

**REJSEFLORA FOR
KORSIKA OG SARDINIEN**

Denne rejseflora blev lavet som et sammenskrift af oplysingerne i Pignattis bog Flora d'Italia om Korsika og Sardinien. For ikke at få floraen for tyk blev den skrevet som et supplement til Dansk Feltflora, sådan at de danske arter forudsættes kendte i forvejen og kun lige nævnes i teksten og nøglerne, men uden særskilte beskrivelser. Og af samme grund indskrænkede jeg også antallet af familienøgler, noget jeg dog senere har rådet lidt bod på ved at tilføje nogle bagest i hæftet.

Udbredelsen er taget direkte fra Pignatti. Når intet er nævnt, findes arten på begge øer. Blomstringstider, højdeangivelser og hyppigheder stammer også herfra og kan nogle gange måske være noget misvisende, idet de ofte dækker større områder af Italien.

Under en rejse til Korsika i 1999 fandt jeg en 5-6 arter, der ikke var med i floraen, hovedsageligt fordi Pignatti havde glemt at sætte prikker ud for Korsika i sin bog. Men heldigvis er der nu udkommet en særlig korsikansk flora med alle de nyeste oplysninger og ofte bedre skillekarakterer for arterne: Flora Corsica af Daniel Jeanmonod og Jacques Gamisans fra 2007.

Mogens Thornberg

1.

SELAGINELLACEAE

Selaginella denticulata (L.) Link 3-10 cm. Spinkle, krybende, flade, toradede skud. Alm.

LYCOPODIACEAE

Huperzia selago (L.) Bernh. Korsika.

ISOETACEAE

- | | |
|---|-----------|
| 1. Vand- eller sumpplante. Bladgrunden ikke forhornet og vedvarende | 2. velata |
| Landplante. Bladgrunden forhornet og vedvarende | 2. |
| 2. Bladene hvidliggrønne | histris |
| " mørkegrønne | durieui |

Isoetes velata A.Br. Blade 8-24 cm, gulgrønne, ved grunden med en godt 1 mm bred hindekant, der strækker sig noget op ad bladet. Lave søbredder. M.sj. Korsika. IV-VIII.

Planterne på Sardinien der har blade på 20-30 cm med smallere hindekant, kaldes undertiden I. tegulana Genn.

I. histrix Bory Blade 5-10 cm. Bladgrunden vedvarende i flere år som skinnende, sorte, hornede skæl med en kort bred midtertak og to lange sidetænder, hos de korsikanske planter danner de et helt løg. Sandede, vintervåde steder. III-V. M.sj.

I. durieui Bory Som foreg., men bladene fastere, ofte krummede. De vedvarende bladgrunde med 3 korte tænder. Sandede, vintervåde steder. III-V. M.sj.

EQUISETACEAE

Equisetum

- | | |
|---|--------------|
| 1. Akset brodspidset | 2. |
| Akset ikke brodspidset | 3. |
| 2. Stængler ugrenede | hiemale |
| " grenede | ramosissimum |
| 3. Stænglen hvidlig, ca. 10 mm i tværmål | telmateia |
| " grøn, sjældent over 10 mm i tværmål | 4. |
| 4. Grenene med ca. 5 trekantede, sortspidsede skedetænder | palustre |
| " med (3-)4 sylformede, grønne skedetænder | arvense |

E. hiemale L. Korsika. M.sj.

E. ramosissimum Desf. Planten mørkegrøn, uregelmæssigt grenet med m.m. oprette grene. Akset 6-12 mm. V-IX. Alm.

E. telmateia Ehrh. Alm.

E. palustre L. Korsika. Sj.

E. arvense L. Alm.

OPHIOGLOSSACEAE

Ophioglossum

- | | |
|---|-------------|
| 1. Et enkelt blade på 1-12 cm | vulgatum |
| 2-3 små blade på 1-3 cm | 2. |
| 2. Bladgrunden tilsmalnet; ingen fritendende bladårer | lusitanicum |
| " kileformet; nogle | azoricum |

O. vulgatum L. IV-VI. M.sj. Korsika

O. lusitanicum L. Bladene smalle: 2-7 mm brede, ofte stilkede. Akset 1-2 cm med 5-10 sporehuse på hver side. VIII-XII. Korsika Sj.

O. azoricum Prsel Bladene 1½-3 cm brede. 6-15 par sporehuse. VIII-XII. Surjordsenge. 1200-1700 m. Korsika. Sj.

Botrychium simplex Hitchc. Bladet fålappet, udgår tæt ved grunden af planten. Sure enge og tørvejord. 1300-2100 m. VII-VIII. Korsika. M.sj.

FILICES

1. Bladene hele Phyllitis
Bladene 1-4 x fjersnitdelte 2.
2. Bladene 1 x delte 3.
Bladene 2-4 x delte 8.
3. Sporer på særlige blade Blechnum
Sporer på almindelige blade 4.
4. Sporehobene sammenløbende og dækkede af den ombøjede
bladrand Pteris
Sporehobene ikke dækkede af bladranden 5.
5. Bladundersiden rustfiltet Ceterach
" ikke filtet 6.
6. Lange sporehobe Asplenium
Runde " 7.
7. Bladfligene med tilsmalnet grund Polystichum lonchitis
" uden " " Polypodium
8. Lille, enårig plante. Golde og sporebærende blade
lidt forskellige Anogramma
Flerårige planter 9.
9. Sporer på særlige blade eller bladafsnit 10.
Sporer på almindelige blade og bladafsnit 11.
10. Sporer på særlige blade Cryptogramma
Sporer på særlige bladafsnit Osmunda
11. Bladafsnittene vifteformede, tydeligt skilte, med
sporehobene langs randen Adiantum
Bladafsnittene anderledes 12.
12. Sporehobene randstillede og dækkede af den ombøjede bladrand 13.
" ikke dækkede af den ombøjede bladrand 14.
13. 40-200 cm høj Pteridium
3-35 cm høj Cheilanthes
14. Sporehobene aflange 15.
" runde 16.
15. Små planter, højst 30-40 cm Asplenium
Større planter, op til 1 m Athyrium
16. Sporehobene uden slør 17.
" med " 19.
17. 50-150 cm høj Athyrium
10-30 cm høj 18.
18. Bladet udpræget trekantet, 2-3 x delt Gymnocarpium
" lancetformet, 2 x delt Phegopteris
19. Sløret skjoldformet, fæstnet midtpå Polystichum
Sløret ikke skjoldformet 20.
20. Sløret hattetformet, fæstnet på den ene side Cystopteris
Sløret ikke således 21.
21. Bladfligene helrandede. Sløret affaldende Thelypteris
" tandede, lappede eller helt delte Dryopteris

Osmunda regalis L. 30-150 cm, 2 x delt med næsten altid helrandede flige, der er indbyrdes adskilte. Øvre flige omdannede og sporebærende. VI-VII. Alm.

Cheilanthes Artsopfattelse efter Flora Iberica.

1. Begge sider af bladet tæt gulfiltede catanensis
Bladoversiden glat 2.
2. Bladundersiden tæt rustfiltet marantae
" ikke rustfiltet 3.
3. Den ombøjede, sporedækkende bladrand frynset (lup) acrostica
Bladranden ikke frynset 4.
4. Den sporedækkende bladrand bred ($\frac{1}{2}$ -1 mm), m.m. sammenhængende
eller med nærmest rektangulære lapper guanchica
Den sporedækkende bladrand smal, op til 0,4 mm 5.
5. Bladundersiden med korte kirtelhår på $\frac{1}{2}$ mm tinai
" uden kirtelhår maderensis

C. marantae (L.) Domin(Notholaena marantae (L.) Desv) 10-35 cm.
Bladstilk næsten af pladens længde, mørkt rødbrun med skæl. Bladet oftest 2 x delt. Solbeskinnede klipper. VI-IX. Korsika. M.sj.

3.

Cheilanthes catanensis (Cos.) Fuchs (Notholaena vellea (Ait.) Desv.
Blade 8-25 cm. Stilken gulbrun, skinende, tætskællet. Bladet 2 x delt, tæt gulskællet på begge sider. Solbeskinnede klipper. M.sj. Korsika: Ajaccio. Sardinien. III-IX.

Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod. (C. fragrans (L.f.) Sw. p.p.)
Indtil 24 cm. Stilken kastanjebrun, med mange skæl. Bladpladen 2-3 x delt, dens ombøjede, sporedækkende rand frynset, til sidst rustbrun. III-IX. Alm. Klipper og mure.

C. guanchica C.Bolle Ligner foregående i sin vækst. III-IX. Skyggefulde klipper, ofte på serpentin. Flere steder på begge øer.

C. maderensis Lowe Vækst som acrostica. III-IX. Klipper. M.sj. Sardinien: Capoterra, Talentino, Orosei. Korsika: Bastia, Casta Torre

C. tinai Tod. (C. corsica Reichst. & Vida) Vækst som acrostica. IV-IX. Granitklipper. M.sj. Korsika: Bastia, Evisa, Bonifacio. Sard.

Adiantum capillus-veneris L. Venushår. 10-60cm høj. Sort bladstilk. VII-IX. Fugtige grotter. Alm.

Pteris cretica L. Højst 7 par flige. Bladet med ægformet omrids. Bladstilk op til 30 cm, pladen til 40 cm. De nederste flige kan være tvedelte ved grunden. VII-IX. Skyggede klipper. Sj.

Cryptogramma crispa (L.) R.Br. Blade tuestillede, lysegrønne, 15-30 cm, findelste. De sporebærende blade med smallere afsnit. VII-IX. 1000-2400m Alm. Korsika.

Anogramma leptophylla (L.) Link Lille, tyndbladet bregne, 5-15cm. Bladet lancetformet, uregelmæssigt 2-3 x delt. Sporehobene aflange til sidst sammenflydende. III-IV. Klipper og fugtige mure. Sj.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn V-IX. Alm.

Thelypteris limbosperma (All.) Fuchs Bladene i tætte rosetter. Bladstilk højst $\frac{1}{4}$ af pladen, brunskællet. VII-IX. Korsika. Sj.

T. palustris Schott Bladene spredte langs den krybende rodstock. Bladstilk af pladens længde, uden skæl. VII-IX. Korsika. Sj.

Phegopteris polypodioides Fée Dunet egebregne. VI-IX. Korsika. Alm.

Asplenium

1. Bladene gaffelgrene, med lange, smalle flige .. septentrionale
Bladene 1-4 x fjerdedelte 2.
2. Bladene 1 x delte 3.
Bladene 2-4 x delte 5.
3. Fligene 2-4cm lange marinum
Fligene kortere 4.
4. Bladstilk sortglinsende med kastanjebrun skær ... trichomanes
" grøn viride
5. Bladstilk grøn undtagen helt nederst 6.
" rødbrun 7.
6. Fligene af 1. orden aftager i størrelse nedad fontanum
" af 1. orden tiltager i størrelse nedadtil ruta-muraria
7. Bladpladen m.m. trekantet, de nedre flige 3-8 cm, ca.
 $\frac{1}{3}$ længere end de midterste 8.
Bladpladen elliptisk eller lancetformet. De nedre flige
 $\frac{1}{2}$ -4 cm, = eller kortere end de midterste 10.
8. De yderste flige kile-vifteformede. Bladene bløde
og matte cuneifolium
De yderste flige æg- eller lancetformede. Bladene stive 9.
9. Bladene stærkt skinnende. De yderste flige udtrukne .. onopteris
Bladene skinnende. Fligene ikke udtrukne adiantum-nigrum
10. Bladpladen $\frac{1}{10}$ - $\frac{1}{5}$ x så bred som lang foesiense
Bladpladen $\frac{1}{5}$ - $\frac{2}{5}$ x så bred som lang 11.
11. Bladtyperne butte og . brodspidsede obovatum
" spidse billotii

Asplenium marinum L. 15-30cm. Bladstilken godt $\frac{1}{2}$ x pladen, rød-brun. Pladen læderagtig. Klipper langs havet. VI-X. Sj.

A. trichomanes L. Rundfinnet radeløv. Her øjensynligt som ssp. quadrivalens D.E.Meyer. III-IX. Alm.

A. viride Hudson 5-15 cm. Bladfligene ca. $\frac{1}{2}$ cm. V-IX. Korsika. Sj.

A. fontanum (L.) Bernh. Bladet smalt, lancetformet til smalt elliptisk. Stilken stråfarvet eller grønlig. III-X. Angivet fra Korsika i Flora Europaea.

A. foresiense Le Grand Bladform som hos foregående. Fligene med 1-3 par tandede, afrundede afsnit. Nedre fligpar noget nedadvendte. Våde klipper. III-X. M.sj.

A. obovatum Viv. De nedre flige kun lidt kortere end de midterste. Omridset ægformet-trekantet. III-X. Fugtige klipper. Alm.

A. billotii F.W.Schultz III-X. Kiselholdige klipper. Korsika: Alm. Sardinien: Sj.

A. adiantum-nigrum L. VII-VIII. R.alm.

A. onopteris L. De yderste bladflige noget piskeformet udtrukne. V-VIII. Stenegskove. Skyggede klipper. Alm.

A. cuneifolium: Viv. Bladene minder ofte om en stor murrude. V-VII. Serpentinklipper. Korsika: Lokalt alm.

A. septentrionale (L.) Hoffm. VII-X. Sj.

A. ruta-muraria L. VI-X. Alm.

Ceterach officinarum DC. Tæt roset. Bladene mørkegrønne og læderagtige ovenpå og rustfildede nedenunder, 1 x delte med butte flige, 5-15 cm lange. Fligene kun lidt længere end brede. V-VIII. Alm.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Hjortetunge. Bladet udelte med hjerteformet grund, hvis lapper er nedadrettede. I-XII. Fugtige skove, vandhuller, altid på kalk. Alm.

P. sagittata (DC.) Guinea & Heywood Bladene 12-30 cm. Grundlapperne m.m. udstående. I-XII. Fugtige, skyggefulde klipper. Sj.

Athyrium filix-femina (L.) Roth. Fjerbregne. Sporehobene aflange med blivende slør. VII-IX. Sj.

A. distentifolium Tausch 50-150 cm. Minder om foregående, men sporehobene er runde og sløret falder meget tidligt. VII-IX. Korsika. M.sj.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Bægebregne. V-IX. Alm.

C. dickeiana R.Sim. Ligner foregående meget, men bladene mattere, lidt over i det brunlige. Bladfligene med overlappende kanter. Det præcise skillemærke er de ru sporer (de er piggede hos *fragilis*). VI-VIII. Sardinien: M.Limbara, Ortobene, Gennargentu. M.sj.

Polystichum. Skjoldbregne. De yderste afsnit m.m. seglformede.

- | | | |
|--|-----------|----|
| 1. Bladet 1 x delt | lonchitis | 2. |
| Bladet 2(-3) x delt | | |
| 2. 2. ordens flige tydeligt stilkede | setiferum | |
| 2. ordens flige nedløbende | aculeatum | |

Polystichum lonchitis (L.) Roth Bladet stift, overvintrende med 15-50 par seglformede flige. VI-VIII. Korsika. Sj.

P. aculeatum (L.) Roth Minder om en mangeløv, men med m.m. seglformede flige. De nederste flige $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ kortere end de midterste. VI-VIII. Sj.

P. setiferum (Forsskål) Woyнар Ligner foregående, men de nederste flige kun lidt kortere end de midterste. VI-VIII. Sj.

Dryopteris

- | | |
|--|-------------|
| 1. Bladet 2 x delt med m.m. hele flige | 2. |
| " 2-4 x delt med delte flige | 4. |
| 2. Bladstilk og skaft tæt, kastanjebrunt skællede | affinis |
| Stilk og skaft med færre, lysere skæl | 3. |
| 3. Sporehobe 1 mm store, næsten kuglerunde | tyrrhena |
| Sporehobe oftest større, afladede | filix-mas |
| 4. Bladets omrids lancetformet, nederste fligpar symmetrisk | 5. |
| Bladets omrids trekantet. Nederste fligpar usymmetrisk | 6. |
| 5. Bladet mørkegrønt, tæt kirtlet ovenpå, 2 x delt | villarii |
| Bladet lysegrønt, m.m. kirtelløst, næsten 3 x delt | pallida |
| 6. Stilkens skæl med mørk midterstribe | dilatata |
| Stilkens skæl ensfarvede | carthusiana |

Dryopteris filix-mas (L.) Schott VII-IX. Korsika alm. Sardinien Sj.

D. affinis (Lowe) Fr.Jenk. Bladskafte på undersiden med en sort plet ud for hver sideflig. VII-IX. Korsika. Sj.

D. tyrrhena Fr.-Jenk. & Reichst. Yderste tænder på bladfligene krumme. VII-IX. 0-2000m. Sardinien: Gennargentu. Korsika. Sj.

D. villarii (Bellardi) Woyнар Bladstilk 1/3- $\frac{1}{2}$ x pladen, gullig, rødbrunt skællet. Bladet oftest dækket af gullige kirtelhår, duf-tende. VII-IX. Bjærgplante. M.sj.

D. pallida (Bory) C.Ch. Minder om foregående. VII-IX. Alm.

D. dilatata (Hoffm.) A.Gray VII-IX. Korsika

D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs VII-IX. Korsika. Sj.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. Tredelt egebregne. Lysegrøn. Største afsnit af 2. orden på nederste flig med 6-10 par lapper. VI-IX. Korsika. Alm.

G. robertianum (Hoffm.) Newm. Bladet har samme udseende som hos foregående, men er mørkegrønt. Største afsnit af 2. orden på nederste flig med 10-20 par lapper. VI-IX. På kalk. Korsika. Sj.

Blechnum spicant (L.) Roth Kambregne. VI-IX. Sj.

Polypodium australe Fée Ligner den hjemlige engelsød, men bredere, mere trekantet bladplade. II-VI. Alm.

MARSILEACEAE

Marsilea quadrifolia L. Kløverbregne. En krybende jordstængel som hos pilledrager med grupper af 7-20 cm langt stilkede firkløverlige blade. Fra jordstilk udgår nogle 1-2 cm langt stilkede, runde sporefrugter. VII-IX. Sumpe- Sardinien. Sj.

M. strigosa Willd. Som foregående, men sporefrugterne næsten sid-dende. Bladene undertiden svagt hårede. III-VI. Sardinien: Ved Taranto.

Pilularia minuta Dur. Som den hjemlige pilledrager, men 1-4 cm høj. Sporefrugten 1 mm stor. IV-V. Stillestående vand. Korsika: ved Portovecchio. Sardinien. M.sj.

AZOLIAEAE

Azolla filiculoides Lam. Andemadsbregne. Flydende planter på 1-10 cm, bestående af grenede skud med toradet stillede blade med nedhængende rødde. VII-IX. Stillestående vand. Sardinien: Cagliari.

PINACEAE

Abies alba Miller Korsika. Alm.

Pinus

- | | |
|--|------------|
| 1. 1.års kviste grå til grågrønne | 2. |
| " rødbrune | 3. |
| 2. Nålene $1\frac{1}{2}$ -2 mm brede | pinæ |
| " 0,7 mm brede | halepensis |

3. Stammens bark rødbrun pinaster
 " " gråviolet laricio

Pinus pinaster Aiton Nåle 10-25cm x 2mm, stive og stikkende. Koglen 8-22cm, symmetrisk, skinnende lysebrun med tornede skæl. 0-800m. Alm.

P. laricio Poiret (Pinus nigra Arnold ssp. l.) Nålene 8-16cm x 1,2-1,9mm, let stikkende, vredne. Koglen 6-8cm, gulbrun. 800-1800m. Korsika. Alm.

P. halepensis Miller Gråfyr. Barken sølvgrå, efterhånden rødligbrun og stærkt furet. Nåle 6-15 cm. Koglen 5-12 x 4 cm, skinnende brun. 0-800m. Alm.

P. pinea L. Pinje. Nåle 10-20cm. Stammen gråligbrun, orangerødt afskallende. Koglen 8-14 x 10cm, skinnende brun. Frøet uden eller næsten uden vinge. 0-800m. Alm.

CUPRESSACEAE

Cupressus sempervirens L. Ægte cypres. Vækst som de hjemligt dyrkede former, men kvistene er helt trinde. Koglen kuglerund, 2-4cm, bestående af 8-14 skjoldformede skæl. Alm.

Juniperus

1. Bladene nåleformede2.
 Bladene skælformede4.
2. Nålene med 2 lyse striber på oversiden oxycedrus
 " med 1 lys stribet på "3.
3. Nålene fjærrnere stillede, 3-10 mm mellem kransene communis
 Nålene tætstillede, 1-3 mm mellem kransene nana
4. Skælbladene i 6 rækker på trinde kviste phoenicea
 " i 4 rækker på firkantede kviste thurifera

Juniperus communis L. Ene. Usikker

J. nana Willd. (Juniperus communis L. ssp. n.) Krybene. Nedtrykt dværgbusk op til 30 cm høj, ofte halvkugleformet. 1500-2500m. Alm.

J. oxycedrus L. Stikkende ene. 1-5m, sjældent højere. Alm.

2 underarter:

ssp. oxycedrus: Nålene højst 2 mm brede. Bærret rødbrunt, skinnende, næppe blådugget, 7-11mm. Alm. Krat.

ssp. macrocarpa (Sibth. & Sm.) Ball: Nålene indtil 2½ mm brede. Bærret brunligt, blådugget, 8-15mm. Alm. nær kysten, især ved strandene.

J. phoenicea L. Skælene. 1-4m, sjældnere op til 8m. Skælbladene 0,7-1mm, butte eller svagt spidse, tydeligt hindekantede. Alm.

J. thurifera L. Røgelsesene. Op til 10m. Skælbladene 1½-2mm, spidse eller tilspidsede, uden hindekant. Korsika. M.sj.

TAXACEAE

Taxus baccata L. Taks. M.sj.

EPHEDRACEAE

Ephedra. Ledris. Udpræget padderokkelignende buske med små akselstillede blomsterstande i nøgler. Bladene stærkt reducerede til korte skeder på få mm.

1. Kvistene bøjelige og skøre, 1-2mm tykke. Frugt 8-9mm .. fragilis
 " stive og tyndere. Frugt 5-7mm2.
2. Ældre bladskeder kastanjebrune. Kvistene 0,4-0,7mm tykke major
 " " grønne eller hvidgrå med mørkebrun grund. Kvistene 0,7-1mm tykke distachya

Ephedra fragilis Desf. Skørt ledris. Bladskederne mørkebrune. 0-300m. Især på strandene. Sardinien. Alm.

E. distachya L. På strandene. M.sj.

E. major Host 200-1300m. Kalkklipper. Sardinien: Fra M.di Oliena

til M. Gonari. M.sj.

SALICACEAE

Salix

1. Modne blades undersider glatte2.
 " " " hårede5.
2. Bladoversiden skinnende mørkegrøn fragilis
 " mat3.
3. Bladene gennemgående smalle, øverste 1/3 finttandede, nederste 2/3 helrandede purpurea
 Bladene ensartet tandede eller helrandede4.
4. Unge kviste mørke og dunede nigricans
 Unge kviste grønligt eller rødligt brune, glatte triandra
5. Bladene gennemgående over 5 x så lange som brede6.
 Bladene bredere8.
6. Bladranden ikke indrullet alba
 " indrullet7.
7. Bladundersiden tiltrykt silkehåret viminalis
 " tætfilteret elaeagnos
8. Bladundersiden blågrøn med grøn spids nigricans
 " ensfarvet9.
9. Sidste års skud tæthårede10.
 " " " glatte11.
10. 7-9 par sidenerver cinerea
 10-15 par sidenerver pedicellata
11. Bladene under 5 cm aurita
 " over 5 cm12.
12. Bladundersiden rustfilteret atrocinerea
 " gråfilteret caprea

Salix fragilis L. Skørpil. Sj.

S. triandra L. Mandelpil. Sardinien. Sj.

S. nigricans Sm. (S. myrsinifolia Salisb.) Sortpil. Korsika. M.sj.

S. pedicellata Desf. 2-4-års kviste med vedstriber. Blade tyndt dunede nedenunder, glatte ovenpå. Nær vandløb. Alm.

S. cinerea L. Gråpil. Korsika: Alm. Sardinien: Sj.

S. atrocinerea Brot. Unge kviste tyndt dunede. Grenene med vedstriber. Undersiden rustfilteret. Fugtige lavninger. Sardinien: Nord, midt og øst. Sj.

S. aurita L. Øret pil. Korsika. Sj.

S. caprea L. Seljepil. Korsika. Sj.

S. viminalis L. Båndpil. Sardinien. Sj.

S. elaeagnos Scop. Unge kviste dunede. Unge blade tæt uldhårede på begge sider, efterhånden glatte ovenpå. Flodlejer. Korsika. Sj.

S. purpurea L. Purpurpil. Flodlejer. Alm.

Populus alba L. Alm. Sølvpoppel.

P. tremula L. Bævreasp Alm.

P. nigra L. Sortpoppel. Alm.

P. canadensis L. Ligner foregående, men nogle blade med 1-2 kirtler ved bladgrunden. Plantet. Sj.

JUGLANDACEAE

Juglans regia L. Valnød. Dyrket og forvildet.

BETULACEAE

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Rødæl. Alm.

A. cordata (Loisel.) Desf. Bladene hjerteformede og tandede. Korsika. R.alm. 0-1500m.

Alnus viridis (Chaix) DC. ssp. suaveolens (Req.) Ball Grønæl.
1-årskviste dunede og klæbrige. Knopperne siddende. Bladene halv-
runde, dunede på undersiden i ribbehjørnerne. Korsika. Sj.

CORYLACEAE

Ostrya carpinifolia Scop. Humlebøg. Bladene helt som hos Avnbøg.
Humraklerne ligner meget forlængede humlekopper. Alm.

Corylus avellana L. Hassel. Alm.

FAGACEAE

Fagus silvatica L. Bøg. Korsika. Sj.

Castanea sativa Miller Ægte kastanje. Blade lancetformede, 18-22
cm, skarpt savtaktede. Alm.

Quercus

1. Bladene ikke lappede, m.m. læderagtige og stedsegrønne 2.
" lappede, tyndere 4.
2. Bladundersiden glat *coccifera* 3.
" filtet 3.
3. Midterribben noget bølget. Barken meget tyk og korkagtig . *suber*
" lige. Barken ikke sådan *ilex*
4. Unge kviste glatte *petraea* 5.
" filtete 5.
5. Bladoversiden skinnende og noget læderagtig *congesta* 6.
" mat eller lidt skinnende, men ikke læderagtig 6.
6. Bladstilken 5-12 mm *pubescens*
" 15-25 mm på de større blade *virgiliana*

Quercus coccifera L. Kermeseg. Stedsegrøn busk, oftest op til 2m.
Bladene 1½-4 cm, tornet tandede. Sj.

Q. ilex L. Steneg. 1-20m. Kvistene gråfiltede. Bladene stedsegrøn-
ne, 3-7cm, helrandede eller tornet savtaktede, glinsende ovenpå,
gvidfiltede nedenunder. Alm.

Q. suber L. Korkeg. Alm. En sjælden form har 3-5 par lapper.

Q. petraea (Matt.) Liebl. Vinterreg. Korsika. Alm.

Q. virgiliana (Ten.) Ten. 5-7 par brede, ofte lappede flige. Sj.

Q. pubescens Willd. Unge kviste tæt hvidfiltede. Bladoversiden mør-
kegrøn, undersiden hvidfiltet, til sidst m.m. glat. M.alm. Duneg.

Q. congesta Presl 5-7 par lapper, der ofte overlapper hinanden.
Sardinien. Sj.

ULMACEAE

Ulmus minor Miller (U. *carpinifolia* Rupp.) Småbladet ælm.

Celtis australis L. Nældetræ. Bladene minder en del om lidt smalle-
re blade hos Stør nælde, langt tilspidsede, mørkegrønne med ru over-
side. Alm.

MORACEAE

Morus nigra L. Sort morbær. Træ med kraftige, ru grene. Bredt æg-
hjørteformede blade med dunet underside. Mærkt purpurfarvet, brom-
bærlignende frugt. Hyppigt dyrket.

Morus alba L. Hvidt morbær. Som forrige, men med glatte, slanke
kviste og glat bladunderside. Rødlig til hvid frugt. Hyppigt dyr-
ket.

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Papirmorbærtræ. Ligner de fore-
gående, men bladene tæt hvidfiltede på undersiden. Nogle blade kan
være dybt 3-5-delte. Alm. dyrket og forvildet.

Ficus carica L. Figen. Alm.

CANNABACEAE

Humulus lupulus L. Humle. Sj.

URTICACEAE

Urtica

1. Hunblomster i langstilkede, kugleformede hoveder *pilulifera* 2.
Alle blomster i klaser 3.
2. Enårig 3.
Flerårig 4.
3. 2 akselblade. Øvre klaser hanlige, 3-9 cm *dubia* 4.
4 akselblade. Klaserne 1-2(-2½)cm, både han- og hunlige *urens*
4. Tvebo. Bladene tit 2 x så lange som brede *dioica*
Klaserne med både han- og hunblomster *atrovirens*

U. atrovirens Req. Mørk nælde. 30-90cm. Bladene 3-9x2-7cm, dybt
tandede; stilken 2-7cm. Gårdspladser, mure. 0-1200m. Sj. IV-VI.

U. dioica L. Stor nælde. Alm.

U. urens L. Liden nælde. Alm.

U. dubia Forsskål (U. *membranacea* Poirer) Udspærret nælde. Blad-
stilken omtrent lig pladen, denne ægformet 2-6 cm. V-IX. Alm.

U. pilulifera L. Kuglenælde. Ligner den foregående, men endetanden
længere end de andre. IV-VI. Alm.

Parietaria Springknap

1. Enårig. Støttebladene mindst lig frugtbløsteret *lusitanica* 2.
Flerårig. Støttebladene kortere end frugtbløsteret 2.
2. Støttebladene helt frie. Frugtbløsteret 2,7-3mm ... *officinalis*
" ikke " " 3-3,5mm *diffusa*

P. officinalis L. Alm. springknap. Sparsomt grenet. Bladene 5-10
cm med gennemskinnelige nerver. V-X. Meget tvivlsom.

P. diffusa Mert. & Koch Grenet springknap. Grenet. Bladene op til
5 cm, nerverne ikke gennemskinnelige. I-XII. Alm.

P. lusitanica L. Enårig springknap. Nedliggende eller opstigende.
Bladene op til 4 cm, oftest 1-2cm, ægformede til halvrunde. I-III
(-V). Alm.

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy Husfred. Skyggefulde, våde klip-
per. V-VI. Sj.

SANTALACEAE

Osyris alba L. Kratris. Rislignende busk op til 120cm. Stænglerne
noget kantede. Linjeformede blade på ca. 1 cm. Små gulgrønne blom-
ster med enkelt, 3-4-bladet bløster og kegleformet underdel. III-
VI. Krat. Alm.

Thesium Nalebæger.

1. Enårig. Frugten netåret *humile* 2.
Flerårig. Frugten længdeåret 2.
2. Blade linje-lancetformede, 2-4mm brede *linophyllon* 3.
Blade linjeformede, 1mm brede (sjældent op til 2mm) 3.
3. Blomsterstand bredt pyramideformet, nedre grene
mangeblomstrede *divaricatum* 4.
Blomsterstand cylindrisk med 1(-3)-blomstrede grene 4.
4. Blomsterstilke meget korte. Bladet 0,8(-1)mm bredt ... *cyrnosum*
" op til 5 mm. Bladet 1(1½)mm bredt *corsalpinum*
" 2-3 x blomsten. Bladet 1-1½ mm bredt *italicum*

• T. cyrnosum Hendrych Blomsterstilke meget korte eller manglende.
Ingen udløbere. Forblade omtrent = blomsten. V-VII. 1200-1850m.
Korsika: M. Pigno, C. Corso, Incudine. M. sj.

- Thesium italicum DC. Med udløbere . Forblade 1-3 x blomsten. V-VI. 50-800cm. Vindblæste toppe. Sardinien: Limbara, M.di Oliena. M.sj.
- T. corsalpinum Hendrych Ingen udløbere. Forblade 1-3 x blomsten. V-VII. Klipper. 1200-1750cm. Korsika: M.Cinto, M.Rotondo.
- T. linophyllon L. 10-30cm. Underjordiske udløbere. V-VII. Tørange. Alm.
- T. divaricatum Jan 15-25cm. Ingen udløbere. V-VI. Alm.
- T. humile Vahl 5-20cm. Nedliggende til opret. Blomsterstanden stundom aksformet. IV-V. Sj.

LORANTHACEAE

Viscum album L. Mistelten. Korsika. Sj. 2underarter: ssp. austriacum (Wiesb.) Vollmann på Fyr og ssp. abietis (Wiesb.) Abromeit på Adelgran.

Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb. 5-20cm store, spidsvinklet grenede, gulgrønne planter med kraftigt reducerede, stængelomfattende skælblade, der snylter på Ene. I-VII. Angivet fra Korsika.

ARISTOLOCHACEAE

Aristolochia Slangered.

- | | |
|---|-------------|
| 1. 2-8 lysegule blomster sammen i bladhjørnerne | clematitis |
| Blomsterne enlige i bladhjørnerne | 2. |
| 2. Blomsterstilken længere end bladstilken | 3. |
| " kortere end eller lig bladstilken | 4. |
| 3. Bladene finttandede, dunede | pistolochia |
| Bladene helrandede, glatte | rotunda |
| 4. Bladstilken 2 x blomsterstilken | pallida |
| " omtrent lig blomsterstilken | longa |

Aristolochia clematitis L. 2-10dm. Hjerterformede blade med dyb udskæring. Blomster 2-3cm. IV-V. Korsika. Sj.

A. pistolochia L. 20-40cm. Blade trekantede med dybt udskåret grund. Blomsten gulbrun med mørkpurpur krave, 2-5cm. IV-VI. Sj.

A. rotunda L. 20-40cm. Bladene afrundet hjerterformede, med en stilk på 1-2mm. Blomsten 3-5cm, gul med mørkebrun krave. IV-VI. Sj.

A. pallida Willd. 10-40cm. Stænglen stribet, opstigende. Blomsten 3-5cm, gulgrøn med purpurfarvede striber. IV-V. Alm.

A. longa L. 20-70cm. Blade ægformet trekantede med nyreformet grund. Blomsten 3-5cm, brun eller gullig med brunpurpur krave. IV-V. Alm.

RAFFLESIAEAE

Cytinus hypocistis (L.) L. 3-8cm høj snylteplante på Cistaceae. Planten kødfuld, dækket af gule, orange eller skarlagenrøde, kodede skælblade. 5-10 kraftigt gule blomster omgivne af kodede højblade af skælbladernes farve. IV-V. Sj.

C. ruber (Fourr.) Komarov Som foregående, men blosteret hvidgult eller orangerødt. Skælbladene kraftigt karminrøde. IV-V. Sj.

POLYGONACEAE

Polygonum Pileurt

- | | |
|--|-----------|
| 1. Blomsterne i en grenet top | alpinum |
| " i aks eller nøgler | 2. |
| 2. Blomster i nøgler på 1-4 i bladhjørnerne | 3. |
| Blomsterne i endestillede aks | 9. |
| 3. Opret, næsten bladløs, padderokagtig halvbusk | scoparium |
| Planten bladlet, urteagtig | 4. |
| 4. Flerårig | 5. |
| Enårig | 6. |
| 5. Skeder helt hindeagtige | romanum |
| Skeder rødbrune forneden | maritimum |

- | | |
|---|---------------|
| 6. De øvre højblade hindeagtige og kortere end blomsten | patulum |
| Alle højblade grønne og længere end blomsterne | 7. |
| 7. Bladene nogenlunde lige store | arenastrum |
| Sidegrenenes blade tydeligt mindre end hovedgrenenes | 8. |
| 8. Større blade 1-4 mm brede | rurivagum |
| " " 5-8 mm brede | aviculare |
| 9. Det endestillede aks tæt med lige akse | 12. |
| " " tyndt med bøjet akse | 10. |
| 10. Flerårig. Større blade ofte over 10 cm | salicifolium |
| Enårig. Bladene sjældent over 8 cm | 11. |
| 11. Blade skarptsmagende. Skeder langt randhårede | hydropiper |
| Blade mildtsmagende. Skeder kort randhårede | mite |
| 12. Flerårig | amphibium |
| Enårig | 13. |
| 13. Skeder dunede, langt randhårede | persicaria |
| " glatte, kort randhårede | lapathifolium |

● Polygonum scoparium Req. 50-100cm. Bladene affaldende. Skeder brune, 3-4mm, åbne i siden. Blomster i forlængede klaser. Fugtig jord, vejkanter og flodlejer. VII-X. 0-300m. Sj.

P. romanum Jacq. 40-100cm, nedliggende, tætbladet foroven. Bladene linje-lancetf., spidse, noget blågrønne. VII-X. Sardinien. Sj.

P. maritimum L. 10-40cm. Stængler ru og kantede. Blade smalt elliptiske, stedsegrønne, blågrønne. Skeder med 8-12 tydelige årer. Sand- og stenkytter. V-VIII. Alm.

P. patulum Bieb. Opret, 20-50cm. Bladene lancetformede, 25-45mm. Kornmarker. IV-X. Alm.

P. aviculare L. VI-X. M.alm.

P. rurivagum Jordan VI-IX.

P. arenastrum Bor. VI-IX.

P. mite Schrank Blosteret uden kirtler. Fugtige steder. VII-X. Sj.

P. hydropiper L. Bidende pileurt. Blosteret kirtlet. VII-X. Sj.

P. salicifolium Brouss. Bladene finttandet-randhårede. Lyserøde blomster i lange, slanke aks. Våde steder. VII-IX. Sardinien. R.alm.

P. lapathifolium L. Bleg pileurt. VII-X. Alm.

P. persicaria L. Ferskenpileurt. VII-X. Alm.

P. amphibium L. Vandpileurt. VI-VIII. Sj.

P. alpinum All. 30-70cm. Stængler oprette, bugtede. Blade bredt æg-lancetformede, spidse. 800-1800m. VII-VIII. Korsika. Sj.

Fallopia convolvulus (L.) Holub Snerlepileurt. V-VIII. Alm.

F. dumetorum (L.) Holub Vingepileurt. V-VIII. Korsika. R.alm.

Oxyria digyna (L.) Hill Fjældsyre. 5-20cm høj. Blade næsten alle grundstillede, 1-3cm, vorterodsformede, noget kodede med 3-10 cm lange stilke. Blomsterne i lille, åben klase, skræppeagtige, men kun med 2 blosterblade i hver blosterkrans. 2400-2600m. Korsika: M.Rotondo.

Rumex Skræppe

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Indre blosterblade tandede | 2. |
| " " helrandede | 5. |
| 2. Bladgrund tilspidset | 3. |
| " afstudset eller hjerterformet | 4. |
| 3. Grundblade 1-3 cm | bucephalophorus |
| " mindst 5 cm | maritimus |
| 4. Blomsterstilk tyk. Blosternerver fremtrædende | pulcher |
| " tynd. " ikke " | obtusifolius |

5. Bladgrunden spyd-, pil- eller hjerteformet 6.
" ikke sådan 11.
6. Bladpladen ca. så lang som bred scutatus
" længere end bred 7.
7. Bladgrundens flige vinkelret udstående acetosella
" m.m. tilbagerettede 8.
8. Indre blosterblade tydeligt bredere end lange,
m.m. udrandede foroven thyrsoides
Indre blosterblade så brede som lange, ikke udrandede 9.
9. Blomsterstanden dobbelt grenet. Bladfligene ofte tvedelte
intermedia
Blomsterstanden enkelt grenet 10.
10. Skeder helrandede. Blade 3-7 cm alpestris
" frynsede. Blade større acetosa
11. 2-3 m høj halvbusk med æg-rudeformede blade lunaria
Urt 12.
12. Blade forneden tilspidsede hydrolapathum
" " afrundede 13.
13. Blade bølgede og krusede crispus
" plane, svagt bølgede 14.
14. Blomsterstanden tæt bladet conglomeratus
" kun bladet forneden sanguineus

Rumex acetosella L. Rødknæ. V-VIII. Alm.

R. lunaria L. Busksyre. Grenene vredne med blågrøn-violet bark. Indre blosterblade 6x5mm. Dyrket og forvildet langs hegn. Fra de Kanariske øer. V-VI. Sardinien. Alm.

R. scutatus L. Skjoldsyre. 20-40cm. Bladene m.m. vorterodsformede. Indre blosterblade 4-5mm, runde med hjerteformet grund. På kalkgrus. VI-VIII. Alm. i bjærgene.

R. alpestris Jacq. (R. arifolius All.) Bjærgsyre. En syre, hvis blade har hjerteformet grund med m.m. afrundede lapper. VII-VIII. 1200-2200m. Sj.

R. acetosa L. Alm. syre. V-VIII. Alm.

R. intermedius DC. Ligner foregående, men grundbladene ofte smalle-re med udstående, ofte tvedelte flige. Stængelbladene linjeformede med pilformet grund. IV-VI. Korsika. Sj.

R. thyrsoides Desf. En pilbladet syre, hvis blosterblade er brede og indsnævrede på midten. IV-V. R.alm.

R. hydrolapathum Hudson Vandskræppe. V-VII. Alm.

R. crispus L. Kruket skræppe. V-VII. Alm.

R. conglomeratus Murray Nøgleskræppe. VI-VIII. Alm.

R. sanguineus L. Skovskræppe. VI-VII. Sj.

R. pulcher L. Udspærret skræppe. Stænglen med udstående grene, zigzagbøjet foroven. Nøglerne bladede. 2 underarter: V-VI. Alm.
ssp. pulcher: Grundbladene violinformede. Blosterblade ægformede med få tænder nær grunden. Den almindeligste underart.
ssp. divaricatus (L.) Murb.: Grundbladene næsten aldrig violinformede. Blosterblade m.m. runde med op til 8 par tænder. Mest mod syd.

R. obtusifolius L. Butbladet skræppe. VI-VIII. Sj.

R. maritimus L. Strandskræppe. VII-IX. Sardinien. Sj.

R. bucephalophorus L. Oksehovedskræppe. Lille enårig plante op til 30cm. Blomsterne i klaser, hængende med 2 slags stilke: nogle tynde og korte, andre lange, brede og flade. Blosterblade med ca. 3 par tænder. II-V. Især langs kysten. R.alm.

Emex spinosa (L.) Campd. Tornspinat. Spinatlignende plante, der kendes på sine frugter, der sidder i nøgler i bladhjørnerne og ud-mærker sig ved hver 3 kraftige, udadrettede torne. I-V. Sardin. Alm.

CHENOPODIACEAE (Nøgle bag i hæftet)

Polycnemum arvense L. Agerbruskurt. 5-30cm høj enårig. Bladene 3-8mm lange, sylformede og stive, næsten stikkende, ikke kødede. Blomsterne enlige i de øvre bladhjørner med 2 små forblade. VII-X. Sj.

Beta. Bede. Bladene flade, m.m. helrandede. Blosteret enkelt, for-hærdes og omslutter den modne frugt.

B. vulgaris L. Foder- og Strandbede. VI-VIII. Alm. langs kysterne.

B. macrocarpa Guss. Enårig op til 40cm. Bladene m.m. rudeformede, 3-5cm. Blomsterstanden med højblade hele vejen. Blomsterne i nøgler på 2-5 i bladhjørnerne. Blosteret 1½-3mm, i frugt op til 5mm. Lerede, kystnære steder. V-VI. Sardinien: Asinara.

Chenopodium. Gåsefod.

1. Planten klæbrigt dunet med aromatisk duft 2.
" glat eller melet, ikke aromatisk 5.
2. Bladene fjerlappede eller fjerdelte 3.
" hele, kun de større tandede eller lappede 4.
3. Flerårig, nedliggende multifidum
Enårig, opret botrys
4. Ofte flerårig halvbusk. Ofte ret tæt håret .. suffruticosum
Enårig, glat ambrosioides
5. Bladene grønne, ikke melede 6.
" i det mindste melede på undersiden 11.
6. Bladene helrandede 7.
Bladene tandede eller lappede, i det mindste ved grunden 8.
7. Enårig. Bladene ægformede polyspermum
Flerårig. Bladene trekantet-spydformede bonus-henricus
8. Planten opret, rank, lidet grenet, grenene meget oprette urbicum

- Planten oftest mere grenet, grenene mere udstående 9.
9. Blomsterstandens øvre blade mindre og anderledes end resten 10.
Alle blade ens murale
10. Nedre stængelblade æg-rudeformede, bugtede
til bugtet-tandede rubrum
Nedre stængelblade (rudeformet)trekantede,
helrandet-tandede botryodes
11. Nedre blade helrandede eller med 1 par butte
tænder. Planten lugter af rådden fisk vulvaria
Nedre blade tandede. Ikke stinkende 12.
12. Blade mørkegrønne, let skinnende ovenpå, æg-rudeformede murale
Bladene anderledes 13.
13. Bladene udpræget tofarvede, blågrønne nedenunder glaucum
Bladene ensfarvede 14.
14. Bladene med 1 par større sidelapper,
så de virker trelappede ficifolium
Bladene ikke trelappede 15.
15. Bladene næsten så lange som brede opulifolium
Bladene tydeligt længere end brede album

Chenopodium botrys L. Bugtet gåsefod. Bladene fjerlappede med op til 4(6) par lapper. Bladet op i blomsterstanden. VI-IX. Alm.

C. ambrosioides L. Vellugtende gåsefod. Bladene lancetformede med bugtet-tandet rand. VIII-X. Alm.

C. suffruticosum Willd. Bladene lidt bredere og lidt dybere bugtet-tandede end hos foregående. VIII-X. Korsika: Vico. (Sydamerika)

C. bonus-henricus L. Stolthenriks gåsefod. VIII-IX. Alm.

C. urbicum L. Rank gåsefod. VIII-IX. Alm.

C. murale L. Murgåsefod. VI-IX. Alm.

C. ficifolium Sm. Sildig gåsefod. VII-IX. Sardinien. Sj.

Chenopodium multifidum L. Bladene smalt og ofte dybtfligede. Blomsterne i små nøgler i de øvre bladhjørner. VII-XII. R.alm.?

C. glaucum L. Blågrøn gåsefod. VIII-X. Sardinien. Sj.

C. rubrum L. Rød gåsefod. IX-X. Sj.

C. botryodes Sm. (*C. chenopodioides* (L.) Aellen) Druegåsefod. VIII-X. Korsika. Sj.

C. polyspermum L. Mangefrøet gåsefod. VIII-X. Sj.

C. vulvaria L. Stinkende gåsefod. V-IX. Sj.

C. opulifolium Schrad. Kortbladet gåsefod. Alm.

C. album L. Hvidmelet gåsefod. VI-IX. M.alm.

Atriplex. Mælde.

- | | |
|---|------------|
| 1. Flerårig med forveddede stængler | halimus |
| Enårig urt | 2. |
| 2. Forbladene sammenvoksede i hele nedre halvdel | 3. |
| " kun " forneden | 4. |
| 3. Blomsterstanden endestillet, bladløs eller fåbladet .. | tornabenei |
| Både ende- og sidestillede, bladede blomsterstande | rosea |
| 4. Nedre blade med afskåret grund | latifolia |
| " " kileformet " | patula |

Atriplex halimus L. Sømælde. Busk op til 2m med sølvhvide, næsten læderagtige, som regel utandede, ægformede blade. Især langs kysten. VII-X. Alm.

A. rosea L. Hvid enårig med m.m. trekantede blade. VII-IX. Sj.

A. tornabenei Tineo (*A. tatarica* L.) Hvid enårig med uregelmæssigt lancet- eller rudeformede blade. Strande. VII-IX. Alm.

A. patula L. Svinemælde. IX-X. Alm.

A. latifolia Wahlenb. (*A. hastata* L.) Spydmælde. VII-IX. Alm.

Halimione portulacoides (L.) Aellen Ustilket kilebæger. VI-VII. Alm.

Camphorosma monspeliaca L. Kamferurt. Opstigende halvbusk, 10-45 cm. De opstigende grene urteagtige, ofte rådligt anløbne mod spidsen. Bladene trekantet-sylformede, 4-10mm lange, anbragte i knipper langs grenene, med 3 m.m. tydelige hvide striber. Blomsterne i endestillede aks, omgivne af bladlignende højblade 2-2½ mm med rørformet, firtandet bloster. Tørre steder og langs kysten. VI-IX. Alm. Kamferlugtende.

Bassia hirsuta (L.) Asch. Tangurt. Ligner en dunet strandgåsefod med ofte skruesnoede grene. VII-IX. Korsika: ved Biguglia. Sardin.

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. Akskveller. Enårig, 5-20cm, blågrøn, grenet fra grunden. Bladene spredte, meget små, 2-4mm, kødede, halvkugleformede, stængelomfattende. Blomsterne kvellerlignende i grupper på 3, hver gruppe med et tykt, kødet dækblad, samlede i tætte, kogleformede aks på 5-15mm. Saltsøer og saltsumpe. VII-VIII. Sardinien. Sj.

Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb. Knopkveller. Halvbusk op til 1½m, stærktgrenet med oprette grene. På grenene små modsatstillede knopper bestående af små grupper kødede blade. De øvre, blomsterbærende knopper er større, 6-27mm, æg- eller kølleformede, med kvellerlignende blomster. VIII-IX. Sardinien. Sj.

Arthrocnemum. Buskveller. Flerårige kvellere.

Arthrocnemum perenne (Miller) Moss Tæppekveller. 15-25cm. Ikke forveddet, ofte bestanddannende. VII-IX. Korsika. Sj.

Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq. 30-80cm. Nedentil forveddet. De udfaldende blomster efterlader et tredelt hul. Blomsterne sidder et stykke fra leddets overkant. Langs kysten. VIII-IX. Alm.

A. glaucum (Del.) Ung.St. 30-100cm. Meget lig foregående, men de udfaldende blomster efterlader et enkelt hul. Blomsterne sidder tæt på leddets overkant. Saltsumpe. VI-IX. Alm.

Salicornia europaea L. Alm. kveller. VIII-IX. Alm.

Suaeda. Strandgåsefod. Bladene trinde, kødede, indsnævrede ved grunden. Blosteret uden vinger.

S. fruticosa (L.) Forsskål Buskgåsefod. Lille, stærktgrenet busk op til 120cm. Grenene glatte og stribede med hvidlig bark. Bladene 8-15x1 mm, blågrønne, ofte rødlig. Langs kysterne. VI-VII. Alm.

S. maritima (L.) Dum. Strandgåsefod. VII-VIII. Alm.

S. splendens (Pourret) G. & G. Ligner foregående, men bladene ofte brodspidsede eller med en 1 mm lang stak, lyst hvidgrønne, gennemskinnelige. På steder med lavere saltindhold end foregående. Ofte sammen med Tangurt. V-VIII. Sardinien. Sj.

Salsola. Sodaurt. Bladene, trinde, kødede, ikke indsnævrede ved grunden. Blosterbladene med en bred, tværstillet vinge i frugt, der giver frugten et blomsterlignende udseende.

S. kali L. Sodaurt. V-VIII. Alm.

S. soda L. Som foregående, men bladene bløde og kødede, ikke stikkende. Langs kysten, f.eks. på tang. VII-VIII. Sj.

S. vermiculata L. Lille busk op til 1m med grå grene. Blade 5-10 mm. Frugtblosteret 6-12mm i tværmål med hvidlige eller lyserøde vinger. Især langs kysten. Sardinien. Sj.

AMARANTHACEAE

Amaranthus. Amarant.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Blomsterne kun i nøgler | 2. |
| " kun eller også i aks | 4. |
| 2. Kapslen åbnes ikke. Oftest flerårig..... | deflexus |
| Kapslen åbnes på tværs. Enårig | 3. |
| 3. Forblade tornspidsede, 2 x blosteret | albus |
| " ikke tornede, 1 x " | graecizans |
| 4. Bladene med en plet på oversiden, spidsen udrandet | lividus |
| " uden plet | 5. |
| 5. Nedliggende til opstigende, rodslående | deflexus |
| Opret | 6. |
| 6. Blosterbladene spatelformede, bredest foroven | retroflexus |
| " m.m. lancetformede | 7. |
| 7. Forbladene spinkle, under 4 mm | hybridus |
| " kraftige, over 4 mm | powellii |

Amaranthus hybridus L. (*A. chlorostachys*) Topamarant. Stænglen m.m. glat foroven. Forbladene mest 4-6mm. VII-X. Alm.

A. powellii S. Watson Nåleamarant. Nær foregående. Forbladene mest 2-3,5mm. VII-X. Alm.

A. retroflexus L. Bladene dunede på silk og årer, de sidste frem-springende på oversiden og hvidlige. VI-X. M.alm.

A. albus L. Opret eller nedliggende, stærktgrenet. Bladene elliptiske eller spatelformede, butte med kort brod og bølget rand. VII-IX. Alm.

A. graecizans L. Mest opret. Blade elliptisk-rudeformede, 2-5cm. (var. *graecizans* har smalt lancetformede blade). VIII-IX. Alm.

A. deflexus L. Rodslående, ofte flerårig, nedliggende til opret. VII-IX. Alm.

Amaranthus lividus L. (A. blitum L.) Pletamarant. Nedliggende eller opstigende. VII-X. Alm.

Achyranthes. Flerårige med modsatte blade, op til 80cm. Blomsterstanden et langt aks. Bløsterbladene smalt lancetformede, spidse, til sidst hårde og tornagtige. Blomsten helt nedadrettet og sammenkneben efter blomstringen.

A. aspera L. Bladene kort tilspidsede, grønne på begge sider. Blomsterne over 5mm lange. III-V. Sardinien. Sj.

A. sicula L. Bladene oftest længere tilspidsede, sølvhvide på undersiden. Blomsterne 3½-5mm. III-V. Sardinien. Alm.

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca americana L. Kermesbær. VII-X. Alm.

AIZOACEAE

Urter eller halvbuske med kødede blade, oftest modsatte. Bægeret ofte kødede. Kronblade talrige.

Carpobrotus. Kølblad. Nedliggende, flerårig. Bladene modsatte, meget kødede, trekantede i tværsnit. Blomsterne 8-12 cm i tværmål, oftest rødlig.

C. acinaciformis (L.) L. Bladene blågrønne, tykke på eller over midten. Støvdragerne rødlig. Dyrket og hyppigt forvildet. IV-V.

C. edulis (L.) N.E.Br. Bladene mørkegrønne, ikke tykkere på midten, jævnt tilsmalnende. Støvdragerne gule. "Hottentotfigen". IV-V. Sardinien. (Sydafr.)

Mesembryanthemum Middagsblomst. Enårig planter med trinde eller flade, kødede, blade. Nedliggende, med små krystallinske vorter.

M. nodiflorum L. Bladene m.m. trinde, let affladede, med få krystalvorter, 14x2-3mm. Planten nedliggende, 5-15cm. Blomsterne enlige, 1 cm på tværs. Klipper og sand langs kysten. III-VI. Alm.

M. crystallinum L. Isblomst. Nedliggende, op til 30cm, tæt krystalvortet. Bladene spatel- til bredt ægformede. Blomsterne 2-3cm. Sand og klipper langs kysten. IV-VI. Sj.

MOLLUGINACEAE

Glinus lotoides L. Enårig, nedliggende urt op til 50cm. Bladene m.m. kransstillede, oftest bredt ægformede til runde, spidse i begge ender, 1-1½x2-3½cm, gråt stjernefildede ligesom stænglerne. Blomsterne i bladhjørnerne med enkelt blomst, men med en del hvide, oftest trekløvede staminodier. Bægeret 4-8mm, gult mod spidsen. VII-X. Fugtige steder, sandede bredder. Sydsardinien. Sj.

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L. Portulak. Enårig, 5-50cm, ofte nedliggende. Bladene kødede, skinende, spredte forneden, tætstillede foroven under blomsterne, spatelformede, flade. Blomsterne 6-8mm, få sammen mellem de øvre blade, med gul krone. VI-VIII. Alm.

Montia fontana L. Vandarve. IV-VIII. Sj. På Sardinien 3 underarter, der skelnes på frøene.

CARYOPHYLLACEAE (Nøgle bag i hæftet)

ALSINOIDEAE: Ingen akselblade. Fribæget.

Arenaria: 5 hele kronblade, 3 grifler.

A. bertolonii Fiori Opstigende flerårig, 2-15cm. Bladene ægformede, dannede, 5-12mm. Bægerblade 5-6mm. Kronbladene let udrandede. Kalkgrus. 1000-2300m. VI-VIII. Alm.

Arenaria balearica L. Tyndstænglet flerårig, 5-10cm, nedliggende med opstigende blomsterskud. Blade 3-4mm, bredt ægformede eller runde. Bægerblade 2½-3mm. Fugtige kløfter. 0-1400m. IV-VI. Sj.

A. serpyllifolia L. Markarve. III-X. Alm.

A. leptoclados (Rchb.) Guss. Spød markarve. Kapslen cylindrisk, kun svagt fortykket ved grunden. Ellers som foregående. III-X. M.alm., især i olivenbæltet, hvor den erstatter serpyllifolia.

Moehringia trinervia (L.) Clairv. Skovarve. IV-VII. Sj.

M. pentandra Gay Ligner den foregående, men bægeret 2-4mm, kronen manglende eller stærkt reduceret. 5 støvdragere. Bladene ikke randhårede. Krat og udyrkede steder. IV-VI.

Minuartia. Som Arenaria, men bladene (undt. hos geniculata) linje- til sylformede.

M. hybrida (Vill.) Schischk. Tyndbladet norel. Enårig, 5-15cm, opret og grenet fra grunden. Blade linjef., 6-10mm, kortere end stængelledene. Blomsterstilkene 2-6 x blomsterne. Udyrkede steder. III-VI. Alm.

M. mediterranea (Link) Maly Som foregående, men blomsterstilkene højst af blomsternes længde. V-VI. Alm.

M. mutabilis Sch. & Th. Næbnorel. Flerårig, 5-15cm. Løst tueformet med mange oprette stængler. Bægerblade 1-årede, bredt hindekantede. Kronen omtrent lig bægeret. Klipper og mure. 600-2600m. V-VII. Korsika. Sj.

M. verna (L.) Hiern. ssp. verna Vårnorel. Flerårig, løst tueformet, 2-12cm. Bægerblade 3-årede. Kronen oftest 1½ x bægeret. 2000-2800m. På kalk. Korsika. Sj.

M. geniculata (Poir.) Thell. Ligner slet ikke de andre Minuartiae. Blomsterne lyserøde, ligner Markhindeknæs. Nedliggende-opstigende flerårig, 5-15(-30)cm, kirteldunet. Bladene 10-15mm, hønsetarmslignende. Nær kysten. IV-VII. Sardinien. Alm.

Buffonia paniculata Dubois Sivblomst. Enårig. Vækst som de enårige Minuartiae, men de sylformede blade endnu mere oprette. 15-30cm. Blomsterne 4-tallige. Kronen 1/3-½ af bægeret. Sand og grus. V-VI. Sardinien: Campidano. Sj. og tilfældig.

Stellaria nemorum L. ssp. glochidisperma Murb. Lundfladstjerne. V-VIII. Korsika. Sj.

S. media (L.) Vill. Alm. fuglegræs. I-XII. M.alm. Den sydligere underart ssp. cupaniana (Jordan & Fourr.) Nyman har stænglerne hårde hele vejen rundt.

S. neglecta Weihe Skovfuglegræs. Kronen lig eller større end bægeret. III-VI. Alm.

S. pallida (Dum.) Piré Blegt fuglegræs. Kronen mangler eller stærkt reduceret. III-VI. Alm.

S. alsine Grimm Sumpfladstjerne. V-VII. Korsika. Sj.

S. palustris Retz. Kærfladstjerne. V-VI. Korsika. M.sj.

S. graminea L. Græsbladet fladstjerne. V-VIII. Korsika. Alm.

Holosteum umbellatum L. Skærmarve. IV-V. Sardinien.

Cerastium. Hønsetarm.

- | | |
|--|------------|
| 1. Flerårig | 2. |
| Enårig | 4. |
| 2. Planten med vredne hår, så den virker m.m. filtet | boissieri |
| " med rette hår | 3. |
| 3. Kronen 2 x bægeret | soleirolii |
| Kronen 1 x bægeret | fontanum |
| 4. | |

4. Bægerbladene spids med fremadrettede, kirtelløse hår 5.
 " " uden sådanne hår 7.
 5. Bægeret meget langhåret (2-3mm) comatum
 " ikke så langhåret (højst 1½mm) 6.
 6. Blomsterstilke lig eller kortere end bægeret glomeratum
 " længere end bægeret brachypetalum
 7. Kronen 1½-2 x bægeret 8.
 " 1 x bægeret eller kortere 9.
 8. Ydre bægerblades spids kun med kirtelhår palustre
 " " mest med kirtelløse hår ligusticum
 9. Højbladene bredt hindekantede semidecandrum
 " smalt eller ikke hindekantede 10.
 10. Blomsterstilke lig eller kortere end bægeret siculum
 " længere end bægeret 11.
 11. Højblade smalt hindekantede. Alle blomster 5-tallige .. pumilum
 " ikke hindekantede. Nogle blomster 4-tallige diffusum

Cerastium boissieri Gren. Stivbladet hønsetarm. Bladene 10-20mm, stive, ofte noget krumme. Planten tæt kirtlet foroven. Kalk- og skiferklipper. V-VI. 700-1600m. Sj.

- C. soleirolii Ser. Ligner C. arvense. 800-2400m. Korsika. Spredt på de midterste og sydlige højdedrag, sjældent mod nord.

C. fontanum Baumg. Alm. hønsetarm. IV-X. Alm.

C. brachypetalum Pers. Stivhåret hønsetarm. III-V. Korsika. Alm. ssp. roeseri (B.&H.) Nyman er tætkirtlet og klæbrig. IV-VIII. Alm. på begge øer.

C. comatum Desv. (C. illyricum Ard. ssp. c.) Lådden hønsetarm. IV-V. Korsika: Ved Calvi og Corbara. - Her en tæt sammentrængt form.

C. glomeratum Thuill. Opret hønsetarm. I-XII. Alm.

C. ligusticum Viv. Op til 15 cm. Bladene op til 20mm. Bægeret 4-6 mm. I-VI. Alm.

- C. palustre Moris Op til 8(-13)cm. Bladene op til 6mm. Bægeret 3-4mm. Fugtige enge. 500-600m. Sardinien: Midten ved Campeda, Macomer og Orune. Sj.

C. pumilum Curtis Liden hønsetarm. IV-V. Korsika. Alm. Her også underarten ssp. pallens (Schultz) Sch. & Th., Klæbrig hønsetarm, der er lysegrøn og har alle højblade smalt hindekantede.

C. diffusum Pers. Firehannet hønsetarm. III-VII. Sj.

C. siculum Guss. IV-V. Sj.

C. semidecandrum L. Femhannet hønsetarm. III-VI. M.alm.

Moenchia erecta (L.) Gaertn. Firtalsbrodbæger. Planten med vækst som en enårig hønsetarm, men helt glat, med firtalsblomster. 5-10 cm høj. V-VI. Fugtig jord. Sj.

Myosoton aquaticum (L.) Moench. Kløvkrone. V-VII. Korsika. Sj.

Sagina. Firling.

1. 1-årig med 4-tallige blomster 2.
 Flerårig 4.
 2. Bladene med tydelig stak 3.
 " uden stak maritima
 3. Frugten med udstående bægerblade micropetala
 " " tiltrykte apetala
 4. 4-tallig blomst procumbens
 5-tallig 5.
 5. Bladet med tydelig stak (¾-1½ x bladbredden) 6.
 " uden stak, højst med en brod på ¾ x bladbredden 7.
 6. Kronen 0,8-1,5 x bægeret subulata
 " 1,5-2 x pilifera

7. Øverste blade kortere end de nederste, ofte
 med bladknipper i hjørnerne nodosa
 Alle blade lige store saginoides

S. nodosa (L.) Fenzl Knudfirling. Korsika. Gl. fund.

- S. pilifera (DC.) Fenzl Tueformet. Kronen 1½-2 x bægeret eller mere. V-VII. Sj. Sardinien: Gennargentu. Korsika: Bjærgene. 400-2700m. På klipper.

S. subulata (Sw.) Presl Sylfirling. V-VII. Alm.

S. saginoides (L.) Karsten Sæterfirling. VI-VII. 1700-2900m. Korsika: Alm. Sardinien: Sj.

S. procumbens L. Alm. firling. IV-VII. Sj.

S. micropetala Rausch Kronløs firling. II-VI. Sj.

S. apetala Ard. Markfirling. II-VI. Alm.

S. maritima G. Don Strandfirling. II-VI. Alm.

Scleranthus. Knavel. Artsopfattelse efter Flora Iberica.

1. Bægerblade butte, bredt hindekantede 2.
 " spidse, smalt " 3.
 2. Opstigende til opret. Kvastene højst 7-blomstrede perennis
 Tæt pudeformet. Kvastene oftest 7-9-blomstrede burnatii
 3. Bægerblade udstående. Stængelled oftest over 10mm annuus
 " oprette eller indadbøjede. Stængelled kortere 4.
 4. Bægerblade tydeligt ulige lange verticillatus
 " m.m. lige lange 5.
 5. Modne frugt ca. 3mm. Bægeret opret til noget indadbøjet
 polycarpus
 Modne frugt ca. 1½mm. Bægeret indadbøjet ruscinonensis

S. perennis L. Flerårig knavel. V-IX. Sj.

S. burnatii Briq. 5-10cm. Kvaster 7-9-blomstrede. 700-2500m. Korsika: Renoso, Coscione, Incudine m.m.

S. annuus L. Enårig knavel. III-X. Alm.

S. verticillatus Tausch Modne frugt ca. 2,2mm. IV-VI.

S. polycarpus L. Bakkeknavel. IV-VI. Korsika

S. ruscinonensis Gillot & Coste Frugten 1,2-1,6mm. Korsika.

Corrigiola litoralis L. Skorem. Nedliggende enårig med mange stængler op til 25 cm. Planten glat. Bladene grågrønne, 10-15mm, spatelformede. Blomsterne små, ca. 1 mm, i nøgler for enden af grenene. Bæger og hvid krone. Sandede steder. VI-IX. Sj.

C. telephiifolia Pourret Som foregående, men større i det. Oftest flerårig. Bladene kødede. Blomstrende grendele uden blade. Sandede steder, mest ved kysten. IV-VIII. Sj.

Paronychia. Negleurt. Blomsterne i nøgler i bladhjørnerne, omgivne af tydelige, ofte store, hindeagtige, sølvhvide højblade. Bægeret ofte hattetformet i spidsen og med brod. Ingen krone. Nedliggende.

1. Højbladene kortere end blomsterne echinulata
 " længere end " 2.
 2. " lancetformede, 2-4mm polygonifolia
 " ægformede, 4-6mm argentea

Paronychia echinulata Chater Enårig, 5-15cm. Bladene æg-lancetf., rødlig. Sandjord. IV-V. Sj.

P. polygonifolia (Vill.) DC. Flerårig, 10-30cm. Blade 3-9mm, lancetformede. Blomsternøglerne 4-7mm, m.m. dækkede af de sølvhvide højblade. Klipper, grus og sand. 1300-2500m. Korsika: Sj. Sardinien: Gennargentu.

Paronychia argentea Lam. Som foregående, men nøglerne 12-15mm. 0-1300m. III-V. Alm.

Chaetonychia cymosa (L.) Sw. (Paronychia c. (L.) DC.) Spinkel, opret enårig på 3-10cm. Bladene linjeformede med brod, i kranse på 4, 5-6mm. Endestillede blomsternøgler på 3-10mm, kugleformede, der i frugt foldes ud og forlænges. 5 bægerblade med stor hætte og lang brod. Ingen krone. Sandede steder. VI-IX. Korsika: Pigno, Solenzara. Sardinien: Siniscola.

Herniaria glabra L. Brudurt. Friskgrøn eller gulgrøn. Lidet håret. V-VIII. Alm.

H. hirsuta L. Stænglen og blade med udstående hår. Undertiden glat med alderen. V-VIII. Alm.

Illecebrum verticillatum L. Bruskbæger. Glat enårig, 5-20cm, opstigende. Tynde, firkantede, ofte rødlige stængler. Bladene 2-6mm, ofte bredt omværgede. 4-6 blomster i kranse. Blomsterne består af stærkt omdannede, hvide, bægerblade, der er hætteformede med lang brod. Fugtige steder. V-VIII. Sj.

Polycarpon. Mangefrø. Små oprette eller opstigende, oftest ret greneplanter med m.m. ægformede til runde blade, der tit er i kranse på 4. Små blomster i ret tætte, endestillede kvaste. Kronen klar, kortere end bægret. 3 grifler.

1. Flerårig, forveddet ved grunden polycarpoides 2.
Oftest enårig, aldrig forveddet
2. Bladene kødede, mest modsatte alsinifolium 3.
" ikke kødede, mest 4 i kranse
3. Planten grøn. Blomsterne 1½-2mm tetraphyllum 4.
" oftest purpurf. forneden. Blomsterne 2½mm diphyllum

Polycarpon polycarpoides (Biv.) Zodda 5-20cm. Bladene mest modsatte, de midterste ofte 4 i kranse. IV-VI. Korsika: Bonifacio.

P. alsinifolium (Biv.) DC. 3-10cm. Ligner en Paronychia. Kvastene tætte. Mest langs kysterne på sandjord. IV-V. Sj.

P. diphyllum Cav. Nedre blade modsatte. V-VII. Alm.

P. tetraphyllum L. Alle blade i kranse. III-VIII. Alm.

Spergula arvensis L. Alm. spergel. V-VIII. Sj.

S. pentandra L. Bladene ikke furede på undersiden. Ligner ellers vårspergel. IV-V. Sj.

Spergularia. Hindeknæ

1. Flerårig, noget forveddet forneden, med kraftig pælerod 2.
Enårig eller toårig, ikke forveddet, med tynd rod 3.
2. Kapslen kortere end bægret macrorrhiza
" længere " " media
3. Yngre skuds skeder halvt sammenvoksede marina
" " " kun " ved grunden 4.
4. Blomsterstanden uden højblade foroven diandra
" med " overalt 5.
5. Øvre højblade ca. så lange som bladene rubra
Øvre " meget kortere end " 6.
6. Frø mørkebrune. Kapslen lidt længere end bægret nicaeensis
Frø lysebrune. Kapslen højst lig bægret bocconii

Spergularia macrorrhiza (Req.) Heynh. 6-12cm. Kirtelhåret. Bladene kødede, tætsiddende. Kronen hvid. Kystklipper. VI-VII. Alm.

S. media (L.) Presl Vingefrøet hindeknæ. I-XII. Lokalt alm.

S. marina (L.) Griseb. Kødet hindeknæ. IV-VI. Sj.

S. diandra (Guss.) Boiss. Stærktgrenet blomsterstand med trådformede stilke. Sandede, oftest kystnære steder. III-V. Sj.

Spergularia rubra (L.) Presl Markhindeknæ. III-VII. M.alm.

S. nicaeensis Sarato Ligner foregående, men oftest toårig. Frøene 0,5-0,65mm. Sj.

S. bocconii (Scheele) Asch. & Gr. Frøene 0,35-0,45mm. V-VI. Sj.

SILENOIDEAE Ingen fodflige. Sambægret.

Lychnis flos-cuculi L. Trævlekrone. V-VIII. Sj.

Agrostemma githago L. Klinte.

Silene. Limurt.

1. Tvebo (Aftenpragtstjerne) 2.
Tvekønnet 3.
2. Bægertænder næsten butte, kapseltænder m.m. rette alba
" tydeligt tilspidsede, kapseltænderne m.m. udadrettede latifolia
3. Bægret opblæst, 20-året, kraftigt netåret vulgaris
" ikke sådan 4.
4. Kronen firtandet, ret lille quadridentata
" hel eller kløvet 5.
5. Bægerrøret glat 6.
" dunet eller håret 13.
6. Enårig 7.
Flerårig 12.
7. Øvre stængelblade stængelomfattende. Blomsterstanden
sammentrængt armeria
Bladene ikke stængelomfattende 8.
8. Blomsterne i en ensidig svikkel giraldii
" i en m.m. tydelig gaffelkvast 9.
9. Kronen indesluttet i bægret eller manglende inaperta
Kronen tydeligt fremragende 10.
10. Bægret 7-10mm, bredt klokkeformet laeta
" 11-25 mm 11.
11. Bægret 11-14mm, årerne sammenløbende behen
" 18-25mm, årerne frie coeli-rosa
12. Bægertænder glatte. Bægret 13-18mm multicaulis
" randhårede. Bægret 18-20mm nodulosa
13. Flerårige 14.
Enårige 21.
14. Bægret 9-12mm. Kronen hvid og grønåret velutinoides
Bægret mindst 14mm 15.
15. Bægret 25-30mm. Kronen gullig nedenunder paradoxa
Bægret oftest mindre. Kronen ikke gullig nedenunder 16.
16. Blomsterstanden 1-5-blomstret 17.
" flerblomstret 18.
17. Bjærgplante. Bladene ikke kødede requienii
Strandplante. Bladene kødede succulenta
18. Blomsterne nikkende, grønlig. Næsten ingen kapselstilk viridiflora
Blomsterne m.m. oprette. Kapselstilk lang 19.
19. Tæt filtet. Kapselstilk 2/3 x kapslen velutina
Ikke filtet. " minds 1 x kapslen 20.
20. Kapselstilk lig kapslen. Flerårig italica
" længere end kapslen. Toårig nemoralis
21. Planten tæt kirteldunet 22.
" højst " foroven 25.
22. Bægret kort, 6-8mm. Kronen lille sedoides
" længere, 10-17mm 23.
23. Kronbladene hele fuscata
" kløvede 24.
24. Kronen lyserød pendula
" hvidlig nicaeensis
25. Kronen indesluttet, sjældent lidt fremragende apetal
Kronen veludviklet 26.

26. Bægerribberne med en række stive hår gallica 27.
 " ikke stivhårede
 27. Blomster ofte enlige, sjældent 2-3 i reduceret kvast . sericea 28.
 " flere i kvast eller svikler
 28. Blomster i m.m. tydelig gaffelkvast rubella 29.
 " i enkelt- eller dobbeltsvikler
 29. Kapselstilk 1-1½mm. Blomster tiltrykte akslen nocturna 30.
 " 4-7mm
 30. Bægeret 10-14mm. Sviklerne mere åbne colorata
 " 14-17mm. " tætte bellidifolia

Silene italica (L.) Pers. Italiensk limurt. 30-60cm. Blomsterstanden bred og ret åben. Bægeret 14-21mm. Kronen hvidlig, rødlig eller grønlig nedenunder. VI-VII. R.sj.

S. nemoralis Waldst. & Kit. (*S. italica* ssp. n.) V-VI.

- ④ *S. velutina* Pourret. Ligner foregående, men tæt filtet. Kystklipper. VI-VII. Korsika ved Porto Vecchio og Bonifacio.

S. paradoxa L. Langbægret limurt. Ligner *italica* og *nutans*, men stærkt klæbrig. VI-VIII. Korsika. Sj.

- ⑤ *S. nodulosa* Viv. 20-30cm. Blomsterstanden glat. Kronen hvid med rødlig underside. Bægeret smalt. Kalkklipper. 0-1600m. VI-VII. Sj.

S. velutinoides Pomel. Ligner Nikkende limurt, men stænglerne forveddede. Skyggefulde kalkklipper. 700-900m. VII-VIII. Sardinien: M.Albo og M.di Oliena.

S. viridiflora L. Grønblomstret limurt. Ege- og kastanjeskove. VI-VII. Sj.

- ⑥ *S. requienii* Otth. 20-30cm. Stænglen fintdunet med nedadrettede hår, m.m. kirtlet. Stængelled karakteristisk fortykkede. Blomsterstanden oftest 1-3-blomstret. Bægeret 17-19(-30)mm. Skyggefulde kalkklipper. V-VII. M.sj.

S. vulgaris (Moench) Blæresmelde. (*S. cucubalus* Wibel). III-VIII. Alm. Ssp. prostrata (Gaudin) Sch. & Th. med 1(-5)-blomstrede, opstigende skud er angivet fra M.di Oliena på Sardinien.

S. succulenta Forsskål. 10-20cm. Klæbrig, m.m. dækket af sandkorn. Bægeret 15-20mm. Kronen hvid, violetåret. Sandstrand. IV-VI. R.alm. I den endemiske ssp. *corsica* (DC.) Nyman

S. multicaulis Guss. 10-20cm. Tueformet. Blade m.m. linjeformede. Bægeret 14-18mm, smalt kølleformet, bleggønt eller vinrødt. Kronen hvidlig eller lyserød ovenpå, olivengrøn eller rødbrun nedenunder. Klipper og urer. 1100-2000m. Korsika. Sj. VI-IX.

S. quadridentata (Murray) Pers. Strålefrø. (*S. pusilla* W. & K.) 8-15cm. Ret spinkel. Bladene m.m. linjeformede. Blomsterne små og langstilkede. Bægeret 3½-7mm. Kronbladene små, hvide, firtandede. Fugtige klipper. 1000-2500m. VI-VIII. Korsika. Sj.

S. armeria L. Knippelimurt. 30-70cm. Blågrøn og glat. Bægeret 12-15mm. Kronen oftest lyserød. Kapselstilk = kapslen. V-VI. Sj.

S. alba (Niller) Krause. Aftenpragtstjerne. V-IX. Alm.

S. latifolia Poiret (*S. alba* ssp. *divaricata* (Rchb.) Walters). V-IX.

S. inaperta L. Kronløs limurt. 15-40cm. Ret tæt, linjeformet bladet. Kvaststilkene meget lange. Udyrkede steder. VI-VIII. Korsika. Sj.

S. fuscata Link. 15-30cm. Stænglen stribet eller kantet. Blomsterstand ret tæt kvast - topformet. IV-VI. Sardinien. Alm.

S. rubella L. 10-50cm. Dunet. Bægeret tofarvet, hvidligt i nederste halvdel, rødligt foroven. III-V. Sj.

Silene sedoides Poiret. 5-20cm. Oftest rigtgrenet, opstigende, klæbrig, ofte rødlig. Bladene kødede. Blomsterne små, langstilkede. Sand og klipper langs kysten. IV-VI. Sardinien. Sj.

S. behen L. 20-40cm. Helt glat og blågrøn. Bægeret hvidrandet. Bægeret med lyserøde, sammenløbende nerver. Kronen hvidlig eller bleggrød. IV-VI. Sardinien. Sj.

S. laeta (Ait.) Godron. Blade linje-lancetformede. Langstilkede blomster i løs kvast. Kronen lyserød. 5 grifler. Fugtige enge nær kysten. IV-V. Sj.

S. coeli-rosa (L.) Godron. 20-50cm. Smalbladet. Langstilkede blomster i løs tvast. Bægeret indknebet under de lange, spidse tænder. 5 grifler. Kronen rødlig. IV-VI. Sj.

S. pendula L. Rød limurt. Blomsterne i en ensidig svikkel, udstående eller nikkende i frugt. Bægeret i frugt opblæst og indknebet foroven. Kronen lyserød. IV-VII. Dyrket og forvildet.

S. nicaeensis All. 15-25cm. Klæbrig, m.m. dækket af sandkorn. Hele planten håret. til stivhåret. Hvidlige blomster i m.m. ensidig kvast. Sandstrand. V-VI. Sj.

S. sericea All. 10-50cm. Bægeret 12-20mm. Kapselstilk 4-10mm. Kronen lyserød. Frø uden vinger. Sandstrand. V-VI. Sardinien: Flumetorgiu. Korsika: Ajaccio og Bonifacio.

S. nocturna L. Akslimurt. 10-50cm. Bægeret 9-13mm, årerne brede og grønne, sammenløbende. Kronen bleggrød. IV-V. Alm.

S. gallica L. Fransk limurt. 10-50cm. Blomsterne i en ensidig svikkel. Kronbladene hele eller udrandede, hvide eller bleggrøde. IV-VII. Alm.

S. giraldii Guss. Ligner foregående, men helt glat og ikke klæbrig. Kapselstilk 1-2mm. IV-V. Sydsardinien ved floden Liscia. M.sj.

S. colorata Poiret. 10-40cm. Stænglen dunet med nedadrettede hår. Kronen iøjnefaldende lyserød. Frøene med 2 bølgede vinger langs randen. IV-VI. Sandstrand. Alm.

S. bellidifolia Juss. 30-60cm. Stænglen stivhåret. Bægeret ladedent. Kronen 2-3mm længere end bægeret. II-VI. Alm.

S. apetala Willd. 10-30cm. Hele planten dunet. Bægeret 8-9mm. Kapselstilk 1-2mm. Frøene med 2 bølgede vinger. III-IV. Sardinien. M.sj.

Gypsophila muralis L. Gipsurt. Enårig, 5-25cm, opret. Blomsterne langt- og tyndstilkede i åben top-halvskærm. Bægeret 3-4mm med hindeagtige ribbemellemrum. Kronen ca. 2 x bægeret, bleggrød. V-VI. Sardinien: Ved Caprera.

Saponaria officinalis L. Sæbeurt. VI-VIII. Alm.

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert. Konellike. 30-60cm. Enårig. Glat. Blomster i stærkt grenet kvast. Bægeret pæreformet, med 5 brede vinger. Kronen lyserød, afstudet eller tolappet. IV-V. R.sj.

Petrorhagia. Knopnellike. Bægeret 5-kantet med hindeagtige mellemrum. 2 grifler.

1. Flerårig. Stilkede blomster i åben kvast saxifraga 2.
 Enårig. Blomsterne i hovede, omgivne af højblade
2. Bladskederne 2-3 x så lange som brede velutina 3.
 " ca. så lange som brede
3. Stænglen ofte filtet midtpå. Frøene vortede nanteuillii
 " glat. Frøene netårede prolifera

Petrorhagia saxifraga (L.) Link. 5-45cm. Blade m.m. linjeformede. Blomsterne langstilkede, med 2 eller 4 hindeagtige højblade ved grunden. Bægeret 3-6mm, buttandet. Kronen hvid eller lyserød. VI-IX. Alm. som ssp. *gasparrinii* (Guss.) Pign. med yderbægeret

tæt på bagerets længde.

P. prolifera (L.) Ball & Heyw. Knopnelike. 2-5 blomster i et svøb af hindeagtige højblade. Bladene med finttandet rand. V-IX. Alm?

P. nanteuillii (Burnat) Ball & Heyw. Som foregående, men bladene svagere finttandede. Ofte med flere blomster i hovedet. V-IX. Sj.

P. velutina (Guss.) Ball & Heyw. Som de foregående, men stænglen tæt kirtelhåret under blomsterstanden. Bladet med bruskagtig rand, uden tænder. IV-VII. Sj.

Dianthus. Nelike.

1. Blomster i hoveder, omgivne af lange højblade 2.
" i åbne kvaste 3.
2. Enårig. Oftest håret armeria
Flerårig. Glat. balbisii
3. Yderbægret $\frac{1}{4}$ x bægret silvester
" ca. $\frac{1}{2}$ x bægret furcatus

Dianthus balbisii Ser. (D. ferrugineus Miller). Bladskederne 2-3 x så lange som brede. 2-6 blomster i hoveder, omgivne af 2 blade. Yderbægerblade af bagerets længde, langstakkede. 0-1200m. VI-IX. Korsika.

D. armeria L. Kostnelike. V-VIII. Sj.

D. silvester Wulfen Grundbladene smalle, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ mm brede. Stængelbladene 1-1 $\frac{1}{2}$ mm med en skede på 4mm, de øverste med skede på 6-8mm. 2-8 yderbægerblade. 0-2400m. På Sardinien som ssp. garganicus (Gr.) Pignatti. På Korsika overgangsformer til ssp. silvester.

D. furcatus Balbis Bladene 1-4mm brede. 4(2-6) yderbægerblade. Bægret 11-14mm. V-VII. På Korsika som ssp. gyspergerae (Rouy) Burnat ved Porto alle Calanche di Piana. 350-450m.

Velezia rigida L. Dueurtsnelike. Enårig, 10-30cm. Bægret linjeformet uden yderbæger. Planten ligner en dueurt rigtigt meget. Udyrkede steder. V-VI. Sardinien: Alm. Korsika: Sj.

NYPHAEACEAE

Nymphaea alba L. Nøkkerose. VI-IX. Sj.

Nuphar luteum (L.) Sibth. & Sm. Gul akande. Sardinien. Sj.

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum demersum L. Tornfrøet hornblad. Sj.

RANUNCULACEAE

Helleborus foetidus L. Stinkende nyserod. 20-60cm. Blomsterne gulgrønne, ofte med purpurfarvede kanter. Bladene med 7-11 flige. Kratkanter, rydninger. I-IV. Alm.

H. lividus Aiton Trebladet nyserod. 30-80cm. Blomsterne store, 5-6cm, hvidlige eller lyserøde. Bladene trekoblede. Urer. I-IV. Korsika: spredt. Sardinien: Santu Lussurgiu, Cuglieri, Dorgali, Villanova, Tulu, Esterzili, Urzulei, Gennargentu. Alm.

Nigella. Sortkommen. Enårige planter med 2-3 x fjersnitdelte blade med linjeformede flige. 5 lyseblå blosterblade samt 5 små honningblade. Frugten består af 5 delvist sammenvoksede bælgekapsler med påsiddende, lange grifler.

N. damascena L. Jomfruen i det grønne. Blomsten omgivet af et svøb af 5 bladlignende højblade. V-VII. Alm.

N. arvensis L. Agersortkommen. Ligner foregående, men uden svøb af højblade under blomsten. Kornmarker. V-VI. Sj.

Aconitum corsicum Gayer Eneste stormhatteart. VII-VIII. M. Coscione-massivet til Zicavo og Quenza. Sj. - (A. napellus L. ssp. corsicum (Gayer) Seitz). Kun på Korsika.

Delphinium. Ridderspore med 3(-5) bælgekapsler. Her kun enårige arter.

1. Bladene med 2-3mm smalle flige halteratum 2.
" med 5-9, 10-40mm brede flige 2.
2. Stænglen udstående langhåret staphisagria 3.
" dunet 3.
3. Sporen tyk og but, ca $\frac{1}{2}$ x blosteret pictum
" spids, nogenlunde = blosteret requienii

Delphinium staphisagria L. Steffensriderspore. 30-80cm. Bladfligene med 1-2 tænder på hver side. Kronen mørkeblå. Sporen 3-5mm. IV-V. Sj.

D. pictum Willd. 30-80cm. Stænglerne dunede. Blegblå blomster. Sporen 6-8mm. Kløfter. 0-600m. V-VI. M.sj.

D. requienii DC. Kløfter, flodlejer. V-VI. Korsika. Sardinien: Carloforte. M.sj.

D. halteratum Sibth. & Sm. Langsporede, mørkeblå blomster. Udyrkede steder. IV-VII. Sardinien. Alm.

Consolida ajacis (L.) Schur Haveridderspore (C. ambigua (L.) Ball & Heyw.) Kun 1 bælgekapsel. Bladene 3-4 x håndfligede med linjeformede afsnit. Blomsten mørkeblå med 13-18mm lang, ret spore. V-VII. Korsika. Alm.

Anemone. Anemone. Enkelt bloster. Blomsterstilken med 3 kransstil-
lede, undertiden noget reducerede blade.

1. Kronen gul. Bladene henad Nyrebladet smørblomst palmata 2.
" hvid, rød eller blå 2.
2. Stængelbladene stilkede, ligesom grundbladene 3.
" siddende, forskellige fra grundbladene 4.
3. 6-9 hvide kronblade nemorosa
16-23, oftest lyseblå kronblade apennina
4. Stængelbladene enkle eller trekløvede hortensis
" 2 x fjersnitdelte coronaria

Anemone nemorosa L. Hvid anemone. II-V. Korsika. M.sj.

A. apennina L. Blegblå anemone. III-V. NØ-Korsika. Sj.

A. palmata L. Nyrebladet anemone. Bladene læderagtige. Stængelbladene sammenvoksede ved grunden, med 3-5 flige. 10-15 gule kronblade. Nødderne uldhårede med lang griffel. I-III. Sardinien: Sj.

A. hortensis L. Bladene hånddelte, noget hen ad Bidende smørblomst, undertiden dog med linjeformede flige. Blomsterne oftest lyserøde, sjældnere mørkerøde, lyslilla eller hvidlige. III-V. Alm.

A. coronaria L. Fransk anemone. Bladene 2 x fjærdelte, med smalle flige. Blomsten rød, blå eller hvid. I-III. Forvildet.

Hepatica nobilis Miller Blå anemone. III-V. Korsika: Sj.

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre ssp. alpina Hvid alpekojbælde. En hvidblomstret kojbælde i bjærgområderne. Korsika.

Clematis. Skovranke.

1. Planten opret, ikke æller lidet klatrende, urteagtig ... recta 2.
" klatrende, oftest forveddet 2.
2. Blomsterne nikkende cirrhosa 3.
" oprette 3.
3. Bladene 1 x fjærdelte. Blosteret dunet på begge sider flammula
" 2 x " " " " glat på oversiden vitalba

Clematis flammula L. Korsskovranke. V-VIII. Alm.

C. vitalba L. Alm. skovranke. V-VII. Alm.

C. recta L. Opret skovranke. 1-1 $\frac{1}{2}$ m. Bladene 1 x delte, blågrønne nederunder, grønne ovenpå. V-VI. Korsika. Sj.

Clematis cirrhosa L. Nikkende skovranke. Bladene 1-2 x delte. Kronen nikkende, 4-7cm på tværs, gullighvid. X-XII. Sj.

Adonis. Enårig planter med 5-8 røde eller gule kronblade og grønt bøger. Stærkt fjerfligede blade. Mange nødder i forlænget hovede.

Adonis annua L. Høstadonis. Frugtens overside næsten lige, uden fremspring. Kronen rød. Markukrudt. III-VI. Alm.

A. aestivalis L. Junkeren i det grønne. Frugtens overside med et fremspring ca. halvvejs mod spidsen. Frugten 4½-6mm. Kronen rød eller gul. V-VIII. Markukrudt. Sardinien. Sj.

A. microcarpa DC. Frugtens overside med et fremspring nær spidsen. Frugten 2½-3½mm. Kronen oftest gul, oftest med sort plet ved grunden. Markukrudt. III-VI. Sj.

Ranunculus. Smørblomst.

1. Kronen hvid 2.
Kronen gul 12.
2. Vandplante 3.
Landplante 10.
3. Bladene oftest 8-30cm, længere end stængelledene 4.
" " under 8 cm 5.
4. Blomsterbunden m.m. glat. Bladafsnit højst 4 x delte fluitans
" tydeligt dunet. Bladafsnit mindst 4 x delte penicillatus
" " " " trichophyllus
5. Kronbladene 3-5½mm med måneformet honningkirtel 6.
" gennemgående større
6. Nødden glat, vinget hele vejen rundt baudotii
" ikke vinget 7.
7. Blomsterstilken oftest over 5 cm, længere end den
tilhørende bladstilk peltatus
Blomsterstilken oftest under 5 cm, kortere end den
tilhørende bladstilk 8.
8. Honningkirtlen halvmåneformet saniculifolia
" rund aquatilis
10. Bladene helrandede 11.
" dybt hånddelte platanifolius
11. Enårig, 2-10cm høj med 1-2mm brede blade batrachoides
Flerårig, 10-30cm høj med 6-8mm brede blade kuepferi
12. 3 bøgerblade ficaria
5 " 13.
13. Alle blade udelte 14.
I det mindste de øvre blade delte 20.
14. Alle blade i roset bullatus
Bladene stængler 15.
15. Enårig 16.
Flerårig 18.
16. Kronen kortere end bageret revelieri
" længere " " 17.
17. Nødderne knudrede. Planten opret, opstigende ophioglossifolius
" glatte. Planten nedliggende, rodslående fontanus
18. 1-2 stængelblade gramineus
Mange " 19.
19. Blomsten 3 cm i tværmål lingua
" under 2 cm i tværmål flammula
20. Enårig 21.
Flerårig 28.
21. Mange nødder i forlænget hpvede sceleratus
20-30 nødder i rundt hovede 22.
22. Nødderne 6-8mm 23.
" 2-4mm 24.
23. Bladene svagt lappede. Bageret nedadrettet muricatus
" smalfligede. Bageret tiltrykt kronen arvensis
24. Kronen 2 x bageret. Nødderne glatte eller fintprikkede ... 25.
Kronen 1-1½ x bageret. Nødderne knudrede eller tornede 26.

25. Nødden 2½-3mm, med næb på ½mm sardous
" 3-4mm, med næb på 1 mm marginatus
26. Blomsterbunden dunet. Bladet stærkt delt trilobus
" glat. Bladet lappet til noget fliget 27.
27. Frugtstilken spinkle. Næbbet ¼-1/3 x nødden parviflorus
" fortykkede. Næbbet ½ x nødden chius
28. Nødderne i et ægformet-aflangt hovede 29.
" i et rundt hovede 30.
29. Stænglen ved grunden med mange fibre paludosus
" uden fibre ved grunden monspeliacus
30. Bægerbladene nedadbøjede 31.
" tiltrykte kronen 35.
31. Blomsterstilken furet 32.
" ikke furet 33.
32. Bladets midterafsnit oftest stillet. Nøddens næb ½ mm bulbosus
" " siddende. Næbbet 1 mm pratensis
33. 2-5 cm høj cymbalariifolius
20-80 cm høj 34.
34. 20-30cm. Grundbladene udelte cordiger
30-80cm. Grundbladene tredelte velutinus
35. Bladets midterafsnit tydeligt stillet repens
" " ikke " " 36.
36. Næsten alle blade grundstillede marschlinsii
Stængelblade veludviklede 37.
37. 5-15cm. Bjærgplante clethraphilus
30-70 cm. 38.
38. Frugtnæbbet 1½mm, stærkt krummet. Stænglen med 2-3
mm lange, udstående hår lanuginosus
Frugtnæbbet svagt krummet. Stængelhårene indtil 1½mm 39.
39. Grundbladene delte i 3 brede, lappede flige macrophyllus
" " i 3-7 smallere, indskårne afsnit acer

Ranunculus acer L. Bidende smørblomst. V-VIII. Korsika: Sj.
Sardinien: Forvildet.

R. lanuginosus L. Uldhåret smørblomst. V-VIII. Alm.

R. velutinus Ten. Fløjls smørblomst. Bladstilke og nedre dele af stænglen udstående dunet, ellers tiltrykt silkehåret. IV-VI. Alm.

R. macrophyllus Desf. Storbladet smørblomst. Stænglen forneden med 1-2mm lange, udstående eller nedadrettede hår. Bladene femkantede i omrids. Frugtstilken stribet. IV-V. Sardinien: Alm. Korsika: Sj.

R. repens L. Lav smørblomst. III-VIII. M.alm.

• R. clethraphilus Litard. Tilhører montanus-gruppen. Bladene glatte. VII. 1800-1900m. Korsika: M.d'Oro. M.sj.

R. bulbosus L. Knoldsmørblomst. III-X. 3 underarter:
ssp. bulbosus: Stænglen fortykket i en knold forneden. Bladets midterafsnit stillet. Ikke på Sardinien.
ssp. bulbifer (Jordan) Neves: Med knold. Midterafsnittet rører de andre ved grunden. Sardinien og måske Korsika.
ssp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc. Ingen knold ved grunden. Midterafsnittet stillet.

R. pratensis Presl 20-70cm. Stænglen tiltrykt dunet. IV-VI. Fugtige enge, skov. Sardinien. Sj.

R. sardous Cr. Stivhåret smørblomst. II-IX. Alm.

R. marginatus D'Urv. Ligner foregående, men blomsten guldgul, bladene glatte og skinnende. VI-VII. SV-Sardinien. Sj.

R. trilobus Desf. Næsten glat. Kronbladene små, 4-6mm, lysegule. Fugtige steder. IV-V. Alm.

• R. cordiger Viv. Grundblade hjerte-nyreformede, rundtakke, tiltrykt dunede og langstilkede. 800-1900 m. Sumpe, grøfter. VI-VII. Sj.

- ④ Ranunculus cymbalariifolius Balbis 2-5cm høj. Grundbladene op til 1 cm store, runde, tredelte halvvejs eller mindre, med kraftigt rundtaktede lapper. Kronen lysegul, 10mm på tværs. 650-1800m. Mud-der og våde steder. Sardinien: Gennargentu. M.sj. VI-VIII.
- ⑤ R. marschlinsii Steudel 8-25cm. Grundblade 1-2cm store, 3-lappede indtil 2/3 eller $\frac{3}{4}$ eller også i smallere flige. Kronbladene 8-9mm. Fugtige steder og snelejer. 1500-2600m. Korsika. Alm.: M.Cinto, Rotondo, Coscione, Incudine, M.d'Oro m.m. VI-VII.
- R. muricatus L. 15-30cm. Bladene groft takkede til 3-5-lappede. Kronbladene $4\frac{1}{2}$ -10mm. Nødden 5-8mm, tornet, med en glat køl hele vejen rundt; næbbet 2-3mm, svagt buet. Fugtige steder. III-IV. Alm.
- R. arvensis L. Agersmørblomst. IV-VI. Alm.
- R. parviflorus L. Minder om marginatus, men med mindre blomster. Kronbladene $1\frac{1}{2}$ -3mm. Nødden ca. 3mm med vortede sider og køl og ca. 1mm langt næb. III-V. Korsika: Alm. Sardinien: Sj.
- R. chius DC. 8-15cm. Grundblade hen ad Vedbendærenpris. Blomster 6-8mm på tværs. Nødden med knudrede sider $2\frac{1}{2}$ -4mm. III-V. Sj.
- R. monspeliacus L. Bladene tredelte med stilket midterafsnit. Kronbladene 10-20mm. Nødderne sammentrykte, svagt dunede. Fugtige urtelier, flodlejer. IV-VI. Sardinien. Måske også Korsika.
- R. paludosus Poiret Forskelligbladet smørblomst (R. flabellatus Desf.) 2 slags grundblade, de ydre rudeformet runde, lidet delte, de indre 3 x fjerdedelte. Ellers kendelig ved fibrene ved stængelgrunden. Tørre enge. IV-V. Alm.
- R. ficaria L. Vorterod. I-V. Alm. Udover ssp. ficaria også ssp. ficariiformis Rouy & Fouc. med store blomster, 3-5cm i tværmal og Bægeret hvidliggult. Alm.
- R. bullatus L. Alle blade i roset, omvendt lancet- til spatelformede, tandede og fildede. Skafterne 1-blomstrede. 5-7 kronblade på 6-9mm. X-II. Alm.
- R. sceleratus L. Tiggersmørblomst. V-VI. Sj.
- R. platanifolius L. Lønbladet smørblomst. 30-60cm. Bladene dybt 5-7-delte med takkede afsnit. Blomsterne hvide. VI-VII. Sj.
- R. flammula L. Kærsmørblomst. VI-VII. Korsika: Sj. Sardinien: M.sj.
- R. batrachioides Pomel 2-10cm. Stænglerne oprette, spinkle, 2-5-blomstrede. Bladene med en stilk på 2-4cm og en smalt lancetformet plade. Blomsterne hvide, gule ved grunden, 5-8mm på tværs. Sumpe. III-IV. Sardinien: Macomer. M.sj.
- R. lingua L. Langbladet smørblomst. VI-VII. Sardinien: Fonni. M.sj.
- R. ophioglossifolius Vill. 10-40cm. Bladene bredt ægformede til lancetformede. Kær, sumpbredder. III-VII. Sj.
- R. fontanus Presl Nedliggende og ofte rodslående. Nedre blade lancetformede. Fugtige steder V-VII. Korsika: Capo Corso. Sj.
- ⑥ R. revelieri Boreau Ligner de to foregående, men grundbladene rundt ægformede med spids grund. Bægeret tætdunet. Grøfter og sumpe. IV-V. M.Sj. Sardinien: Cagliari, Molara, Salto, S.Sofia. Korsika: Porto Vecchio, Bonifacio.
- R. kuepferi Greuter & Burdet Liljesmørblomst. (R. pyrenaicus L.) Grundbladene blågrønne, lancetformede, ligenervede. Blomsten hvid. 1700-2600m. V-VI. Korsika. Sj.
- R. gramineus L. Græsbladet smørblomst. Bladene lancey-linjeformede med lyserøde skeder. Blomsten gul. 250-1600m. V-VI. Midtsardinien. Sj.

- Ranunculus baudotii Godron Strandfrøpeber. III-V. Sj.
- R. saniculifolius Viv. Oftest enårig. IV-VI. M.sj.
- R. peltatus Schrank Storblomstret frøpeber. IV-VI. Sj.
- R. aquatilis L. Alm. frøpeber. V-VI. Alm.
- R. trichophyllus Chaix Hårfliget frøpeber. IV-VI. Alm.
- R. fluitans Lam. I hurtigtstrømmende vand. V-VI.
- R. penicillatus (Dum.) Bab. (R. pseudofluitans (Syme) Newb.) I strømmende vand og store søer. V-VI. Sardinien. Sj.
- Hjembragte eksemplarer af underslægten Batrachium vil med fordel kunne bestemmes efter Flora Iberica.
- ⑦ Aquilegia barbaricina Arrig. & Nardi Hvidblomstret. Minder ellers om Alm. akeleje. Sporen krum, 11-17mm, men ikke ombøjet. V-VI. I et øllekrat på Gennargentu, Sardinien. M.sj. 1300-1400m.
- ⑧ A. litiardierei Briq. 8-12cm. Grundbladene med 3 afsnit på ca. 1 x 1 cm, der er sanikelagtigt indskårne. 1 vandretstillet blå-violet blomst med hagebøjet spore, kortere end blosteret. VII. Klipper. 1500-2100m. Korsika: M.Incudine.
- ⑨ A. bernardii Gren. & Godron Blomsterne lyseblå, vandretstillede. Planten 50-80cm høj. Sporen 15-17mm, ret eller noget bøjet. Stænglen kirteldunet foroven. Klipper. 1500-2300m. VI-VIII. Korsika: M.Cinto, M.Renoso, M.Rotondo. Sj.
- ⑩ A. nugorensis Arrig. & Nardi Som foregående. Sardinien: Gennargentu, Sevi.
- Thalictrum minus L. Liden frøstjerne. Alm.
- T. exaltatum Gaudin Høj frøstjerne. (T. morisonii Gmelin). 50-150cm. Stænglen skinnende. Planten med underjordiske udløbere. Øvre blade smaltfligede, 8-15 x 1mm. Blomsterne i nøgler. VI-VII. Korsika. Sj. Her som ssp. mediterraneum (Jordan) P.Fourn.

BERBERIDACEAE

- Berberis aetnensis Presl Klaserne 2-3cm med under 15 blomster. Klipper. 1400-2300m. V-VI. Alm.

PAEONIACEAE

- Paeonia mascula (L.) Miller Storbladet bonderose. Bladafsnittene gennemgående hele. Bælgkapslerne 3-5, oftest dunede, med afrundet spids og siddende støvfang. Rydninger i løvfældende egeskov. IV-V. Sj. Som ssp. russii (Biv.) Cullen & Heyw. med dunede bladunders.
- P. coriacea Boiss. Bladene lidt læderagtige, glatte nedenunder, men formede som hos den foregående. Oftest 2 bælgkapsler, der er glatte og spidse med kortstilket støvfang. Lysninger, buskads. 400-800m. IV-V. Sj.

LAURACEAE

- Laurus nobilis L. Laurbær. 1-5m. Unge grene grønne med langstrakte korkporer. Bladene stedsgrønne, læderagtige, aromatiske, mørkegrønne og skinnende ovenpå, spredte, oftest let bølgede i kanten. Tvebo. 4 blosterblade. 8-12 støvdragere. III-IV.

PAPAVERACEAE

- Papaver somniferum L. Opiumsvalmue. Hyppigst som ssp. setigerum (DC.) Arc., der er stivhåret og med bladtænderne endende i en stak. V-VIII. Alm.
- P. rhoeas L. Kornvalmue. IV-VI og VIII-IX. Alm.
- P. dubium L. Gærdevalmue. IV-VI. Alm.
- P. lecoquii Lamotte. En gærdevalmue med gule støvdragere og gullende mælkesaft. Bladene lidt dybere delte. Klipper og grus. IV-VI.

Korsika. Sj.: Ajaccio, Calvi, Pto.Vecchio, Colle di S.Colombano.

Papaver pinnatifidum Moris Skarptandet valmue. En gærdevalmue med gule støvknapper. De øvre blade ikke fjerdelte, men skarpt trekan- tet tandede eller lappede. Markukrudt. IV-V. Alm.

P. argemone L. Køllevaalmue. V-VI. Sj.

P. hybridum L. Vinvalmue. Kronbladene vinrøde. Kapslen stivbørstet
ligesom argemone, men næsten kuglerund. Makrurkrutt. V-VI. Alm.

Glaucium flavum Cr. Strandhornskulpe. V-X. Alm.

G. corniculatum (L.) Rud. Rød hornskulpe. 30-50cm. Kronen orange-rød. Kapslen stivhåret. V-VI. Sj.

Chelidonium majus L. Svaleurt. V-X. Alm.

Hypecoum. Seglskulpe. Glatte, blågrønne, enårige urter med mælkesaft. Bladene 2-3 x fjerdelte. Blomsterne ret små, gule, 4-tallige, de to par kronblade lidt forskellige. Kapslen linjeformet, m.m. seglkrummet, noget leddet.

H. procumbens L. 12-25cm, nedliggende. Ydre kronblade 3-9mm med
sidelapperne tydeligt mindre end hovedlappen. II-V. Sj.

H. imberbe Sibth. & Sm. 5-40cm, opret til opstigende. Ydre kronblade 10-12mm med sidelapperne så store som midterlappen. II-IV. Sj.

H. torulosum Dahl 5-12cm. Yderste flige på de øvre bladafsnit udvidede mod den 3-delte spids. Kronen citrongul. Ydre kronblade 5-8mm, længere end brede, med indrullede sidelapper, så kronbladet virker rudeformet. Frugten stærkt knudret. Korsika.

Corydalis pumila (Host) Rchb. Fingerlærkespore. IV-V. Korsika: Alm.

C. solida (L.) Sw. Langstilket lærkespore (L.) Sw. Frugstilkten
10-20mm (højest 5mm hos pumila). 10-20 blomster (3-8 hos pumila).
IV-V. Sj.

Fumaria. Jordrøg.

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | Kronen mindst 9 mm lang | 2. |
| " | højst 9 mm " | 7. |
| 2. | Frugstilken tilbagekrummet | 3. |
| " | ret, udstående eller opret | 4. |
| 3. | Modne frugt glat. Klasestilken lidt længere end klasen | |
| | capreolata | |
| | Modne frugt rynket. Klasestilken lidt kortere end klasen | |
| | flabellata | |
| 4. | Kronen vedvarende hvid med mørk spids | agraria |
| " | hele tiden eller efterhånden lyserød | 5. |
| 5. | Klasestilken kortere end klasen | bastardii |
| " | lig eller længere end klasen | 6. |
| 6. | Kronen først hvidlig, senere rosenrød | bicolor |
| " | hele tiden rosenrød | muralis |
| 7. | Kronen hvidlig med mørk spids | parviflora |
| " | lyserød, ofte med mørk spids | 8. |
| 8. | Frugstilken nedadkrummet | kralikii |
| " | ikke " | 9. |
| 9. | Klasestilken først lig klasen, senere kortere. Mørk krone | |
| | schleicheri | |
| " | hele tiden kortere end klasen | 10. |
| 10. | " tydelig | 11. |
| " | meget kort | densiflora |
| 11. | Kronen rødlig | officinalis |
| " | blegt lyserød | vallantii |

Fumaria agraria Lag. IV. Sardinien. Sj.

F. capreolata L. Hvid jordrøg. Ofte m.m. klatrende. II-V. Alm.

F. flabellata Gasparr. Ofte klatrende. II-IV. Alm.

F. bicolor Sommer II-IV. Korsika: Alm. Måske Sardinien.

F. bastardii Bor. III-V. Alm.

F. muralis Boiss.& Sonder IV-VI. Korsika: Sj. Sardinien?

F. kralikii Jordan IV-VI. Gl. fund.

F. densiflora DC. III-IV. Alm.

F. officinalis L. Lægejordrøg. V-VIII. M.alm. 2 underarter:
ssp. officinalis: Klassen oftest 20-30-blomstret. Bægerblade 2-3mm.
ssp. wirtgenii (Koch) Arc.: Klassen 10-20-blomstret. Bægerblade
 højst 2mm. Sjældnere.

F. schleicheri Soyer-Will. Mørk jordrøg. V-X. Sardinien. Sj.

F. vaillantii Loisel. VI-X. Sj.

F. parviflora Lam. Småblomstret jordrøg. III-IV. Sj.

Platycapnos spicata (L.) Bernh. Aksjordrøg. 8-35cm. Opret eller opstigende, m.m. blågrøn enårig med lyserøde eller hvidlige jordrøgsblomster på 5-6mm i ganske tætte, ret langstilkede klaser på 1-2cm. Vingårde og køkkenhaver. IV-V. Sardinien. Sj.

CAPPARIDACEAE

Capparis spinosa L. Rundbladet kapers. Busk med spredte, grågrønne, m.m. runde, op til 6cm store blade, der ofte har akseltorne. Store enlige, hvide blomster i bladhjørnerne. Disse er 4-tallige med mange støvdragere og en langstilket frugtknude. Kystklipper. Mure. V-VI. Alm.

CRUCIFERAE

- | | |
|---|----------------|
| 1. Skulpen lang, 3-flere x så lang som bred | 2. |
| " kort, højst 3 x så lang som bred | 28. |
| 2. Kronen gul | 3. |
| " hvid, lyserød eller blålig | 16. |
| 3. Med stjernehaar, grenede eller midterstillede haar | 4. |
| Med enkle haar eller glat | 6. |
| 4. Bladene 2-3 x fjersnitdelte | Descurainia |
| " hele eller svagt delte | 5. |
| 5. Blomsten hvidgul | Arabis turrita |
| " mørkegul til brunlig | Erysimum |
| 6. Modne frugt perleformet indsnævret | Raphanus |
| " " ikke " " | 7. |
| 7. Bægeret opret | 8. |
| " m.m. udstående | 12. |
| 8. Skulpen med knopformet næb | Hirschfeldia |
| " uden " " | 9. |
| 9. Alle blade helrandede, stængelbladene med hjerteformet grund | Conringia |
| Nogle blade delte eller tandede | 10. |
| 10. Skulpens næb sværdformet sammentrykt | Eruca |
| " næb ikke sværdformet | 11. |
| 11. Skulpen 3-året | Rhynchosinapis |
| " 1-året | Brassica |
| 12. Skulpen 3-året | 13. |
| " 0-1-året | 14. |
| 13. Skulpen med sværdformet næb | Sinapis |
| " med en kort griffel | Sisymbrium |
| 14. Skulpen med firkantet tværsnit | Barbarea |
| " trind eller flad | 15. |
| 15. Frøene i 2 rækker | Diplotaxis |
| " i 1 række | Brassica |
| 16. Nogle blade dybt delte | 17. |
| Bladene hele, højst tandede | 22. |
| 17. Skulpen tveleddet. Planten kødet | Cakile |
| " ikke tveleddet | 18. |
| 18. Skulpen perleagtigt indsnævret | Raphanus |
| " ikke " " | 19. |

19. Skulpen med sværdformet næb Eruca
 " uden " 20.
 20. Støvfanget med 2 sidestillede horn eller knuder ... Matthiola
 " afrundet 21.
 21. Skulpen med flade klapper Cardamine
 " " hvælvede klapper (se også *Diplostaxis eruc.*) Nasturtium
 22. Bladene hjerteformede. Blomsterne hvide Alliaria
 " ikke " 23.
 23. Skulpen sammentrykt, klapperne flade Arabis
 " trind, klapperne hvælvede 24.
 24. Hvidblomstret enårig Arabidopsis
 Anderledes 25.
 25. Støvfanget rundt Maresia
 " tvedelt 26.
 26. Støvfanget med 2 sidestillede horn eller knuder ... Matthiola
 " uden " " " " 27.
 27. Flerårig Hesperis
 Enårig Malcolmia
 28. Kronen gul 29.
 " hvid eller rød 42.
 29. Stænglen mangler eller bladløs 30.
 " bladet 31.
 30. Skulpen består af 2 kugleformede led Morisia
 " fladtrykt Draba loiseleurii
 31. Skulpen hængende 32.
 " opret eller udstående 34.
 32. Bladene 1-2 x delte Carrichtera
 " hele 33.
 33. Bladene pilformede. Planten 40-120 cm Isatis
 " spatelformede. Planten 2-15 cm Clypeola
 34. Skulpen tornet med langt næb Succowia
 " ikke tornet 35.
 35. Skulpen brilleformet Biscutella
 " ikke " 36.
 36. Stængelblade med pilformet grund 41.
 " uden " " " 37.
 37. Stjernehaaret. Bladene helrandede Alyssum
 Ikke stjernehaaret 38.
 38. Frugten med 4 uregelmæssige, grove vinger Bunias
 Frugten uvinget 39.
 39. Frugten ender i en pig, kort og kølleformet Myagrum
 " uden pig 40.
 40. Planten stivhaaret forneden Rapistrum
 " glat eller svagt håret Rorippa
 41. Skulpen netrynknet Neslia
 " glat Camelina
 42. Kronen stor og rødlig. Skulpen 3-6 cm Lunaria
 Skulpen mindre 43.
 43. Skulpen m.m. kugleformet 44.
 " ikke " 45.
 44. Stængelbladene med øret grund Calepina
 " " tilsmalnet grund Crambe
 45. Skulpen smalvæg 50.
 " bredvægget til trind. Bladene hele 46.
 46. Enårig 47.
 Flerårig 48.
 47. Stænglen bladet Draba muralis
 " bladløs Erophila
 48. Rosetplanter med få stængelblade 49.
 Masser af stængelblade Lobularia
 49. Skulpen flad Draba dubia
 " kuglerund Kerneria
 50. Skulpen retvinklet tilspidset nedadtil Capsella
 " ikke " " " 51.
 51. Enårig (toårig) 52.
 Flerårig 59.

52. Skulpens overflade ujævn, rynket eller nettribbet .. Coronopus
 " " jævn 53.
 53. Alle blade hele 54.
 Nogle blade delte 56.
 54. 4-10cm høj Teesdalia
 Over 10 cm høj 55.
 55. Tæthåret Lepidium campestre
 Glat eller svagt håret Thlaspi
 56. Een opret stængel over 15 cm Lepidium
 Flerstængler; ellers en ganske lav plante 57.
 57. Skulpen vinget foroven. Kronbladene ulige store ... Teesdalia
 " uvinget. Kronbladene lige store 58.
 58. Klaserne tætte Hornungia
 " ret løse Hymenolobus
 59. Skulpen omvendt hjerteformet Cardaria
 " anderledes 60.
 60. Kronbladene ulige store Iberis
 " lige " 61.
 61. Med bladrosen Thlaspi
 Uden " 62.
 62. Skulpen smalvinget Lepidium
 " bredvinget 63.
 63. Planten glat Aethionema
 " håret Lepidium hirtum

Sisymbrium. Vejsennep.

1. Skulpen 1-2½ cm, næsten siddende 2.
 " 3-20 cm 3.
 2. Frugterne tiltrykte i bladløs klase officinale
 " m.m. udadbøjede i bladhjørner polyceratium
 3. Frugtstilkens af skulpens tykkelse 4.
 " tynd irio
 4. Blomsterne små, med krone og bøger 1-2½ mm erysimoides
 " større. Kronen 8-10mm orientale

Sisymbrium irio L. Glat vejsennep. 15-75cm. Bladene med smalt trekantet, større endefsnit og op til 4 pasr (stængelbladene), smallr, næsten vinkelret-udstående sideafsnit. II-VI. Alm.

S. orientale L. Blød vejsennep. VI-VII. Sj.

S. polyceratium L. Blomsterne 2-3 sammen i de øvre bladhjørner. IV-VI. Sj.

S. erysimoides Desf. IV-V. Sardinien: Geremajas, Galtelli. Ruderal.

S. officinale (L.) Scop. Rank vejsennep. V-VII. Alm.

Descurainia sophia (L.) Webb Barberforstand. VI-VII. Korsika. Sj.

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande Løgkarse. V-VII. Korsika. Sj.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Gåsemad. III-IV+IX-X. Alm.

Myagrum perfoliatum L. Pigskulpe. 20-40cm. Glat, blågrøn enårig. Bladene noget tandede, stængelens med spydformet grund. Skulpen 5-8mm, med tyk stilk. Markukrudt. IV-V. Sardinien. Sj.

Isatis tinctoria L. Farvevæjd. V-VII. Alm.

Bunias erucago L. Agertakkeklap. 20-80cm. Stivhaaret, kirtlet. Skulpen 10-12mm, firkantet med 4 uregelmæssigt takkede vinger. II-VII. Alm.

Erysimum cheiri (L.) Cr. Gyldenlak. (Cheiranthus cheiri L.) III-VI. Gamle mure, borge, klipper. Alm. forvildet.

Hesperis matronalis L. Aftenstjerne. V-VII. Sj. Forv.

Malcolmia ramosissima (Desf.) Thell. 5-20, hvidt til grågrønt filtet af grenede hår. Bladene omvendt lancet-linjeformede blade. Kronen 4-8mm. Bøgeret ikke med sækformet grund. Skulpen m.m. knudret. Klitter. III-V. Sj.

M. maritima (L.) R.Br. 10-30cm. Bladene omvendt lancet-spatelformede. Kronen 12-25mm. Bøgeret med sækformet grund. Skulpen 35-80mm. Sandstrand og nær kysten. IV-V. Sardinien: Platamona.

Maresia nana (DC.) Batt. 5-20cm. Kort grådunet, stærkt grenet fra grunden af. Bladene linjeformet til aflange. Kronen 4½-5mm. Skulpen noget krummet og noget knudret. Klitter. IV-V. Korsika. Sj.

Matthiola incana (L.) R.Br. Sommerlevkøj. 30-60cm. Kraftig flerårig. Bladene oftest hele. Bøgeret tiltrykt, sækformet ved grunden. Kronen 2-3cm rødilla, lyserød eller hvid. Skulpen 4½-16cm, fladtrykt, uden fremtrædende kirtler. Planten oftest tæt hvidfiltet. Kystklipper og gamle mure. III-V. Alm.

M. sinuata (L.) R.Br. 30-50cm. Ligner den foregående. Gråfiltet. Grundbladene fligede. Kronbladene rødilla, 19-22m. Skulpen med iøjnefaldende gule eller sorte kirtler. Klitter. III-VII. Sj.

M. tricuspidata (L.) R.Br. Enårig. 10-30cm. Gråfiltet. Kronen 14-17mm. Let kendelig ved skulpens 3 iøjnefaldende horn på 3-4mm. Sandstrand. IV-VII. Sardinien. Alm.

Barbarea. Vinterkarse

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Grundblade med 0-1 par sidelapper | rupicola |
| " med 2-4 par " | vulgaris |
| " med 6-10 par " | verna |

⊗ Barbarea rupicola Moris Flerårig med vedvarende bladstilke ved grunden. Grundbladenes endefsnit violformet. Bladene lidt blågrønne. Kronen 7-10mm. Frugtstilke 6-12mm. Fugtige klipper. V-VII. 300-2000m. Sj.

B. vulgaris R.Br. Alm. vinterkarse. IV-VII. Korsika. Sj.

B. verna (Miller) Asch. Langskulpet vinterkarse. IV-VII. Alm.

Rorippa amphibia (L.) Besser Vandpeberrod. V-VII. Sj.

Nasturtium officinale R.Br. Havebrøndkarse. V-VII. Alm.

Cardamine. Springklap.

- | | |
|---|------------|
| 1. Bladstilkene med små stængelomfattende øren | 2. |
| " uden øren ved grunden | 4. |
| 2. Kronen 2-3mm, af bøgerets længde | impatiens |
| " 4-6mm, mindst 2 x bøgeret | 3. |
| 3. Kronen rød | chelidonia |
| " hvid | graeca |
| 4. Kronen 2-3mm, af bøgerets længde | 5. |
| " 5-13mm, mindst 2 x bøgeret | 6. |
| 5. 1-3 stængelblade, der er mindre end grundbladene | hirsuta |
| 6-12 " , af størrelse som grundbladene | flexuosa |
| 6. Støvknapperne sortviolette | amara |
| " gule | 7. |
| 7. Grundbladene hele, henad Vedbendørenprisen | plumieri |
| " fjersnitdelte | pratensis |

Cardamine amara L. Vandkarse. V-VIII. Korsika. Sj.

C. pratensis L. Engkarse. V-VII. Korsika. Sj.

C. plumieri Vill. Vedbendkarse. 5-20cm. Grundbladene hele, de nedre stængelblade 3-delte, de øvre 5-delte. Kronen 6-8mm. Våde klipper. 500-2200m. Korsika. Sj. VII-VIII.

C. graeca L. 10-30cm. Nedre blade med ca. 9 afsnit. Skulperne noget ensidigt stillede, vingede. Stenede, fugtige skrænter. II-V. Korsika. Sj.

Cardamine chelidonia L. 20-40cm. Bladene med 1-3 par ret store afsnit. Klasen med få lyserøde eller violette blomster. Især i bøgeskov. V-VI. Korsika. Sj. Cap Corse, Tenda.

C. impatiens L. Kronløs karse. IV-VII. Korsika. Alm.

C. flexuosa With. Skovkarse. IV-VI. Sj.

C. hirsuta L. Rosetkarse. I-XII. M.alm.

Arabis. Kalkkarse.

- | | | |
|---|-------|--------------|
| 1. Skulpen over 9cm, som moden vandret stillet | | turrita |
| " højst 9 cm, ikke vandret stillet | | 2. |
| 2. Blåblomstret enårig | | verna |
| Anderledes | | 3. |
| 3. Stængelblade stængelomfattende | | 6. |
| " med afrundet/afstudet grund | | 4. |
| 4. Kronblade linje-kileformede, 0,6-2mm brede | | 8. |
| " bredt omvendt ægformede, 1,8-4mm brede | | 5. |
| 5. Øvre stængelblade næppe bredere end stænglen | | muralis |
| Alle " meget bredere end " | | rosea |
| 6. Flerårig med golde, bladede skud | | alpina |
| Ingen golde skud | | 7. |
| 7. Enårig. Skulperne udspærrede | | recta |
| 2-flerårig. Skulperne oprette | | 8. |
| 8. Stænglen jævnt stivhåret | | hirsuta |
| " glat foroven | | 9. |
| 9. Stængelgrunden med mange 2-3-kløvede hår | | planisiliqua |
| " " " ugrenede hår | | sagittata |

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. 14-35 stængelblade. Kronblade 4½-8mm. Skulpen 4½-7½cm med svag eller ingen midteråre. IV-V. Korsika. Sj.

A. sagittata (Bertol.) DC. 12-50 stængelblade. Kronblade 4-6½mm. Skulpen 3-7cm med tydelige midteråre. IV-VI. Alm.

A. hirsuta (L.) Scop. 6-24 stængelblade. Kronen 3-6½ mm. Skulpen 25-52mm med tydelig midteråre. Sj. IV-VII.

A. muralis Bertol. 10-20cm. Flerårig med udpræget bladrosset. Ofte test gråfiltet af 3-5-grenede hår. Kronen hvid, sjældent lyserød. Større skulper 4-7cm på stilke op til 10mm. III-VII. Alm.

A. rosea DC. (A. collina Ten.) 15-30cm. Flerårig. Stængelbladene med spredte grenhår. Den umodne blomsterstand hængende. Kronen hvid, lyserød eller rødilla. Større skulper 5½-9cm på 10-16mm lange stilke. II-V. Sardinien: Oliena.

A. recta Vill. (A. auriculata Lam.) 10-40cm. Enårig. Dunet af grenede hår. Skulper 10-35mm. Kronblade hvide 2-4mm. III-V. Sardinien. Sj.

A. verna (L.) R.Br. 5-40cm. Ofte flerstænglet med få stængelblade. På blegviolette blomster med kronblade på 5-10mm. II-V. Alm.

A. turrita L. 2-flerårig. 20-80cm. Stængelblade med hjerteformet grund. Blomsterne gulhvide i ensidig, forlænget klase. Skulperne op til 15 cm, ensidigt, vandret stillede som modne. III-VII. Korsika. Alm.

A. alpina L. Fjældkalkkarse. 5-40cm. Flerårig, med udløbere. Bladene groft tandede, stængelbladene med hjerteformet grund. Kronbladene 6-10mm, hvide. III-VIII. Korsika. Sj.

Lunaria rediviva L. Vedvarende måneskulpe. V-VI. Sardinien: M. Limbara.

Alyssum. Krognål.

- | | | |
|-----------|-------|----|
| 1. Enårig | | 2. |
| Flerårig | | 3. |

2. Bægeret blivende alyssoides
 " affaldende minus
 3. Stængelblade 10-35 mm corsicum
 " 4-8 mm robertianum

Alyssum alyssoides (L.) L. Gråodder. III-VIII. Alm.

A. minus (L.) Rothm. Skulpen rund, 4½mm, stjernehaarsdunet. II-V. Sardinien. Alm.

A. corsicum Duby Grå flerårig, 30-60cm. De gølge skud sølvhvide, de frugtbare skuds blade efterhåden glatte og grønne. Bred halv-skærmformet blomsterstand. Kronblade 3mm. Skulpen 3-4mm, omvendt ægformet, glat. Bratte skrænter. V-VII. Korsika: Ved Bastia i dale- ne Fango og Toga.

• A. robertianum Bernard Flerårig, 6-15cm. Opstigende, hvidfildede grene. Bladene rude-spatelformede, 5-7mm, grågrønne ovenpå og grå-hvide nedenunder. Skulpen 5-6mm, svagt dunet, med griffel på 2 mm. Kalklipper. 900-1500m. V-VII. Sardinien: Oliena, Orgosolo, Dorgali. Korsika: Capo Corso fra M.Alticciona til M.S.Leonardo. Sj.

Lobularia maritima (L.) Desv. Biblomme. Flerårig, 10-40cm, forved- det forneden, stærktgrenet. Blade linje-lancetformede, 6-30mm, spid- se, gråfildede som unge af midtfæstede hår. Klaserne forlængede. Bægeret lmm, kronen 3mm, hvid. Skulpen 2-3x2½-3½mm, m.m. sølvdunet. Udyrkede steder, især ved havet. IV-X. Alm.

Clypeola jonthaspi L. Hængeskulpe. Opstigende, gulblomstret enår- ig, 2-15cm, gråfildet. Let kendelig ved de hængende, cirkelrunde, vingede skulper. III-IV. Sj.

• Draba loiseleuri Boiss. 5-10cm høj rosetplante med bladløst skaft. Gule blomster. Granitklipper. 2300-2709m. VII-VIII. Korsika: M.Ro- tondo, M.d'Oro, M.Cinto. M.sj.

D. dubia Suter 3-10cm. Rosetplante med bladet skaft og hvide blom- ster. 2100-2800m. VI-VII. Korsika. Sj.

D. muralis L. Murgæslingeblomst. Enårig. Hvidblomstret. IV-VI. Alm.

Erophila verna (L.) Chevall. Vårgæslingeblomst. I-V. Alm.

Kernera saxatilis (L.) Rchb. Kugleskulpe. 10-25cm. Flerårig roset- plante. Grundbladene spatelformede, 10-25mm, oftest grofttandede. Stængelbladene mindre. Kronen 2-4mm, hvid. Skulpen kuglerund. Plan- ten sparsomt håret forneden. Kalklipper. 1200-2500m. VI-VII. Kor- sika. Sj.

Camelina sativa (L.) Cr. Hundehør. 30-80cm. Kronen gul. Skulpen tydeligt længere end bred. Bladene helrandede eller svagt tandede. V-VI. Sj.

C. alyssum (Miller) Thell. Hjerteskulpet dodder. 15-50cm. Kronen bleggul. Skulpen affladet kugleformet, ca. så bred som lang. Bla- dene oftest stærkt tandede eller lappede. V-VI. Korsika. Sj.

Neslia paniculata (L.) Desv. Rundskulpe. IV-V. Alm. som ssp. thracica (Velen.) Bornm. med firkantet skulpetværnsnit.

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Hyrdetaske. Kronbladene 2-3mm, tydeligt længere end bægeret. I-XII. M.alm.

C. rubella Reuter Rødlig hyrdetaske. Kronbladene næppe længere end bægeret, dette rødligt anløbet. Planten enårig. III-VIII. Alm.

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. Enårig 5-15cm, med spredte, ugre- nede hår. Nedre blade oftest 1 x fjersnitdelte. Kronen lidt længere end bægeret. Skulpen 2-5mm med gennemskinnelige klapper. Mest nær kysten. III-V. Sj.

Hornungia petraea (L.) Rchb. Stenkarse. Ligner foregående, men me- re udpræget bladroset og tættere klase. Stjernehaaret. II-V. Sj.

Teesdalia coronopifolia (Berg.) Thell. Som flipkrave, men grund- bladene spidslappede eller hele. Kronbladene nogenlunde lige sto- re. Skulpen under 3mm. II-IV. Sj.

Thlaspi. Pengeurt.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Enårig | 2. |
| Flerårig | 3. |
| 2. Stængelbladene bredest foroven | alliaceum |
| " " forneden | perfoliatum |
| 3. Skulpen 3 x 5 mm, dens indskæring afrundet | brevistylum |
| " 4 x 8 mm, " " spids | rivale |

Thlaspi alliaceum L. 10-30cm. (Den omtalte løglugt ganske svag). Blågrøn. Glat. Bægeret bredt hvidrandet. Skulpen smalt, omvendt hjerteformet, smalvinget. III-V. Korsika. Alm.

T. perfoliatum L. Hjertebladet pengeurt. Skulpen bredere vinget, med ret dyb indskæring. IV-VI. Alm.

• T. brevistylum (DC.) Jordan 2-10cm. Glat rosetplante. Kronen 2mm. Støvnapperne først hvide, så gråviolette. Sætere og Klipper. V-VIII. 1000-2400m. Korsika: Alm. Sardinien: Gennargentu, Oliena, Tuttavista, Serpeddi. M.sj.

T. rivale Presl Som foregående, men støvnapperne gule. Sætere, snelejer. 800-1970m. V-VI. Sardinien: Oliena, Orgosolo. Lokalt alm.

Aethionema saxatile (L.) R.Br. 10-20cm, oftest grenet. Kronen ofte hvidligrød. Skulpen flad og med en vinge, der er bredere end frugten selv, med et spidst og dybt hak foroven. Grus og klipper. IV-VI. Sardinien. Sj.

Iberis pruitii Tineo 7-25cm., ret tykke stængler. Kronen hvide til rødlilla, op til 8-9mm. Skulpen bredt vinget med 2 store, tre- kantede spidser foroven. Grus, tør lerjord. V-VI. Sardinien. Sj.

Biscutella. Brilleskulpe.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Flerårig. Grundbladene dybt bugtet-tandede | rotgesii |
| Enårig | 2. |
| 2. Grundblade lyreformede | lyrata |
| " helrandede eller tandede | 3. |
| 3. Skulpen 7½-8½ x 4-4½ mm | eriocarpa |
| " 9½-12 x 4½-7 mm | didyma |

• Biscutella rotgesii Fouc. 18-26cm. Stænglerne tynde. Grundbladene 2-5cm, gråt stivhårede. Kronen 4-4½mm. Skulpen 8½x5mm. Skiferklip- per. 150-250m. V. Korsika: Kløfterne Inzecca og Punta Scalojo ved Ghisoni. M.sj.

B. didyma L. 15-30cm. Med eller uden bladroset, bladene tandede. I-IV. Alm.

B. eriocarpa DC. 10-30cm. Som foregående, men bladene mindre, ofte helrandede. Blomsterstanden tættere. I-IV. Korsika?

B. lyrata L. 10-30cm. Stænglen violet. Grundbladene med 3-5 par sidelapper, stængelbladene små og linjeformede. I-IV. Sardinien. Sj.

Lepidium. Karse.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Stængelbladene med øret grund | 2. |
| " " tilsmalnet grund | 3. |
| 2. 1-2-årig. Skulpen tæt dækket af små skæl | campestre |
| Flerårig. " håret/glat | hirtum |
| 3. Frugten 5-6mm, med vinge på 1-1½mm | sativum |
| " 2-4mm, stort set uvinget | 4. |
| 4. Kronen kortere end bægeret. Enårig | ruderales |
| " længere " " Flerårig | 5. |
| 5. Bladene brede, op til 10 cm lange | latifolium |
| " lancet-linjeformede, op til 4 cm lange | graminifolium |

Lepidium campestre (L.) R.Br. Salomons lysestage. V-VI. Korsika. Alm.

L. hirtum (L.) Sm. ssp. oxyotum (DC.) Thell. Håret karse. Den modne skulpe med en vinge på $\frac{1}{4}$ på skulperummet, rund i spidsen, uden hak.

L. sativum L. Havekarse. 20-50cm. Nedre blade m.m. fjerdelte, øverste linjeformede. Skulperne oprette i frugt. Kronen 2-2 $\frac{1}{2}$ mm, ofte rødligt anløben. VI-VII. Sardinien. Sj.

L. ruderales L. Stinkende karse. V-VII. Sardinien. Alm.

L. latifolium L. Strandkarse. VI-VII. Sj.

L. graminifolium L. Opret flerårig, 40-80cm. Bladene noget blågrønne, glatte eller fint randhårede, de nedre m.m. fjerdelte, de øvre mindre og smalle, ofte nedadkrummede. Skulpen druekærneformet. V-X. Alm.

Cardaria draba (L.) Desv. Hjerteskulpet karse. V-VII. Alm.

Coronopus squamatus (Forsskål) Asch. Ravnefod. Frugten vortet, nærmest nyreformet. III-VI. Alm.

C. didymus (L.) Sm. Stinkende ravnefod. Frugten netåret, noget som et liggende ottetal. III-V. Sardinien. Sj.

Conringia austriaca (Jacq.) Sw. Gul kálurt. Enårig. 30-100cm. Glat og blågrøn. Bladene helrandede, afrundede med hjerteformet grund. Kronen citrongul. VI-VII. Sardinien: Cagliari.

Diplotaxis. Mursennep.

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. Kronbladene hvide, lillaårede | | erucoides |
| " " gule | | 2. |
| 2. Kronbladene 8-14 mm lange. Stænglen bladet | | tenuifolia |
| " " 3-7 mm " . Stænglen oftest bladløs | | 3. |
| 3. Kronbladene 3-4 x 1 mm | | viminea |
| " " 6-8 x 3-4 mm | | muralis |

D. erucoides (L.) DC. Enårig. Stænglerne sparsomt stivhårede. Nedre blade fjerdelte, øvre tandede. I-XII. Alm.

D. tenuifolia (L.) DC. Sandsennep. V-X (I-XII) M.alm.

D. muralis (L.) DC. Mursennep. V-IX (II-XI). Alm.

D. viminea (L.) DC. Stinkende mursennep. 5-30cm. Glat eller svagt håret. Bladene lyreformet fjerlappede. Kronen svovl- eller citrongul. II-XI. Sardinien. Alm.

Brassica. Kål.

- | | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|
| 1. Bladgrunden tilsmlnende | | 2. |
| " " m.m. stængelomfattende | | 4. |
| 2. Modne skulper tiltrykte | | nigra |
| " " udstående | | 3. |
| 3. Nedre blade med 5-8 par sideflige | | tournefortii |
| " " lyreformede med 2-4 par sideflige | | fruticulosa |
| 4. Flerårig med forveddet grund | | insularis |
| Enårig | | 5. |
| 5. Bladene blågrønne, m.m. glatte | | napus |
| " " grønne, stivhårede | | rapa |

Brassica insularis Moris 40-80cm. Grundblade 10-15cm, lyre- bredt spatelformede . 60-80-blostmret klase. Blomster hvide eller bleggule. Stejlvægge, urer. IV-V. 0-700m. Sardinien: Spartivento, Iglesiente, Supramonte, Tavolara og andre småøer. Korsika: M.di Caporlino, Inzecca, Rio Stretto.

B. napus L. Raps. III-X. Alm.

B. rapa L. Agerkål. III-X. Alm.

Brassica tournefortii Gouan 30-50cm. Kronbladene 5-7mm, bleggule ofte med lillaanløben grund. Skulpens næb 6-20cm. Mest på sandstrand. II-V. Sardinien. Sj.

B. nigra (L.) Koch Sort sennep. II-V. Sj.

B. fruticulosa Cyr. 20-60cm. 1-flerårig. Bægeret 3-8mm opret, kronen 7-15mm. Skulpens næb 5mm. I-XII. Sardinien. Sj.

Sinapis arvensis L. Agersennep. III-V. (X)

S. alba L. Gul sennep. III-VI. Alm.

S. pubescens L. Flerårig. Den modne skulpe 14-25mm, oftest tiltrykt, med fine, fremadrettede hår. I-XII. Sardinien: Sassari.

Eruca sativa Miller Salatsennep. 20-80cm. Enårig. Bægeret opret. Kronbladene 15-20mm, hvide eller bleggule med violette årer. Skulpen tiltrykt med sværdformet næb. II-VI. Alm.

Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy Næbskulpe. 1-flerårig, 40-80cm. Stænglen tæt stivhåret forneden. Bladene fjerfligede med 3-6 par flige. Kronen gul med mørkere årer, 15-20mm. Skulpen 3-5 cm med et næb på ca. 1 cm. Klipper. 800-2200m. V-VIII. Sardinien: Bollotona, Pattada, Tavolara. Korsika: C.Corso ved M.di Cagna. Sj.

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-F. Bastardsennep. 10-50cm. 1-flerårig. Tæthåret. Nedre blade lyreformede til fjerfligede. Kronen 6-9mm, bleggul, ofte med mørkere årer. Den blomstrende del af klasesen sammentrængt kugleformet. Skulperne noget tiltrykte. IV-V. Alm.

Carrichtera annua (L.) DC. Skeskulpe. Skulperne 3-4mm, hvælvede, hver klap med 3 stivhårede årer. Skulpen desforuden med et skeformet næb på 4-6mm. II-IV. Sardinien: Cagliari, S.Elia, Aritzo, S.Stefano.

Succowia balearica (L.) Med. Morgenstjerne. 20-30cm. Enårig. Bladene 2 x delte. Skulpen 3-5mm, helt dækket af 1-3mm lange torne og med 6-9mm langt næb. Skyggefulde, fugtige steder. II-V. Sardinien: Østkysten. Korsika: Portovecchio.

Cakile maritima Scop. ssp. aegyptiaca (Willd.) Nyman Strandsennep. I-XII. Alm.

Rapistrum rugosum (L.) All. Enårig knopskulpe. Skulpen todelt, det øvre led æg- til kugleformet, det nedre cylindrisk og ofte så tykt som stilken. 2 underarter: V-VII.
ssp. rugosum: Frugtstilken 1-2 x så lang som det cylindriske led. Det øvre led tydeligt ribbet og rynket. Alm.
ssp. linnaeanum Rouy & Fouc.: Frugtstilken 2-4 x det cylindriske led. Det øvre led svagt ribbet og rynket. Sj.

Crambe hispanica L. 20-100cm. Enårig. Bladene med hjerteformet endefsnit og 0-2 par små sidelapper. Endefsnittet 3-7cm. Kronen hvid. Skulpen toledet som Knopskulpes. III-IV. Sardinien: M.Cea Bari, Tortoli.

Calepina irregularis (Asso) Thell. Netskulpe. Glat og noget blågrøn enårig, 20-40cm. Kronbladene uend, de ydre 2mm, de indre 2 $\frac{1}{2}$ -3 mm. Skulpen kugleformet, 2mm, netåret. II-V. Sj.

- Morisia monanthos (Viv.) Asch. Savblad. Flerårig rosetplante uden stængler. Blade fjerfligede med skarpt trekantede flige. Blomsterne enlige på 5-26mm lange stilke, med gulgrønt bæger og gul, orangeåret krone på 9-12mm. Fugtigt sand. 0-1200m. III-V. Alm.

Raphanus raphanistrum L. Kiddike. III-VI. Alm. 4 underarter:

- ssp. raphanistrum: Skulpens tværmål 3 $\frac{1}{2}$ -5mm. Alm.
- ssp. microcarpus (Lange) Thell.: Skulpens tværmål 2-3mm. Korsika.
- ssp. maritimus (Sm.) Thell.: Skulpens bredde 5-8mm. Bladfligene tætstillede og ofte overlappende. Kyster. Sardinien.
- ssp. landra (Moretti) Bonnier: Skulpens bredde 5-8mm. Bladfligene fjærntsideende. Markukrudt.

RESEDACEAE

Reseda

1. Rosetbladene hele 2.
" fligede 3.
2. Alle blade hele luteola
Øvre " tredelte phyteuma
3. Rosetbladene med 1-2 par sideflige lutea
" med 5-15 par " alba

Reseda luteola L. Farvereseda. Kronen hvidgul. VI-IX. Sj.

R. alba L. Hvid reseda. Alle blade mangefligede. Kronen hvid.
Kapslen m.m. udstående. IV-VIII (I-XII). Alm.

R. phyteuma L. Kronen grønlig hvid. Kapslen hængende, noget pære-
formet. IV-IX. Korsika: Alm.

R. lutea L. Gul reseda. Kronen gul. V-IX. Alm.

Sesamoides. Stjerne-kapsel. Flerårig med hele blade. Kronen mange-
fliget ligesom hos Reseda. 4-7 m.m. frie enfrøede kapsler, der
bliver stjerneformet udstående i frugt. Artsopfattelse efter
Flora Iberica.

1. Stængelbladene bredt spatelformede spathulifolia
" linjeformede til aflangt lancetformede 2.
2. Griflen helt eller næsten endestillet interrupta
" sidestillet purpurascens

Sesamoides interrupta (Bor.) G.López (S. pygmaea (Scheele) Kuntze). 5-15cm. Noget blågrøn. 7-9" støvdragere. Sandede klippeområder. 1200-2200m. V-VIII. Alm.

S. purpurascens (L.) G.López (S. canescens (L.) Kuntze p.p.) 10-45cm. Friskgrøn eller blågrøn. 12-14 støvdragere.

S. spathulifolia (Revel.) Rothm. (S. canescens p.p.). 5-35cm.
Sandstrand eller sandede områder nær kysten. V-VI. Sj.

DROSERACEAE

Drosera rotundifolia L. Rundbladet soldug. VI-VIII. Korsika. Sj.

PLATANACEAE

Platanus hybrida Brot. Alm. platan. IV-VI. Dyrket og forvildet.

CRASSULACEAE

Crassula. Korsarve. 2-6cm høje, glatte enårige med modsatte, ofte
rødlige blade. Blomster 3-4-tallige. Lige så mange støvdragere.

Crassula tillaea Lester-G. Moskorsarve. Bladene ægformede, konka-
ve, 2mm, tætsiddende og næsten taglagte. 3-tallige blomster i små
grupper i bladhjørnerne. Fugtigt sand, dynd. I-V. Sj.

C. vaillantii (Willd.) Roth. Bladene bredt linjeformede, flade,
4-6mm, ikke tætstillede. 4-tallige blomster på tynde stilke, der
er længere end bladene. Udtørrende pytter på kiselholdig jord.
II-V. Sj.

Umbilicus. Navleblad. Flerårige planter med kødede, skjoldformede
blade. Blomsterne i en lang klase med rørformet, sambladet krone.

Umbilicus rupester (Salisb.) Dandy Blomsten hængende. Kronfligene
bredt ægformede. Fugtige, skyggefulde klipper og gamle mure. III-V.
Alm.

U. horizontalis (Guss.) DC. Blomsterne vandret udstående. Kronfli-
gene spidse. Fugtige klipper og mure. III-V. Sardinien. Alm.

Sempervivum montanum L. Bjærghusløg. VII-VIII. Korsika. Sj.

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berth. Evighedstræ. Flerårig, 50-80
cm, med halvforveddede stængler og endestillede bladrossetter. Bla-
dene 2x6 cm, finttandet randhårede, kødede. En ret stor top med
8-12-tallige, guldgule blomster. Mure og klipper. XII-III. Forvil-
det på Sydsardinien. (Marokko).

Sedum. Stenurt.

1. Bladene flade 2.
" trinde 4.
2. Enårig 3.
Flerårig telephium
3. Bladene helrandede, de nedre større end de øvre cepaea
" med ujævn rand, nogenlunde lige store stellatum
4. Enårig 5.
Flerårig 12.
5. Kronen gul 6.
" ikke gul 7.
6. Kronen 2 x bageret annuum
" 1 x " litoreum
7. Kronen himmelblå caeruleum
" hvid eller rød 8.
8. Planten glat 9.
" kirteldunet, i det mindste foroven 10.
9. Blomsterne siddende. Kronen lyst rødlig hvid caespitosum
" kortstilkede. Kronen snavset hvid andegavense
10. Blomsterstilkene længere end blomsterne villosum
" kortere " " 11.
11. Blomsten 5-tallig. Højbladene længere end blomsterne rubens
" 6(-9)-tallig. Kortere højblade hispanicum
12. Kronen gul 13.
" ikke gul 16.
13. Bælgkapslerne oprette. Planten 15-25cm eller mere 14.
" udspærrede. Planten under 10cm 15.
14. De gølge skuds blade hindeagtigt udbredte foruden tenuifolium
Bladene trinde hele vejen rupestre
15. Kronen 2 x bageret acre
" 1,2-1,5 x bageret alpestre
16. Bladene ægformede (1,1-1,5 x så lange som brede) 17.
" lange 18.
17. Kronen hvid, rosenstribet. Bladene mest modsatte dasyphyllum
" lyserød. Bladene ofte 4-radede brevifolium
18. Planten glat album
" kirteldunet 19.
19. Øvre blade 4-radede. Kronen hvid monregalense
Alle blade spredte. Kronen rødlig villosum

Sedum telephium L. Sankthansurt. På Korsika den rød-blomstrede un-
derart ssp. telephium og på Sardinien den grøn-blomstrede ssp. ma-
ximum (L.) Krockner.

S. rupestre L. Bjærgstenurt. (S. reflexum L.) V-VII. Sardinien.

S. tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl De ikke-blomstrende skud med
tætsiddende, oprette blade med en hindeformet, bred, trelappet
grund. Bladene visner tidligt og bliver siddende sommeren igennem.
V-VII. Sardinien. Alm.

S. acre L. Bidende stenurt. V-VII. Sj.

S. alpestre Vill. Alpestenurt. De gølge skud korte og nærmest
kugleformede. Bladene spatel- til kølleformede. 1800-2800m. Snele-
jer o.l. VII-VIII. Sardinien: Gennargentu, Limbara. Korsika.

S. album L. Hvid stenurt. VI-VII. Alm.

S. dasyphyllum L. Tykbladet stenurt. Planten oftest blådugget. Bla-
dene oftest modsatte, 2½-3mm. VI-VII. Alm.

Sedum brevifolium DC. Ligner foregående, men helt glat og næsten kugleformede blade. 0-2300m. V-VIII. Korsika: Alm. Sardinien: Tavolara.

S. monregalense Balbis. Planten kirteldunet oventil. 5-15cm. Blomsterne langstilkede. VI-VIII. Korsika. Sj.

S. villosum L. Lådden stenurt. 5-15cm. Kirteldunet over det hele. Blomsterne stilkede. VII-VIII. Fugtige steder. 1500-2900m. Sardinien: Gennargentu, Limbara.

S. cepaea L. Topstenurt. Blomsterne i en lang top, der indtager det meste af stængelen, hvide med røde årer. 15-30cm. V-VII. Alm.

S. stellatum L. Glat enårig, 3-15cm. Kronen lyserød. IV-V. Alm.

S. annuum L. Liden stenurt. 5-15cm. Glat, ofte rødligt anløben eller stribet. Grenene bugtede foroven. Bladene spredte, 4-6mm, indsnævrede mod grunden. VI-VIII. Korsika. Sj.

S. litoreum Guss. Ligner foregående, men bladene 2-5mm, noget affladede. Kronen bleggul, til sidst hvidlig. IV-V. Sj.

S. rubens L. 5-12cm, kirteldunet foroven, noget blågrøn og ofte rødligt anløben. Blade 10-20mm. Kronbladene hvide med rødlig åre. IV-VI. Alm.

S. caespitosum (Cav.) DC. Ofte rødlig plante, 2-5cm. Bladene 3-6mm. IV-V. Sj.

S. andegavense (DC.) Desv. 3-7cm. Bladene ægformede til næsten runde, taglagte. IV-VI. Klipper og mure. 0-1200m. IV-VI. Sj.

S. hispanicum L. Grå stenurt. 5-8cm. Bladene 7-18mm, blågrønne. Kvastene ensidige. Kronen hvid og rødåret. V-VI. Sardinien.

S. caeruleum L. 5-20cm, oftest stærkt rødligt anløben. Bladene 3-4mm. Blomsterne i en åben top. Klipper og grus. II-V. Alm.

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga. Stenbræk.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Grundbladene med stilk og m.m. rund plade | 2. |
| " " jævnt tilsmalende mod grunden | 4. |
| 2. Med ynglekopper ved stængelgrunden | 3. |
| Uden " " rotundifolia | |
| 3. Stænglen med ynglekopper i bladhjørnerne | bulbifera |
| " uden " " corsica | |
| 4. Grundbladene helrandede eller finttandede | 5. |
| " takkede eller fligede | 6. |
| 5. Grundbladene linjeformede, helrandede | lingulata |
| " spatelformede, finttandede | paniculata |
| 6. Grundbladene takkede | stellaris |
| " håndformet 3-5-kløvede | 7. |
| 7. Enårig | tridactylites |
| Flerårig | cervicornis |

Saxifraga stellaris L. Stjernestenbræk. 12-25cm med tæt bladros. Bladene let kodede, omvendt ægformede til spatelformede. Bægeret nedadrettet. VII-VIII. Korsika. Sj.

S. rotundifolia L. Rundbladet stenbræk. 15-40cm., kirteldunet, især foroven. Grundbladene blege nedenunder, mørke ovenpå. Kronbladene oftest gulplettede ved grunden. VII-VIII. Sj.

S. tridactylites L. Trekløftstenbræk. II-VII. Alm.

S. bulbifera L. Knopstenbræk. Vækst som Kornet stenbræk, men med ynglekopper i bladhjørnerne. III-V. Alm.

S. corsica (Duby) Gren. & Godron Ligner kornet stenbræk, men stænglen grenet halvvejs oppe eller helt fra grunden. Grundbladene m.m. trelappede. Blomsterstanden fåblomstret. IV-V. Sj.

Saxifraga cervicornis Viv. (S. pedemontana All. ssp. c.) 5-10cm. Tæt tuedannende. Bladene kileformede, 5-fligede. Blomsterstanden 3-7-blomstret. Granit- og skiferklipper. VI-VII. Korsika: Alm. Sardinien: Gennargentu, M.di Oliena, Montalbo.

S. lingulata Bell. Tungestenbræk. (S. callosa Sm.) Rosetplante med læderagtige blade med kalkkirtler, ofte mørkerøde ved grunden. Mange blomster i ret smal top. Kronen hvid, ofte med karminrøde pletter. Klipper og kløfter. 1100-2500m. Sardinien. Sj.

S. paniculata Mill. Klippestenbræk. (S. aizoon Jacq.) Grundbladene blågrønne, med kalkkirtler ved tænderne. Kort, halvskærmformet top. Kronen hvid, ofte purpurpletet. VI-VIII. Korsika. Sj.

GROSSULARIACEAE

Ribes multiflorum Kit. Mangeblomstret ribs. Klaserne 30-50-blomstrede, hængende. Bladene ca. 10x10cm. Især i bøgeskov. V-VII. Sardinien. Gennargentu, Limbara, M.Novo S. Giovanni. Her som den endemiske ssp. sandaliticum Arrigoni.

R. sardoum Martelli Ligner stikkelsbær, men uden torne. Bladene små, 1-1½cm. Blomsterne enlige i bladhjørnerne, kortstilkede. Kalkklipper. 1000-1200m. Sardinien: Oliena (Sos Prados). Sj. V-VI.

ROSACEAE

Rubus idaeus L. Hindbær. V-VI. R.sj. Sardinien: Indført.

R. ulmifolius Schott Ælmebladet brombær. Brombær med hvidfildede bladundersider. Årsskuddene uden kirtler. Støvdragerne længere end de lyserøde eller hvide grifler. V-VII. Alm.

R. canescens DC. Kilebrombær. Et brombær med hvidfildede bladundersider. Årsskuddene fåkirtlede. Støvdragerne af længde med de grønne grifler. V-VII. Korsika. Alm.

Rosa. Rose

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Bægerbladene m.m. helrandede | 2. |
| De 3 ydre bægerblade tydeligt fligede | 4. |
| 2. Kronen mørkt rosenrød | glauc |
| " hvid | 3. |
| 3. Stænglerne med få, krumme torne | sempervirens |
| " med mange tynde, rette torne | pimpinellifolia |
| 4. Bladene læderagtige. Kronblade 3-4½ cm | gallica |
| " ikke " " 1-2½(-3) cm | 5. |
| 5. Bladundersiden glat | 6. |
| " kirtlet | 7. |
| 6. Hybenstilken glat ..(bægerblade 2-3mm brede: glauca)... | canina |
| " med kirtelbørster | pouzinii |
| 7. Hybenstilken oftest 3-5mm. Hybenet kuglerundt | serafinii |
| " " 10-15mm. " aflangt | 8. |
| 8. Bladene med kileformet grund. Hybenstilkene oftest | agrestis |
| " " afrundet grund. Hybenstilkene med | |
| stilkstilkertler | micrantha |

Rosa pimpinellifolia L. Klitrose. V-VII. Sj.

R. serafinii Viv. En æblerose med skinnende bladoversider. V-VI. 800-1500m. Sj.

R. agrestis Savi Lugtløs æblerose. V-VI. Sj.

R. micrantha Sm. En æblerose m. m.m. skinnende bladoversider. V-VI. Korsika. Sj.

R. glauca Pourret Kobberrose. (R. rubrifolia Vill.) Bladene glatte, blåliggrønne. Bægerbladene oftest fligede, men nogle gange hele. VI-VII. Korsika: M.d'Oro. M.sj.

Rosa canina L. Glat hunderose. V-VII. Alm.

R. pouzinii Tratt. En hunderose med ofte m.m. runde småblade. Terpentinnlignende lugt. V-VI. Sj.

R. gallica L. Sukkerrose. Stænglen med torne og kirtelbørster. Bladene kirtlede på undersiden. Blomsterne stærktduftende. Mærkt rosenrøde. V-VI. Sjældent forvildet.

R. sempervirens L. Stedsegrøn rose. Bladene stedsegrønne. Stænglerne 1-3m lange, klatrende. V-VI. Alm.

Agrimonia eupatoria L. Alm. agermåne. VI-VII. Alm.

Sanguisorba minor Scop. Bibernelle. VII-VIII. Alm. 3 underarter: ssp. *minor*: Yderbægeret netåret.

ssp. *muricata* Briq.: Yderbægeret vinget, op til $1\frac{1}{2}$ x så langt som bredt.

ssp. *rupicola* (Boiss.& Reuter) Nordborg: Yderbægeret vinget, mindst 2 x så langt som bredt. Sardinien: Oliena, Desulo.

Sarcopoterium spinosum (L.) Spach Tornbibernelle. Ligner *Sanguisorba*, men en tornet busk op til 60cm. III-V. Sardinien. Alm.

Geum montanum L. Bjærgnellikerod. Store gule blomster 1-3 sammen på stænglerne. 1800-2600m. VI-VII. Korsika. R.alm.

G. urbanum L. Febernellikerod. V-VII. Alm.

Potentilla. Potentil.

- | | | |
|--|-------|------------------------|
| 1. Bladene uligefinnede. Kronen hvid | | <i>rupestris</i> |
| " 3-7-fingrede | | 2. |
| 2. Kronen hvid | | 3. |
| " gul | | 5. |
| 3. Grundbladene 3-koblede | | <i>micrantha</i> |
| " 5(-7)-koblede | | 4. |
| 4. Bladene buttandede | | <i>crassinervia</i> |
| " spidstandede | | <i>caulescens</i> |
| 5. Blomsten 4(-5)-tallig | | 6. |
| " 5-tallig | | 7. |
| 6. Stænglerne nedliggende, ofte rodslående | | <i>anglica</i> |
| " opret-opstigende | | <i>erecta</i> |
| 7. Stænglerne nedliggende og rodslående | | <i>reptans</i> |
| " ikke rodslående | | 8. |
| 8. Bladene hvidfildede på undersiden | | <i>argentea</i> |
| " ikke " " | | 9. |
| 9. Stænglen opstigende | | <i>tabernaemontani</i> |
| " opret | | 10. |
| 10. Småbladene med 3-8 par tænder | | <i>hirta</i> |
| " " 7-15 " " | | <i>recta</i> |

Potentilla rupestris L. 10-50cm. Grundbladene med 2-3 par småblade. Klipper og tørre. V-VI. Sardinien: Gennargentu. Korsika: Sj.

P. argentea L. Sølvpotentil. Korsika. Sj.

P. recta L. Rank potentil. VI-VII. Sj.

P. hirta L. Ligner foregående, men uden kirtelhår. Stænglen ofte rødlig. Tørre, klipper. V-VII. Sj.

P. tabernaemontani Asch. Vårpotentil. IV-IX. Sj.

P. erecta (L.) Räuschel Tormentil. V-VIII. Alm.

P. anglica Laich. Liggende potentil. V-VII. Korsika. Sj.

P. caulescens L. Mangestænglet potentil. 5-30cm. Grundbladene med linje-lancetformede fodflige. Kalkklipper. VI-IX. 500-2000m. Sardinien. Sj.

Potentilla reptans L. Krybende potentil. V-IX. Alm.

P. crassinervia Viv. Ligner foregående, men grundbladene med æg-lancetformede fodflige. Kiselholdige klipper. 1200-2500m. Sardinien: M.Vittoria Esterzili. Korsika. Sj.

P. micrantha Ramond Fyrrepotentil. Blomstrende stængler 1-5cm. Minder ellers om Jordbærpotentil. I-V. Alm.

Fragaria vesca L. Skovjordbær. IV-VI. Alm.

Alchemilla glaucescens Wallr. Blågrøn løvefod. Korsika.

A. saxatilis Buser Bladene delte næsten til grunden. Blomsterstandene lidt længere end bladene. Nøglerne tætstillede. Korsika.

A. transiens (Buser) Buser Bladene delte næsten til grunden. Blomsterstandene tydeligt længere end bladene. Nøglerne adskilte. Korsika.

Aphanes arvensis L. Alm. dværgløvefod. IV-VI. Alm.

A. microcarpa (Boiss.& Reuter) Rothm. Småfrugtet dværgløvefod. IV-V. Alm. Pignatti omtaler planterne på Korsika og Nordsardinien som *A. bonifaciensis*, der dog ikke beskrives klart.

Pyrus amygdaliformis Vill. Mandelpære. Op til 6m. Smalt lancet-til omvendt ægformede blade, der bliver glatte og ganske svagt vortede på undersiden. Unge grene uldhårede. Frugten $1\frac{1}{2}$ -3cm, gul-lig oftest kugleformet. IV-V. Alm.

Malus silvestris Miller Skovæble. IV-V. Alm.

M. domestica Borkh Sødæble

Sorbus aucuparia L. Alm. røn. V-VI. Korsika. Sj.

S. domestica L. Storfrugtet røn. Med blade som hos foregående. Klæbrige knopper. Blomsterstanden fåblomstret. Frugterne $1\frac{1}{2}$ -3cm, pæreformede, grønne eller brunlige. 5 grifler. IV-V. Sj.

S. torminalis (L.) Cr. Tarmvridrøn. IV-V. Alm.

S. aria (L.) Cr. Sydlig akselrøn. Bladene ægformede eller elliptiske, savtaktede. V-VI. Alm.

Amelanchier ovalis Med. Europæisk bærmisspel. Busk op til 3m med slanke, oftest oprette grene og næsten sort bark. Blade ægformede til omvendt rundagtige, savtaktede, først hvidfildede på undersiden, senere glatte. Hvide blomster, 10-13mm, med smalle kronblade. IV-V. Sj.

Mespilus germanica L. Mispel. 2-6m Undertiden tornet. Bladene lancetformede, 6-12cm, næsten siddende, dunede nedenunder. Bægerbladene længere end kronen. Frugten 2-3cm, brun, indtrykt kugle- eller pæreformet. V-VI. Sardinien: Sj. Korsika

Crataegus monogyna Jacq. Engriflet hvidtjørn. IV-V. Alm.

Prunus

- | | | |
|--|-------|------------------|
| 1. Bladet 0,8-1,4 x så langt som bredt | | 2. |
| " 2-4 x så " " " | | 3. |
| 2. Tornet busk med de unge grene dunede | | <i>mahaleb</i> |
| Lille træ med glatte grene | | <i>armeniaca</i> |
| 3. Unge grene dunede | | 4. |
| " " glatte | | 6. |
| 4. Bladene 9-12 mm lange | | <i>prostrata</i> |
| Bladene 2-8 cm lange | | 5. |
| 5. Bladene 2-4 cm | | <i>spinosa</i> |
| " 6-8 cm | | <i>domestica</i> |
| 6. Bladet 3 x så langt som bredt | | 7. |
| " bredere | | 8. |
| 7. Bladet bredest i øvre halvdel | | <i>persica</i> |
| " " i nedre " | | <i>dulcis</i> |
| 8. Bladet enkelt savtakket, skinnende ovenpå | | <i>cerasus</i> |
| " dobbelt " | | <i>avium</i> |

Prunus persica (L.) Batsch Fersken. Dyrket og forvildet.

P. dulcis (Miller) Webb Mandel. Dyrket og sj. forvildet.

P. armeniaca L. Abrikos. Alm. dyrket.

P. spinosa L. Slåen. Alm.

P. domestica L. Blomme. Dyrket.

P. prostrata Labill. En kirsebærbusk op til 1m. Bladene gråfil-
tede eller glatte nedenunder. Blomstrer før bladsætningen. Kronen
lyserød. V. M.sj. Sardinien: Gennargentu, Oliena. Korsika: P. del
Fornello.

P. avium L. Fuglekirsebær. IV-V. Alm.

P. cerasus L. Surkirsebær. IV-V. Dyrket og forvildet.

P. mahaleb L. Weichsel. 1-5m. Barken skinnende, gråviolet, tvær-
stribet. Kortskuddene mørke og glatte. Bladene æg-hjerteformede,
skinnende ovenpå, randen kirteltandet. 3-10 blomster i halvskærm.
IV-V. Korsika. Sj.

LEGUMINOSÆ

1. Træ 2.
Urt eller busk 5.
2. Bladene hele Acacia
" finne 3.
3. Bladene enkelt finne 4.
" dobbelt finne Acacia
4. Bladene ligefinne Ceratonia
" uligefinne Robinia
5. Nogle blade finne 33.
Ingen finne blade 6.
6. Nogle blade 3-koblede eller fingrede 13.
Alle blade hele (eller mangler) 7.
7. Bladene tandede Ononis
" helrandede (eller mangler) 8.
8. Enårig urt 9.
Flerårig urt eller busk 10.
9. Den modne bælg sammenrullet Scorpiurus
" " lige Lathyrus
10. Ingen blade. Tornet busk Ulex
Med blade 11.
11. Bægerørret 2-4 x så langt som bredt ... Anthyllis hermanniae
" " ca. " " " " 12.
12. Bægeret kløvet til grunden langs oversiden Spartium
" ikke kløvet til grunden Genista
13. Småbladernes nerver når den oftest tandede rand 14.
" " når ikke den helrandede rand 20.
14. Bælgen spiralsnoet med mindst 1 vending Medicago
" højst seglkrummet 15.
15. Alle støvdragerne sammenvoksede, planten ofte kirteldunet
Ononis
1 fri og 9 sammenvoksede støvdragere 16.
16. Blomsterstanden et smalt aks Melilotus
Blomsterne i et rundt eller forlænget hovede eller
få sammen 17.
17. Bælgen 3-20 gange så lang som bred 18.
" kort, m.m. indesluttet i bægeret Trifolium
18. 2-4 hvide eller lyserøde blomster sammen Trifolium
Gule eller evt. purpuranløbne blomster 19.
19. Flerårig Medicago falcata
Enårig Trigonella
20. Bladene flerfingrede, hjulformede Lupinus
" 3-koblede 21.

21. Akselbladene af form som småbladene, der
derved virker 5-delte 22.
Akselbladene forskellige fra småbladene 24.
22. Stænglen i det mindste forveddet ved grunden Dorycnium
" helt urteagtig 23.
23. Bælgen med oftest 4 vinger Tetragonolobus
" uvinget Lotus
24. Kronen blå eller hvid Psoralea
" gul 25.
25. Store, guldregnsli lignende småblade, 3-7cm Anagyris
Mindre småblade, højst 3 cm lange 26.
26. Bægeret lige afskåret. Tornet busk Calycotome
" tandet eller tolæbet 27.
27. Bægeret regelmæssigt 5-tandet Anthyllis hermanniae
" 2-læbet 28.
28. Bægerets overlæbe med 2 korte tænder Cytisus
" " dybt kløvet 29.
29. Bladundersider, unge grene og bælg sølvhvide .. Argyrolobium
Ikke sølvhvidt filtet 30.
30. Planten tornet Genista
" ikke tornet 31.
31. Blomsterne i 3-8-blomstrede nøgler Teline
" i lange aks Genista ephedroides
32. Bladene ligefinne 33.
" uligefinne 39.
33. Bladskaffet er en torn Astragalus
" er ikke nogen torn 34.
34. Stængler og blade kirteldunede Cicer
" " ikke kirtlede 35.
35. Stænglen vinget, eller bladene ligestrengede Lathyrus
" uvinget og bladene fjerstrengede 36.
36. Alle bægeretænder mindst 2 x røret Lens
Mindst 2 bægeretænder kortere 37.
37. Akselbladene meget større end småbladene Pisum
" ikke " " " 38.
38. Griflen kun dunet på oversiden Lathyrus
" anderledes dunet, eller glat Vicia
39. Bælgen leddelt 40.
Bælgen ikke leddelt 43.
40. Bælgen med ensidige, dybe indskæringer Hippocrepis
" lidet indskåret, m.m. symmetrisk 41.
41. Bælgen stærkt netåret Ornithopus
" ikke " " " 42.
42. Bælgen består af 2-4 skiveformede, småtornede led Hedysarum
" " af flere, aflange, glatte led Coronilla
43. Bladstrengene når den tandede kant 44.
" " ikke kanten 45.
44. Fodfligene frie fra bladstilkene Cicer
" sammenvoksede med bladstilkene Ononis
45. Busk med stor, oppustet bælg på 5-7 cm Colutea
Bælgen ikke oppustet så stærkt 46.
46. Planten m.m. kirtlet Glycyrrhiza
" ikke " " 47.
47. Bælgen med krog i spidsen, sammentrykt Securigera
" anderledes 48.
48. Bælgen flad og skiveformet Hymenocarpus
" forlænget 49.
49. Bælgen lang og savtakket Biserrula
" ikke " " 50.
50. Bælgen lille og kort. Blomsterne oftest i hoveder . Anthyllis
" større og længere. " " i klaser Astragalus

Ceratonia siliqua L. Johannesbrødtræ. Træ eller busk op til 10m.
2-5 par elliptiske til runde, læderagtige småblade, mørkegrønne
ovenpå og bleggrønne nedenunder. Bælgene 10-20cm x 1½-2cm lange.

IX-XI. Sj. Hyppigt dyrket og forvildet.

Acacia. Blomsterne gule eller hvide med talrige støvdragere i aks eller kugleformede hoveder. Blomsterne ligner da mimosernes. Bladene enten dobbeltfinnede eller også reducerede til bladlignende bladstilke (phyllodier). De phyllodiebærende arter kan være svære at skelne fra Eucalyptus, når de ikke har blomster eller bælg, men kan dog kendes ved, at de mangler den nerve lige inden for kanten, som Eucalyptus har.

A. karoo Hayne Bladene dobbeltfinnede, løvfældende. Akselbladene op til 5-10 cm lange torne på ældre grene. Busk på 1-4m. Dyrket på Korsika. (Sydafrika).

A. mearnsii De Wild. Garveakacie. Bladene dobbeltfinnede, stedsegrønne. Akselbladene reducerede. Træ op til 15m. Dyrket. (Austral.)

A. pycnantha Benhtam Bladene phyllodier, bredt seglformede, grønne. Sardinien. (Australien).

A. cyanophylla Lindley Blå akacie. Bladene phyllodier, lige, m.m. blågrønne. Dyrket. (Australien).

Anagyris foetida L. Stinktræ. Stinkende busk op til 4m. Bladene guldgrensagtige. Kronen gul, 18-25mm, fanen meget kortere end køl og vinger, ofte med en sort plet. II-IV. Alm.

Calycotome. Bærggyvel. Tornede buske med gule blomster og 3-koblede blade. Let kendelige ved det lige afskårne bæger.

C. spinosa (L.) Link Tornet bærggyvel. 1½-3m. Blomsterne for det meste enlige. Bælgen m.m. glat. Bladene m.m. glatte ovenpå. IV-V. Alm.

C. villosa (Poirot) Link Håret bærggyvel. 1½-3m. Blomsterne i nøgler på 2-15. Bladoversider og bælg m.m. lādne. IV-V. Alm.

Cytisus villosus Pourret ½-2m. Grenene 5-kantede, dunede mod spidsen. Bladene med en stilk på 2-8mm, næsten glatte ovenpå, lādne nedenunder. Blomsterne 1-3 sammen. Fanen 15-18mm, rødtribet ved grunden. II-IV. Alm.

C. scoparius (L.) Link Alm. gyvel. V-VI. M.sj.

Teline monspessulana (L.) Koch Bredbladet krusbælg. ½-2m. Blade- ne 3-koblede, nogenlunde lige store, hårede på begge sider. Blomsterne i halvskærme på 3-9 blomster fra bladhjørnerne. Fanen glat. IV-V. Alm.

T. linifolia (L.) Webb & Berth. Smalbladet krusbælg. ½-1½m. Blade- ne næsten siddende med m.m. linjeformede småblade. Blomsterne 3-8 sammen i tætte, endestillede klaser. Fanen silkehåret. Iv. Korsika: Forte della Girolata. Forv. i Riviera alla Mortola.

Genista. Visse.

- | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------|
| 1. Planten uden torne | | 2. |
| " tornet | | 3. |
| 2. Bladene enkle | | aetnensis |
| " 3-koblede | | ephedroides |
| 3. Alle eller nedre blade 3-koblede | | 4. |
| Alle blade enkle | | 6. |
| 4. Endestillede torne | | acanthoclada |
| Sidestillede " | | 5. |
| 5. Bladoversiden m.m. glat | | corsica |
| " håret | | morisii |
| 6. Kun endestillede torne | | salzmannii |
| Også sidestillede " | | germanica |

Genista salzmannii DC. 30-70cm. Stærktgrenet, tornet busk. Bladene affaldende. Blomsterne oftest parvise i bladhjørnerne på enden af grenene. IV-VI. 500-1500m. Sj. Lyngheder.

Genista acanthoclada DC. ssp. sardoa (Landi) Valsecchi 30-160cm. Blomsterne enlige eller halvvejs modsatte for enden af grenene. V-VII. Sardinien: La Nurra i NV mellem Capo Caccia og Torre di Bantine. Lokalt alm. 0-100m.

G. corsica (Loisel.) DC. 30-80cm. Stærktgrenet tornebusk. Planten m.m. glat, dog med hårede bladundersider. IV-VI. Alm.

G. morisii Colla 30-70cm. Blødtornet. Småbladene lancetformede, 3-9x2mm, fildede på begge sider. Bægeret 5-6mm, meddudstående hår. Fanen 10mm, purpurtribet. III-IV. Sydsardinien + Is.S.Antioco.

G. germanica L. Tysk visse. 10-40cm. Blomsterne i løse klaser. V-VI. Korsika.

G. ephedroides DC. 30-70cm. Endestillede klaser. Bægeret silkehåret. Kystklipper. 0-600m. V-VI. Sardinien: Gallura, Iglesiasiente.

G. aetnensis (Biv.) DC. 2-6m. Endestillede klaser. Bægeret m.m. glat. 100-2000m. V-VI. Sardinien: Orgosolo, M.di Dorgali, Settefratelli, S.Antioco. Sj.

Spartium junceum L. Spansk gyvel. ½-3m. Kronen 2-2½cm. Blomsterne i løse, mangeblomstrede, endestillede klaser. V-VI. Alm.

Ulex europaeus L. Tornblad. II-V. Korsika. Sj.

Argyrolobium zanonii (Turra) Ball Sølvbælg. 8-25cm, nedliggende, forveddet ved grunden, m.m. sølvhåret. V-VI. Sj.

Lupinus. Lupin.

- | | | |
|---|-------|---------------|
| 1. Kronen gul | | luteus |
| " hvid eller blå | | 2. |
| 2. Bægerets overlæbe svagt 2-tandet | | albus |
| " " tvekløvet | | 3. |
| 3. Kronen 15-17mm. Bælgen 13-20mm bred | | varius |
| " 10-14mm. " højst 12mm bred | | 4. |
| 4. Småbladene linjeformede, 2-5mm brede | | angustifolius |
| " omvendt ægformede, 5-15mm brede | | micranthus |

Lupinus luteus L. Gul lupin. IV-V. Sj.

L. angustifolius L. Smalbladet lupin. Klases blomster spredte. IV-V. 2 underarter:

ssp. angustifolius: 50-80cm. Småbladene 3-4cm x 4-5mm. Sj.

ssp. reticulatus (Desv.) Coutinho: 20-40cm. Småbladene 1-2cm x 2mm. Korsika.

L. micranthus Guss. 10-40cm. Brunhåret. Kronen blå, fanen hvid midtpå, kølen mørkspidset. Nedre blomster spredte, øvre uregelmæssigt kranstillede. IV-V. Sj.

L. albus L. Hvid lupin. Op til 120cm. Kronen hvid. Kølen med lyseblå spids. IV-V. Dyrket og alm. forvildet.

L. varius L. Spraglet lupin. 40-70cm. Kronen blå. Fanen med en hvid og gul eller lyslilla plet. III-IV. Korsika. Sj.

Robinia pseudacacia L. Uægte akacie. V-VI. Forvildet. (Nordamer.)

Colutea arborescens L. Blærebælg. 1-4m. 4-5 par småblade. Kronen 13-17mm. V-VII. Sj.

Astragalus. Astragel.

- | | | |
|-------------------------|-------|-------------|
| 1. Enårig | | 2. |
| Flerårig | | 4. |
| 2. Klasen 1-3-blomstret | | scorpioides |
| " 5-15-blomstret | | 3. |
| 3. Fanen 12-14mm | | boeticus |
| " 7-8mm | | hamosus |
| 4. Bælgen seglkrummet | | 5. |
| " ikke krummet | | 6. |

5. Stænglen udstående langhåret verrucosus
 " tæt, kort, mørkhåret maritimus
6. Uligeformede blade med tornformet skaft 7.
 Ligeformede blade 8.
7. Stivtornet. Kronen hvid massiliensis
 Blødtornet. Kronen gullig sirinicus
8. Kronen 3 mm epiglottis
 Kronen 11-15mm glycyphyllus

Astragalus boeticus L. Kaffeastragal. 10-60cm. Opret. Blade 5-20 cm med 10-15 par småblade. Kronen gul. Bælgen 2-4cm x 7-8mm, med et kroget næb. III-IV. Alm.

A. scorpioides Pourret 5-20cm. Opstigende eller opret. Bladene 3-8cm med 7-8 par småblade. Klasetilken op til 3mm. Kronen blålig eller gullig. Bælgen m.m. krum, med hjerteformet tværsnit og kroget næb. IV-V. Korsika: Algajola. Uddød?

• A. verrucosus Moris 30-100cm. Stænglerne nedliggende, langt blødhårede. 7-12 par småblade. Klaserne 5-8-blomstrede. Kronen lyst rødlig, 16-18mm. Bælgen bredt seglformet, 20-25x10-14mm. Sandstrand. IV-VI. Vestsardinien: Flumentorgiu. Også angivet fra Cagliari og S.Giorgio.

• A. maritimus Moris 20-40cm. Ligner foregående. Bælgen 20-25x4-5 mm. Strandkrat. IV-V. Sardinien: Isola di S.Pietro.

A. epiglottis L. 5-25cm, opstigende. Bladene 2-4cm med 5-10 par småblade. Kronen gul. Bælgen 7-9mm, med en lang spids. III-IV. Udyrkede steder. Sardinien. Sj.

A. hamosus L. Krogastragal. 10-40cm, nedliggende eller opstigende. Kronen gul, 7-8mm. Bælgen 20-50x2-3mm, seglkrummet. III-V. Alm.

A. glycyphyllus L. Sød astragal. V-VII. Korsika. Alm.

A. massiliensis Lam. Ræveskæg. Halvbusk på 20-30cm. Klaserne med 5-8 blomster. Bægeret 5-7mm. IV-V. Forblæst strandkrat. Nordsardinien: Fra Capo Caccia til S.Teresa. Korsika: Bonifacio.

A. sirinicus Ten. Ligner foregående. 10-20cm. Klaserne med op til 15 blomster. Bægeret 6-10mm. VI-VII. som ssp. gennargenteus (Moris) Arcang. Sardinien: Gennargentu. Korsika: Fra M.Cinto til M.di Cagna.

Biserrula pelecinus L. Nedliggende til opstigende enårig, 10-40cm. 7-15 par småblade. Planten håret. 3-9-blomstrede klaser i bladhjørnerne med blå eller bleggule, blåspidsede blomster, 4-6mm. IV-V. Sj.

Glycyrrhiza glabra L. Lakridsplante. 40-100cm. Klæbrig, opret. Bladene 8-12cm med 4-7 par småblade. Klaser fra bladhjørnerne. Kronen lyseblå, 8-12mm. Bælgen glat eller med få kirtelbørster. VI-VII. Sardinien. Sj.

Psoralea bituminosa L. Tjærekløver. 20-50cm flerårig, opret. Blade- ne langstilkede (3-8cm). Blålig blomster i ægformet, langstilket hovede. Planten tjærelugtende. V-VI. Alm.

• P. morisiana Pign. Halvbusk med forveddede, opret-opstigende grene. Lugtløs. Nedre blade omvendt æg-lancetformede, øvre linje-lancetformede. Kronerne hvide. Skyggefulde klipper. 300-1000m. Sardinien: I nordøst på Montalbo hen til Cala Gonone.

Cicer arietinum L. Kikært. Opret enårig, 20-50cm, klæbrig. 3-8 par kraftigt tandede småblade. Enlige blegblå eller hvide blomster. Bælgen 2-3cm x 10-15mm. VI-VIII. Dyrket og forvildet.

Vicia. Vikke.

1. Klasen langstilket, længere end een blomsts længde 2.
 " kortstilket, kortere end een " 18.
2. Bægertænderne ens og bægerrøret lige afskåret 3.
 " uens og " skråt " 6.

3. Kronen 2-5mm. Bælgen tofrøet hirsuta
 " 6-20mm. " 3-6-frøet 4.
4. Kronen 15-20mm bithynica
 " 6-10 mm 5.
5. Enårig. 5-10 bladpar. Kronen hvid leucantha
 Flerårig. 3-6 " " lyserød, purpuråret glauca
6. Kronen 3-9mm. Enårig 7.
 " 10-25mm. 10.
7. Klasen kortere end bladet. Kronen 3-5 mm disperma
 " lig eller længere end bladet. Kronen 5-9mm 8.
8. Småbladene 3-5mm brede. Bægeret dunet pubescens
 " 3-3mm " " m.m. glat 9.
9. Klaserne 2-5-blomstrede, stilken med kort stak tenuissima
 " 1-2- " " uden stak tetrasperma
10. Enårig 11.
 Flerårig 15.
11. Fodfligene uens, den ene linjeformet, den anden stærkt fliget articulata
 Fodfligene ens 12.
12. Fodfligene næsten helt tvedelte calcarata
 " helrandede eller finttandede 13.
13. Kronen lyserød, mørkspidset atropurpurea
 " blålig eller purpurfarvet eller gullig 14.
14. Bælgen 5-6 mm bred. Klaserne 3-10-blomstrede pseudocracca
 " 8-11mm bred. " 10-30- " villosa
15. Kronen hvid, fanen blååret altissima
 " blålig 16.
16. Fanen 12-18mm. Pladen længere end neglen tenuifolia
 Fanen 8-12 mm. Pladen ca. lig neglen 17.
17. Stænglen glat eller svagt, tiltrykt dunet cracca
 " tæt, udstående dunet incana
18. Bladet uden slyngtråd faba
 " med " 19.
19. Kronen gul, undertiden violetanløben 20.
 " ikke gul 21.
20. Fanen dunet på ryggen hybrida
 " glat lutea
21. Bægertænderne ulige store, bægerrøret skråt afskåret 22.
 " ca. lige " " lige " 24.
22. Småbladene 1-2 mm brede, 3-spidsede peregrina
 " 4-40mm " " ikke 3-spidsede 23.
23. Flerårig. 3-6 bladpar sepium
 Enårig. 2-3 bladpar narbonensis
24. Kronen 5-8 mm lathyroides
 " 10-30 mm 25.
25. 1-3 bladpar. Køl og vinger hvidlige bithynica
 4-8 " " Køl og vinger purpurfarvede sativa

Vicia altissima Desf. 60-200cm. Glat. Fodfligene tandede. 5-9 par småblade på 10-25 x 4-9mm. V-VI. Sj.

V. glauca Presl Bladene blågrønne. Planten 10-35cm høj. Bjærgenge. 1500-1950m. V-VI. Sardinien: Siniscola, Oliena, Gennargentu, Ortobene, Asinara. Sj.

V. cracca L. Musevikke. V-VIII. Korsika.

V. incana Gouan Som foregående. 10-22 bladpar. Klaserne med 20-40 blomster. V-VIII. Alm.

V. villosa Roth Sandvikke. III-VI. 2 underarter:
ssp. villosa: Stænglen ladden. Dyrket og forvildet. Sj.
ssp. varia (Host) Corb.: Stænglen glat eller svagt dunet. Alm.

V. pseudocracca Bertol. Ligner villosa, men kronen større: 14-18 mm, gullighvid og ofte m.m. blålig. Sandede steder især ved havet. III-V. Sj.

V. tenuifolia Roth Langklaset vikke. V-VIII.

Vicia atropurpurea Desf. Sortspidset vikke. (V. benghalensis L.) 10-40cm. Enårig eller flerårig. Lådden. Klaserne 2-12-blomstrede. Bægeret tydeligt buget ved grunden. III-VI. Alm.

V. calcarata Desf. (V. monantha Retz.) M.m. glat enårig. 30-60cm. Klaserne 1-2-blomstrede. Kronen 10-15mm, lyst rødlilla. IV-V. Sardinien. Sj.

V. articulata Hornem. Glat. 20-70cm. Klasen 1-2-blomstret. Kronen 8-17mm, hvid eller blegblå, undertiden sortspidset. V-VI. Sard. Sj.

V. leucantha Biv. 30-50cm. Klsen 1-4-blomstret. Kronen 6-9mm, hvid og blååret. III-V. Sardinien. Alm.

V. hirsuta (L.) S.F.Gray Tofrøet vikke. IV-VI. Alm.

V. disperma DC. Ligner foregående, men tænderne uens og kronen blegt rødlilla. III-V. Sj.

V. tenuissima (Bieb.) Sch. & Th. Klaserne 2-5-blomstrede, længere end bladene. Bægertænderne uens. Kronen 6-9mm, blegt rødlilla. III-V. Sardinien. Alm.

V. tetrasperma (L.) Schreber Taddervikke. IV-VI. Sj.

V. pubescens (DC.) Link Ligner foregående. Nedre bægertænder lig eller længere end røret. III-V. Sj.

V. sepium L. Gærdevikke. VI-VII. Sardinien. Sj.

V. sativa L. Fodervikke. III-VI. 6 underarter:
ssp. ampicarpa (Dorthe) A. & Gr.: Ligner ssp. sativa, men med underjordiske stængler, der bærer kronløse blomster og hvide, 1-2-frøede bælg. IV-V. Korsika. Sj.
ssp. sativa: Kronen 18-30mm. Bælgen 6-11 mm bred, indsnøret mellem frøene. Dyrket og forvildet. Alm.
ssp. angustifolia (Grufb.) Gaudin: Smalbladet vikke. Kronen 15-16 mm, fanen omtrent vinkelret opadbøjet. Alm.
ssp. cordata (Wulfen) A. & Gr.: Kronen 18-20mm. Bælgen 4½-6mm bred. En mellemform mellem sativa og angustifolia. Sj.
ssp. segetalis (Thuill.) Gaudin: Kronen 15-17mm, fanen opadbøjet i en vinkel på 45°. Markkruddt. M.alm.
ssp. macrocarpa (Moris) Arcang.: Kronen 22-30mm. Bælgen 8-11mm bred, ikke indsnøret mellem frøene. Alm.

V. lathyroides L. Vårvikke. III-V. Sj.

V. peregrina L. Blomsterne enlige eller 2 sammen, 10-16mm, rød-lilla. III-V. Sardinien. Alm.

V. lutea L. Gul vikke. Stænglen ribbet og næsten firkantet. Blomsterne 1-3 sammen, 20-35mm, bleggule, ofte purpuranløbne. IV-V. Sardinien. Alm. 2 underarter:
ssp. lutea: m.m. glat til tæt dunet. Bælgen hvidhåret.
ssp. vestita (Boiss.) Rouy: Lådden. Bælgen rust- eller rødhåret.

V. hybrida L. Svovlvikke. Blomsterne enlige, 18-30mm, bleggule eller purpuranløbne. III-IV. Alm.

V. bithynica (L.) L. Firbladet vikke. Nedre blade med 1-2 runde bladpar, øvre med 2-3 smallere, elliptiske bladpar. 1-3 blomster sammen, 16-20mm. III-V. Sardinien. Alm.

V. narbonensis L. Nedre blade uden slyngtråd. 1-3 par småblade. Planten dunet, opret. 1-6 blomster sammen, 10-30mm, mørkt purpurfarvede. IV-VI. Alm.

V. faba L. Hestebønne. III-V. Dyrket og lidt forvildet.

Lens. Linse. Ligner Vicia, men med lange bægertænder. Enårig. Bleg-blå eller blegt rødlilla blomst, 4-7mm, 1-3 sammen i langstilket klase.

Lens nigricans (Bieb.) Godr. Vild linse. 10-30 cm. Udstående dunet. 2-5 par småblade, 1-2mm brede. Fodfligene halvt spydformede eller tandede. Klasestilken med stak. Bælgen glat. IV-V: Sj.

L. culinaris Med. Alm. linse. 10-40cm. Udstående dunet. 3-8 par småblade, op til 8mm brede. Fodfligene helrandede. Klasestilken med stak. Bælgen glat. V-VIII. Dyrket og undertiden forvildet.

L. ervoides (Brign.) Grande 10-30cm, tiltrykt dunet. 2-4 par småblade, 1-3mm brede. Fodfligene halvt spydformede eller tandede. Klasestilken uden stak. Bælgen dunet. IV-V. Sardinien. Sj.

Lathyrus. Fladbælg.

1. Bladene med slyngtråd 2.
 " uden " 16.
2. Stænglen trind eller kantet 3.
 " vinget, vingerne mindst ½mm brede 7.
3. Flerårig. 5-10 gule blomster i klase pratensis
 Enårig. Blomsterne enlige 4.
4. Bladene erstattede af spydformede fodflige. Gul blomst aphaca
 " med 1 par småblade. Rød blomst 5.
5. Blomsterstilken uden stak setifolius
 " med " 6.
6. Blomsterstilken ½-2 cm sphaericus
 " 2-7 cm angulatus
7. Flerårig. Klaserne 3-15-blomstrede 8.
 Enårig. " 2-5- " eller blomsterne enlige 9.
8. Øvre blade med 2-3 par småblade heterophyllus
 " " med 1 " " latifolius
9. Nedre blade reducerede til en udfladet bladstilk 10.
 Alle blade med 1, sjældent flere par småblade 12.
10. Kronen gul ochrus
 " rødlilla eller hvidlig 11.
11. Vingerne violette eller rødlilla. Fanen udrandet ... clymenum
 " hvide eller lyserøde. Fanen brodspidset articulatus
12. Kronen gul gorgoni
 " rød, undertiden over i det orange eller hvide 13.
13. Kronen 20-30 mm tingitanus
 " højst 20 mm 14.
14. Bægertænderne omtrent af bægerrørets længde 15.
 " 2-3 x bægerrørets længde cicera
15. Kronen rød med blegblå vinger hirsutus
 " orangerød setifolius
16. Flerårig 17.
 Enårig 18.
17. 2-3 par småblade venetus
 3-6 " " niger
18. 2-3 par småblade saxatilis
 Ingen småblade, men en udfladet, bladstilk nissolia

Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. Minder om Vårfladbælg, men klasen med 7-20 udstående blomster og bælgen kirteldunet. IV-V. Korsika: Alm.

L. niger (L.) Bernh. Sort fladbælg. V-VI. Korsika. Sj.

L. pratensis L. Gul fladbælg. V-VIII. Alm.

L. latifolius L. Havefladbælg. V-VIII. Alm.

L. heterophyllus L. Vingefladbælg. Ligner foregående, men øvre blade med 2-3 par småblade. VI-VIII. Sardinien. Sj.

L. tingitanus L. Fodfligene trekantet-spydformede, 6-12mm. 1-3-blomstrede klaser. Kronen klart rødlilla. IV-V. Sardinien: Iglesias.

L. saxatilis (Vent.) Vis. 10-30cm høj, vikkeligende enårig. Nedre blade omvendt hjerteformede, øvre linje-lancetformede. Enlige 7-8mm bleggule blomster. IV-V. Sardinien: M. Tuttavista.

L. sphaericus Retz. Enblomstret fladbælg. Kronen orangerød, 10-13 mm. Bælgen tydeligt længdestribet, 4-7mm bred. V-VI. Alm.

L. angulatus L. Kronen rødlilla eller blegt blå. Bælgen utydeligt netåret, 3-4mm bred. V-VI. Sj.

L. setifolius L. Kronen orangerød, 8-11mm. Bælgen 7-11 mm bred. IV-VI. Korsika. Sj.

L. cicera L. Kronen rødlilla, 10-14mm. Bælgen med to køle langs ryggen. III-VI. Alm.

L. gorgoni Parl. 30-70cm. Kronen mørkegul med rødåret fane. Marker, udyrkede steder. IV-VI. Sardinien: Cagliari.

L. hirsutus L. Håret fladbælg. Svagt dunet enårig. 2-3-blomstrede klaser. Bælgen rusthåret. IV-VI. Alm.

L. clymenum L. Klatrært. Bladene med bred, udfladet bladstilk og skaft, de nedre uden småblade, de øvre med 2-4 par. Kronen karminrød med violette eller rødlilla vinger. IV-VI. Korsika. Alm.

L. articulatus L. Bladene som hos foregående. IV-VI. Sj.

L. ochrus (L.) DC. Skedefladbælg. Den udfladede bladstilk aflangt ægformet, 1-2cm bred. Øvre blade med 1-2 par småblade. IV-VI. Alm.

L. nissolia L. Græsbladet fladbælg. Den udfladede bladstilk græsagtig, 5-10cm x 4-5mm. 1(-2) langstilkede, karminrøde blomster på 6-7mm. IV-VII. Alm.

L. aphaca L. Bladløs fladbælg. Selve bladet reduceret til en slyngetråd. Akselbladene store, spydformede. Blomsterne gule, oftest enlige, langstilkede, 6-18mm. IV-VI. Alm.

Pisum elatius Bieb. En ært med klaserne 2-3 x længere end fodfligene. Kronen lilla eller purpurfarvet. IV-VI. Alm.

Ononis. Krageklo.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kronen gul | 2. |
| " rød | 9. |
| 2. Flerårig | 3. |
| Enårig | 5. |
| 3. Planten ikke klæbrig | minutissima |
| " klæbrig | 4. |
| 4. Blomsterstandens blade ca. 2 x blomsternes længde | pusilla |
| " " kortere end blomsterne | natrix |
| 5. Bælgen 7-10 gange så lang som bred, knudret | ornithopodioides |
| " bredere og ikke knudret | 6. |
| 6. Blomsterstilkene 2-blomstrede | biflora |
| " 1- " | 7. |
| 7. Kronen lig eller kortere end bageret | 8. |
| " 1½-2 x bageret | variegata |
| 8. Kronen 5 mm. Blomsterstilkens stak 3-4 mm | sicula |
| " 7-9mm. " 6-17 mm | breviflora |
| 9. Flerårig | spinosa |
| Enårig | 10. |
| 10. Alle blade med 1 småblad | 11. |
| Mellemste blade med 3 småblade | 12. |
| 11. Stænglen næsten glat | alba |
| " tæthåret foroven | alopecuroides |
| 12. Stænglen uden kirtelhår | mitissima |
| " kirtelhåret foroven | 13. |
| 13. Småbladene 10-20 mm | diffusa |
| " 5-8 mm | 14. |
| 14. Bægetænderne helrandede | reclinata |
| " udvidede og 3-tandede i spidsen | dentata |

Ononis natrix L. Stærktgrenet dværgbusk, 20-60cm. Kronen ofte med røde eller violette årer. Blomsterne enlige på 2-3cm lange stilke i den tætte klase. IV-VII. 2 underarter:

ssp. natrix: Stænglen langhåret: ½-2mm. Bægetænderne 2½-4 x røret. Alm.

ssp. ramosissima (Desf.) Batt. & Trab.: Stænglen korthåret: 0,2-0,5 mm. Bægetænderne 1½-2½ x røret. Alm.

O. ornithopodioides L. 5-25cm. Klæbrig. Toppens grene 1-2-blomstrede. Let kendelig ved de lange, knudrede bælg. IV-V. Sj.

O. biflora Desf. 10-50cm. Stænglen svagt kirtelhåret. Kronen bleggul eller m.m. rødtligt anløben. Længere end bageret. Bælgen hængende. II-IV. Sardinien. Sj.

O. sicula Guss. 5-20cm. Stænglerne lådne og kirtelhårede. Kronen 5mm, bageret 8-9mm. Bælgen 10-17x2-4mm. III-V. Sardinien: Cagliari.

O. reclinata L. 2-15(-30)cm, nedliggende. Stænglen dunet og klæbrig. Kronen 5-8mm, ofte lidt kortere end bageret. IV-VI. Alm.

O. dentata Solander Ligner den foregående, men de 4 øvre bægetænder 3-spidsede. IV-V. Sardinien: Golfo Aranci. Forsvundet.

O. breviflora DC. (*O. viscosa* L. ssp. br.) 10-20cm. Stænglen grenet fra grunden med 1-2mm lange kirtelbørster. Kronen gul, ofte rødåret. V-VI. Sardinien. Alm.

O. pusilla L. 10-20cm. Småblade 5-13mm. Kronen 5-12mm, oftest af bagerets længde. VI-IX. Sj.

O. minutissima L. 5-30cm, ofte nedliggende og næsten glat. Kronen 8-10mm, kortere end bageret. IV-X. Sj.

O. spinosa L. Strandkrageklo. som ssp. antiquorum (L.) Arcang. V-IX. Tørre steder. Alm.

O. alba Poir. 10-50cm. Småblade 10-45cm. Kronen 12-16mm, lyserød eller hvidlig, 2 x bageret. Stenede tørre. V-VI. Sardinien. Sj.

O. variegata L. 10-30cm. Nedliggende eller opstigende, klæbrig og ofte med påsiddende sandskorn. Bladene med 1 småblad på 5-8mm, der ofte er m.m. seglkrummet og noget sammenfoldet. Kronen 12-14mm. Sandstrand. IV-V. Alm.

O. diffusa Ten. 10-40cm. Nedliggende eller opstigende. Stænglen klæbrig. Grundbladene undertiden finned. Klasen forlænges efter blomstringen. Kronen 9-11mm, lidt længere end bageret. IV-VI. Sj.

O. mitissima L. 15-60cm. Opret eller nedliggende. Blomsterne i en tæt klase. Kronen 10-12mm, længere end bageret. Kystklipper og sandstrand. IV-VI. Sj.

O. alopecuroides L. 10-65 cm. Det enlige småblad 3-5cm. Blomsterne i tætte aksformede klaser. Bageret 12mm, kronen 15mm. IV-VI. Korsika. Sj.

Melilotus. Stenkløver.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Klasen kortere end støttebladet | messanensis |
| " længere " | 2. |
| 2. Vingerne kortere end kølen. Bælgen med koncentriske striber | 3. |
| " længere end eller lig kølen. Bælgen tværbribet eller netåret | 5. |
| 3. Kronen 2½-4 mm | sulcata |
| " 4-8 mm | 4. |
| 4. Kølen kortere end eller lig fanen. Modne bælg sortbrun | infesta |
| " længere end fanen. Modne bælg gul | segetalis |
| 5. Midterste blades fodflige tandede | italica |
| " " " helrandede | 6. |
| 6. Modne frugt opret eller udstående, spidsnæbbet | neapolitana |
| " hængende | 7. |
| 7. Kronen 2-3 mm | indica |
| " 4-7 mm | 8. |
| 8. Kølen kortere end fane og vinger | officinalis |
| " lig fane og vinger | elegans |

Melilotus officinalis (L.) Pallas Markstenkløver. V-VIII. Sardinien. Alm.

M. italica (L.) Lam. Stænglerne kantede. Nedre småblade halv-runde, op til 20x16mm. Klaserne 1½-3cm, i frugt op til 7cm. III-V. Alm.

M. neapolitana Ten. Stænglen svagt kantet, dunet foroven. Nedre blade brede og runde, op til 10x8mm. Klaserne 1 cm, i frugt 4-7 cm. Sandede steder. IV-VI. Alm.

M. indica (L.) All. Nedliggende, opstigende eller opret, oftest 8-20cm. Klaserne 2-3cm. IV-VII. Alm.

M. elegans Salz. Stænglen dunet foroven. Nedre blade op til 16x11mm. Klasen 2-3cm, i frugt 7-10cm. IV-VII. Sj.

M. infesta Guss. Klasen 2-3cm. IV-VI. Korsika. Sj.

M. sulcata Desf. Klasen 1-2cm, oftest med under 25 blomster. IV-VII. Alm.

M. segetalis (Brot.) Ser. Klasen ca. 3cm, 30-50-blomstret. IV-VII. Korsika. Sj.

M. messanensis (L.) All. 15-40cm. Småbladene savtakke. Klaserne 0,7-1cm med 3-10 blomster på 4-5mm. III-V. Sj.

Trigonella. Bukkehorn

1. Bælgen med et næb på 8-20 mm gladiata 2.
- " uden næb
2. Blomsterne med en klasestilk på 1-2 cm maritima
- " i siddende nøgler monspeliaca

Trigonella maritima Delile Strandbukkehorn. 10-20cm, nedliggende, glat. 5-10 blomster nærmest i en skærm med stilke på 1-1½mm. Bælgen 10-16x2-3mm, hængende og noget krum, skævt netåret. Sandstrand. III-V. Sardinien. Sj.

T. monspeliaca L. Stjernebukkehorn. 5-15cm. Tæt tiltrykt dunet. 4-14 blomster i siddende nøgler. Bælgen 7-17x1-1½mm, krum, skævrribbet. Udyrkede steder. Krat. III-VI. Alm.

T. gladiata Steven Sværdbukkehorn. 3-15cm, nedliggende eller opstigende. Blomsterne oftest enlige og siddende. Kronen 8-10mm, bleggul, undertiden purpuranløben. Bælgen 15-40x3-7mm med et næb på 8-20mm. Udyrkede steder. IV-VI. Sardinien. Alm.

Medicago. Sneglebælg.

1. Bælgen nyreformet, højst 3mm lang lupulina 2.
- " forlænget, m.m. spiralsnoet, over 3mm
2. Flerårig 3.
- Enårig 4.
3. Hvidfiltet med gule blomster marina
- M.m. dunet med lilla blomster sativa
4. Fodfligene hele eller med 1-2 svage, grundstillede tænder .. 5.
- " tydeligt tandede eller fligede 6.
5. Kronen 4mm. Klasen ca. af bladets længde minima
- " 2½mm. " 3-4 x " coronata
6. Bælgen uden torne 7.
- " med torne langs randen 15.
7. Fodfligene med trekantede tænder 8.
- " delt i linjeformede flige 9.
8. Bælgen skiveformet rugosa
- " halvkugleformet scutellata
9. Bælgen 10-15mm 10.
- " 4-9 mm 11.
10. Fodfligene 6 mm lange. Kronen 3 mm orbicularis
- " 8-12mm lange. Kronen 7 mm intertexta

11. Kronen 3-4 mm 12.
- " 5-8 mm 14.
12. Klaserne 5-7-blomstrede. Fodfligene 4-9 mm polymorpha
- " 2-3- " 8-15mm 13.
13. Bægertænderne når kronens spids. Fodflige 8-10mm ... aculeata
- " når 2/3 af kronen. " 10-15mm murex
14. Bælgen tangentielt netåret uden randribbe soleirolii
- " med randstillet ribbe og tværrårer tornata
15. Bælgen med korte, trekantede torne 16.
- " lange, smalle torne 20.
16. Bælgen med utydelige tværribber, især langs kanten 17.
- " tydelige tværribber, der løber sammen i en randribbe 19.
17. Den modne bælg med affladede ender tenoreana
- " afrundede " 18.
18. Bælgens kant med en enkelt køl tuberculata
- " 3 køle murex
19. Bælgen cylindrisk eller skiveformet. Fodflige 5mm .. rigidula
- " kugleformet eller elliptisk. Fodflige 8-10mm aculeata
20. Tornenes afstand større end deres længde 21.
- " mindre " " " 22.
21. Klasen længere end bladet. Tornene rette eller svagt krumme litoralis
- Klasen kortere end bladet. Tornene tydeligt krumme rigidula
22. Tornene lange og bløde, børsteformede 23.
- " og kraftige, med fortykket grund 24.
23. Småbladene tandede i spidsen tornata
- " indskårne ca. til midten laciniata
24. Småbladene 8-18mm brede. Fodfligene 8-12mm 25.
- " 1-8 mm " 2-9 mm 27.
25. Småbladene ca. så lange som brede, ofte sortplettede arabica
- " ca. 1½ x så lange som brede, ikke plettede 26.
26. Klasen længere end bladet. Bælgen m.m. glat intertexta
- " kortere " " kirtelhåret ciliaris
27. Bægertænderne når eller overskrider kronen 28.
- " tydeligt kortere end kronen 29.
28. Bægeret 2mm, ca. lig kronen praecox
- " 3-4mm, tydeligt længere end kronen truncatula
29. Kronen 2½mm. Tornene parallelle med bælgens akse ... coronata
- " 4 mm. " udstående polymorpha

Medicago lupulina L. Humlesneglebælg. IV-VII. Alm. M. cupaniana Guss. er en flerårig, lidt anderledes form.

M. sativa L. Lucerne. IV-VII. Alm.

M. marina L. Strandsneglebælg. Nedliggende, 20-50cm. Klaserne næsten hovedformede med 5-12 blomster på 6-8mm. Sandstrand. III-VIII. Alm.

M. orbicularis (L.) Bartal. Glat eller svagt håret. Bælgen linseformet, 10-17mm, dens tværrårer noget sammenløbende. IV-V. Alm.

M. intertexta (L.) Miller Gittersneglebælg. Bælgen kugleformet, 15-18mm, typisk med lange, akseparallelle torne. IV-V. Alm.

M. ciliaris (L.) All. Kirtelsneglebælg. Ligner den foregående, men med kirtelhåret bælg, op til 15-20mm. IV-V. Alm.

M. scutellata (L.) Miller Skjoldsneglebælg. Bælgen 9-18mm, kirteldunet, med mange og tydelige tværrårer og tydeligt kantåre. IV-V. Alm.

M. rugosa Desf. Ribbet sneglebælg. Bælgen 6-10mm, glat. Tværrårerne ikke sammenløbende, stærkt fortykkede mod den stærke randribbe. III-V. Alm.

M. soleirolii Duby Netsneglebælg. 4-8-blomstrede klaser. Bælgen 6-7mm. IV-V. Korsika: Biguglia, Calvi, Aleria. (Indslæbt fra Nordafrika?)

Medicago rigidula (L.) All. Stænglen med dybe længdestriber.
III-VI. Alm.

M. tornata (L.) Miller Valsesneglebælg. Bælgen 5-8mm, flad i begge ender. IV-V. Sj.

M. truncatula Gaertner Fodangelsneglebælg. Bælgen 5-8mm, næsten altid spredt lådden. III-V. Alm.

M. litoralis Rohde Sandsneglebælg. Bælgen 4-6mm, tværråerne næsten rette, næsten kun sammenløbende nær randribben. Sandede steder nær kysten. III-V. Alm.

M. aculeata Willd. Savsneglebælg. Kraftige, dybt furede stængler. Klaserne oftest 1-2-blomstrede. Bægeret 3mm, omtrent lig kronen. III-V. Alm.

M. tuberculata (Retz.) Willd. Knudret sneglebælg. (*M. turbinata* (L.) All.) Ligner foregående, men klasen 1-8-blomstret. Kronen 5-6mm. Bælgen 5-7mm, m.m. cylindrisk, med korte, men tætstillede torne. III-V. Sj.

M. murex Willd. Kærvsneglebælg. Bælgen 5-9mm, oftest med 1-3mm lange torne, men undertiden med korte knuder i stedet for. III-V. Alm.

M. arabica (L.) Hudson Pletsneglebælg. Småbladene oftest med en sort plet. IV-VI. Alm.

M. polymorpha L. (M. hispida Gaertner). Foranderlig sneglebælg. Bælgen 4-10mm med fremtrædende ribber på hver side af kantribben, hvorved kanten bliver 3-kølet. Tornene udgår både fra en randribbe og kantribben og bliver derved dybt furede. Tornene undertiden reducerede. III-V. Alm.

M. praecox DC. Pindsvinesneglebælg. Blomsterne oftest enlige. Bælgertornene krumme. III-IV. Sj.

M. laciniata (L.) Miller Fligsneglebælg. Klaserne 1-2-blomstrede. Bælgen 4-5mm. Tornene krumme. V-VI. Korsika. Sj.

M. coronata (L.) Bartal. Kronsneglebælg. Spinkel dunet, 10-20cm. Fodfligene 2-3mm. Klaserne 3-8-blomstrede. Kantribben udvidet til en flad kant med torne, der er parallelle med akse. Bælgen 2-4mm. IV-V. Korsika: Prunelli.

M. tenoreana Ser. Bælgen 5mm, kort cylindrisk. Tornene korte, næsten rette, parallelle med akse. V-VI. Sardinien. Sj.

M. minima (L.) Bartal. Liden sneglebælg. Planten spredt håret. Bælgen også håret og noget kirtlet. V-VII. Alm.

Trifolium. Kløver

1. Kronen gul 2.
- " hvid, rød eller hvidgul 5.
2. Fanen furet. Kronen 4-7mm 3.
- " ikke furet. Kronen 2-3mm 4.
3. Kronen rent gul, 4-5mm. Hovederne tætte med 20-30 bl. campestre 6.
- " urangegul, 5-7mm. Hovederne med 10-15 blomster patens 10.
4. Øvre blades midtersmåblad tydeligt stilet (1-2mm) dubium 7.
- " " " siddende micranthum 8.
5. Bægeret oppustet ved frugtmødningen 6.
- " ikke " " " 10.
6. Endestillede hoveder 7.
- Sidestillede " 8.
7. Småbladene lancetformede, bredest på midten vesiculosum 9.
- " omv. ægformede, " mod spidsen spumosum 9.
8. Flerårig fragiferum 9.
- Enårig 9.
9. Hovedernes stilke meget kortere end de tilhørende blade tomentosum

Hovedernes stilke omtrent af længde med de tilhørende blade

10. Hovederne 1-5(-7)-blomstrede 11.
- " mangeblomstrede 12.
11. Kronen 6-8 mm. Bælgen 6-8mm, fremragende ornithopodioides 13.
- " 8-14mm subterraneum 13.
12. Planten helt glat 20.
- " håret, i det mindste på bægeretænderne 14.
13. Hovederne siddende 15.
- " stilkede, stilken mindst 5 mm 15.
14. Øvre blade kortstilkede. Kronen lyserød glomeratum 17.
- Alle blade langstilkede. Kronen hvid suffocatum 17.
15. Flerårig repens 16.
- Enårig 16.
16. Kronen ca. 2 x bægeret 17.
- " højst 1½ x bægeret 19.
17. Blomsterstilkene 3-6 mm michelianum 18.
- " kortere 18.
18. Hovederne endestillede. Kronen 9-12 mm isthmocarpum 22.
- " fra bladhjørnerne. Kronen 6-9 mm nigrescens 22.
19. Hovederne kortstilkede. Fodflige finttandede cernuum 21.
- " langstilkede. " helrandede strictum 21.
20. Hovederne siddende langs stænglen 23.
- " stilkede 23.
21. Frugtbægerets tænder oprette eller sammenknæbne bocconeii 22.
- " " m.m. udstående 22.
22. Småbladenes sidenerv rette. Kronen lyserød striatum 24.
- " " krumme. Kronen oftest hvid scabrum 24.
23. Flerårig 24.
- Enårig 26.
24. Bægeret glat medium 25.
- " håret 25.
25. Kronen 10-15mm, rød (sjældent hvid) pratense 27.
- " 15-20mm, oftest hvidgul (sjældent rød) ochroleucum 27.
26. Hovedet forlænget 32.
- " m.m. rundt 32.
27. Kronen kortere end bægeret 28.
- " lig eller længere end bægeret 30.
28. Øvre blade siddende, småbladede 29.
- Alle blade stilkede, bredbladede ligusticum 29.
29. Bægeretænderne længere end røret arvense 31.
- " omtrent lig " phleoides 31.
30. Småbladene 10-25 x så lange som brede angustifolium 31.
- " kun lidt længere end brede 31.
31. Små bladene højst 1 cm. Blomsterstilkene ofte 2-hovede smyrnaeum 32.
- " indtil 2½ cm. Blomsterstilkene ethovede incarnatum 33.
32. Hovederne med svøb af blade eller af disses fodflige 36.
- " uden et sådant svøb 36.
33. Nogle af svøbbladene kun med fodflige 34.
- Alle svøbbladene med småblade 35.
34. Kronen hvidlig, kortere end bægeret cherleri 35.
- " rød, længere end bægeret hirtum 35.
35. Kronen purpurrød, omtrent lig bægeret diffusum 37.
- " hvidlig eller lyserød, 2 x bægeret pallidum 37.
36. Alle blade spredte. Småbladene omv. hjørteformede ... stellatum 37.
- Øvre " modsatte. " smallere 37.
37. Kronen 2 x bægeret, lyserød squamosum 38.
- " omtrent lig bægeret 38.
38. Nedre bægeretand 2 x de andre squarrosum 39.
- " " lig de andre 39.
39. Stænglerne m.m. glatte lappaceum 39.
- " udstående hårede leucanthum 39.

Trifolium ornithopodioides L. Spædt bukkehorn. 5-10cm, nedliggende. Blomsterne 2-4 sammen, hvide eller lyserøde. V-VI. M.sj. Sardinien: Maddalena. Korsika: Bastia.

T. strictum L. Rank kløver. 3-15cm, opret eller opstigende. Småbladene linjeformede til aflangt elliptiske. Bladribberne ender i stilkede kirtler. Hovederne 7-10mm. Kronen lyserød. V-VI. Sj.

T. repens L. Hvidkløver. IV-X. M.alm. 2 underarter:

ssp. repens: Bladstilkene glatte.

ssp. prostratum Nyman: Bladstilkene tæthårede. Erstatte foregående underart i tørre områder.

T. isthmocarpum Brot. 5-60cm. Hovederne tætte, 15-25mm. Kronen 9-12mm, lyserød. Bælgen aflang, indsnøret mellem de to frø. IV-V. Korsika. M.sj.

T. nigrescens Viv. 5-40cm. Ligner Hvidkløver, men enårig. Bælgen indsnøret mellem de godt 4 frø. III-VI. Alm.

T. michelianum Savi Hovederne 20-25mm, løse, mangeblomstrede. Bægeret ca. 5mm, tænderne sylformede, 3-4 x røret. Kronen lyserød. Fugtige enge. V-VI. Sj.

T. cernuum Brot. Blomsterstilkene ca. 2mm, af bægerets længde og nedadbøjede i frugt. Kronen lyserød, 4-5mm. V-VII. Sydkorsika. Sj.

T. glomeratum L. Bægeret netåret, tænderne kortere end røret, udstående. Kronen lyserød, 4-5mm. IV-VI. Sj.

T. suffocatum L. Hovederne 5-6mm. Kronen hvid eller lyserødt anløben. Bægeretænderne af rørets længde, krumme. IV-V. Sj.

T. spumosum L. Frugtbægeret pæreformet opblæst, stærkt netåret. Kronen lyserød, lidt længere end bægeretænderne. IV-V. Sj.

T. vesiculosum Savi Bladene med fint brodspidsede tænder. Bægeret netåret. Kronen hvid, efterhånden lyserød, $1\frac{1}{2}$ -2 x bægeret. IV-VI. Korsika. Sj.

T. fragiferum L. Jordbærkløver. IV-VIII. Alm.

T. resupinatum L. Omvendt kløver. Bægeret svagt dunet til filtet, kronet af 2 udstående-oprette bægeretænder. Kronen omvendt med fænen nedad. IV-VII. Alm.

T. tomentosum L. Bægeret uldhåret. De to bægeretænder meget korte. Kronen omvendt som hos foregående. IV-VI. Sj.

T. patens Schreber Guldkløver. Opret eller opstigende. Småblade op til 18mm, smalt elliptisk til omvægformede. Hovederne 9-12mm. Fugtige enge. VI-VII. Korsika. Sj.

T. campestre Schreber Gul kløver. IV-VIII. Alm.

T. dubium Sibth. Fin kløver. V-IX. Sj.

T. micranthum Viv. Spæd kløver. 2-10cm. Hovederne 1-6-blomstrede med forholdsvis lange blomsterstilke. V-IX. Sj.

T. striatum L. Stribet kløver. IV-VII. Sj.

T. arvense L. Harekløver. IV-VI. Alm.

T. bocconeii Savi Hovederne 9-15mm, tætte, cylindriske eller kegleformede, de endestillede ofte parrede, men uens. Kronen blegrød, af bægerets længde. IV-VII. Alm.

T. phleoides Pourret Minder om Harekløver, men med få hoveder, oftest 1-2 pr. stængel. IV-VI. Alm.

T. ligusticum Balbis Stænglen mørkegrøn med spredte, udstående hår. Hovederne ofte parrede med eet kort- og eet langstilket. IV-VI. Alm.

T. scabrum L. Ru kløver. Minder om Stribet kløver, men bægeretænderne stikkende. IV-VI. Alm.

T. stellatum L. Stjernekløver. 8-20cm. Stænglen tæt, udstående håret. Hovederne ca. 15mm under blomstringen. Bægeret 5 mm, tænderne 7mm, udstående i frugt. IV-VI. Alm.

T. incarnatum L. Blodkløver. IV-VI. 2 underarter:

ssp. incarnatum: Opret. Kronen blodrød. Dyrket og forvildet.

ssp. molinerii (Balbis) Syme: Opstigende. Kronen gullighvid eller blegrød. Alm.

T. pratense L. Rødkløver. I-XII. M.alm.

T. pallidum L. Ligner en enårig udgave af foregående. Kronen hvidlig eller blagrød. IV-VII. Korsika. Sj.

T. diffusum Ehrh. Ligner en enårig rødkløver. V-VII. Sj.

T. lappaceum L. Burrekløver. Oftest enlige, endestillede hoveder på $1\frac{1}{2}$ cm. Bægeret fotet glat, tænderne lange, trådformede og hårde foroven. IV-V. Alm.

T. hirtum All. Stænglen udstående håret. Hovedet med svøb af fodflige og oftest 1 helt blad. Bægeret låddent. V-VI. Korsika.

T. cherleri L. Svøbkløver. De svøbdannende fodflige store og iøjnefaldende. 5-15cm, nedliggende. III-V. Alm.

T. medium L. Bugtet kløver. Korsika.

T. angustifolium L. 10-50cm, opret, tiltrykt dunet. Det endestillede hovede forlænget, 2-8cm. Kronen blegrød, omtrent lig bægeret. IV-VII. Alm.

T. smyrnaeum Boiss. 5-20cm, blødt gråhåret. Hovederne ægformede eller cylindriske, ofte parrede, med et blad nedenunder sig. Bægeretænderne uens, 4 korte og 1 lang. Kronen blegrød. V-VI. Korsika. Sj.

T. ochroleucum Hudson Bleggul kløver. Vækst som en hvidgul, Bugtet kløver, omend med lidt bredere blade. V-VI. Sj.

T. leucanthum Bieb. 15-30cm, tæt, udstående håret. Hovederne langstilkede, ofte to og to. Hovederne hvidhårede forneden. IV-V. Sj.

T. squamosum L. Pigget kløver. (T. maritimum Hudson). 10-40cm, opret eller nedliggende. Bægeretænderne udspærrede og fortykkede i frugt, tornede. Især enge langs kysten. IV-V. Sj.

T. squarrosum L. 20-80cm. Opret. Nedre bægeretand 2 x de andre, nedadrettet i frugt. IV-VI. Alm.

T. subterraneum L. Ankerkløver. 3-20cm, nedliggende. Oftest med langstilkede blade. Blomsterne 1-få sammen, hvidlige, omgivne af golde bægre. IV-VI. Alm.

Dorycnium. Hanefod. Blomsten hvid eller lyserød med en mørk køl.

1. Kronen 13-16mm hirsutum 2.

" 3-7mm rectum

2. Bladstilken 5-10mm pentaphyllum

Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 20-40cm. Flerårig urt eller lav busk med tæthårede stængler. Bladene også hårde med meget kort bladstilk. 5-10 hvide eller lyserøde blomster i løse hoveder. V-VI. Alm.

D. rectum (L.) Ser. 30-150cm. Tiltrykt dunet. Hovederne med 15-30 hvide eller blegrøde blomster. Grøfter. Sumpe. IV-V. Sj.

D. pentaphyllum Scop. ssp. herbaceum (Vill.) Rouy 10-30cm. De smalt omvægformede blade giver planten et snerrelignende præg. 15-25 blomster i små, langstilkede hoveder. Kronen 3-5mm. V-VII. Alm.

Lotus. Kællingetand.

1. Flerårig 2.
Enårig 6.
2. Bægeret tolæbet med korte sidetænder *cytisoides*
Bægertænderne nogenlunde lige lange 3.
3. Øvre småblade smalle, 4-8 x længere end brede *tenuis*
" " bredere 4.
4. Planten 5-10 cm. Hovederne 1-3-blomstrede *alpinus*
" oftest over 10 cm. Hovederne 2-12-blomstrede 5.
5. Stænglen marvfyldt. Hovederne 2-7-blomstrede *corniculatus*
" hul. Hovederne 5-12-blomstrede *uliginosus*
6. Bægeret tolæbet med korte sidetænder *ornithopodioides*
Bægertænderne nogenlunde lige store 7.
7. Bægertænderne 3-4 x røret *parviflorus*
" højst $1\frac{1}{2}$ x røret 8.
8. Bælgen 4-8mm bred og tyk, med furet ryg *edulis*
" 1-2mm bred, uden fure 9.
9. Bælgen 2-3 x bægeret, 10-16 mm *subbiflorus*
" over 3 x bægeret, 15-60mm 10.
10. Kronen hvid eller bleggrød med violet køl *conimbricensis*
" gul *angustissimus*

Lotus tenuis Waldst. & Kit. Smalbladet kællingetand. V-VIII. Sj.

L. corniculatus L. Alm. kællingetand. IV-IX. Alm.

L. alpinus (DC.) Schleicher Småblade 2-6x $1\frac{1}{2}$ -4mm. Kronen 12-18mm. 1800-2700m. VII-VIII. Sardinien.

L. uliginosus Schkuhr Sumpkællingetand. V-VII. Sj.

L. parviflorus Desf. Lådden plante op til 40cm. Hovederne 3-7-blomstrede, deres stilke krumme i frugt. Bælgen omtrent af bægerets længde. Sandede og udyrkede steder. IV-VI. Sj.

L. subbiflorus Lag. Tæthåret. Hovederne 2-4-blomstrede. IV-V. Sj.

L. angustissimus L. 10-50cm. Nedliggende. Hovederne (1-)2-3-blomstrede. Fugtige enge, flodbredder. IV-VI. Alm.

L. edulis L. 10-40cm. Let kendelig ved sin tykke bælg. II-V. Alm.

L. conimbricensis Brot. Bælgen 20-60x1-2mm, seglkrummet. Fugtige steder. IV-VI. Sj.

L. cytisoides L. 5-20cm, noget forveddet. Bladene let kødede, gråfiltede. Kølen med purpurfarvet næb. Kystklipper og grus. IV-VI. Lokalt alm.

L. ornithopodioides L. Blomsterne 2-5 sammen. Bælgene 2-3cm, let krumme og knudrede. IV-V. Alm.

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth Kantbælg. V-VII. Sj.

T. purpureus Moench Rød kantbælg. Blomster mørkerød. Bælgens 4 vinger 2-4mm brede og krusede. IV-V. Sardinien. Alm.

Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi Skjoldbælg. Enårig op til 30 cm. Nedre blade enkle, øvre med 2-3 par mindre småblade. Bælgen 10-15mm, rundt nyre-skiveformet. Kronen 5-7mm, gul. III-V. Sj.

Securigera securidaca (L.) Deg. & Dörf. Hagebælg. Enårig, 30-100 cm. 4-7 par småblade. Hovederne langstilkede, med 4-8 gule blomster. Bælgen 5-10cm, sammentrykt, med fortykket rand, tilspidset i et m.m. hageformet ombojet næb på 1-3cm. IV-VI. Korsika. Alm.

Anthyllis. Rundbælg.

1. Busk med forveddede grene 2.
Urt 3.

2. Grenene tornede. Bladene enkle eller 3-koblede *hermanniae*
Ikke tornet. Bladene uligefinnede *barba-jovis*
3. Kronen 4-5 mm, lyserød *gerardi*
" større, ikke lyserød 4.
4. Bladene usymmetrisk finned. Bægertænderne ens ... *tetraphylla*
" symmetrisk " " uens *vulneraria*

Anthyllis hermanniae L. Tornet rundbælg. Busk op til 50cm med vredne grene med tornede ender. Bladene 10-13mm. Blomsterne 1-3 sammen i bladhjørnerne i en mellembudt klase. V-VII. Sj.

A. barba-jovis L. Jupiterskæg. Busk op til 90cm. Bladene med 6-9 par småblade med sølvhvide undersider. Endestillede hoveder med oftest over 10 blomster. Tørre kystklipper. IV-V. Sj.

A. gerardi L. Lyserød rundbælg. Flerårig, 20-60cm. 2-5 par ens, smalle småblade. Hovederne små, 1cm, langstilkede, med lyserøde blomster. V-VI. Sj.

A. vulneraria L. Alm. rundbælg. V-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. praepropera (Kerner) Bornm.: Nedre stængelblade med 1 stort endesmåblad og få, små sidesmåblade. Begge øer.
ssp. weldeniana (Rchb.) Cullen: Nedre stængelblade med 3-5 par forholdsvis ens småblade. Korsika. Sj.

A. tetraphylla L. Blærerundbælg. Enårig, 7-35cm, nedliggende. Ofte tilsyneladende kun 4 småblade. Bægeret oppustet i frugt, op til 12mm bredt, ofte rødspidset. Blomsterne i akselstillede nøgler på 4-8. III-V. Sj.

Ornithopus. Fugleklo. Enårige.

1. Kronen hvid eller lyserød *perpusillus*
" gul 2.
2. Øvre blade siddende *compressus*
Alle blade stilkede *pinnatus*

Ornithopus compressus L. 3-30cm. Hovederne 3-5-blomstrede med et finnet højblad. Bælgen 2-5cm, krum, m.m. fladtrykt, med et krumt næb på 7mm eller mere. 7-18 par småblade. IV-VI. Alm.

O. perpusillus L. Liden fugleklo. V-VI. Sj.

O. pinnatus (Miller) Druce 3-7 par småblade. Hovederne med 1-5 blomster, uden egentlige højblade. Bælgen 2-3 $\frac{1}{2}$ cm, krum og trind, med et næb på højst 5mm. IV-VI. Sj.

Coronilla emerus L. Perlebælg. Lille busk op til 120(-200)cm. 2-4 par småblade. Kronen 14-20mm. 3-4 blomster sammen. Bælgen 5-11cm, hængende. IV-VI. Korsika. Alm.

C. valentina L. 30-70cm. Bladene stedsegrønne og blågrønne. 4-12 blomster i langstilkede hoveder. Kronen 8-12mm. I-V. 2 underarter:
ssp. valentina: 3-8 par småblade. Bælgen oftest over 2cm, med 4-8 led. Korsika. Sj.

ssp. glauca (L.) Batt.: 2-3 par småblade. Bælgen oftest under 2 cm, med 1-3 led. Sardinien. Sj.

C. scorpioides (L.) Koch Skorpionsvikke. 5-20cm. Enårig. Bladene enkle eller 3-koblede med to runde sidesmåblade og et stort elliptisk endesmåblad. 2-3-blomstrede hoveder fra bladhjørnerne. Bælgene krumme. IV-V. Alm.

Hippocrepis. Hestesko.

1. Flerårig. Hovederne 5-12-blomstrede 2.
Enårig. Hovederne 2-5-blomstrede eller blomsterne enlige 3.
2. Bælgen med rødbrune papiller *comosa*
" med hvide " *glauca*
3. Blomsterne enlige *unisiliquosa*
" 2-5 sammen i stilkede hoveder 4.

4. Bælgen glat multisiliquosa
" med lange papiller på frøstykkerne ciliata

Hippocrepis glauca Ten. Blågrøn hestesko. 5-20cm, opstigende. 4-7 par småblade, der er tæt hviddunede på undersiden. Hovedernes stilke 3-6 gange det tilhørende blads længde. Tørre enge. V-VII. Sardinien: Monti di Oliena. Sj.

H. comosa L. Alm. hestesko. 5-20cm. Ligner foregående, men hovedstilkene $1\frac{1}{2}$ -4 x det tilhørende blad. Tørre enge. Sardinien. Alm. V-VIII.

H. ciliata Willd. Børstehestesko. Kronen 3-5mm. III-V. Alm.

H. multisiliquosa L. Flerblomstret hestesko. Kronen 5-8mm. III-V. Alm.

H. unisiliquosa L. Blomsterstilkene indtil 5mm. III-V. Alm.

Scorpiurus. Skorpionshale. Enårig med enkle, m.m. spatelformede blade. Blomsterne gule, med brunåret fane, i langstilkede hoveder på 1-5 blomster. Bælgen cylindrisk, uregelmæssigt snoet, med længderibber og oftest med torne eller knuder.

S. muricatus L. Hovederne med 2-5 blomster. Bælgen glat eller med knuder eller torne. IV-V. Alm.

S. vermiculatus L. Blomsterne enlige, sjældent 2 sammen. Bælgen med paddehatsformede knuder. IV. Sardinien: Paulilatino. Korsika?

Hedysarum. Hanekløver. Kronen rød eller hvid.

1. Flerårig. Klasen med 10-35 blomster coronarium
Enårig. Klasen med 2-10 blomster 2.
2. Kronen 8-11mm, $1\frac{1}{2}$ -2 x bægeret spinosissimum
" 14-20mm, $2\frac{1}{2}$ -5 x " glomeratum

Hedysarum coronarium L. 3-10dm, nedliggende-opstigende. 3-5 par elliptiske småblade. Blomsterne rødlilla, 12-15mm, på opstigende, oprette stilke i en 3-8cm lang klase. Bælgen 2-4-leddet. IV-V. Alm.

H. spinosissimum L. 10-30cm, nedliggende. 4-8 par småblade. Kronen hvid eller bleg rød. Bælgen 2-4-leddet med krogede torne. IV-V. Sj.

H. glomeratum Dietrich 10-30cm, nedliggende. 8-10 par småblade. Kronen hvidrød eller rødlilla. Blomsterne i hoveder på 3 cm. III-V. Sj.

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L. Nedliggende surkløver. Planten nedliggende og ofte violet anløben. Blomsterne små og gule. IV-VI. Alm.

O. stricta L. Stiv surkløver. Opret. Små gule blomster. Frugtstilkene nedadbøjede med oprette kapsler. IV-X. Sardinien.

O. fontana Bunge Rank surkløver. Opret. Små, gule blomster. Frugtstilkene udadrettede med oprette kapsler. V-X. Korsika. Alm.

O. acetosella L. Skovsyre. IV-VI. Korsika. Alm.

O. pes-caprae L. Svovlgul surkløver. Blade og skærmstilke udgår fra en underjordisk stængel. Skærmene med 5-12 store, svovlgule blomster på 20-22mm. XI-V. M.alm.

GERANIACEAE

Geranium. Storkenæb.

1. Flerårig 2.
En- eller toårig 4.
2. Blomsterne enlige sanguineum
" 2 sammen 3.

3. De 5 bladafsnit hele, tandede nodosum
Bladafsnittene 2 x fjerdedelte tuberosum
4. Bægeret opret under blomstringen 5.
" m.m. udstående 7.
5. Bladets omrids rundt lucidum
" " femkantet 6.
6. Kronen 11-12mm. Planten m.m. glat robertianum
" 5-9 mm. Planten udstående langhåret purpureum
7. Bægerbladet langt brodspidset 8.
" kort " 10.
8. Blomsten 15 mm bred, blålilla lanuginosum
" højst 10mm bred, rødlilla 9.
9. Blomsterstilken 5 mm, i frugt 15mm dissectum
" 2-4cm columbinum
10. Kronbladene hele rotundifolium
" kløvede 11.
11. Kronen 2 x bægeret pyrenaicum
" ca. lig bægeret 12.
12. Stængler og bladstilke med korte, ens hår pusillum
" " med lange og korte hår molle

Geranium sanguineum L. Blodrødt storkenæb. V-X. Korsika. Alm.

G. nodosum L. Knudret storkenæb. 20-30cm. Kronbladene 15-16mm, lyserøde eller lyst rødlilla med mørkere årer. . Løvskov. VI-VIII. Korsika. Sj.

G. tuberosum L. Knoldstorkenæb. 20-50cm. Kronbladene rødlilla, 8-13mm, kløvede. II-V. Vinmarker, olivenlunde. Sardinien. Sj.

G. lanuginosum Lam. Brandstorkenæb. 10-30cm. Kronblade $7\frac{1}{2}$ mm med hvid grund. Skov. 500-1000m. V-VII. Alm.

G. pyrenaicum Burm.f. Pyrenæisk storkenæb. IV-VII. Korsika. Alm.

G. rotundifolium L. Rundbladet storkenæb. Bladet rundt, 25-40% indskåret. V-X. Alm.

G. molle L. Blødt storkenæb. III-IX. Alm.

G. pusillum L. Lidet storkenæb. V-X. Sj.

G. columbinum L. Storbægret storkenæb. III-X. Alm.

G. dissectum L. Kløftet storkenæb. IV-IX. Alm.

G. lucidum L. Skinnende storkenæb. Planten skinnende, m.m. glat. IV-IX. Alm.

G. robertianum L. Stinkende storkenæb. V-X. Alm., især i bjærgene.

G. purpureum Vill. Purpurstorkenæb. Blomsterne stærkere rødlilla end hos foregående. Planten mindre. IV-XI. Alm.

Erodium. Hejrenæb.

1. Grundbladene ikke helt snitdelte 2.
" fjersnitdelte helt til skafet 10.
2. Flerårig 3.
En- eller toårig 4.
3. Næbbet 1- $1\frac{1}{2}$ cm corsicum
" 3-4 cm chium
4. Skærmene med 2 brede højblade laciniatum
" 3-flere " 5.
5. Kronbladene 3mm. Næbbet 1 cm maritimum
" 5-25mm. Næbbet 1-11 cm 6.
6. Frugten 3-6mm med et næb på 1- $4\frac{1}{2}$ cm 7.
" 8-15mm " " " 5-11cm 9.
7. Frugtens topgrube med en dyb fure under sig malacoides
" " uden fure 8.
8. Næbbet 3-4 cm chium
" 1-2 cm alnifolium

9. Kronen 15-25mm, længere end bægeret botrys
 " 8-9mm, omtrent lig bægeret ciconium
10. Ingen bladstængel acaule
 Med " " 11.
11. Små lapper på stilkene mellem bladafsnittene ciconium
 Ingen " " " 12.
12. Bladafsnittene højst 50% indskårne moschatum
 " dybt delte 13.
13. Frugten med tydelig fure under topgruben 14.
 " uden fure bipinnatum
14. Næbbet 4-7cm. Frugtens hår sidder på sorte knuder jacquinianum
 " 1-4cm. Frugten uden sorte knuder cicutarium

• *Erodium corsicum* Léman Op til 25cm. Bladene rundtakket-tandede, de nedre hele, de øvre undertiden fjerkløvede. Kronbladene 5-10mm, hvide eller lyserøde med violette årer. Kystklipper. IV-X. Nordsardinien. Syd- og Vestkorsika og mindre omgivende øer. Bocche di Bonifacio. Sj.

E. maritimum (L.) L'Hér. 10-20cm, håret. Bladene bredt ægformede, buttandede eller lappede. Kronen 3mm, lyserød eller hvid, kortere end bægeret. Blomsterne oftest enlige på 2-3cm lange stilke. Tørre steder, mest nær kysten. III-VIII. Alm.

E. alnifolium Guss. 10-50cm. Nedre blade m.m. runde, øvre ægformede, lidt delte. Kronen blegrød, af bægerets længde, 6mm. III-VI. Sardinien. Sj.

E. chium (L.) Willd. 5-50cm. Bladene ægformede, meget forskelligt indskårne. Kronblade 5-9mm, rødlilla, lidt længere end bægeret. II-V. Alm.

E. laciniatum (Cav.) Willd. 7-50cm. Bladene aflange til bredt ægformede, meget forskelligt indskårne: fra udelte og savtakkede til næsten 2 x fjerdelte. Bægeret 7mm. Kronen 7-10mm. III-V. Sandstrand. Korsika: Bastia. Sydsardinien.

E. malacoides (L.) L'Hér. 10-60cm. Bladene oftest ægformede med hjerteformet grund, tandede, oftest svagt 3-lappede, nogle gange mere delte. Bæger 5-7mm. Kronen 5-9mm. II-XI. Alm.

E. botrys (Cav.) Bertol. 5-40cm. Nedre blade ægformede fra fjerlappede til 1-2 x fjerfligede. De øvre ofte 2 x fligede. Kronen blålilla. IV-V. Alm.

E. ciconium (L.) L'Hér. Mellembredt hejrenøb. Bægeret 10-12mm. Kronen 7-8mm, blå eller blålilla. Frugterne med mange hvide hår. Næbbet 6-10cm. III-V. Alm.

E. moschatum (L.) L'Hér. Moskushejrenøb. Moskuslugtende. Kronen 13-14mm, rødlilla. Frugterne med udstående, brune eller hvide hår. Næbbet 2-4½cm. I-V. Alm.

E. cicutarium (L.) L'Hér. Alm. hejrenøb. III-XI. M.alm.

E. jacquinianum Fisch. & al. (*E. cicutarium* ssp. j.) Ofte tæt kirtelhåret. Småbladene dybt delte. Sandede steder nær kysten.

E. bipinnatum Willd. (*E. cicutarium* ssp. b.) Ofte tæt kirtelhåret. Småbladene dybt delte. Klitter. Korsika: Pero. Sardinien?

ZYGOPHYLLACEAE

Peganum harmala L. Hermelrude. Flerårig 30-60cm. Stænglerne kantede foroven, stærkt grenede. Bladene spredte, uregelmæssigt fjer-snitdelte med linjeformede afsnit, lidt kødede. Blomsterne enlige, endestillede. Bægerblade linjeformede, 7-10mm. Kronblade hvidgrønne, 10mm. 15 støvdragere. 1 griffel. Frugten en stilket, kuglerund kapsel, 7-10mm. Tørre steder. Vejkanten. V-VI. Sardinien. Sj.

Zygophyllum fabago L. Dobbeltblad. Opret, glat, flerårig, 60-100 cm. Bladene modsatte og består af 1 paromvendt ægformede, noget kødede småblade. Skaffet danner et kort fremspring mellem småbladene. Blomsterne enlige i bladhjørnerne. Bægeret elliptisk, 5-6mm, bredt hvidkantet. Kronbladene 6mm, flødefarvede med orange farvet grund. 10 støvdragere. Frugten en hængende, aflangt cylindrisk kapsel på 2-3½cm med vingede kanter. Forvildet på Sardinien ved Cagliari. V-VIII. Udyrkede steder.

Tribulus terrester L. Korstorn. 10-60cm dunet, nedliggende enårig. Bladene modsatte, ligefinnede med 5-8 par småblade. Stilkede, gule blomster fra bladhjørnerne. Kronen 4mm. Frugten tornet, kan minde om et femtakket malteserkors. V-X. Alm. Sandede steder.

LINACEAE

Linum. Hør.

1. Alle blade modsatte. Kronen hvid catharticum
 Øvre blade spredte. Kronen ikke hvid 2.
2. Kronen gul 3.
 " ikke gul 5.
3. Flerårig maritimum
 Enårig 4.
4. Bladranden glat trigynum
 " ru strictum
5. Kronen rød, lyserød eller næsten hvid 6.
 " blå 7.
6. Enårig. Bægeret ikke kirtelrandhåret decumbens
 Flerårig. Bægeret kirtelrandhåret. tenuifolium
7. Kronbladene 25-40 mm narbonense
 " 10-25 mm 8.
8. Kapslen 5-6½ mm. Toårig eller flerårig bienne
 " 6-9 mm. Enårig usitatissimum

Linum narbonense L. Storblomstret hør. 40-60cm. Let kendelig ved sine store blå blomster. VI-VII. Korsika. Sj.

L. decumbens Desf. Rosenhør. 10-25cm, blågrøn, opstigende. Bægerblade 7-9mm, med bred hindekant forneden og randhårede foroven. Kronblade 13-16mm, røde eller lyserøde med hvid grund. IV-V. Sardinien. Alm.

L. bienne Miller Toårig hør. Bladene linjeformede. V-VII. Sj.

L. usitatissimum L. Alm. hør. V-VII. Dyrket og forvildet.

L. maritimum L. 10-40cm. Opret eller opstigende. Bægerblade 3mm, kirtelrandhårede. Kronblade gule, 8-12mm. VI-IX. Strandenge. Sj.

L. trigynum L. 9-16cm. Opret og grenet. Bladene linjeformede. Bægerblade 5mm, kortkirtlede. Kronen 6mm. III-V. Alm.

L. strictum L. Rubladet hør. 10-60cm. Bladene linje-lancetformede. Bægeret 4-6mm, kirtelhåret langs randen. Kronen 6-12mm. IV-V. Alm.

L. tenuifolium L. 20-40cm, opstigende, med forveddet grund. Bladene linjeformede, tætsiddende på de golde skud. Bægeret 6mm, kirtelrandhåret. Kronen 15mm, lyserød eller næsten hvid. V-IX. Alm.

L. catharticum L. Vild hør. V-VII. Korsika. Alm.

Radiola linoides Roth Tusindfrø. VI-IX. Sj.

EUPHORBACEAE

Chrozophora tinctoria (L.) Juss. Lakmusplante. Enårig, 10-30cm høj, nærmest mældeagtig plante, der er tæt stjernefiltet. Frugten dog tydeligt tretallig, tæt dækket af skjoldformede hår. Bladene æg- til rudeformede, grågrønne. VI-VIII. Alm.

Mercurialis. Bingelurt.

- | | |
|--|----------|
| 1. Flerårig | 2. |
| Enårig | 3. |
| 2. Blade 2-4cm. Stænglen forveddet ved grunden | corsica |
| " 2-8cm. " ikke " " " | perennis |
| 3. Tvebo. Bladene spidsvinklet tandede | annua |
| Enbo. " retvinklet " " | ambigua |

Mercurialis annua L. Enårig bingelurt. 10-50cm. Glat eller svagt håret, oftest opret og grenet plante. Bladene 1½-5cm, bredt lancetformede, afrundet savtakke. Hanaksene oprette. I-XII. Alm.

M. ambigua L.f. Ligner foregående, men oftest gulgrøn. III-VI. Alm.

M. perennis L. Skovbingelurt. IV-VI. Korsika. Sj.

M. corsica Cosson Hanblomsterne i langstilkede nøgler. Klipper, mure, skygefulde, fugtige steder. III-IX. Korsika: Alm. Sardinien: Fra Siniscola til Iglesias.

Ricinus communis L. Kristpalme. Enårig eller busk op til 4m. Store, stjerneformede blade med 5-9 takker, 20-30 cm brede. Blomsterne i smalle, oprette toppe. Frugterne 1-2cm, runde og småpiggede. VII-X. Sj. forvildet.

Euphorbia. Vortemælk.

- | | |
|---|----------------|
| 1. Stængelblade modsatte | 2. |
| " spredte | 6. |
| 2. Stænglen opret med 4-radet stillede blade på 3-12cm . | lathyrus |
| " nedliggende til opstigende. Bladene højst 13mm | 3. |
| 3. Bladstilken 2-3mm. Kapslen 4-5mm | peplis |
| " ½-1mm. " 1-2mm | 4. |
| 4. Kapslen glat. Frøene glatte | humifusa |
| " håret. " rynkede | 5. |
| 5. Kapslen med tiltrykte hår | maculata |
| " " udstående " | chamaesyce |
| 6. Kirtlerne halvmåneformede eller med to horn | 7. |
| " m.m. afrundede | 21. |
| 7. Højbladene sammenvoksede ved grunden | 8. |
| " indbyrdes frie | 9. |
| 8. Kapslen glat | semiperfoliata |
| " håret | characias |
| 9. Enårig | 10. |
| Flerårig | 13. |
| 10. Bladene m.m. linjeformede, 1-2mm brede | 11. |
| " bredere | 12. |
| 11. Højbladene linjeformede | exigua |
| " æg-rudeformede | aleppica |
| 12. Kapslen med 2 vinger på hver klap | peplus |
| " uden vinger | falcata |
| 13. Blade og højblade savtakke | serrata |
| " " helrandede eller finttandede | 14. |
| 14. Planten 5-10(-20)cm med 2-3 skærmstråler | gayi |
| 3-8 skærmstråler | 15. |
| 15. Planten nedliggende | 16. |
| " opret | 17. |
| 16. Kirtlernes horn udvidede i spidsen | myrsinites |
| " " tilspidsede | corsica |
| 17. Stænglerne m.m. forveddede ved grunden. Bladene læderagtige | 18. |
| " helt urteagtige. Bladene ikke læderagtige | 19. |
| 18. Kapslen 4½-6mm. Bladene ikke tydeligt brodspidsede . | paralias |
| " 2½-3½mm. " med tydelig brod | pithyusa |
| 19. 2 skærme over hinanden | biumbellata |
| Kun 1 skærm | 20. |

- | | |
|---|--------------|
| 20. Frøene rynkede. Kapslen 3-3½mm | pineae |
| " glatte. " 4-5 mm | terraccina |
| 21. Kapslen håret | 22. |
| " ikke håret | 24. |
| 22. Højbladene sammenvoksede ved grunden | characias |
| " indbyrdes frie | 23. |
| 23. Frøene glatte. Bladene m.m. purpuranløbne | platyphyllos |
| " ru. Bladene ikke purpuranløbne | pubescens |
| 24. Kapslen glat | 25. |
| " vortet eller knudret | 31. |
| 25. Enårig | 26. |
| Flerårig | 28. |
| 26. Kapslen med 3 par krusede vinger | pterococca |
| " uden vinger | 27. |
| 27. Bladene bredest i øvre halvdel | helioscopia |
| " " i nedre " | lagascae |
| 28. Busk på 1-3 m | dendroides |
| Urt | 29. |
| 29. Bladene savtakke | serrata |
| " helrandede eller finttandede | 30. |
| 30. 2 skærme over hinanden | biumbellata |
| Kun 1 skærm | seguierana |
| 31. Enårig | 32. |
| Flerårig | 34. |
| 32. Kapslen 4 mm, ikke opspringende | akenocarpa |
| " opspringende | 33. |
| 33. Bladet but | cuneifolia |
| " spidst | platyphyllos |
| 34. Forveddet halvbush | spinosa |
| Urt | hyberna |

Euphorbia peplis L. Sandvortemælk. 5-20cm. Bladene lidt kødede, blågrønne, stærkt usymmetriske, noget seglkrummede. Sandstrande. V-X. Lokalt alm.

E. humifusa Willd. 5-15cm. M.m. blågrøn. Bladene tynde med usymmetrisk grund, finttandede i spidsen. Oprodet jord, brolægning, jærnbanskærver. VII-X. Sj.

E. chamaesyce L. 5-30cm. Bladene usymmetriske, spidsen but eller udrandet. Haver, vejkanter, oprodet jord. VI-X. Alm. 2 underarter: ssp. chamaesyce: Glat eller dunet. Bladene runde, ægformede, ofte helrandede og udrandede. Alm. ssp. massiliensis (DC.) Thell.: Lådden. Bladene ægformet aflange, butte, finttandede.

E. maculata L. Pletvortemælk. 5-20cm. Stænglerne dunede. Bladene med skævt afskåret grund, finttandede nær spidsen, oftest med en purpurfarvet plet midtpå. V-X. Sardinien.

E. dendroides L. Trævortemælk. Halvkugleformet busk. Bladene 2½-6½cm x 3-8mm, kun på de unge grene. Skærmen med 5-8 stråler. Dens støtteblade som stængelbladene. Klipper nær havet. XI-IV. Alm.

E. serrata L. Savtandet vortemælk. 20-50cm. Opret, noget blågrøn. 3-5 skærmstråler. Højbladene gule. III-V. Sardinien.

E. lagascae Sprengel 15-45cm. Opret. Bladene blågrønne, 3-6cm, ofte uregelmæssigt bølgede. 3 skærmstråler. Højblade m.m. gullige. Kapslen 5-7mm, svagt netåret. IV-V. Sardinien. Sj.

E. akenocarpa Guss. 15-45cm. Bladene spatelformede, oftest butte, med finttandet spids. 2-5 skærmstråler. Kapslen dækket af børsteagtige knuder. Fugtige enge. IV-V. Sardinien. Sj.

E. hyberna L. 30-60cm. Opret, m.m. håret. Bladene m.m. elliptiske med afrundet grund. Skov og kløfter. VI-VII. Som ssp. insularis (Boiss.) Briq. Sj.

Euphorbia spinosa L. Tætgrenet halvbusk på 10-30cm med vedvarende grenender, der dog ikke er stikkende. Bladene 5-20mm, helrandede, lancetformede. 1-5 ofte korte skærmstråler. Klipper, stenede skrænter. XII-V. Alm.

E. platyphyllos L. 15-80cm. Stænglen glat eller let håret. Lancetformede blade med let hjerteformet grund og finttandet spids. Mange ekstrastråler fra bladhjørnerne. VI-IX. Alm.

E. pubescens Vahl Dunet vortemælk. 30-80cm. Tætdunet, opret. Bladene lancetformede, grågrønne, finttandede og tætdunede. Fugtige steder. V-X. Alm.

E. cuneifolia Guss. 5-25cm. Med vækstform som Skærmvortemælk. Kapslen med 2 rækker knuder på hver klap. Fugtige enge. IV-V. Sj.

E. pterococca Brot. 10-30cm. Bladene lancet- til spatelformede. De 5 skærmstråler først 3-grenede, så tvegrenede. IV-V. Sj.

E. helioscopia L. Skærmvortemælk. IV-X. Alm.

E. myrsinites L. Blågrøn vortemælk. 20-30cm. Bladene tykke og kødede, m.m. omvendt ægformede. 5-12 skærmstråler. Klipper og urer. V-VI. Korsika. Sj.

① E. corsica Req. 20-30cm. Som foregående, men bladene bredere og butte. Stenede skrænter. 1500-1860m. Korsika. M.sj. Den øvre del af Valle del Tavignano.

E. lathyris L. Korsvortemælk. IV-V. Sj.

E. aleppica L. 10-30cm. Bladene linjeformede, meget tætstillede og tætliggende. 2-4 op til 5 x tvedelte skærmstråler. Markukrudt. V-VII. Korsika. Sj.

E. exigua L. Liden vortemælk. IV-VIII. Alm.

E. falcata L. 8-30cm. Bladene 5-30x3-5mm. III-IX. Sj.

E. peplus L. Gaffelvortemælk. I-XII. Alm.

E. pinea L. 10-40cm. Bladene lidt tykke i det, oftest tætstillede, de nedre nedadrettede, alle linje-spatelformede. Kystklipper og sandstrande. III-VI.

E. biumbellata Poir. 30-60cm. Bladene 2-5½cm, linje-lancetformede. 8-21 stråler i hver skærm. Hornene nogle gange kølleformede. Udyrkede steder nær kysten. IV-V. Korsika. Sj.

E. gayi Salis Spinkle, nedliggende eller opstigende stængler 5-10 (-20)cm. Krat og klipper. 500-1500m. V-VII. Korsika. Sj.

E. seguierana Necker Steppevortemælk. 20-50cm. Blågrøn. Stængelblade lancetformede 10-25x2-5mm. tætsiddende. 6-15, 1-3 x tvedelte skærmstråler. Tørrenge. V-VIII. Korsika. Sj.

E. pithyusa L. 10-50cm. (Nedre blade nedadrettede) Alle med opadvendte kanter. IV-VII. Sj. 2 underarter:
ssp. pithyusa: Mange gølge skud. Nedre blade nedadrettede. Langs kyster. Sj.

ssp. cupanii (Guss.) A.R.Sm.: Ingen gølge skud. Nedre blade udstående. Inde i landet. Sardinien. Korsika: Pontenuovo.

E. paralias L. Strandvortemælk. 30-60cm. 3-6 skærmstråler. Sandstrand. IV-VIII. Lokalt alm.

E. terracina L. Langhornet vortemælk. 10-50cm. Kirtlerne med 2 lange horn på 2 x kirtlens bredde eller mere. II-IX. Alm.

② E. semiperfoliata Viv. 30-60cm. Opret, tæt dunet, eet- til toårig. Den lokale udgave af Skovvortemælk E. amygdaloides. Løvskov. IV-Vi. Sj.

Euphorbia characias L. Ulvemælk. 60-120cm. Kraftig, tætstående flerårig. Bladene smalt lancetformede, lidt blågrønne, dunede og ofte med omrullet rand. 10-20 skærmstråler. Kirtlerne mørkebrune. I-IV. Alm.

RUTACEAE

Ruta. Rude. Flerårig urter, m.m. forveddede ved grunden. Bladene 2-3 x fjersnitdelte, spredte og kirtelprikkede. Blomsterne grønliggule, i halvskærme. Kronen ofte frynset, 4-tallig. 8 støvdragere, 1 griffel.

1. Kronbladene langfrynset langs randen 2.
" uregelmæssigt bølgede i randen 3.
2. Planten kirteldunet foroven angustifolia
" helt glat chalcensis
3. Bægerblade lancetformede, spidse graveolens
" ægformede, butte corsica

Ruta angustifolia Pers. 25-75cm. Højbladene ikke eller kun lidt bredere end deres tilhørende grene. Frynserne ofte så lange som kronbladets bredde. IV-VII. Sj.

R. chalcensis Frynset rude. 20-60cm. Højbladene meget bredere end deres tilhørende grene. IV-VII. Alm.

R. graveolens L. Haverude. Frugtstilkene 1-2 kapslens længde. V-VII. Korsika. Alm., men ofte dyrket og forvildet.

③ R. corsica DC. Tornet rude. Buskagtig med stive, blivende grene. Kronen bleggul. Klipper og tørre steder. 100-1200. VI-VIII. Sj. Sardinien: Gennargentu (Su Sciussciu). Korsika: M.Cinto, Rotondo, Renoso, Incudine til Massiccio di Cagna.

CNEORACEAE

Cneorum tricoccon L. Dværgoliven. Lav busk, 30-100cm med stedsegrønne, aflange blade 1-3cm, siddende med tilsmalnet grund og lidt omrullet rand, 1-ribbede. Blomsterne små, 2-3 sammen eller enlige, tretallige, med gul krone på 4mm. Frugten tredelt som hos Vortemælk. Krat. IV-V. Sardinien. Sj.

SIMAROUACEAE

Ailanthus altissima (Miller) Swingle Skyrækker. Træ på 5-15m. Bladene spredte, fjerfinnede, 45-60cm, m.m. glatte. 13-25 småblade på 7-12cm lancet- til ægformede, tilspidsede, randhårede med 2-4 tænder nær grunden med en stor kirtel under sig. Dyrket og forvildet. VI-VII. Alm.

POLYGALACEAE

Polygala. Mælkurt.

1. Enårig monspeliaca
Flerårig 2.
2. Nedre blade modsatte serpyllifolia
Alle blade spredte 3.
3. Højbladene længere end blomsterstilkens under blomstringen
" højest så lange som blomsterstilkene nicaeensis 4.
4. Kronrøret lidt kortere end vingerne sardoa
" ca. ½ x vingerne vulgaris

Polygala monspeliaca L. Enårig mælkurt. 9-20cm. Opret. Grundblade spatelformede ca. 8mm, stængelbladene linje-lancetformede, ca. 15mm. Vingerne 6-8mm, hvidliggrønne. IV-VI. Sj.

④ P. sardoa Chodat 8-15cm. Højblade af blomsterstilkens længde. Vingerne 7x3mm, hvidlige. Tørre enge. 500-1200m. IV-VI. Sardinien: Orgosolo, Oliena. Sj.

Polygala nicaeensis Risso 15-40cm. Højbladene omtrent dobbelt så lange som blomsterstilkene, men falder af allerede under blomstringen. Rager frem over de udsprungne blomster. Blomsten lyserød, sjældnere blå eller hvid. IV-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. mediterranea Chodat: Vingernes midteråre ugrenet. Sardinien.
ssp. corsica (Bor.) A. & Gr.: Vingernes midteråre grenet. Korsika.

P. vulgaris L. Alm. malkurt. V-VII. Sj.

P. serpyllifolia Hose Spød malkurt. V-IX. Korsika: M. Rotondo, Incudine.

ANACARDIACEAE

Pistacia terebinthus L. Terpentintræ. Mindre træ 1-5m. Bladene uligefinnede, noget læderagtige med 3-9 småblade, spredte. Småbladene mørkegrønne ovenpå, grågrønne nedenunder, lancetformede, 3-4½cm med en kort brod. Frugterne i grenede stande, koralrøde som unge, senere brune. IV-VI. Alm.

P. lentiscus L. Mastikstræ. Busk på 1-3m, sjældent 6-8m. Bladene ligefinnede, læderagtige, med 8-12 småblade på 1-5x½-1½cm. Bladskaftet tydeligt vinget. III-V. Alm.

ACERACEAE

Acer campestre L. Navr. Alm.

A. pseudoplatanus L. Ær. Korsika. Alm.

A. obtusatum Waldst. & Kit. Bladet med 5 korte, brede og butte, ujævnt takkede lapper. Undersiden m.m. tæthåret, ofte flettet. Ege- og kastanjeskov. Korsika. Sj.

A. monspessulanum L. Trelappet løn. Bladet 3-8cm, 3-lappet, helrandet, skinnende ovenpå, noget grønt nedenunder, langstilket. Varmepræget løvskov. Sj. til alm.

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus hippocastanum L. Hestekastanje. Forvildet fra dyrkning.

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L. Kristtjørn. Sj.

CELASTRACEAE

Euonymus europaeus L. Benved. Alm.

BUXACEAE

Buxus sempervirens L. Buksbom. Bladene 15-30mm, med vedvarende hvidlige dunhår på yderdelen af bladet og ofte også på de unge skud. III-V. Sardinien. M.sj.

B. balearica Lam. Bladene 25-40cm, m.m. glatte. Sardinien: nær Carbonia (Barbusi). M.sj.

RHAMNACEAE

Rhamnus. Vrietorn.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Bladene stedsegrønne og læderagtige | 2. |
| " løvfældende, ikke " | 3. |
| 2. Ingen torne | alaternus |
| Grenene tornede | oleoides |
| 3. Grene og blade spredte | alpinus |
| Unge grene og deres blade modsatte | persicifolius |

Rhamnus alaternus L. Stedsegrøn vrietorn. 1-5m. Unge grene dunede. Bladene spredte, oftest elliptiske eller lancetformede, med en hvidlig hindekant, helrandede eller med svage, småkirtlede tænder. II-IV. Vigtig plante i det stedsegrønne krat. Alm.

Rhamnus oleoides L. 60-100cm. Stærktgrenet busk. Bladene omvendt æg-lancetformede, 1-4cm, spredte, helrandede eller med 1-2 småtænder nær spidsen. III-V. Sardinien: nær Pula.

• R. persicifolius Moris Bladene elliptisk-lancetformede, 3½-4½ x så lange som brede, fint savtakke, glatte ovenpå og dunede nedenunder. 50-100cm. Krat og hegn. 300-800m. Indre Sardinien: Barbagia, Fonni. Sj.

R. alpinus L. ssp. alpinus Alpevrietorn. 1-1½m. Bladene bredt elliptiske, 6-8 x 3-5 cm, finttandede, skinnende ovenpå. 9-12 par sideribber, der træder frem på undersiden. Unge grene dunede. V-VI. Sardinien. Sj.

VITACEAE

Vitis vinifera L. Vinranke. Ca. hvert 3. blad har ingen slyngtråd eller blomsterklase over for sig. 2 underarter:
ssp. vinifera: Blomsterne tvekönnede. Frøene pæreformede. Dyrket og forvildet.

ssp. silvestris (Gmelin) Hegi: Planten tvebo. Frøene m.m. runde. Den vilde form. Fugtige egeskove. Korsika.

V. labrusca L. Amerikavin. Alle blade med slyngtråd. Bladundersiden rustflettet. Dyrket og sj. forvildet.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon Klatrevildvin. Bladene håndfliget femdelte. Slyngtrådene med 5-8 grene med hæfteskiver. Dyrket. Sj. forvildet.

TILIACEAE

Tilia cordata Miller Småbladet lind. Korsika Sj.

MALVACEAE

- | | |
|---|----------|
| 1. Yderbæger mangler | Abutilon |
| " findes | 2. |
| 2. Yderbægret 2-3-bladet | 3. |
| " 5-13-bladet | 5. |
| 3. Yderbægerbladene sammenvoksede ved grunden | Lavatera |
| " frie | 4. |
| 4. Yderbægerbladene større end bægerbladene, stilkfæstede | Malope |
| " mindre " | Malva |
| 5. Yderbægerbladene indbyrdes frie | Hibiscus |
| " sammenvoksede ved grunden | Althaea |

Malope malacoides L. Håret trompetkatost. 20-50cm. Mest flerårig. Nedre blade 2-5cm, ægformede, de øvre lige sådan eller 3-lappede. Yderbægerbladene anbragte lidt under blomsten, store og helt hjerteformede. Kronen lyserød eller rødlig. Udyrket, leret jord. V-VI. Alm.

Malva. Katost.

- | | |
|--|------------|
| 1. Stængelbladene dybt delte | 2. |
| " lappede | 4. |
| 2. Bægerbladene smalle, over 3 x så lange som brede | cretica |
| " ægformede | 3. |
| 3. Stængelen stjernehaaret | alcea |
| " uden stjernehaaret | moschata |
| 4. Kronen omtrent af bægerets længde | parviflora |
| " mindst 2 x bægeret | 5. |
| 5. Blomsterstilkene tilbagebøjede efter blomstringen | neglecta |
| " oprette | 6. |
| 6. Kronbladene rødlig, 12-22mm | silvestris |
| " hvidlige eller blålige, 10-12mm | nicaeensis |

M. silvestris L. Alm. katost. V-VIII. M.alm.

Malva cretica Cav. Enårig. 10-40cm. Stivhåret. Nedre blade m.m. runde, de øvre 3-fligede. Yderbægeret linjeformet, bægerbladene tilsvarende, 7-10mm. Kronen rødlilla, 10mm. III-VI. Sardinien. Sj.

M. alcea L. Rosenkatost. VI-IX. Sj.

M. moschata L. Moskuskatost. V-VIII. Korsika. Alm.

M. nicaeensis All. 30-60cm. Oftest enårig. Bægeret oftest glat på undersiden. Kronen uden mørkere årer. V-VII. Alm.

M. parviflora L. Enårig. 20-50cm. Opret. Kronen hvid, 4-6mm, rød- eller blååret. Nær bebyggelse. III-V. Alm.

M. neglecta Wallr. Rundbladet katost. V-VIII. Sj.

Lavatera. Katost.

- | | |
|--|------------|
| 1. Blomsterne i nøgler i bladhjørnerne | 2. |
| " enlige | 4. |
| 2. Planten klæbrig med kirtelhår | triloba |
| " uden kirtelhår | 3. |
| 3. 30-50cm. Yderbægeret mindre end bægeret | cretica |
| 1-3m. " større " | arborea |
| 4. Forveddet busk | 5. |
| Urt | 6. |
| 5. Bladet så langt som bredt | maritima |
| " længere end bredt | olbia |
| 6. Stænglen dækket af fine stjernehaar | punctata |
| " med ugrenede og fågrenede haar | trimestris |

Lavatera cretica L. Vejkatost. Ligner fuldstændigt Alm. katost, men er opret, har bredere yderbægerblade og ikke netrynkede del-frugter. III-V. Alm.

L. arborea L. Kæmpekatost. 1-3m. Opret og forveddet ved grunden. Toårig. Bladene runde, svagt 5-7-lappede, op til 20cm. Yngre dele af planten stjernehaarsfildede. Oprindelig på kystklipper, ellers dyrket og forvildet. IV-IX. M.sj. oprindelig.

L. maritima Gouan Busk på 30-120cm, unge dele hvidt stjernehaars-fildede. Bladene runde, oftest let 5-lappede, undersiden gråfildet. Kronbladene 1½-3cm, lyserøde med purpurfarvet grund. Kalkklipper nær kysten. IV-V. Sardinien. M.sj.

L. olbia L. Busk på 60-200cm. Stænglerne stivhårede, unge dele stjernefildede. Kronblade 15-30mm, rødlilla. Øvre blade æg-lancet-formede, ofte med trelappet grund. Kalkklipper. IV-VI. Sj.

L. punctata All. Enårig 20-90cm. Opret. Stænglen ofte m.m. rød. Nedre blade runde, svagt 5-lappede, øvre spydformet 3-lappede. Kronbladene 1½-3cm. V-VI. Korsika. Sj.

L. trimestris L. Mamelukærme. Enårig, op til 120cm. Bladene runde, de øvre noget 3-7-lappede. Kronen 2-4½cm. Delfrugterne dækkede af en skiveformet udvidelse af midteraksen. IV-VIII. Sj.

L. triloba L. Flerårig, forveddet ved grunden, 30-200cm. Stænglen stivhåret og stjernehåret. Bladene runde, de nedre 5-lappede, de øvre 3-lappede. Kronbladene 1½-3cm. 2 underarter: V-VI.
ssp. triloba: Yderbægeret sammenvokset i den nederste tredjedel. Bladene flade eller let bølgede. Sardinien. Sj.
ssp. pallascens (Moris) Nyman: Yderbægerbladene næsten frie. Bladene stærkt bølgede. Sardinien: Isola di San Pietro. M.sj.

Althaea. Stokrose.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Enårig. 10-25cm. Støvknapperne gule | hirsuta |
| Flerårig. 40-120cm. " purpurrode | 2. |
| 2. Bladene dybt fligede. Delfrugterne glatte | cannabina |
| " lappede eller hele. Delfrugterne dunede | officinalis |

Althaea hirsuta L. Håret stokrose. Opstigende eller nedliggende, håret og stjernehåret. Nedre blade runde, øvre smalt 3-5-fligede. Blomsterne enlige. Kronen lyst rødlilla, 15mm, lidt længere end bægeret. V-VIII. Alm.

A. cannabina L. Hampestokrose. 50-80cm. Opret, stjernedunet. Bladene med 3-5 lancet- eller linjeformede flige, der er savtakke. Bladene ofte delte helt til grunden. Kronbladene 1½-3cm, lyserøde. Fugtige steder, grøfter, flodbredder. VII-IX. Sardinien. Alm.

A. officinalis L. Lægestokrose. Sumpe, grøfter. V-VIII. Alm.

Abutilon theophrasti Med. Kinajute. 50-100cm. Opret enårig. Bladene rent hjerteformede. Blomsterne i tætte nøgler. Kronen gul, 7-13mm. Sumpe, grøfter, også forvildet. VII-IX. Korsika. Sj. forv.

Hibiscus syriacus L. Syrisk rose. Busk på 1-2m. Bladene 3-7cm, rudeformede, tandede og ofte trelappede. Kronbladene 4-5cm, blå, røde eller hvide. Dyrket og forvildet. VI-VIII. Alm.

THYMELAEACEAE

Daphne. Kælderhals. Mindre buske. Bladene ofte samlede i grenenderne, helrandede, omvendt lancetformede til linjeformede. Blomsten 4-tallig med sambladet, farvet, m.m. rørformet bæg. Ingen krone. Bladene oftest over 12mm, stedsegrønne hos de stedlige arter.

- | | |
|---|----------|
| 1. Blomsterne gulgrønne, glatte | laureola |
| " hvide, hårede | 2. |
| 2. Bladene lancetformede, samlede i grenenderne | oleoides |
| " m.m. linjeformede, jævnt fordelte | gnidium |

Daphne laureola L. Skovlavrbær. 60-120cm. Bladene omvendt lancetformede, 8-13cm, skinnende. Blomsterne i tætte klaser mellem bladene. II-IV. Sj.

D. gnidium L. Høstkælderhals. 60-150cm. Bladene 3-4½cm x 3-5mm, med en brød på ca. 1mm, randen let indrullet. Blomsterne i små endestillede toppe, 7mm. Stedsegrønt, lavt krat. VII-IX. Alm.

D. oleoides Schreber 30-50cm. Bladene 10-45mm, oftest omvendt lancetformede, skinnende ovenpå og oftest glatte. Bægerørret 6-8mm, bægrefligene 5-7mm. Klipper, stenede græssange. IV-VI. Sj.

Thymelaea. Spurvetunge. Blomsterne som hos Daphne. Bladene sjældent over 12mm. Buske eller urter.

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Enårig urt | passerina |
| Busk | 2. |
| 2. Bladene skælagtige | hirsuta |
| " omvendt lancetformede | tartanraira |

T. hirsuta (L.) Endl. Skællet spurvetunge. Dværgbusk på 40-100cm. Grenene tæt dækkede af skællignende blade. De unge kviste hvidfildede. Bladene 3-8x1½-4mm, noget kødede eller læderagtige. Den indadvendte overside hvidfildet, den udadvendte underside m.m. glat og skinnende. Bløsteret gult, tæt fildet, 4-5mm. Krat, især nær kysten. IX-IV. Sj.

T. tartanraira (L.) All. Dværgbusk på 20-50cm. Unge skud oftest silkehårede. Bladene 9-13x5-7mm, oftest silkehårede. Blomsterne gullighvide, ca. 4mm. Klipper, sandstrand. IV-V. 2 underarter:
ssp. tartanraira: Bladene hvidfildede på begge sider. Alm.
ssp. thomasii (Duby) Briq.: Bladene eller glatte eller med få har.
Korsika: Nær Ponte Leccio. M.sj.

T. passerina (L.) Cosson Enårig spurvetunge. 20-50cm. Opret, glat, svagt håret foroven. Bladene linjeformede, 8-12x1mm, jævnt fordelte, spidse. Blomsterne grønne, 1-3 sammen, 3-4mm. Sand, udyrkede steder. VI-VIII. Sj.

Hypericum. Perikon.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Busk. Uden røde eller sorte kirtler på blade eller blomster | 2. |
| Urt. Med " " " " " " " " | 4. |
| 2. Bladene små, 2-3mm brede | aegypticum. |
| " store, 1-5cm brede | 3. |
| 3. Kronen kortere end bægeret | androsaemum |
| " længere " " | hircinum |
| 4. Planten dunet | 5. |
| " glat | 6. |
| 5. Opret. Bægerbladenes kirtler langstilkede | annulatum |
| Nedliggende. Bægerbladenes kirtler kortstilkede | tomentosum |
| 6. Bægerbladene med langstilkede kirtler | 7. |
| " " kortstilkede " eller helrandede | 8. |
| 7. Øvre bladpar sammenvoksede ved grunden | perfoliatum |
| " " frie | montanum |
| 8. Stænglen 4-vinget | tetrapterum |
| " trind eller med 2 ribber | 9. |
| 9. Bægerbladene spidse | perforatum |
| " butte | 10. |
| 10. Kronbladene 7-15mm. Stænglen trind | australe |
| " 4-6 mm. " 2-ribbet | humifusum |

Hypericum hircinum L. Bukkeperikon. 30-100cm. Stænglerne med 2 ribber eller 4 kanter. Bladene 2-7cm, lancetf. eller æg-lancetformede, med bukkelugt ved knusning. Bøgerblade 3-6mm, kronblade 11-18mm. Grifflerne 3-5 x frugtknuden. Kløfter, fugtige og skyggefulde steder. V-VIII. Alm.

H. androsaemum L. 30-70cm. Stængler 2-ribbede. Bladene 4-15cm, bredt ægformede, uden bukkelugt ved knusning. Bøgerblade 8-12mm, uens, kronblade 8-10mm. Grifflerne kortere end frugtknuden. Fugtige og skyggefulde steder i krat og skov. V-VII. Alm.

H. aegypticum L. Klintperikon. 20-30cm høj busk. Bladene 5-12x 2-3mm, læderagtige, ofte tattsiddende, blågrønne. Kronblade 8-14mm. Kystklipper. Sardinien. Sj.

H. montanum L. Bjærgperikon. VI-VII. Alm.

H. annulatum Moris 20-60cm. Stængler og blade grådunede. V-VII.
Sardinien. Sj. (1 sted ifølge Fl.Eur.)

H. tomentosum L. Filtet perikon. 10-30cm. Bladene 8-16mm. Fugtige steder. V-VI. Sardinien. Sj.

H. perfoliatum L. Gennembrudt perikon. V-VI. Alm.

H. australe Ten. 8-40cm. Nedliggende, opstigende eller opret.
Bægerblade oftest med kortstilkede randkirtler. IV-V. Alm.

H. humifusum L. Dværgperikon. VI-IX. Sj.

H. tetrapterum Fr. Vinget perikon. VI-VIII. Sj.

H. perforatum L. Prikbladet perikon. V-VIII. Alm.

VIOLACEAE

Viola. Viol.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Enårig | 2. |
| Flerårig | 3. |
| 2. Blomsten 1-1½ cm. Bladene rundtakkede | arvensis |
| " ½ cm " næsten helrandede | parvula |
| 3. Stænglerne forveddede i det mindste ved grunden | arborescens |
| " helt urteagtige | 4. |
| 4. De sidestillede kronblade opadrettede (stedmoderblomst) | 5. |
| " " " nedadrettede | 7. |

- | | |
|---|------------------|
| 5. Bladene nyreformede. Kronen gul, 1-1½ cm | biflora |
| " ikke " " oftest bla | 6. |
| 6. Nedre blade helrandede, m.m. runde | nummulariaefolia |
| " " m.m. rundtakkede, rudeformede | corsica |
| 7. Blomsterstilkene udgår fra bladede stængler | 8. |
| " " jordstænglen | 9. |
| 8. Sporen blå og tynd | reichenbachiana |
| " hvid og tyk | riviniana |
| 9. Jordstænglen krybende. Bladene nyreformede, glatte | palustris |
| " ikke " , ofte med overjordiske udløbere | 10. |
| 10. Bladene runde og butte. Fodflige bredt ægformede | odorata |
| " æg-hjerteformede, noget spidse. Fodflige smalle | alba |

Viola odorata L. Martsviol. II-IV. Alm.

V. alba Besser ssp. dehnhardtii (Ten.) Becker Udløbere mangler
undertiden. Blomsterne blå. II-IV. Alm.

V. reichenbachiana Jordan Skovviol. III-VII. M.alm.

V. riviniana Rchb. Kratviol. IV-VIII. Alm.

V. palustris L. Engviol. V-VII. Korsika. M.sj.

V. biflora L. Gul viol. Jordstænglen krybende. IV-VIII. Korsika.
Sj.

V. nummulariaefolia Vill. 3-5cm. Stænglerne forlængede, kryber mellem stenene. Bladpladen 1-2cm. Kronen lmm, lyseblå. Sporen but, godt 2 x bægervedhænet. Fugtige urer. 1800-2900m. Korsika. M.sj.

V. corsica Nyman 10-20cm. Øvre blade 2-3cm, aflange til linjeformede, svagt rundtakkede eller helrandede. Kronen 1 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ cm, blalilla, sjældent gul. Sporen lang, 10-15mm. 600-1800m. Mellem tornede dværgbuske, på stenede enge. IV-VI. Sj. 2 underarter:

ssp. limbarae Merxm.& Lippert: Fodfligene spatelformede med 1-4 sideflige. Sardinien: M.Linas, Gennargentu, Limbara.
ssp. corsica: Fodfligene smalle med højst 1 sideflig. Nordkorsika: Capo Corso.

V. arvensis Murray Agerstedmoderblomst. IV-VII. Alm.

V. parvula Tineo 3-10cm, tæthåret. Nedre blade m.m. runde, de øvre aflangt spatelformede. Sporen meget kort. 1200-2500m. Korsika. M.sj. III-VI.

V. arborescens L. Buskviol. 10-20cm. Bladene ægformede til linje-lancetformede, spidse. Blomsterne 1-1½cm, blegviolette. Kystklipper. VIII-IX. Sardinien: Capo Mannu. M.sj.

CISTACEAE

- | | |
|---|--------------|
| 1. Blomsterne hvide eller lyserøde | 2. |
| " gule | 3. |
| 2. Oprette buske på 30-150 cm | Cistus |
| Lave, opstigende dværgbuske | Helianthemum |
| 3. Griflen kort eller manglende | 4. |
| " veludviklet | 5. |
| 4. Hvidfiltet busk | Halimium |
| Grøn urt | Tuberaria |
| 5. Alle støvtråde med støvknapper. Bladene modsatte | Helianthemum |
| Ydre støvtråde perlesnorsformede, uden støvknapper | |
| bladene oftest spredte og linjeformede | Fumana |

Cistus. Stenrose.

- | | |
|--|----------|
| 1. Kronen lyserød | 2. |
| " hvid | 5. |
| 2. Bladene med 3 buestrengede hovedribber | albidus |
| " fjerstrengede | 3. |
| 3. Bladoversiden jævn og plan. Grenene lange | corsicus |
| " stærkt rynket. " korte | 4. |

4. Bladranden m.m.plan. Planten ikke klæbrig incanus
" kruset. Planten klæbrig creticus
5. Bladene linjeformede monspeliensis
" brede 6.
6. Bladene fjerstrengede, rynkede ovenpå salvifolius
" buestrenget 3-ribbede, glatte ovenpå laurifolius

Cistus albidus L. Fløjlsstenrose. Bladene tæt gråhvidt filtede på begge sider, elliptiske, siddende. IV-V. M.sj.

C. incanus L. Gråbladet stenrose. Bladstilken 2-4mm. Bladet med rynket overside, plan eller svagt bølget rand og bræmnet med hvid filt. Planten med meget få eller ingen kirtelhår. IV-V. Alm.

• *C. corsicus* Loisel. Bladet stilket, kanten med mørke eller rødlig hår, svagt bølget. IV-V. Alm.

C. creticus L. Kruset stenrose. Planten tæt kirtelhåret med aromatisk lugt. V-VI. Sardinien. Alm.

C. monspeliensis L. Planten klæbrig. Bladene 15-50x3-6mm, mørkegrønne og fåhårede ovenpå, stjernefildede nedenunder, med 3 parallelle hovedribber. IV-V. Alm.

C. salvifolius L. Salviebladet stenrose. Bladet elliptisk, 15-30 x 8-15 mm, grønne, med stjernehår på begge sider. IV-V. Alm.

C. laurifolius L. Lavrbærstenrose. Op til 1½m. Bladene ægformede, spidse, mørkegrønne ovenpå, tæt hvidfildede nedenunder, kortstilkede. VI. Korsika: I Marmano-skoven ved Ghisoni. M.sj.

Halimium halimifolium (L.) Willk. Sølvbladet soløjebusk. 30-120cm. Opret, hvidfiltet busk. Dækket af stjernehår og skjoldformede skæl. Bladene elliptiske 10-40x5-20mm. Blomsterne i mange, fåblomstrede svikler. Kronbladene gule, ofte med orangerød grund, 12-14mm. Krat nær kysten. V-VI. Sj.

Tuberaria. Artsopfattelse efter Flora Iberica.

1. Flerårig. Grundbladene 2-5cm lignosa
Enårig. Grundbladene visne under blomstringen, mindre 2.
2. Blomsterstilke under blomstringen af bægerets længde praecox
" " " længere end bægeret 3.
3. Indre bægerblade 1,7-2,5mm brede. Støvknapperne 0,1-0,2mm
" " " " plantaginea
" " " 2,5-3,3mm brede. Støvknapperne 0,4-0,5mm guttata

T. lignosa (Sweet) Samp. Vejbreddsoløje. 10-30cm., forveddet ved grunden. Bladene vejbredagtige, m.m. glatte ovenpå, dunede eller fildede nedenunder. Blomsterne stængler oprette. Kronbladene 15mm. Krat og afbrændt skov. IV-V. M.sj.

T. guttata (L.) Fourr. Plettet soløje. 5-15cm. Lådden enårig. Grundbladene elliptiske, danner en roset, der oftest er visnen under blomstringen. Blomsterne i oprette klaser. Kronbladene 5mm, oftest med en sort plet. Åben, udyrket jord. III-V. Alm.

T. plantaginea (Willd.) Gallego Meget lig foregående. Bladrosetten mere vedvarende. Ikke udskilt hos Pignatti.

T. praecox Grosser Blomsterstilkene hviddunede. IV-V. Sj.

Helianthemum. Soløje

1. Enårig 2.
Flerårig 4.
2. Bægerbladene hindeagtige, kun hårede på ribberne aegyptiacum
" urteagtige, jævnt hårede 3.
3. Blomsterstilkene kortere end bægeret, fortykkede ledifolium
" længere " " , spinkle salicifolium

4. Bladene uden fodflige canum
" med " 5.
5. Ydre bægerblade bredt ægformede, udstående, så den lådne knop ligner et kattehovede caput-felis
Ydre bægerblade smalle 6.
6. Bægerbladene med fremtrædende, bebørstede ribber hirtum
" uden lange, stive børster 7.
7. Øvre blade med små, linjeformede fodflige apenninum
" " " bladlignende, lancetformede fodflige 8.
8. Bladoversiden tæt stjernefildet. Kronen oftest orangegul croceum
" glat eller dunet. Kronen gul nummularium

Helianthemum caput-felis Boiss. Kattehovedsoløje. Halvbusk 10-30 cm. Stængler og blade hvidfildede. Bladene egentlig bredt elliptiske, 6-15mm, men kraftigt omrullede. Bægeret laddent med lmm lange hår. III-IV. Vestsardinien: Capo Mannu. M.sj.

H. hirtum (L.) Miller Op til 30cm, med oprette grene. Bladene smalt lancetformede, m.m. glatte ovenpå, gråfildede nedenunder. Bægerribberne med udstående børster på lmm, ribbemellemrummene stjernehårede. IV-V. Korsika: S. Lucia di Porto Vecchio. M.sj.

H. croceum (Desf.) Pers. 10-30cm. Stænglerne hvidfildede. Nedre blade m.m. runde, øvre elliptisk-lancetformede, 6-10mm, kanten lidt omrullet, hvidfildede nedenunder. Kronen orangegul, gul eller hvid. VI-VII. Sardinien. Sj.

H. nummularium (L.) Miller Alm. soløje. V-VIII. Alm. På Sardinien også *ssp. berterianum* (Bertol.) Breistr. med lyserød krone.

H. apenninum (L.) Miller Hvidt soløje. Blomsten hvid med gul grund. Angivet fra begge øer i Pignatti, men ikke i Fl.Eur.

H. salicifolium (L.) Miller Enårigt soløje. 5-25cm. Bladene omvendt lancetformede, svagt dunede, 6-25mm. Blomsterstilkene udadrettede og opadbøjede. Kronbladene 4-9mm, undertiden manglende. III-V. Alm.

H. ledifolium (L.) Miller 10-60cm. Lådden-filtet plante. Klaserne svikkelagtige med tykke, oprette blomsterstilke. Kronen kortere end bægeret. IV-V. Sardinien. Sj.

H. aegyptiacum (L.) Miller 5-30cm. Ligner *salicifolium*, men bladene linjeformede, mørkegrønne og glatte ovenpå, gråfildede nedenunder, 14-16mm. Frugtstilkene nedadbøjede. IV-V. Korsika: Bastia. Sardinien. Sj.

H. canum (L.) Baumg. Gråfiltet soløje. Halvbusk på 4-20cm. Blade æg- eller lancetformede, gråfildede nedenunder, grønne eller gråfildede ovenpå. V-VII. Sardinien. Sj.

Fumana. Dværgbuske. 2 ydre bægerblade små, de 3 indre hindeagtige.

1. Bladene uden fodflige 2.
" med " 3.
2. Blomsterstilkene nedadbøjede, ca. lig støttebladene procumbens
" rette, 2-3 x støttebladene ericoides
3. 2 fodflige. Bladene lancetformede arabica
6-8 fodflige i knippe. Bladet smalt 4.
4. Bladene spredte. Planten glat laevipes
" modsatte. " kirtelhåret 5.
5. Bladene æg-lancetformede, med ombøjet rand, 1-2mm brede thymifolia
" linjeformede, stærkt ombøjede, ½-1mm brede laevis

Fumana arabica (L.) Spach 15-25cm. M.m. kirteldunet. Bladet 5-12 x 2-5mm. IV-V. Sardinien. Sj.

Fumana procumbens (Dunal) G. & G. 5-15cm. Nedliggende. Bladene med noget trekantet tværsnit, linjeformede, 8-12x1mm, randhårede. V-VI. Sardinien. Alm.

F. ericoides (Cav.) Gandog. 10-20cm. Opret eller opstigende. IV-VI. Sardinien: S. Korsika: M.sj.

F. thymifolia (L.) Spach 10-20cm. De øvre blade tæt kirtlede eller kirtelbørstede. IV-VI. Sj.

F. laevis (Cav.) Pau Bladene glatte. Står nær den foregående og ikke udskilt fra denne hos Pignatti.

F. laevipes (L.) Spach 8-15cm. Bladene 4-8x0,3-0,4mm, klart grønne eller blågrønne, glatte eller med nogle spredte kirtelhår. IV-V. Sardinien. Sj.

TAMARICACEAE

Tamarix. Tamarisk. Mindre træer med slanke grene, der er dækkede af ganske små, skælformede blade. Blomsterne i hvide, cylindriske, ret tætte klaser.

1. Klaserne 5-8mm brede. Bladene med gennemskinnelig rand africana
" 3-5mm " " uden " " 2.
2. Forbladet mindst så langt som bægeret. Kronblade 1,2-1,5mm
" 1/2 x bægeret. Kronblade 1,5-2mm canariensis gallica

Tamarix africana Poiret 2-5m. Barken sort eller mørkpurpur. V-VI. Klitter, strandsumpe m.m. Alm.

T. canariensis Willd. 1-5m. Barken rødbrun. Planten papilløs. Fugtigt sand og grus. Sardinien. Sj.

T. gallica L. Barken mørkebrun til mørkpurpur. Planten ikke papilløs. IV-VI. Langs kysten. Korsika: Alm. Sardinien?

FRANKENIACEAE

Frankenia. Nedliggende planter med hele, modsatte, ofte lyngagtige blade uden fodflige. Oftest røde blomster med 4-6 forbundne bægerblade og 4-6 kronblade. De minder lidt om nellikeblomster.

1. Enårig. Bladene flade, spatelformede pulverulenta
Flerårig. Bladene smalle, med omrullet rand 2.
2. Blomsterne spredte langs stængler og grene laevis
" i endestillede halvskærmfælgende knipper hirsuta

F. pulverulenta L. 5-25cm. Ofte pudedannende. Stænglerne dunede. Bladene svagt dunede ovenpå, tæt dunede nedenunder. Blomsterne i tætte, ensidige, korte aks. Sandede steder. IV-V. Alm.

F. laevis L. 10-30cm. Pudedannende, fintdunet med hår op til 0,1 (-0,2)mm. Bladene undertiden dækkede af en hvid skorpe. Sand og grus. IV-VI. Sj.

F. hirsuta L. 10-30cm. Pudedannende. M.m. tæt dunet med hår på 0,1 til 1mm. Bladene uden en hvid skorpe. Sand og grus. IV-VI. Sj.

ELATINACEAE

Elatine alsinistrum L. Kransbækarve. 1-flerårig, 2-80cm. Bladene i krans, i vand med op til 18 blade i krans og så linjeformede, på land med ned til 3 lancet-ægformede blade. Siddende 4-talsblomster. Næringsfattigt, stillestående vand. V-VIII. Sj.

CUCURBITACEAE

Ecballium elaterium (L.) Rich. Æselagurk. Kraftigt stivhåret, flerårig plante med trekantet hjerteformede blade. Gule agurkeblomster på 18-20mm. Grøn, elliptisk, stivhåret frugt på 4-5cm. V-IX. Alm.

Bryonia marmorata Petit 1-3m. Bladene lyse langs ribberne. Omridset trekantet-rudeformet, ikke særligt indskåret. Hanblomsterklaserne m.m. glatte, deres kronrør uden kirtler. IV-VI. Sj.

B. acuta Desf. Bladene ensfarvede, tydeligt lappede til fligede, 5-delte. Hanblomsterstanden kirtlet og langhåret. IV-V. Sardinien?

LYTHRACEAE

Lythrum. Kattehale.

1. Kronen 8-12mm. Blomsterne i endestillede aks salicaria
" 0-6 mm. " spredte mellem bladene 2.
2. Bladene modsatte 3.
" spredte 4.
3. Frugtbægeret længere end kapslen. borysthenicum
" kortere " " portula
4. Kronen 5-6 mm junceum
" 0-3 mm 5.
5. Bladene omvendt lancetformede, bredest foroven .. borysthenicum
" linjeformede eller elliptiske, bredest midtpå 6.
6. Bægertænderne m.m. ens tribracteatum
" skiftevis korte og lange 7.
7. 6 støvdragere. Kronbladene 2-3 mm hyssopifolia
2 " 1-2 mm thymifolia

Lythrum salicaria L. Alm. kattehale. VI-IX. Alm.

L. junceum Banks & Sol. 20-70cm. Glat, ofte flerårig med nedliggende grene. Bladene bredt til linjeformet aflange. Underbægeret 5-6mm, rødt ved grunden. V-IX. Sj.

L. hyssopifolia L. 10-60cm. Enårig, oftest opret, m.m. glat. Blomsterne oprette og tiltrykte. IV-IX. Alm.

L. thymifolia L. 5-12cm. Enårig, opret eller nedliggende, ofte noget ru. Blomsterne 4(-5)-tallige, underbægeret 3-4mm. IV-V. Sardinien. M.sj.

L. tribracteatum Salzm. 5-30cm. Enårig, opret eller nedliggende, glat eller ru, stænglen med 4 ribber. Grenene modsatstillede, udstående. IV-VI. Sardinien. Sj.

L. portula (L.) Webb Vandportulak. VI-X. Sj.

L. borysthenicum (Schränk) Litv. 3-10cm. Ligner foregående, men oftest opret, næppe rodslående og tit ru. VI-VII. M.sj.

MYRTACEAE

Myrtus communis L. Myrte. Busk op til 5m med stedsegrønne, lancetformede, læderagtige, kirtelprykkede blade. Langstilkede, hvide, parvise, femtalsblomster med mange støvdragere i de øvre blad-hjørner. VI-VII. Alm.

Eucalyptus. Febertræ. Høje træer. Bladene noget læderagtige med en m.m. tydelig randnerve tæt ved kanten. Unge blade modsatte, brede og regelmæssige. Modne blade spredte, smalle og ofte seglformede. Blomsterne enlige eller i skærme. Blomsteret lågformet og falder af under blomstringen og afdækker de mange støvdragere.

1. Blomster enlige globulus
" i skærme 2.
2. Skærmstilkene trinde 3.
" sammentrykte eller kantede 4.
3. Barken hvid og glat camaldulensis
" sort og grov rudis
4. Modne blade ca. 20cm lange, skinnende maidenii
" 10-18 cm 5.

5. Skærmstilke 7-10mm botryoides
 " 15-33mm 6.
 6. Skærmstilke 15-20mm. Modne blade 2-3 cm brede resinifer
 " 20-33mm. " " 4-8 cm " robustus

PUNICACEAE

Punica granatum L. Granatæble. Busk op til 5m. Tornet, stærkt grenet, løvfældende. Pirkantede kviste. Modsatte, lancetformede, glatte, helrandede, flirke blade. Blomsterne røde, 3-4cm i tværmål med et stort, kødet og farvet bæger, 5-7-tallige. IV-VI. Dyrket og forvildet.

ONAGRACEAE

Circaea lutetiana L. Dunet steffensurt. VI-VII. Sj.

Oenothera biennis L. Toårigt natlys. Stænglen ikke rødpletet. Bægeret grønt. Modne blade med røde midterribber. VI-IX. Korsika. Alm.

O. rosea L'Hér. Rosennatlys. Kronbladene lyserøde. VI-IX. Sardinien. Sj. (Amerika).

Ludwigia palustris (L.) Elliott Vandkryb. 3-50cm. Flerårig, krybende og rodslående sumpurt. Bladene modsatte, rudeformede, Parietaria-lignende, glatte. Blomsterne 4-tallige i bladhjørnerne, 4mm, bestående af underbæger og bæger, uden krone. VI-VIII. Sj.

Epilobium. Dueurt.

1. Bladene spredte angustifolium
 " modsatte 2.
2. Stænglen med lange, udstående, bløde hår 3.
 " glat eller med tiltrykte hår 4.
3. Kronbladene 10-18mm hirsutum
 " 5-9 mm parviflorum
4. Støvfanget 4-lappet 5.
 " kølleformet 7.
5. Midterbladene med kileformet grund og stilk på 3-10mm lanceolatum
 " " afrundet grund og stil på 1-3 mm 6.
6. Bladene 4-8cm. Frugtknudens flader med udstående kirtelhår montanum
 Bladene 1½-4cm. Frugtknudens flader uden kirtelhår collinum
7. Bladene bredest nær midten, smalt elliptiske roseum
 " " under " , m.m. lancetformede 8.
8. Kronbladene 10-12mm tournefortii
 " 4-8 mm 9.
9. Øvre stængelblade helt glatte, ofte lyst grønne .. tetragonum
 " " med håret rand, mørke- eller grågrønne 10.
10. Bægeret tættere håret ved grunden. Uden udløbere lamyi
 " jævnt håret. Ofte med udløbere obscurum

E. angustifolium L. Gederams. Korsika. Sj.

E. hirsutum L. Lådden dueurt. VII-IX. Alm.

E. parviflorum Schreber Dunet dueurt. VI-VIII. Sj.

E. montanum L. Glat dueurt. VI-VIII. Alm.

E. collinum Gmelin Bakkedueurt. Står nær den foregående. Frugtknudernes flader tæt, tiltrykt hårede, uden kirtelhår. Bladoversiden ofte noget skinnende. Øvre stængelblade ofte spredte. Blomsterknopper næsten kuglerunde og butte. VI-VIII. Sj.

E. lanceolatum Seb.& Mauri Stænglen dunet. Blomsterne først hvide, senere rødlig. Fugtige klipper, kløfter. VI-VII. Sj.

Epilobium tetragonum L. Kantet dueurt. V-VII. Sj.

E. lamyi Schultz Rank dueurt. V-VII. Korsika. Sj.

E. tournefortii Michalet Stænglerne med 4 fremtrædende ribber. Bægeret 8-10mm. Støvfanget sidder oftest over støvknapperne under blomstringen. V-VII. Sj.

E. obscurum Schreber Risdueurt. VI-VII. Sj.

E. roseum Schreber Rosendueurt. VII-VIII. Sardinien. M.sj.

HALORAGACEAE

Myriophyllum verticillatum L. Kranstusindblad. Oftest 5 blade i krans. Kamdelte dækblade. VI-IX. Sardinien. Sj.

M. spicatum L. Akstusindblad. 4 blade i krans. VI-IX. Sj.

M. alterniflorum DC. Hårtusindblad. Øvre blomster spredte. VII-IX. M.sj.

THELIGONACEAE

Theligionum cynocrambe L. Hundekål. 2-15cm. Fuglegræslignende, stinkende enårig med opsvulmede stængelled. Nedre blade modsatte, øvre spredte. Stærkt reducerede, særkønnede blomster i bladhjørnerne. II-IV. Alm.

CYNOMORIACEAE

Cynomorium coccineum L. Maltersersvamp. 10-20cm høj, mørkerød, kødet, svampelignende, kølleformet snylteplante. IV-V. Langs kysten. Snylter på Atriplex halimus, Obione og Inula crithmoides. Sardinien. M.sj.

CORNACEAE

Cornus sanguinea L. Rød kornel. V-VI. Alm.

ARALIACEAE

Hedera helix L. Vedbend. IX-X. M.alm.

UMBELLIFERAE

1. Stænglen krybende og rodslående. Bladene udelte eller svagt delte....Hydrocotyle 2.
 Disse karakterer ikke forenede
2. Alle blade helrandede Bupleurum 3.
 " " tandede eller delte, sj. de øvre helrandede
3. Blomsterne i et tæt hoved. Planten oftest tornet ... Eryngium 4.
 " i skærm eller dobbeltskærm
4. Bladene tornede Echinophora 5.
 " ikke tornede
5. Planten 2½-4 cm høj. På kystkliner Naufraga 6.
 " højere
6. Frugten tornet 7.
 " ikke tornet 13.
7. Bladet håndfliget Sanicula 8.
 " fjersnitdelt
8. Storsvøbet 3-kløvet til fjersnitdelt Daucus 9.
 " udelte eller manglende
9. Storsvøbet manglet eller er reduceret 10.
 " veludviklet 11.
10. Frugten 6-12mm, dens torne rettede til alle sider .. Caulalis 12.
 " 2-5 mm, dens torne opadrettede Torilis
11. Skærmstrålerne tæt hviddunede Pseudorlaya 12.
 " ikke " " "
12. Storsvøbet mindst ½ x de glatte skærmstråler Orlaya 12.
 " under ¼ af de beborstede " Turgenia

13. Bladene med stjernehaar på undersiden. Blomsten gul Opopanax
" uden " 14.
14. Frugtens næb 1-4 x frugten Scandix
" kortere end frugten 15.
15. Frugtens randribber tydeligt vingede eller fortykkede 16.
" " ikke " " 27.
16. Frugtens rand fortykket Tordylium
" vinget 17.
17. Kronbladene gule 18.
" hvide 23.
18. Bladene flere gange 3-5-delte med linjeform.afsnit Peucedanum
" fjerfinnede 19.
19. Bladene enkelt fjersnitdelte Pastinaca
" 2-flere x " 20.
20. Storsvøbet flerbladet Cachrys
" 0-3-bladet 21.
21. Frugtens vinger smalle Ferula
" mindst så brede som frugten selv 22.
22. Yderste bladflige hårtynede Elaeoselinum
" linjeformede, 1½-4mm brede Thapsia
23. Frugtens rygribber også m.m. vingede 24.
" ikke vingede 26.
24. Alle frugtens vinger smalle Ligusticum
I det mindste randribberne brede 25.
25. Rygribberne mindst ½ x så brede som randribberne Laserpitium
" højst ¼ x så " " Rouya
26. Enårig Aethusa
Flerårig Angelica
27. Blomsterne gule 28.
" hvide 35.
28. Frugten mindst 3 x så lang som bred Kundmannia
" under 3 x så lang som bred 29.
29. På eller ingen stor- og småsvøblade 30.
Mange stor- og småsvøblade 33.
30. Bladafsnittene trådformede 31.
" brede 32.
31. Flerårig eller toårig. Ca. 20 ulige lange skærmstråler
Enårig. Ca. 40 m.m. lige lange skærmstråler Foeniculum
Flerårig. Grundbladene enkelt fjersnitdelte Pimpinella lutea
Toårig. Grundbladene 3-delte Smyrnum
33. Bladene kødede, kystplante Crithmum
" ikke kødede 34.
34. Småsvøbet bredt hindekantet Seseli tortuosum
" ikke " Petroselinum
35. Frugten mindst 3 x så lang som bred 36.
" højst 3 x så " " 38.
36. Frugten uden ribber. Næbbet veludviklet Anthriscus
" med " og uden næb 37.
37. Frugten dunet. 1-3 skærmstråler Myrrhoides
" glat. 6-12 " Chaerophyllum
38. Frugten rynket 39.
" ikke rynket 40.
39. Frugten længere end bred Capnophyllum
" bredere end lang Bifora
40. Småsvøb mangler 41.
" til stede 42.
41. Planten dunet Pimpinella
" glat Apium graveolens
42. Frugten med tydeligt, blivende bæger Oenanthe
" uden " " 43.
43. Storsvøbet 3-delt eller fjersnitdelt Berula + Ammi
" udelte 44.

44. 40-50 skærmstråler. Grundbladene udelte eller lappede
3-24 " Magydaris 45.
45. Alle blade findelte, 2-3 x delte 46.
Nogle blade 1 x delte med brede afsnit 50.
46. Stænglen rødplettet forneden Conium
" ikke rødplettet 47.
47. Enårig. Bladfligene trådformede, 0,3-0,7mm brede ... Ammoides
Flerårig. " bredere 48.
48. Frugten bredest under midten Physospermum
" " på eller over midten 49.
49. Planten med underjordisk knold. Derfor ingen rigtige
grundblade Bunium
Planten uden knold, med normale grundblade Seseli
50. Storsvøbet ofte 3-delt eller fliget Berula
" udelte 51.
51. Frugten aflang, 2-3 x så lang som bred Ptychotis
" rund eller ægformet, 1-1½ x så lang som bred 52.
52. Frugten bredest under midten Sison
" " på midten Apium

Hydrocotyle ranunculoides L. Bladstilkene 10-30cm. Bladpladen m.m. nyreformet og håndlappet, ikke skjoldformet. Bladstilkene 2-3 mm tyk, kødet. Grøfter og sumpe. IV-VII. Sardinien: Tanca di Nizza, Oristano. M.sj.

H. vulgaris L. Vandnavle. V-VII. Korsika. M.sj.

Naufraga balearica Constance & Cannon 2½-4cm høj. Grundbladene 5-10mm med 3-5 afsnit. 1 krans af 3-delte stængelblade. 2-4 enkle skærme i en krans. V-VI. Skyggefulde kløfter på kalkklinter nær kysten. Korsika. M.sj.

Sanicula europaea L. Sanikel. V-VII. Alm.

Eryngium. Mandstro.

1. Hovederne med 12-25 svøblade barrellieri 2.
" " 3-7 " 3.
2. Svøbladene 1-2½cm brede, bladlignende maritimum
" smalle 3.
3. Grundbladene fjersnitdelte campestre 4.
" hele 4.
4. Svøblade hele og helrandede corniculatum
" torntandede tricuspidatum

Eryngium barrellieri Boiss. 10-30cm. 1-2-årig. Grundblade 7-10cm, linje-lancetformede. Hovederne siddende i stænglens gaffelgreninger, 5-8mm brede, op til 30 stk. Svøblade linjeformede, 1-2cm, helrandede eller med 1(-2) par torne. Vintervåde steder. V-VI. Sj.

E. maritimum L. Strandmandstro. VI-IX. Alm.

E. tricuspidatum L. 20-70cm. Flerårig. Grundblade m.m. runde med hjerteformet grund, takkede eller trelappede. Blomsterstanden grøn med 2-8 hoveder på 1cm. Svøbladene med 5-8 par torne. VI-IX. Udyrkede og stenede steder. Sardinien. Alm.

E. campestre L. Bjærgmandstro. 20-70cm. Flerårig. Bladene 2-3 x fjersnitdelte, tornede. Blomsterstanden bleggrøn med mange hoveder. Svøblade linjeformede, helrandede eller med 1(-2) par torne. VII-IX. Alm.

E. corniculatum Lam. 10-60cm. Toårig. Grundblade ægformet aflange, tidligt visnende, med lang og opsvulmet stilk. De øvre blade mere tandede og tornede. Op til 40 hoveder på 5-10mm. Vintervåde steder. VI-VIII. Sardinien: Tempio, Cantoniera di Padula. M.sj.

Echinophora spinosa L. Hvid pigskærm. 20-50cm. Flerårig, m.m. dunet. Bladene 2 x delte med stive, tykke, tornspidsede afsnit, der er kølede nedenunder og furede ovenpå, $1\frac{1}{2}$ -3mm brede. Skærmen med 6-10 stråler, hvidblomstret. Svøbbladene tornede. Sandstrand. VI-IX. Lokalt almindelig.

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon Knudeskærm. 30-100cm. Enårig. Stænglen stivhåret, ofte purpuranløben, m.m. opsvulmet under stængelledene, glat og m.m. blådugget foroven. Bladene tæt stivhårede, 2 x delte. Skærmen med 2-3 stråler. Skov og krat. V-VI. Sj.

Chaerophyllum temulum L. Hulsvøb. V-VII. Sj.

Anthriscus silvester (L.) Hoffm. Vild kørvel. VI-VII. Korsika. Sj.

A. cerefolium (L.) Hoffm. Havekørvel. Enårig. 2-6 skærmstråler. Frugten 5-6 x så langs som bred, glat. IV-VI. Sardinien. Forvildet.

A. caucalis Bieb. Gærdekørvel. Enårig. 2-6 skærmstråler. Frugten ca. 3 x så lang som bred, oftest stivbørstet. V-VII. Korsika. Sj.

Scandix. Jomfrukam. Enårige, 10-35cm, kendelige på det lange næb.

1. Småsvøbet bredt hindekantet. Midterfrugten m.m. siddende
Småsvøbet lidet hindekantet. Midterfrugten stilket 2. *australis*
2. Frugten $1\frac{1}{2}$ cm. Næbbet under 2 x selve frugten *brachycarpa*
" 2-8cm. " mindst 2 x " " 3.
3. Griflen $1-2\frac{1}{2}$ mm. Næbbet 3-4 x selve frugten *pecten-veneris*
" 0,4-0,75mm. Næbbet 2-3 x selve frugten *macrorhyncha*

Scandix australis L. jomfrukam. IV-VI. Sardinien.

S. brachycarpa Guss. IV-VI. ?

S. pecten-ceneris L. Alm. jomfrukam. IV-VI. Mest udbredte art.

S. macrorhyncha C.A.Meyer IV-VI.

Bifora testiculata (L.) Roth Hulfrø. 20-40cm. Enårig. 1-3 skærmstråler. Frugten består af to m.m. kugleformede delfrugter og ligger derfor noget et liggende 8-tal. Markukrudt. III-V. Alm.

Smyrnum. Guldskærm. Gulblomstrede, 2-årige planter. Frugterne æg-kugleformede, ofte bredere end lange.

S. olusatrum L. Stor guldskærm. 30-120cm. Bladene 3-koblede, der efter 1-2 x fjersnitdelte med brede, ægformede afsnit. Øvre stængelblade mindre delte. Frugten sort. I-V. Alm.

S. perfoliatum L. Lundgylden. 30-120cm. Øvre blade udelte, gennemvoksede, ægformede, rund-savtakke. Stænglen svagt vinget langs kanterne. III-V. Sardinien. Sj.

S. rotundifolium Miller 20-60cm. Som foregående, men de øvre stængelblade m.m. helrandede, og stænglen uvinget. III-V. Sardinien: Alm. Korsika: Sj.

Bunium. Jordkastanje. Flerårige med underjordisk knold og derfor uden normal grundbladsroset. Bladflige linjeformede.

B. bulbocastanum L. 30-100cm. 10-20 skærmstråler, der ikke er fortykkede. Markukrudt. V-VII. Sj.

B. pachypodum P.W.Ball 20-50cm. 6-15 skærmstråler, der fortykkes ved modenhed og bliver stive. 6-8 storsvøbblade. Kornmarker. V-VI. Korsika: Porto Vecchio. Sj.

B. corydalinum DC. 3-20cm. 3-5 skærmstråler. på 1-2cm. 1-5 storsvøbblade, sylformede. Stenede græsgange. V-VI. Sj.

Pimpinella lutea Desf. 60-140cm. Nedre blade ca. 20cm., 1 x delte med 3-5 par brede, m.m. rundtakke afsnit på $2\frac{1}{2}$ -6cm. Få gule skærme med 3-5 stråler. Frugten glat. V-VI. Korsika. Sj.

Pimpinella peregrina L. Hårfrugtet pimpinelle. 50-100cm. Toårig. Grundebladene enkle, hjærteformede; efterfølgende 1 x fjersnitdelte med 2-4 par brede afsnit; de øverste med linjeformede afsnit. 8-50 tynde skærmstråler. Frugten med udstående hår. V-VII. Alm.

Pimpinella saxifraga L. Alm. pimpinelle. VI-VIII. Sardinien. Sj.

Berula erecta (Hudson) Coville Sideskærm. VI-VIII. Alm.

Crithmum maritimum L. Stranddild. 10-50cm. Glat flerårig med 1-2 x delte blade med kødede, linje-lancetformede afsnit. 8-36 skærmstråler. Grønliggule blomster. Kystklipper. VI-VIII. Alm.

Seseli. Hjortetrod. Bladene smalflegede.

1. Nedre blade 1-3 x 3-koblede. Frugten 4-6mm *bocconi*
- " " 2-4 x fjersnitdelte. Frugten $1\frac{1}{2}$ -3mm 2.
2. Stænglen gaffelgrenet og m.m. zigzagbøjet *tortuosum*
" opret og ikke zigzagbøjet *djianeae*

● S. djianeae Gamisans. 13-26cm. Noget blågrøn. Yderste bladafsnit 1-3mm. Grundbladens stilk ved grunden udvidet i en hindeagtig stilk. Klipper. 1200-1700m. VII-IX. Korsika: M. Cinto i Val di Giargia. M.sj.

S. bocconi Guss. 30-60cm. Yderste bladafsnit oftest 3-fligede. Bladene læderagtige. Ingen storsvøbblade, mange småsvøbblade. Kalkklipper, især langs kysten. X-XI. Sj.

S. tortuosum L. 20-70cm. Toårig. Bladene 3-4 x delte, med kødede afsnit. 3-10 skærmstråler, der er dunede på indersiden. Bredt hindekantet småsvøb. Kronbladene hvidgule. Frugten dunet. VIII-X. Sj.

Oenanthe. Klaseskærm.

1. Skærmene kortstilkede, modsat stængelbladene 2.
" langstilkede og endestillede 4.
2. Skærmen med 5-15 stråler. Rødderne ikke fortykkede .. *aquatica*
" med 2-4(-7) " " tenformet fortykkede 3.
3. Stænglen furet. Griflen $\frac{2}{3}$ x den 5 mm lange frugt . *globulosa*
" stribet. " $\frac{1}{3}$ x den $3-3\frac{1}{2}$ mm " " *lisae*
4. Skærmen med 2-3 stråler. Stænglerne let sammentrykkelige
" Skærmen med 4-40 stråler. Stænglerne stivere *fistulosa* 5.
5. Skærm- og frugtstilke fortykkede 6.
" - og " tynde 7.
6. Grundbladens afsnit ægformede. Stænglen fyldt *pimpinelloides*
" " smalle. Stænglen hul *siliaifolia*
7. Grundbladens afsnit ægformede. Stænglen hul *crocata*
" " smalle. Stænglen fyldt *lachenalii*

Oenanthe globulosa L. Kugleklaseskærm. 30-50cm. IV-VI. Sardinien. Alm.

● O. lisae Moris 10-40cm. Sumpe. V-VI. Midt- og Nordsardinien. Sj.

O. fistulosa L. Vandklaseskærm. V-VII. Sj.

O. pimpinelloides L. Valseklaseskærm. V-VII. Alm.

O. siliaifolia Bieb. Knoldklaseskærm. VI-VII. Sj.

O. lachenalii Gmelin Engklaseskærm. VI-VIII. Sj.

O. crocata L. V-VI. Alm.

O. aquatica (L.) Poiret Billebokklaseskærm. V-VI. Korsika. Sj.

Aethusa cynapium L. Hundepersille. VII-IX. Korsika. Sj.

Foeniculum vulgare Miller Fennikel. 40-150cm. 2-flerårig. Blågrøn. Bladene 3-4 x delte med trådformede afsnit. Oftest intet stor- og småsvøb. VI-VII. Alm. 2 underarter:

ssp. vulgare: 12-25 skærmstråler. Oftest 2-årig. Bladafsnittene oftest over 10mm. Dyrket og forvildet.
ssp. piperitum (Ucria) Cout.: 4-10 skærmstråler. Flerårig. Bladafsnittene oftest under 10mm. Den vilde form.

Kundmannia sicula (L.) DC. Guldmarke. 30-70cm. Glat flerårig. Nedre blade 1-2 x fjersnitdelte med ægformede, savtaktede afsnit. Stor- og småsvøb mangebladet. Frugten 6-10mm. V-VI. Alm.

Physospermum cornubiense (L.) DC. Stjernesvøb. 50-120cm. Flerårig. Grundbladene langstilkede, 3 x 3-koblede med omvendt lancetformede afsnit. Stængelbladene reducerede til skeder. Stor- og småsvøb mangebladet. Egeskov. VII-VIII. Korsika. Sj.

Conium maculatum L. Skarntyde. VI-IX. Sj.

Cachrys. Nøddeskærm. Frugterne store, 7-15mm, med brede ribber, der kan være m.m. tandede. Gule blomster.

C. sicula L. Tandet nøddeskærm. Frugten 10-15mm med m.m. kantandede ribber. Midterskærmen med (1-2) x fjersnitdelt storsvøb. 30-150cm høj. Sand og tørre græsgange, især nær kysten. VI-VII. Sardinien. Sj.

C. libanotis L. Kærret nøddeskærm. Frugten 7-10mm. Ribberne uden tænder, m.m. bølgede. Storsvøbet enkelt eller 2-3-kløvet. Tørre græsgange. VI-VII. Sardinien: ved Fertilia. Sj.

Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. Valkefrø. 100-250cm. Flerårig. Grundbladene enkle eller kort 3-7-lappede. Stængelbladene 1 x fjersnitdelte med 1-2 par ægformede lapper. Bladene læderagtige, mørkegrønne ovenpå. Storsvøbbladene 5-6cm med hvid hindekant. Småsvøbet 2½cm. Frugten tåhåret. Krat nær kysten. V-VI. Sardinien. Sj.

Bupleurum. Hareøre.

- | | |
|--|----------------|
| 1. Flerårig | 2. |
| Enårig | 4. |
| 2. Lille busk på 1-2m | fruticosum 3. |
| Urter | |
| 3. Småsvøbbladene ca. ½ sammenvoksede | stellatum |
| " indbyrdes frie | falcatum |
| 4. Bladene ægformede og stængelomfattende | 5. |
| " smalle, ikke | 6. |
| 5. 4-10 skærmstråler. Frugten 3-3½mm | rotundifolium |
| 2-3 " " 3½-6mm | lanceolatum |
| 6. Småsvøbbladene bredt lancetformede, ofte overlappende, med stak | 7. |
| " smalt " " ikke uden " | 8. |
| 7. Småsvøbbladene med svage, fremadrettede tværårer | baldense |
| " med tydelige, ombøjede tværårer | fontanesii |
| 8. De større blade kølede på undersiden | praealtum 9. |
| Bladene flade | |
| 9. 30-60cm. Bladene 8-20cm | gerardi |
| 3-30cm. " ½-5 cm | semicompositum |

Bupleurum rotundifolium L. Rundbladet hareøre. 15-75cm. Blågrøn og ofte purpuranløben. Småsvøbbladene store og ægformede, gulgrønne. Markukrudt. V-VI. Sj.

B. lancifolium Hornem. Blomsterhareøre. Ligner foregående. Småsvøbbladene fundagtige. IV-VI. Alm.

B. stellatum L. Stjernehareøre. 20-40cm. Mange linje-lancetformede grundblade på 15-25cm. Støttebladene tilsmalnede fra en ægformet grund. Storsvøbet som de øvre stængelblade, men kortere. Klipper. VII-VIII. Korsika: M.Rotondo, M.Renoso. Incudine m.m.

B. baldense Turra. Stakhareøre. 5-70cm. Storsvøbbladene 10-20x2-3 mm, med gennemskinnelig kant og næppe sammenløbende tværårer. IV-VII. Alm.

Bupleurum fontanesii Guss. Nethareøre. 5-30cm. Storsvøbblade lancetformede, brodspidsede, hvidlige og halvgennemskinnelige i frugt, 3-9-ribbede med tværårer, der går fremad og sa bøjer brat tilbage. IV-VI. Sardinien. Sj.

B. praealtum L. Sivhareøre. 30-50cm. Skov, rydninger. V-IX. Sardinien. Sj.

B. gerardi All. Børstehareøre. 30-60cm. Bladene ofte m.m. seglkrummede. Åbne skove, rydninger. VIII-IX. Korsika. Sj.

B. tenuissimum L. Smalbladet hareøre. Leret, oftest saltholdig jord. VIII-IX. Alm.

B. semicompositum L. 3-30cm. Frugten 5-6mm, dækket af små, hvide papiller. Især på saltholdig jord. IV-VI. Alm.

B. falcatum L. Seglhareøre. 30-80cm. Bladene lancetformede, jævnt fordelte langs stænglen. Denne noget gaffelgrenet. Skærmen med 7-11 stråler. Tørre skrænter, rydninger, krat. VII-VIII. Korsika. Alm.

Apium graveolens L. Selleri. V-IX. Dyrket og forvildet. Sj.

A. nodiflorum (L.) Lag. Spredtblomstret sumpskærm. 30-100cm. Flerårig, nedliggende til opstigende, rodslående. Bladene 1 x delte med 3-6 par m.m. ægformede, regelmæssigt tandede småblade. 5-12 skærmstråler. 5-7 hvidt hindekantede småsvøbblade. Grøfter, sumpe. V-VII. Alm.

A. crassipes (Koch) Rchb. Tykstilket sumpskærm. 10-40cm. Vandplante, der ligesom A. inundatum har findelte undervandsblade samt 1 x fjersnitdelte luftblade. 3-5 skærmstråler. Frugstilkene med fortykket grund. Stillestående vand. IV-VI. Alm.

Petroselinum sativum Hoffm. Havepersille. V-VI. Dyrket og forv.

Ridolfia segetum Moris. Smalflig. 30-80cm. Glat, stinkende enårig. Øvre blade ofte reducerede til den opblæste bladstilk. 10-60 nogenlunde ens skærmstråler. Kornmarker. V-VI. Sj.

Sison amomum L. Krydderskærm. 30-60cm. Toårig. Kvalmende duft ved knusning. Nedre blade 1 x delte med 5-9 æg-lancetformede, undertiden lappede småblade. De øvre smalfligede. 3-6 uens skærmstråler. 2-4 stor- og småsvøbblade. VI-VIII. Sj.

Ammi visnaga (L.) Lam. Kostfligsvøb. 20-60cm. Enårig. Smalfliget. Storsvøbet 1-2 x fjersnitdelt. 30-50(-150) skærmstråler, der bliver oprette og fortykkede i frugt. Fugtig, leret jord. V-IX. Alm.

A. majus L. Fligsvøb. 30-60cm. Enårig. Nedre blade 2-3 x delte med lancetformede afsnit; de øvre smalfligede. Storsvøbet 3-kløvet eller fjersnitdelt. 15-30(-60) tynde skærmstråler. V-VII. Alm.

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barr. Foldøre. 30-70cm. Glat toårig. Grundbladene med ægformede, tandede til noget lappede afsnit. De øverste blade med linjeformede flige. 5-12 skærmstråler. 2-3 affaldende storsvøbblade. 3-6 børsteformede småsvøbblade. Udyrkede steder. VI-VIII. Sj.

• P. sardoa Pign. & Metl. Ligner den foregående, men 4-6 kraftige skærmstråler (0,3-0,5mm tykke). 1-4, delvist vedvarende storsvøbblade. Kalkurer og oprodet jord. 800-1000m. VI-VII. Mellemsøst-Sardinien: Montalbo ved Siniscola.

Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. Hårskærm. 10-50cm. Enårig. Stænglen blågrøn, til sidst rødlig. Nedre blade med lancetformet omrids, 2 x delte med 0,2mm hårfine afsnit. 5-11 uens skærmstråler. Intet storsvøb. Småsvøbet med 4-6, dels linjeformede og dels skeformede blade. IV-VI. Sj.

● Ligusticum corsicum Gay 10-60cm. Flerårig. Jordstænglen med mange, grove fibre. Bladene med lancetf. omrids, 3-4 x delte med $\frac{1}{2}$ mm brede flige. 7-10 skærmstråler. 1-5 affaldende storsvøbblade. Blomsterne lyserøde med mørkpurpur grifler. Græsgange og klipper. 1150-2700m. Korsika: M.Cinto, Rotondo, Renoso, Incudine, Bavella.

Angelica silvestris L. Angelik. VI-VIII. Korsika. Alm.

Capnophyllum peregrinum (L.) Lange Rynkefrø. 10-50cm. Glat enårig. Bladene 3 x delte, jordrøglignende. 2-5 skærmstråler. Storsvøb 0-3. Småsvøbblade 4-6. IV-V. Sardinien. Sj.

Ferula communis L. Alm. ferle. Flerårig. 1-2m. Stænglen meget kraftig, blågrøn-violet. Nedre blade 30-60cm, 4-6 x delte med linjeformede afsnit. Øvre blade efterhånden reducerede til store skeder. Endeskærmen omgivet af mindre sideskærme. 20-40 skærmstråler. V-VI. Alm.

Opopanax chironium (L.) Koch Stor gummirod. 1-2m. Nedre blade 2 x delte, indtil 80cm store, med ægformede afsnit på 5-8x3-5cm med finttandet rand. Grenene i krans eller modsatte. 9-25 skærmstråler. Lancetformede svøbblade. V-VII. Sardinien. Alm.

● Peucedanum paniculatum Loisel. 80-120cm. Nedre blade 20-40cm. Mange skærme i en bred top. 10-20 skærmstråler. Blomsterne bleggule. Frugten 10-15mm. Klipper, buskads. 300-1500(-2200)m. Syd-korsika. Sj.

Pastinaca sativa L. Pastinak. VII-VIII. Alm. Forekommer som ssp. divaricata (Desf.) Rouy & Cam., med håret, trind stængel og en endeskærm, der er meget større end sideskærmene.

● P. latifolia (Duby) DC. Som foregående, men nedre bladstilke op til 1 cm tykke, svampede. Bladenes sideribber meget tydelige. Fugtige steder. 0-1000m. VI-VIII. Korsika. Alm. i nord og midten, mindre hyppig sydpå.

Tordylium. Skjoldfrø. Frugten kredsrunder med kraftigt fortykket rand hele vejen rundt. Enårig.

T. maximum L. 30-50cm. Stænglen med kraftige, nedadrettede, stive hår. Bladenes endearfsnit lancetformet, 2 x så langt som bredt. Frugten stivhåret. V-VII. Alm.

T. apulum L. 10-60cm. Stænglen blødt dunet af udstående hår. Bladenes endearfsnit ægformet med hjerteformet grund. Frugten blødhåret. Blomsten med 1 stort kronblad på 4-6mm (de ydre blomster). V-VII. Alm.

Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. Hvidvinget olieskærm. 50-120 cm. Flerårig. Stænglen med fibre ved grunden. Nedre blade 20-40cm, 3-5 x delte med hårtynde, ofte kransstillede afsnit. 8-25 skærmstråler. Frugten 8-15mm, med brede, hvidlige vinger. VI-X. Sj. Sardinien. Her som ssp. meoides (Desf.) Fiori

Laserpitium. Foldfrø. Kendelig på de brede rygribber.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Storsvøbet ikke randhåret, ofte manglende | 2. |
| " randhåret, altid mangebladet | 3. |
| 2. Bladafsnittene helrandede | <u>garganicum</u> |
| " tandede | <u>nestleri</u> |
| 3. Bladene tæt og fintfligede, afsnittene 1 mm brede | <u>halleri</u> |
| " mere åbent og bredtfligede (2-10mm) | <u>gallicum</u> |

Laserpitium garganicum (Ten.) Bertol. (L. siler L. ssp. g.) 20-50 cm. Grundbladene 10-25cm, 2-3 x delteafsnittene bredt lancetformede, med ganske finttandet rand.(lup). 10-20 skærmstråler. VI-VII. Sardinien: Angivet fra Monti d'Oliena.

Laserpitium nestleri Soy.-Will. 50-100cm. Bladene 2-3 x delte med 18-30mm lange, rundtakked-tandede afsnit. 10-30 skærmstråler. 1-3 affaldende storsvøbblade. VI-VII. Sardinien. M.Linas. Gl.fund.

L. halleri Cr. 30-50cm. Stænglen med fibre ved grunden. Bladene skinnende, de nedre med trekantet omrids (15x10cm). 10-25 skærmstråler. 12-14 hvidkantede storsvøbblade. 1300-2400m. VII-VIII. Korsika. Her som den endemiske ssp. cynapifolium (Viv.) Fourn.

L. gallicum L. 30-150cm. Stænglen med fibre ved grunden. Nedre blade ca.50cm, med trekantet omrids, 3-5 x delte med ofte 3-fligede afsnit. 20-50 skærmstråler. 800-2000m, sjældent ned til 200m. VII-VIII. Sardinien: Isola Tavolara.

Thapsia garganica L. Storfrugtet vingeskærm. 30-250cm. Flerårig. Stænglen med fibre ved grunden. Nedre blade 10-40cm lange, 2-3 x delte med smalle afsnit med omrullet rand. Undersiden lysere. 5-20 skærmstråler. Intet svøb. Frugten 12-25mm, med 3-6mm brede, dybt udrandede, let bølgede vinger. V-VII. Sardinien. Alm.

Rouya polygama (Desf.) Coincy Hvid vingeskærm. 10-30cm. Flerårig. Nedre blade 2 x delte med ofte 3-kløvede eller tandede afsnit. Stænglen foroven med hvide, skællignende bladgrunde. Storsvøbet ofte 3-delt, randhåret. Frugten ca.8mm, med 1-1 $\frac{1}{2}$ mm brede, bølgede, dybt udrandede vinger. Sandstrande. VI-VII. Sardinien: Arbatax, Portoscuso. Korsika: Portovecchio.

Torilis japonica (Houtt.) DC. Hvast randfrø. 4-6 storsvøbblade. VI-VIII. Korsika. Alm.

T. arvensis (Hudson) Link Markrandfrø. Som foregående, men 0-1 storsvøbblade. 3 underarter:

ssp. arvensis: 4-12 skærmstråler.

ssp. elongata (Hoffm. & Link) Cannon: 2(-4) skærmstråler, der er ret kraftige og oftest danner en vinkel på 90°.

ssp. purpurea (Ten.) Hayek: (2-)3(-4) skærmstråler, der er spinkle og oftest danner en vinkel på 45°-60°.

Torilis nodosa (L.) Gaertner Liggende randfrø. 20-60cm. Liggende eller sjældnere opret. Skærmene siddende eller kortstilkede, modsat bladene. III-VIII. Alm.

Caucalis platycarpos L. Fodangel. 5-30cm. Opret, enårig. Bladene 2-3 x delte, fintfligede, med trekantet omrids. 2-5 skærmstråler. Frugten 6-13mm, med krogede torne. Kornmarker. V-VII. Korsika. Alm.

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Burrenskærm. 20-40(-60)cm. Enårig. Bladene 1 x fjersnitdelte med tandede eller fjerfligede afsnit, dunede til stivhårede på undersiden. Langstilkede skærme med 2-5 stråler og bredt hvidkantede svøbblade. Kronbladene ca.5mm, hvide, lyserøde eller purpurrøde. Frugten 6-10mm. V-VI. Sj.

Orlaya kochii Heyw. Fladfrugtet bredfrø. 10-30cm. Stivhåret enårig. Bladene 2-3 x delte med aflange afsnit. Skærmene med 2-3 stråler, 2-3 lancetformede storsvøbblade af strålerens længde og ægformede småsvøbblade. Ydre kronblade 2-3 x de andre. Frugten 10-15mm med lange torne af frugtens bredde. V-VI. Alm.

Daucus muricatus (L.) L. 10-30cm. Enårig. 8-14, meget uens skærmstråler, der er m.m. sammentrængte i frugt. Frugtens torne sølvhvide. Ydre kronblade større end de andre. V-VI. Sardinien: Sj. Korsika: Indslæbt.

Daucus carota L. Vild gulerod. Opret eller opstigende. Storsvøbet med linjeformede flige. Skærmen sammentrængt i frugt til en fugle-rede. Frugtens torne så lange som dens bredde. 3 underarter:

ssp. carota: Endeskærmen 5-10cm. Yderste bladafsnit 2-3 x så lange som brede. IV-X. M.alm.

ssp. maritimus (Lam.) Batt.: Endeskærmen 3-5cm. Yderste bladafsnit ca. 10 x så lange som brede. Især langs kysten. Sj.

ssp. maximus (Desf.) Ball: Endeskærmen 12-20(-30)cm. Yderste blad-afsnit ofte under 2 x så lange som brede. Sj.

Daucus gingidium L. Kystgulerod. (D. gummifer All.) Nedliggende-opstigende. Storsvøbet med lancet- eller linje-lancetformede flige. Skærmen ikke eller lidet sammentrængt i frugt. Frugtens torne $\frac{2}{3}$ -1/3 x dens bredde. Klipper. Sandstrand. III-XII. 4 underarter:

1. Bladafsnittene af 1. og 2. orden danner en ret vinkel med skaftet .. ssp. mauritanicus
Bladafsnittene af 1. og 2. orden danner en spids vinkel med skaftet 2.
2. Bladene oftest tæthårede ssp. fontanesii
" svagt hårede, glatte eller ru 3.
3. Bladene over 20cm. 2. ordens afsnit fjerfligede med æg eller lancetformede afsnit ssp. gingidium
Bladene under 20cm. 2.ordens afsnit oftest 3-tandede eller lancetfligede ssp. polygamus

Pseudorlaya pumila (L.) Grande Sandskærm. 5-20cm. Tæthåret enårig. Bladene 2-3 x delte. Oftest 3 skærmstråler. 2-5 grønne, linjeformede storsvøblade. Kronbladene hvide eller rødlige. Frugten 7-10x5-6mm med torne på $2\frac{1}{2}$ -3mm med udvidet grund. Sandstrand. IV-V. Sj.

P. minuscula (Pau) Lainz Som den foregående, men frugten 5-6x2 $\frac{1}{2}$ -3mm med torne på $\frac{1}{2}$ -1mm uden udvidet grund. Sandstrand. IV-V. Sardinien. M.sj.

PYROLACEAE

Pyrola minor L. Liden vintergrøn. Griflen 1-2mm, indelukket i blomsten. VI-VII. Korsika. Sj.

P. chlorantha Sw. Grønlig vintergrøn. Griflen fremragende, bøjet. VI-VII. Korsika. Sj.

Moneses uniflora (L.) Gray Enblomstret vintergrøn. VI-VII. Korsika. M.sj.

Monotropa hypopitys L. Snylterod. VI-VII. Korsika. Sj.

ERICACEAE

Erica

1. Kronen lyserød 2.
" hvid eller grønlig 3.
2. Kronen 5-7mm, støvdragerne skjulte terminalis
" 4-5mm, " rager lige frem multiflora
3. Kronen hvid arborea
" grønlig scoparia

Erica terminalis Salisb. Busk på 1-2 $\frac{1}{2}$ m. Bladene 3-5 $\frac{1}{2}$ mm, i kranse på 4, ufuldstændigt omrullede. Beskyggede, fugtige klipper. VI-VII. Sj.

E. arborea L. Trælyng. 1-5m høj busk eller træ med rødbrun bark. Unge kviste hvidfildede. Bladene 3-5mm, i kranse på (3-)4. Blomsterne i sidestillede klaser samlede i endestillede toppe. Kronen 2 $\frac{1}{2}$ -4mm. III-V. Alm.

E. multiflora L. Kratlyng. Op til 80cm. Bladene 6-11mm, i kranse på 4-5, helt omrullede, så undersiden dækkes. IX-XI. Alm.

E. scoparia L. Grønblomstret lyng. 30-150(-250)cm. Bladene 7-9mm i kranse på 3-4, undersiden kun 2/3 dækket af den omrullede rand. Kronen 1 $\frac{1}{2}$ -3mm med skjulte støvdragere. V-VI. Alm.

Calluna vulgaris (L.) Hull Hedelyng. Korsika. VIII-XI. Gl. fund.

Arbutus unedo L. Jordbærtræ. Busk eller træ på 1-8m. Unge kviste med kirtelbørster. Bladene 4-11x1 $\frac{1}{2}$ -4cm, stedsegrønne, læderagtige, skinnende ovenpå med finttandet rand og en stilk på 1cm. Hvidlige, krukkeformede blomster på 6-10mm i hængende klaser. Frugten et rødt bær på 2cm med papilløs overflade. X-XI. Alm.

Vaccinium myrtillus L. Blåbær. VI-VII. Korsika. Sj.

PRIMULACEAE

Primula vulgaris Hudson Storblomstret kodriver. II-III. Korsika.

Cyclamen hederifolium Aiton Vedbendbladet alpeviol. Bladene hjerteformede med 5-9 takker. Kronen bleg rød eller hvid med purpurfarvet grund. VIII-X. Alm.

C. repandum Sibth. & Sm. Tandet alpeviol. Bladene hjerteformede, uregelmæssigt tandede, ofte lysbrogede. Kronen ensfarvet rødlilla, sjældent bleg med mørk grund. IV-V. Alm.

Lysimachia vulgaris L. Alm. fredløs. VI-VIII. Korsika. Alm.

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby Stjerneheer. 3-12cm. Glat enårig, friskgrøn, opret plante. Bladene linje-lancetformede, spidse, helrandede, modsatte, 3-7x $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ mm. Stjerneformet bæg på 3-6mm og en meget lille, hvid krone. III-V. Alm.

Anagallis. Arve.

1. Kronen mindre end bægret. Blomsten oftest 4-tallig ... minima 2.
2. " lig eller større end bægret. Blomsten 5-tallig 2.
2. Kronen 11-20mm i tværmål, lyserød eller blå. Flerårig monelli 3.
- " mindre 3.
3. 1-2-årig. Kronen rød eller blå 4.
- Flerårig. " hvidlig crassifolia
4. Kronen 4-6mm i tværmål, af bægrets længde parviflora 5.
- " 8-10mm i " , længere end bægret 5.
5. Kronen med få eller ingen randhår, altid blå foemina 5.
- " " mange randhår, rød eller blå arvensis

A. minima (L.) Krause Knudearve. VI-VII. Sj.

A. crassifolia Thore Tykbladet arve. 5-15cm, krybende og rodslående. Bladene spredte, skinnende, kadede og m.m. runde. Blomsterne stilke kortere end bladene. Kronen 3-6mm, tragtformet. Fugtigt sand. VI-VIII. Sydvestsardinien: Portoscuso. M.sj.

A. arvensis L. Rød arve. Blomsterne kan også godt være blå, hvorved planten ligner følgende art. IV-X. M.alm.

A. foemina Miller Blå arve. Som foregående, men de øvre blade ofte lancetformede. Blomsterstilkene ofte kortere end bladene under blomstringen. IV-X. Alm.

A. parviflora Hoffm. & Link Blomsterne altid blå. Bladene stængelomfattende. Blomsterstilkene 2-3 x deres blade. Mudder, fugtig jord. V-IX. Sj.

A. monelli L. Pragtarve. 10-50cm. Opret eller opstigende. Bladene lancetformede eller linje-lancetformede, spidse, 2-3 sammen. Blomsterstilkene krumme, 2-5cm. III-VI. Sardinien. Sj.

Samolus valerandi L. Samel. VI-IX. Sj.

Coris monspeliensis L. Pigkrans. 10-30cm. 2-flerårig. Virker lyngagtig i vækst og blade. Tætte endestillede klaser af rødlilla blomster. Bægret klokkeformet med 2 rækker tænder, hvoraf den yderste er sylformet og udstående. Kronen 9-12mm, tolåbet med lille overløbe. Krat og tørre enge. III-V. Vestsardinien. Sj.

PLUMBAGINACEAE

Plumbago europaea L. Blyrod. Flerårig urt, 30-100cm. Nedre blade langstilkede ægformede, øvre siddende, øreformat omfattende, med melet underside. Bægeret 5-7mm, tæt stikkirtlet på ribberne. Kronen blåhvid med et rør på $1\frac{1}{2}$ x bægeret. VI-X. Sj.

Armeria. Fåreleger.

1. Bladene stikkende. Flergrenet dværgbusk pungens
" ikke stikkende 2.
2. Korsika 3.
Sardinien 5.
3. Hovedets tværmål 16-25 mm leucocephala
" " 12-18 mm 4.
4. Bladene 1-3 cm lange multiceps
" 4-10cm " soleirolii
5. Bladene 5-12 mm brede morisii
" $\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ mm " 6.
6. Indre blade trådformede, 4-8 cm lange sulcitana
" " 1-5 cm lange sardoa

• Armeria morisii Boiss. Bladene 2-5(-10)cm x 5-12mm, med smal hindkant, 3-ribbede. Skaftet 15-25cm med en skede på 13-15mm. Kronen blegt lyserød. 1000-1300m. V-VIII. Sardinien: Sopramonte ved Orgosolo og Oliena.

• A. sardoa Sprengel. Bladene 1-ribbede, 1-5cm lange, spidse, de ydre indtil 2mm brede, de indre under 1mm. Mange skafter på 4-40cm med skeder på 5-10mm. Hovedet 10-14mm i tværmål. De ydre svøblade større end de andre. Kronen blegt lyserød til rødlig. Klipper og stenede græssange. V-VII. Sardinien. Alm. 2 underarter:
ssp. sardoa: Indre blade oftest under 3cm, tydeligt længere end de ydre. Skaftet 10-40cm, opret. Alm fra 800 til ca. 1500m
ssp. genargentea Arrig.: Bladene oftest under 3cm, de indre lidt længere end de ydre. Skaftet 4-20cm, spinkelt. Gennargentu over 1500m fra Bruncu Spina til P. Paolina og omkring Rif. Lamarmora.

• A. sulcitana Arrig. Ydre blade 1-3-ribbede, flade, indtil 2mm brede, de indre trådformede og forlængede, 4-8cm, m.m. sammenrullede. Skaftet 15-40cm. Hovedet 13-15mm på tværs, skeden af samme længde. 800-1200m. SV-Sardinien: M. Santo di Pula, M. Linas. M. sj.

• A. leucocephala Salzm. Bladene 2-6cm x 1,3-1,8mm, ensartede, 1-ribbede, brodspidsede. Skaftet 10-30cm med en skede på $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ x hovedet. Kronen hvid. 700-2300m. V-VIII. Sj. 3 underarter:
ssp. leucocephala: Planten m.m. glat. Midtkorsika. VII.
ssp. pubescens (Salis) Arrig.: Planten m.m. håret. Hovedet ca. 20mm i tværmål. Sydkorsika: Monti di Cagna.
ssp. breviaristata Arrig.: Planten m.m. håret. Hovedet 12-16mm i tværmål. Nordkorsika: Capo Corso.

• A. multiceps Wallr. Rosetten lille, tæt pudeformet. Bladene ofte udstående, 1-ribbede, ensartede, 1-3cm x $\frac{1}{2}$ mm. Skaftet 3-20 med en skede på 5-8mm. Kronen lyserød. 1200-2600m. VII-IX. Korsika: M. Cinto, M. Rotondo, M. d'Oro, M. Renoso, M. Incudine, P. di Fornello, C. di Bavella, M. Coscione. Sj. 2 underarter:
ssp. multiceps: Bladene 1-2cm. Skaftet 2-9cm. Mest udbredte ssp.
ssp. meridionalis Arrig.: Bladene $1\frac{1}{2}$ -5cm. Skaftet 5-15(-20)cm. Den lavere del af Col di Bavella og M. Coscione.

• A. soleirolii (Duby) Godron. Bladene 4-10cm x 1-2mm, let duede. Skaftet 15-25cm med en skede på 9-12mm. Kronen bleggrød eller hvid. Kystklipper. VI-VII. Korsika: Calvi. M. sj.

A. pungens (Link) Hoffm. & Link. Stikkende fåreleger. 10-40cm. Rosetterne tætte, bladene 6-15cm x 1- $3\frac{1}{2}$ mm, ensartede, furede og m.m. indrullede, 1-ribbede. 1-3 skafter pr. roset med skeder af hovedets størrelse (2-3cm). Kronen lyserød. Sandstrand. V-VII. Korsika. Nord- og Midsardinien til Capo Mannu.

Limonium. Hindebæger.

1. Bladene lappede sinuatum
" helrandede 2.
2. Enårig 3.
Flerårig 4.
3. Småaksene sidder 5-20mm fra hinanden echioides
" " 2-5 mm " " longispicatum
4. Blomsterstanden højst med få golde grene 5.
" " s nedre halvdel overvejende med golde grene 10.
5. Bladene fjerstrengede, 10cm eller mere serotinum
" een- eller ligestrengede 6.
6. Bægerribberne under blomstringen ankeragtigt udadbøjede
og noget tornede longispicatum
Bægerribberne anderledes 7.
7. Bladet 1-ribbet. Planten 10-25cm laetum
" 3-9-ribbet. Planten 20-50cm 8.
8. Bladet skeformet, 15-25mm bredt, 5-9-ribbet lausianum
" ikke skeformet, 10-11(-20)mm bredt, 3-5-ribbet 9.
9. 6-8 småaks pr. cm. Aksene 1-2cm glomeratum
1-5 " pr. cm. densissimum
10. Højbladene overvejende hindeagtige bellidifolium
" " urteagtige 11.
11. Toppens led bredest midtpå (articulatum s.l.) 12.
" " cylindriske 14.
12. Topleddens midtertykkelse 2 x endetykkelsen articulatum
" " $\frac{6}{5}$ - $\frac{5}{4}$ x endetykkelsen 13.
13. Bladene spatelformede, de store 20-28x3-4mm dolcheri
" sylformede, 8-12x1,2-2,5mm tibulatum
14. Bladene spredte på tætbladede, forveddede grene 15.
" i roset 18.
15. Bladet spidst, højst 2mm bredt 16.
" but, $1\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ mm bredt 17.
16. Bladet $\frac{1}{2}$ -1mm bredt. Topgrenene næsten parallelle tenuifolium
" 1-2mm " " med vinkler på 30-40° acutifolium
17. Plantens grene lange, indtil 50cm. Toppen reduceret obtusifolium
" " korte. Toppen veludviklet, 5-8cm nymphaeum
18. Bægerribberne under blomstringen ankeragtigt udadbøjede
og noget tornede longispicatum
" anderledes 19.
19. Topleddene stærkt rynket-knude merxmuelleri
" anderledes 20.
20. Indre højblad tydeligt hindekantet 21.
" " kun hindekantet i spidsen 22.
21. Bladene 1- $1\frac{1}{2}$ mm brede hermaeum
" 3-8 mm " morisianum
22. Topleddene lange, længst forneden. Grenvinklerne indtil 45° 23.
" korte, ens lange. Grenvinklerne 45°-120° 24.
23. Småaksene 1-blomstrede. Bægeret 6-7mm dictyocladum
" mest 2-5-blomstrede. Bægeret 5-6mm virgatum
24. Bladene 3-ribbede pignattii
" 1-ribbede 25.
25. Topleddene 2-4mm korte. Toppen regelmæssigt netgrenet sardoum
" 1-2cm lange. Toppen uregelmæssigt grenet 26.
26. Grenvinklerne 60°-90°. Indre højblade $5\frac{1}{2}$ -6mm divaricatum
" 45°. Indre højblad $3\frac{1}{2}$ -4mm racemosum

Limonium sinuatum (L.) Miller. Bugtet hindebæger. Bladene med 4-7 par lapper. Kronen bleggul eller lyserød, omgivet af et oftest violet bæger. Tørre, noget salte steder. V-VII. Sj.

L. serotinum (Rchb.) Pign. (L. vulgare Miller ssp. s.) VI-IX. Sj.

Limonium bellidifolium (Gouan) Dum. Gaffelhindebæger. Bladene 14-40x3-6mm, spidse, ofte visne under blomstringen. Toppen talrige, danner ofte en hel halvkugle. Indre højblad hindeagtigt bortset fra kølen. VI-VIII. Sardinien. Sj.

• L. articulatum (Loisel.) Kuntze Toppen stærkt- og tætgrenet, skør. VI-VIII. Korsika og Nordsardinien. De følgende 3 er de hidtil udskilte småarter.

• L. articulatum s.str. 5-15cm høj. Bladene væk under blomstringen. Nordsardinien ved Capo Testa, Padrongiano og Tavolara.

• L. dolcheri (Pign.) Pign. 15-27cm. Bladene til stede under blomstringen. Nordsardinien i Gallura fra Castelsardo til P.ta Capriccioli, Tavolara.

• L. tibulatum (Pign.) Pign. 3-10cm. Bladene til stede under blomstringen. Nordsardinien: S.Teresa di Gallura.

• L. acutifolium (Rchb.) Salmon Nordsardinien: S.Teresa til M.Russu.

• L. obtusifolium (Rouy) Erben Sydkorsika ved Bonifacio.

• L. nymphaeum Erben NV-Sardinien: Alghero, Capo Caccia, Bosa

• L. tenuifolium (Bertol.) Erben Sardinien: Fra Nurra til Gallura, Asinara, Maddalena-øgruppen, Tharros.

• L. morisianum Arrig. Nøgne og skyggefulde kalkklipper. 600-1200m. VII-IX. Midtsardinien: Monti di Lula, Oliena og Orgosolo.

• L. hermaeum (Pign.) Pign. Kystklipper og bjærgland. 0-500m. VI-VII. Sardinien: S.Teresa: Sj. Tavolara: Alm.

• L. laetum Pign. Saltholdige strandlavninger. VI-VIII. NV-Sardinien: Asinara. Sj.

• L. merxmülleri Erben Zink- og blyholdige slaggebunker. 0-200m. VIII-X. Sardinien: Ved Iglesias ved Monteponi-minerne. M.sj.

L. divaricatum (Rouy) Brullo VI-VIII. Alm.

• L. racemosum (Lojac.) D.Corr. Sardinien: Miocenkalk Øst for Sassari, langt fra kysten.

L. virgatum (Willd.) Fourr. Rishindebæger. (L. oleifolium Miller) Kendelig på sine bananagtigt krumme småaks. VI-VIII. Alm.

• L. dictyocladum (Boiss.) Kuntze Korsika. Sardinien?

L. pignattii Brullo VI-VIII. Sj.

L. longispicatum Erben Bredder af saltsøer. V-VII. Sardinien: Cagliari. Sj.

L. densissimum (Pign.) Pign. s.l. Sardinien og Korsika?

L. glomeratum (Tausch) Erben 40-50cm. Sardinien: Cagliari, Carloforte, S.Antioco, Capo S.Marco, Terranova, Olbia.

• L. lausianum Pign. VI-IX. Sardinien: Tharros, Capo S.Marco. M.sj.

L. echioides (L.) Miller Enårigt hindebæger. Bladene utydeligt fjernervede, fintknudrede. Småaksene 2-blomstrede, banankrummede. Saltholdig jord. V-VII. Sardinien: Cagliari. Sj.

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. Buskhindebæger. Ligner Limonium, men en dværgbusk på 50-120cm med grenede, bladede stængler. Bladene spatelformede, kødede, blågrønne. Aksene 5-10cm lange. Kronen 1-2cm på tværs, lyserød. Strandsumpe. VI-VIII. Sardinien. Sj.

OLEACEAE

Fraxinus ornus L. Bjærgask. 2-4 par 2-6mm langt stilkede småblade. Knopperne grålige eller brunlige, m.m. blåduggede. Kronblade til stede, hvide, 5-6mm lange, linjeformede, i oprette, oftest endestillede toppe. IV-V. Alm.-sj.

F. oxycarpa Bieb. (F. angustifolia Vahl ssp. o.) 2-6 par smalt lancetformede småblade. Unge kviste glatte, skinnende grønne. Knopperne mørkebrune. XI-I. Sj.

Olea europaea L. Oliventræ. Op til 15m. Grå, udstående, ofte noget kantede grene. Bladene modsatte, oftest lancetformede med mørkt grågrøn, glat overside og lysegrå underside. IV-VI. Alm.

Phillyrea. Stenved. Stedsegrønne buske eller træer. Kvistene trinde. Bladene modsatte. Blomsterne 4-tallige i korte, akselstillede klaser, små. Frugten en m.m.rund, blåsort stenfrugt på 6-10mm.

P. angustifolia L. Smalbladet stenved. 1-3m. Bladene smalt lancetformede, 2-8cm x 3-15mm, helrandede med 4-6 par svage sideribber. III-V. Alm.

P. latifolia L. Bredbladet stenved. 1-5(-15)m. Bladene af 2 slags. De unge ægformede, 2-7cm, m.m. savtakke; de ældre lancetformede til elliptiske, 1-6cm, helrandede eller fint savtakke. 7-11 par oftest tydelige sideribber, der er bølgede og tydeligt delte mod spidsen. III-V. Alm.

GENTIANACEAE

Cicendia filiformis (L.) Delarbre Bitterblad. 3-12cm. Opret enårig. Få bladpar med 2-6mm linjeformede blade. Blomsterne 4-tallige, langstilkede med en gul krone på 4-5mm. Fugtig jord. Skovstier. IV-V. Sj.

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel Spidsbæger. 1-10cm. Spinkel, hyppigt grenet enårig med spidse, linje-lancetformede bladpar på 2-10mm. Blomsterne 4-tallige. Bægeret med lange, sylformede tænder. Kronen gul med et langt rør, hvidgul eller lyserød, 5-6mm. Dynd, fugtige stier. V-VIII. M.sj.

Blackstonia. Bitterling. Enårig, glat blågrøn, 10-60cm. Kronen hjulformet, gul, 6-12-tallig. Bladene ofte parvist sammenvoksede.

1. Blomsterne 8-12-tallige, 20-35mm på tværs grandiflora
2. " " 6-8- " , under 15mm i tværmål 2.
3. Øvre stængelblade ikke eller næppe tilsmalnede mod grunden 3.
4. " " tydeligt tilsmalnede mod grunden 3.
5. Øvre stængelblade smalt forbundne ved grunden serotina
6. " " ikke eller næppe forbundne imperfoliata

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson Bægertænderne linjeformede, 1-ribbede. V-VIII. Alm. Spydbitterling.

B. serotina Koch VI-VIII. Sardinien. Sj.

B. imperfoliata (L.f.) Samp. Lancetbitterling. VI-VIII. Korsika. M.sj.

B. grandiflora (Viv.) Pau Storblomstret bitterling. V-VI. Sardinien. Sj. Korsika?

Centaureum. Tusindgylden.

1. Kronen gul maritimum
2. " rød 2.
3. Blomsterne i aksformet kvast spicatum
4. " i halvskærmformet kvast 3.
5. Toårig. Bladrosetten veludviklet under blomstringen erythraea
6. Enårig. " væk under blomstringen 4.
7. Stænglen oftest med 2-4 stængelled pulchellum
8. " " " 5-9 " tenuiflorum

Centaureum erythraea Rafn Marktusindgylden. Bægeret $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ x så langt som kronrøret. V-IX. 4 underarter:

1. Stænglen kun grenet i den øvre halvdel. Kronfligene butte ..2.
" oftest grenet fra grunden eller midten. Kronfligene spidse 3.
2. Kronfligene 5-6mm. Blomsterstanden åben ssp. rumelicum
" $2\frac{1}{2}$ -5mm. " tæt ssp. erythraea
3. Kronfligene 5-7mm, ca $\frac{1}{2}$ x røret ssp. rhodense
" 8-10mm, ca. 1 x røret majus

C. pulchellum (Sw.) Druce Liden tusindgylden. Stænglen oftest gaffelgrenet i den nedre halvdel. Blomsterne langstilkede, oftest i åben gaffelkvast. V-X. Alm.

C. tenuiflorum (Hoffm. & Lk.) Fritsch Kosttusindgylden. Stænglen grenet i den øvre halvdel. Blomsterne kortstilkede, oftest i en tæt gaffelkvast. IV-IX. Sj.

C. spicatum (L.) Fritsch Akstusindgylden. 10-55cm. 1-2-årig, oftest med bladrosset. Blomsterne 12-14mm. VI-X. Alm.

C. maritimum (L.) Fritsch Gul tusindgylden. 10-20cm. 1-2-årig. Blomsterne 20-25mm. IV-V. Krat og tørre enge. Alm.

Gentiana lutea L. Gul ensian. 40-120cm. Bladene mest ægformede til elliptiske, op til 25cm, buestregede med 5-7 årer. Blomsterne i krans med gul, dybt delt krone. VI-VII. Korsika: Sj. Sardinien: Gennargentu.

G. asclepiadea L. Svalerodsensian. 50-80cm. Bladene æg-lancetformede, spidse, 3-5-ribbede. Kronen blå, 35-50mm. Blomsterne i de øvre bladhjørner. Fugtige skove. VIII-IX. Korsika. Alm.

MENYANTHACEAE

Nymphoides peltata (Gmelin) Kuntze Søblad. Sardinien: Ariola. M.sj. VI-IX.

APOCYNACEAE

Nerium oleander L. Nerie. Busk indtil 4m. Bladene oftest i krans på 3, linje-lancetformede, op til 12cm, læderagtige, noget grågrønne med tætte kamlignende ribber og bruskagtig kant. 3-4cm brede, lyserøde, sjældent hvide blomster. Flodlejer og flodbredder. V-VII.

Vinca minor L. Liden singrøn. II-IV. Korsika. Alm.

V. difformis Pourret Bleg singrøn. Blomsterne større, 3-4 $\frac{1}{2}$ cm på tværs, med et rør på 12-15mm og flige på 10-16mm. Farven blegblå eller næsten hvid. II-IV. Sj.

① V. sardoa (Stearn) Pign. Blomsterne 5-7 i tværmål. Kronrøret 16-18mm og fligene 2 $\frac{1}{2}$ -4cm. Skove og hegn. Sardinien: Alghero, Tempio, Cagliari, Isola Maddalena. III-V.

ASCLEPIADACEAE

Gomphocarpus fruticosus (L.) Ait.f. Børstekapsel. Busk på 1-2m. Bladene modsatte, smalt lancetformede, 2-10cm x 3-10mm, helrandede og spidse. Blomsterne hvide, i skærme fra de øvre bladhjørner, 15-20mm i tværmål. Kapslen tenformet, 5x1cm, med masser af stive børster. VI-VIII. Grus og sand nær kysten. Sj. forvildet.

Cynanchum acutum L. Slyngeplante på op til 3m. Bladene spidst ægformede med dybt hjørteformet grund, 3-12cm, modsatte. Sammenstrængte skærme i bladhjørnerne på 1-6cm lange stilke. Kronen hvid eller blegrød, 8-12mm på tværs. Saltsumpe. Flodlejer. VII-VIII. Sardinien. Sj.

Vincetoxicum hirundinaria Med. Svalerod. V-VIII. Alm. 2 underarter:

ssp. hirundinaria: Bikronens afsnit adskilte af en hinde, der er $\frac{1}{2}$ så lang som afsnittene.
ssp. contiguum (Koch) Markgraf: Bikronens afsnit adskilte af en hinde, der er $\frac{1}{8}$ så lang som afsnittene, der derfor sidder tæt.

CONVOLVULACEAE

Cuscuta. Silke.

1. De 2 støvfang hovedformede 2.
De 2 " kølle- til trådformede 3.
2. Blomsten 4-tallig tinei
" 5- " suaveolens
3. Grifflerne kortere end frugtknuden 4.
" lig med eller længere end frugtknuden 5.
4. Stænglerne rigtgrenede. Kronen mest 4-tallig europaea
" næsten ugrenede. Kronen 5-tallig epilinum
5. Bægeret gyldent, skinnende og netåret approximata
" ikke sådan 6.
6. Blomsternøglerne 5-6mm i tværmål planiflora
" 7-10mm i " epithymum

Cuscuta tinei Inzenga (C. australis R.Br. ssp. t.) Stænglerne gulgrønne til orange. Blomsternøglerne tætte. Grifflerne kortere end den kugleformede frugtknude. På Pileurt og andre urter. V-IX. Korsika. Sj.

C. suaveolens Ser. Vellugtende silke. På dyrkede ærteblomster, især Lucerne og Kløver. V-IX. Korsika. Sj.

C. europaea L. Nældesilke. Især på Nælde og Humle, men også på andre planter. VI-IX. Alm.

C. epilinum Weihe Hørsilke. Stænglerne gulgrønne. På Alm. hør og andet ukrudt i hørmarker. VI-VIII. Sj.

C. epithymum (L.) L. Lyngsilke. Stænglerne mest røde eller purpurfarvede. VI-IX. På forskellige buske og urter. VI-IX. Alm.

C. planiflora Ten. Stænglen gullig. På dværgbuske og urter. V-VII. Sj.

C. approximata Bab. Bægeret i tør tilstand gennemsommeligt, minder om en fluevinge. Mest på buske. V-VII. Sj.

Cressa cretica L. Strandpude. Pudeagtig plante op til 30cm, grådunet. Bladene 2-10mm, ægformede med hjørteformet grund. Blegt lyserøde blomster i korte aks for enden af grenene, 3-5mm store med halvvejs delt krone. Sandstrand. V-VII. Sj.

Calystegia soldanella (L.) R.Br. Strandsnerle. Stænglerne nedliggende, lidet klatrende. Bladene nyreformede og noget kødede. Sandstrand. VI-VIII. Alm.

C. sepium (L.) R.Br. Gærdesnerle. V-IX. Sj.

C. silvatica (Kit.) Griseb. Skovsnerle. Ligner foregående, men blomsterne større: 5-9cm. Forbladene dækker bægeret helt og er 15-40mm brede i flad tilstand. IV-X. Sardinien. Alm.

Convolvulus. Snerle.

1. Bladene oftest siddende, med indsnævret grund 2.
" stilkede, med hjørte- eller spydformet grund 4.
2. Enårig. Kronen blå med gul grund pentapetaloides
Flerårig. Kronen lyserød eller hvid 3.
3. Stænglen i det mindste forneden udstående håret .. cantabrica
" tiltrykt silkehåret lineatus
4. Kronen blå sculus
" hvid eller rød 5.

5. Kronen hvid (blegt rød). Bladene hele *arvensis*
 " lyst rødlilla. De øvre blade fligede 6.
 6. Planten med udstående, ofte brunlige hår *althaeoides*
 " " tiltrykte, sølvhvide hår *elegantissimus*

Convolvulus lineatus L. 3-25cm. Tæt silkehåret, forveddet ved grunden, med nedliggende til opstigende stængler. Bladene med en udvidet og hindeagtig grund. Blomsterstilkene kortere end de tilhørende blade. Kronen 15-25mm, lyserød. Tørre skrænter. III-VI. Korsika. Sj.

C. cantabrica L. Stænglerne dunede, ofte oprette. De nedre blomster langstilkede. Kronen 15-25mm, lyserød. 20-50cm. Tørre skrænter, krat. V-X. Alm.

C. pentapetaloides L. Klokkesnerle. 10-30cm. Nedliggende med udstående hår. Bladene omvendt lancetformede. Kronen 7-10mm, 2 x bageret og ret indskåret. III-VI. Sardinien. Sj.

C. siculus L. Blå snerle. 10-60cm. Svagt dunet, nedliggende, sjældent klatrende. Bladene lancet- til ægformede med hjerteformet grund. Kronen blå, 7-10mm. III-V. 2 underarter:

ssp. siculus: Forbladene bladagtige, sidder lige under bageret og dækker en stor del af det. Alm.

ssp. agrestis (Schweinf.) Verdc.: Forbladene trådformede, sidder et stykke under bageret og dækker det ikke. Sardinien. Sj.

C. arvensis L. Agersnerle. IV-X. M.alm.

C. althaeoides L. Katostsnerle. 30-60cm. Klatrende. De nedre blade uregelmæssigt trekantede, de øvre næsten helt delte i 5-8 flige, hvoraf den midterste er grofttandet. Kronen lyst rødlilla, 2-3cm i tværmål. IV-VI. Alm.

C. elegantissimus Miller Syvfliget snerre. 30-60cm. Ligner den foregående art, men bladene helt delte i 7 smalle, helrandede flige. IV-VI. Alm.

BORAGINACEAE

1. Kronen uregelmæssig 2.
 " regelmæssig 3.
 2. Svælgskele findes *Anchusa arvensis*
 " mangler *Echium*
 3. Kronen cylindrisk med korte, oprette tænder, oftest hængende 4.
 " foroven med 5 m.m. udstående tænder 5.
 4. Planten håret *Symphytum*
 " helt glat *Cerinth*
 5. Kronen hvid 6.
 " af en anden farve 7.
 6. Højblade mangler *Heliotropium*
 " findes *Lithospermum*
 7. Ingen svælgskele 8.
 Med " 11.
 8. Kronen gul 9.
 " blå 10.
 9. Blomsterne i tætte, ensidige svikler *Lithospermum apulum*
 " spredte i bladhjørnerne *Alkanna lutea*
 10. Planten med udstående hår på over 1 mm ... *Alkanna tinctoria*
 Evt. udstående hår under 1 mm *Lithospermum*
 11. Delfrugterne korttornede, fritsiddende *Cynoglossum*
 " ikke tornede 12.
 12. Blomsterstanden m.m. uden højblade *Myosotis*
 " med højblade 13.
 13. Kronen hjulformet *Borago officinalis*
 " med veludviklet kronrør 14.
 14. Blomsterstilkene 2-3 cm *Borago pygmaea*
 " kortere *Anchusa*

Heliotropium. Skorpionsurt.

1. Flerårig *curassavicum*
 Enårig 2.
 2. Bladene grågrønne på begge sider *europaeum*
 " hvidfildede i det mindste på undersiden *supinum*

Heliotropium europaeum L. Alm. skorpionsurt. 5-40cm. Ofte opret. Bladene m.m. ægformede, tiltrykt dunede, med en stilk på 1-1½cm. Sviklen bispestavsformet. Kronen 2-5mm, tværmålet 2-4mm. Bageret delt til grunden. VI-XI. Alm.

H. curassavicum L. 20-50cm. Nedliggende, glat, ret blågrøn og kødet. Bladene linje-spatelformede, op til 4x1cm. Sviklerne ikke bispestavsformede, 2-6cm. Kronen 1-2½mm. Grus- og sandstrand. VI-VIII. Sardinien: Cagliari, Carloforte. (Amerika).

H. supinum L. Lav skorpionsurt. 10-30cm. Minder om *H. europaeum*, men hvidfildet, med opret midtergren og nedliggende sidegrene. Bageret højst ¼ delt, opsvulmet og pæreformet i frugt. VII-IX. M.sj.

Lithospermum. Stenfrø.

1. Kronen gul *apulum*
 " hvid eller blå 2.
 2. Bladene med tydelige sidestrenge. Flerårig *officinale*
 Sidestrenge utydelige 3.
 3. Flerårig. Kronen 14-19mm, mørkeblå *purpureocaeruleum*
 Enårig. Kronen 4-9mm 4.
 4. Bageret med spredte hår og spidse flige 5.
 " meget tæt stivhåret, med butte flige *minimum*
 5. Frugtstilkene cylindriske *arvense*
 " kølleformet fortykkede mod spidsen *gasparrinii*

Lithospermum officinale L. Lægestenfrø. V-VII. Sj.

L. apulum L. 5-25cm. Enårig, stivhåret, halvskærmagtigt grenet foroven. Bladene m.m. linjeformede. Sviklerne tætte og ensidige. Den gule krone 6-6½mm. III-V. Alm.

L. purpureocaeruleum L. Blåt stenfrø. 15-60cm. M.m. oprette stængler fra en rodstock i større bevoksninger. Bladene lancetformede, 3½-8cm, spidse. Kronen først rødlilla, senere mørkeblå. Tørre løvskove. IV-VI. Sardinien. Sj.

L. arvense L. Rynket stenfrø. I-VI. Alm.

L. gasparrinii Heldr. 3-20cm. Ligner foregående, men grenet fra grunden med nedliggende sidegrene og oftest opret midtergren. Kronen blå til blålilla. IV-VII. Sardinien. Sj.

L. minimum Moris 2-10(-27)cm. Bageret 1½-3mm, i frugt indtil 6 mm., så langt som det halvde kronrør. Kronen oftest blå. IV-V. Sardinien: Cagliari. M.sj.

① *Cerinth tenuiflora* Bertol. 20-50cm. Blågrøn flerårig. Grundbladene lancet-spatelformede, 15-25cm. Stængelbladene ægformede med hjerteformet omfattende grund. Kronen 10-12mm, 3-4mm bred, højst 2 x så lang som bageret. IV-V. Korsika. Sj.

C. major L. Storblomstret voksur. 20-80cm. Enårig. Som foregående, men kronen 15-20(-30)mm lang og 5-8mm bred, over 2 x så lang som bageret. XII-VI. Alm.

Alkanna tinctoria (L.) Tausch Farvestilkfrø. 8-20cm. Flerårig. Kraftigt stivhåret, hårene op til 2mm. Sviklerne tætte, med højblade på 10-12mm. Bageret delt næsten til grunden. Kronen 6-7mm i tværmål. Nødderne stilkede. III-V. Sardinien. Alm.

Alkanna lutea DC. Enårigt stilkfrø. 20-80cm. Langt stivhåret enårig. Grundblade mangler. Stængelbladene elliptisk-lancetformede. Højbladene store, mindst 2 x bageret, langs den spredtblomstrede klase. Kronen 5-7mm i tværmål. IV-VI. Sj.

Echium. Slangehoved.

1. Alle støvdragerne indesluttende i kronen 2.
Mindst 1-2 fremragende støvdragere 3.
2. Bageret i blomst 6-8mm, i frugt indtil 15mm med ved
grunden 3-6mm brede flige. ... parviflorum
Bageret i blomst 5-7mm, i frugt indtil 10mm med ved
grunden 2-3mm brede flige arenarium
3. Kronen bleg italicum
" blå eller rødlilla 4.
4. Kronen m.m. glat, kun håret på kanter og årer .. plantagineum
" m.m. jævnt håret 5.
5. Oftest kun 1-2 fremragende støvdragere 6.
" 3-5 " " vulgare
6. Stænglen opstigende med et underlag af opret-udstående hår
sabulicolum
" opret, med et underlag af nedadrettede hår creticum

Echium italicum L. Blegt slangehoved. 35-100cm. Grundbladene 20-30cm. Stænglen opret, de øvre børster med en grøn knude på grunden. Blomsterstanden aksformet eller oftere stærktgrenet og pyramideformet. Kronen 10-12mm, lyst gråbrun med 4-5 langt udragende støvdragere. IV-VII. Alm.

E. vulgare L. Alm. slangehoved. IV-IX. Alm.

E. plantagineum L. Purpurslangehoved. 20-60cm. Opret. Blødhåret. Kronen 18-30mm, først blå, så purpur, så lyserød, kun håret på årer og kanter. Oftest 2 udragende støvdragere. III-VII. Alm.

E. sabulicolum Pomel. Strandslangehoved. 30-50cm. Oftest opstigen- de, stivhåret. Kronen 12-22mm, lyserød til mørkeblå eller mørklilla. Vejkanten, marker og sandede steder nær kysten. III-V. Sydkorsika. Vest- og Sydsardinien. Sj.

E. creticum L. Tungeslangehoved. 25-60cm. Kronen 25-35mm, tragtformet, oftest rødlilla. III-V. Sj.

E. arenarium Guss. 15-25cm. Opstigende. Bladene med hvidlige, korte, tiltrykte børster. Kronen 6-10mm, mørkeblå, m.m. rørformet. Sandede steder nær kysten. III-V. Sj.

E. parviflorum Moench 10-40cm. Opstigende til opret. Bladene med tiltrykte børster. Kronen 10-14mm, blegblå med mørkere rand, m.m. rørformet. III-V. Sj.

Symphytum officinale L. Lægekulsukker. V-VII. Sardinien. Sj.

S. bulbosum Schimper 20-40cm. Kronen 8-11mm, bleggul. Svælgskæl- lene lancet-sylformede, rager 1-4mm ud af kronen. Skove, hegn, udyrkede steder. III-IV. Alm.

Anchusa. Oksetunge.

1. Kronen uregelmæssig, lyseblå arvensis
" regelmæssig 2.
2. Bageret højest delt til midten 3.
" delt næsten til grunden 5.
3. Bladene 8-17mm brede. Kronen 7-15mm i tværmål officinalis
3-10mm " " 3-5 mm i " 4.
4. Højbladene lig eller længere end bageret crispa
" kortere end bageret hybrida
5. Nedre højblade bladlignende, meget længere end bageret litorea
" " højest 2 x bageret 6.
6. Bladranden kruset undulata
" plan 7.

7. Kronen mørkelilla. Frugtbageret 8-10mm officinalis
" dyblå. " 10-15mm azurea

Anchusa hybrida Ten. 20-50cm. Flerårig. Bladene linje-lancetforme- de, spidse, oftest med kruset rand. Kronen blå med et rør på 5-8mm og en krave på 3-5mm i tværmål. V-IX. Alm.

A. undulata L. Bølget oksetunge. 20-50cm. Toårig. Ligner foregåen- de, men kronrøret 8-13mm og kraven 6-8mm i tværmål. III-IX. 2 ssp.: ssp. undulata: Højbladene æg-lancetformede, omtrent af bagerets længde. Bladene 10-15cm. Sand og klitter. NV-Sardinien fra Alghero til Castelsardo og andetsteds. Sj.
ssp. capellii (Moris) Valsecchi: Højbladene æg-hjærteformede, kor- tere end bageret. Bladene 8-10cm. Klipper og tørre enge. Ca. 1200m. SØ-Sardinien nær Esterzili. M.sj.

• A. crispa Viv. 10-30cm. Toårig. Stivhåret af 2-3mm lange børster. Oftest nedliggende. Bladene med kruset rand. Kronen blå. Sand og klitter. NV-Sardinien: Alghero, Stintino, Porto Torres. Korsika: Bonifacio, Propriano, Portigliolo, C.Corso. Sj. IV-IX.

• A. litorea Moris 10-20cm. Toårig. Ligner den foregående, men mere opret. Bladene oftest spidse. Sand og klitter. V-Sardinien: Orista- no, Isola di S. Pietro. Sj. III-V.

A. officinalis L. Lægeoksetunge. V-VIII. Korsika. Sj.

A. azurea Rchb. Blå oksetunge. (A. italica Retz.) 30-80cm. Flerå- rig. Sviklerne forlænges i frugt, så bægerene sidder 1-2cm fra hin- anden. Kronens tværmål 9-13mm. IV-VII. Alm.

A. arvensis (L.) Bieb. Krumhals. V-VIII. Korsika: Sj. Sardinien: Indslæbt.

Borago officinalis L. Hjulkrone. 20-60cm. Enårig, stivhåret af 2-3mm lange børster. Bladene bredt lancetformede. Kronen med et ganske kort, hvidligt rør og vandret udstående, mørkeblå kronflig- ge på op til 15mm. Støvdragerne med 6mm lange støvknapper, samle- de i en slags rør. IV-VIII. Alm.

• B. pygmaea (DC.) Chater & Greuter 30-70cm. Flerårig, nedliggende. Stængelbladene lancetformede, lysere på undersiden og med fremtræ- dende, m.m. netformede årer. Blomsterstilkene 2-3cm, tynde, nedbø- jede efter blomstringen. Kronen blå, klokkeformet, ca. 1cm. Fugtige skove, kløfter, kilder. Mest 200-800m. III-XI. M.sj.

Myosotis. Forglemmigej.

1. Bageret med rette, tiltrykte hår 2.
" med hagekrummede, udstående hår 5.
2. Blomsterstanden med højblade til spidsen pusilla
Øvre blomster uden højblade 3.
3. Blomsterne 2-radede stillede, kun de nederste stilke
længere end frugtbageret sicala
Blomsterne ikke 2-radede. Frugstilkene længere end bageret 4.
4. Bageret fliget til midten. Nedre bladundersider med
fremadrettede hår caespitosa
Bageret 2/5 fliget. Nedre bladundersider med tilba-
gerettede hår nemorosa
5. Flerårig 6.
Enårig 7.
6. Stænglerne næsten glatte. Kronen lyseblå corsicana
" hårede. Kronen hvidgul til blegblå soleirolia
7. Kronen først lysegul, siden lyserød og blå discolor
" lyseblå 8.
8. Nedre frugstilk 2 x bageret arvensis
Frugstilkene sjældent længere end bageret 9.

9. Kronrøret forlænges under blomstringen. Frugstilkken kortere end bægeret congesta
Kronrøret forlænges ikke under blomstringen. Frugstilkken ca. = bægeret ramosissima

Myosotis pusilla Loisel. Enårig. 2-7cm. Nedliggende. Ofte stærkt grenet og pudeformet. Bladene mørkt grågrønne. Blomsterstilkene tykke. III-IV. Alm.

M. arvensis (L.) Hill Markforglemmigej. IV-VII. Alm.

M. ramosissima Rochel Bakkeforglemmigej. IV-VI. Alm.

M. discolor Pers. Forskelligfarvet forglemmigej. IV-VI. Sj.

M. congesta Shuttlew. Kronen lmm i tværmål. Sandede marker. Vejkanter. IV-VI. Korsika. Sj.

• M. soleirolii G. & G. Ligner Skovforglemmigej. Frugstilkene højst 2mm. Kronens tværmål 4mm. Fugtige stenskrænter, bjærgbække. IV-VII. Korsika: Rotondo, Renoso, Incudine. Alm.

• M. corsicana (Fiori) Grau Grundbladene med glat underside og få børster på oversiden. Stengelbladene også med glatte undersider. Blomsterstilkens øverste del også med kroghår. 1950-2600m. VII-VIII. Korsika: M. Rotondo, M. Renoso. Sj.

M. nemorosa Besser Lundforglemmigej. Ligner vær hjemlige Engforglemmigej. VI-VIII. Sj.

M. caespitosa C.F. Schultz Sumpforglemmigej. (M. laxa Lehm). VI-VIII. Korsika. Sj.

M. sicula Guss. Kronen skålformet, op til 3mm på tværs. Fugtige enge. 0-1300m. Sj.

Cynoglossum. Hundetunge.

1. Kronen bleg med blå årer creticum 2.
2. Kronfligene hårede clandestinum 3.
3. Kronen rødbrun. Blomsterne uden højblade officinale 3.
- " rødlilla, blålilla til blå. Med højblade cheirifolium

Cynoglossum officinale L. Alm. hundetunge. Sj.

C. creticum Miller Året hundetunge. 20-60cm. Grågrøn. Frugstilkene ofte nedadbøjede. IV-VI. Alm.

C. clandestinum Desf. 30-50cm. Gulligt håret. Sviklerne oftest med højblade. Bægertænderne butte, ægformede. Kronen lyst blålilla. IV-V. Sardinien. Sj.

C. cheirifolium L. Filtet hundetunge. 10-40cm. Grå- eller gulfiltet. Kronen først lyst rødlilla, siden blålilla eller mørkeblå. Frugstilkene ofte udadkrummede. IV-VI. Sardinien. Alm.

VERBENACEAE

Vitex agnus-castus L. Kyskhedstræ. Busk på 1-6m. Unge grene but 4-kantede. Bladene modsatte, 5-7-fingrede med hvidfiltet underside og smalt lancetformede, helrandede småblade. Blomsterne lyslilla i lange Buddleya-lignende aks. Især flodlejer nær kysten. V-VIII. Sj.

Verbena officinalis L. Jærnurt. Lyslilla læbeblomster i lange, smalle, for neden spredtblomstrede aks med spredtsiddende blomster. Bladene modsatte, rude-spatelformede, lappede til fligede. I-XII. M.alm.

V. supina L. Lav jærnurt. Enårig, ofte nedliggende, tathåret med kortere aks op til 8 cm og 1-2 x fjerfligede blade. Fugtig, udyrket jord. V-IX. Sardinien. Sj.

Lippia. Kølbæger. Krybende, flerårige urter med modsatte, rude-spatelformede, m.m. tandede blade. Blomsterne i tætte, hovedformede aks på 2-4cm lange stilke fra bladhjørnerne. Blomsterne små, blege og lidt uregelmæssige. Bægeret delt i 2 kølede blade.

Lippia nodiflora (L.) Michx. 10-30cm. Kronen hvid. Bægeret næsten helt delt. Planten helt urteagtig. Fugtige enge. VI-VIII. Korsika. Sj.

L. canescens Kunth 10-30cm. Kronen lyslilla. Bægeret halvt delt. Stænglerne med forveddet grund. VI-VIII. Sj. forv. (S.Amer.)

CALLITRICHACEAE

Callitriche. Vandstjerne.

1. Frugten uvinget eller kun vinget foroven 2.
- " vinget hele vejen rundt 3.
2. Frugten helt uvinget, elliptisk, 1½mm obtusangula
- " smalvinget foroven, oftest omvendt ægformet palustris
3. Undervandsbladene gennemskinnelige. Frugten stilket truncata
- " matte 4.
4. Frugten stilket, smalvinget brutia
- " siddende, bredvinget stagnalis

Callitriche truncata Guss. Kun undervandsblade. Disse linjeformede og lidt udvidede mod spidsen. Frugten smalvinget. III-V. Sardinien: Sj. Korsika?

C. stagnalis Scop. Storfrugt vandstjerne. IV-IX. Alm.

C. obtusangula Le Gall Rudevandstjerne. Flydebladene elliptisk-rudeformede. Planten ofte stor, 20-100cm. Frugten med en svag fure mellem de parallelle delfrugter. IV-VIII. Sj.

C. palustris L. Småfrugt vandstjerne. V-X. Korsika. R.alm.

C. brutia Petagna Stilkfrugt vandstjerne. VIII-X. Sardinien. Sj.

LABIATAE

1. Kronens overlæbe mangler eller stærkt reduceret 2.
- " " veludviklet 3.
2. Underlæben 3-delt Ajuga
- " 5-delt Teucrium
3. Støvdragerne helt indesluttende i kronrøret 4.
- " rager frem af kronrøret 6.
4. Blåblomstret halvbusk Lavandula
- Blomsterne ikke blå. Urt 5.
5. Bægeret m.m. regelmæssigt Marrubium
- " med 1 stor og 4 almindelige tænder Sideritis
6. 2 fungerende støvdrager 7.
- 4 " " 9.
7. Kronen næsten regelmæssig, 2½-4mm lang Lycopus
- " udpræget tolåbet, 8-40mm lang 8.
8. Kronens overlæbe konkav. Bladene linjeformede Rosmarinus
- " " hvælvet. Bladene brede Salvia
9. Kronen ret regelmæssig, 4-lappet Mentha
- " 2-låbet 10.
10. Kronens overlæbe hvælvet, ofte længere end underlæben 11.
- " " flad eller konkav, ofte kortere end underlæben 18.
11. Bægeret 2-låbet 12.
- " m.m. regelmæssigt 14.
12. Bægeret med en pukkel på ryggen. Kronen blå Scutellaria
- " uden sådan en pukkel 13.
13. Halvbusk med hvide blomster i bladhjørnerne Prasium
- Urt med hovedformede aks Prunella

14. Underlæbens sideflige mangler eller reducerede til 2 små tænder *Lamium* 15.
 Underlæbens sideflige veludviklede 15.
 15. Gulblomstret busk *Phlomis* 16.
 Anderledes 16.
 16. Underlæben med 2 hule tænder ved grunden *Galeopsis* 17.
 " uden sådanne tænder 17.
 17. Bægeret med korte, krogformet udstående tænder *Ballota* 19.
 " veludviklede tænder *Stachys* 19.
 18. Bægeret m.m. regelmæssigt 22.
 " 2-læbet 22.
 19. Planten krybende og rodslående med blå blomster *Glechoma* 20.
 " ikke krybende 20.
 20. Blomsterne enlige eller i kranse i en akslignende stand .. 21.
 " i tætte småaks i en grenet stand *Origanum* 21.
 21. Kronen hvidlig eller blegblå *Nepeta* 22.
 " lyserød, gul eller gullig *Stachys* 22.
 22. Støvdragerne tiltrykte underlæben *Ocimum* 23.
 " ikke tiltrykte underlæben 23.
 23. Kronen 25-40mm 24.
 " 4-25 mm 25.
 24. Bladene skarpttandede, uden hjerteformet grund *Calamintha grandiflora* 26.
 " buttandede, med hjerteformet grund *Melittis* 26.
 25. Støvdragerne bøjede mod hinanden 26.
 " udstående *Thymus* 26.
 26. Kronrøret krumt *Melissa* 27.
 " ret 27.
 27. Griflens to grene m.m. lige store 28.
 " " tydeligt uens 29.
 28. Kransene med 20-40 siddende blomster *Satureja* 29.
 " " 2-18 stilkede " *Micromeria* 29.
 29. Blomsterne i grenede kvaste i bladhjørnerne *Calamintha* 30.
 " ikke i grenede kvaste 30.
 30. 2-6(-8) blomster i kransene *Acinos* 30.
 10-20 " " *Clinopodium* 30.

Ajuga orientalis L. 10-50cm. Flerårig. Blåblomstret. Støvdragerne helt indesluttet i kronrøret. Skove og hegn. III-V. Nyligt funden på Sardinien.

A. iva (L.) Schreber Moskuslæbeløs. 5-20cm. Tueformet flerårig med moskuslugt. Bladene smalle, helrandede eller rundtaktede. Kronen rødlilla eller gul. III-VI. Alm.

A. chamaepitys (L.) Schreber 10-20cm. Ofte enårig, med stærk lugt. Bladene noget klæbrige, med 3 smalle flige. Kronen citrongul. IV-X. Sardinien: Alm.

Teucrium. Kortlæbe.

1. Enårig *spinosum* 2.
 Flerårig 2.
 2. Blomsterne i endestillede hoveder 3.
 " i kranse 4.
 3. Bladene helrandede, glatte og mørkegrønne ovenpå ... *montanum* 5.
 " rundtaktede, gråfildede på begge sider *polium* 5.
 4. Bladene helrandede 5.
 " tandede eller rundtaktede 6.
 5. Kronen blålilla, 20-24 mm *fruticans* 6.
 " rødlilla, 10-12 mm *marum* 6.
 6. Bægeret 2-læbet 7.
 " regelmæssigt 8.
 7. Kronrøret kortere end bægeret, kronen lyserød ... *massiliense* 8.
 " 2 x bægeret, kronen gul *scorodonia* 8.

8. Stænglen med urteagtig grund. Kronen 7-9mm *scordium* 9.
 " " forveddet " " 9-19mm 9.
 9. Kronen rødlilla *chamaedrys* 9.
 " grøngul *flavum* 9.

Teucrium fruticans L. Buskkortlæbe. Busk på 50-120cm med firkan-
 tede, hvidfildede grene. Bladene æg- eller lancetformede, hvidfil-
 tede nedenunder og ofte glatte og skinnende ovenpå. Kransene 2-
 blomstrede. Griffel og støvdragere langt fremragende. Kalkklipper
 nær kysten. IV-V. Sj.

T. scorodonia L. Klasekortlæbe. 20-60cm. Bladene ægformede med
 hjerteformet grund, rundtaktede og rynkede. VI-VIII. Alm.

T. massiliense L. 20-40cm. Planten gråfildet. Bladene mindre end
 hos foregående og uden hjerteformet grund, bølget tandede og rynke-
 de. Klipper og krat. V-VI. Sj.

T. scordium L. Løgurt. 20-60cm. Med løglugt. Bladene lancetforme-
 de med 5-7 par tænder. 2-6 blomster i hver krans mellem almindeli-
 ge blade. Kronen lyserød. Sumpe, fugtige enge. VI-VIII. Sj. som
 ssp. *scordioides* (Schreber) Maire & Petmg. med halvt stængelomfat-
 tende stængelblade og udløbere med skælblade.

T. spinosum L. 30-50cm. Stænglerne stærktgrenede med tornlignende
 grene, der er næsten bladløse under blomstringen. Stængelbladene
 omvendt lancetformede, lcm, helrandede eller fåtandede. Blomsterne
 1-4 sammen. Bægeret 2-læbet med stor øvre tand. Kronen 6-8mm, hvid
 og vendt på hovedet. Fugtige enge. VI-VIII. Sardinien. Sj.

T. chamaedrys L. Ædelkortlæbe. 20-35cm. Bladene op til 2x1cm med
 5-8 par tænder. Kronen 12-15mm, oftest ørdlilla, men undertiden
 hvid. V-VII. Alm.

T. flavum L. Gul kortlæbe. 30-60cm. Halvbusk med forveddede, fir-
 kantede grene. Bladene trekantede og rundtaktede, skinnende ovenpå.
 Klipper og stenede skrånter. V-VII. 2 underarter:
 ssp. *flavum*: Bladene ca.2cm med lådden underside. Sj.
 ssp. *glaucom* (Jordan & Fourr.) Romn.: Bladene ca.1cm med blågrøn
 og glat underside. Den almindeligste underart.

T. marum L. Kattkortlæbe. 30-50cm. Halvbusk med hvidfildede gre-
 ne. Bladene lancetformede, 6-8x2-3mm, hvidfildede nedenunder og
 ofte med omrullet rand. 1-2 blomster i kranse, der er samlede i
 ret tætte, cylindriske aks. V-X. Sj.

T. montanum L. Bjærgkortlæbe. 8-15cm. Halvbusk med liggende eller
 opstigende, hvidfildede grene. Bladene læderagtige, linjeformede,
 med indrullet rand. Kronen bleggul. V-VIII. Alm.

T. polium L. Hovedkortlæbe. 8-20cm. Tættilt halvbusk med opsti-
 gende grene. Bladene lancetformede, ofte noget omrullede. Kronen
 hvid eller noget rødlig. VI-VIII. Alm. som ssp. *capitatum* (L.) Arc.

Scutellaria galericulata L. Alm. skjolddrager. VI-VIII. Sj.

Prasium majus L. Murgrøn. 30-100cm. Halvbusk med gulliggrå, læng-
 desprukken bark. Bladene friskgrønne, 2-5cm, ægformede og ofte
 skarpttandede, de nedre med hjerteformet grund. Bægeret tragtfor-
 met med 3-tandet overlæbe og 2-tandet underlæbe, op til 25mm i
 frugt. Kronen 17-20mm, oftest hvid, ellers rødlilla. IV-VI. Alm.

Marrubium alysson L. 20-40cm. Tæt hvidt uldhåret. Bladene rude-
 vifteformede, rundtaktede fortil, ofte noget glatte ovenpå. Kran-
 sene med op til 12 blomster. Bægeret 5-tandet. Tænderne ca.3mm,
 længere end den rødlilla krone. V-VI. Sardinien: Cagliari.

M. vulgare L. Kransburre. 20-45cm. M.m. grå-hvidfildet. Bladene
 m.m. runde, uregelmæssigt rundtaktede, med en stilk på 1-2cm.
 Bægeret med 10 ens, krogformede tænder. Kronen 6-7mm, hvid. V-
 VIII. Alm.

Sideritis romana L. Stortandet kortkrone. 5-25cm. Enårig, lådden. Nedre blade elliptisk rudeformede, tandede i øvre halvdel; de øvre lancetformede og næsten helrandede. Kransene med 6 blomster, langs det meste af stænglen. Bøgeret med tornagtige, violette tænder. Kronen hvidgul med kort, opret overlæbe. IV-VI. Alm.

Melittis melissophyllum L. Vild hjærtensfryd. 30-50cm. Bladene ægformede, op til 8cm, med 10-20 par tænder. Stænglen uden kirtelhår. 1-2 ensidigt rettede blomster i bladhjørnerne. Kronen 25-28mm, hvid, lyserød eller rødlig, eller flerfarvet. V-VIII. Løvskove. Korsika. Alm.

M. albida Guss. Ligner den foregående, men stænglen med kirtelhår og bladene 6-15cm med 20-24 par tænder. Kronen hvid, ofte med rødlig pletter på underlæben. V-VII. Løvskov. Sardinien: Capo S. Elia.

Phlomis fruticosa L. Buskløvehale. 50-100cm. Busk med stjernefildede grene. Bladene 3-9cm, m.m. aflange, helrandede eller rundtakede, laderagtige, svagt stjernefildede ovenpå, kraftigt nedenunder. Kransene tætte med 20-30 blomster. Kronen gul, håret, 25mm lang. Klipper og krat. III-V. Sardinien. Sj.

Galeopsis ladanum L. Sandhanekro. Bladene lancetformet-elliptiske med 3-7 par tydelige tænder. Stænglen ikke opsvulmet under bladfæsterne. V-VII. Korsika. Sj.

G. tetrahit L. Alm. hanekro. VI-VIII. Korsika. Alm.

Lamium. Tvetand.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Flerårig | 2. |
| Enårig | 3. |
| 2. Kronrøret ret | <i>corsicum</i> |
| " krumt | <i>maculatum</i> |
| 3. Kronen hvid, overlæben kløvet | <i>bifidum</i> |
| " lyserød | 4. |
| 4. Blomsterkransens støtteblade m.m. siddende. Frugtbøgerets tænder sammenstødende amplexicaule | |
| Blomsterkransens støtteblade m.m. stilkede. Frugtbøgerets tænder udstående | 5. |
| 5. Bladene rundtakke | <i>purpureum</i> |
| " uregelmæssigt lappede | hybridum |

④ *Lamium corsicum* G. & G. 20-40cm. Stænglen voksdækket. Kronen 15-20 mm, hvid med lyserøde årer. Klipper. 1500-2500m. VI-VIII. Sardinien: M. di Olena, Gennargentu. Korsika: S. Pedrone, Cinto, Rotondo, Incudine. Sj.

L. maculatum L. Plettet tvetand. 20-50cm. Bladene ofte blegplettede. Kronen 20-30mm med et hvidligt rør og rød, ofte plettet underlæbe. III-XII. Sardinien. Alm.

L. bifidum Cyr. ssp. *bifidum* Kløvet tvetand. 10-40cm. Bladene uregelmæssigt indskårne. Bøgetænderne kortere end røret. Kronen 20-25mm. III-V. Sj.

L. purpureum L. Rød tvetand. III-X. Sj.

L. hybridum Vill. Fliget tvetand. V-VIII. Korsika. Sj.

L. amplexicaule L. Liden tvetand. I-V (IX-XI). Alm.

Ballota nigra L. ssp. *uncinata* (Fiori & Bég.) Patzak Tandbøger. Bøgeret 9-11mm med udadbøjede tænder på 1-2mm. V-VIII. Alm.

Stachys. Galtetand.

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Kronen gul | 2. |
| " rød | 3. |
| 2. Flerårig | <i>maritima</i> |
| Enårig | <i>ocymastrum</i> |

- | | |
|--|----------------------|
| 3. Enårig | 4. |
| Flerårig | 5. |
| 4. Kronen 13-15 mm | <i>marrubiifolia</i> |
| " 5-8 mm | <i>arvensis</i> |
| 5. Svagtornet busk | <i>glutinosa</i> |
| Urt | 6. |
| 6. Bladene med 3-7 brede lapper som Vedbendærenpris | <i>corsica</i> |
| " mangetandede | 7. |
| 7. Bladene æg-hjærteformede | <i>silvatica</i> |
| " smallere | 8. |
| 8. Bladene med kileformet grund | <i>palustris</i> |
| " mest med hjærteformet eller afskåret grund | 9. |
| 9. Bladundersiden tæt gråfiltet. Bøgeret uden kirtelhår | <i>germanica</i> |
| " håret-lådden. Bøgeret med kirtelhår | <i>heraclea</i> |

Stachys germanica L. ssp. *germanica* Filtet galtetand. 30-60cm. Stænglen gråfiltet. Bladene 3-12cm, aflange til aflangt ægformede, med hjærteformet grund, undersiden gråfiltet og oversiden m.m. grøn. Bøgetænderne noget uens, de øvre $\frac{1}{2}$ x røret, de nedre kortere. Blomsterne med linjeformede forblade på 6-9mm. V-VIII. Alm.

S. heraclea All. Lådden galtetand. 20-60cm. Bladene m.m. aflange, svagt uldhårede ovenpå, stærkere nedenunder. Blomsterne med linjeformede forblade på 10-12mm. Bøgetænderne noget uens, de øvre $\frac{1}{2}$ x røret, de nedre kortere. V-VIII. Korsika. Sj.

S. silvatica L. Skovgaltetand. VI-VIII. Korsika. Sj.

S. palustris L. Kærgaltetand. VI-VIII. Korsika. Sj.

S. maritima Gouan Strandgaltetand. 10-30cm. Filtet-håret. Bladene aflange til bredt ægformede, $2\frac{1}{2}$ -4cm, de nedre i en vedvarende roset. Kransene 4-6-blomstrede. Kronen bleggul, filtet, 12-14mm. Sand og klitter. VII-VIII. Korsika. Sj.

S. glutinosa L. 10-60cm. De nedre grene vedvarende og svagt tornspidsede. Bladene smalt spatelformede, 15-25x1-4mm, helrandede, tæt kirtlede. Blomsterne enlige, kronen 10-13mm, hvid eller rødlig. Tørre skrænter. V-VII. Alm.

⑤ *S. corsica* Pers. Krybende galtetand. 5-25cm. Krybende og ofte rodslående. Bladene med en stilk på 7-15mm og plade på 5-10(17) mm. 1-2 blomster i hver krans, ensidigt vendte. Kronen bleg rød, ofte noget purpuråret. Væld, fugtige sprækker. IV-IX. 800-2000m. Alm.

S. ocymastrum (L.) Briq. 5-25cm, med udstående hår. Bladene ægformede, tandede, med afstudsset grund. Kronen 12-13mm, med kløvet overlæbe. III-VI. Alm.

S. marrubiifolia Viv. 10-40cm. Bladene ægformede eller m.m. runde, 1-3x1-1 $\frac{1}{2}$ cm, rundtakke eller tandede. De 2 øvre bøgetænder 4-4 $\frac{1}{2}$ mm, af rørets længde, de 3 nedre 3-3 $\frac{1}{2}$ mm. IV-VI. Korsika: Ajaccio, Capo Corso. Sj.

S. arvensis (L.) L. Agergaltetand. III-V. Sj.

Nepeta. Katteurt.

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Bladene m.m. glatte | <i>agrestis</i> |
| " med dunet underside | 2. |
| 2. Bladoversiden m.m. glat | <i>cataria</i> |
| " tætdunet | <i>foliosa</i> |

Nepeta cataria L. Alm. katteurt. 50-150cm. Bladene 2-6cm, ægformede med hjærteformet grund og grofttandede. Kronen hvid med rød-prikket underlæbe, dunet udvendigt, 8-10mm. VI-VIII. Korsika. Sj.

⑥ *N. agrestis* Loisel. 30-60cm. Bladene lancetformede, grønne og m.m. klæbrige med 5-6 par skarpe tænder. Kronen hvidlig. 3-5 blomster i kransene. Stenede steder, hyppig ved dyreskure. 800-1700m. Korsika: M. Cinto, Rotondo, Renoso, Incudine. Alm.

● Nepeta foliosa Moris 30-70cm. Stænglen klæbrigt lådden med nedadrettede hår. Bladene lancetformede, 2-3cm, grofttandede. Blomsterstanden forlænget med adskilte, bladede kranse. Kronen 10-13mm, blegt blålilla. Tørre enge. 600-1300m. V-VII. Sardinien: M.di Oliena, Tavolara. M.sj.

Glechoma hederacea L. Korsknapp. III-VI. Korsika. Sj.

● G. sardoa Bég. Glat korsknapp. Ligner foregående, men næsten glat. Bægeret med siddende, gule småkirtler. Bægertænderne 1,8-2mm brede ved grunden (0,8-1,5mm hos hederacea). 500-1800m. IV-VI. Sardinien. Korsika: Serra di Pigno, Poggio di Nazza. Sj.

Prunella vulgaris L. Alm. brunelle. IV-X. M.alm.

P. laciniata (L.) L. Hvid brunelle. Kronen gullighvid. I det mindste de øvre blade fjerfligede. IV-VIII. Alm.

Melissa officinalis L. Hjærtensfryd. 50-80cm, med citronduft. Bladene svagt hårede, desuden kirteldunede på undersiden. Frugtbægerets øvre midterrand tydelig og bredt trekantet. V-VIII. Sj.

M. romana Miller (M. officinalis ssp. altissima (Sibth.& Sm.) Arc. 40-150cm, stinkende. Bladene med grå- eller hvidfiltet underside. Frugtbægerets øvre midterrand tydelig. VI-VIII. Alm.

Satureja thymbra L. Rødstænglet bønneurt. 15-30cm. Stærktgrenet, ofte grådunet dværgbusk med rødlig stængler med nedadrettede hår. Bladene aflange til omvendt ægformede, spidse, indtil 11mm, stivhårede. Kransene adskilte, kugleformede. Bægeret stivhåret. Kronen rødlig. II-VII. Sardinien: Cagliari. M.sj.

Micromeria filiformis (Aiton) Benth 5-20cm. Halvbusk med forvedede, trådtynde grene. Bladene læderagtige, 1-5mm, ægformede til trekantede, de nedre med hjerteformet grund. 2-4 blomster i kranse. Kronen 4-5mm, hvid. V-VIII. 2 underarter:
ssp. filiformis: Stænglerne trådformede, næsten glatte. Korsika: Casamozza, St.Florent, Golos og Fium Altos bredder. M.sj.
ssp. cordata (Moris) Pign.: Stænglerne kraftigere, dunede. Sardinien: M.di Oliena, Montalbo, M.S.Giovanni d'Orgosolo. M.sj.

M. graeca (L.) Benth 20-30cm. Halvbusk med mange, oftest ugrene- de stængler. Bladene 5-12mm, oftest lancetformede, med omrullet rand. Kransene adskilte med kortstilkede blomster. Bægeret syltandet. Kronen 6-8mm, rødlig. V-VI. Alm. 2 underarter:
ssp. graeca: Ved hvert støtteblad en stilk på 2-4mm med et knippe på 3-4 opret-udstående blomster.
ssp. tenuifolia (Ten.) Nyman: Ved hvert støtteblad en stilk på 0,8-1,5(-3)mm med 2 opret-tiltrykte blomster.

Calamintha grandiflora (L.) Moench Bøgemynthe. 20-50cm. Stænglen liggende med oprette blomstrende skud. Bladene ægformede, 3-5x2-4 cm. Kransene 1-5-blomstrede, m.m. ensidige. Kronen 25-35mm, rød. Løv- og især bøgeskov. VII-VIII. Korsika. Sj.

C. silvatica Bromf. Alm. bjærgmynthe. 30-80cm. Stænglerne opstiggende. Bladene bredt ægformede til runde, takkede. Kvastene 3-9-blomstrede på en stilk op til 15mm. Bægeret 6-10mm, dets nedre tænder 2-4mm. V-X. Korsika. Alm. 2 underarter:
ssp. silvatica: Større blade 5-6x3-4cm. Kvaststilkene op til 15mm. Kronen 15-22mm.
ssp. ascendens (Jordan) Ball: Større blade 1½-3x1-2cm. Kvaststilkene 1-3(-10)mm. Kronen 10-16mm.

C. nepeta (L.) Savi Grå bjærgmynthe. 20-40cm. Som foregående, men bladene helrandede eller svagt tandede. Bægeret 3-7mm med de nedre tænder 1-2mm. V-X. M.alm. 2 underarter:
ssp. nepeta: Bladene ægformede, 1,3-1,5 x så lange som brede, op til 35mm. Kvastene 10-20-blomstrede og længere end støttebladet.
ssp. glandulosa (Req.) Ball: Bladene æg-rudeformede, ca. så lange som brede, op til 22mm. Kvastene 5-11(-15)-blomstrede, kortere.

Acinos. Voldtimian.

1. Bladene med gennemskinnelig rand og utydelige sideribber
Bladene uden gennemskinnelig rand, sideribberne tydelige 2. corsicus
2. Flerårig. Kronen 10-12mm, oftest længere end støttebladet
Enårig. Kronen 7-10mm, kortere end støttebladet alpinus arvensis

● Acinos corsicus (Pers.) Getliffe Halvbusk på 1-10cm. Bladene ægformede til runde, 4-6x3-5mm. Kronen 12-16mm. 1900-2586m. VI-VIII. Korsika: Cinto, Renoso, Rotondo, Incudine. Sj.

A. alpinus (L.) Moench Alpevoldtimian. 5-30cm. Halvbusk. VI-VIII. Sardinien. Alm.

A. arvensis (Lam.) Dandy Voldtimian. IV-VI. Sj.

Clinopodium vulgare L. ssp. arundanum (Boiss.) Nyman Kransbørste. VI-VIII. Alm.

Origanum. Merian.

1. Bægeret 1-læbet, kløvet og tandløst majorana
- " regelmæssigt, 5-tandet 2.
2. Støtteblade 2-3mm, grønne og tætkirtlede heracleoticum
- " 4-5mm, oftest purpurfarvede med 0-få kirtler vulgare

Origanum vulgare L. Alm. merian. VI-IX. Korsika: Alm. Sardinien: Sj.

O. heracleoticum L. Vintermerian. Kronen hvid, sjældent lyserød. VI-VIII. Sardinien. Alm.

O. majorana L. Havemerian. 1-flerårig. Kronen hvid eller lyserød. VI-IX. Dyrket og forvildet.

Thymus capitatus (L.) Hoffm. & Lk. Hovedtimian. 20-50cm. Dværgbusk med opstigende til oprette, grenede stængler. Bladene nåleformede, 6-10mm, ofte knippeformede, kølede, med randhåret grund. Ægformede hoveder med tæt taglagte støtteblade. Kronen 7-10mm, rød. V-VI. Alm.

● T. herba-barona Loisel. 6-15cm, nedliggende til opstigende, men ikke krybende. Bladene elliptiske til æg-rudeformede, friskgrønne, op til 6-8x3-4mm. Øvre bægertænder korte og ikke randhårede. 1000-2000m. VI-VII. Sj.

Lycopus europaeus L. Sværtevæld. VI-IX. 2 underarter:

ssp. europaeus: Bladene 3-5 x så lange som brede, glatte eller svagt hårede. Alm.
ssp. menthaefolius (Mabille) Skalicky: Bladene 1,2-2 x så lange som brede, med dunet underside. N-Korsika. Sj.

Mentha. Mynte.

1. Bægertænderne tydeligt uens 2.
- " nogenlunde ens 3.
2. Lille, spinkel plante med 2-4(-6)mm lange blade ... requienii
- Bladene 12-20(-30)mm pulegium
3. Bladstilk over 2mm aquatica
- " 0-2 mm 4.
4. Bladene 2-4cm brede og under dobbelt så lange suaveolens
- " ½-2cm " og ca. " " " microphylla

Mentha requienii Benth 2-12cm, stinkende. Stænglerne liggende og rodslænde med forlængede led. Bladene ægformede til runde, helrandede til rundtakkede. Kransene 2-6-blomstrede. Kronen 2mm, lyserød. Fugtige steder og væld. 500-1600m. VI-VIII. Sj.

Hyoscyamus niger L. Bulmeurt. V-VIII. Alm.

Nicotiana glauca Graham Grågrøn tobak. 1-3m. Glat busk. Bladene 5-25cm, lancetformede til æg-rudeformede, grågrønne, helrandede. Blomstærned i endestillede, halvskærmformede toppe. Kronen gul, 3-4cm, med et langt, smalt rør og en kortlappet krave. I-XII. Sj. (Sydamerika).

SCROPHULARIACEAE (Nøgle bag i hæftet)

Gratiola officinalis L. Nådesurt. 10-50cm. Flerårig, opret, glat urt med modsatte blade og en opadtil 4-kantet stængel. Bladene lancetformede, spidse, 2-5cm, m.m. savtakke, kirtelprikke. Blomsterne enlige i bladhjørnerne, stilkede. Kronen 10-18mm, hvid og ofte rødlig i svælget. Kronen rørformet med en noget tolåbet krave. Sumpe og fugtige enge. VI-VIII. Sardinien. Sj.

Verbascum. Kongelys.

1. Hvert støtteblad med 1 blomst 2.
- " " " 3-7 blomster 3.
2. 4 støvdragere. Bægeret 8-15 mm creticum
- " " " 5-8 mm blattaria
3. De to nedre støvknapper nedløbende 4.
- Alle støvknapper nyreformede 6.
4. Støvtrådene rødlilla filtede boerhavii
- " hvidgult " 5.
5. Øvre blade nedløbende. Nedre støvtråde 3-4 x knapperne thapsus
- " " ikke " " 2-2 x " phloimoides
6. Støvtrådene rødlillat filtede 7.
- " gulhvidt " 8.
7. Grundbladene bølget bugtede sinuatum
- " hele, uregelmæssigt rundtakke conocarpum
8. Større støtteblade 8-15mm lychnitis
- " " 3-5 mm pulverulentum

Verbascum phloimoides L. Hjærtebladet kongelys. 30-120cm. Grundbladene helrandede, filtede. Støtteblade 9-15mm. Kronen 4-5cm på tværs. Øvre støvtråde filtede, nedre glatte. V-VIII. Sj.

V. thapsus L. Filtet kongelys. Støtteblade 12-18mm. Kronen 12-35 mm på tværs. Nedre støvtråde glatte til svagt hårede. V-VIII. Sj.

V. boerhavii L. 30-120cm. Hvidfiltet. Nedre blade ægformet elliptiske. Støtteblade 10-25mm. Kronen 22-32mm på tværs, violetstrubet. Nedre støvknapper kort nedløbende. Alle støvtråde rødlillat filtede. V-VII. Korsika. Sj.

V. lychnitis L. Blegt kongelys. 50-150cm. Svagt gråfiltet. Blade- ne med grøn overside og hvidfiltet underside. Blomsterstanden grenet. Kronen 12-20mm. VI-VIII. Korsika. Alm.

V. conocarpum Moris 30-80cm. Gråfiltet. Nedre støtteblade blad- lignende, 3x1cm, øvre sylformede, 1-1½cm. Kronen 15-18mm. Kapslen kegleformet. V-VII. Sardinien: Alm. Korsika: Bonifacio.

V. sinuatum L. Bugtet kongelys. 40-100cm. Kort, men tæt grå- el- ler gulfiltet. Blomsterstanden grenet, ikke tæt. Kronen 15-30mm. V-VIII. Alm.

V. pulverulentum Vill. Hvidtøttet kongelys. 50-120cm. Tæt hvid- tøttet. Blomsterstanden grenet, forholdsvis tæt. Kronen 18-25mm. VI-VIII. Sj.

V. blattaria L. Klasekongelys. 40-70cm. Stænglen kantet, glat forneden, kirtlet foroven. Bladene glatte, rundtakke til fjerfli- gede. Kronen 20-30mm med violet grund. Øvre støvdragere med hvide og rødlilla hår, nedre rødlilla med nedløbende knapper. V-VIII. Alm.

V. creticum (L.) Cav. Lappet kongelys. 40-150cm. Kirteldunet. Grundbladene lappede, lapperne ofte helt frie. Kronen 40-50mm, med violetanløben grund. Den ene nedre støvdrager med nedløbende knap. IV-V. Sardinien. Sj.

Scrophularia. Brunrod.

1. Bladene hele og takkede 2.
- De fleste blade delte på den ene eller anden måde 3.
2. Øvre blade spredte peregrina
- " " modsatte umbrosa
3. Bladene med 1 par smålapper på stilkene 4.
- " fjerfligede til fjersnitdelte 5.
4. Kronen 7-9mm auriculata
- " 15-20 mm trifoliata
5. Blomsterstandens sidegrene med 1-2 blomster ramosissima
- " " " 3-11 " canina

Scrophularia peregrina L. Skarptakket brunrod. 40-80cm. Enårig. M.m. glat. Bladene ægformede, uregelmæssigt tandede. Kronen 6-9mm, mørkerød til purpurbrun. V-VII. Alm.

S. trifoliata L. Trefliget brunrod. 80-200cm. Bladene gennemgåen- de lyseformet fjersnitdelte eller trefligede, oftest dobbelt sav- takkede. Kronen purpurfarvet. Fugtige klipper, veld. V-VII. Sj.

S. auriculata L. Øret brun rod. 40-100cm. Glat, sjældent dunet. Stænglen med smalle vinger. Bladene ægformede med 1, sjældent fle- re par smålapper nedenunder den ægformede endelap. Bægerfligene runde og hindekantede. Kronen grønlig med purpurbrun overløbe. VI-IX. Alm.

S. umbrosa Dumort Vandbrunrod. VI-IX. Sj.

S. ramosissima Loisel. Stænglerne 25-50cm med mange, oprette, stive grene. Bladene 1-2cm x 2-4mm, indskåret tandede til fjersnit- delte. Kronen 4-5mm, purpurfarvet. Sandstrand. V-VII. Sj.

S. canina L. Fliget brunrod. 40-80cm. Nedre blade med en stilk på 4 cm og en trekantet, 2 x fjersnitdelt plade på 5-10x3-5cm. Kronen 5-6mm. IV-IX. Alm.

- Anarrhinum corsicum Jordan & Fourr. Korsikansk paddegab. 5-20cm. Flerårig, glat. Grundbladene 4-5x1-1½cm, helrandede eller svagt tan- dede. Oprette, kantede stængler med spredte, smalle blade. Løse endestillede klaser. Kronen rørformet med en svag spore og en ikke særligt uregelmæssig krave, blå eller lilla, 4mm lang, uden nogen pukkell i svælget. Klipper, stenede skrænter. VI-IX. Alm.

Antirrhinum majus L. Haveløvemund. V-IX. Dyrket og forvildet.

Misopates orontium (L.) Raf. Agerløvemund. V-IX. Alm.

M. calycinum (Vent.) Rothm. Hvid agerløvemund. Ligner foregående, men oftest glat. Bægerfligene 15-20mm. Kronen 18-22mm, hvid, ofte rødtribet på underløben. V-IX. Sardinien. Sj.

Chaenorhinum rubrifolium (Rob. & Cast.) Fourr. Rødbladede torske- . mund. Ligner den efterfølgende art, men ofte m.m. rødtligt anløben. De nedre blade ofte i roset. Sporen spids, 2-5 x så lang som bred. IV-IX. Sj.

C. minus (L.) Lange Liden torskemund. IV-X. Sardinien. Alm.

Linaria. Torskemund.

1. Kronen lilla 2.
- " gul eller hvid (evt. med lilla spore) 5.
2. Stænglerne liggende reflexa
- " oprette 3.
3. Kronen 15-20mm. Planten glat pelisseriana
- " 2½-7 mm. Klasen kirteldunet 4.
4. Kronen 4-7mm. Sporen stærkt krummet arvensis
- " 2½-5mm. " ret eller svagt krummet micrantha
5. Kronen hvid med orange pukkell og lilla spore triphylla
- " anderledes 6.
6. Flerårig vulgaris
- Enårig 7.

7. Klasen kirteldunet. Kronen 5-9mm simplex
Planten helt glat. Kronen 10-30mm 8.
8. Frugtstilken nedadkrummet reflexa
" opret-udstående 9.
9. Kronen gul flava
" hvid chalapensis

Linaria reflexa (L.) Desf. 5-45cm. Nedliggende. Bladene m.m. elliptiske, mest spredte, de nedre i kranse. Klaserne bladede. Kronen 20-30mm, gul, lilla eller hvid. Sporen 12-16mm. Frugtstilken tilbagebøjet. I-IV. Indslæbt.

L. flava (Poiret) Desf. 5-15cm. Opstigende. Bladene smalt lancetformede, m.m. ensidige, blågrønne. Klaserne korte. Kronen 10-14mm med spore på 5-6mm. Sandstrand. V-VI. V.Sardinien: Iglesiente. N-Sardinien: Coghinas-Porto Torres. Korsika. Sj.

L. triphylla (L.) Miller Trebladet torskemund. 30-50cm. Opret og blågrøn. Enårig. Bladene i kranse på 3, elliptiske til omvendt ægformede, 3-5-årede. Blomsterne næsten siddende. Kronen 20-30mm med spore på 8-9mm. II-IV. Alm.

L. chalapensis (L.) Miller Hvid torskemund. 15-40cm. Bladene linjeformede, 18-35x1-2mm. Klaserne løse. Blomsterstilkene 1-2mm, i frugt op til 4mm. Kronen 12-16mm med en krum spore på 8-11mm. Svælget åbent. IV-V. Alm.

L. pelisseriana (L.) Miller Hedetorskemund. 15-50cm. Blågrøn enårig. Klaserne tætte. Bladene linjeformede. Kronen 15-20mm, blålig-lilla med hvidlig pukkel og spore på 7-9mm. Overløben stærkt forlængt. III-VI. Alm.

L. vulgaris Miller Alm. torskemund. VI-X. Korsika. Alm.

L. arvensis (L.) Desf. 10-40cm. Bladene linjeformede, i kranse forneden. Kronen blegt blålig-lilla. III-VI. Sj.

L. simplex (Willd.) DC. 8-30cm. Bladene linjeformede, i kranse forneden. Kronen bleggul, ofte violetåret. Sporen ret. IV-VI. Alm.

L. micrantha (Cav.) Hoffm. & Lk. 5-25cm. Bladene m.m. lancetformede, i kranse forneden. Kronen blålig-lilla. Sporen under 1mm. IV-VI. Sj.

Cymbalaria. Torskemund.

1. Bladene ofte kødede, tæt findunede muelleri
" ikke " 2.
2. Kronen 15-18mm hepaticifolia
" 8-13 mm 3.
3. Bladene med 3(-5) lapper aequitriloba
" " 5-9 " muralis

Cymbalaria muralis Gaertn. Vedbendtorskemund. III-X. Alm.

● C. hepaticifolia (Poiret) Wettst. Planten glat. Mellemste stængel-led forlængede, de øvre korte, så de langstilkede blade rager frem over stængelspidsen. Nedre blade modsatte. Bladene 3-lappede. 1000-2200m. VI-VIII. Korsika: Cinto, Rotondo, Renoso, Incudine, Bavella. Sj.

C. aequitriloba (Viv.) Cheval Dunet til lådden. Bladene oftest spredte, runde til nyreformede, oftest 3-lappede. Kronen 8-13mm. IV-VII. Sj.

● C. muelleri (Moris) Cheval. Stænglerne ca. 5cm, planten pudeformet. Bladene runde til nyreformede, helrandede eller med 3 runde lapper. Kronen ca. 10mm, mørkelilla med rødlig pukkel. Kalkklipper. III-VI. 650-1000m. Sardinien: Syd for Gennargentu nær Laconi. Sj.

Kickxia. Torskemund.

1. Alle blade med afrundet eller hjørteformet grund spuria
Øvre blade med spydformet grund 2.
2. Kronen 4-6mm. Bladene lancetformet spydformede cirrhosa
" 9-15mm. " trekantet spydformede 3.
3. Sporen krum commutata
" ret elatine

Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch Pilbladet torskemund. Stænglerne dunede til hårede. Bladene m.m. glatte, minder noget om Rødknæs. Kronen hvid, lillaanløben og -stribet. V-VI. M.sj.

K. commutata (Bernh.) Fritsch Skovbladet torskemund. Flerårig. Stænglerne kirtellåde. Bladene låde, de nedre bredt ægformede. Kronen 11-15mm, hvidlig med blålig overløbe, gul underløbe og purpurpletet pukkel. IV-VII. Sj.

K. elatine (L.) Dumort Spydbladet torskemund. Enårig. Kirteldunet til -lådden. Kronen gullig eller blålig med lilla overløbe. V-X. Alm. 2 underarter:

ssp. elatine: Mellemste blade spydformede og spidse, de øvre spidse og savtakke. Kronen 7-10mm. Blomsterstilken 3-6 x bageret.

ssp. crinita (Mab.) Greuter: Mellemste blade m.m. ægformede, svagt spydformede, butte; de øvre spydformede og butte. Kronen 10-15mm.

K. spuria (L.) Dum. Rundtbladet torskemund. Kirteldunet til -lådden. Kronen 10-15mm, gul med mørklilla overløbe og krum spore. VI-IX. Alm.

Digitalis purpurea L. Alm. fingerbøl. V-VII. Alm.

D. micrantha Roth 50-90cm. Blomsterstanden ensidig, ret tæt. Kronen hvidgul, rørformet, 9-11x2-3mm. V-VII. Korsika. Alm.

Erinus alpinus L. Stenbalsam. 15-25cm. Noget tueformet, håret og lidt klæbrig. Flerårig med omvendt ægformede blade. Stænglen opret med en kort klase, der forlænges i frugt. Bageret næsten helt delt. Kronen rødlig-lilla, 6-9mm på tværs, næsten regelmæssig med 5 udrandede flige, der er noget kortere end røret. V-VII. Sardinien: M.d'Oliena. M.sj.

Veronica. Ærenpris.

1. Blomsterne i sidestillede klaser 2.
" i endestillede " eller spredt i bladhjørnerne 6.
2. Planten håret 3.
" glat 4.
3. Bladene bredt ægformede, stilken 7-15 mm montana
" omvendt ægformede, kortstilkede til næsten siddende officinalis
4. Bladene tykke og butte beccabunga
" tynde og spidse 5.
5. Enårig. Kapslen elliptisk anagalloides
Oftest flerårig. Kapslen rund til ægformet anagallis-aquatica
6. Flerårig 7.
Enårig 10.
7. Stænglerne nedliggende med opstigende klaser 8.
" opstigende til oprette 9.
8. Kronen blegblå. Kapslen 4-5mm serpyllifolia
" lyserød. " 2-2½mm repens
9. Stænglerne helt urteagtige. Kronen 7mm bred alpina
" forveddede forneden. Kronen 11-15mm bred fruticans
10. Blomsterne kortstilkede til siddende 11.
" langstilkede 14.
11. Planten helt glat. Bladene m.m. lancetformede peregrina
" m.m. håret 12.
12. Bladene savtakke arvensis
Øvre blade fligede eller dybt lappede 13.
13. Øvre blade fjerfligede verna
" " håndlappede med 3-5 lapper brevistyla

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 14. | Blomsterne i klasse, støttebladene ulig løvbladene | acinifolia |
| | " spredte i bladhjørnerne | 15. |
| 15. | Bladene savtaktede til rundtakkede | 16. |
| | " 3-9-lappede | 17. |
| 16. | Kapseludrandingen stump- til retvinklet | persica |
| | De to kapselhalvdele kuglerunde | polita |
| 17. | Kronen bleglilla | hederifolia |
| | " hvid | 18. |
| 18. | Griflen ca. $\frac{1}{2}$ mm. Bladundersiden glat | panormitana |
| | " 1-2 mm. Bladet håret på begge sider | cymbalaria |

Veronica alpina L. Fjældårenpris. 5-15cm. Bladene siddende, ægformede til elliptiske, m.m. helrandede. Klasen kort, hovedformet, forlænget i frugt. Kapslen elliptisk, udrandet. VI-VIII. Korsika. Sj.

V. fruticans Jacq. Klippeærenpris. 5-15cm. Bladene omvendt ægformede til smalt aflange, m.m.helrandede. Klasen kort, forlænget i frugt. Kapslen ægformet, næppe udrandet. VI-VIII. Korsika. Sj.

V. serpyllifolia L. Glat ærenpris. V-X. Sj.

V. repens Clairon 5-10cm. Ofte tæppedannende med opstigende klæstilk. Bladene ægformede til runde, svagt tandede, m.m.glatte. Kronen 10-12mm bred. Fugtige enge. Væld. 1000-2500m. Korsika. Sj.

V. acinifolia L. Udspærret ærenpris. 5-15cm. Opret. Bladene ægformede. Støttebladene kortere end eller lig blomsterstilkene. Kronen 2-3mm bred, blå. III-V. Alm. Korsika.

V. arvensis L. Markærenpris. II-VI. Alm.

V. verna L. Vårærenpris. III-V. Korsika. Sj.

* *V. brevistyla* Moris 1-5cm. Stænglen u- eller fågrenet. Bladene 3-8x2-5mm. Blomsterstanden højst 20-blomstret, ofte sammentrængt. Griflen 0,3-0,4mm, kortere end udrandingen. Bjærgenge. 500-1500m. III-VI. Sardinien: Limbara, Gennargentu, M.Linas. Korsika: V.Nio-
lo, M.Cavo, M.Rotondo, M.Grosso, Col di Sevi. M.sj.

V. polita Fr. Blank ærenpris. III-X. Alm.

V. persica Poiret Storkronet ærenpris. I-XII. Alm.

V. hederifolia L. Vedbendærenpris. I-V. Alm.

V. panormitana Tineo Bladene m.m. runde, med 7(-9), oftest spidse lapper, fint randhårede. Blomsterstilken glat. Kapslen med ingen eller meget få hår. I-V. Korsika. M.sj.

V. cymbalaria Bodard Hvid ærenpris. Bladene runde med 5-9 lapper. Blomsterstilken oftest håret. Kapslen også håret. I-V. Alm.

V. peregrina L. Vandrærenpris. 5-25cm. Bladene helrandede eller svagt takkede. Klaserne dårligt afgrænsede. Kronen 2-3mm bred, hvidlig. IV-VI. Sj. (Amerika).

V. montana L. Bjærgærenpris. V-VI. Korsika. Sj.

V. officinalis L. Lægeærenpris. V-VII. Sj.

V. anagallis-aquatica L. VI-X. Alm. Lancetbladet ærenpris.

V. anagalloides Guss. Dyndærenpris. 10-30cm. Ligner foregående, men stænglerne svampede (hule hos a.q.), ofte rødligt anløbne. Alle blade siddende, smalt lancetformede. Blomsterstilken ca. af støttebladets længde. VI-X. Sj.

V. beccabunga L. Tykbladet ærenpris. IV-IX. Sardinien: Sj. Korsika?

Euphrasia nana (Rouy) Prain (E. salisburgensis ssp. corsica) 2-15 cm. Bladene med 3-4 par tænder med stak. VII-VIII. Korsika: Alm. Sardinien: Gennargentu.

Odontites rubra (Baumg.) Opiz Markrødtop. V-X. Korsika. Sj.

O. lutea (L.) Clairv. Dunet guldtop. Ligner foregående, men gulblomstret. Klaserne ensidige. Planten opret, 20-50cm. Bladene helrandede. VIII-X. Alm.

● O. corsica (Loisel.) Don 5-20cm. Nedliggende, spinkel. Bladene linjeformede, helrandede. Klasen kort, 1-2cm, gulblomstret. Stenede enge. 500-1600m. VII-IX. Sardinien: Gennargentu. Korsika: R.alm.

Parentucellia latifolia (L.) Car. Stenrødtop. Minder mest om en Rødtop. 3-25cm. Enårig. Bladene ægformede, dybt tandede. Blomsterstanden alsidig. Kronen rød, 8-10mm. III-VI. Alm.

P. viscosa (L.) Caruel Engguldtop. 10-50cm. Enårig. Blomst som Rødtops, blade som Skjallers. Klasen alsidig. Kronen gul, 18-24mm. Enge, udyrket, fugtig jord. III-V. Alm.

Bellardia trixago (L.) All. Rosenmund. 5-50cm. Enårig. Vækst og blade som Skjællers. Kronen 20-25mm, hvid med lyst rødlilla overlæbe. IV-V. Alm.

OROBANCHACEAE

Orobanche. Gyvelkvæler.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-----|
| 1. | Hver blomst med 1 støtteblad, 2 forblade og 2 bægerflige,
kronen blå til lilla | | 2. |
| | Hver blomst med 1 støtteblad og 2 bægerflige | | 6. |
| 2. | Stænglen 1½-3mm tyk forneden | | 3. |
| " | 4-7 mm " " | | 5. |
| 3. | Kronen 17-23mm, røret 5-6mm bredt i spidsen |mutelii | 4. |
| " | 10-15mm, " 3-4mm " " | | 4. |
| 4. | Oftest ugrenet. Underlæbens tænder spidse | nana | |
| " | grenet. " " butte | ramosa | |
| 5. | Vinkelmellemrummet mellem over- og underløbe ca. 180° | | |
| | " mellem læberne ret eller spidst | lavandulacea | |
| 6. | Kronen blå, krum, med opsvulmet grund | purpurea | |
| " | ikke blå | cernua | 7. |
| 7. | Kronen skinnende mørkerød indvendigt | | 8. |
| " | ikke sådan | | 9. |
| 8. | Støvfanget gult | gracilis | |
| " | rødlillat | sanguinea | |
| 9. | Kronen rødbrun eller mørkerød | | 10. |
| " | lysere | | 11. |
| 10. | Kronen rødbrun, kirtelhåret | variegata | |
| " | mørkerød, næsten glat | rigens | |
| 11. | Kronen med mørklilla kirtelhår | reticulata | |
| " | " " blege eller ingen kirtelhår | | 12. |
| 12. | Underlæben kirtelrandhåret | | 13. |
| " | ikke " " | | 14. |
| 13. | Kronen svagt dunet, uden rødviolet skær | denudata | |
| " | stærkt " , med " " | rapum-genistae | |
| 14. | Overlæben lige fremadrettet | | 15. |
| " | m.m. opadbøjet | | 16. |
| 15. | Kronen kødfarvet. Støvfanget gult | canescens | |
| " | bleggul, ofte lillaanløben. Støvfanget rødlillat | minor | |
| 16. | Kronen m.m.gul, ikke lillaanløben, næsten lige med et
knæk fortil | lutea | |
| " | m.m. lillaanløben | | 17. |
| 17. | Kronen lidt opsvulmet ved grunden, tilsmalnet mod spidsen | hederae | |
| " | ikke særligt tilsmalnet mod spidsen | | 18. |

Euphrasia nana (Rouy) Prain (E. salisburgensis ssp. corsica) 2-15 cm. Bladene med 3-4 par tænder med stak. VII-VIII. Korsika: Alm. Sardinien: Gennargentu.

18. Kronen 20-30mm, med bredt udstående kronflige crenata
 " 14-25mm, med smalt tilbagebøjede kronflige 19.
 19. Kronens største knæk nær grunden amethystea
 " " " spidsen loricata

Orobanche ramosa L. Grenet gyvelkvæler. V-VIII. R.sj.

O. nana (Reuter) Noë Liden gyvelkvæler. V-VIII. Alm.

O. mutellii Schultz V-VIII. Alm.

O. lavandulacea Rchb. Lavendelblå gyvelkvæler. Mest på Psoralea. IV-V. Sj.

O. purpurea Jacq. Røllikegyvelkvæler. VI-VIII. På Røllike, bynke og andre kurvblomster. Korsika. Sj.

O. cernua Loefl. IV-VI. Mest på Bynke. Sjældnere på Solsikke og andre planter. Korsika. Sj.

O. crenata Forsskål Bønnegyvelkvæler. Kronen hvid, m.m. lillaåret. Overløben hel og lidt tilbagebøjet. IV-VII. På dyrkede ærteblomster. Alm.

O. reticulata Wallr. Tidselgyvelkvæler. På tidselplanter, knopurter, blåhatte. V-VII. Korsika. Sj.

O. amethystea Thuill. Ametystgyvelkvæler. Kronen hvid mod grunden og lilla mod spidsen, tæt dunet. IV-VII. Sj.

O. canescens Presl Kødfarvet gyvelkvæler. På Mandstro og Kurvblomster. V-VI. Sj.

O. loricata Rchb. Bittermælksgyvelkvæler. IV-VII. Sj.

O. minor Sm. Kløvergylkvæler. Kronen 10-15mm, gullig med violet skær mod spidsen. Mest på kløver. III-VII. Alm.

O. hederæ Duby Vedbendgyvelkvæler. IV-VI. På Vedbend. Sj.

O. lutea Baumg. Gulbrun gyvelkvæler. Kronen gulbrun eller rødbrun. På ærteblomster. V-VII. Sardinien. Sj.

- O. denudata Moris 20-40cm. Stænglen kantet og furet. Akset tæt, 6-10x2½-3cm. Bægeret 8-10mm. Kronen 18-21mm, svagt dunet, gul, overløben tolappet, underløben dunet med ret ens lapper. Støvfanget gult. Støvknapper glatte, sidder 3-4mm fra kronens grund. VI-VII. På Rubus. Sardinien: Belvi, Fonni, Aritzo. Sj.

O. rapum-genistæ Thuill. Høj gyvelkvæler. På ærteblomster. IV-VII. Alm.

O. rigens Loisel. Op til 40cm. Planten næsten glat. På ærteblomster. IV-VII. Sj.

O. gracilis Sm. Blodrød gyvelkvæler. Mest på ærteblomster. IV-VII. Alm.

O. variegata Wallr. Stinkende gyvelkvæler. På forveddede ærteblomster. IV-VII. Sj.

O. sanguinea C.Presl Mest på Lotus cytisoides. IV-VI. Sj.

ACANTHACEAE

Acanthus mollis L. Blød bjørnetidsel. 25-100cm. Staude med 20-60 cm lange grundblade, der er lappet-fligede. Hvide, rødårede maskeblomster uden overløbe, 3½-5cm, i et tæt, 30x3cm langt aks. III-VI. Alm.

MYOPORACEAE

Myoporum tenuifolium Forster Emubusk. Busk eller træ på 1-5m. Glat og stedsgrønt med spredte, lancetformede, oftest helrandede, spidse blade med skinnende overside, 5-10cm. 5-9 blomster i nøgler i bladhjørnerne. Kronen 10-11mm bred, hvid med små rødlilla prikker, næsten regelmæssig, butlappet, 5-tallig. 4 støvdragere. IV-VI. Dykket langs veje og kyster. (Australien)

GLOBULARIACEAE

Globularia alypum L. Buskkugleblomst. Busk op til 1m med rødbrune stribede grene. Bladene omvendt lancetformede, helrandede eller 3-tandede, glatte og læderagtige. Blå blomster i 10-15mm brede hove-der med bredt ægformede svøbblade. X-III. Sj.

LENTIBULARIACEAE

- Pinguicula corsica Bern.& Gren. Korsikansk vibefedt. Kronen 16-25mm, blegblå til lyserød eller næsten hvid. Væld og enge. VI-VII. Korsika: Cinto, Rotondo, Renoso. 1000-2200m.

RUBIACEAE (nogle bag i hæftet)

Sherardia arvensis L. Blåstjerne. III-VII. Alm.

Crucianella. Korsaks. 1-flerårige, kransbladede urter med små, langrørede kroner, der rager noget frem mellem aksenes tæt taglagte støtteblade.

C. maritima L. Strandkorsaks. 10-50cm. Liggende, forveddet, flerårig plante med kranse på 4 æg-lancetformede blade med hvid kant, der er let tornede. Aksene 3-5x1cm med kølede, randhårede og hindekantede højblade og gullige blomster på 10-13mm. Sandstrand. VI-VIII. Lokalt alm.

C. angustifolia L. Smalbladet korsaks. 10-40cm. Opret enårig. Bladene i kranse på 6-8, ½-1mm brede. Endestillede, firkantede, 3-6cm lange aks med frie højblade. Kronen bleggul, 3-5mm. V-VII. Alm.

C. latifolia L. Bredbladet korsaks. Ligner den foregående, men bladene 1-4mm brede. Aksene cylindriske, 6-16cm lange med de ydre højblade halvt sammenvoksede. IV-VI. Sardinien. Sj.

Asperula. Mysike. Snerrelignende urter med langt kronrør.

- | | |
|---|------------|
| 1. Kransene med 8 blade. Kronen blå | arvensis |
| " " 4 " " " hvid eller rød | 2. |
| 2. Bladene elliptiske, 3-5mm brede | laevigata |
| " linjeformede, 1-2mm brede | 3. |
| 3. Kronrøret 3-3½ x fligene | pumila |
| " 1-1½ x " | cynanchica |

- Asperula pumila Moris 3-10cm. Tæt, flerårig, grøn og fintdunet pudeplante. Bladene smalt lancetformede, 4-9mm, med en midterribbe på ¼ af bladets bredde. Kronen rødlig, svagt håret, 6-7mm. Meget tørre kalkklipper. 800-1300m. VI-VII. Sardinien: M.d'Oliena, Lula, Tonneri di Seui. M.sj.

A. cynanchica L. Bakkemysike. 10-20(-50)cm. Flerårig med liggende til opstigende stængler. Bladene linjeformede, 12-35mm med en midterribbe på ¼ x bredden. Blomsterne i halvskærm, lyserøde til hvide, med en krone på 2½-3½mm. VII-X. Sardinien. Alm.

A. laevigata L. Skovmysike. 30-70cm. Flerårig. Stænglen 4-kantet, dens led 2-4 x bladene. Disse med lysere underside og tydeligt netårede. Blomsterne i ofte langstilkede kvaste, 1,3-2mm lange, hvide. Løvskeve. VI-VII. Sj.

A. arvensis L. Blåmærke. 5-30cm. Enårig. Minder noget om Blåstjerne, men blomsterne mørkere blå. Blomsterne i hove, omgivne af 12-20 bladlignende, langt randhårede støtteblade. Kronen 4-6mm. IV-VI. Alm.

Galium. Snerre.

- | | |
|---|----|
| 1. Enårig | 2. |
| Flerårig | 9. |
| 2. Bladranden med tilbagerettede småtorne | 3. |
| " " fremadrettede " | 5. |

3. Frugstilkken nedadbøjet. Bladoversiden glat *tricornutum*
- " udstående-opret. Bladoversiden dunet 4.
4. Kronen hvid, 1,5-1,7mm bred. Frugten 3-5mm *aparine*
- " grøngul, 0,8-1,3mm bred. Frugten 2-3mm *spurium*
5. Frugten 4-6mm, vortet. Bladene 2-5mm brede *verrucosum*
- " under 2mm. Bladene smallere 6.
6. Kvastene kortere end bladene *murale*
- " længere " " 7.
7. Delblomsterstandenes støtteblade længere end disse ... *setaceum*
- " " kortere " " 8.
8. Kvaststilkene 1-3 x blomsterstilkene, disse ret kraftige
- " 3-7 x " , disse trådfine *parisiense*
- " " " " *divaricatum*
9. Bladene 3-ribbede, 4 i krans *scabrum*
- " 1-ribbede 10.
10. Frugten kroghåret. Kronen tragtformet. *odoratum*
- " ikke kroghåret 11.
11. Delfrugten kugleformet. Bladet m.m.but. Stænglen ofte ru . 12.
- " ægformet. Bladet spidst eller med brod 13.
12. Bladene linjeformede, 0,8-2mm brede. Frugstilkken ikke
- " udspærret *debile*
- Bladene 3-6mm brede. Frugstilkken udspærret *elongatum*
13. Stænglen ru af nedadrettede småtorne *corsicum*
- " glat eller håret 14.
14. Kronen tragtformet 15.
- " hjulformet 16.
15. Pudeplante med stængler på 2-15 cm *cometorhizon*
- Opret plante med " på 20-50 cm *glaucophyllum*
16. Kronen mørkegul. Bladundersiden dunet *verum*
- " hvid til gullig. Bladundersiden glat 17.
17. Bladene op til 7 x så lange som brede *album*
- De længste blade over 7 x så lange som brede 18.
18. Planten m.m.blågrøn, i det mindste bladundersiderne *schmidii*
- " grøn 19.
19. Bladene 5-11 mm *corrudifolium*
- " 10-30 mm 20.
20. Kronen hvid eller gullig *lucidum*
- " rødlig *bernardii*

Galium scabrum L. Ægbladet snerre. 30-50cm. Opret og tæt udstående håret. Blomsterstanden lang, ægformet, mangeblomstret. Kronen hvid, hjulformet, 2½-3½mm bred. Stenege- og bøgeskove. VI-VII. Sj.

G. odoratum (L.) Scop. Skovmærke. V-VII. Korsika. Alm.

G. debile Des. Spinkel snerre. Minder om Kærsnerre. Kransene med 4-6, ofte omrullede blade. Stænglen glat eller noget ru. V-VII. Sj.

G. elongatum Presl Vandsnerre. V-VIII. Sj.

G. verum L. Gul snerre. VI-IX. Alm.

G. album Miller Hvid snerre. V-IX. M.alm.

G. corrudifolium Vill. 20-40cm. Opret. Bladene 5-11x½-1mm, læderagtige; randen omrullet, stærkt ru. Blomsterstanden aflang, tæt. Kronen 3-3½mm bred, flødefarvet, hvid eller gullig. V-VIII. Korsika. Alm.

G. lucidum All. Sylsnerre. 30-60cm, opret eller opstigende. Bladene 10-30x1-2mm med klar brodspids. Randen noget omrullet, ru. Blomsterstanden aflang eller ægformet, tæt. Kronen 3-5mm, hvid, sjældent gullig eller grønlig. V-IX. Alm.

G. bernardii G. & G. Rødlig snerre. 30-50cm. Ligner foregående, men blomsterstanden løsere og kronen rødlig. VII-IX. Korsika. Sj.

Galium schmidii Arrigoni 10-40cm. Blågrøn i det mindste på bladundersider og stængelknuderne, der er fortykkede. Bladene 5-20x1-2mm, omrullede og med finttandet rand. Blomsterstanden forlænget kegleformet. Kronen 3-4mm, hvid eller hvidgullig. Klipper. Stenede skrænter. 0-1800m. VI-VII. M.Sardinien: Nuorese, Gennargentu, Alghero. Sj.

G. glaucophyllum Schmid Grussnerre. 20-50cm. Stænglerne svagt 4-kantede. Bladene 6 i krans, 15-20x½-1½mm med svagttandet rand. Kronen 4-5mm, bredt tragtformet med kort rør, hvid. Klipper og urer. 900-950m. V-VI. Sardinien: Seui, M.Linas. M.sj.

G. cometorhizon Lapeyr. 2-15cm. Bladene 5-15x1½-3mm, i krans på 5-6, ret butte, glatte. Korte, fåblomstrede kvaste i bladhjørnerne. Kronen 1½-2mm, skålformet, hvid. Urer. 2000-2600m. VIII-IX. Korsika: M.Cinto, Capo Bardato. M.sj.

G. corsicum Sprengel 10-20cm. Bladene oftest 5-7 sammen, 7-12mm, lancetformede, 5-7 x så lange som brede. Kronen 1½-2½mm, rødlig, grønlig, gul eller hvid med stak på ½ x kronfligen. Stenede skrænter. VI-VIII. Sj.

G. setaceum Lam. Børstesnerre. 3-30cm. Stænglen spinkel, m.m. opret, glat eller svagt ru. Bladene 5-17mm, smalt linjeformede, 6-8 i krans. Kronen ½mm bred, rødlig. Frugten tæt kroghåret, sjældent glat. IV-V. M.sj.

G. spurium L. Hørsnerre. Ligner *aparine*. Frugten tætborstet eller glat. III-VI. Alm.

G. aparine L. Buresnerre. III-IX. M.alm.

G. tricornutum Dandy Vortesnerre. Ligner foregående, men frugten uden krogbørster, med små, spidse vorter. IV-VI. Alm.

G. verrucosum Hudson Rynket snerre. Minder om *aparine*. Frugstilkene nedadkrummede. Frugten groft rynket. I-V. Alm.

G. parisiense L. Marksnerre. 5-40cm. Toppen kegleformet til aflang. Vinklen mellem frugstilkene 45-90°, disse mest 0,1-0,2mm tykke. IV-VI. Alm.

G. divaricatum Lam. Udspærret snerre. 5-30cm. Toppen bredt omvendt ægformet til kugleformet. Vinklen mellem frugstilkene 20-45°, disse mest 0,05-0,075mm tykke. IV-VI. Alm.

G. murale (L.) All. Mursnerre. 5-20cm. Kransene med 4-6 omvendt lancetformede blade. Blomsterstanden fåblomstret med 1-4 blomster i hver krans. Blomsterstilkene nedbøjede efter blomstringen. Frugten 1,3-1,5mm, cylindrisk med adskilte, ofte uens, kroghårede delfrugter. III-VI. Sj.

Cruciata. Korsblad. 4 blade i krans. Ret korte, gulblomstrede kvaste.

1. Flerårig 2.

Enårig *pedemontana*

2. Kvaststilkken med 2 støtteblade. Stængelhårene oftest 1-2mm

laevipes

Kvaststilkken uden støtteblade. Stænglen glat eller med

hår på 0,4-0,8mm *glabra*

Cruciata laevipes Opiz Korsblad. 20-60cm. Stænglen oftest udstående håret. Bladene lancet- til ægformede, 3-årede, de øvre gulgrønne. Kvastene 5-9-blomstrede. IV-VII. Alm.

C. glabra (L.) Ehrend. Glat korsblad. 5-20cm. Stænglen oftest glat. Bladene smalt til bredt ægformede, gulgrønne foroven, 3-årede. Kvastene 3-5-blomstrede. IV-VII. Alm.

Cruciata pedemontana (All.) Ehrend. Enårigt korsblad. 10-30cm. Stænglerne spinkle, oprette, med hagekrummede småtorne og udstående hår. Bladene 1-årede, ensartet grønne. Kvastene 2-3-blomstrede. IV-VI. Sj.

Valantia. Hornsnerre. Små enårige planter med 4-bladede kranse. Blomsterne i korte, 3-blomstrede kvaste med 2 han- og en tvekønnet blomst. Frugtstilken nedadbøjet, udvidet og tornet, omslutter frugten.

Valantia muralis L. Glat hornsnerre. 2-6(-15)cm. Bladene ægformede, 2½-6mm. Stængel og blade glatte. Frugtstilken med et rygstillet horn. Stilk og horn med nogle krogborster. III-VI. Alm.

V. hispida L. Ru hornsnerre. Stænglen stivhåret. Frugtstilken uden horn, men med mange borster. III-VI. M.sj.

Rubia peregrina L. Vild krap. 30-120cm. Flerårig plante, der ligner en grov snerre. Kraftigt pigget. Frugten et sort bær. Bladene m.m.lancetformede, læderagtige, bløkt mørkegrønne i kranse på oftest 6. Kronen gulliggrøn, 4-6mm, IV-VI. Alm.

PLANTAGINACEAE

Plantago. Vejbred.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Bladene modsatte | 2. |
| " i roset | 4. |
| 2. Flerårig. Stænglerne forveddede | sempervirens |
| Enårig. Stænglerne urteagtige | 3. |
| 3. Bladene 3½-7cm. Nedre støtteblade med lang stak | arenaria |
| " 1-2½cm. " " uden stak | afra |
| 4. Bladene ægformet-elliptiske | major |
| " lancet- til linjeformede | 5. |
| 5. Bladene fligede eller tandede | 6. |
| " helrandede | 8. |
| 6. Bladet med båndformet midterdel og veludviklede flige | coronopus |
| " lancetformet og tandet | 7. |
| 7. Bladet bredest foroven, med 3-4 par tænder | macrorrhiza |
| " " midtpå, med 9-12 " " | serrata |
| 8. Bladene kødede og trinde | crassifolia |
| " ikke kødede | 9. |
| 9. Bladene stive og linjeformede, 1-2cm brede | subulata |
| " ikke stive, bredere | 10. |
| 10. Flerårig | 11. |
| Enårig | 12. |
| 11. Bladene uldhårede. Akset 3-10cm | albicans |
| " ikke uldhårede. Akset ½-5cm | lanceolata |
| 12. Nedre støtteblade 3-4mm, lancetformede | lagopus |
| " " 6-8mm, sylformede | bellardii |

Plantago major L. Glat vejbred. III-XI. M.alm. 2 underarter:
ssp. major: Bladene 5-9-årede med m.m.hjerteformet grund, tykke og mørkegrønne. Akset tilsmalnet opadtil.
ssp. intermedia (DC.) Arc.: Bladene 3-5-årede, gradvist tilsmalned mod stilken, tynde og gulgrønne. Akset cylindrisk.

P. coronopus L. Fliget vejbred. III-X. Alm. 2 underarter:
ssp. coronopus: Støtteblade 2½-3mm, med en stak på 2/3-¾ så lang. Skaffet 1-1½mm tykt, 1-2 x så langt som bladene.
ssp. commutata (Guss.) Pilger: Støtteblade 2,2-3mm, med en stak på 1/3 heraf. Skaffet fortykket, 1½-2mm tykt, ofte kortere end bladene.

P. macrorrhiza Poirer. Spidstakket vejbred. Flerårig. Bladene 7-9x1 cm, kødede og stive, randhårede og hårede. Skaffet gulligt, 1-2 x bladene. Akset cylindrisk, 2-4cm. Nær kysten. V-X. Sj.

P. crassifolia Forsskål Tykbladet vejbred. Flerårig. Bladene 5-20 cm. Akset 2-5cm. Strandenge, ofte med Sortskæne. V-VI. Sj.

Plantago serraria L. Savbladet vejbred. Flerårig. Bladene 8-15 x ½-4 cm, regelmæssigt savtakkede. Aksene 6-10cm. III-VI. Sardinien. Alm.

P. subulata L. Sylvejbred. Flerårig med grenede, tætbladede stængler. Bladene 2½-4cm med trekantet tværsnit. Vindblæste bjærg. 1200-2700m. Sj. Sardinien som var. sarda (Presl) Pilger på Gennargentu. På Korsika som var. insularis Godr. flere steder.

P. lanceolata L. Lancetvejbred. V-VIII. M.alm.

P. lagopus L. Harefodsvejbred. 3-40cm. Bladene lancetformede, 3-7-årede. Aksene først runde til ægformede, senere noget forlængede, fildede. Støtteblade lancetformede, tæt uldhårede. IV-VI. Alm.

P. bellardi All. Rævehalevejbred. Som foregående, men bladene ofte smallere, aksene lidt længere. III-VI. R.sj.

P. albicans L. Hvidbladet vejbred. Jordstænglen ofte grenet. Bladene smalt lancetformede til næsten linjeformede, 5-8mm brede, ofte bølgede, silke-uldhårede. Skafterne ca. 2 x bladene, trinde og fildede. IV-V. Sardinien. Sj.

P. arenaria W.& K. Grenet vejbred. (P. indica L.) 5-35cm. Opret, ofte med opstigende grene. Bladene linjeformede, ikke kødede. Aksene ægformede, ½-1½cm. V-VII. Sj.

P. afra L. Loppefrø. (P. psyllium L.) Som foregående, men ofte tæt kirteldunet, især foroven. I-VI. Alm.

P. sempervirens Cr. Spergelvejbred. (P. cynops L.) IV-VII. R.alm. Korsika.

Littorella uniflora (L.) Asch. Strandbo. V-VII. Sardinien. M.sj.

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus ebulus L. Sommerhyld. Staupe på 80-150cm. Fodflige til stede. Støvknapper mørklilla. V-VII. Alm.

S. nigra L. Alm. hyld. IV-VI. Alm.

Viburnum tinus L. Vintersnebolle. Busk på 1-3m. Bladene modsatte, helrandede, m.m.ægformede, glatte og skinnende mørkegrønne ovenpå og duned til glatte nedenunder, med en stilk på ½-1½cm. De er 3-10x1½-7cm. Fodflige mangler. Blomsterne i en halvskærm på 6-10 cm i tværmål, flødehvite, 5-9mm brede, ensartede. X-VI. Alm.

Lonicera. Gedeblad. Kun slyngende arter her.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Bladene under blomsterstanden frie | periclymenum |
| I det mindste det øvre bladpar sammenvokset ved grunden | 2. |
| 2. Kun det øverste bladpar sammenvokset | etrusca |
| Flere bladpar sammenvoksede | implexa |

Lonicera implexa Aiton Stedsegrøn vedvind. Kvistene glatte og blågrønne. Bladene stedsegrønne, skinnende mørkegrønne ovenpå, blågrønne nedenunder. Blomsterstanden siddende med 2-6(-9) blomster. V-VI. Alm.

L. etrusca Santi Stilket vedvind. Unge kviste duned. Blade blå eller hvidgrønne og oftest fintdunede på undersiden. Blomsterstanden stilket. V-VI. Alm.

L. periclymenum L. Alm. vedvind. V-VI. Korsika. Sj.

ADOXACEAE

Adoxa moschatellina L. Desmerurt. III-V. Korsika. M.sj.

VALERIANACEAE

Valerianella. Vårsalat.

1. Alle støtteblade bredt lancetformede, æg- eller hjerteformede, spidse, bredt hindekantede og oftest langt randhårede ... 2.
I det mindste de nedre støtteblade m.m. aflange og butte, svagt til ikke hindekantede og højst svagt randhårede ... 4.
2. Frugten med en tandet krone af frugtens længde 3.
" uden eller med en kortere krone pumila
3. Kronen på frugten halvt delt coronata
" næsten helt delt discoidea
4. Frugten med et 6-tandet bager eriocarpa
Bageret reduceret til en enkelt tand 5.
5. Frugten uden tydelig tand. Blomsterne blegblå 6.
" med " " " hvide til lyserøde 7.
6. Frugten med en tydelig længdefure carinata
" uden længdefure locusta
7. Bægertanden af frugtens længde, skævt kraveformet ... muricata
" kortere end frugten 8.
8. Frugten $2\frac{1}{2}$ -3mm 9.
" 1-1 $\frac{1}{2}$ mm 10.
9. Blomsterne hvide. Frugten æg-kugleformet rimosa
" lyserøde. Frugten vindruekærmeformet dentata
10. Støttebladene tiltrykt frugterne, disse glatte ... microcarpa
" udstående. Frugterne tæthårede puberula

Valerianella coronata (L.) DC. Kronvårsalat. 10-30cm. Bladene ofte fligede eller groft tandede. Blomsterstanden ofte 2 x gaffeldelt. Blomsterne lyst rødlilla. Frugten stivhåret med netåret bager. IV-VI. Alm.

V. discoidea (L.) Loisel. 10-30cm. Ligner foregående, men ofte med 3-4 par modsatstillede hovedstilke. Bægerkronen med 6-12 uregelmæssige og oftest hagekrummede tænder. V-VI. Sj.

V. pumila (L.) DC. 10-40cm. Som de foregående, men blomsterstanden 3-4 x gaffeldelt. Kronen lyserød. Frugten halvkugleformet, but trekantet, oftest uden krone. IV-VI. Korsika. Sj.

V. eriocarpa Desv. Uldfrugtet vårsalat. 10-30cm. De øvre stængelblade med tandet grund. Blomsterstanden 2-3 x gaffeldelt. Støttebladene linjeformede, spidse og randhårede, i frugt oprette og overrørende frugterne. Blomsterne lyserøde. Frugten ofte stivhåret. IV-V. Alm.

V. muricata (Stev.) Baxter Skævkrevet vårsalat. 10-30cm. Ligner foregående undtagen på frugtens krave. IV-V. Sj. Sardinien.

V. microcarpa Loisel. Småfrugtet vårsalat. Som de 2 foregående, bortset fra frugten. IV-VI. Sj.

V. puberula (Bertol.) DC. Trekantet vårsalat. Som de foregående. Frugtens tværsnit trekantet. IV-VI. Sj.

V. rimosa Bastard Opblæst vårsalat. 10-40cm. Blomsterstanden flere gange gaffeldelt. IV-VI. Korsika. Sj.

V. dentata (L.) Pollich Tandet vårsalat. V-VII. Sj.

V. locusta (L.) Laterrade Tandfri vårsalat. IV-V. Alm.

V. carinata Loisel. Kølet vårsalat. IV-VI. Sj.

Fedia cornucopiae (L.) Gaertner Læbebaldrian. 10-30cm. Enårig, glat og noget kødet plante med spatelformede til elliptiske blade og flere gange gaffelgrenet. Blomsterne i tætte nøgler på kølleformet opsvulmede stilke. Kronen 8-16mm, rødlilla. XII-IV. Alm.

Valeriana montana L. Bjærgbaldrian. 12-50cm. Alle blade næsten altid helrandede, de nedre æg- til rudeformede, det ene øvre par linjeformet. Blomsterne hvide eller lyserøde. V-VIII. Sj.

V. tripteris L. Trebladet baldrian. 10-40cm. Nederste blade ægformede og hele, resten med 3 æg-lancetformede småblade. Blomsterne hvide eller lyserøde. VI-VIII. Korsika. Sj.

Centranthus. Sporebaldrian. Kronen med en spore eller udvækst på det lange kronrør, rød, lyserød (sjældent hvid).

C. ruber (L.) DC. Rød sporebaldrian. 30-70cm. Flerårig, glat, blågrøn. De større blade 7-12cm, ægformet trekantede, de øvre linje-lancetformede. Kronrøret 7-10mm, sporen 5-10mm. Kronen rød. V-VIII. Sardinien. Alm.

• C. trinervis (Viv.) Bég. 20-40cm. Flerårig. Ligner foregående, men bladene noget smallere, æg-lancetformede. Kronrøret 3-4mm, med udvækst, men uden egentlig spore. Kronen lyserød. Fugtige klipper. VI-VIII. 200-1200m. Sardinien: M.d'Oliena. S.Korika: M. della Trinita ved Bonifacio. M.sj.

C. calcitrapa (L.) DC. Fliget baldrian. 4-40cm. Enårig. Bladene gennemgående smalt fjerfligede. Kronen lyserød, 2mm, med en kort spore midt på røret. III-VI. Alm.

DIPSACACEAE

1. Alle blomster ens og regelmæssige 2.
De ydre blomster i kurven uregelmæssige og større end de indre 3.
2. Planten m.m. tornet. Hovederne ægformede Dipsacus
" ikke " " brede Cephalaria
3. Kronen 4-lappet Knautia
" 5-lappet 4.
4. Kurvsvøbbladene halvt sammenvoksede Pycnocomon
" frie Scabiosa

Cephalaria squamiflora (Sieber) Greuter Buskskælhoved. 40-60cm. Bladene læderagtige, de nedre 12-15x3-4cm, omvendt lancetformede, med svage tænder nær spidsen; de øverste linjeformede, 2-4cm. Kurvsvøbbladene i flere end 3 rækker. Kronen 9-12mm, gul eller hvid. Skyggefulde kalkklipper. 500-1200m. M.sj.

Dipsacus fullonum L. Gærdekartebolle. VI-VIII. Alm.

D. ferox Loisel. Tornet kartebolle. Ligner foregående, men kraftigere tornet med torne også på bladfladerne og randen. Bladet oftest lappet. Kurvsvøbbladene udstående. Blomsterne hvide eller lyserøde. VI-VIII. Sj.

Knautia integrifolia (L.) Bertol. Enårig blåhat. 20-80cm. Enårig. Stænglen stivhåret fornedet. Grundbladene omvendt æg-lancetformede, hele eller noget delte; de øvre lancet-linjeformede. Kurvene 1 $\frac{1}{2}$ -3 cm brede, blomsterne blålilla. Bægeret med 12-24 tænder. VI-VIII. Alm.

Scabiosa. Skabiose.

1. Enårig stellata
2-flerårig 2.
2. 2-årig. Bladene noget hårede maritima
Flerårig. Bladene tæt sølvhvidt uldhårede holosericea

Scabiosa stellata L. Stjærneskabiose. 20-60cm. Mellemste blade fjerfligede med 4-6 par sideflige. Kurvene 2 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ mm brede. Bægerret gulligt, 5-8 $\frac{1}{2}$ mm bredt. V-VII. Sardinien. Sj.

S. holosericea Bertol. 20-80cm. Grundbladene omvendt lancetformede, rundtakkede eller m.m. lappede; de øvre 1-2 x fjersnitdelte. Kurvene 2-3 $\frac{1}{2}$ cm brede. Kronen rødlilla. Bægerret ca. $\frac{1}{2}$ x frugten med børster på 2-3 x rørets længde. VI-VII. Sardinien. Sj.

S. maritima L. vejskabiose. (S. atropurpurea L.) 20-60cm. Nedre blade omvendt lancetformede, rundtakkede, stængelbladene lyreforformet eller helt fjersnitdelte med smalle afsnit. Kurvene 2-4cm på lange stilke. Bægerret kort, ca. 1/5 af frugten; børsterne 3-5x rørets længde. IV-XI. Alm.

Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffm. & Lk. Rudeskabiøse. Op til 175cm. Flerårig. Bladene 1-2 x fjersnitdelte, smalfligede. Kurvene 5-20mm brede. Blomsterne lyserøde, gullige eller hvide. Sandstrand. VI-IX. Sj.

CAMPANULACEAE (Nogle bag i hæftet)

Legousia. Spejlblomst. Enårig, blå- til rød-blomstrede planter med lange og smalle, prismatiske frugtknuder, der er kortstilkede og m.m. oprette. Kronen noget længere end eller kortere end de smalle bagerflige.

1. Blomsterne i et smalt aks 2.
- " i top eller små nøgler 3.
2. Kronen ca. 1/3 x bagerfligene falcata
- " ca. lig " castellana
3. Kronen ca. 1/2 x bagerfligene hybrida
- " mindst så lang som bagerfligene speculum-veneris

L. speculum-veneris (L.) Chaix Alm. spejlblomst. 10-30cm. Oftest stærkt grenet, dunet. Bladene næppe bølgede. Mange blomster i en ofte stor top. Bagerfligene af frugtknudens længde under blomstringen eller lidt kortere. Kronen ca. 10mm. Kapslen 10-15mm. I Kornmarker. IV-VII. Alm.

L. falcata (Ten.) Fritsch Seglspejlblomst. 10-40cm. Planten m.m. dunet. Bladene svagt bølgede. Bagerfligene ca. så lange som frugtknuden under blomstringen. Kapslen 15-20mm. IV-VI. Alm.

L. hybrida (L.) Delarbre Liden spejlblomst. 10-25cm. Kort stivhåret. Bladene stærkt bølgede. Blomsterne mest i små nøgler. Bagerfligene ca. 1/2 x frugtknuden under blomstringen. Kapslen 15-30mm. IV-VI. Alm.

L. castellana (Lange) Samp. Ru spejlblomst. 20-40cm. Meget ru. Bagerfligene 1/3-1/2 x frugtknuden under blomstringen. Kronen ca. = bagerfligene. IV-V. Korsika. M.sj.

Campanula. Klokkeblomst.

1. Enårig. Kronen 3-5mm erinus
- 2-flerårig. Kronen større 2.
2. Blomsterne ustilkede, samlede i nøgler glomerata
- " stilkede, i klasse eller top 3.
3. Toårig. Kronen halvt delt 4.
- Flerårig. Kronen mindre delt 5.
4. Blomsterstilkene med forblade ved grunden rapunculus
- " " ude på stilkene patula
5. Bagerfligene linjeformede. Kronen 20-26mm forsythii
- " smalt lancetformede. Kronen 30-40mm persicifolia

Campanula patula L. Engklokke. V-VIII. Sardinien som ssp. costae (Willk.) Fedorov.

C. rapunculus L. Rapunselklokke. V-IX. Korsika. Alm.

C. persicifolia L. Smalbladet klokke. V-VIII. Sardinien?

C. glomerata L. Nøgleblomstret klokke. VI-IX. Alm.

C. erinus L. Tofarvet klokke. 5-25cm. Gaffelgrenet, stivhåret enårig. Bladene 1-2cm, omvendt ægformede med 2-3 par tænder, ofte modsat stillede. Planten ligner en klokkeblomst meget lidt. III-VI. Alm.

⑤ C. forsythii (Arc.) Podlech 10-30cm. Ydre henad C. rotundifolia. Stængelbladene smalt lancetformede, fjærnt savtakke til helrandede. 1-få blomster. Bægerenderne udstående til nedadbøjede, brat bøjede ved grunden. Fugtige og skyggefulde kalkklipper. 300-1100m. V-VII. Sardinien: M.d'Oliena, Montalbo, Lula, Galtelli, Iaconi, S.Vittoria Esterzili, Tonnari d'Irgini, Isola di Tavolara. M.sj.

⑤ Phyteuma serratum Viv. 3-15cm. Flerårig. Grundblade lancetformede, tandede, 3-6cm. Stængelbladene linjeformede. De mørkt blålige, rørformede blomster samlede i 1 1/2-2cm brede, m.m. runde hoveder, omgivne af linje- til lancetformede højblade på 8-11x2-3mm. 1000-2300m. VII. Korsika. Sj.

Wahlenbergia nutabunda (Guss.) DC. Stilklokke. 10-40cm. Opret, glat enårig med oprette grene. Bladene linje-lancetformede, m.m. helrandede, spidse. Blomsterne i store kvastlignende toppe, først vandret udstående, siden oprette, stilkene 1-5 cm. Kronen 7-8mm, smalt klokkeformet, blegblå til hvid. Terre enge. III-IV. Sardinien: C. Carbonara, Tortoli. Korsika: Ajaccio. M.sj.

Jasione. Blåmunke.

1. Bladene flade laevis
- " med bølget rand 2.
2. 1-2-årig. Svøbbladene oftest helrandede montana
- Flerårig. " brodtandede echinata

J. montana L. Alm. blåmunke. III-IX. Alm.

J. echinata Boiss. & Reuter 10-50cm. Ligner den foregående, men ofte kraftigere. De større blade 3-4cm x 5-6mm. Hovederne 1 1/2-2cm, svøbbladene 8-10x5-6mm med 1 til mange par tænder. IV-VI. Sardinien: Gennargentu. Sj.

J. laevis Lam. Flerårig blåmunke. 20-50cm. Jordstænglen grenet med mange gøld skud. Bladene 4-5 1/2cm x 6-10mm, næsten helrandede. Hovederne 2 1/2-3cm. Svøbbladene spidstandede. VII-IX. N-Sardinien. Korsika: M. Capitello. Sj.

LOBELIACEAE

Laurentia. Stilklobelie. Langstilkede, blå eller hvide, uregelmæssige blomster med 2 nogenlunde lige store læber, 4-11mm.

L. tenella DC. (L. bivonae (Tineo) Pign.) Flerårig. Alle bladene grundstillede, spatelformede. 3-10cm høje, ugrenede blomsterstilke. Kronen 8-11mm, blålig med hvidgult svælg. Væld, fugtige steder. IV-IX. Sj.

L. gasparrinii (Tineo) Strobl 3-20cm. Enårig med bladet og grenet stængel. Kronen 2 1/2-4 1/2mm, kongeblå med hvidt svælg. Væld, grøfter. V-VIII. Sj.

COMPOSITAE

1. Skivekronerne rørformede 2.
- " tungeformede 90.
2. Alle kroner rørformede 3.
- Randkronerne tungeformede 58.
3. Planten med torne på stængel, blade eller kurvsvøb 4.
- " uden torne 24.
4. Blomsterne blå 5.
- " røde, rødlig eller gule 6.
5. Kurvene store, 4-15 cm Cynara
- " mindre Carduncellus
6. Planten kun med torne på kurvsvøbet 7.
- Bladene eller stænglerne m.m. tornede 8.
7. Svøbbladene ender i en hagekrummet torn Arctium
- " med et tornet eller frynset vedhæng Centaurea
8. Med 3-delte torne i bladhjørnerne Xanthium spinosum
- Bladene tornede 9.
9. Indre svøbblade skinnende, randkroneagtige, ydre tornfligede Carlina
- Svøbbladene anderledes 10.
10. Blomsterne gule 11.
- " røde eller rødlig 12.

11. Indre svøbblade fjerdelte Cnicus
 " " hele Carthamus
 12. Halvkugleformet halvbusk Centaurea horrida
 Ikke halvkugleformet urt 13.
 13. Ydre svøbblade fjerfligede 14.
 Svøbbladene hele 17.
 14. Ingen stængel Atractylis gummifera
 Stænglen udviklet 15.
 15. Stænglen vinget-tornet Picnemon
 " trind 16.
 16. Ydre svøbblade udstående. Bladene hvidbrogede Silybum
 " " omslutter kurven. Bladene ensfarvede
 Atractylis cancellata
 17. Fnokken hårformet 18.
 " fjerformet 20.
 18. Kurvene på meget langt, utornede stilke Tyrimmus
 Stænglerne tornede op til eller ret tæt på kurvene 19.
 19. Kurvbunden tæt børstebeklædt Carduus
 " uden børster Onopordum
 20. Randkronerne større end midterkronerne Galactites
 Alle kroner lige store 21.
 21. Bladoversiden og bladranden ikke fintornet 22.
 " eller " fintornet 23.
 22. Kurvene i knipper Lamyropsis
 " i aks Ptilostemon
 23. Bladoversiden hvidåret Notobasis
 " grøn Cirsium
 24. Hanblomster i særlige kurve; hunblomsterne 1-2 sammen
 i bladhjørnerne 25.
 Alle kurve ser ens ud 26.
 25. Frugten stor og tornet. Bladene spredte Xanthium
 " ikke stor og tornet. Bladene ofte modsatte Ambrosia
 26. Bladene modsatte 27.
 " spredte eller i roset 28.
 27. Kronerne røde eller hvide Eupatorium
 " gulbrune Bidens
 28. Kurvsvøbbladene med hagekrummet spids. Røde kroner .. Arctium
 " ikke hagekrummede 29.
 29. Grundbladene hjerte-nyreformede med indskåren grund 30.
 " anderledes 32.
 30. Stænglerne med 1 kurv Tussilago
 " " flere kurve 31.
 31. Kurvene i klase Petasites
 " i halvskærm Adenostyles
 32. Blomsterne røde eller blå 33.
 " ikke røde eller blå 39.
 33. Blomsterne blå 34.
 " røde 35.
 34. Kurvene 8-15 cm Cynara
 " mindre Centaurea cyanus
 35. Bladene hele. Svøbbladene hindeagtige Xeranthemum
 " fligede 36.
 36. Kurvsvøbbladene med et vedhæng 37.
 " uden " 38.
 37. Stænglen med 1 kogleformet kurv Leuzea
 " " flere kurve Centaurea
 38. Svøbbladene ægformede med sort spids Mantisalca
 " smalt lancetformede Crupina
 39. Bladene fligede 40.
 " helrandede eller tandede 45.
 40. Med hårformet fnok; søvblade ofte sortspidsede
 Senecio vulgaris
 Uden hårformet fnok 41.

41. Enårig 42.
 Flerårig 43.
 42. Planten glat Cotula
 Anthemis asperula
 43. Bladene 1 x fjersnitdelte. Halvbusk Santolina
 " 2-3 x " 44.
 44. Kurvene i halvskærm Tanacetum audiberti
 " i top Artemisia
 45. Planten hvid- eller gråfiltet, i det mindste på bladunder-
 siderne 46.
 Planten grøn 53.
 46. Planten flerårig med forveddet grund 47.
 " ikke forveddet, oftest enårig 49.
 47. 1-6 brunskållede kurve sammen på bladløse skafter Phagnalon
 Stænglerne bladede til tæt på kurvene 48.
 48. Kurvene 1 cm brede. Sandplante Otanthus
 " 2-6mm " . Ikke på sand Helichrysum
 49. Svøbbladene m.m. glatte 50.
 " m.m. lårne 51.
 50. Kurvene samlede i puder, omgivne af udstående højblade . Evax
 " i nøgler Gnaphalium
 51. 1-3 cm høj. Bladene så lange som brede Evax rotundata
 Ofte høje. Bladene længere end brede 52.
 52. Kurvene kugleformede Micropus
 " pæreformede-kegleformede Pilago
 53. Planten helt glat 54.
 " m.m. håret 56.
 54. Enårig Cotula
 Flerårig 55.
 55. Slyngplante med vedbendformede blade Senecio mikanoides
 Urt med blade som Hvidt okseøj Plagiis
 56. Kurvene hvidgrå til hvidgule Conyza
 " gule til gulbrune 57.
 57. Alle svøbblade stort set lige lange Pulicaria
 Svøbbladene noget til meget forskellige i længde Inula
 58. Randkronerne gule 76.
 " hvide, blålige eller rødlig 76.
 59. Bladene modsatte Helianthus
 " spredte 60.
 60. Frugterne store, stærkt krummede, med tornet eller
 rynket ryg Calendula
 " ikke krummede 61.
 61. Kurvsvøbet består af 1 række end blade, evt. + en ekstra
 række små ydersvøbblade 62.
 Kurvsvøbet med 2-mange taglagte kurvsvøbblade 63.
 62. Bladene kommer frem efter blomastringen Tussilago
 " til stede under blomstringen Senecio
 63. Bladene 2 x fjersnitdelte 64.
 " hele til 1 x fjersnitdelte 65.
 64. Kurvsvøbbladene med hindeagtigt vedhæng .. Anacyclus radiatus
 " uden vedhæng Chrysanthemum coronarium
 65. Små korttangede kurve i halvskærm Achillea ageratum
 Anderledes 66.
 66. Kurvene i en lang og smal top 67.
 " ikke således 68.
 67. Planten klæbrigt kirtlet Inula viscosa
 " ikke klæbrig Solidago
 68. Kurvbunden med avner 69.
 " uden " 71.
 69. Randkronerne i 1 række Bupthalmum
 " i 2 rækker 70.
 70. De ydre svøbblade bladagtige, butte Asteriscus
 " " " og tornspidsede Pallenis
 71. Uden fnok 72.
 Med hårformet fnok 73.

72. Planten blågrøn; bladene fjærnttandede *Chrysanthemum segetum*
 grøn; bladene tættdandede *Coleostephus*
73. Fnokken består af 2 kranse, den ydre af skæl *Pulicaria*
 " " af 1 krans 74.
74. Planten filtet *Inula helenium*
 " glat til svagt dunet eller håret 75.
75. Veludviklede grundblade til stede *Doronicum*
 Grundbladene ikke særligt veludviklede *Inula*
76. Bladene 1-3 x fjærnsnitdelte 77.
 " ikke " 82.
77. Bladene 1 x fjærnsnitdelte med 1-2 par flige *Nananthea*
 " stærkere delte 78.
78. Bladfligene trådformede *Matricaria*
 " flade 79.
79. Skivekroner hvidlige. Småkurve i tæt halvskærm *Achillea*
 " gule 80.
80. Kurvbunden uden avner. Bladene gulgrønne *Tanacetum parthenium*
 " med " 81.
81. Ydre frugter bredt vingede *Anacyclus clavatus*
 Frugterne ikke vingede *Anthemis*
82. Bladene modsatte *Galinsoga*
 " spredte eller i roset 83.
83. Med hår- eller børsteformet fnok 84.
 Uden fnok 86.
84. Ingen stængelblade *Bellium*
 Med " 85.
85. Stænglen med 1 kurv *Erigeron*
 " " mange kurve *Aster*
86. Enårig 87.
 Flerårig 88.
87. Stængelblade med tilsmalnet grund *Bellis annua*
 " med stængelomfattende grund *Coleostephus*
88. 0-1 stængelblade 89.
 Flere " *Leucanthemum*
89. Bladene m.m. helrandede *Bellis*
 " tydeligt buttandede *Leucanthemopsis*
90. Kronen blå eller rødlig 91.
 " gul 93.
91. Bladene helrandede *Tragopogon*
 " fligede eller tandede 92.
92. Kronen blå *Cichorium*
 " rødlig *Prenanthes*
93. Bladene ligestrengede og helrandede 94.
 " fjerstrengede 95.
94. Svøbbladene hindeagtige *Catananche*
 " urteagtige *Scorzonera*
95. Frugten uden fnok 96.
 " med " 98.
96. Ydre frugter lange og stjerneformet udstående ... *Rhagadiolus*
 Frugterne ikke udstående 97.
97. Stænglen bladlet *Lapsana*
 Alle blade i roset *Arnoseris*
98. Fjerformet fnok 99.
 Hår- eller børsteformet fnok 103.
99. Kurvbunden med avner *Hypochoeris*
 " uden " 100.
100. 1 række svøbblade *Urospermum*
 Flere rækker svøbblade 101.
101. Alle blade i roset *Leontodon*
 Stængelblade til stede 102.
102. Planten stivhåret. Bladene ikke fligede *Picris*
 " glat til filtet. Bladene fligede *Podospermum*
103. Frugten med næb 104.
 " uden næb 108.

104. Frugten sammentrykt 105.
 " ikke sammentrykt 106.
105. 2 rækker kurvsvøbblade *Mycelis*
 Flere rækker kurvsvøbblade *Lactuca*
106. Stænglerne ugrene, bladløse, hule, tyndvæggede *Taraxacum*
 " anderledes 107.
107. En krone øverst på frugten under næbbet. Risformet,
 stærktgrenet med mange små, cylindriske kurve *Chondrilla*
 Frugten uden krone. Planten ikke risformet *Crepis*
108. Fnokhårene m.m. børsteagtige 109.
 Fnokken hårformet 110.
109. Stænglerne bladløse *Hyoseris*
 " bladede *Hedypnois*
110. Frugten sammentrykt *Sonchus*
 " ikke sammentrykt 111.
111. Kurvbunden med hår mindst af frugtens længde.
 Kurvsvøbet stærkt stjerneformet *Andryala*
 Kurvbunde uden lange hår 112.
112. Frugten stærkt tværrynket *Reichardia*
 " ikke " 113.
113. Svøbbladene i 2 rækker 114.
 " i flere rækker og taglagte 115.
114. Frugten afskåret foroven *Tolpis*
 " tilsmalnet foroven *Crepis*
115. Frugten tilsmalnet foroven. Med rodknolde *Aetheorhiza*
 " afskåret " " Uden " *Hieracium*

Eupatorium cannabinum L. Hjortetrøst. VII-IX. Alm. Flora Europa-
 ea, men ikke *Pignatti* udskiller 2 underarter:

ssp. cannabinum: Ofte kraftig og høj. Mellemste stængelblade
 3-5-delte. Fnokken længere end frugten.

ssp. corsicum (Req.) Fourn.: Spinkel og lille. Bladene oftest
 udelte. Fnokken ikke længere end frugten.

E. adenophorum Sprengel Rudebladet hjortetrøst. 80-200cm. Stæn-
 gel og stilke med korte kirtelhår. Bladene hele, trekantede eller
 rudeformede og takkede. Kurvene 5-10mm brede, hvidlige. IV-V.
 Korsika. Forvildet. (Meksiko).

Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner Øret hovblad. 40-70cm. Ned-
 re blade trekantet hjerteformet til nyreformet, oftest spindel-
 vævsdunede nedenunder, med grove, uens tænder. Øvre blades stilke
 med 2 øren ved grunden. Kurvene med 3-6 blomster, lyst rødlig.
 VII-VIII. Korsika: M. Renoso.

● *A. briquetii* Gamisans Glat hovblad. 30-90cm. Ligner den foregåen-
 de, men helt glat. Øvre stængelblade uden øren. Kurvene med 6-12
 blomster. Bladene regelmæssigt savtaktede. Kløfter, langs skov-
 bække. 1250-2600m. VI-VIII. Korsika: Alle bjergområder. Sj.

Solidago virgaurea L. Alm. gyldenris. VII-X. Alm.

Aster tripolium L. *ssp. pannonicus* (Jacq.) Soó Strandasters.
 VIII-IX. Lokalt alm.

A. squamatus (Sprengel) Hieron. Skælasters. 30-80cm. Enårig.
 Stænglen opret, glat, stærkt grenet. Bladene linje-lancetformede,
 helrandede. Talrige små kurve, 8mm brede, med korte, lyslilla
 tungekroner. IX-X. Alm. (Midt- og Sydamerika).

Conyza. Bakkestjerne.

1. Kurvsvøbet næsten glat. 3 rækker svøbblade *canadensis*
 " som regel håret. 2 rækker svøbblade 2.
2. Mellemste blade 1-årede, 2-4(7)mm brede *bonariensis*
 " " fjerstrengede, 5-15mm brede *albida*

Conyza canadensis (L.) Cronq. Kanadisk bakkestjerne. VI-X. M. alm.

Conyza bonariensis (L.) Cronq. Håret bakkestjerne. 10-60cm. Ligner foregående, men ofte noget tættere håret. Nedre blade linje-lancetformede. Ingen randkroner (korte randkroner hos canadensis). Toppen halvskærmformet. VI-IX. Alm.

C. albida Willd. Høj bakkestjerne. 50-150cm. Nær ved foregående, men lidt mere grågrøn. Nedre blade omvendt lancet- til linjeformede. Toppen pyramideformet. VI-IX. Alm.

Erigeron uniflorus L. Snebakkestjerne. 2-6cm. Flerårig. Rosetplante med fåbladet stængel. Grundbladene spatelformede, randhårede, 2-5cm. Hovederne enlige. Svøbbladene m.m. dunede, med lilla spids. Randkronerne lyslilla eller hvide. VIII-IX. Korsika. Sj.

Bellis. Tusindfryd.

1. Enårig med bladede stængler annua
- Flerårig rosetplante 2.
2. Bladene op til 2½cm brede, mørkegrønne, 3-årede silvestris
- " højst 1½ cm " , friskgrønne, 1-årede 3.
3. Bladene højst 10x6 mm, randhårede bernardi
- " gennemgående større, ikke randhårede perennis

Bellis annua L. Enårig tusindfryd. 5-12cm. Halvglat til stivhåret.

Bladene 6-25x3-15mm, m.m. finttandede, randhårede. Kurvene 5-15mm brede. XI-IV. Alm.

B. perennis L. Alm. tusindfryd. I-XII. M.alm.

• B. bernardi Boiss. & Reuter 1-6cm. Bladene glatte, helrandede eller sjældent med 1-3 par tænder. Kurvene højst 12mm brede. Fugtige enge. 1600-2000m. VII-VIII. Korsika: M.Cinto, Rotondo, Renoso.

B. silvestris Cyr. Mørk tusindfryd. 10-30cm. Bladene 3-18cm, omvendt lancetformede, dunede, med 3-5 årer. Skafterne stivhårede. Kurvene 2-4cm brede. Tungekronerne ofte rødt anløbne. IX-VI. Alm.

Bellium bellidioides L. Dværgtusindfryd. 3-15cm. Rosetplante med udløbere. Bladene spatelformede, lidt kødede, 6-12x3-7mm. Skafterne spinkle, rødlige med 1, 9-15mm bred kurv. Svøbbladene hårede, rødlige og hindekantede, 3mm lange. Enge og klipper. 0-2000m. IV-VIII. Sj.

B. crassifolium Moris Tykbladet dværgtusindfryd. 10-20cm., noget forveddet stængel uden udløbere. Bladene tykke, helrandede, rundt spatelformede, 9-15mm, spredt siddende eller m.m. sammentrængte til en roset, med stilke på 1½-4cm. Kurvsvøbbladene over 3mm. Kurvene 15-20mm brede. Kystklipper. IV-VIII. SV-Sardinien (vel omkring Portoscuso). Sj.

Micropus erectus L. Fureblomst (Bombycilaena erecta (L.) Smolj.) 5-20cm. Gråhvid. Bladene aflangt spatelformede, 10-18mm, m.m. bølgede i randen. Kurvnøglerne 8-10mm brede, kugleformede, oftest omgivne af længere højblade. V-VII. Sardinien. Sj.

• Evax rotundata Moris Bredbladet pudekurv. 1-4cm, ofte med udstrakte sidegrene i en cirkel. Bladene bredt spatelformede og afskårne fortil, 4-6x3-5mm, sølvhvide. De 2-8mm brede nøgler omsluttet af bladene. 0-300m. IV-V. N.Sardinien. Korsika: Ajaccio, Portovecchio. De mellemliggende øer og Maddalena-øgruppen. M.sj.

E. pygmaea (L.) Brot. Alm. pudekurv. 2-4cm, hvidfiltet. Bladene spatelformede, 5-15x2-5mm, afrundede i spidsen, højbladene 2-3 x nøglerne. Nøglerne tætte, danner en skive på 1-2cm. Op til 40 kurvsvøbblade på ca. 4mm, der er brungule med en stak på 1mm. IV-V. Alm.

E. asterisciflora (Lam.) Pers. 3-13cm. Stænglerne ofte grenede, ligner foregående, men bladene lancetformede, spidse; højbladene 3-4 x nøglerne. IV-V. Sardinien. Sj.

Filago. Musurt.

1. Planten pudeformet congesta
- Med opret stængel 2.
2. Kurvsvøbbladene med en stak 3.
- " uden stak 4.
3. Bladene bredest i nedre halvdel vulgaris
- " " i øvre " pyramidata
4. Kugleformede nøgler i gaffelgreningspunkter og grenender eriocephala
- Nøglerne ikke kugleformede 5.
5. Stænglen klaseagtigt grenet 6.
- " gaffelgrenet 7.
6. Nøglerne med 2-12 m.m. siddende kurve arvensis
- " med 2-5 kurve, nogle kurve enlige og stilkede heterantha
7. Bladene 4-10mm, aflangt-linjeformede til linjeformede, flade minima
- Bladene 15-25mm, linje-sylformede, ofte indrullede gallica

Filago vulgaris Lam. Kuglemuseurt. V-VIII. Alm.

F. eriocephala Guss. 10-20cm. Hvidfiltet. Stænglen oftest grenet over midten. Bladene bredest i nedre halvdel. Svøbbladene gullige, med en kort brod, men uden egentlig stak. IV-VII. Sardinien. Sj.

F. pyramidata L. Bredbladet museurt. 5-30cm. Gråhvidt filtet med kugleformede nøgler i gaffelgreningspunkter og grenender. Bladene 10-15mm, udvidede mod spidsen og afrundede. Nøglerne med 12-20 kurve, der ofte overrages af højbladene. Kurvene tydeligt 5-kantede, svøbbladene med lang, strågul stak. IV-VII. Alm.

F. congesta Guss. Pudemuseurt. 3-10cm., stænglen udviklet, med tiltrykte grene. Bladene spatelformede, 8-16mm. Kugleformede nøgler i gaffelgreningspunkter og grenender. Kurvene skarpt 5-kantede, svøbbladene med en stak på ½-1,2mm. IV. Sardinien: Cagliari til Bonavia. M.sj.

F. arvensis L. Agermuseurt. V-VII. Korsika. Sj.

F. minima (Sm.) Pers. Liden museurt. V-VIII. Sj.

F. gallica L. Spidsbladet museurt. 2-25cm, grålig. Bladene spidse, ofte med let indrullet rand, 15-25x0,8-1,2mm. Svøbbladene udtrukne i en lang, but spids. V-VIII. Sj.

F. heterantha (Rafin.) Guss. Stilket museurt. 8-30cm., gråfiltet. Nogle af de nedre kurve stilkede. Bladene 8-15x1-2½mm, spidse. V-VI. Sardinien. Sj.

Gnaphalium supinum L. Dværgevigheidsblomst. Flerårig, 2-12cm, gråfiltet. Bladene m.m. linjeformede, spidse. Kurvene bredt klokkeformede, svøbbladene snart stjerneformet udstående, rødbrunde. VII-VIII. 2400-3000m. Korsika. M.sj.

G. luteo-album L. Gulhvid evighedsblomst. 5-30cm. Enårig, hvidfiltet. Bladene omvendt lancet-linjeformede, spidse, 1-ribbede, 10-25 x 2-5mm, noget stængelomfattende. Nøglerne uden højblade omkring sig. Svøbblade glatte, gullige. Blomsterne gullige, rødlige foroven. Fugtige, ofte sandede steder. VI-IX. Sj.

Phagnalon. Stenkurv. Buske op til 30-40cm. Brunt, glat kurvsvøb.

1. Grenene med 2-6 kurve i et nøgle sordidum
- Kurvene enlige 2.
2. Mellemløste kurvsvøbblade med bølget rand saxatile
- " " " flad rand rupestre

Phagnalon sordidum (L.) Rchb. Nøglistenkurv. Bladene 1-3cm x 1mm, helrandede, tæt uldhårede på begge sider, randen stærkt omrullet. Kurvene pæreformede til cylindriske, ret små. VI-VII. Alm.

Phagnalon rupestre (L.) DC. Klippestenkurv. Bladene linje-spatelformede, 20-25x3-4mm, spidse, tæt uldhårede nedeunder, glatte eller svagt fildede ovenpå, med bølget-tandet rand. Kurvene ægformede, 8-12x6-10mm. II-VI. Alm.

P. saxatile (L.) Cass. Smalbladet stenkurv. Bladene linjeformede, 3-5cm x 2-3mm, med let bølget rand, tæt uldhårede nedeunder, svagt uldhårede ovenpå. Kurvene 1½cm brede. III-VI. Sj.

Helichrysum. Evighedsblomst. Flerårig. Gulblomstret.

1. Kurvene enlige i spidsen af grenene 2.
" i halvskærm 3.
2. Øvre og nedre blade ret ens frigidum
Øvre blade 5-10 x så lange som de nedre montelimasanum
3. Nedre blade 0,8-1,6mm brede italicum
" " 1,5-3 mm " saxatile

② Helichrysum frigidum (Lab.) Willd. Skælevighedsblomst. 5-15cm. Tæt tueformet med liggende til opstigende skud. Bladene 2-5mm, hvidfildede på begge sider, taglagte og m.m. 4-radede. Kurven 8-15 mm bred, kegelformet. Svøbbladene sølvhvide, helt hindeagtige. Klipper. 600-2000m. VI-VII. Korsika. Sardinien: M.Limbara. Sj.

③ H. montelimasanum Schmid 5-10cm. Som foregående, men behåringen mindre tæt, mere spindelvævsagtig. Nedre blade skælformede, 1-2mm; de øvre linjeformede og spidse, 10-15mm. Granitklipper. ca.1000m. VI. SV-Sardinien: M.Linas. M.sj.

H. italicum (Roth) Don Smalbladet evighedsblomst. 25-40cm. Stinkende halvbusk. Bladene smalt linjeformede med omrullet rand, der dækker indtil 2/3 af undersiden, oftest grønne og svagt fildede. Halvskærmen 1½-8cm bred. Kurven 2-3mm bred, smalt klokkeformet under blomstringen. De indre svøbblade mindst 5 x de ydre. V-IX. Alm.

④ H. saxatile Moris Nær foregående. Bladene noget mindre omrullede. Halvskærmen 2-10cm bred. Kurven 4-5mm bred, cylindrisk-klokkeformet under blomstringen. De indre svøbblade ca.3 x de ydre. Kalkklipper. 300-1000m. V-VII. Sardinien: Orgosolo, Oliena, Dorgali, Baunei, Uzzulei, Ulassai, Ogliastro. Sj.

Inula. Alant.

1. Randkroner tilsyneladende manglende 2.
" veludviklede 3.
2. Stærktgrenet, kirtelhåret, smalbladet enårig graveolens
Svagtgrenet, ukirtlet, lancetbladet toårig conyza
3. Nedre blade 40-80x10-20cm. Kurvene 6-7 cm brede helenium
" " mindre. Kurvene 1-3½ cm brede 4.
4. Bladene kodede, linjeformet cylindriske crithmoides
" flade, ikke kodede 5.
5. Planten klæbrigt kirtlet. Mange kurve i top viscosa
" ukirtlet. 1-9 kurve i halvskærm 6.
6. Øvre blade med stængelomfattende grund. 1-3 kurve .. salicina
" " " kileformet grund. Oftest 5-9 kurve spiraeifolia

Inula helenium L. Lægealant. VII-X. Kulturrest.

I. salicina L. Pilealant. VI-IX. Sardinien. Sj.

I. spiraeifolia L. Udspærret alant. 30-80cm. Ligner foregående, men stænglen dunet forneden, glat foroven. Bladene tydeligt netårede på oversiden, svagt hårede i det mindste langs kanten og på undersidens årer. VI-IX. Korsika. M.sj.

I. conyza DC. Trekløftalant. 50-120cm. Kurvene i en top, 1 cm brede, cylindriske, med taglagt og ofte rødspidset svøb. VII-IX. Alm.

Inula crithmoides L. Strandalant. 40-70cm. Glat halvbusk med opstigende grene. Bladene 2-4½cm x 2-4mm, helrandede eller med tre-tandet spids. Kurvene mellemstore på hule, fortykkede stilke med mange skælformede højblade. Kyster. VII-XI. Lokalt alm.

I. graveolens (L.) Desf. Tægealant. 20-50cm. Kamferlugtende. Bladene linjeformede, 20-33x1-2mm, spidse, m.m.helrandede; de nederste indtil 1 cm brede. Mange små kurve, 4-7mm brede. VIII-XI. Alm.

I. viscosa (L.) Aiton Klæbrig alant. 40-130cm. Stænglerne oprette, forveddede nedentil, stivhårede foroven. Nedre blade linjeformede til aflangt lancetformede, 3-7cm x 2-30mm, spidstandede og ru. Kurvene mellemstore, svøbet 6-8mm. VIII-X. Alm.

Pulicaria. Loppeurt. Ligner foregående, men fnokken med en ydre krans af små skæl.

1. Randkronerne 0-3mm. Oftest enårig 2.
" mindst 5mm. Flerårig 3.
2. Stængelbladene linjeformede, 2-3mm brede sicula
" lancetformede, bredere vulgaris
3. Grundbladene visne under blomstringen dysenterica
" i en vedvarende roset odora

Pulicaria sicula (L.) Moris 20-60cm. Svagt håret til glat. Opret. Bladene 15-30mm, spidse, ofte med omrullet rand. Mange kurve på 7-10mm i en grenet top med en del små højblade på stilkene. Fugtige steder, grøfter. VII-X. Alm.

P. vulgaris Gaertner Alm. loppeurt. 7-30cm. Stinkende, filtet af krusede hår. Kurvene på korte, bladede stilke. VIII-IX. Sardinien. Sj.

P. dysenterica (L.) Bernh. Strandloppeurt. 30-70cm. VII-X. Alm. Forekommer her sydpå i en form med mindre kurve.

P. odora (L.) Rchb. Knoldloppeurt. 30-90cm. Med vedvarende roset af æg-lancetformede blade. Stængelbladene noget omfattende, de nedre med øret grund, kirteltandede, grønne og ru ovenpå, gråladne nedeunder. 1-få kurve, der er 2-3cm brede og halvkugleformede. VI-VII. Alm.

⑤ Buphthalmum inuloides Moris 30-50cm. Stænglerne oprette, grene-de, forveddede forneden. Bladene elliptisk-lancetformede, 2-2½cm, spidse, med 2-4 par spidse tænder. Kurvene enlige på lidt fortykkede grenender. Kystklipper. V-VI. NV-Sardinien: Capo Testa samt øerne Tavolara, Budelli, Mortorio. M.sj.

Asteriscus aquaticus (L.) Less. Vandstjærnesvøb. 10-40cm. Opret 1-årig, der er m.m. halvskærmformet gaffelgrenet i øverste halvdel. Ydre kurvsvøbblade bladagtigt forlængede, længere end randkronerne, disse citrongule. Fugtig-eller sandet jord. IV-VII. Sardinien. Sj.

A. maritimus (L.) Less. Strandstjærnesvøb. Op til 20cm. Flerårig med forveddet grund. Bladene aflangt spatelformede, stilkede. Ydre kurvsvøbblade bladagtigt forlængede, m.m. af randkronernes længde, disse guldgule, dybt 3-tandede. Kystklipper. IV-V. Sj.

Pallenis spinosa (L.) Cass. Tornet stjærnesvøb. Op til 60cm. 1-2-årig. Grenene rager op over stænglen. Bladene spatel- til lancet-formede, brodspidsede. Ydre kurvsvøbblade bladagtigt forlængede og tornspidsede. V-VIII. Alm.

Bidens tripartita L. Fliget brøndsel. VII-X. Alm.

B. bullata L. 20-60cm. Nær foregående. De nedre blade oftest hele, ret bredt ægformede; de øvre oftest 3-delte med ægformede flige. VIII-X. Korsika. Sj.

Helianthus annuus L. Solsikke. VII-X. Dyrket og forvildet.

H. rigidus (Cass.) Desf. 1-3m. Flerårig. Stænglen ru, grenet foroven. Bladene modsatte foroven, bredt lancetformede, 10-15x6-8cm, ru og tandede. Kurvene 7-10cm brede, randkroner indbefattede; disse gule. Skivekronerne brune. Langs vandløb. VIII-X. Forvildet.

Ambrosia maritima L. Strandambrosie. 10-30(-60)cm. Opret, grenet, aromatisk enårig. Nedre blade modsatte, øvre spredte, alle dybt 2 x fjersnitdelte med gråhåret underside. Bynkelignende hankurve i et endestillet aks. Sandstrand. VII-IX. Sj.

Xanthium spinosum L. Tornet brodrfrø. 20-80cm. Nedliggende til opstigende, ofte dunet enårig. Gule, fra grunden 3-kløvede torne i bladhjørnerne. Bladene 3-5-kløvede, henad Hjertespands, mørkegrønne ovenpå, hvid-gråfildede nedenunder. VII-X. Alm. (Sydamerika).

X. strumarium L. Skræppebrodrfrø. 20-120cm. Bladene m.m. trekantede med let hjerteformet grund, 8-12x7-12cm, med 3-5 brede, groft savtakke lapper, grønne. Frugten 12-15x6-10mm, tornet og med to rette spidser fortil. VII-X. Alm.

X. italicum Moretti Plettet brodrfrø. 30-120cm. Ligner foregående, men bladene med afskåren grund; stænglen ofte mørkplettet; frugten 15-35x6-25mm med to krogformede spidser fortil. VII-X. Alm.

Galinsoga parviflora Cav. Håret kortstråle. VIII-X.

Santolina. Cypresurt. Halvbusk på 20-40cm.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. De blomstrende stænglers blade med sideflige på 2-5mm | insularis |
| " " " " " " " " " " " " | " " " " " " " " " " " " |
| 2. De blomstrende stængler udelte til fågrenede | marchii |
| " " " " " " " " " " " " | " " " " " " " " " " " " |
| | flergrenede corsica |

☉ Santolina corsica Jordan & Fourr. Bladene talrige, med en stilk på 1-4mm, 1-3cm lange, sidefligene 1-2mm på de blomstrende skuds blade, 2-3mm på de golde skuds. Kurvene 7-10mm brede. VI-VII. Korsika. Midt- og Nordsardinien. Alm.

☉ S. insularis (Genn.) Arrigoni Bladene stilkede, de golde skuds 3-6cm lange, de blomstrende skuds $\frac{1}{2}$ -3cm. Kurvene 10-16mm brede. VI-VII. Midt- og Sydsardinien.

S. marchii Arrigoni Bladene kortstilkede, 1-2cm foroven og 2-4cm forned på skuddene. Sidefligene i 2-4 rækker. Kurvene 8-12mm. VI-VII. Forvildet haveplante af ukendt oprindelse.

Anthemis. Gåseurt.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Randkroner mangler | asperula |
| " " findes | " " " " " " " " " " " " |
| 2. Flerårig. Bladene kødede, 1(-2) x delte | maritima |
| Enårig (sjældent 2-årig) | " " " " " " " " " " " " |
| 3. Skivekronerne med en sæk eller spore ved grunden | 4. |
| " " uden " " " " " " " " " " " " | " " " " " " " " " " " " |
| 4. Kurvsvøbbladene sortkantede, tilsidst nedadbøjede | ... praecox |
| " " hindekantede, tiltrykte | " " " " " " " " " " " " |
| 5. Bladene tykke med kirtelprikket underside | secundiramea |
| " " ikke tykke, ikke kirtelprikkede | " " " " " " " " " " " " |
| 6. Kurvbundens avner afstudet spatelformede med lang brod | altissima |
| " " lancet- eller børsteformede | " " " " " " " " " " " " |
| 7. Avnerne lancetformede. Planten ikke stinkende | arvensis |
| " " børsteformede. Planten stinkende | " " " " " " " " " " " " |

Anthemis maritima L. Strandgåseurt. 12-70cm. Glat til svagt dunet dværgbusk. Svøbbladene spidse og lyst hindekantede. Randkronerne ofte nedadrettede. Sandstrand. V-XI. Lokalt alm.

Anthemis secundiramea Biv. ssp. secundiramea 10-40cm. Stænglerne nedliggende til opstigende, ofte røde. Kurvene på lange, fortykkede og ofte ensidigt rettede stilke. Ydre frugter ribbede og m.m. kornede, de indre næsten glatte. Nær kysten. IV-VI. Sj.

A. asperula Bertol. 2-4cm. Planten ofte ladden. Bladene 1-2x delte. Frugtstilkene fortykkede og ofte m.m. krumme. Enge og udyrkede steder. 0-900m. V-VII. Korsika: Niolo. M.sj.

A. arvensis L. Agergåseurt. IV-VI. Alm. 3 underarter: ssp. arvensis; Frugtstilkene ikke fortykkede. ssp. incrassata (Loisel.) Nyman: Frugtstilkene fortykkede under kurvene. Frugterne ikke rynkede. Planten oftest tæthåret. ssp. acrochordona Briq. & Cav.: Frugtstilkene fortykkede. Planten kraftig, 1-2-årig, gråfiltet, med liggende og ofte rodslående stængler. Frugterne fintrynkede. Sardinien. Korsika: Ajaccio.

A. cotula L. Stinkende gåseurt. VI-IX. Alm.

A. praecox Link Vårgåseurt. (Chamaemelum fuscum (Brot.) Vasc.). 5-30cm. M.m. glat. Stænglerne rødlig. Bladene 2 x delte, m.m. kødede. Kurvsvøbet sortrandet. Avnerne butte. XI-VI. Sardinien: Alm. Korsika: Sj.

A. mixta L. Tofarvet gåseurt. (Chamaemelum mixtum (L.) All.). 10-50cm. Dunet til tæthåret. Svøbbladene grønlig med bred hindekant. Randkronerne ofte nedadrettede. V-IX. Alm.

A. altissima L. Høj gåseurt. 20-80cm. Næsten glat til dunet. Frugtstilkene fortykkede. Frugterne med 10 fine striber på hver side. V-IX. Korsika. Alm.

Anacyclus radiatus Loisel. Gul bertram. 20-60cm. Enårig. Bladene 2 x delte med 1-3mm brede afsnit. Kurvsvøbbladene med et vedhæng som hos Centaurea jacea. Avnerne bredt spatelformede med brod. Frugten fladtrykt med 2 vinger. V-VIII. Korsika. Sj.

A. clavatus (Desf.) Pers. Kølbertram. 20-60cm. Bladene 2-3 x delte, småfligede. Kurvstilkene ofte fortykkede i frugt. Svøbbladene ofte med rødlig kant, uden vedhæng. Avnerne og frugterne som hos foregående. IV-VII. Sj.

Achillea. Røllike.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Blomsterne gule. Bladene tandede | ageratum |
| " " hvide. " 2(-3) x fjersnitdelte | " " " " " " " " " " " " |
| 2. Mellemske stengelblade ca. 2 x så lange som brede | .. ligustica |
| " " flere gange længere end brede | " " " " " " " " " " " " |
| 3. Bladene oftest $1\frac{1}{2}$ cm brede, næsten parallelsidede | collina |
| " " $1\frac{1}{2}$ -3 cm brede, med svagt buede sider | millefolium |

Achillea ageratum L. Balsamrøllike. 10-80cm. Med kamferlugt. Bladene i knipper langs stænglen, omvendt lancet- til spatelformede, 2-5cm, grofttandede og kirtelprikkede. Halvskærmene med 15-mange, gule kurve. IV-X. Sj.

A. millefolium L. Alm. røllike. V-IX. Sj.

A. collina Becker Bakkerøllike. 30-70cm. Nær foregående. M.m. tæt langhåret. Nedre blade 8-13x1- $1\frac{1}{2}$ cm, de øvre 5x1cm, fligene tætstil- lede, ofte spidsvinklet påsatte (mere rette hos millefolium). Kur- vene $2\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ mm (4-5 hos millefolium). V-VII. M.alm.

A. ligustica All. Skarpfliget røllike. 50-100cm. Stengelbladene med ægformet omrids, flade, 2-3x1 $\frac{1}{2}$ cm, dunede med noget tandet skaft. Kurven 2 $\frac{1}{2}$ -3mm. Kronerne hvide til hvidgule. VI-VII. Sj.

Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Lk. Sølvøre. 20-40cm. Tæt hvid- filtet flerårig med opstigende stængler. Bladene udstående, om- vendt lancetformede, butte, 9-12x4-5mm, siddende. Kurvene kugle- formede, de ydre svøbblade uldhårede, de indre galte med uldhå- ret spids. Sandstrand. VI-VIII. Lokalt alm.

Matricaria chamomilla L. Vellugtende kamille. V-VIII. Alm.

Chrysanthemum segetum L. Gult okseøje. IV-VIII. Alm.

C. coronarium L. Kronokseøje. 20-60cm. Enårig. Bladene 2 x delte med ofte tandede afsnit. Ydre kursvøbblade med brunligt kantbånd og hvidlig hindekant. Randkronerne gule eller hvidliggule. IV-VII. Alm.

Coleostephus myconis (L.) Cass. Rørøkseøje. 10-45cm. glat eller svagt håret. Enårig med opret og ofte grenet stængel. Bladene omvendt æg-spatelformede, m.m. regelmæssigt tandede, de øvre m.m. stængelomfattende. Randkronerne gule eller hvide med gul grund. Frugterne med et rør i spidsen. IV-VII. Alm.

Plagiush flosculosus (L.) Alavi & Heyw. Kronløst okseøje. 40-100cm. Noget forveddet flerårig. Glat. Bladene spatelformede til aflange, regelmæssigt tandede, med øret grund. Kurvene 10-13mm brede, gule, uden randkroner. V-IX. Vest- og Sydsardinien. Korsika: især Sartenais. Alm.

Leucanthemum. Hvidt okseøje.

1. Stængelbladene 2 x fjersnitdelte *corsicum* ssp. *fenzlii* 2.
- " " ikke " 2.
2. Mellemste stængelblade regelmæssigt tandede *ircutianum* 3.
- " " uregelmæssigt " 3.
3. Stængelbladene med spidse sidelapper .. *corsicum* ssp. *corsicum* 3.
- " " butte " *vulgare* 3.

Leucanthemum vulgare Lam. Hvidt okseøje. (L. *praecox* Horv.) Mellemste stængelbladets nedre flige længere end brede. III-VII. Sardinien. Sj.

L. ircutianum (Turcz.) DC. Mellemste stængelbladets nedre flige kortere end hos foregående. V-X. Sardinien. Alm.

- ① L. corsicum (Less.) DC. ssp. *corsicum* Nedre blade spatelformede med lappet plade; de mellemste fjerlappede fortil, sjældent hele. Klipper. 1200-1900m. VI-VIII. Korsika: Rotondo, Renoso, Bavella, Incudine, Cinto. Sj.

- ② L. corsicum ssp. *fenzlii* Gamisans Nedre blade m.m. delte; de mellemste 2 x delte med linjeformede flige. 1350-1800m. VI-VIII. Korsika: M.Oro og Punta Migliarello. M.sj.

- ③ Leucanthemopsis tomentosa (Loisel.) Holub 3-6cm høj. Bladene i roset, håndtakket spatelformede med butte, ægformede lapper, fildede. Stænglen med 0-1 blad. Randkronernes grund ofte karminrød. 2000-2700m. Klipper. VII-VIII. Korsika: M.Rotondo. M.d'Oro, M.Cagnone. Col de France i Niolo. Sj.

Tanacetum parthenium (L.) Sch.-Bip. Matrem. VI-IX. Forvildet. Alm.

- ④ T. audiberti (Req.) DC. Ligner Rejnfang, men kun 4-10 kurve i en ganske åben halvskærm. Enge og kløfter. 800-1800m. VII-IX. Sardinien: Gennargentu. Korsika: M.Rotondo, Restonica-kløften, Niolo. Sj.

- ⑤ Nananthea perpusilla (Loisel.) DC. Dværgokseøje. 3-6cm. Spinkel, glat enårig. Stænglerne krybende, med rosetter ved nogle af ledde. Bladene noget kødede, 10x2-3mm, med 3-5 ægformede, butte lapper. Kurvene 2-5mm brede, randkronerne 3x1mm. Klipper og sand nær kysten. II-VI. Sardinien: Porto Scuso, Stintino. De små øer mellem Sardinien og Korsika. M.sj.

Cotula coronopifolia L. Firkløft. 5-20cm. Bladene stængelomfattende, m.m. fjerfligede. Kurvene 5-10mm brede, uden randkroner, nikkende før blomstringen. Saltsumpe. VII-VIII. SØ-Sardinien: Stagno di Colostrai. Alm.

Artemisia. Bynke.

1. Bladene mørkegrønne ovenpå, gråfildede nedenunder 2.
- " " af samme farve på begge sider 3.
2. 1. ordens bladflige ujævnt tandede til fjersnitdelte *vulgaris*
1. " " helrandede *verlotorum*
3. Kurvene 1-2mm brede 4.
- " " 3-8mm " 5.
4. De visne, tornagtige bladstilke blivende *densiflora*
- De visne blade falder af *coerulescens*
5. Bladfligene 3-4mm brede. Kurvene 3-5mm brede *absinthium*
- " " 1/2-2mm " " 5-8mm " *arborescens*

Artemisia vulgaris L. Grå bynke. VII-X. Sj.

A. verlotorum Lamotte Pilebladet bynke. 50-200cm. Med lange udløbere. Bladfligene helrandede, spidse. X-XI. Sardinien. Indslæbt.

A. arborescens L. Buskmalurt. 50-100cm. Hvidfiltet. Stænglerne forveddede forneden. Bladene 1-2 x delte, smal- og butfligede. VI-VIII. Alm.

A. absinthium L. Malurt. VIII-IX. Alm.

A. coerulescens L. 30-80cm. Svagt gråfiltet til m.m. glat. Golde skud med ofte hele, omvendt lancetformede blade. Stængelbladene hele eller 1-2 x delte. Toppen bred, pyramideformet. Ksytnære steder. Korsika. Sj.

- ⑥ A. densiflora Viv. 10-22cm. Gråfiltet halvbusk. Stængelbladene 1 x delte. Ksytnære steder. VII-X. Korsika: Bonifacio, St.Florent. Sardinien: Maddalena-øgruppen. M.sj.

Tussilago farfara L. Pølfod. II-IV. Alm.

Petasites fragrans (Vill.) Presl Vellugtende hestehov. 20-40cm. Bladene hjerte-nyreformede, 5-20cm, regelmæssigt finttandede. 5-10 kurve med rødligthvide blomster. I-IV. Sardinien. Sj. Fugtige kløfter.

- ⑦ Doronicum corsicum Poiret 30-90cm. Stænglerne kirtelhårede foroven, m.m. glatte forneden. Grundbladene ægformede, kortstilkede; stængelbladene lancetformede, m.m. glatte. Mange, 2 1/2-4 1/2 cm brede kurve. Fugtige kløfter, bjergbække. VII-VIII. Korsika: M.Cinto, Rotondo, Renoso. Alm. 500-1500m.

D. grandiflorum Lam. Storblomstret gemserod. 10-35cm. Stænglerne dunede. Grundbladene ægformede, langstilkede; stængelbladene m.m. stængelomfattende. Kurvene enlige, 3 1/2-6 1/2 cm brede. 2000-2500m. VII-VIII. Korsika. Alm.

Senecio. Brandbæger.

1. Bladene helrandede til tandede 2.
- " " lappede til delte 4.
2. Stænglerne forveddede og klatrende. Bladene vedbendagtige *mikanoides*
- Stænglerne oprette. Bladene m.m. lancetformede 3.
3. Stængelbladene aftager gradvist i størrelse mod højbladene *doria*
- " " forskellige i størrelse fra højbladene *fuchsii*
4. Bladundersiden hvidfiltet, oversiden gråfiltet *cineraria*
- Bladene ikke fildede 5.
5. Randkroner mangler *vulgaris*
- " " til stede 6.
6. Randkronerne tilbagerullede *lividus*
- " " udstående 7.
7. 21 indre kurvsvøbblade 8.
- 13 " " 9.
8. Frugterne finkornede *delphinifolius*
- Frugterne glatte *siculus*

9. Enårig 10.
 Flerårig 11.
 10. Bladene med 1-1½mm smalle flige. M.m. håret gallicus
 Grundbladene hele til lappede. M.m. glat leucanthemifolius
 11. 4-6 ydre kurvsvøbblade erucifolius
 1-3 " " erraticus

Senecio doria L. Tykbladet brandbæger. 40-100cm. Nedre blade ægformede til elliptiske, 15-25x2-3cm, helrandede eller finttandede. Mange, 15-25mm brede kurve i sammensat halvskærm. Kurvsvøbet 5-6mm glat eller svagt håret. Ydre svøbblade ca. ½ x de indre. Sumpe og tørvemoser. VI-IX. Sardinien: Valle del Tarquisara, Gennargentu. M.sj.

S. fuchsii Gmelin. Pilebladet brandbæger. 50-150cm. Bladene lancetformede, 5 x så lange som brede, med 1-2mm lange tænder. Ydre kurvsvøbblade ofte længere end de indre. VI-VIII. Korsika.

S. cineraria DC. Gråblad. 30-60cm. Dværgbusk med hvidfildede stængler. Bladene 1 x delte med ca. 5 par m.m.brede flige. Mange kurve i tætte halvskærme. V-VIII. Alm.

S. mikanioides Otto. Jærnbanevedbend. 30-300m. Slyngende, forveddede grene. Bladene stedsegrønne, kødede, vedbendagtige. Kurvene i tætte toppe, uden randkroner. VIII-X. Sardinien: Cagliari. (Sydafr.)

S. erucifolius L. Smalfliget brandbæger. 30-120cm. Bladene ret smalt fjersnitdelte med skaftområdet 2-3mm bredt; fligene spids-til retvinklet udstående, ca.2mm brede og ensidigt tandede. Bred halvskærm. VII-IX. Korsika. Sj.

R. erraticus Bertol. (S.aquaticus ss. barbareaefolius) Vandbrandbæger. VI-X. Alm.

S. siculus All. Kålbrandbæger. 20-30cm. Bladene spatelformede, 5-9x2-4cm, bredest ca.2/5 fra spidsen, med nogle afrundede lapper og øret grund, let blågrønne. 700-1850m. IV-VII. Sardinien: Pula, Sarrabus, Miniera di S.Leone m.m.

S. leucanthemifolius Poir. 5-40cm. Ofte meget kødet. Ganske foranderlig. Bladene ofte omvendt ægformede, tandede eller groft fjerdelte. Mest langs kysten. XI-V. Alm.

S. gallicus Willd. Fligøret brandbæger. 10-40cm. M.m.glat til spindelvæsvhåret forneden. Stænglerne rødlig og stribede. Blade med smalle, tandede og noget omrullede, ofte retvinklet udstående flige. Mellemste og øvre med tandede til fligede øren. III-VI. Korsika. Sj.

S. delphinifolius Vahl. 20-60cm. Nedre blade lyreformet delt; de mellemste og øvre med smalle, ofte trekløvede flige. IV-V. Sardinien. Sj.

S. vulgaris L. Alm. brandbæger. I-XII. Alm.

S. lividus L. Fennikelbrandbæger. Op til 40cm, med fennikellugt. Planten fåhåret forneden og m.m. kirtelhåret i blomsterstanden. Bladene glatte eller noget kirtlede, m.m. lappede. IV-VI. Sj.

Calendula officinalis L. Morgenfrue. VI-XII. Dyrket og forvildet.

C. arvensis L. Agermorgenfrue. 15-25cm. Ofte temmelig grenet enårig. Bladene aflange til smalt omvendt ægformede, m.m. helrandede. Kurvene 1-2cm brede. Tungekronerne gule eller orange. Rørkronerne af samme farve, undertiden brune. Ydre frugter 1½-2cm lange, med næb og ofte tornede. XI-V. Alm.

C. tripterocarpa Rupr. Ligner foregående, men bladene linje-lancetformede. De lange frugter altid 3-vingede. XI-VI. Sj.

Arctium minus (Hill) Bernh. Liden burre. VII-IX. Alm.

Arctium pubens Bab. Melet burre. Blomsterne af længde med svøbbladene. Kurvstilke 1-4cm. Kurvsvøbet strågult. Korsika.

Carduus. Tidsel

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Kurvene halvkugle- eller ægformede | 2. |
| " cylindriske | 5. |
| 2. Kurvsvøbbladene 3-5mm brede forneden | macrocephalus |
| " 1½-2mm " | 3. |
| 3. Kurvene mest 3 sammen. Bladene ofte hvidarede | argyroa |
| " enlige. Bladene ikke hvidarede | 4. |
| 4. Mellemste svøbblade ½-1 mm brede | corymbosus |
| " " 1½-2mm " | vivariensis |
| 5. Mellemste svøbblade ½-1 mm brede | corymbosus |
| " " mindst 1½ mm brede | 6. |
| 6. Kurvene i grupper på 5-15, der overrages af støtteblade | 7. |
| eller i det mindste af disses torne ... | 8. |
| Disse træk ikke kombinerede | 8. |
| 7. Blomsterne rødilla | cephalanthus |
| " hvide | fasciculiflorus |
| 8. Nedre svøbblade højst ½ x så lange som resten | australis |
| " " ikke meget kortere end resten | 8. |
| 9. Øvre kurve 1-3 sammen. Kronerne længere end svøbet, | pycnocephalus |
| ofte lyserøde | pycnocephalus |
| Øvre kurve 4-8 sammen. Kronerne kortere end svøbet | tenuiflorus |
| ofte rødilla | tenuiflorus |

Carduus macrocephalus Desf. 30-60cm. Bladene med 6-10 par lapper og endetorne op til 12mm. Ydre og midterste svøbblades yderste 2/3 nedadkrummede eller udstående. Kurvene op til 8cm brede på oftest forlængede stilke uden vinger. VI-VIII. Sardinien. Alm. 2 underar. ssp. macrocephalus: Bladribberne forhøjede hele vejen. Alm. ssp. inconstrictus (O.Schwarz) Kazmi: Bladribberne kun forhøjede i den inderste halvdel. ?

C. vivariensis Jordan. Hagetidsel. 40-100cm. Stænglerne vingede op til 6mm. Bladene glatte ovenpå, stærkt tornede. Kurvene 3-5cm brede. Svøbbladene med langt nedadbøjet spids. VI-VIII. Korsika som ssp. australis Nyman. Sj.

C. argyroa Biv. 20-75cm. Stænglens vinger op til 2mm, dens torne op til 7mm. Bladene kraftige, m.m.glatte ovenpå med m.m. trekantede lapper. Kurvene 1-4 sammen. Svøbbladene tiltrykte, smalt hindekantede. Blomsterne oftest lyserøde. IV-V. Sydsardinien. Alm.

C. pycnocephalus L. Piltidsel. 20-60cm. Stænglen gråfiltet oven-til, dens vinger fortsætter ofte lige til kurvene. Bladene med 3-5 par lapper og hvidfiltet underside. Midterste kurvsvøbblade meget fint randhårede, spindelvævsfildede. IV-VII. M.al.

C. tenuiflorus Curtis. Smalhovedet tidsel. 20-70cm. Ligner den foregående, men de midterste kurvsvøbblade glatte til svagt spindelvævsfildede og ikke randhårede. IV-VII. Sj.

C. australis L.f. Marmortidsel. Ligner de to foregående, men kurvene oftest samlede 3-5 sammen og overrages af de øvre blades torne. Bladene ofte hvidbrogede. Kronen ofte hvid. De mellemste og indre svøbblade med forholdsvis but og ofte rødilla spids. IV-V. Korsika. Sj.

C. cephalanthus Viv. Lædertidsel. Stænglen hvidfiltet foroven. Bladene læderagtige, næsten helt indskarpe, med 3-5 par flige. IV-VI. Sj.

C. fasciculiflorus Viv. Nøgletidsel. Nær foregående. Bladene med glat eller dunet underside. Svøbbladene glatte. IV-VI. Sj.

C. corymbosus Ten. 30-70cm. Enårig. Stænglerne vingede forneden, trinde og gråfildede foroven. Bladene 3/5-4/5 delte. Kurvene enlige, 2-2½x1½cm. Kronen 17-18mm. IV-VI. Alm.

Picnomon acarna (L.) Cass. Tornsvøb. 20-50cm. Enårig. Gråt spindelvævsfiltet. Stænglen med finttandede vinger. Bladene nedløbende. Kurvene i nøgler, omgivne af de øvre blade som en slags svøb. Kurvsvøbbladene med en krummet, fjerfliget spids. Blomsterne lyst rødlig. VI-VII. Sardinien. Sj.

Notobasis syriaca (L.) Cass. Spydtidsel. 20-150cm. Enårig. Stænglen uvinget. Bladene læderagtige. De øvre blade fjersnitdelte og stort set reducerede til ribberne; de omgiver kurvene som et svøb. V-VI. Sj.

• Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter 30-80cm. Flerårig. Stænglerne furede og gråfildede. Bladene med hvidfiltet underside, smalt lancetformede med kraftige, gyldne torne på 7-12mm. Kurvene omgivne af de øvre blade. VI-VII. 1500-1700m. Sardinien: Gennargentu omkring Bruncu Spina.

Ptilostemon casabonae (L.) Greuter Elfenbenstidsel. 40-100cm. Flerårig. Bladene linje-lancetformede, helrandede med knipper på 2-flere torne langs randen, skinnende ovenpå, hvid- til ofte rustfildede nedenunder. VI-VIII. Alm.

Cirsium. Tidsel.

1. Bladoversiden finttornet 2.
" ikke finttornet 4.
2. Bladene ikke nedløbende scabrum
" nedløbende 3.
3. Kurvene 1-1½cm brede, overrages af støtteblade italicum
" 2-4 cm " , omgives ikke af støtteblade vulgare
4. Bladene ikke (sjældent kort) nedløbende arvense
" nedløbende creticum

Cirsium italicum (Savi) DC. Lansetidsel. 20-45cm. Stænglen spinke. Bladene bleggrønne, noget fildede nedenunder. Kurvsvøbbladene med en purpurbrun, køllignende fortykkelse under tornspidsen. VII-X. Sj.

C. vulgare (Savi) Ten. Horsetidsel. VI-X. Alm. 2 underarter:
ssp. vulgare: Bladundersiden håret, men grøn. Kurven ægformet.
ssp. silvaticum (Tausch) Dostál: Bladundersiden grå- til hvidfiltet. Kurven m.m.kugleformet.

C. scabrum (Poiret) Bonn. & al. 100-200cm. Bladene meget store, med stængelomfattende grund, m.m. fildede nedenunder. Kurvene 1-3 sammen på lange grene i en åben top, med korte støtteblade under sig. VI-IX. Sardinien. Sj.

C. arvense (L.) Scop. Agertidsel. V-IX. M.alm.

C. creticum (Lam.) D'Urv. Damtidsel. 50-100cm. Stænglen vinget hele vejen. Bladene stærkt bølgede, med omrullet rand og kraftige torne på 5-15mm. Kurvsvøbblade ægformede med en lang spids. Væld, sumpe, våde enge. VII-VIII. Korsika. Sj. Som ssp. triumfetti.

Cynara scolymus L. Artiskok. Op til 2m. Bladene op til 80x40cm, 1-2 x delte eller m.m. helrandede, uden torne. Kurvene 8-15cm brede med kadede svøbblade. VI-VIII. Dyrket.

C. cardunculus L. Spansk artiskok. 20-100cm. Bladene op til 50 x 35cm, hvidfildede nedenunder, 1-2 x delte med 1½-3½cm lange, gule torne. Kurvene 4-5cm. Svøbbladene med en torn på 1-5cm. VI-VIII. Alm.

Silybum marianum (L.) Gaertner Marietidsel. 20-150cm. Toårig. Nedre blade store, 25-50cm, brede, skinnende og læderagtige og hvidbrogede med kraftige torne. Kurvene 2½-4cm. Svøbbladene med lange, tornfligede spidser. VI-VIII. Alm.

Tyrimnus leucographus (L.) Cass. Stilkstidsel. 20-60cm. 1-2-årig. Bladene tynde, langt nedløbende, med hvidbroget overside og gråfildet underside. Kurvene enlige, rødlig. V-VII. Sj.

Galactites tomentosa Moench Kamtidsel. 15-100cm. Enårig, m.m. hvidfiltet plante. Bladene hvidårede eller hvidbrogede ovenpå, hvidfildede nedenunder, ret smalfligede med spidse torne. Kurvene 1-flere sammen. Svøbbladene med en spids torn, der er furet på oversiden. Kronerne lyst rødlig. V-VII. Alm.

Onopordum. Æselfoder.

1. Planten m.m. grøn, kirtlet forneden horridum
" grå- til hvidfiltet 2.
2. Kurvsvøbbladene 5-8mm brede illyricum
" 2-2½mm brede forneden acanthium

Onopordum acanthium L. Alm. æselfoder. VII-VIII. Korsika. Sj.

O. horridum Viv. 50-150cm. Kurvsvøbbladene 3-5mm brede ved grunden, de ydre med nedadbøjet spids. VI-VIII. Sardinien: Alm. Korsika: Lazio.

O. illyricum L. 30-130cm. Kurvene 3-5cm brede, æg-kugleformede. Ydre og midterste svøbblade med nedad- til udadbøjet spids. VI-VIII. Alm.

Crupina. Krybefrø. Slanke enårige på 20-50cm. Bladene 1 x delte, ofte smalfligede, uden torne. Smalt ægformede kurve med rødlig blomster. Fnokken gyldenbrun, senere sortbrun.

C. vulgaris Cass. Kurvgrunden kegleformet. Kurven med 3-5 blomster. Frøets tilhæftningspunkt rundt og endestillet. V-VI. Alm.

C. crupinastrum (Moris) Vis. Kurvgrunden afrundet. Kurven med 9-15 blomster. Frøets tilhæftningspunkt linjef. og sidestillet.

Mantisalca duriaei (Spach) Briq. & Cav. 20-100cm. Enårig. Glat foroven og spindelvævsdunet forneden. Bladene lyreformet delte, sjældent helrandede. Kurvene ægformede, langstilkede. VI-VII. Sardinien. Sj.

Leuzea conifera (L.) DC. Kogleknopurt. 5-30cm. Stængel og bladundersider hvidfildede. Nedre blade hele eller lyreformet delte, øvre smalfligede. 1 stor, op til 4cm lang kurv. De midterste svøbblade med et rødligbrunt vedhæng. Kronerne næsten helt indesluttede i kurven. V-VII. Sj.

Centaurea. Knopurt.

1. Kronen blå cyanus
" gul eller rød 2.
2. Kronen gul 3.
" rød, sjældent hvid 6.
3. Svøbbladene med frynser og en svag, 5-10mm lang torn collina
" " et knippe torne 4.
4. Bladene nedløbende 5.
" ikke nedløbende nicaeensis
5. Bladene grønne og ru melitensis
" uldhårede eller gråfildede solstitialis
6. Bladene tornede horrida
" ikke tornede 7.
7. Svøbbladsvedhængen med frynser filiformis
" med torne 8.
8. Den midterste svøbbladstorn 1-2 cm calcitrapa
Svøbbladstornene korte 9.
9. Stænglen vinget foroven napifolia
" uvinget 10.
10. Vedhængene med 5-13, 3-5mm lange torne sphaerocephala
" " 3-5, højst 3mm lange torne aspera

Centaurea collina L. 20-60cm. Flerårig. Nedre blade henad Stor knopurts, sjældnere lyreformede eller helrandede. Langstilkede kurve i en halvskærm, 13-17mm brede. Svøbbladene gulgrønne med et lysebrunt vedhæng. Kronerne bleggule. VII-VIII. Korsika. Sj.

• C. horrida Bad. 10-30cm. Stærkt- og tætgrenet, meget tornet halvbusk. Bladene helt reducerede til fjerdelte torne. Kurvene mest enlige, pæreformede, 4-5mm brede. Svøbbladene hvidfildede med brunligt, frynset vedhæng med en kort torn på 1mm. Forblæste kystskrænter. V-VII. N-Sardinien: Nurra, Asinara- og Tavolara-øerne. Sj.

• C. filiformis Viv. 30-70cm. Stænglerne forneden forveddede og med rødlig hår. Bladene glatte, de nedre 2 x delte med ganske smalle afsnit, læderagtige og omrullede. Kurvene i halvskærm, ensidige og noget nikkende. Kalkklipper. 0-1100m. V-VI. Ø-Sardinien. M.sj. 2 underarter:
ssp. filiformis: Vedhængen purpursort med regelmæssige frynser. Oliena, Urzulei, Dorgali, Orosei, Tavolara, Capo Figari.
ssp. ferulacea (Mart.) Arrig.: Vedhængen hindeagtigt, lyst, fliget tandet. Baunei.

C. cyanus L. Kornblomst. Alm.

C. sphaerocephala L. Sandknopurt. 10-70cm. Flerårig, oftest opstigende og lidet grenet. Bladene klæbrige, spindelvævhårede, lyreformede med en 2-3 par sideflige, undertiden med ører ved grunden. Kurven 25-30mm bred, svøbbladene med oftest 5-7 tilbagebøjede torne. Sandstrand. VI-IX. Alm., men lokal.

C. napifolia L. 30-50cm. Opret enårig med smalvingede grene. Nedre blade lyreformede med 1-2 par flige, gråligt dunede. Kurvene 10mm brede. Vedhængen med 7-13 indtil 3mm lange torne. V-VII. Sj.

C. aspera L. Raspeknopurt. 20-50cm. Toårig. Nedre blade aflangt lancetformede, m.m. dybt fligede eller lappede. Kurvene kugleformede, 2cm brede. Svøbbladene blegt rødlige med oftest 3-5 små torne i spidsen. VI-VII. Sardinien. Sj.

C. calcitrapa L. Stjærnetidsel. 20-100cm. Toårig. Nedre blade 1x delte, med lancetformede flige. Kurvene siddende, omgivne af de øvre blade, 6-8mm brede. Kronerne blegt rødlilla. VI-VIII. Alm.

C. melitensis L. Vinget knopurt. 30-60cm. 1-2-årig. Nedre blade lyreformede til bølget lappede, øvre lancetformede. Kurvene 1-3 sammen, 8-12mm brede. Vedhængen med 1 større torn på 5-8mm og 1-3 par småtorne. V-VIII. Sj.

C. solstitialis L. Tornet knopurt. 30-100cm. Toårig. Nedre blade lyreformede med 2-3 par lapper, de øvre lancetformede. Kurvene 7-12mm brede, talrige. Vedhængen med 1 stor torn på 10-15(-30)mm og 0-3 par småtorne. VI-VIII. M.alm. 2 underarter:
ssp. solstitialis: Midtærtornen 9-17mm, $\frac{1}{2}$ -1,4mm ved grunden. Stænglens vinger højst 1mm brede. Tæt hvidulden.
ssp. schouwii (DC.) Dostál: Midtærtornen 20-30mm, 1,2-2 $\frac{1}{2}$ mm ved grunden. Stænglens vinger 1-3mm brede. Svagt håret. Sardinien.

C. nicaeensis All. Øreknopurt. 30-60cm. Toårig. Nedre blade lyreformede, øvre lancetformede med 3-5 par store tænder. Kurvene 12-18mm brede, svøbbladene glatte med 1 stor torn på 10-15mm og 2-3 par småtorne. V-VIII. Sj.

Carthamus lanatus L. Gul svøbtidsel. 30-60cm. Enårig. Kirtlet og m.m. spindelvævsfildet. Bladene tidselagtige. Kurvene enlige, med mange rækker store kurvsvøbblade, hvoraf de yderste er bladagtige og tandede. Lysegule kroner. VI-VIII. Alm.

Carduncellus coeruleus (L.) DC. Blå sælskurv. 30-60cm. Flerårig med ugrene stængler. Bladene lancetformede med fintornet rand og meget varierende indskæringer. Kurvene oftest enlige, omgivne af udstående støtteblade. Svøbbladsvedhængen brunt og fliget. Kronen blå. VI-VII. Sj.

Cnicus benedictus L. Korbendikt. 20-60cm. Enårig. Bladene aflange, lysegrønne med hvidåret underside, fint tornet-tandede, de nedre m.m. delte, de øvre m.m. bølgede, de øverste omgiver kurven som et svøb. V-VI. Sardinien. Gl. kulturplante. Forsvundet?

Xeranthemum inapertum (L.) Miller Spinkel papirsblomst. 10-40cm. Hvidfildet enårig. Bladene m.m. lancetformede, helrandede og noget indrullede. Kurvene 1-2cm brede, med hindeagtige svøbblade, hvoraf de inderste er kronbladsagtige og oftest blegt lyserøde. VI-VIII. Sardinien. Sj.

Carlina. Bakketidsel.

1. Glat eller fåhåret flerårig 2.
M.m. fildet enårig 3.
2. Indre svøbblade gule eller brungule corymbosa
" " hvide foroven, rødlilla forneden macrocephala
3. Indre svøbblade gule racemosa
" " rødlilla lanata

Carlina corymbosa L. Skærbakketidsel. 20-50cm. Ofte mange kurve i halvskærm. VII-X. Alm.

C. racemosa L. Guldbakketidsel. 10-40cm. Gyldengule indre svøbblade. IX-X. SV-Sardinien: Iglesiente, Sulcis, S.Antioco. Sj.

C. lanata L. 5-40cm. Blomstefarvet, med rødlilla indre svøbblade og gule kroner. VI-VIII. Alm.

C. macrocephala Moris 20-40cm. Stænglen fortykket. 1-4, 2 $\frac{1}{2}$ -3cm store kurve. VI-VII. Sardinien: Gennargentu, Limbara. Korsika: Alm.

Atractylis cancellata L. Enårigt strålehovede. 6-25cm. Stænglerne hvidfildede. Bladene smalt lancetformede med fint tornet-tandet rand. De øvre blade omgiver kurvene som et svøb. Kurven ægformet, 5-15x5-12mm. Kronerne rødlilla. IV-V. Sardinien. Alm.

A. gummifera L. Lavt strålehovede. Ingen stængel. Bladene 15-40x 5-12cm, fjerfligede og kraftigt tornede. Den enlige kurv 3-7cm bred med rødlilla blomster. VIII-IX. Sj.

Scolymus. Gyldenrod. Planten stærktornet som en tidsel, men med gule, cikorielignende blomster.

1. Blade og stænglens vinger med en fortykket, hvid kant maculatus
" " " ikke hvidkantede 2.
2. Stænglens vinger mellembredte. Kronbladene 16-17mm hispanicus
" " ubrudte. Kronerne 23-25mm grandiflorus

Scolymus maculatus L. Hvidkantet gyldenrod. 15-90cm. Enårig. Kurvene i en slags halvskærm. Kronen 15-17mm. VI-VII. Sardinien. Alm.

S. hispanicus L. 20-80cm. 2-flerårig. Kurvene i en smal top. VI-VIII. M.alm.

S. grandiflorus Desf. 20-80cm. Kurvene i en halvskærm. V-IX. Sardinien: S.Margherita di Pula. M.sj.

Catananche lutea L. Gul rasleblomst. Enårig. 20-40cm. Bladene smalt lancetformede, de nedre indtil 15cm. Kurvsvøbbladene hindeagtige og gulbrune. Kurvene gule. IV-VI. Sardinien. Sj.

Cichorium intybus L. Cikorie. VII-X. Alm.

C. pumilum Jacq. 5-50cm. Stivhåret enårig. Bladene uregelmæssigt tandede til lappede. Kurvstilkene kølleformede fortykkede. Fnokken 1/6- $\frac{1}{2}$ x frugten. VII-IX. Korsika.

Lapsana communis L. Haremad. V-X. Alm.

Tolpis barbata (L.) Gaertner Kristøje. 6-60cm. Opret enårig. Let kendelig på de lange, børsteformede ydre svøbblade, der danner et ydre svøb, der rager udenom kurven. De ydre kroner svovlgule, de indre ofte purpurbrune. IV-VI. Alm.

Tolpis virgata Bertol. Svovlkr. 20-60cm. Ofte flerårig. Stænglens grene danner en spids vinkel med stænglen og rager op over den. Bladene m.m. lancetformede, helrandede til dybt tandede. Kronerne svovlgule. V-VII. Alm.

Hyoseris. Svinefoder.

1. Enårig. Kurvstilkene kraftigt fortykkede scabra
2. Flerårig. " svagt eller ikke fortykkede 2.
2. Kurvstilkene 40-60cm. Frugterne noget vingede taurina
- " 10-40cm. " ikke " radiata

Hyoseris scabra L. Ru svinefoder. Bladene i roset, 5-8x1cm, fjerndeltes med ægformede, m.m. tandede afsnit, ru og m.m. melede. Kurvene 7-10x3-5mm. II-IV. Alm.

H. radiata L. Glat svinefoder. Som foregående, bladene større, 10-14x2-2½cm. Kurvene 10-15x7-15mm. I-XII. Alm.

* H. taurina (Pamp.) Martinoli Med en kraftig jordstængel og mange rosetter. Kurvene større end hos foregående. Kalkklipper nær havet. 0-200m. III-XI. SV-Sardinien: Tonnara og den nærliggende Isola Il Toro. M.sj.

Arnoseris minima (L.) Schw. & K. Svineøje. 5-20cm. Enårig rosetplante med grenede stængler og kølleformede kurvstilke. V-VI. Korsika. M.sj.

Rhagadiolus stellatus (L.) Willd. Stjernefrø. 20-40cm. Opret, grenet enårig med oftest 1 stængel. Nedre blade spatelformede og tandede forneden, de øvre linjeformede. 2 rækker svøbblade, den ydre ganske kort. Let kendelig ved de 10-15mm lange, stjernedannede 8-15 ydre frugter. III-VI. Alm.

R. edulis Gaertner 10-40cm. Ligner foregående, men de nedre blade lyreformede med 3-4 par nedre sideflige. De indre korte frugter rynkede (glatte hos foregående). III-VI. Alm.

Hedypnois cretica (L.) Willd. 3-45cm. Enårig rosetplante med ofte grenede og noget bladede stængler. 2 rækker svøbblade, den ydre meget lille. Frugterne m.m. cylindriske, ofte krumme. III-VI. Alm. (Pignatti adskiller 2 arter: H. cretica med stærkt fortykkede kurvstilke og H. rhagadioloides (L.) Willd. med slanke kurvstilke)

Tragopogon porrifolius L. Havrerod. 20-125cm. Et Gedeskæg med lilla blomster og noget fortykkede kurvstilke. V-VI. Alm. 2 ssp.: ssp. porrifolius: Planten glat. Bladene ikke bølgede. Frugten længere end næbbet.

ssp. australis (Jordan) Nyman: Planten ofte løst filtet. De øvre blade med bølget rand. Frugten kortere end næbbet.

T. hybridus L. Køllegedeskæg. (Geropogon glaber L.) 20-50cm. Enårig. Ligner foregående, men de ydre frugter med en fnok af 5 uens, ru børster; de indre med fjerformet fnok. Kronerne lyserøde eller lyslilla. IV-VI. Sardinien. Alm.

* Scorzonera callosa Moris 20-40cm. Bladene 10-25cm x 2-3mm, helrandede, kølede, med fortykket spids. Kronerne lidt længere end svøbet, 14-17mm. Tørre enge. 0-600m. IV-V. Sardinien: Laconi, Ala dei Sardi, Maddalena. M.sj.

Podospermum. Fodfrø. Står nær Scorzonera, men med fjerfligede blade.

1. Flerårig med golde skud. Stænglen furet foroven canum
- En-toårig uden golde skud. Stænglen ikke furet 2.
2. Bladfligene linjeformede laciniatum
- " elliptisk-lancetformede resedifolium

Podospermum canum C.A. Meyer Flerårigt fodfrø. 10-40cm. Bladene linjeformet fjerndeltes. Planten halvglat til løst filtet. Kronerne 1½-2 x svøbet. V-VII. Sardinien. Alm.

P. laciniatum (L.) DC. 10-50cm. Kronerne = svøbet. V-VII. Korsika. Sj.

Podospermum resedifolium (L.) DC. 10-40cm. Kronerne = svøbet. V-VII. Sardinien. Sj.

Hypochoeris. Kongepen.

1. Kurvsvøbbladene lige lange 2.
- " af forskellig længde 3.
2. Enårig achyrophorus
- Flerårig robertia
3. Bladene fjerndeltes cretensis
- " tandede til fjerlappede 4.
4. Ofte glat og enårig glabra
- Flerårig. En stribe mørke hår på svøbbladets spids radicata

Hypochoeris glabra L. Glat kongepen. 5-40cm. To rækker fnokhår, den ydre kort og ru. Ydre frugter uden næb, indre med eller uden næb. IV-V. Alm.

H. radicata L. Alm. kongepen. IV-VII. Alm.

H. cretensis (L.) Bory & Chaub. Smalfliget kongepen. 10-40cm. Flerårig. Bladene glatte til stivhårede. Ydre frugter med kort, indre med langt næb. IV-VI. Sj.

H. achyrophorus L. Enårig kongepen. 8-35cm. Planten stivhåret med grundbladsroset og 0-flere stængelblade. Bladene svagt tandede. 2 rækker fnokhår, den ydre ½mm. II-VII. Alm.

H. robertia Fiori Næbløs kongepen. 8-15cm. Bladene alle i roset, butet-fligede, glatte. Stænglerne ugrenede, med nogle småskæl. Kurvene op til 10mm brede. Frugterne uden næb. 800-2500m. V-VIII. Korsika. R.alm.

Urospermum picroides (L.) Scop. Rut halefrø. 30-45cm. M.m. stivhåret enårig. Bladene stængelomfattende, fjerfligede til tandede. 1-9 langstilkede kurve, op til 4cm brede. II-VII. Alm.

U. dalechampii (L.) Scop. Blødt halefrø. 25-40cm. Udstående håret flerårig. Nedre blade høvfligede, øvre m.m. helrandede. Op til 5cm brede, langstilkede kurve med svovlgule kroner. III-VIII. Alm.

Leontodon. Borst.

1. Ydre kroner med en blågrå stribe på ydersiden tuberosus
- " med gul eller rødlig yderside 2.
2. Glat enårig muelleri
- Håret flerårig crispus

Leontodon crispus Vill. Kruket borst. 20-40cm. Bladene oprette, fjerfligede, med kruset-bølgede flige, behåret med 2-7-grenede hår. Kurvene nikkende før blomstringen. De ydre kroner ofte med rødlig underside. IV-VI. Korsika. Alm.

L. tuberosus L. Knoldborst. Flerårig med tenformede rodknolde. 15-40cm. Bladene bugtet-tandede, med få til mange 1-3-grenede hår. X-VI. Alm.

L. muelleri (Sch.Bip.) Fiori 15-30cm. Enårig med grenede og noget bladede stængler. Grundbladene fjerfligede, bølgede eller tandede, glatte eller med få ugrenede hår. Kronbladene ensfarvede. Frugterne stærkt tværrynkede. Fugtige steder. II-V. Sardinien. Sj.

Picris hieracioides L. Ru bittermælk. VI-X. Alm.

P. echioides L. Vingekurv. De 3-5 ydre kurvblade store, svøbdannede, æg-hjerteformede. Enårig. VI-VIII. Alm.

Andryala. Filtkurv.

1. Kurvstilke og kurvsvøb kirtlet 2.
- " " uden kirtler ragusina
2. Kronerne lysegule (eller rødt anløbne), lidt længere end svøbet integrifolia
- " orange farvede, 2 x svøbet rothia

Andryala integrifolia L. Alm. filtkurv. 12-80cm. 1-2-årig, tæt grågult dunet af stjernehaar og korte ugrene hår. Bladene fra bølgede til helrandede, de øvre m.m. lancetformede og spidse. Mange kurve i en tæt halvskærm. IV-VI. Alm.

A. rothia Pers. ssp. dentata (S. & S.) Pign. 20-40cm. V-VI. Sardinien. Sj.

A. ragusina L. Hvid filtkurv. 10-50cm. Filtet flerårig. Bladene tandede til helrandede. Få kurve på lange, oprette grene. VI-VII. Korsika. M.sj.

Chondrilla juncea L. Riskurv. 50-100cm. Grågrøn 2-flerårig risagtig, stærktgrenet plante med oprette grene, stivhåret forneden, glat foroven. Øvre blade lange og linjeformede. Kurvene tålrige, 1-4 sammen, smalt cylindriske. VI-VIII. Alm.

Taraxacum. Mælkebøtte. Efter Flora Europaea.

1. Næbbet ret kraftigt, $\frac{1}{2}$ -1 x frugten pacheri 2.
- " længere og tyndere 3.
2. Ydre kurvsvøbblade bredt hindekantede 4.
- " smalt eller ikke hindekantede 5.
3. Bladene smalt lancetformede, lidet delte palustre 6.
- " dybt delte megalorrhizon 7.
4. Frugterne m.m. rødlige 8.
- " ikke 9.
5. Frugterne røde, purpurfarvede eller violette erythrospermum 6.
- " rødbrune eller lyserøde 7.
6. Bladene udstående, dybt smaltfligede. Frugterne rødligt brune fulvum
- Bladene oprette, ofte svagt lappede til hele. Frugterne lyserøde til rødlige gasparrinii
7. Ydre svøbblade med et horn 8.
- " uden horn 9.
8. Bladene med 3-5 par flige. Frugten $2\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ mm simile
- " helrandede til svagt lappede. Frugten $3\frac{1}{2}$ -4mm obovatum
9. Kronerne gulbrune og indrullede cucullatum
- " ikke gulbrune eller indrullede 10.
10. Bladene brede, helrandede eller svagt lappede fontanum
- Veludviklede blade fligede officinale

Taraxacum pacheri Dvergsmælkebøtte. Blade og skafter 3-5cm. Kurvsvøbet mørkt. Usikker angivelse fra Korsika af småarten T. litaridieri Van Soest. Over 2000m. VII-VIII.

T. megalorrhizon (Forsskål) Hand.-Mazz. 10-20cm. De ydre svøbblade oftest tiltrykte, bredt ægformede med ofte rødligt anløben hindekant og et horn på spidsen. IX-IV. Alm.

T. obovatum (Willd.) DC. 1500-2400m. V-VII. Sj.

T. palustre III-IV. Sj.

T. fontanum Korsika.

T. cucullatum Hættemælkebøtte. Forekommer på Korsika som småarten T. cucullatiforme Van Soest. Bjærgplante. VII-VIII.

T. erythrospermum III-V. Begge øer.

T. simile III-V. Korsika.

T. fulvum III-V. Korsika.

T. gasparrinii III-V. Begge øer.

T. officinale Fandens mælkebøtte. II-V. M.alm.

Sonchus. Svinemælk.

1. 1-2-årig 2.
- Flerårig 4.

2. Bladfligene linjeformede eller stærkt indsnævrede forneden tenerrimus
- " brede 3.
3. Bladene skinnende med øreformat grund asper
- " matte med pilformet grund oleraceus
4. Kurvstilkene kirtlede arvensis
- " ikke kirtlede maritimus

Sonchus arvensis L. Agersvinemælk. VI-IX. M.sj.

S. maritimus L. Strandvinemælk. 15-60cm. Ligner foregående, men stærkt blågrøn og uden kirtler. Bladene spatelformede og m.m. helrandede til svagt bugtede. Saltsumpe. VI-IX. Lokalt alm.

S. asper (L.) Hill Ru svinemælk. I-XII. M.alm.

S. oleraceus L. Alm. svinemælk. III-X. M.alm.

S. tenerrimus L. Smaltfliget svinemælk. 10-80cm. Bladene med 6-8 par oftest lancetformede flige med stærkt tilsmalnet grund; sjældnere er de helt linjeformede. I-XII. Alm.

Lactuca. Salat.

1. Bladene langt nedløbende 2.
- " ikke 3.
2. Nedre blade fjerfligede, midterdelen under 2 cm bred viminea
- " tandede, midterdelen 4-6cm bred longidentata
3. Stængelbladene helrandede saligna
- " tandede eller lappede 4.
4. Bladene bløde. Toppen halvskærmsagtig sativa
- " finttornede. Toppen pyramideformet 5.
5. Bladene normalt lodretstillede. Frugten grålig, finttornet serriola
- Bladene normalt vandretstillede. Frugten purpursort, glat virosa

⑤ Lactuca longidentata Moris 40-60cm. Nedre blade bredt lancetformede med lange, udstående tænder; de øvre ægformede og nedadbøjede. Fugtige klipper. 200-1000m. V-VI. Sardinien: Bjærgkæden mellem M.d'Oliena og Montalbo di Siniscola. Sj.

L. viminea (L.) Presl 20-60cm. Stænglen benhvid. Nedre blade fjerfligede med linjeformede flige; de øvre ofte helrandede. VI-VIII. 2 underarter:

ssp. viminea: 30-60cm høj. Kun grenet foroven. Sardinien. Sj.
ssp. ramosissima (All.) Bonn.: 20-30cm høj. Stærktgrenet fra grunden. Korsika. Sj.

L. serriola L. Tornet salat. VII-IX. Alm.

L. sativa L. Havesalat. V-VIII. Dyrket og forvildet. Alm.

L. saligna L. Pilsalat. 30-100cm. Stænglen benhvid. Nedre blade udelte til fjerfligede; de øvre aflange til linjeformede, med pilformet grund. V-VIII. Alm.

L. virosa L. Giftsalat. 30-150cm. VI-IX. Sardinien. Sj.

Mycelis muralis (L.) Dum. Skovsalat. VII-VIII. Sj.

Reichardia picroides (L.) Roth Haresalat. 10-45cm. Glat flerårig med noget grenet stængel. Stængelbladene omfattende. 1-5 kurve med mange små, hindekantede skælblade. Ydre svøbblade ægformede med en $\frac{1}{2}$ mm bred hindekant. I-XII. Alm.

Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cass. Knoldhøgeskæg. 8-30cm. Flerårig med underjordiske rodknolde. Bladene linje-spatelformede i roset, 0-2 stængelblade. Oftest kun 1 kurv med sortagtige kølleformede kirtelhaar ved grunden og ned på stilken. III-VI. Alm.

Crepis. Høgeskæg.

1. Nogle kurve siddende i stænglens gaffelgreningspunkter *zacintha* 2.
Kurvene stilkede
2. Svøbbladene med lange, stive hår *setosa* 3.
" uden " " "
3. Svøbbladene tatkirtlede *foetida* 4.
" ikke tatkirtlede
4. Indre svøbblade fildede, ydre ægformede *vesicaria* 5.
" " højst svagt fildede
5. Ydre svøbblade med tydelig hindekant *sancta* 6.
" " uden " "
6. Flerårig med høvlformet spidsfligede blade *leontodontoides* 7.
1-2-årig
7. Ydre kurvsvøbblade udstående, $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ x de indre *biennis* 8.
" " tiltrykte
8. Bladene tykke, helrandede eller lappede *bellidifolia*
" tynde, med spidse tænder eller flige *capillaris*

Crepis leontodontoides All. Løvetandshøgeskæg. 10-40cm. Næsten glat. Bladene lange og tynde. Kurvsvøbet melet til glat. Ydre kurvsvøbblade korte. Skove, lysninger. IV-X- Alm.

C. biennis L. Toårigt høgeskæg. V-IX. Sardinien. Sj.

C. foetida L. Stinkende høgeskæg. 10-50cm. Bladene stærkt fligede, m.m. stivhårede. Kurvene nikkende før blomstringen. Ydre frugter meget kortnæbbede, indre med langt næb. VI-X. Alm.

C. sancta (L.) Babc. 5-20cm. Stængelbladene få, linje- eller skælformede. Ydre frugter med 3 vinger, hvoraf de 2 er brede. IV-V. Alm.

C. zacintha (L.) Babc. Gaffelkurv. 20-30cm. Enårig rosetplante med få til ingen stængelblade. Kurvene først cylindriske, bredt pæreformede i frugt. V-VI. Alm.

C. capillaris (L.) Wallr. Grønt høgeskæg. V-VII. Korsika. Sj.

C. vesicaria L. Opblæst høgeskæg. 10-80cm. 1-2-, sjældent flerårig. Bladene stærkt delte, overvejende grundstillede, glatte eller stivhårede. Kurvstilkene med karakteristiske lancet- til ægformede støtteblade, der ligner de ydre svøbblade. I-XII. Alm.

C. setosa Haller f. Børstehøgeskæg. 10-80cm. Enårig. Stængelbladene med 2-3 par lange tænder ved grunden. Frugterne med næb. V-IX. Korsika. Alm.

C. bellidifolia Loisel. Bittert høgeskæg. 35-50cm. Enårig med liggende til opstigende, rødstrubede stængler. Bladene overvejende grundstillede. Kronerne med rødlig yderside. V-VIII. Sj. Kystnær.

Prenanthes purpurea L. Rød nikkesalat. 25-150cm. Glat og mørkt blågrøn flerårig. Bladene aflange eller lidt violinformede, helrandede, bølget tandede eller sjældent lyreformet delte. Talrige smalle kurve i en stor top. Bjærgskove. VI-VIII. Korsika. Sj.

Hieracium. Høgeurt. Artsopfattelsen følger Pignatti.

1. Ofte med udløbere. Frugten foroven med en knudret ring 2.
Uden udløbere. Frugten foroven med en jævn ring 12.
2. Bladene tydeligt 2 farvede, over- og underside forskellige 3.
Bladets over- og underside temmelig ens 6.
3. Kurvsvøbet helt skjult af mørke hår *pseudopilosella* 4.
" ikke helt skjult af hår
4. Bladene blågrønne på oversiden *soleirolianum* 5.
" ikke blågrønne på oversiden
5. Stænglerne med 1 kurv *pilosella*
" " flere kurve *adriaticum*

6. Stænglen 5-12(-20)cm høj med 1-2 kurve 7.
" 20-100cm høj med mange kurve 8.
7. Bladene med stjernehaar *micranthum*
" uden " *sardoum*
8. 20-100 kurve 9.
8-20 kurve 10.
9. Ydre rosetblade spatelformede, indre smallere *sardonium*
Rosetbladene ens *cymosum*
10. Kurvstilkene grønne med få til ingen stjernehaar *florentinum*
" hvid-gråfildede med mange stjernehaar 11.
11. Blomsterstanden pyramideformet *praealtum*
" en halvkærm *subcymigerum*
12. Grundbladene mangler eller visne under blomstringen, mange stængelblade 13.
Grundbladene til stede under blomstringen 16.
13. Planten kirtelhaaret og klæbrig *viscosum*
" ikke kirtelhaaret og ikke klæbrig 14.
14. Bladene jævnt fordelte og gradvist aftagende i størrelse *sabaudum*
De nedre blade tydeligt større end de øvre, danner ofte en slags falsk roset 15.
15. Stængelbladene med omfattende grund *crinitum*
" " tilsmalnet grund *symphytaceum*
16. Bladene med kirtelhaar, ofte klæbrige 17.
" uden " 18.
17. Kirtlerne brunlige. Kurven 12-18mm lang *amplexicaule*
" blege. Kurvsvøbet 10-12mm langt *pseudocerinthe*
18. Planten langhaaret med 2-10mm lange hår 19.
" korthaaret 21.
19. Grundbladene med m.m. afskåret grund, oftest plettede *wiesbauerianum*
Grundbladene med kileformet grund 20.
20. Lav, 6-15 cm høj med 1-2(-3) kurve. Hårene rødgyldne *brunellaeforme*
10-40cm høj med flere kurve. Hårene hvidlige eller gullige *pallidum*
21. Med 2-5 m.m. tydeligt stængelomfattende blade *umbrosum*
Med 0-2(-3) ikke stængelomfattende blade 22.
22. Blade og stængler tæthårede af m.m. fjertandede hår 23.
" " " glatte til fåhårede 25.
23. Kurvstilk med mange kirtelhaar *leiopogon* 24.
" " få til ingen kirtelhaar
24. Bladundersiden med ingen til få stjernehaar, kurvsvøbet $8\frac{1}{2}$ -10mm langt *pictum*
Bladundersiden med mange stjernehaar. Kurvsvøbet 10-14mm *caesioides*
25. Kurvsvøbet uden almindelige hår *silvaticum*
" med " " *glaucinum*

Hieracium pilosella L. Håret høgeurt. V-X. Korsika. Alm.

H. pseudopilosella Ten. 10-25cm. Tørre skrænter. V-VIII. Korsika. Sj.

● H. sardoum (Bell.) Pign. (H. lactucella p.p.) Stænglerne oventil med 1mm lange, hvidlige hår, ugrenede eller 1 gang gaffelgrenede midtpå. Kronerne med okkerrød spids. 1000-2500m. Korsika. Sardinien: Gennargentu. M.sj. VI-VII.

H. micranthum Huet du Pav. (H. lactucella ssp. nanum) Ligner forældende, men stængler og kurvsvøb med mange stjernehaar og få kirtel- og alm. hår. 2000-2500m. Korsika. Sj.

● H. soleirolianum A.-T. & Briq. (*pilosella*-*sardoum*). Korsika. Sardinien: Gennargentu? Sj.

Hieracium cymosum L. Kvasthøgeurt. 30-80cm. Oftest uden udløbere. 20-50 kurve, sjældent færre, i en tæt halvskærm. Blomsterstanden med 0-få kirtelhår. V-VIII. Korsika. Sj.

H. florentinum All. (H. piloselloides Vill. ssp. piloselloides) 15-50cm. Bladene glatte eller med få børstehår. V-VIII. Alm.

H. praealtum Vill. Med grågullig behåring og lyst kurvsvøb. V-VIII. Alm.

H. subcymigerum Zahn (H. praealtum p.p.) Bladene altid lancetformede, med børstehår på ribberne. Kurvstilke og -svøb m.m. kirtelhåret. Korsika. Sj.

H. adriaticum Naeg. (H. florentoides A.-T.) 5-30 kurve. Bladene linjeformede og spidse, med 2½mm lange børster ovenpå. Korsika. M.sj.

H. sardonium Zahn Stænglen m.m. uden kirtelhår. Begge øer. Sj.

H. silvaticum (L.) L. Skovhøgeurt. (H. murorum L.) V-VIII. Sj.

H. glaucinum Jordan Som foregående, men stænglen med hår og ofte stjernehaar; bladene ofte med spidse og dybe tænder forneden; svøbet ofte uden stjernehaar. Korsika i følge Fl.Eur.

H. pallidum Biv. Bleg høgeurt. (H. schmidtii) 10-40cm. Med lange hvide eller gullige hår især på bladstilkene og langs grundbladernes rand og midterribbe på undersiden. Ligner ellers en lille Skovhøgeurt. V-VII. Sj.

H. wiesbauerianum Uechtr. (H. hypchoeroides) Som foregående, men med mange stjernehaar. Bladene m.m. blågrønne. Sj.

H. brunellaeforme A.-T. 1500-2000m. Forblæste klipper. Sj.

H. pictum Pers. 10-40cm. Grundbladene oftest blågrønne og mørkplettede. VI-VII. Sardinien. M.sj.

H. caesioides A.-T. (pictum-bifidum) Korsika. M.sj.

H. leiopogon Gren. (pictum-glaucinum) Korsika. Sj.

H. amplexicaule L. 25-40cm. 3-6(-12) stængelblade med bredt stængelomfattende grund. V-VIII. Korsika: Pollino.

H. pseudocerinthe (Gaudin) Koch 10-40cm. Korsika. Sj.

H. viscosum A.-T. Korsika. Sj.

H. umbrosum Jordan Korsika. Sj.

H. sabaudum L. Bredbladet høgeurt. VIII-XI. Korsika. Alm.

H. crinitum S. & S. (H. racemosum p.p.) VIII-X. Korsika. Alm.

H. symphytaceum A.-T. Korsika. Sj.

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L. Vejbredskeblad. V-VII. Alm.

Damasonium alisma Miller Damstjerne. 5-40cm. Alle blade grundstillede, flydende og aflange hos vandformer, m.m. lancetformede hos landformer. 3 3mm lange, hvide kronblade med gul grund. Oftest 6 stjerneformede udstående bælgekapsler. Kær og sumpe. IV-V. Sardinien. Sj.

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Søpdy. IV-VI. Sj.

Sagittaria sagittifolia L. Pilblad. VI-VIII. Sardinien: Dorgali, Macomer.

BUTOMACEAE

Butomus umbellatus L. Brudelys. IV-VII. Sardinien. Sj.

JUNCAGINACEAE

Triglochin bulbosum L. Knoldtrehage. 3-10(-20)cm. Stængelgrunden knoldformet fortykket. 3 lange frugter på udstående stilke. IV-V. Saltsumpe. Sj. som ssp. barrelieri (Loisel.) Rouy

T. laxiflorum Guss. Høsttrehage. 3-10(-30)cm. Stængelgrunden fortykket. 3 lange frugter på tiltrykte stilke. IX-XI. Saltsumpe og våde enge. Sj.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton. Vandaks.

1. Alle blade smalle og parallelsidede 2.
Bladene elliptiske til lancetformede 4.
2. Bladet med skede og skedehinde pectinatus 3.
" kun med skedehinde 3.
3. Stænglerne flade friesii 5.
" trinde pusillus
4. Bladene krusede, med finttandet rand crispus 5.
" ikke krusede 5.
5. Undervandsbladene reducerede til bladstilken natans 6.
" med veludviklet bladplade 6.
6. Undervandsbladene helt ustilkede 7.
" kort- eller langstilkede 8.
7. Undervandsbladene spidse, finttandede gramineus 7.
" butte, oftest helrandede alpinus
8. Uden flydeblade lucens 9.
Med " 9.
9. Flydebladene gennemskinnelige coloratus 9.
" uigennemskinnelige nodosus

Potamogeton natans L. Svømmende vandaks. IV-VII. Sj.

P. nodosus Poir. Flydebladene store, elliptiske eller lancetformede, 9-14x3-6cm; undervandsbladene lancetformede, op til 20x4cm. VI-VIII. Korsika. Sj.

P. coloratus Vahl Vejbredvandaks. IV-VI. Sj.

P. alpinus Balbis Rustvandaks. VII-VIII. Korsika: M.sj.

P. lucens L. Glinsende vandaks. VI-VIII. Korsika. Sj.

P. gramineus L. Græsbladet vandaks. VI-VIII. Korsika. Sj.

P. crispus L. Kruset vandaks. IV-V. Sj.

P. friesii Rupr. Brodbladet vandaks. VI-VIII. Korsika. M.sj.

P. pusillus L. Spinkelt vandaks. VI-VIII. Sj.

P. pectinatus L. Børsteblandet vandaks. VI-VIII. Alm.

RUPPIACEAE

Ruppia maritima L. Alm. havgræs. V-IX. Alm.

R. cirrhosa (Petagna) Grande Langstilket havgræs. V-IX. Alm.

POSIDONIACEAE

Posidonia oceanica (L.) Delile Gedebollegræs. Rodstokken tæt besat med fibre og bladresten, skyller op på stranden som "gedeboller". Ålegræsagtige blade med 13-17 strenge, 8-15mm brede og 10-30cm lange med but til udrandet spids. Saltvand. X. Alm.

ZOSTERACEAE

Zostera marina L. Alm. ålegræs. Sj.

Z. noltii Hornem. Dværgålegræs. Alm.

ZANNICHELLIACEAE

Zannichellia palustris L. Vandkrans. IV-VII. Sj. 2 underarter: ssp. polycarpa (Nolte) Richter: Frugterne siddende, 2-4 sammen. ssp. pedicellata (Wahlb.) Hegi: Oftest 2 stilkede frugter.

Althenia filiformis Petit Dværgvandkrans. Vandplante med krybende stængel og korte, trådformede blade i knipper med skæl ved grunden og eet mellem hvert knippe. Bladene 1-4cm x $\frac{1}{2}$ mm. Brakvand. IV-X. Sj.

Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. Finttandet ålegræs. Et ålegræs, der er op til 4mm bredt med 7-9 ribber og er finttandet mod spidsen. Saltvand. IV-VI. M.alm.

NAJADACEAE

Najas marina L. Stor najade. VI-VIII. Sardinien. Sj.

LILIACEAE

1. Blomsterne i bladhjørnerne eller i klaser fra bladhjørnerne 2.
" i en endestillet blomsterstand eller lige fra .. 6.
2. Linjeformede blade (kladodier) *Asparagus* 3.
Brede blade (eller kladodier) .. 3.
3. Slyngplante med tornet stængel *Smilax* 4.
Urt eller halvbusk .. 4.
4. Bladene (kladodierne) stive, læderagtige og stikkende *Ruscus* 5.
" bløde .. 5.
5. Bladene stængelomfattende *Streptopus* 6.
" ikke stængelomfattende *Polygonatum* 6.
6. Blomsterne udgår direkte fra løget *Colchicum* 7.
" på en stængel .. 7.
7. Blomsterne i en skærm *Allium* 8.
" ikke i en skærm .. 8.
8. Blosterbladene mindst $\frac{1}{5}$ sammenvoksede 9.
" højst " " 12.
9. 2 elliptiske blade *Convallaria* 10.
Linjeformede " .. 10.
10. Støttebladene af blomsterstilkens længde *Brimeura* 11.
" mangler eller meget små .. 11.
11. Blosteret m.m. klokkeformet, højst $\frac{1}{2}$ delt *Muscari* 12.
" $\frac{1}{2}$ delt *Hyacinthus* 12.
12. 4 helt frie grifler *Paris* 13.
1 griffel, undertiden med 3-delt spids .. 13.
13. Støvtrådene tæt hårede. Planten uden løg 14.
" m.m. glatte .. 15.
14. Klase af gule blomster *Narthecium* 16.
Top af hvide/røde blomster *Simethis* 16.
15. Stænglerne sivformede. Bladene hindeagtige skæl *Aphyllanthes* 17.
Bladene veludviklede .. 17.
16. Stængelblade til stede 17.
Ingen stængelblade (1-2 kan omskede stængelen og ligne stængelblade) .. 19.
17. Støvfanget siddende *Tulipa* 18.
Veludviklet griffel .. 18.
18. Blosteret lysegult *Gagea* 19.
" rødt *Lilium* 19.
19. Jordstænglen uden løg 20.
" med " " 21.
20. Blosterbladene med 1 mørk midterribbe *Asphodelus* 21.
" " 3-5 ribber *Anthericum* 21.
21. Blosteret blå *Scilla* 22.
" hvidt .. 22.
22. Blosteret med rød midterribbe *Urginea* 23.
" " grøn " eller ensfarvet *Ornithogalum* 23.

⊗ Narthecium reverchoni Celak. 10-40cm. Bladene sværdformede, toradet stillede. Blosteret 6-8mm, gult med en grøn stribe udvendigt. 10-24 blomster i klasen. Fugtige klipper. 550-2200m. VII-VIII. Korsika. R.alm.

Asphodelus fistulosus L. 30-50cm. Bladene hule og næsten trinde, 1-3mm brede. Blomsterne i en smalt pyramideformet top, 12-16mm lange. Kapslen 5-7mm bred. III-V. Alm.

A. aestivus Brot. Stor skarnlilje. (*A. microcarpus* Viv.) 1-2m. Bladene flade, 1-4cm brede og 25-45cm lange. Stor, stærktgrenet top. Kapslen 5-8mm bred. III-V. Alm.

A. cerasifer Gay Dødslilje. (*A. ramosus* L.) 40-150cm. Ligner foregående meget, men kapslen 15-20mm bred. IV-V. Sj.

Anthericum liliago L. Ugrenet edderkopurt. V-VI. Korsika.

Simethis planifolia (L.) G. & G. Hedestjerne. 12-40cm. Bladene smalle, ofte vredne, længere end stænglen. Toppen åben og uregelmæssig, med 10-30 blomster. Disse 9-11mm, hvide indeni og røde udenpå. Cistusheder. IV-V. Sj.

Aphyllanthes monspeliensis L. Blå nellikelilje. 20-30cm. Tæt tueformet, noget blågrøn plante med sivformede stængler, hvis blade er reducerede til hindeagtige skeder. Blomsterne endestillede, 1-3 sammen, omgivne af et rødbrunt, hindeagtigt svøb. Blosteret blåt. IV-V. Sardinien: Sa Grasseda. M.sj.

Colchicum. Tidløs.

1. Med oftest 2 blade under blomstringen *cupanii* 2.
Ingen blade under blomstringen .. 2.
2. Støvfanget hovedformet *alpinum* 3.
" kølleformet .. 3.
3. Støvknapperne gule *neapolitanum* 4.
" orange eller purpurbrune *bivonae* 4.

Colchicum cupanii Guss. 8-16cm. Bladene 2-5mm brede. Støvknapperne purpursorte. 1-5 små blomster. Blosteret 2½cm. IX-XI. Sardinien. Alm.

C. alpinum DC. Alpetidløs. 1(-3) blomster. Blosteret 2-3½cm, rød-lilla. Støvknapperne gule. Tørre bjærgenge. VII-IX. Korsika: Alm. Sardinien: Aritzo, m.sj.

C. bivonae Guss. Spættet tidløs. 1-6 stærkt spættede blomster. Blosteret 5½-6½mm. Støvfanget nedrullet i spidsen som på en bispestav. IX-X. Sardinien: Cagliari.

C. neapolitanum Ten. Blosteret 3-4½cm. Blomsterne ikke eller kun svagt spættede, rødilla. IX-XI. Sj.

Gagea. Guldstjerne.

1. 2-5 stængelblade mellem grund- og støttebladene 2.
Ingen egentlige stængelblade .. 4.
2. Blomsterstilkene glatte *soleirolii* 3.
" dunede .. 3.
3. Grundbladene trådformede, 1 mm brede *busambarensis* 4.
" flade, 3-5 mm brede *foliosa* 4.
4. Grundbladene 5-10mm brede, med hættestilk spids *lutea* 5.
" 2-4 mm " .. 5.
5. Grundbladene cylindriske og hule, 2-4 mm brede *fistulosa* 5.
" flade, 2-3 mm brede *granatellii* 5.

Gagea granatellii Parl. 5-12cm. De 2 grundblade 2-3 x så lange som blomsterskuddet, bølgede. Blomsterstilkene hvidhårede. Blosteret 12-14mm, gult indvendigt, grønt og m.m. glat udvendigt. III-V. Sj.

G. busambarensis (Tineo) Parl. (*G. bohémica* p.p.) 3-7cm. 2-5 grundblade, der er længere end blomsterskuddet. Stængelbladene lancetformede og noget krumme. 1-2 13-17mm store, smalt hindekantede blomster. III-V. M.sj.

G. lutea (L.) Ker-Gawl. Alm. guldstjerne. III-V. Korsika. Sj.

Gagea soleirolii Schultze (G. nevadensis Boiss.) 3-12cm. 2 grundblade, 1-1½mm brede. 2 stængelblade. Bløsterbladene 10-11mm, spidse, gule med grøn midterribbe udvendigt. V-VII. Korsika. Sardinien: Gennargentu, Limbara. Sj.

G. foliosa Schultze 8-15cm. 2 grundblade, der er længere end blomsterskuddet. 2-5, 11-17mm lange, butte blomster. 2-5 stængelblade. IV-V. Sardinien. Sj.

G. fistulosa (Ramond) Ker-Gawl. Alpeguldstjerne. 5-12cm. 1-2 grundblade, der er 1½ x det blomstrende skud, halvcyklindriske og furede foroven. Blomsterstilkene udstående hårede. Bløsteret 9-12mm, 3-året med grøn yderside. VI-VIII. Korsika. Sj. 1500-2800m.

Tulipa silvestris L. Vild tulipan. IV-V. Sj.

T. maleolens Reboul (T. praecox Ten.p.p.) Bløsterbladene 5-9cm, røde, ved grunden med en sort, gulkantet plet, de indre butte og smalle, de ydre spidse og bredere, med stinkende lugt. III-IV. Korsika. Forvildet.

Lilium martagon L. Kranslilje. 50-90cm. Bladene i kranse på 4-8 lancetformede blade. Klaserne med hængende blomster. Bløsteret op til 3½cm, krummet, m.m.rødt og oftest plettet. VI-VII. Korsika.

L. bulbiferum L. Brandlilje. 30-80cm. Bladene spredte, lancetformede, de øvre med ynglekopper i bladhjørnerne. 1-3 8½cm lange, orangegule eller -røde blomster, der ofte er brunprikkede indvendigt. V-VII. Korsika. Sj.

Scilla. Vår stjerne.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Høstblomstrende | 2. |
| Vårblomstrende | 3. |
| 2. Bladene halvt trådformede, 1-2 mm brede | autumnalis |
| " flade, 5-25 mm brede | obtusifolia |
| 3. Mangeblomstret (50-100 stk.) | 4. |
| Fåblomstret (6-10 stk.) | bifolia |
| 4. Støttebladene 2-5½ cm lange | peruviana |
| " 1½ mm " | hyacinthoides |

Scilla peruviana L. 30-50cm. Stort løg på 4-7cm. Bladene store, 30-50x5-8cm, noget kødede. Blomsterstanden tæt, pyramideformet, stilkene til sidst 5-9cm. Blomsterne blålige med en grøn stribe udvendigt. IV-V. Sardinien: M.sj. Korsika?

S. hyacinthoides L. 30-60cm. Løget 4-5cm. Bladene 8-40x1-3cm. Blomsterstanden noget cylindrisk, klaseformet med 1-3cm lange stilke. IV-V. Sardinien. Sj.

S. bifolia L. Tvebladet Vårstjerne. 5-12cm. Glat og skinnende. Ofte 2 ca. 1cm brede blade, med ofte noget hætteleformet spids. Blomsterstanden noget ensidig. Bløsteret 5-10mm. III-V. Sardinien: Osilo. M.sj. Løvskov.

S. autumnalis L. Høstværstjerne. 10-40cm. 6-20 blomster i en forlænget klase med stilke på 3-4mm (15mm i frugt). Bløsteret 3-5mm, blålig med brungrøn midterribbe. VIII-IX. Alm.

S. obtusifolia Poirer 10-30cm. Stænglen ru, noget rødlig og bugtet. 6-15 blomster på 4-5mm i en klase. IX-X. Sj.

Urginea. Strandløg. Blomsterne i en lang klase. Bladene kommer frem efter blomstringen.

Urginea maritima (L.) Baker Strandløg. Stor knold på 10-15cm med store, læderagtige blade på 12-30x3-6cm. Stænglen 50-150cm med over 50 tætsiddende blomster med 5-8mm lange støtteblade, der ofte er affaldende. Bløsteret 6-8mm. IX-X. Alm.

Urginea fugax (Moris) Steinh. Trådbladet strandløg. Løget 2-3cm. Bladene trådformede og furede, op til 40cm x 1-2mm. Stænglen 10-35cm med 5-10 blomster. Støttebladene skælformede, 1mm. Bløsteret 9mm, hvidt med rødlig midterribbe. Stenede skrænter. 0-300m. VII-VIII. S-Korsika. Sardinien: Cagliari, Gallura. Sj.

U. undulata (Desf.) Steinh. Bølget strandløg. Løget 2-3½cm. Bladene 8-15cm x 3-10mm, bølget bugtede. Stænglen 20-50cm. 8-30 blomster. Støttebladene 2-5mm, affaldende. Bløsteret 10-12mm, ofte smudsigt rødlig. Tørre skrænter, krat. VII-IX. Sj. 0-300m.

Ornithogalum. Fuglemælk.

- | | |
|--|------------|
| 1. 20-50 blomster i en lang klase | 2. |
| Blomsterne i en kort klase eller en halvskærm | 3. |
| 2. Bladene visre under blomstringen | pyrenaicum |
| " grønne under " | narbonense |
| 3. Blomsterne helt hvide eller flødefarvede | arabicum |
| " med en grøn midterstribe udvendigt | 4. |
| 4. Bladene med en ganske fin hvid stribe. Frugtstilkene nedad-
bøjede | exscapum |
| " " en tydelig hvid stribe på oversiden | 5. |
| 5. Nye småløg uden for løghinden. Frugtstilkene udstående
umbellatum | |
| Nye småløg inden for løghinden. De nedre frugtstilke lidt
nedadbøjede | divergens |

Ornithogalum umbellatum L. Kostfuglemælk. IV-V. Sj.

O. divergens Boreau IV-V. Sj.

O. exscapum Ten. Stængelløs fuglemælk. 3-10 blomster, hvoraf de underste stilke udgår i jordhøjde. Frugtstilkene nedadbøjede med opret frugt, indtil 6 cm. Bløsteret stjerneformet udstående. Kapslen med 6 kule. II-IV. Sj.

O. arabicum L. Størblomstret fuglemælk. 30-80cm. Bladene 1-3cm brede, uden hvid stribe. Blomsterne i en tæt halvskærm, 15-25x7-12mm, butte. IV-V. Sj.

O. narbonense L. Pyramidefuglemælk. 30-60cm. Bladene 6-8mm brede, uden hvid stribe, oftest nedliggende. Bløsterbladene hvide med en grøn stribe på ydersiden. V-VI. Alm.

O. pyrenaicum L. Bløsterbladene blegt gullige indvendigt og grønlig udvendigt med en grøn stribe. V-VII. Alm.

Hyacinthus orientalis L. Hyacint. III-IV. Sardinien. Forvildet.

Brimeura fastigiata (Viv.) Chouard 3-8cm. Flere oprette blade, der er lidt længere end skaftet, 1-3mm brede. 1-8 oprette, lilla eller hvidlige, klokkeformede, 6-10mm lange blomster. Skov og kløfter. 0-2000m. III-IV. Sj.

Muscari racemosum (L.) Lam. Druhyacint. (M. neglectum Guss.) 10-20cm. Bladene 1½-3mm brede, furede eller halvtrinde. En tæt klase med 12-20 kortstilkede, 4-4½mm lange, mørkeblå blomster med små, hvide tænder. I spidsen nogle mindre, gule blomster. III-VI. Alm.

M. comosum (L.) Miller Duskhyacint. 15-50cm. Bladene 5-17mm brede. Klasen forlænget, for neden med udstående, blegbrune eller violette, frugtbare blomster med en stilk på 5-10mm. Foroven med en dusk af gule, lilla blomster med stilke på 6-25mm. IV-VI. Alm.

Allium. Løg.

- | | |
|---|---------|
| 1. Indre støvtråde 3-spidsede | 2. |
| " " enkle eller med 2 små tænder forneden | 10. |
| 2. Skærmene med ynglekopper | 3. |
| " uden " | 5. |
| 3. Bladene flade | sativum |
| " m.m. trinde og hule | 4. |

4. Bladene halvcylindriske og furede, kun hule forneden
Bladene m.m. cylindriske, hule indvendigt vineale
5. Støvnapperne indesluttende i bløsteret acutiflorum
" fremragende 6.
6. Bladene flade og kølede, 5-50mm brede 7.
- " cylindriske til trekantede, 1-4mm brede 8.
7. Indre bløsterblade uregelmæssigt savtakke commutatum
Alle bløsterblade helrandede ampeloprasum
8. Svøbet 2-4-delt. Skærmen tæt kugleformet sphaerocephalon
" udelte 9.
9. Bløsterbladene hvide med grøn eller lyserød stribet ... sardoum
" m.m. ensfarvede, oftest lyserøde vineale
10. Bladene æg-lancetformede med tydeligt afsat stilk ... ursinum
" ustilkede 11.
11. Bladene alle grundstillede, udgår fra samme højde 12.
- Bladene omskeder i det mindste $\frac{1}{4}$ af stænglen 20.
12. Skærmen næsten siddende mellem grundbladene chamaemoly
" sidder på en veludviklet stængel 13.
13. Stænglen m.m. trekantet 14.
- " trind 16.
14. Stænglen med 2 skarpe og 1 but kant neapolitanum
" " 3 " kanter 15.
15. Bløsteret med 1 grøn ribbe triquetrum
" " 3 grønne ribber pendulinum
16. Bladene 2-6 cm brede 17.
- " 2-10mm " 18.
17. Bløsterbladene med 3-7 ribber siculum
" " 1 ribbe nigrum
18. Bladene cylindriske schoenoprasum
" flade 19.
19. Blomsterne lyserøde. Bladene glatte roseum
" hvide. Bladene oftest randhårede subhirsutum
20. Stænglen tyk og hul, 1-3 cm bred cepa
" tynd, 2-4 mm bred 21.
21. Svøbet 1 cm, kortere end skærmen parciflorum
" lig eller længere end skærmen 22.
22. Bløsterbladene spidse tenuiflorum
" butte 23.
23. Blomsterne hvide, 4-5mm, med mørke stilke pallens
" rødlilla, 5-8mm paniculatum

Allium sativum L. Hvidløg. 50-80cm. 6-12 blade, der omskeder halvdelen af stænglen. Bladene 6-12mm brede og flade. Svøbet med et langt næb, op til 25cm. Støvnapperne indesluttende. VI-VII. Dyrket og undertiden forvildet.

A. sphaerocephalon L. Hovedløg. 30-90cm. 2-5 ofte visne blade. Svøbet 1-2cm langt. Bløsteret lyserødt eller rødlillat, sjældent hvidt, $3\frac{1}{2}$ -5 $\frac{1}{2}$ mm, but. VI-VIII. Alm.

A. vineale L. Sandløg. V-VII. Alm.

A. acutiflorum Loisel. 20-40cm. Stænglerne $\frac{1}{3}$ bladede. Bladene 3-6mm brede, kølede, med ru kant og køl. Svøbet 1-2-delt, op til 2cm, ofte affaldende. Bløsterbladene spidse, 8mm, rødlilla. VI-VII. Korsika: Porto. M.sj.

A. ampeloprasum L. 50-130cm. Bladene $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{3}$ omskedende, visne under blomstringen, 5-18mm brede, kølede og ru. 3-8cm bred kugleformet blomsterstand, der ofte er meget tæt blomstret. Svøbet udelte og affaldende. Bløsteret oftest lyserødt og $3\frac{1}{2}$ -5 $\frac{1}{2}$ mm. IV-VI. Alm.

A. commutatum Guss. Savtandet løg. 40-180cm. Lig foregående, men bladene op til 4 $\frac{1}{2}$ cm brede. Svøbet langnæbbet, 8-22cm. VII-VIII. Åbne steder nær kysten. Sj.

Allium sardoum Moris. Stribet løg. (A. guttatum Steven ssp. sardoum). 30-80cm. Bladene trådformede, 1-2mm, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$ omskedende. Skærmen tæt, 1-3 $\frac{1}{2}$ cm. Svøbet enkelt, men delt i lancetformede flige, affaldende, kortere end skærmen. IV-VI. Sardinien. Sj.

A. tenuiflorum Ten. 15-30cm. Bladene næsten børsteformede. Svøbet tvedelt, af skærmens længde. Bløsteret blegrødt med mørk ribbe. VI-VII. Korsika. Sj.

A. pallens L. Blegt løg. 30-45cm. Bladene halvt cylindriske, 1-1 $\frac{1}{2}$ mm, let furede. Svøbet tvedelt, vedvarende, den ene del længere end skærmen. Blomsterstilkene uens, de ydre korte og krumme, de indre rette og forlængede. VI-VII. Sj.

A. paniculatum L. Topløg. 20-60cm. Bladene indtil 2mm brede, karakteristisk indrullede som tørre. Svøbet tvedelt, den længste del med næb og indtil 14cm lang. Skærmen $3\frac{1}{2}$ -7cm, halvkugle- til ægformet. Bløsteret lyst rødlilla til hvidt. VI-VIII. Korsika. Alm.

● A. parciflorum Viv. Fåblomstret løg. 10-30cm. Bladene trådformede, visne under blomstringen. Svøbet tvedelt, op til 14mm. 2-10 ulige-stilkede, rødlilla blomster med indesluttende støvdragere. VI-IX. Sj.

A. cepa L. Haveløg. 60-150cm. VI-VIII. Dyrket og forvildet.

A. schoenoprasum L. Purløg. VI-VIII. Korsika. Sj. som ssp. sibiricum (L.) Hartm.

A. nigrum L. Bredbladet løg. Bladene 1-2(-6)cm brede, med bølget rand. Skærmen tæ og halvkugleformet, 7-9cm. Svøbet 2-4-delt, op til 3 cm. Bløsteret 6-9mm, lyserødt eller hvidligt med grønlig ribbe. IV-V. Alm.

A. neapolitanum Cyr. Hvidt løg. 20-40cm. Bladene 5-20mm brede, oftest 2 stk., kølede. Svøbet udelte, blivende og kortere end stilke- ne. Bløsteret mælkehvidt, 7-12mm. V-VI. Alm.

A. roseum L. Rosenløg. Bladene 4-6mm brede, med finttandet rand. Svøbet kort og uregelmæssigt firfliget. Bløsteret 9-13mm, lyserødt eller hvidt. IV-V. Alm.

A. subhirsutum L. Randhåret løg. 20-50cm. Bladene slappe, 3-10mm brede. Svøbet med 2-3 korte lapper. Skærmen åben. Bløsteret 7-9mm, skinnende hvidt. Støvdragerne oftest brune. III-V. Alm.

A. triquetrum L. Trekantet løg. 10-30cm. Ydre blade længere end stænglen, de indre kortere og krumme, alle 3-12mm brede, brat afsmal- nede i en but spids. Bløsteret hvidt, 10-15mm, klokkeformet. XII-IV. Sj.

A. pendulinum Ten. 6-25cm. 2 blade på 3-8mm bredde. Skærmen med 5-9, 3-5mm stor blomster, der hænger efter blomstringen. Skov og fugtige, skyggefulde steder. IV-VI. Sj.

A. ursinum L. Ramsløg. V-VI. Korsika.

A. chamaemoly L. Dværgløg. 1-4cm. Bladene og blomsterne omtrent i jordhøjde. Bladene 3-8mm brede og randhårede. Skærmen med 5-10 hvide blomster. Svøbet hindeagtigt og 2-4-lappet. XII-III. Sj.

A. siculum Ucria. Klokkeløg. (Nectaroscordon s. Lindley). 60-120 cm. Bladene 1-3cm brede, kølede og ofte sammenlagte. Skærmen mangeblomstret. Stilkene hænger nedad under blomstringen og er opret- te i frugt. Bløsteret bredt klokkeformet, 14-16mm langt, mat grøn- lig-rødt. Løvskov. 400-1000m. Sj. V-VI.

Convallaria majalis L. Liljekonval. V-VI. Korsika. Sj.

Streptopus amplexifolius (L.) DC. Snoaks. 30-80cm. Ligner en Storkonval, men stænglen zigzagbøjet, bladene spidst ægformede og stængelomfattende og blomsterstilkene med et knæk midtpå. VI-VIII. Korsika.

Polygonatum odoratum (Miller) Druce Kantet konval. IV-VI. Korsika. Sj.

Paris quadrifolia L. Firblad. VI-VII. Begge øer.

Asparagus. Asparages.

1. Kladodierne tynde og bløde. Stænglen urteagtig 2.
" stive og m.m. stikkende. Stænglen forveddet 3.
2. Kladodierne glatte. Stængler og grene glatte officinalis
" ru. Stængler og grene med striber af småvorter maritimus
3. Kladodierne enlige stipularis
" i knipper 4.
4. Stænglerne hvide. Kladodierne 20-30mm albus
" grønne. " 4-20 mm 5.
5. Kladodierne næsten ens, 2-8mm, i knipper på 10-30 acutifolius
" tydeligt uens, 10-20mm, i knipper på 3-7 aphyllus

Asparagus officinalis L. Asparages. V-VI. Korsika. Alm.

A. maritimus (L.) Miller Bitter asparages. 40-80cm. Ligner foregående, men stærkt grenet, kladodierne lidt tykkere (0,6mm). Støvknappen $\frac{1}{2}$ x støvtråden (ca. = støvtråden hos off.) Fugtige strandlavninger. V-VI. Sj.

A. acutifolius L. Buskaspargen. 30-150cm. Blomsterne gulgrønne, 4mm. Bærret grønt. VIII-IX. Alm.

A. aphyllus L. Gitteraspargen. IX-X. Sardinien. Alm.

A. stipularis Forsskål Tornaspargen. 50-100cm. Unge grene stribede og blådgule. Kladodierne tornformede, firkantede, 1mm brede og 17-27mm lange med gul spids. Blomsterne i knipper på 2-8, 3mm store og grønne. Bærret sortebåt. IV-V. Sardinien. Sj.

A. albus L. Hvidgrenet asparages. 50-100cm. De hvide grene bugtede eller zigzagbøjede. De ret bløde kladodier med en torn ved grunden af knippet. Blomsterne grønne, 4mm, 6-12 sammen. Bærret rødt, til sidst sortagtigt. VIII-X. Alm.

Ruscus aculeatus L. Musetorn. 30-60cm. Halvbusk med mørkegrønne, stribede grene og mørkegrønne, æg- til lancetformede kladodier, 20-32x8-14mm, med blomster og frugter udgående fra midten af kladodiet. Blomsterne grønne, 5mm, 3-6 sammen. Bærret rødt. II-IV. Alm.

Smilax aspera L. Pigtråd. 1-4m. Stedsegrøn slyngplante med glatte, tornede stængler og spredte hjerte-pilformede, læderagtige blade, ofte 8-10x4-5cm. Blomsterne hvide, 4-5mm i skærme i korte stande fra de øvre bladhjørner. Bærret rødt eller mørkt. IX-XI. Alm.

AGAVACEAE

Agave americana L. Sekelplante. Tykbladet rosetplante med spidse blade på 80-180cm. Blomstrer een gang med en bred, 2-5m høj top. VII-VIII. Dyrket og forvildet. Alm. (Nordamerika).

AMARYLLIDACEAE

Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. Tordenurt. 12-22cm. Gule krokuslignende blomster, der afviger fra Krokus ved at være oversædige. Bladene op til 15mm brede. IX-X. Sardinien. Sj.

Leucojum. Hvidblomme.

1. Bladene 7-12mm brede. Blomsteret hvidt med en grøn plet nær spidsen aestivum
Bladene 1-3 mm brede. Blomsteret hvidt eller lyserødt 2.
2. Vårblomstrende. Blomsteret renhvidt longifolium
Høstblomstrende. " m.m. lyserødt 3.
3. Stænglen 5-12cm, med 1 lyserød blomst på 5-7mm roseum
" 10-20cm, med 2-3 blomster på 8-12mm autumnale

Leucojum aestivum L. ssp. pulchellum (Salisb.) Briq. Sommerhvidblomme. 30-50cm. Ofte 2-3 1-1½cm store blomster. III-IV. Begge øer.

- L. longifolium Gay 15-20cm. Bladene af stænglens længde, 1-2mm brede. Støttebladet 15-25mm. 1-4 blomster på 8-11mm. 100-1200m. Klipper. IV-V. Korsika: Omkring M.Cinto og M.Rotondo. Sj.
- L. roseum Martin Rosenhvidblomme. 5-12cm. Blomsterne oftest enlige, 5-7mm. Klipper og krat. IX-XI. Korsika og Nordsardinien. Sj.

Pancratium. Hvide blomster med bikrone i en skærm. Støvdragerne halvt sammenvoksede med bikronen og rager frem fra blomsten.

P. maritimum L. Strandlilje. Bladene op til 50x2cm, mørkt grågrønne. 5-10 10-15cm lange blomster med et 6-8cm langt blomsterrør. Den øverste del af blomsten tragtformet med 12-tandet bikrone. Sandstrand og klitter. VII-IX. Alm.

P. illyricum L. 40-70cm. Bladene 4-5cm brede. Skærmen med 7-20 6-8cm lange blomster med et blomsterrør på 1½cm. Bikronen med 6 kløvede tænder. Skyggefulde klipper. 0-1350m. Sj.

Narcissus serotinus L. Høstnarcis. 10-30cm. Bladene udvikles efter blomstringen, trådformede, 2mm brede. 1 blomst med et støtteblad på 2-3cm. Blomsteret hvidt med et rør på 1-2cm og flige på 10-16mm. Bikronen orange, reduceret til en 1-1½mm bred ring. IX-XI. Sj.

N. tazetta L. Tazet. 20-50cm. Bladene 1cm brede. Støttebladet 5-6cm. 3-8 blomster med en 3-5mm lang, gul eller orange, kopformet bikrone. III-V. 2 underarter:

ssp. tazetta: Blomsterfligene hvide. Bikronen gul. Alm.

ssp. bertolonii (Parl.) Baker: Blomsterfligene gullige. Bikronen kraftigere gul. Sj.

DIOSCORACEAE

Tamus communis L. Fedtblad. Slyngplante på 1-4m med spredte, ret store (5-10x3-8cm) hjerteformede, fedtglinsende blade med 3-9 krumme og grenede årer. Små 6-fligede, grønne blomster i klaser fra bladhjørnerne. IV-V. Alm.

IRIDACEAE

Hemerodactylus tuberosus (L.) Salisb. Hermesfinger. 20-40cm. En iris med gulgrønne blomster med purpurbrune ydre kronblade og smalle, 4-kantede, sivagtige blade. II-III. Korsika. Sj.

Iris. Sværdlilje.

1. Bladene sværdformede 2.
" ikke sværdformede 6.
2. Ydre svæbblade med en stribet hår (skæg) 3.
" glatte eller dunede 5.
3. Støttebladene hindeagtige i den øvre halvdel germanica
" kun hindeagtige i spids og kanter 4.
4. Blomsteret hvidt eller lyseblåt florentina
" lyslilla med mørke årer todaroana
5. Blomsterne gule. Stænglen trind pseudacorus
" oftest matlilla. Stænglen med en kant foetidissima
6. Bladene flade, 5-30 mm brede planifolia
" m.m. furede, 3-5 mm brede 7.
7. Blomsterne små, 2-3cm, blå, 2-5 sammen sisyrinchium
" store, 6-8cm, enlige xiphium

Iris germanica L. Havesværdlilje. 50-100cm. Støttebladene m.m. hvide og hindeagtige. Blomsten 10-12cm, lyslilla eller over i det blå. Skægget gult. IV-VI. Dyrket og forvildet.

I. florentina L. Violrod. V. Dyrket og svagt forvildet.

Iris todaroana Cif. & Giac. 100-120cm. Som de foregående, men bladene gradvist tilsmalende. Blosteret indtil 15cm, mere blåligt. IV-V. Sardinien: Isola di S. Pietro. Sj.

I. pseudacorus L. Gul sværdlilje. IV-VI. Alm.

I. foetidissima L. Stinkende sværdlilje. 30-90cm. Bladene mørkegrønne, stinkende. Blosterrøret grønligt, de ydre flige gullige ved grunden, ellers matlilla, de indre flige lysegule og violetanløbne. Fugtige skove. V-VIII. Sj.

I. planifolia (Miller) Dur. & Sch. 15-40cm. Alle blade grundstillede. Oftest kun 1 blomst med et 10-20cm langt, hvidligt blosterrør, ellers blå til blålilla med en gul stribe på de 6cm lange, ydre flige. XI-III. Sydsardinien.

I. xiphium L. Spansk sværdlilje. 25-50cm. Nedre blade 20-70cm, oprette og blågrønne. Blomsten med et kort blosterrør på 2-3mm, lyseblå eller blålilla med en gul plet og uden skæg. IV-V. Sardinien: Ingurtosu. Korsika: Bonifacio. M.sj.

I. sisyrinchium L. Toknoldet sværdlilje. 8-12cm. Bladene 10-30cm, ofte liggende og halvirkelformet krummede. Blosterrøret 2-3cm, fligene 1½-3cm, himmelblå, ofte med en gul plet. IV-V. Sj.

Crocus minimus DC. 8-15cm. Bladene linjeformede, ½-1mm brede. Blomsterne lilla, de ydre blosterblade med 3 mørke striber. Støvfanget orangegult. Knolden med parallelle fibre. Blomsten med et støtteblad og et lille forblad. III-V. Sj.

● C. corsicus (Gay) Vanucci 12-18cm. Ligner den foregående, men knolden med netformede fibre, ihvertfald foroven. Blomsten kun med støtteblade, men uden forblad. Blomsten ofte større. II-VI. Sj.

Romulea. Sivstjerne. Små, oftest lilla/hvide blomster. Trådformede blade uden hvidt bånd. Blomsterne på en kort stængel.

1. Griffel og støvfang rager op over støvdragerne 2.
- " og støvfang lig eller kortere end støvdragerne 4.
2. Blosterbladene spatelformede med afrundet spids, mørklilla requienii 3.
- Blosterbladene elliptiske, spidse 3.
3. Blomsten med gult svælg. Blomsterstøvet gult limbarae 3.
- " " hvidt " " hvidt ligustica 3.
4. Bladene trinde (0,8mm brede), slappe og liggende rollii 5.
- " halvtrinde (1-1½mm brede), m.m. oprette 5.
5. Begge støtteblade m.m. hindeagtige 6.
- Det nedre støtteblad helt urteagtigt 7.
6. Støvtrådene glatte. Blosterbladene elliptisk-spatelformede, butte ... insularis 3.
- Støvtrådene hårede. Blosterfligene elliptiske, ikke helt butte revelieri 3.
7. Øvre støtteblad kun hindeagtigt i kanten. Blomsten 15-25mm ramiflora 3.
- Øvre støtteblad overvejende hindeagtigt. Blomsten 10-12mm columnae 3.

Romulea ligustica Parl. 3-15cm. Nedre støtteblad urteagtigt med smal hindekant, det øvre næsten helt hindeagtigt og tæt plettet. Blomsten 2-3½cm blålilla. II-III. Alm.

● R. limbarae Bég. 5-15cm. IV-V. Nordsardinien: M.Limbara. Sj.

R. requienii Parl. 2-10cm. Bladene meget længere end stænglen, slappe og liggende. Blomsten 12-28mm. Svælget også mørkfarvet. II-IV. Især nær kysten. Alm.

R. insularis Sommier 5-15cm. III-IV. Korsika: Pto. Vecchio, Sta. Manza, Macinaggia. Sardinien: Caprera- og Maddalenæerne. M.sj.

● Romulea revelieri Jordan & Fourr. 5-15cm. Fugtige enge og sumpe. III-IV. Korsika: Capo Corso, Bastia, Calvi, Ajaccio, Pto. Vecchio, Bonifacio. Sj.

R. rollii Parl. 10-25cm. Bladene 15-25cm lange og m.m. snoede. Blomsten 15-22mm. Svælget gulligt og m.m. håret. Fugtigt sand nær kysten. II-III. Sj.

R. ramiflora Ten. 10-25cm. Bladene 25-40cm lange. Blomsten 15-25mm, blålilla, undertiden mørkstribet. Fugtige steder langs kysten. II-III. Sj.

R. columnae Seb. & Mauri 2-15cm. Blomsterne bleglilla med mørkere striber, 10-12mm. II-IV. Alm.

Gladiolus. Jomfrufinger. 30-100cm. Bladene sværdformede. Blomsterne rødlig, ensidige, uregelmæssige i et aks.

1. Støvknapen længere end støvtråden italicus 2.
- " lig eller kortere end støvtråden 2.
2. Det nederste blosterblad tydeligt større end sine 2 naboer byzantinus 3.
- De 3 nederste blosterblade nogenlunde lige store 3.
3. Blosteret stort, 4-5cm. Støvknapen lig støvtråden communis 3.
- " mindre, 3cm. Støvknapen kortere end støvtråden 4.
4. Frøene kantede, uden vinger. Sardinien inarimensis 4.
- " 5-6mm, smalvingede. Korsika. dubius 4.

Gladiolus italicus Miller Markjomfrufinger. Blosteret 4(3-5)cm. Kronrøret lidt krummet. Øvre blosterblade uens, de nedre ligeså; det nederste med en hvid, mørkkantet plet. Støvfanget spatelformet. IV-V. Alm.

G. byzantinus Miller Blosteret 2-5cm, røret lidt krummet. Blosterbladene overlappende, de øvre nogenlunde ens; det nederste æg-rudeformet med en hvid, mørkkantet plet. Støvfanget spatelformet. III-V. Alm.

G. communis L. Blosterrøret lidt krummet; bladene overlappende, nogenlunde lige store. VI-VII. ?

G. inarimensis Guss. V-VI. Sardinien. Sj.

G. dubius Guss. V-VI. Korsika. Sj.

JUNCACEAE

Juncus. Siv.

1. Enårig 2.
- Flerårig 9.
2. Bladene med tydelige tværvægge 3.
- " uden tværvægge 4.
3. 1-5 nøgler med 2-5(-8) blomster pygmaeus 3.
- 2(-3) nøgler med 8-16 " tingitanus 3.
4. Stænglen bladløs capitatus 5.
- " med 1-2 blade 5.
5. Blomsterne altid enlige langs grenene 6.
- De nedre blomster til dels i nøgler på 2-20 8.
6. Kapslen kugleformet tenageja 7.
- " æg- til ellipseformet 7.
7. Bladene flade, 1-2½ mm brede foliosus 7.
- " trådformede, op til 1 mm brede bufonius 7.
8. Indre blosterblade m.m. butte, ca. af kapslens længde hybridus 7.
- " " spidse, længere end kapslen sorrentinii 7.
9. Alle blade grundstillede, cylindriske og stængellignende 10.
- Bladene forskellige fra stænglerne 15.
10. Blomsterstanden trængt til side af det lange, stængel- lignende støtteblad 11.
- Blomsterstanden længere end sit støtteblad eller lig det 13.
11. Nedre bladskeder sortbrune og skinnende inflexus 12.
- " " gulbrune og matte 12.

12. Blomsterstanden kugleformet sammentrængt. Stænglen rillet
conglomeratus
Blomsterstanden oftest åben. Stænglen glat effusus
13. Blosteret gulgrønt, lig eller længere end kapslen maritimus
brunt, $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ af kapslen 14.
14. Kapslen 4-6mm, spidsen kegleformet eller trekantet .. acutus
" $2\frac{1}{2}$ -4mm, " but litoralis
15. Nedre blade med tydelige tværvægge 16.
" " uden eller med svage tværvægge 21.
16. Grundbladene reducerede til bladskeder subnodulosus
" med veludviklet bladplade 17.
17. Ydre stængler liggende og rodslående, op til 2m lange
fontanesii
- Alle stængler oprette til opstigende 18.
18. Blosterbladene uden hindekant, de indre længst acutiflorus
" med " " ikke længst 19.
19. Stænglen sammentrykt. Nøglerne m.m. sammenklumpede ... anceps
" trind. Nøglerne veladskilte 20.
20. Ydre blosterblade spidse, 10 - 20 articulatus
" " butte, 40 requienii
21. De øvre blade med, de nedre uden tydelige tværvægge
heterophyllus
- Bladene uden tydelige tværvægge 22.
22. Blosteret længere end kapslen subulatus
" kortere " " 23.
23. Stænglerne med knoldformet opsvulmet grund bulbosus
" uden " " compressus

Juncus subulatus Forsskål Mellembrodt siv. 50-100cm. 2-4 slappe, 6-8mm brede stengelblade. Toppen 10-20cm, åben og mangeblomstret. Blosteret spidst, kapslen but. Mest i saltsumpe. V-VI. Sj.

J. tenageja L.f. Tyndstænglet siv. 5-30cm. Bladene smalle, $\frac{1}{2}$ -1mm brede. Bladskederne ender i 2 afrundede øren. Blosterbladene 2-2 $\frac{1}{2}$ mm, de ydre spidse, de indre butte. Fugtigt sand. V-VII. Sj.

J. föliosus Desf. 15-50cm. Blomsterstanden optager ofte det meste af stænglen. Blosterbladene 4-6mm, oftest med en mørkebrun streg mellem hindekanten og den urteagtige midte. Fugtigt sand. IV-VI. Sardinien: Sj. Korsika?

J. bufonius L. Tudsosiv. Blosteret 5-8mm. V-IX. Alm.

J. hybridus Brot. Svikkelsiv. 5-20cm. Blomsterne oftest 2-3 sammen. Toppen bred, danner ofte en flad vifte. Blosterbladene uens, de ydre længst, 4-5mm. Fugtigt sand nær kysten. IV-VII. Alm.

J. sorrentinii Parl. Viftesiv. 5-20cm. Blosteret 6-8mm, ca. 2 x kapslen. Fugtige lavninger. VI-VIII. M.sj.

J. compressus Jacq. Fladstrået siv. VI-VII. Sardinien. Sj.

J. effusus L. Lysesiv. V-VII. Alm.

J. conglomeratus L. Knopsiv. V-VII. Korsika. Sj.

J. inflexus L. Blågråt siv. VI-VIII. Alm.

J. acutus L. Stikkende siv. 50-150cm. Tæt tueformet og stærkt stikkende. Det nedre støtteblade 3-6cm, med en kølet grund. Blosteret 2 $\frac{1}{2}$ mm, ydre blade spidse, indre butte eller afskårne. Mest strandsumpe. IV-VII. Alm.

J. litoralis C.A.Meyer 50-150cm. Som foregående, men stænglerne ofte enlige i en åben tue. Bladene mindre stikkende. Klitlavninger. V-VII. Korsika. Sj.

J. maritimus Lam. Strandsiv. VI-VIII. Alm.

J. pygmaeus Richard Dværgsiv. IV-V. Sj.

J. tingitanus Maire & Weill. Tvehovedet siv. 5-20cm. Blosterbladene 6-7mm, langt tilspidsede. Fugtigt sand. IV-V. M.sj.

J. subnodulosus Schrank Butblomstret siv. VI-VIII. Sj.

J. heterophyllus Desf. Forskelligbladet siv. 10-40cm. Vandplante. Vandbladene trådformede, slappe, uden skillevægge. Luftbladene cylindriske, med skillevægge. Toppen med 5-20nøgler med 2-6 blomster. Blosteret 6-8mm. Lavt vand. V-VI. Sj.

J. bulbosus L. Lidet siv. VI-VII. M.sj.

J. fontanesii J.Gay Krybsiv. Bladskederne med 2 øren. Blosteret 2 $\frac{1}{2}$ -4mm, spidst. Fugtigt sand, damkanter. VI-VII. Sardinien. Sj.

J. articulatus L. Glanskapslet siv. V-VIII. Alm.

J. acutiflorus Ehrh. Spidsblomstret siv. V-VII. Sj.

• *J. requienii* Parl. (*J. alpinus* p.p.) VI-VII. Korsika. Alm.

J. anceps Laharpe Sandsiv. V-VII. Sardinien: M.Limbara. Korsika: Sj.

J. capitatus Weigel Fin siv. IV-V. Sj.

Luzula. Frytle.

1. Blomsterne enlige 2.
" i nøgler, hoveder eller aks 4.
2. Planten med lange udløbere. Blomsterne strågule luzulina
" uden udløbere. Blomsterne brune 3.
3. Grundbladene 7-10mm brede. Frugtstilkene nedadrettede pilosa
" 1-3 mm " " opadrettede forsteri
4. Blomsterne hvide 5.
" brune eller sorte 6.
5. Blosteret 5-6 mm, ca. 2 x kapslen nivea
" 2 $\frac{1}{2}$ -3mm, ca. lig " pedemontana
6. Blomsterne i nøgler på 2-5 7.
" i hoveder eller aks 8.
7. Bladene 4-5 mm brede. Kapslen kortere end blosteret sieberi
" 5-25mm " " lig blosteret silvatica
8. Blomsterne i et nikkende aks 9.
" i hoveder 10.
9. Kapslen lidt længere end blosteret. Støvknappen 3-5 x tråden italica
Kapslen ca. = blosteret. Støvknappen ca. = tråden spicata
10. Griflen kortere end frugtknuden. Blosterbladene uens sudetica
" lig eller længere end frugtknuden. Blosterbladene m.m. ens 11.
11. 2-5, ved frugtmodning nikkende nøgler. Støvknappen 3 x tråden campestris
3-10 ved frugtmodning oprette nøgler. Støvknappen ca. = tråden multiflora

Luzula forsteri (Sm.) DC. Smalbladet frytle. 20-30cm. Grundbladene med en kort, gullig spids. Løvskov. III-V. Alm.

L. pilosa (L.) Willd. Håret frytle. V-VII. Begge øer.

L. luzulina (Vill.) DT. & Saroth. Gullig frytle. 15-25cm. Med 5-10 cm lange, overjordiske udløbere. Bladene 2-4mm brede, flade og med en kort, gullig spids. Kapslen længere end blosteret. VI-VIII. Korsika. Sj.

L. pedemontana Boiss. & Reuter Trådfrytle. 30-60cm. Grundbladene sammenlagte, højst 1mm brede, de øvre ca. 2mm brede. Blosteret gennemsommeligt. Løvskov. V-VII. Korsika. Sj.

L. nivea (L.) DC. Snehvid frytle. 40-60cm. Grundbladene 3-4mm brede. Toppen med 6-20 nøgler. Blosterbladene uens. Løvskov. V-VII. Korsika. Vizzavona. M.sj.

Luzula sieberi Tausch Granfrytle. 40-60cm. Bløsteret rødbrunt, 3-3½mm. 1000-2100m. VI-VII. Korsika. Sj.

L. campestris (L.) DC. Markfrytle. IV-VII. Korsika: Alm. Sardinien: Sj.

L. multiflora (Ehrh.) Lej. Mangeblomstret frytle. IV-VI. Korsika. Alm.

L. sudetica (Willd.) DC. Sort frytle. 15-35cm. Blomsterstanden med 3-5(-8) hoveder. Bløsteret sortskinnende. Alpeenge. 1700-2800m. VII-VIII. Korsika. Sj.

L. spicata (L.) DC. ssp. *mutabilis* Chrtek & Krisa Aksfrytle. 7-15cm. Blomsterne i et ægformet, sammentrængt aks med mørkebrune til sortagtige blomster. Bjærgenge. VI-VIII. M.sj.

L. italica Parl. 15-25cm. Blomsterne brune til sorte, i et af-langt-elliptisk aks. Bjærgenge. 1500-2600m. Sardinien: Gennargentu. Sj.

GRAMINEAE

1. 1 endestillet småaks, indesluttet i en skede *Lygeum*
Flere småaks 2.
2. Blomsterstanden 1 eller flere aks 3.
" en dusk eller top 26.
3. Blomsterstanden 1 aks 4.
" flere aks 20.
4. Småaksene ensidigt stillede 5.
" toradet eller alsidigt stillede 6.
5. Småaksene 1-blomstrede *Nardus*
" 3-9-blomstrede *Nardurus maritimus*
6. Akset kort og kugleformet. Avnerne stikkende *Echinaria*
" forlænget 7.
7. 2-3 småaks ved hvert led 8.
1 " " " 10.
8. 2 småaks ved hvert led *Taeniatherum*
3 " " " 9.
9. Midtersmåakset stilket *Hordelymus*
" siddende *Hordeum*
10. Småaksene 1-blomstrede 11.
" flerblostmstrede 13.
11. Inderavnen med stak *Psilurus*
" uden " 12.
12. Småakset med 2 yderavner *Parapholis*
" 1 yderavne *Hainardia*
13. Småaksene vender kanten mod aksens 14.
" " fladen " " 16.
14. Inderavnen med knæbøjlet, rygstillet stak *Gaudinia*
Eventuelle stakke rette og endestillede 15.
15. Kun 1 yderavne *Lolium*
2 yderavner *Catapodium*
16. Småaksene lange, 2-4 cm, de nedre kortstilkede *Brachypodium*
" mest mindre, siddende 17.
17. Flerårige. Inderavnen ribber løber sammen foroven *Agropyron*
Enårig 18.
18. Avnerne hvælvede med 2-4 stakke eller tænder *Aegilops*
" med 0-1 stak 19.
19. Yderavnerne med 2 hårede køle. Akset halvtrindt .. *Dasypyrum*
" ikke kølede. Akset toradet *Nardurus halleri*
20. Småakset langstakket 21.
" uden stak 23.
21. Aksene spredtstillede *Echinochloa*
" parvise 22.
22. 1 par aks *Andropogon*
Flere par aks *Hyparrhenia*

23. Skedehinden hårformet 24.
" hindeagtig 25.
24. Aksene spredtstillede *Spartina*
" fingerstillede *Cynodon*
25. Aksene grønne. Alle småaks siddende *Paspalum*
" brunlige. Hvert andet småaks stilket *Digitaria*
26. Blomsterstanden en dusk 27.
" en top 50.
27. To slags småaks: golde og frugtbare 28.
Småaksene ens 30.
28. Frugtbare småaks brede, vinget-kølede *Phalaris paradoxa*
" " smalle 29.
29. Golde småaks spidse eller med stak *Cynosurus*
" " butte, uden stak *Lamarckia*
30. Yderavnen besat med ½-1mm lange krogbørster *Tragus*
" uden krogbørster 31.
31. Dusken lådden af hår eller lange stakke 32.
" ikke lådden 35.
32. Småaksene uden stak 33.
" med " 34.
33. Yderavnerne lådne, længere end blomsterne *Imperata*
" glatte, omtrent lig " *Melica*
34. Bladene glatte. Dusken forlænget *Polypogon*
" blødhårede. Dusken ægformet *Lagurus*
35. Småaksene omgivne af brunlige børster *Setaria*
" ikke omgivne af børster 36.
36. Småakset med 1 frugtbar blomst 37.
" " 2-flere frugtbare blomster 44.
37. Yderavnerne med en knudeformet fortykkelse ved grunden.
Enårig *Gastridium*
Yderavnerne uden knude ved grunden 38.
38. Inderavnen med stak 39.
" uden " 41.
39. Bladene sammenrullede. Stakken mindst 1cm *Stipa*
" flade 40.
40. Yderavnerne lige lange *Alopecurus*
" uens *Anthoxanthum*
41. Skedehinden hårformet *Crypsis*
" hindeagtig 42.
42. Småakset 11-13mm. Dusken 10-25cm *Ammophila*
" mindre 43.
43. Yderavnen med en vinget køl *Phalaris*
" " uvinget køl *Phleum*
44. Inderavnen med en lang stak 45.
" uden eller med en kort stak 46.
45. Stakken lige og endestillet *Vulpia*
" knæbøjlet og rygstillet *Trisetum paniceum*
46. Dusken ensidig 47.
" alsidig 48.
47. Skedehinden hårformet *Aeluropus*
" hindeagtig *Dactylis*
48. Inderavnen med 3-5 brodspidsede tænder foroven *Sesleria*
" spids, stump eller kort tvekløvet 49.
49. Flerårig *Koeleria*
Enårig *Lophochloa*
50. Småakset med 1 frugtbar blomst 51.
" " 2-flere frugtbare blomster 65.
51. Toppen 25-60cm, dækket af lange, hvide hår *Erianthus*
" ikke dækket af hvide hår 52.
52. Småaksene i par af 1 siddende og 1 stilket 53.
" alle ens 54.
53. Toppen udgøres af parvise klaser 22.
" topformet *Sorghum*
54. Inderavnen med en stak på mindst 1cm 55.
" uden eller med en kortere stak 56.

55. Stakken rygstillet Arrhenatherum
" endestillet Stipa
56. Småakset indeholder en tydelig, gold blomst 57.
" uden en gold blomst 59.
57. Med stak Holcus
Uden stak 58.
58. Hårformet skedehinde Panicum
Skeden ender i en urteagtig spids modsat bladpladen Melica
59. Småakset kraftigt børstehåret på ribberne Leersia
" med glatte eller svagt hårede ribber 60.
60. Blomsten med hår ved inderavns grund Calamagrostis
" uden " " " 61.
61. Yderavnerne hvælvede 62.
" kølede 63.
62. Inderavnen uden stak Milium
" med en langt fremragende eller skjult st. Oryzopsis
63. Skedehinden hårformet eller næsten manglende Sporobolus
" hindeagtig 64.
64. Bladene 8-16mm brede. Planten 80-150cm Phalaris arundinacea
" smallere. Planten lavere Agrostis m.m.
65. Inderavnerne omgivne af m.m. lange, hvide hår. Høje
planter over 1m 66.
Inderavnerne ikke omgivne af lange, hvide hår 68.
66. Bladene noget indrullede. Skedehinden hindeagtig Ampelodesmos
" flade. Skedehinden hårformet 67.
67. Stænglen forveddet. Yderavnerne næsten lige lange Arundo
" ikke forveddet. Yderavnerne uens Phragmites
68. Yderavnerne så lange som eller længere end inderavnerne 69.
" kortere end inderavnerne 77.
69. Ingen eller en endestillet stak 70.
En rygstillet stak 72.
70. En endestillet stak. Sammentrængt top Avellinia
Uden stak 71.
71. Småaksene meget små, 1-2 mm Antinoria
" større, 6-15 mm Melica
72. Småaksene 2-blomstrede, små. kortstakkede 73.
" flerblomstrede, mere langstakkede 75.
73. Stakken meget kort og kølleformet Corynephorus
" trådformet 74.
74. Flerårig Deschampsia
Enårig Aira
75. Småaksene ret små, 2-7mm. Inderavnen kølet Trisetum
" større, 8-35mm. " hvælvet 76.
76. Småaksene hængende Avena
" m.m. oprette Ventenata
77. Småakset med 2 frugtbare blomster 78.
" " 3-flere frugtbare blomster 80.
78. Skedehinden hårformet Molinia
" hindeagtig 79.
79. Inderavnerne afstudsede foroven Catabrosa
" spidse Molinierella + Melica
80. Småakset omtrent så bredt som langt Briza
" længere end bredt 81.
81. Toppen sammentrængt og ensidig Dactylis
" anderledes 82.
82. Hårformet skedehinde 83.
Hindeagtig " 84.
83. Småakset med 1-4 blomster Molinia
" " 6-30 toradet stillede blomster Eragrostis
84. Rygstillet, knæbøjet stak Avena
Ingen eller endestillet stak 85.
85. Inderavnen kløvet, oftest med en stak i kløften Bromus
" ikke kløvet 86.

86. Flerårig 87.
Enårig 89.
87. Avnerne spidse, ofte med stak Festuca
" butte, uden stak 88.
88. Yderavnerne med 1 ribbe, inderavnerne med 5-11 Glyceria
Øvre yderavne med 3 ribber, inderavnerne med 5 Puccinellia
89. Inderavnen langstakket 90.
" uden stak 91.
90. Inderavnen med 1 køl Vulpia
" " 3 køle, i det mindste forneden Vulpiella
91. Toppens grene stive 92.
" " ikke stive 93.
92. Toppens grene udspærrede Cutandia
" " ikke udspærrede Catapodium
93. Småaksene 2-3mm. Den længste yderavne under 1mm Sphenopus
" større. " " over 1 mm Poa

Festuca. Svingel.

1. Bladene flade 2.
I det mindste de nedre blade sammenfoldede 5.
2. Inderavnen med en stak på 12-15 mm gigantea
" " " 0-3 mm 3.
3. Nederste par topgrene med 1-3 og 4-6 småaks pratensis
De nederste topgrene med 5-15 småaks 4.
4. Toppen bred med udstående grene arundinacea
" smal med oprette grene fenas
5. Skedehinden $\frac{1}{2}$ -1mm. Golde skuds blade 2-3cm sardoa
" stærkt reduceret, under $\frac{1}{2}$ mm 6.
6. Planten med korte udløbere rubra
" uden udløbere 7.
7. Skedehinden med 2 øren 8.
" uden " 9.
8. Bladene 0,6-0,9 mm tykke, stive og stikkende indigesta
" 0,3-0,6 mm tykke, ret bløde vizzavonae
9. Toppen smal og aksformet morisiana
" ikke aksformet 10.
10. Stakken 1-2 $\frac{1}{2}$ mm. Planten 30-40 cm cyrnea
" op til 6mm. Planten 30-120 cm heterophylla

Festuca gigantea (L.) Vill. Kæmpesvingel. VII-VIII. Korsika. Msj.

F. pratensis Hudson Engsvingel. V-VIII. Sj.

F. arundinacea Schreber Strandsvingel. V-VII. Alm.

F. fenas Lag. (F. arundinacea ssp. f. Arc.). 30-80cm. Bladene 3-4 mm, til sidst indrullede. Skedehindens ører med korte, tætsiddende randhår. Toppen smal og mellembrudt. Mest kystnær. IV-VI. Sj.

● F. sardoa Hackel 12-37cm. Stråene tynde og trådformede, noget ru foroven. Bladene 0,3-0,4mm tykke, svagt stikkende. Toppen 2-5cm, skinnende grøn. Stakken indtil 1,2mm. 1200-2700m. Sardinien: Limbara. Korsika. Alm. VII-VIII.

F. rubra L. Rød svingel. V-X. Korsika. Sj.

F. cyrnea (Lit. & St. Yves) M.D. 30-40cm. Bladene 0,35-0,55mm brede. Toppen (3-)5-7cm, rugrenet, bleggrøn og violetanløben. Stakken 1-2 $\frac{1}{2}$ mm. Bjærgenge. 600-1800m. V-VI. Alm.

F. heterophylla Lam. Forskelligbladet svingel. 30-70(-20)cm. Grundbladene tynde, 0,4-0,6mm brede; stængelbladene flade, 1 $\frac{1}{2}$ -2mm brede. Toppen bred og åben, 6-17cm, ofte ensidig. Stakken 2-3 $\frac{1}{2}$ (-6) mm. Skov. V-VII. Korsika. Sj.

● F. morisiana Parl. 10-30cm. Stænglerne glatte. Bladene 0,2-0,5mm tykke. Toppen smal og aksformet, 3-8cm, bleggrøn. Småaksene 1-2(-4) blomstrede. 1400-1710m. VI-VII. Sardinien: Gennargentu. M.sj.

Festuca indigesta Boiss. ssp. litardierei (St.Yves) Kerg. 30-40 cm. Bladene grågrønne, m.m. blåduggede og krumme, stive og stikken-de. Toppen tæt og opret. 3-6cm, rugnet. Stakken 1½-2,3mm. Klip-per og stenede skrånter. V-VII. Korsika. Sj.

F. vizzavonae Ronn. 6-30cm. Toppen linjeformet, 2-4(-5)cm, grøn eller en anelse violetanløbne. Stakken 3-5mm. V-VII. Sj.

Lolium. Rajgræs.

1. Inderavnen tyk, 3 x så lang som bred, oftest med en ru stak
temulentum 2.
Inderavnen almindelig, 5 x så lang som bred
2. Planten med golde skud 3.
" uden " 4.
3. Oftest med stak. Stænglen næsten altid ru foroven multiflorum
" uden " " glat foroven perenne
4. Yderavnerne kortere end småakset. Oftest med stak multiflorum
" omtrent lig " " uden " rigidum

Lolium temulentum L. Giftigt rajgræs. 20-70cm. Enårig, oftest kun med 1 strå, der er glat foroven. Yderavnen omtrent af småaksets længde. I kornmarker. IV-VI. Alm.

L. rigidum Gaudin Rut rajgræs. 18-45cm. Enårig. Inderavnen med en but, hindekantet spids. Yderavnen omtrent af småaksets længde. IV-VI. Alm.

L. multiflorum Lam. Italiensk rajgræs. V-VII. Alm. 2 underarter: ssp. multiflorum: Kraftigt flerårig.

ssp. gaudinii (Parl.) Sch.& Th.: Spinkel enårig.

L. perenne L. Alm. rajgræs. III-X. Alm.

Vulpia. Væselhale.

1. Toppen med forlængede grene. Stakken højst af inderavnen
længde 2.
Toppen med korte eller ingen grene. Stakken ofte længere
end inderavnen 4.
2. Flerårig med golde skud sicala
Enårig uden " " 3.
3. Nedre yderavne 1/3 x så lang som den øvre geniculata
" " reduceret til et ganske lille skæl ligustica
4. Nedre yderavne 0-1/10 x så lang som den øvre 5.
" " ½-1/6 af den øvre 6.
5. Stænglen stiv med blade næsten til akset. Småaksene med
4-6 blomster .. fasciculata
Stænglen spinkel, uden blade helt oppe. Småaksene med
2-4 blomster membranacea
6. Inderavnen randhåret ciliata
" glat 7.
7. Toppen 10-20cm, noget bøjet, rører den øverste bladskede myuros
" 2-8cm, rank, rører ikke den øverste bladskede 8.
8. Småakset 8-10cm. Stakken ca. lig inderavnen bromoides
" ca.6cm. " 2-3 x " muralis

Vulpia sicala (Presl) Link Flerårig væselhale. 20-70cm. Tæt tue-formet med kraftige strå. Toppen 5-13cm med oprette eller udstående grene. Skovlysninger og bjærgenge. IV-V. Sj.

V. geniculata (L.) Link Grenet væselhale. 30-60cm. Toppen 5-15cm med opret-udstående grene. IV-VI. Sj.

V. ligustica (All.) Link Udspærret væselhale. 20-40cm. Modne top-grene ofte hængende. IV-VI. Alm.

V. ciliata (Danth.) Link Randhåret væselhale. 3-45cm. Ofte med blade lige til toppen. IV-VI. Alm.

V. myuros (L.) Gmelin Stor væselhale. IV-VI. Alm.

Vulpia bromoides (L.) S.F.Gray Langstakket væselhale. IV-V. Sj.

V. muralis (Kunth) Nees IV-V. Sj.

V. fasciculata (Forsskal) Samp. Strandvæselhale. Sandstrand. IV-VI. Lokalt alm.

V. membranacea (L.) Dum. Angivet fra Korsika i Fl.Eur.

Nardurus maritimus (L.) Murb. (Vulpia unilateralis (L.) Stace). 5-25cm. Enårig. Akset ensidigt. Småaksene bredere foroven end på midten, oftest med kort stak. Yderavnerne uens og meget spidse. V-VI. Sj.

N. halleri (Viv.) Fiori (Micropyrum tenellum (L.) Link). 5-25cm. Enårig, ofte violetanløben. Akset tydeligt toradet, 1-20cm, stift. Yderavnerne ret ens, butte. Inderavnerne med eller uden stak. V-VI. Sj.

Catapodium. Stivgræs. Enårige.

1. Småaksene 2-4½mm brede, med tætstillede, taglagte inderavner 2.
" 1-1½mm " " noget adskilte inderavner 4.
2. Bladene 1-2mm brede. Blomsterstanden ofte ugrenet 3.
" 3-6mm " " oftest grenet tuberosum
3. Småakset med 5-11 blomster. Topaksen buget marinum
" 11-20 " " ofte ret siculum
4. Toppen tæt med korte grene med småaks omtrent fra grunden
rigidum

Toppen åben. De nedre grene kun med småaks i øvre halvdel hemipoa%

Catapodium marinum (L.) Hubbard Liggende stivgræs. (Desmazeria ma-rina (L.) Druce). 5-15cm. Glat enårig med halvt liggende stængler. Akset toradet, indtager ofte over halvdelen af stænglen. III-V. Alm

C. siculum (Jacq.) Link Skælgræs. (Desmazeria s. Dumort). 5-25cm. Småaksene ægformede. Avnerne stærkt kølede. Kystnær. III-IV. Sar-dinien. Lokalt alm.

C. tuberosum Moris Knudeavne. (Castellia t. Bor). 15-80cm. Op-ret eller opstigende, m.m. lilla. Blomsterstandens eventuelle side-grene m.m. udstående. Inderavnen tæt fintknudret. IV-V. Sardinien. Sj.

C. rigidum (L.) Hubbard Bregnegræs. (Desmazeria r. Tutin). 5-30cm. Stråene opstigende. Skedehinden 2mm. Toppen sammentrængt, ofte m.m. ensidig, til sidst med udstående grene. IV-VII. Alm.

Cutandia maritima (L.) Richter Strandstivgræs. 10-35cm. Nedliggen-de til opret enårig. Svingelagtige småaks i en stivgrenet, ofte udspærret top. Skedehinden 3-4mm. Yderavnerne 5-6mm, med 3-5 ribber. Sandstrand. IV-VI. Lokalt alm.

C. divaricata (Desf.) Benth Udspærret stivgræs. 10-35cm. Som fo-regående, men skedehinden 1-2mm; yderavnerne 3-4mm med 1 ribbe. Mest på sandstrand. 0-500m. IV-V. Sardinien. Sj.

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb. Kilefodsgræs. 5-25cm. Spinkel, trådbladet, opret enårig med ægformet, tyndgrenet top. Blomster-stilkene fine, ofte parvise, gradvist fortykkede opad, ca.2-4mm. Længs kysten. IV-V. Sardinien. Lokalt alm.

Vulpiella tenuis (Tineo) Kerg. Violet væselhale. (Vulpia incras-sata (Link) Parl. 10-30cm. Opret enårig. Toppen 2-10cm med op til 4 grene ved hvert led. Småakset 8-25mm; dets stilk af småaksets længde. Stakken af inderavnen længde. V-VI. M.sj.

Poa. Rapgræs.

1. Strået fladtrykt compressa 2.
" trindt

2. De golde skud med toradet stillede blade fontquerii 3.
3. Nedre topgrene 1-2 sammen 4.
- " " 3-8 (sjældent 2) sammen 11.
4. Stænglen med fortykket grund 5.
- " uden " " 7.
5. Bladene 2-4½mm brede. Småaksene ca. 1½ x så lange som brede alpina
- Bladene ½-2mm brede. Småaksene mindst 2 x så lange som brede 6.
6. Grundbladene grønne under blomstringen. Småaksene 2-6-blom- strede, ofte topspirende ... bulbosa
- Grundbladene visne under blomstringen. Småaksene 4-10-blom- strede, ikke topspirende carniolica
7. Nedre skedehinder korte, ½-1mm, de øvre 2mm 8.
- Både øvre og nedre skedehinder 2-3mm laxa
8. Nedre topgrene opret-udstående efter blomstringen 9.
- " " nedbøjede eller udstående efter blomstringen 10.
9. Enårig infirma
- Flerårig balbisii
10. Enårig. Småaksene ikke samlede i spidsen af topgrenene annua
- Flerårig. " samlede i spidsen af topgrenene supina
11. Skedehinden meget kort, indtil 1 mm 12.
- " over 1 mm lang 14.
12. Stængelbladene udstående. Knæene brune nemoralis
- Anderledes 13.
13. Bladene 2-3mm brede, flade eller noget rendedeformede pratensis
- " 1 mm " , trådformede angustifolia
14. Stængelbladene sammenlagte og trådformede violacea
- " flade 15.
15. Nedre topgrene 4-8 sammen trivialis
- " 3-4 " 16.
16. Med hvide, perlesnorsformede udløbere silvicola
- Tueformet, eller med grønne udløbere balbisii

Poa violacea Bell. Violet rapgræs. 20-30(-50)cm. Tættuet med op til 0,8mm brede, blågrønne blade. Skedehinden 3-7mm. Toppen 5-12cm, sammenkneben, rugnet, grønt og violet broget. Minder om en Svingel. 1500-2400m. VII-VIII. Korsika. Sj.

P. annua L. Enårigt rapgræs. I-XII. M.alm.

P. infirma Kunth Ligner foregående meget, men støvknappen 0,2-0,3 mm (0,5-1,2mm hos annua). Småaksene med 5-6 mere fjærntsidende blomster, så de virker smallere. Sandede steder. III-V. Alm.

P. supina Schrader Lavt rapgræs. Ligner annua meget, men lidt større, noget nedliggende og rodslående og lidt mere gulgrøn. 1600-2800m. VII-VIII. Korsika. Sj.

P. compressa L. Fladstrået rapgræs. VI-VIII. Alm.

P. trivialis L. Alm. rapgræs. V-IX. Sj.

P. silvicola Guss. 30-60cm. Ligner den foregående. Egeskov. V-VI. Alm.

P. pratensis L. Engrapgræs. V-IX. Alm.

P. angustifolia L. Smalbladet rapgræs. Begge øer.

P. bulbosa L. Løgrodet rapgræs. IV-VII. Alm.

P. carniolica Hladnik & Graf (P. perconcinna Edmondson). 8-15cm. Ligner foregående. Toppen kort og tæt, 1½-2½cm. Tørre skrænter. IV-VI. Sardinien: M.Linas. Sj.

P. alpina L. Fjældrapgræs. 15-30cm. Stænglen bladløs i øverste 1-2/3. Stængelbladene skedehinde 3-5mm, ofte fliget. Toppen m.m. pyramideformet. Småaksene æg-hjærteformede, ofte topspirende. Bjærgenge. V-VIII. Korsika. Sj.

Poa laxa Haenke Slapt rapgræs. 10-20cm. Tæt tuet. Bladene 1-1½mm brede. Stængelbladene med tydelig skede. Toppen tynd, sammentrængt og bøjet, med tynde og glatte grene, violetbroget. 2000-3600m. VII-VIII. Korsika. Sj.

P. nemoralis L. Lundrapgræs. V-X. Sj.

● *P. balbisii* Parl. Ligner foregående, men mindre, 15-30cm. Toppen oftest reduceret, kortgrenet og klaseagtig, violetbroget. Klipper, mellem tornebuske. 700-2700m. V-VII. Sardinien: Gennargentu. Korsika: Fra Capo Corso til Incudine. Sj.

P. fontquerii Br.-Bl. (P. cenisia All. ssp. sardoa E.Schmid). 20-50cm. Løst tueformet. Stråene med blade til over midten. Golde skuds blade toradede og blågrønne og korte. Toppen pyramideformet under blomstringen, derefter sammentrængt. Tornekrat i bjærgene. 1500-2500m. VI-VII. Korsika. Sardinien: Gennargentu. Sj.

Puccinellia convoluta (Hornem.) Hayek 30-60cm. Bladene sammenlagte, under 1 mm brede. Toppen smal, de nedre grene ofte tiltrykte. Saltsumpe. VI-VIII. Sj.

P. borreri (Balb.) Hayek (P. fasciculata (Torrey) Bicknell). 60-85cm. Bladene 2-3mm brede, flade, dog undertiden m.m. sammenlagte i sommerheden. Toppen åben eller sammenkneben. Saltsumpe. VI-VIII. Sardinien. Sj.

Dactylis glomerata L. Alm. hundegræs. V-VII. Sj.

D. hispanica Roth 20-40cm. Ligner foregående, men toppen lige bred foroven og forneden med korte grene, så den bliver duskformet. Skedehinden 4-8mm (2-5 hos glomerata). III-V. Alm.

Cynosurus. Kamgræs.

1. Blomsterstanden smal, 3-5mm bred. Småaksene uden stak 2.
- " bred, 10-20mm. Småaksene langstakkede 3.
2. Flerårig cristatus
- Enårig polybracteatus
3. Bladene 3-9 mm brede echinatus
- " 1-3 mm " elegans

Cynosurus cristatus L. Alm. kamgræs. IV-VI. Sj.

C. polybracteatus Poiret 20-80cm. Som foregående, men ofte højere. Akset tættere. De frugtbare inderavner uden brod, de golde med stivhåret køl. IV-V. Sardinien. Sj.

C. echinatus L. Pindsvinekamgræs. 20-60cm. Enårig. Toppen kortgrenet, tæt og ægformet. Frugtbare blomsters stakke 1-2 x inderavnen. V-VI. Alm.

C. elegans Desf. Grenet kamgræs. 10-60cm. Enårig. Toppen mere langgrenet og åben. Frugtbare blomsters stakke 4-5 x inderavnen. IV-VI. Alm.

Lamarckia aurea (L.) Moench Guldgræs. 7-15(-20)cm. Enårig. En løs, oftest ensidig, først lysegrøn, senere gylden top med m.m. hængende grene. Frugtbare småaks med stak; de golde med 6-9 fjærntsidende, små, butte inderavner. II-V. Alm.

Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Tæppegræs. V-VII. Sj.

Psilurus incurvus (Gouan) Sch. & Th. Slangehalegræs. 10-30cm. Stængler, blade og aks trådformede. Akset meget skørt og til sidst m.m. indrullet. Yderavnen reduceret til et skæl på højst 1mm. 1 blomst med stak af inderavnen længde. IV-V. Alm.

Briza media L. Alm. hjærtegræs. V-VIII. Sardinien. Sj.

B. maxima L. Stort hjærtegræs. 20-50cm. Enårig. Toppen med 1-12 meget store småaks, der er sølvhvide og 14-25mm lange med 5-20 blomster i. IV-VI. Alm.

Briza minor L. Lidet hjærtegræs. 15-30cm. Enårig. Skedehinden meget lang, 5-10mm (højst 1mm hos media). Toppen mangeblomstret og ret tæt. Småaksene 5-7-blomstrede, 3-4mm lange (5-6mm hos media). IV-V. Alm.

Sesleria insularis Sommier Staragtigt hovedgræs. 15-30cm. Flerårig. Stænglerne ved grunden omgivne af gamle skeder. Bladene 1½-3mm brede, blåduggede ovenpå. Akset 2½-4cm x 6-8mm. Kalkklipper. 200-1200m. V-VI. Korsika. Sardinien: Golfo Aranci, Orgosolo, Oliena. Sj.

Echinaria capitata (L.) Desf. Pindsvinegræs. 5-25cm. Enårig. Akset kuglerundt, ca. 1cm. Yderavnerne med 1 og 2 staklignende tænder, inderavnerne med 5(-7) staklignende tænder. IV-V. Sj.

Melica. Flitteraks.

1. Inderavnen langhåret. Toppen hvidulden 2.
" glat 4.
2. Inderavnen but, dens yderste tredjedel glat *bauhinii* 3.
" spids, håret til spidsen 3.
3. Toppen oftest 12-25cm, nedre grene med 10-20 småaks *magnolii* 3.
" " under 8 cm, nedre grene med 5-7 " *ciliata*
4. Yderavnerne næsten ens, den nedre hindeagtig i yderste fjerdedel *uniflora* 5.
Yderavnerne uens, den nedre halvt hindeagtig 5.
5. Stænglen 40-80cm. Skedehinden afskåret, 2½-3mm *arrecta* 5.
" 10-40cm. " spids, 4-5 mm *minuta*

Melica ciliata L. Skægflitteraks. 20-60(-100)cm. Bladene ofte sammenrullede og stive. Toppen smal og oftest ensidig, med korte, oprette grene. V-VI. Alm.

M. magnolii G. & G. 50-100cm. Ligner den foregående, men oftest kraftigere og med flade blade. Toppen mellembudt forneden. V-VIII. Alm.

M. bauhinii All. 20-50cm. Bladene ru, til sidst sammenrullede. Toppen løs, ensidig, lidet uldhåret, m.m. violet. V-VI. Korsika. Sj.

M. uniflora Retz. Enblomstret flitteraks. V-VI. Alm.

M. minuta L. Klippeflitteraks. 10-40cm. Bladene helt indrullede. IV-V. Sj.

M. arrecta Kuntze 50-80cm. Bladene 2-3mm brede, med indrullet rand og sivagtig spids. Toppen pyramideformet med udstående grene. Yderavnen med violet ryg. IV-V. Alm.

Glyceria maxima (Hartman) Holmberg Højt sødgræs. VII-VIII. Sardinien. Sj.

G. fluitans (L.) R.Br. Mannasødgræs. V-VII. Korsika. Sj.

G. plicata Fries Butblomstret sødgræs. V-VIII. Sj.

G. declinata Bréb. Tandet sødgræs. VI-VII. Korsika. Sj.

Bromus. Hejre.

1. Flerårig 2.
Enårig 3.
2. Toppen bred med hængende eller udstående grene *ramosus* 3.
" smal med oprette grene *erectus*
3. Yderavnerne 9-25mm med 1 og 3 ribber 4.
" 3½-9mm med 3-5 og 7-9 ribber 10.
4. Topgrenene m.m. hængende 5.
" m.m. oprette 6.
5. Topgrenene ru. Stænglen dunet foroven *sterilis* 6.
" dunede. Stænglen dunet foroven *tectorum*
6. Småaksene med stak 2-5cm, næsten siddende i tæt dusk 7.
" " 3-9cm, i grenet top 8.

7. Topgrenene med 1-2 småaks. Den modne stak ofte krum fasciculatus
" " 4-5 " " " lige *rubens*
8. Inderavnen 15-17mm med en stak på 20-25mm *madritensis* 9.
" 20-30mm " " " 25-75mm
9. Nedre topgrene 1-3 sammen, 1-3cm lange *rigidus* 9.
" " 3-6 " , indtil 8 cm lange *diandrus*
10. Nedre skeder stivhårede 11.
" " blødhårede 12.
11. Inderavnen 9mm, med afrundet kant *secalinus* 12.
" 9-12mm, dens kant danner en vinkel *commutatus*
12. Toppen duskformet med grene på højst 5-8mm 13.
" bredere, de nedre grene 1-flere cm 14.
13. Stakken højst af inderavns længde *scoparius* 14.
" længere end inderavnen *alopecuroides*
14. Bladskederne med korte, 0,4-0,7mm, ofte tiltrykte hår *intermedius* 15.
Bladskederne med 1-1½mm lange hår 15.
15. Inderavnen 12-14 mm *lanceolatus* 16.
" kortere 16.
16. Stakken affaldet forneden, m.m. bøjet i frugt *molliformis* 16.
" trind forneden, m.m. ret i frugt *hordeaceus*

Bromus erectus Hudson Opret hejre. V-VII. Sj.

B. ramosus Hudson Sildig skovhejre. V-VII. Sj.

B. rubens L. Rød hejre. 10-30cm. Bladene og stænglens øvre del dunede. Toppen rødlig. Inderavnen 14-15mm med en stak på 1½-2cm. IV-V. Sj.

B. fasciculatus Presl Duskhejre. 5-20cm. Som foregående, men mindre, med kortere top. Inderavnen 11-12mm med en stak på 1-1½cm. III-V. Sj.

B. tectorum L. Taghejre. IV-VI. Alm.

B. sterilis L. Gold hejre. IV-VI. Alm.

B. madritensis L. Spansk hejre. 10-50cm. Stråene oftest glatte. Bladene langt blødhårede. III-IV. Alm.

B. rigidus Roth Stivtoppet hejre. 20-40cm. Toppen 15-20cm, tæt og opret. Småaksene med stak 5-8cm, heraf en stak på 3-5cm. IV-VI. Alm. 2 underarter:

ssp. rigidus: Topgrenene ru, de nedre enlige. Bladene slappe.
ssp. ambigens (Jordan) Pign.: Topgrenene dunede, de nedre 2-3 sammen. Bladene lidt stive i det.

B. diandrus Roth Storakset hejre. (B. gussonei Parl.). 30-95cm. Toppen op til 25cm, meget åben, nikkende. Grenene meget ru, oftest kun med 1 småaks. Stakken 3½-6½cm. IV-V. Alm.

B. scoparius L. Kosthejre. 10-30cm. Knæene ofte mørke. Toppen ægformet, 3-5cm. Småaksene 10-20mm. Stakken 7-9mm, udstående og knæbøjet. IV-VI. Sardinien. Sj.

B. alopecuroides Poiret Røvehalehejre. (B. alopecuros Poir.). 20-40cm. Som foregående, men større. Småaksene 20-25mm. Stakken 15-18mm. Toppen 6-10cm, lancetformet. IV-VI. Sardinien. Alm.

B. lanceolatus Roth 30-70cm. Toppen 10-20cm. De nedre grene forlængede, 2-4cm, men stive og oprette. Småaksene 2½-4½cm. Stakken knæbøjet, indtil 15mm. IV-VI. Sardinien. Alm.

B. intermedius Guss. 10-60cm. Knæene ofte sorte. Toppen 5-10cm, løs. Småaksene 14-18mm. Stakken af inderavns længde, knæbøjet. V-VI. Alm.

B. hordeaceus L. Blød hejre. V-VII. Alm.

Bromus molliformis Lloyd 15-25cm. Øvre skeder ofte lidt opblåste. Toppen fåakset. Inderavnen 7-8mm (9-10 hos hordaceus). IV-VI. Alm.

B. commutatus Schrader Mangeblomstret hejre. 30-70cm. Toppen 5-25cm, med ru grøne, løs. Grenene indtil 6cm. V-VI. Korsika. Sj.

B. secalinus L. Rughejre. 30-90cm. Toppen løs, ofte ensidig, 5-20 cm. Småaksene 1½-2cm, blomsterne først taglagte, senere udstående. De indrullede inderavner afslører småksets skaft. Kornmarker. V-VI. Korsika. Alm.

Brachypodium. Stilkaks.

1. Enårig distachyum
Flerårig 2.
2. Stakken lig eller længere end inderavnen. Tueformet silvaticum
" højst ½ x inderavnen. Med udløbere 3.
3. Bladene flade, i det mindste forneden, uden fremtrædende
ribber på oversiden 4.
4. Bladene indrullede, med fremtrædende ribber på oversiden 5.
4. Bladene helt flade, grønne pinnatum
" indrullede mod spidsen, noget blågrønne rupestre
5. Bladene spredte. Akset med 4-8 småaks phoenicoides
" toradede. Akset med 1-5 småaks ramosum

Brachypodium silvaticum (Hudson) Beauv. Skovstilkaks. VI-VIII. Alm.

B. pinnatum (L.) Beauv. Bakkestilkaks. 40-70cm. Småaksene 18-40mm, oftest rette. Inderavnen ofte noget korthåret. Stakken 1-6mm. V-VII. Alm.

B. rupestre (Host) R. & S. Seglstilkaks. Småaksene 30-50mm, oftest noget seglkrummede. Stakken højst 3mm. V-VII. Korsika. Sj.

B. phoenicoides (L.) R. & S. 50-80(-100)cm. IV-VI. Korsika. Sj.

B. ramosum (L.) R. & S. Toradet stilkaks. (B. retusum (Pers.) Beauv.). 20-40cm. Bladene tydeligt toradet stillede, især på de gølge skud. Småaksene 2-3cm. IV-VI. Alm.

B. distachyum (L.) Beauv. 2-15(-45)cm. Bladene glatte eller svagt hårede. Akset reduceret til (1)2(5) småaks på 2-3mm. Stakken 7-15 mm. IV-VI. Alm.

Agropyron. Kvik.

1. Tueformet 2.
Med udløbere 4.
2. Med stak caninum
Uden stak 3.
3. Yderavnerne med 5-11 ribber. Småaksene med 5-9 blomster
elongatum
Yderavnerne med 3-5 ribber. Småaksene med 3-5 blomster
corsicum
4. Småaksene på samme side ikke overlappende junceum
" " " overlappende 5.
5. Bladene stikkende pycnanthum
" ikke stikkende repens

Agropyron caninum (L.) Beauv. Hundekvik. V-VII. Sj.

A. elongatum (Host) Beauv. 60-90cm. Tæt tuet og blågrøn. Aksets akse næsten flad ud for småaksene. Bladene ru, indrullede i frugt, læderagtige. Akset 10-25cm. Nær kysten. VI-VIII. Sj.

② A. corsicum (Hackel) Contandr. 50-100cm. Ligner foregående, men bladene med håret overside. Stænglerne ofte med opsvulmet grund. Stenede skrænter. 100-1300m. Korsika. Sj.

A. junceum (L.) Beauv. Strandkvik. (Elymus farctus (Viv.) Runem.) IV-VI. Sj.

A. repens (L.) Beauv. Alm. kvik. V-VII. Alm.

Agropyron pycnanthum (Godron) G. & G. Stiv kvik. (A. pungens (Pers. R. & S.). 70-110cm. Akset 6-12cm, bredt og tæt og m.m. firkan- tet. V-VI. Mest nær kysten. Alm.

Aegilops. Bukkekorn. Enårig.

1. Akset m.m. ægformet, 1-3 cm langt uden stakkene 2.
" forlænget, indtil 10 cm 3.
2. Yderavnen med 4-5 stakke geniculata
" " 2-3 " neglecta
3. Yderavnen med 1-3 1-flere cm lange stakke triuncialis
" " en brod på 1-få mm (undtagen i topsmåakset) ventricosa

Aegilops geniculata Roth Alm. bukketkorn. 10-30cm. Akset 1-2 cm med 1 goldt småaks forneden og 2-5 frugtbare med 3-6 blomster. Stakkene ru forneden. V-VI. Alm.

A. neglecta Req. Goldt bukketkorn. 10-30cm. Akset 3cm, brat ind- snævret foroven, idet de 2 øverste småaks er gølge. 3-4 frugtbare småaks. Stakkene glatte. V-VII. Sj.

A. ventricosa Tausch Perlebukkekorn. 20-40cm. Akset 4-10cm, perle- snorsformet. 1-2 gølge småaks forneden og 3-7(-10) frugtbare. Yder- avnerne med 2 tænder, hvoraf den ene er forlænget til en brod. In- deravnen oftest med 1 stak. V-VI. Sardinien. Sj.

A. triuncialis L. Trestakket bukketkorn. 20-45cm. Akset 3-6cm uden stakkene, med 1-2 gølge småaks forneden og 3-6 frugtbare. Inderav- nen med 3 lange tænder eller stakke. V-VI. Sardinien. Sj.

Dasypyrum villosum (L.) Candargy Børsterug. 20-60cm. Enårig. Akset 6-10cm. Yderavnen med en stak på 25-32mm og to fremtrædende køle, der er besatte med bundter af korte børster. Inderavnen med en stak på 35-41mm og noget randhåret. IV-VI. Alm.

Hordeum. Byg.

1. Flerårig secalinum
Enårig 2.
2. Småaks + stak 2 cm. Yderavnen uden randhår 3.
" " " 3-4cm. " randhåret på midtersmåakset 4.
3. Sidesmåaksenes yderavner uens, en bred og en smal marinum
" " ens, begge smalle hystrix
4. Sidesmåaksene ikke længere end midtersmåakset murinum
" længere end midtersmåakset leporinum

Hordeum secalinum Schreber Engbyg. 15-70cm. Akset 2-5cm. Midter- småakset siddende, sidesmåaksene med en stilk op til 1½mm. V-VII. Korsika. Sj.

H. marinum Hudson Strandbyg. (H. maritimum With.) 5-30cm. Akset aflangt og tilsmalnet opad. Mest på sandstrand. Også på udyrkede steder. IV-V. Alm.

H. hystrix Roth 5-30cm. IV-V. Korsika. M.sj.

H. murinum L. Gold byg. IV-X. Alm.

H. leporinum Link 30-60cm. Ligner foregående meget. Sidesmåakse- nes indre yderavne randhåret på begge sider (hos murinum kun på den ene side). IV-X. Alm.

Hordelymus europaeus (L.) C.O. Harz Skovbyg. V-VI. Korsika. Sj.

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski Tveblomstret byg. 10-40cm. Enårig. Bladene trådformede, 0,2-0,6mm brede. Akset ca. 4cm med stakke på 5-12cm. Yderavnerne sylformede, sammenvoksede ved grun- den. IV-VI. Sardinien som ssp. crinitus (Schreber) Pign. Sj.

Avena. Havre

1. Inderavnen ender i 2 4-6mm lange spidser barbata
 " " i 2 tænder 2.
 2. Toppen alsidig. Småakset 18-25 mm fatua
 " ensidig. " 25-45 mm sterilis

Avena barbata Pott Skæghavre. 30-100 cm. Inderavnen oftest hvidgult ladden. Småakset 18-30mm. IV-VI. M.alm.

A. fatua L. Flyvehavre. 20-100cm. Inderavnen glat eller håret forneden med rustbrune eller lyse hår. Stakken 2½-4cm. IV-VI. Alm.

A. sterilis L. Gold havre. 50-120cm. Inderavnen rusthåret i nærste halvdel. Stakken 3-9cm. IV-VI. Alm.

Arrhenatherum elatius (L.) Presl Draphavre. V-VII. Sj.

Gaudinia fragilis (L.) Beauv. Akshavre. 30-60(-100)cm. Enårig med m.m. lādne blade. Akset ganske langt, op til 35cm. Småaksene 10-12mm med 3-4 blomster. IV-VI. Alm.

Ventenata dubia (Leers) Coss. Bunkehavre. 15-70cm. Enårig. Toppen bred og løs med m.m.kransstillede grene. Småaksene med 2-3 blomster, 10-15mm lange. Inderavnen med knæbøjstak. V-VI. Sardinien. Sj.

Koeleria splendens Presl Skinnende kambunke. 20-45cm. Tættuet. Strået med blivende skeder ved grunden og derfor fortykket. Blade ne blågrønne, 3-5cm x 1-2mm. Toppen cylindrisk, 4-6cm, sølvskinnende. V-VIII. Alm.

Lophochloa.

1. Yderavnerne lige store, af småaksets længde pubescens
 " uens, kortere end småakset 2.
 2. Toppen ægformet. Nedre stakke 3-5 mm hispida
 " aflang. Nedre stakke 1-3 mm cristata

Lophochloa pubescens (Lam.) Scholz 10-40cm. Toppen aflang, 5-12 x ½ cm. Yderavnerne randhårede på kølen. Sandstrand. IV-V. Alm.

L. cristata (L.) Hyl. Enårig kambunke. 5-20(-60)cm. Toppen 1-12x ½-lcm. Yderavnerne glatte eller dunedede. IV-VII. Alm.

L. hispida (Savi) Pign. 5-30cm. Toppen 3-5cm. Yderavnerne glatte med ru køl. IV-VI. Sardinien. Sj.

Trisetum. Guldhavre.

1. Flerårig 2.
 Enårig 4.
 2. 2-15 cm. Tæt tueformet 3.
 25-80cm. Løst tueformet flavescens
 3. Inderavnen håret langs ryggen i det mindste i den nederste halvdel gracile
 Inderavnen kun håret forneden conradiae
 4. Toppen duskformet panicum
 " åben og pyramideformet parviflorum

• Trisetum gracile (Moris) Boiss. 8-15cm. Grundbladene ½-3cm lange, stive og krumme, grågrønne som unge. Toppen ægformet, ret tæt, 2-3 x 1cm, violetbroget. 1100-1800m. VI. Sardinien: Gennargentu, Limbara. Sj.

• T. conradiae Gamisans 3-7cm. Som foregående, men toppen mindre, 7-13x4-8mm. 2050m. VII. Korsika. Incudine. M.sj.

T. flavescens (L.) Beauv. Guldhavre. V-VIII. Sj.

T. panicum (Lam.) Maire 20-45cm. Bladene lādne. Toppen 4-10cm, ofte lappet, m.m. gullig. Småaksene med 4-6 blomster med knæbøjstak. V-VI. Alm. Sandede steder.

Trisetum parviflorum (Desf.) Pers. 20-50cm. Bladene m.m. lādne. Toppen 4-15cm. Småaksene toblomstrede, 2-2½mm med en stak på 3-4 mm. Kornmarker. V-VI. Sardinien. Alm.

Lagurus ovatus L. Harehale. 8-50cm. Enårig. Bladene blødhårede. Toppen ægformet med 1-blomstrede småaks med lādne yderavner, der får toppen til at virke meget blødhåret. Inderavnen med 2 ende-stillede børster på 2-6mm og en stak på 8-20mm. III-V. Alm.

Deschampsia flexuosa (L.) Parl. Bølget bunke. VI-VIII. Korsika. Sj.

Aira. Dværgbunke.

1. Stilkene 1-2 x småaksene 2.
 " 2-8 x " 3.
 2. Yderavnerne spidse caryophyllea
 " m.m. butte cupaniana
 3. Stilkene 5-8 x småakset. Ingen stak tenorei
 " 2-5 x " Med stak 4.
 4. Yderavnen 1½-2 mm. Stilken 4-5 x så lang elegans
 " 2-2½ mm. " 2-3 x så lang cupaniana
 " 3-3½ mm. " 2-4 x så lang provincialis

Aira caryophyllea L. Udspærret dværgbunke. IV-V. 2 underarter:
ssp. caryophyllea: Oftest 5-20cm. Topgrenene m.m. udstående. Yderavnen 2½-3mm. Alm.
ssp. multiculmis (Dum.) Hegi: Oftest 20-50cm. Topgrenene oprette. Yderavner 2-2½mm. Sj.

A. cupaniana Guss. 5-30cm. Som foregående, men stilkene brat fortykkede under småakset. Inderavnen ½-2/3 x yderavnen (¾ hos car.). IV-V. Sj.

A. provincialis Jordan 10-40cm. Som de foregående, men skedehinden 2mm (5 hos car.). Småakset kun med 1 stak. V-VI. Korsika: M. Fosco, S.Florent. M.sj.

A. tenorei Guss. 10-40cm. Bladene meget ru. Topgrenene udvidede under småaksene. IV-V. Korsika. Sj.

A. elegans Willd. Hårdværgbunke. (A. elegantissima Schur). 10-30 cm. Stilkene brat udvidede under småaksene. Stakken 2 x småakset. V-VI. Alm.

Molinierella minuta (L.) Rouy Violet dværgbunke. 5-20cm. Som Aira, men yderavnerne kortere end småakset. Ingen stak, eller med en kort stak fra midten af inderavnen. Toppen ofte violetanløben. III-IV. Sj.

Antinoria agrostidea (DC.) Parl. 10-35cm. Enårig. Som Aira, men den øverste blomst tydeligt stilket. Inderavnen afskåret, svagt 3-tandet og uden stak. Fugtige steder. VI-VII. Sj. som var. insularis (Parl.) Maire

Anthoxanthum. Gulaks.

1. Flerårig odoratum
 Enårig 2.
 2. Småaksene 10-12 mm gracile
 " 6-8 mm 3.
 3. Toppen ægformet og tæt ovatum
 " forlænget og løs aristatum

Anthoxanthum odoratum L. Alm. gulaks. IV-VIII. Alm.

A. ovatum Lag. Eggegulaks. 10-40cm. Bladene ca. 5mm brede, m.m. hårede. Øvre golde blomsts stak rager ikke ud. V-VI. Sardinien. Sj.

A. aristatum Boiss. Enårigt gulaks. 10-40cm. Bladene ca. 3mm brede. Øvre golde blomsts stak rager oftest ud. V-VI. Sardinien. Sj.

Anthoxanthum gracile Biv. Stakgulaks. 10-30cm. Toppen åben og få-blomstret. De 2 gølge blomster med stakke på 1 og 2 cm. IV-V. Sardinien. Sj.

Holcus lanatus L. Fløjlsgræs. V-VII. Sj.

H. mollis L. Krybende hestegræs. V-VII. Korsika. Sj.

Corynephorus. Sandskæg.

1. Flerårig canescens 2.
Enårig
2. Stakken af yderavnens længde, svagt fortykket ... fasciculatus
" kortere end yderavnen, stærkt fortykket divaricatus

Corynephorus canescens (L.) Beauv. Alm. sandskæg. V-VI. Sj.

C. divaricatus (Pourret) Breistr. Enårigt sandskæg. 5-50cm. Glat, ikke blågrøn enårig. Bladene ru og indrullede, skederne ofte purpurfarvede. Knæene sorte. Skedehinden indtil 8mm. Småaksene 3½-4 mm. IV-VI. Sj.

C. fasciculatus Boiss. & Reuter Ligner den foregående. Småakset 3mm. IV-VI. Sj.

Avellinia michelii (Savi) Parl. Svingelbunke. 10-25cm. Enårig. Toppen 2-7cm, tæt og hvidliggrøn. Småaksene 3-5mm. Nedre yderavne ¼ x den øvre, sylformet. Inderavnerne med en kort stak fra spidsen. Sandede steder, især nær kysten. IV-VI. Sj.

Agrostis. Hvene.

1. Enårig pourretii 2.
Flerårig
2. 5-12 cm høj. Alle blade indrullede rupestris 3.
Højere. Nogle blade flade
3. Med stak canina 4.
Stak mangler eller skjult i småakset
4. Toppen åben hele tiden. Ingen udløbere capillaris 5.
" sammenkneben hele tiden eller efter blomstringen
5. Toppen meget tæt, ligner en lappet dusk Polypogon viridis 6.
" sammenkneben efter blomstringen, ellers åben
6. De fleste topgrene 2-3 x delte, uden småaks i nedre halvdel
castellana
De fleste topgrene 1-2 x delte, med småaks i nedre halvdel
stolonifera

Agrostis pourretii Willd. Bleg hvene. (A. salmantica (Lag.) Kunth). 10-40cm. Toppen oftest sammenkneben efter blomstringen, bleggrøn. Stakken 3-4mm. Fugtige steder. IV-VI. Sj.

A. rupestris All. Klippehvene. Toppen brunlilla. Stakken grundstillet, 2-2½mm. 1700-2800m. VII-VIII. Korsika. Sj.

A. canina L. Hundehvene. VI-VII. Korsika. Sj.

A. stolonifera L. Krybhvene. V-VIII. Alm.

A. castellana Boiss. & Reuter 30-60cm. V-VI. Korsika. Sj.

A. capillaris L. Alm. hvene. (A. tenuis Sibth.) VI-VIII. Korsika. Sj.

Gastridium ventricosum (Gouan) Sch. & Th. Gniddergræs. 10-40cm. Enårig med tæt og lappet top, let kendelig ved yderavnernes hvidlige knude forneden. Småaksene enblomstrede, 3-4mm. Yderavnerne brodspidsede, 1/3 forskellige i længde, glatte med ru køl. V-VII. Sj.

G. scabrum Presl Som den foregående, men toppen tættere, ikke lappet. Yderavnerne ru, ikke brodspidsede og 1/5 forskellige. III-V. Sardinien. Sj.

Polypogon. Skægaks.

1. Blomsterne uden stak viridis 2.
Yderavnen med stak
2. Flerårig. Stakken lig eller kortere end yderavnen .. litoralis 3.
Enårig. Stakken længere end yderavnen
3. Yderavnen svagt tvetandet. Inderavnen med stak monspeliensis 4.
" tvelappet for ¼-1/3. Inderavnen uden stak
4. Inderavnstilken (callus) så lang som bred maritimus
Inderavnstilken 3-4 x så lang som bred subspathaceus

Polypogon viridis (Gouan) Beristr. Duskhvene. 20-80cm. Stænglerne nedliggende og rødslående forneden. Minder om en Krybhvene. Men toppen ganske tæt, ligner en lappet dusk. Fugtige steder. III-V. Alm.

P. litoralis (With.) Sm. 20-40cm. Melleform mellem den foregående og efterfølgende art og måske en krydsning. Toppen grålig eller violet, cylindrisk og lappet, indtil 9x1½cm. Fugtige steder ved kysten. III-V. Sardinien. M.sj.

P. monspeliensis (L.) Desf. Skægaks. 10-40cm. Toppen tæt, duskformet, halvt cylindrisk til svagt lappet, silkeagtigt gulgrøn. Småakset 2mm. Yderavnens stak 5-7mm. Skedehinden 5-10mm, spids. Fugtig jord. III-V. Alm.

P. maritimus Willd. 10-30cm. Toppen halvt cylindrisk, tæt. Skedehinden 5-6mm. Fugtig jord langs kysten. III-V. Alm.

P. subspathaceus Req. 20-40cm. III-V. Fugtig jord nær kysten. III-V. Sj.

Ammophila arenaria (L.) Link Hjælme. IV-V. Lokalt alm. som ssp. arundinacea H.Lindb.f. (A. littoralis (Beauv.) Rothm.).

Calamagrostis varia (Schrader) Host Pigrørhvene. 80-120cm. Blade- ne flade, 6-8mm brede, ofte rødligt anløbne. Toppen sammenkneben. Yderavnerne 5-6mm, hårene halvt så lange. Stakken rager 1 mm frem. VI-VIII. Korsika. Sj. som ssp. corsica (Hackel) Rouy.

C. epigejos (L.) Roth Bjærgørhvene. VI-VII. Sj.

Phleum. Rottehalet.

1. Enårig 2.
Flerårig 4.
2. Yderavnerne m.m. jævnt tilspidsede 3.
" brat afskarne i spidsen paniculatum
3. Toppen cylindrisk. Yderavnen med ru køl subulatum
" smalt ægformet. Yderavnen randhåret sardoum
4. Toppen tydeligt lappet, når den bøjes phleoides
" ikke lappet, når den bøjes 5.
5. Toppen ægformet, 2-4 x så lang som bred, violet alpinum
" cylindrisk, 4-10 x så lang som bred, grågrøn 6.
6. Yderavnen 2½-3mm, brodden 1-2mm pratense
" 2mm, brodden ½-1mm. Stængelgrunden løgformet bertolonii

● Phleum sardoum (Hackel) Hackel 1-3 cm. Toppen 3-5cm x 4-7mm, bleggrøn. Yderavnens køl randhåret i øverste halvdel. Klitter. V. Sardinien: Santa Teresa di Gallura ved Arena Majori (gl. fund), Arbus på Costa Verde. M.sj.

P. subulatum (Savi) Asch. & Gr. Tynd rottehalet. 10-40cm. Toppen 0,8-1,1cm x 2-7mm, bleggrøn. Yderavnen bådformet, ca. 3mm. V-VI. Korsika. Sj.

P. phleoides (L.) Karsten Glat rottehalet. V-VII. Korsika. Sj.

Phleum paniculatum Hudson Stenrottehale. 10-30cm. Toppen smalt cylindrisk, 5-10cm x 6mm, bleggrøn. Yderavnerne 2-2½mm, med en kort brod. V-VI. Sj.

P. pratense L. Engrottehale. IV-IX. Sj.

P. bertolonii DC. Knoldrottehale. IV-X. Alm.

P. alpinum L. Fjældrottehale. 10-50cm. Toppen 2-4x1cm. Yderavnen 3-3½mm med langt randhåret køl og en stak på 1½-3mm. Bjærgenge. VI-VIII. Korsika. Sj.

Alopecurus. Rævehale.

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1. Toppen ægformet | | utriculatus |
| " cylindrisk | | 2. |
| 2. Enårig | | myosuroides |
| Flerårig | | 3. |
| 3. Strået opret | | 4. |
| " liggende og rodslående forneden | | geniculatus |
| 4. Strået 10-80cm, med en knold ved grunden | | bulbosus |
| " 20-100cm, uden " " " | | pratensis |

Alopecurus utriculatus (L.) Pers. Kølrævehale. (A. rendlei Eig.) 10-60cm. Yderavnerne ¼-1/3 sammenvoksede, kølen med et brat knæk på midten, randhåret i nederste halvdel. Fugtige enge. IV-VI. Sardinien. Alm.

A. geniculatus L. Knæbøjjet rævehale. V-VII. Sardinien: Limbara.

A. bulbosus Gouan Knoldrævehale. Strået ved grunden omgivet af rustbrune skeder. Bladene meget smalle, 1-2mm. Dusken meget tynde, 2-3mm, 2-6cm lang. Støvknapperne violette. III-VII. Fugtige steder. Sj.

A. pratensis L. Engrævehale. IV-VI. Sj.

A. myosuroides Hudson Agerrævehale. IV-VI. Korsika. Sj.

Parapholis strigosa (Dum.) Hubbard Spidshale. V-VI. Sj.

P. incurva (L.) Hubbard Krum spidshale. 5-15cm. Afviger fra foregående art ved, at inderavnen er 3/5 af yderavnen (lig den hos str.). Mere nedliggende til opstigende med krumme aks (rette hos str.). IV-VI. Lokalt alm. langs kysten.

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter Lang spidshale. 5-30cm. Opret til opstigende enårig med et 5-15cm langt, cylindrisk, stift aks. Oftest på saltholdig jord. 0-300m. V-VI. Sj.

Phalaris. Glansfrø.

- | | |
|--|---------------|
| 1. 70-150cm høj flerårig med lappet og ofte åben top | arundinacea |
| Tæt dusk | 2. |
| 2. Flerårig | 3. |
| Enårig | 4. |
| 3. Yderavnnens køl tandet foroven | coerulescens |
| " " helrandet | bulbosa |
| 4. Yderavnen med stak og en tand nær spidsen | paradoxa |
| " uden stak | 5. |
| 5. Toppen nærmest cylindrisk. Yderavnnens køl tandet | minor |
| " ægformet. Yderavnnens køl helrandet | 6. |
| 6. De gølge inderavner mindst ½ x de frugtbare | canariensis |
| " " " højst 1/5 x de frugtbare | brachystachys |

Phalaris arundinacea L. Røgræs. V-VII. Sj.

P. coerulescens Desf. Violet glansfrø. 70-120cm. Stængelgrunden knoldformet. Toppen ofte violetanløben, 6-12cm, aflang-cylindrisk. IV-V. Sj.

P. bulbosa L. Knoldglansfrø. (P. aquatica L.) 50-150cm. Stængelgrunden ofte knoldformet. Toppen aflang cylindrisk. IV-VI. Sj.

Phalaris paradoxa L. Stakglansfrø. 25-65cm. Toppen ofte dækket af den øverste bladskele forneden og ofte violetbroget. Småaksene i grupper på 5-7, hvoraf kun 1 er frugtbar, resten gølge. IV-V. Alm.

P. minor Retz. Lidet glansfrø. 10-60cm. V-VI. Sj.

P. canariensis L. Kanariegræs. IV-VI. Alm.

P. brachystachys Link IV-VI. Alm.

Milium effusum L. Miliegræs. V-VIII. Korsika. Sj.

M. vernale Bieb. Vårmiliegræs. 10-50cm. Opret enårig. Bladene ru og glatte. Skederne ru, ofte purpurfarvede og bredt hindekantede. Toppen 1½-8cm med opret-udstående grene. Fugtige skove, hegn. IV-VI. Sj.

Oryzopsis. Rishirse.

O. miliacea (L.) Asch& Schweinf. Alm. rishirse. 50-120cm. Toppen stor, åben og mangeblomstret, op til 30cm. Yderavnerne 3-3½mm, hindeagtige. Inderavnen med en 3-5mm lang stak. IV-IX. Alm.

O. thomasi Duby En form af foregående med de nedre topgrene i kranse på 20-60 og næsten alle gølge. Sj.

O. coerulescens (Desf.) Richter Blå rishirse. 30-70cm. Bladene tynde og ofte indrullede. Toppen stor- og fåblomstret med ofte bølgede grene. Yderavnerne 6-8mm, grønt og blåligt brogede. Stakken indesluttet, 3mm lang. Kalkholdig jord. IV-V. Sj.

Stipa. Stakgræs.

- | | | |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. Stakken 12-16mm | | bromoides |
| " 5-11 cm | | 2. |
| 2. Enårig | | capensis |
| Flerårig | | offneri |

Stipa bromoides (L.) Dörfl. Ret stakgræs. 60-100cm. Flerårig. Bladene indrullede, under 1mm brede. Toppen linjeformet, 15-30cm. Yderavner 8-9mm, inderavnen 6-7mm, lådden forneden. V-VI. Alm.

S. capensis Thunb. Snoet stakgræs. 10-30(-80)cm. Toppen 3-10cm, tæt. Yderavnerne 12-16mm. Stakken 5-10cm, stærkt snoet i sin nederste del. IV-V. Alm.

S. offneri Breistr. Sivstakgræs. 40-100cm. Bladene indrullede, ½ mm brede. Yderavnen 2-3cm. Stakken 9-11cm, snoet forneden. V-VI. Sardinien. M.sj.

Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) Dur.& Schinz Vingræs. Op til 1m brede tuer. Bladene op til 1m x 7mm, rukantede. Stråene 1-2m med en top på 30-40cm. Småaksene 10-15mm, nærmest svingelagtige, gulgrønne til purpuranløbene. IV-VI. Sj. til M.sj.

Arundo donax L. Kæmperør. 2-5m. Strået 1-2cm tykt og bambusagtigt. Bladene 1-8cm brede. Toppen 30-60cm. Småaksene mindst 12mm, oftest med 3 blomster. Inderavnen med kløvet spids. VII-XI. Alm.

A. plinii Turra Strandør. 1-2m. Strået 3-7mm tykt. Bladene 1(2) cm brede. Småaksene ikke over 10mm, med 1-2 blomster. Inderavnen ikke kløvet. VII-X. Korsika. Alm.

Phragmites australis (Cav.) Trin. Tagrør. VI-X. Alm.

Molinia caerulea (L.) Moench Blåtop. VII-IX. Korsika. Sj.

Nardus stricta L. Kattesøg. VI-VIII. Korsika. Sj.

Lygeum spartum L. Espartogræs. 20-30cm. Bladene 1½mm brede, indrullede og stive. Blomsterskeden 3-4cm, ægformet og spids. Småakset med 2 blomster, med langhåret grund. Lerkliner. III-V. Sardinien. Sj.

Aeluropus litoralis (Gouan) Parl. Kattefodsgræs. 10-25cm. Lange, nedliggende, grenede og sjældent rodslående stængler med stive og udstående, ret korte blade. Dusken en tosidet klase af m.m. sidende aks med toradet stillede småaks, 2½-5cm lang, smalt ægformet og lappet. Strandsumpe. VI-VIII. Korsika. Sj.

Eragrostis. Kærlighedsgræs. Enårig med smalle og langagtige småaks. Yderavnerne så store som de taglagte inderavner.

E. pilosa (L.) Beauv. Slørkærlighedsgræs. 10-30cm. Småaksene 4-5 xl-1½mm. Nedre topgrene ofte 4-5 i krans. VI-IX. Sardinien. Sj.

E. megastachya (Koeler) Link Stort kærlighedsgræs. (E. cilianensis (All.) Hubb.) 10-40(-60)cm. Nedre topgrene ofte enlige. Småaksene 8-12x2-3mm, med 15-20 blomster. Bladskederne glatte. III-X. Alm.

E. minor Host Lidet kærlighedsgræs. 10-20(-40)cm. Nedre topgrene 1-2 sammen. Småaksene 6-8x2-3mm med 8-15(-20) blomster. Bladskederne blødhårede. VI-X. Korsika. Alm.

Sporobolus pungens (Schreber) Kunth Ribbensgræs. 20-50cm. Jordstænglen langt krybende i sandet. Golde skud med faste, indrullede toradede blade. Toppen 3-6cm, gråviolet, stærktgrenet, tæt og sammentrængt. Klitter. VII-VIII. Lokalt. Alm.

Crypsis aculeata (L.) Aiton Hovedsumpaks. 3-15cm. Enårig med m.m. oppustede skeder og blågrønne blade. Dusken pudeformet, bredere end lang, 1½ cm bred, med et svøb af 2(-4) udstående, stive blade med en noget tornagtig spids. Våde klitlavninger. VII-IX. Sj.

C. schoenoides (L.) Lam. Ægformet sumpaks. 5-25cm. Som foregående, men dusken 2-4 x så lang som bred, ægformet og meget tæt. Fugtige steder, især nær kysten. VII-X. Sj.

C. alopecuroides (Pill. & M.) Schrader Langakset sumpaks. 10-40cm. Enårig. Bladskederne ikke oppustede. Dusken uden svøbblade, cylindrisk, 4-10 x så lang som bred, ofte mørk. VII-X. Korsika. Sj.

Cynodon dactylon (L.) Pers. Hundetandsgræs. -30cm. Ligner Digitaria, Fingeraks, men let kendelig ved sine toradede blade, der er blågrønne. VI-IX. M.alm.

Spartina versicolor Fabre 60-150cm. Bladene sivagtige, først purpurfarvede. 3-4 3-6cm lange aks. X-III. Strandsøer m.m. X-III. Sj.

Tragus racemosus (L.) All. Burreaks. 10-30cm. Nedliggende til opstigende enårig. Bladene stivhårede i randen. Dusken cylindrisk, 2-7cm, violet med 1-blomstrede småaks. VI-VIII. Korsika. Alm.

Leersia oryzoides (L.) Sw. Risgræs. 30-100cm. Opret flerårig. Bladene stærkt ru med hvidlig midterribbe. Toppen åben med bølgede grene, ofte m.m. indesluttet i den øverste bladskede. Yderavner mangler helt. Inderavner 4-5mm. VIII-X. Korsika. Sj.

Panicum miliaceum L. Alm. hirse. VII-VIII. Forvildet. Sj.

P. repens L. Krybehirse. Flerårig med lange udløbere, der ofte er overjordiske. Bladene næsten regelmæssigt toradede. Toppen tæt, med m.m. oprette grene. Fugtigt sand, mest langs kysten. VI-X. Sj.

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Hanespore. VI-X. M.alm.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Blodhirse. 20-50cm. Blade og bladskeder stivhårede. Oftest 4-7 aks sammen. VI-XI. M.alm.

D. ischaemum (Schreber) Mühlenb. Lidet fingeraks. 10-40cm. Blade og bladskeder glatte. Aksene oftest 2-4 sammen. VII-IX. Korsika. Sj.

Paspalum paspalodes (Michx.) Scribner Tvillingaks. 10-50cm. Flerårig med udløbere. Blader og skeder oftest randhårede. 2 m.m. oprette aks sammen på 2-7cm med en smal, affladet akse. Småaksene lysegrønne. VII-IX. Sardinien. Alm.

Setaria. Skærmaks.

1. Yderavnerne ret ens, ½-2/3 af den tværrynkede inderavne glauca
" uens, ½ og 1 x den meget svagt rynkede inderavne 2.
2. Blomsterstanden m.m. lappet forneden, 2-3 cm bred italica
" cylindrisk, under 1 cm bred 3.
3. Børsterne med nedadvendte småtorne verticillata
" " opadvendte " viridis

Setaria glauca (L.) Beauv. Blågrønt skærmaks. 20-60cm. Bladene noget blågrønne. Dusken tæt, ikke mellembrudt. VII-X. Alm.

S. viridis (L.) Beauv. Grønt skærmaks. VI-X. Alm.

S. verticillata (L.) Beauv. Kransskærmaks. 30-80cm. Dusken mellembrudt forneden og med uregelmæssigt kransstillede grene.

S. italica (L.) Beauv. Kolbehirse. VII-VIII. Dyrket og forvildet.

Imperata cylindrica (L.) Beauv. Sølvgræs. -120cm. Bladene indtil 60cm, indrullede og stift oprette. Dusken indtil 20cm, tæt og cylindrisk, hvidulden af de lådne yderavner. Småaksene 2-blomstrede, 4-6mm. Flodbredder, klitlavninger. V-VII. Sj.

Erianthus ravennae (L.) Beauv. Sølvør. 1-3m. I tuer op til 1 m brede. Bladene ru og blågrønne, til sidst ofte rødlig og hvidårede, mest indrullede. Toppen 30-50cm, hvidulden og ofte bøjet. Småaksene 3½-5mm, ofte violette, 2-blomstrede. Flodbredder. Klitlavninger. VII-X. Sj.

Sorghum halepense (L.) Pers. Vild durra. 50-150cm. Bladene 1-2cm brede, med lys midterribbe. Toppen 10-30cm med brunlilla småaks. VII-X. Alm.

Andropogon distachyus L. Hornet skæggræs. 25-100cm. De to endestillede klaser 4-14cm. V-IX. Sj.

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf Tvillingskæggræs. 30-100cm. Toppen dannet af parvise klaser på 3-4cm på en fælles stilk fra bladhjørnerne. V-X. Alm.

PALMAE

Chamaerops humilis L. Dværgpalme. 1-2m. Stænglen oftest kort og knoldformet, sjældnere noget forlænget. Bladene vifteformede, op til 80cm. Mest langs kysten. Sj.

ARACEAE

Arum pictum L.f. 30-50cm. Bladene mørkegrønne og hvidbrogede. Hylsterbladet 15-25cm, mørkt purpurfarvet, kolben af samme farve. X-XI. Sj.

A. maculatum L. Plettet lygtemand. Kolben oftest violet. Bladene ofte sortplettede, kommer frem om foråret. IV-V. Sj.

A. italicum Mill. Hvidåret lygtemand. 25-50cm. Kolben gul. Bladene ofte hvidbrogede, kommer frem om høsten eller i den tidlige vinter. III-V. Alm.

Dracunculus vulgaris Schott Dragerod. Op til 1m. Bladene nærmest juleroseagtige med 9-15 fodformet anbragte flige, 15-20x25-35cm. Hyksterbladet 20-40cm, grønligt udvendigt og mørkt purpurbrunt indvendigt, glat. Kolben mørkpurpur og glat. IV-V. Sj.

D. muscivorus (L.f.) Parl. 20-40cm. Hylsterbladets inderside og kolben hårede. Bladene mere uregelmæssigt delte. Hylsterbladet 20-25 cm, udvidet i øvre halvdel, grønligt med purpurfarvede streger. Hede nær havet. IV-V. M.sj.

Biarum dispar (Schott) Talavera Opblæst ormetunge. 10-20cm. Bladene ikke spydformede, vårbladene ægformede, 2-4cm lange, de følgende linjeformede, 8-10cm lange. Hylsterbladet 10-12cm, mørkpurpur, opblæst forneden, linjeformet foroven. X-I. Midtsardinien: Nuorese ved Marmuri, Nurri, Ortacesus, Guamaggiore. M.sj.

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. Munkehætte. 10-30cm. 1-få blade, der ligner små Arum-blade på 4-10cm. Hylsterbladet 3-5cm, grønligt med purpurbrune længdestriber, foroven hætteagtigt fremadbøjet. X-V. Alm.

Ambrosina bassii L. Kolbebad. 4-8cm. 2-4, undertiden purpurbrogede, elliptisk-ægformede blade. Hylsterbladet nedliggende, bådformet, 2-3cm, ender i en vreden spids, grønt og purpurpletet. XII-III. Krat og lysninger. Sj.

LEMNACEAE

Lemna trisulca L. Korsandemad. Sardinien. Sj.

Lemna gibba L. Tyk andemad. V-X. Sj.

L. minor L. Liden andemad. Sj.

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Stor andemad. Sardinien. Sj.

Wolffia arhiza (L.) Wimm. Dvergandemad. Små $\frac{1}{2}$ -1mm store, flydende kugler. Korsika. Forsvundet?

SPARGANIACEAE

Sparganium erectum L. Grenet pindsvineknop. VI-VIII. Alm. 2 ssp.: ssp. erectum: Frugten mørkebrun til sort, med trindt tværsnit.

ssp. neglectum (Beeby) Sch. & Th.: Frugten gulbrun, kantet tværsnit.

S. emersum Rehm.: Enkelt pindsvineknop. Sardinien. Sj. VI-IX.

TYPHACEAE

Typha latifolia L. Bredbladet dunhammer. VI-VIII. Alm.

T. angustifolia L. Smalbladet dunhammer. VI-VII. Sj.

T. domingensis (Pers.) Steudel Stro dunhammer. Op til 3m. Ligner den foregående, men hunakset lysebrunt. Bladskederne oftest uden øren. Hunblomsternes skæl lysebrune og gennemskinnelige (matte og mørkebrune hos ang.). VI-VII. Sj.

CYPERACEAE

Scirpus. Kogleaks.

1. Småaksene i kugleformede hoveder holoschoenus
- " ikke i kugleformede hoveder 2.
2. Blomsterstanden øjensynligt endestillet 3.
- " " sidestillet 5.
3. Småakset enligt, uden støtteblade caespitosus
- 1-flere småaks med tydelige støtteblade 4.
4. Stænglen trekantet. Småaksene over 8 mm maritimus
- " trind. Småaksene 3-10 mm silvaticus
5. Ofte enårig. Stænglen under 1 mm tyk 6.
- Flerårig. Stænglen over 2 mm tyk 7.
6. Støttebladet ofte ca. af småaksenes længde. Nødden m.m.

glad cernuus
Nødden længderibbet setaceus

7. Tueformet mucronatus
- Med udløbere 8.
8. Stænglen trekantet litoralis
- " trind 9.
9. Stænglen grøn. Avnerne glatte lacuster
- " blågrøn. Avnerne småvortede tabernaemontani

Scirpus maritimus L. Strandkogleaks. VI-IX. Alm.

S. holoschoenus L. Kuglekogleaks. 30-50cm. Stænglen trind. Blomsterstanden tilsyneladende sidestillet, bestående af 1-10 kugleformede, stilkede hoveder på op til 12mm. IV-IX. Alm.

S. lacuster L. Søkogleaks. V-VIII. Alm.

Scirpus tabernaemontani Gmelin Blågrønt kogleaks. V-VIII. Alm.

S. mucronatus L. Sylkogleaks. 40-100cm. Tæt tueformet med trekantede stængler og bladløse skeder. Blomsterstanden et sammentrængt nøgle af 3-8 grålige eller brune småaks. Sumpe, grøfter. VI-VIII. Korsika. Sj.

S. litoralis Schrader 50-120cm. En Søkogleaks med trekantede stængler. Strandsumpe. V-VIII. Korsika. Sj.

S. setaceus L. Børstekogleaks. VI-VIII. Sj.

S. cernuus Vahl Som foregående, men 1(-3) småaks sammen. Fugtigt sand. V-X. Sj.

S. caespitosus L. Tuekogleaks. VI-VIII. Korsika. Alm.

Eleocharis palustris (L.) R. & S. Alm. sumpstrå. VI-IX. Sj.

E. acicularis (L.) R. & S. Nålesumpstrå. VI-IX. Korsika. Sj.

E. multicaulis (Sm.) Sm. Mangestænglet sumpstrå. VI-X. M.sj.

E. parvula (R. & S.) Link Lavt kogleaks. 2-8cm. Flerårig. Tueformet med trådformede udløbere, der ender i hvide, løglignende knolde. Småaks 2-3(-5)mm med 3-5(-8) blomster. V-VII. Sardinien. M.sj.

Fuirena pubescens Kunth Knippeaks. 20-70cm. Flerårig med udløbere. Stænglerne skarpt trekantede, bladede næsten til toppen, blødt dunedede ved stængelledene. Grågrønne, dunedede aks i et nøgle eller en top. Sumpe. V-VI. Sardinien: Pixinamanna. Korsika. M.sj.

Schoenus nigricans L. Sortskøne. Et hovede på 5-10 sortbrune småaks. 2 højblade, hvoraf det nederste forlænger stænglen lidt. Tæt tueformet flerårig med sortagtige nedre bådskeider. Alm. IV-VII.

Cladium mariscus (L.) Pohl Avneknippe. V-VII. Sj.

Cyperus. Fladaks. Småaksene med 4-40 toradet stillede dækskæl.

1. 3 grifler 2.
- " " 6.
2. Enårig fuscus
- Flerårig 3.
3. Blomsterstanden et hovede capitatus
- " en skærm med toradet stillede aks 4.
4. 50-120 cm. Uden rodknolde longus
- 10-40cm. Med rodknolde 5.
5. Bladene blågrønne, 2-6mm brede. Aksene rødbrune rotundus
- " friskgrønne, 5-10mm brede esculentus
6. Enårig flavescens
- Flerårig 7.
7. 2-6 aks i et sidestillet knippe laevigatus
- Mange toradet stillede aks i en skærm serotinus

Cyperus longus L. Langt fladaks. Stænglens nederste 20cm dækket af bladløse skeder. Blomsterstanden med ofte 3-4 støtteblade på 7-17cm x 6-8mm. VI-VIII. Alm.

C. rotundus L. Knoldfladaks. Alle blade grundstillede, skederne ofte rødlig. 2(-4) støtteblade op til 5cm. VI-XI. Alm.

C. esculentus L. Spiseligt fladaks. Aksene strågule eller rødlig, korte, 6-12mm, med m.m. udstående avner. Grøfter og sumpe nær kysten. VII-X. Sj.

C. fuscus L. Fladaks. 2-35cm. Stænglen trekantet med konkave sider. Bladene 2-3mm brede, kølede. Aksene 1 $\frac{1}{2}$ mm brede og brune. VII-IX. Sj.

C. capitatus Vandelli Hovedfladaks. 10-50cm. Stænglerne trinde, blågrønne og ofte krumme. Bladene 3-6mm, sivformet indrullede og stive. Hovedet endestillet, 2-3cm bredt, med 1-3 3-12cm lange støtteblade. Sandstrand. V-IX. Alm.

Cyperus serotinus Rottb. 30-100cm. Ligner *C. longus*, men mere blågrøn. VI-VIII. Sj. Korsika.

C. laevigatus L. Sivfladaks. 20-40cm. Stænglerne but trekantede, omgivne af bladskeder forneden. Blomsterstanden med oftest 2-6 småaks på 2-15mm lange stilke, omgivne af to støtteblade, hvoraf det ene danner en forlængelse af stænglen. VI-VIII. Sardinien. Sj.

C. flavescens L. 3-30cm. Stænglerne trekantede med stærkt uens sider. Bladene $\frac{1}{2}$ -3mm brede, uden køl. Aksene 10x2 $\frac{1}{2}$ mm, gullige. Fugtigt sand. VII-IX. Sj.

Carex. Star.

1. Aksene ens 2.
- " uens 12.
2. Med udløbere 3.
- Uden udløbere 4.
3. Bladene meget kortere end stænglen *praecox*
- " ofte af stænglens længde *divisa*
4. Småaksene med hanblomster i spidsen 5.
- " " ved grunden 10.
5. 3 støvfang *distachya*
- 2 " 6.
6. Stænglen but trekantet 7.
- " skarpt til vinget trekantet 9.
7. Frugten med en tværfure midtpå, svampet forneden *spicata*
- " uden tværfure og svampet underdel 8.
8. Akset tæt, 2-3 cm *pairaei*
- " 5-10 cm, stærkt mellembrudt *divulsa*
9. Støttebladene med mørkebrun, øreformet omfattende grund *vulpina*
- " " bleggrøn grund *otrubae*
10. Nedre støtteblade 10-20 cm lange. Aksene adskilte *remota*
- " " korte 11.
11. Aksene runde med stjerneformet udstående frugter *stellulata*
- " omvendt ægformede med tiltrykte frugter *leporina*
12. 2 støvfang 13.
- 3 " 16.
13. Tueformet *elata*
- Med udløbere 14.
14. Nedre hunaks stilket *panormitana*
- " " siddende 15.
15. 2-15cm. Frugten utydeligt ribbet *intricata*
- 5-40cm. " tydeligt " *nigra*
16. 2-4 hunblomster med bredt hindekantede, ofte centimeter-lange dækskæl *oedipostyla*
- Anderledes 17.
17. 1 hanaks 18.
- Flere hanaks 39.
18. Frugterne hårede 19.
- " glatte eller højst randhårede i spidsen 26.
19. 1- flere aks grundstillede og langstilkede 20.
- Alle aks højtsiddende 22.
20. Bladene 1-1 $\frac{1}{2}$ mm brede, 2-3 x stænglerne *humilis*
- " 2-4 mm " , højst af stænglens længde 21.
21. Stænglen med 3-5 siddende aks *hallerana*
- " " 2-3 aks, det nedre langstilket *depressa*
22. Hanakset højere end hunaksene 23.
- " så højt som eller lavere end hunaksene *digitata*
23. Hunaksenes støtteblade uden skede 24.
- " " med " 25.
24. Dækskæl sorte, kortere end frugterne *montana*
- " rødlig, af frugtens længde *pilulifera*
25. Tueformet. Med sortbrune fibre ved grunden *umbrosa*
- Med korte udløbere. Med kastanjebrune fibre ved grunden *caryophyllea*

26. Hunaksene meget åbne, med 2-12 blomster 27.
- " flerblomstrede 28.
27. Frugterne meget store, 7-9 mm lange *depauperata*
- " middelstore, 4-5 mm " *olbiensis*
28. Frugterne sortbrune til brune 29.
- " m.m. grønne 30.
29. Hunaksene 1 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ cm. Planten 20-50 cm *frigida*
- " 4-10 cm. " 50-100 cm *microcarpa*
30. Nedre hunaks hængende 31.
- Hunaksene oprette 33.
31. Frugterne kortnæbbede. Hunaksene 5-15 cm *pendula*
- " med tydeligt tokløvet næb 32.
32. Hunaksene 6-10 mm brede *laevigata*
- " 3-5 mm " *silvatica*
33. Nedre bladskeder hårede. Frugten uden næb *pallescens*
- Bladskederne glatte. Frugten med kort eller langt næb 34.
34. Med lange udløbere, næppe tueformet *panicea*
- Ingen eller korte udløbere, tydeligt tueformet 35.
35. Øvre hunaks m.m. tætsiddende 36.
- " " veladskilte 38.
36. Frugten 4-7 mm lang. Næbbet langt og bøjet *flava*
- " 2 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ mm lang. Næbbet kort og ret 37.
37. Lange, oprette støtteblade *extensa*
- Støttebladene til sidst nedadbøjede *oederi*
38. Nederste støtteblad lig eller længere end blomsterstanden *punctata*

- Nederste støtteblade kortere end blomsterstanden *distans*
39. Bladene og frugterne hårede *hirta*
- " glatte 40.
40. Frugten stivhåret foroven *hispida*
- " glat eller ruprikket 41.
41. Frugten ruprikket og kortnæbbet. Bladene blågrønne .. *flacca*
- " glat og med tokløvet næb 42.
42. Frugtens næb $\frac{1}{2}$ mm *acutiformis*
- " " mindst $\frac{3}{4}$ mm 43.
43. Hunaksets dækskæl længere end frugterne *riparia*
- " " kortere " " 44.
44. Stænglen trind forneden. Bladene blågrønne *rostrata*
- " overalt trekantet. Bladene grønne *vesicaria*

Carex distachya Desf. 15-45cm. Bladene $\frac{1}{2}$ -1mm, af stænglernes længde, flade. 2-4 løse aks med 2-5 hunblomster. Nedre støtteblade lange, 6-15cm. Frugterne 5-6mm. IV-VI. Alm.

C. spicata Hudson Spidskapslet star. IV-VII. Korsika. Sj.

C. pairaei F.Schultz Pigget star. IV-VII. Korsika. Sj.

C. divulsa Stokes Sydlig mellembrudt star. Blomsterstanden 5-10 cm. De nedre aks mellemrum større end aksene. 20-40cm. IV-VI. Alm.

C. otrubae Podp. Syltstar. IV-VI. Alm. i følge Pignatti. Kun Korsika i følge Fl.Eur.

C. vulpina L. Rævestar. IV-VI. Korsika i følge Fl.Eur.

C. divisa Hudson 10-50cm. Stænglerne trekantede, m.m.ru. Bladene 1-3mm brede. Blomsterstanden 1 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ cm, ægformet med 3-8 aks med hanblomster foroven. Fugtige steder, mest nær kysten. IV-VI. Alm.

C. praecox Schreber 10-30(-45)cm. Stænglerne trekantede, ru foroven. Bladene 1-1 $\frac{1}{2}$ mm, noget indrullede. 3-7 småaks med hanblomster ved grunden, rødbrune. III-VI. Tørre enge. Sj.

C. leporina L. Harestar. V-VII. Sj.

C. echinata Murray Stjernestær. V-VII. Korsika. Sj.

C. remota L. Akselblomstret star. V-VII. Sj.

C. nigra (L.) Reichard Alm. star. V-VII. Korsika. Sj.

Carex intricata Tineo 2-15cm. Som den foregående, men mindre. Nedre skeder trævlede. Kun det nederste støtteblad bladlignende, omend kort. Oftest 1 hanaks. Frugten omtrent så lang som bred, med utydelige ribber. 700-2400m. V-VI. Korsika. Sj.

C. panormitana Guss. 30-50cm. Ligner Nikkende star. Udløberne korte. Mange bladløse skeder. Bladene 2-3mm brede. 2-4 hanaks og 3-6 hunaks. Langs vandløb. 0-300m. III-V. Sardinien: Muravera. Sj.

C. elata All. Stiv star. IV-V. Sardinien. Sj.

C. oedipostyla Duv.-J. Knækstar. 10-30cm. Med udløbere. Bladene tynde og længere end blomsterstanden. 2-3 korte og fåblomstrede aks, det nedre oftest et rent hunaks med stilk fra stængelgrunden. Hunblomsterne veladskilte på en zigzagbøjet akse. Lyng- og Rosmarinheder. III-IV. Sardinien: Gallura, Alghero, Calentino, Jerzu. Sj.

C. umbrosa Host Skyggestar. 30-50cm. Bladene op til stænglens højde, bleggrønne. Blomsterstanden lidt forlænget, 2-4cm, med det nederste hunaks stilket. IV-V. Sardinien. Sj.

C. pilulifera L. Pillestar. V-VII. Korsika. Sj.

C. montana L. Bakkestar. IV-VI. Korsika. Sj.

C. caryophyllea Latourr. Vårstar. III-V. Alm.

C. hallerana Asso 10-40cm. Tæt tueformet. Nedre skeder brune og trævlede. 1-2, 5-15cm langt stilkede, grundstillede hunaks + 3-5 korte, tætstillede, ægformede hunaks. Dækskællene brune til rødbrune med hindekant. III-V. Alm.

C. depressa Link 5-20cm. Tæt tueformet. Bladene ofte længere end stænglerne. Nedre hunaks med bladagtigt støtteblad på 1-4cm. Dækskællene med brod. III-IV. Korsika. S. Bonifacio. M. sj.

C. humilis Leyser Jordstar. 2-10cm. 2-4 fjærntsiddende og jævnt fordelte hunaks med hvert 2-4 blomster. Dækskællene hindeagtige med brun køl. III-VI. Korsika. Sj.

C. digitata L. Fingerstar. IV-VI. Korsika. Sj.

C. olbiensis Jordan Hvidgrøn star. 20-50cm. Nedre skeder sorte og skinnende. Hunaksene oprette med 3-12 blomster, hvoraf de nedre er m.m. adskilte. Dækskællene m.m. hindeagtige. Frugterne hvidbrune. Stenegskov, krat. III-IV. Korsika. Sj.

C. depauperata Good. Storfrugtet star. 30-60cm. Nedre skeder rustbrune, bladløse. 2-4 hunaks med 2-6 blomster. Dækskællene bredt hindekantede. Frugterne langnæbbede, grønlig og skinnende. V-VI. Korsika. M. sj.

C. silvatica Hudson Skovstar. IV-V. Korsika. Sj.

C. pallescens L. Bleg star. VI-VII. Korsika. Sj.

C. panicea L. Hirsestar. IV-VII. Korsika. Sj.

C. punctata Gaudin Prikstar. 20-50cm. Bladene 4-8mm brede, friskgrønne. Støttebladene ofte stængeloverrægende. Hunaks cylindriske eller aflange. Dækskæl lysebrune. Væld og tørvemoser. IV-V. Sj.

C. distans L. Fjærnakset star. IV-VI. Alm.

C. extensa Good. Udspilet star. V-VI. Sj.

C. flava L. Gul star. V-VII. Korsika. Sj.

C. oederi Retz. Dværgstar. V-VIII. Korsika. Sj.

C. laevigata Sm. 50-100cm. Nedre skeder lysebrune og bladløse. Bladene 5-8mm brede. 2-4 cylindriske, langt adskilte, 2-3cm lange hunaks. Frugterne grønlig, flaskeformede, flerribbede. Sumpe, fugtige skove. IV-V. Korsika på østsiden. Sj.

Carex frigida All. Bækstar. 20-50cm. Hunaksene ret tætsiddende, ret langstilkede og m.m. hængende. Dækskællene sortpurpur. Frugterne 5-6mm, smalle, sortbrune. Bjærgbække og væld. 1500-2600m. VI-VII. Sj.

C. pendula Hudson Kæmpestar. IV-V. Sj.

C. microcarpa Bertol. 50-100cm. Tæt tueformet. Bladene indtil 13 mm brede. Hunaksene oprette. Frugterne purpurbrune. Sumpe og våde enge. III-IV. Sj.

C. rostrata Stokes Næbstar. V-VII. Korsika?

C. vesicaria L. Blærestar. V-VII. Korsika. Sj.

C. acutiformis Ehrh. Kærstar. IV-VI. Sj.

C. riparia Curtis Tykakset star. IV-VI. Korsika. Sj.

C. hispida Willd. Ru star. 45-100cm. Stænglerne kraftige, butkantede. Nedre skeder sortbrune og trævlede. Bladene 4-8mm brede, blågrønne. 2-4 hanaks, 3-5 hunaks på 4-10cm x 6-8mm. Dækskællene med stak. Sumpe, grøfter. III-V. Sj.

C. flacca Schreber Blågrøn star. 2 underarter:

ssp. flacca: Hunaks ofte hængende. Dækskæl med 1 ribbe, næppe længere end frugten, der er 2-3mm. III-VI. Korsika: Alm. Sardinien: Sj.

ssp. serrulata (Biv.) Greuter: Hunaks oprette. Dækskæl med 3 ribber, lig eller længere end den 3-4mm lange frugt. III-V. Alm.

C. hirta L. Håret star. IV-VI. Korsika. Alm.

ORCHIDACEAE

- | | |
|--|---------------|
| 1. Uden bladgrønt | 2. |
| Med grønne blade | 3. |
| 2. Planten brun | Neottia |
| " mørklilla | Limodorum |
| 3. Blomsten uden eller næsten uden spore | 4. |
| " med spore | 10. |
| 4. 2 ægformede, modsatte blade midt på stænglen | Listera |
| Bladene anderledes | 5. |
| 5. Små, hvide, skruetillede blomster på 4-7mm | Spiranthes |
| Større og anderledes stillede blomster | 6. |
| 6. Underlæben firfliget. Blomsterbladene hjælmdannende | Aceras |
| " ikke firfliget | 7. |
| 7. Underlæben ikke tværdelt | Ophrys |
| " delt på tværs i en inder- og yderlæbe | 8. |
| 8. Underlæben lang og nedadrettet. Blomsten rødbrun | Serapias |
| " anderledes. Blomsten ikke rødbrun | 9. |
| 9. Blomsterne stilkede, m.m. ensidigt stillede | Epipactis |
| " m.m. siddende, alsidigt stillede | Cephalanthera |
| 10. Underlæben udelte og smal. Hvid blomst | Platanthera |
| " delt eller bred | 11. |
| 11. Underlæben med 2 lameller nær grunden | Anacamptis |
| " uden ophøjede lameller | 12. |
| 12. 2 spredtstillede, hjerteformede blade | Gennaria |
| Bladene ikke hjerteformede | 13. |
| 13. Underlæben 4-fliget med krusede sideflige | Barlia |
| " oftest 3-fliget | 14. |
| 14. Sporen 1-3 mm | 15. |
| " længere | 16. |
| 15. Støttebladene hindeagtige | Neotinea |
| " urteagtige | Leucorchis |
| 16. Støttebladene hindeagtige | 17. |
| Nedre støtteblade urteagtige | |
| 17. Sporen ca 1 mm bred. Underlæben uden tegninger | Gymnadenia |
| " over 1mm " " ofte med tegninger | Dactylorhiza |

Epipactis palustris (L.) Cr. Sumpfullæbe. VI-VIII. Korsika. M.sj.
E. helleborine (L.) Cr. Skovhullæbe. VI-IX. Sj.
E. microphylla (Ehrh.) Sw. Småbladet hullæbe. 20-50cm. 3-6 lancetformede blade på 1-2½x1cm. Skov, tørre. VI-VIII. Sj.

Cephalanthera rubra (L.) Rich. Rød skovlilje. V-VII. Sj.

C. longifolia (Hudson) Fritsch Sværdskovlilje. 6-10 blade, mindst 6 x så lange som brede. IV-VI. Sj.

C. damasonium (Miller) Druce Hvidgul skovlilje. 3-5 blade, der er 2-3 x så lange som brede. V-VII. Sj.

Limodorum abortivum (L.) Sw. Fuglestok. 20-80cm. Stænglen opret og med skælblade. 6-20 adspredte blomster med hel underlæbe og en 10-15mm lang, nedadbøjet spore. V-VII. Sj.

Neottia nidus-avis (L.) Richard Røderod. V-VII. Sj.

Listera ovata (L.) R.Br. Ægbladet fliglæbe. V-VIII. Sj.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Skrueaks. Bladene ægformet elliptiske, grundstillede. 6-20cm. Blomsterne små og hvide i 1 spiralsnoeing. Underlæben ndelt. X-XI. Alm.

S. aestivalis (Lam.) Rich. Sommerskrueaks. 12-30cm. Som foregående, men bladene linje-lancetformede, nogle af dem på stænglen. Tørvemoser. VI-VII. Sj.

Gennaria diphylla (Link) Parl. Knospore. 15-30cm. 2 hjørteformede stængelblade. Akset 5-8cm, m.m. ensidigt. Blomsterne små, ca. 4mm, gulgrønne, med udadbøjede blomsterbladsspidser. III-IV. Sardinien: Gallura, Stintino-halvøen, Maddalena-øgruppen. Sj.

Platanthera chlorantha (Custer) Rehb. Skovgøgelilje. Støvknapperne vigende. V-VII. Sj.

P. bifolia (L.) Richard Bakkegøgelilje. Støvknapperne parallelle. V-VII. Sj.

Leucorchis albida (L.) Meyer Sækspore. 15-25cm. Akset 3-7cm, tæt og mangeblomstret. Blomsterne ca. 3mm, hvidgrønne, blomsterbladene hjørtemagtigt sammenbøjede. Underlæbens 3 lapper næsten lige lange. VI-VIII. Korsika. M.sj.

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Langakset trådspore. 25-55cm. Bladene linje-lancetformede. Akset tætblomstret. Blomsterne lyserøde til lyst rødlig. Sporen 15-20mm, ca. 2 x frugtknuden. V-VIII. Korsika. M.sj.

Dactylorhiza. Gøgeurt.

1. Blomsten gul 2.
" rød 3.
2. Sporen opadkrummet markusii
" ret og m.m. vandret insularis
" nedadkrummet sambucina
3. Sporen slankt cylindrisk, 1-1½mm tyk 4.
" bredt " eller kegleformet, over 2 mm tyk 5.
4. Underlæbens midterflig meget smallere end sidefligene maculata
" " ca. så bred som sidefligene fuchsii
5. Underlæben gul i svælget sambucina
" uden gult 6.
6. Underlæben kraftigt 3-lappet. Bladene plettete, ofte brede
" saccifera
Underlæben svagt 3-lappet til udelt. Bladene smalle og
oftest uplettete elata

Dactylorhiza markusii (Tineo) Baum. & Künk. 15-45cm. Sidestillede blomsterblade lodret opadrettede. Underlæben lyst citrongul uden rød tegning. Sporen 9-13mm. III-VI. Sardinien. M.sj.

Dactylorhiza insularis (Somm.) Landwehr 20-50cm. Bladene danner ingen tydelig roset. Sidestillede blomsterblade vandret udstående til skråt opadrettede. Blomsten citrongul, oftest med rødt på underlæben. IV-VI. M.sj.

D. sambucina (L.) Soó Hyldegøgeurt. 10-30cm. Akset tæt. Blomsterne gule eller røde. Sidestillede blomsterblade skråt udstående til opadrettede. Underlæben oftest udelt. Sporen cylindrisk kegleformet. III-VII. Korsika?

D. elata (Poir.) Soó Rank gøgeurt. 30-125cm. 5-10 blade, der er bredest på eller under midten. Klasen cylindrisk og rigtblomstret. Blomsterne ofte ret mørkt rødlig. Læben med brudte striber på sin lysere inderdel. Fugtige enge. IV-VII. Korsika.

D. saccifera (Brongn.) Soó Tragtgøgeurt. 25-90cm. Ligner Plettet gøgeurt, men sporen ganske tyk, 2½-4mm. Nedre støtteblade oftest længere end blomsterne. Fugtige skove m.m. V-VII.

D. maculata (L.) Soó Plettet gøgeurt. V-VII. Korsika.

D. fuchsii (Druce) Soó Skovgøgeurt. V-VII. Korsika.

Neotinea maculata (Desf.) Stearn Kyseblomst. 10-30cm. Bladene af-lange, noget blågrønne og oftest småplettede. Akset tæt, 2-6cm, noget ensidigt. Blomsterne 3-4mm, med hjørteformet sammentrængte blomsterblade, mat lyserøde eller grønlig-hvide. IV-V. Sj.

Aceras anthropophorum (L.) Ait.f. Den hængte mand. 10-40cm. Akset smalt cylindrisk og tætblomstret. Øvre blomsterblade grønlig og hjørtemagtigt. Underlæben okkergul, lang og firfliget, så den ligner en mand med arme og ben. IV-V. Alm.

Orchis. Gøgeurt.

1. Læben udelt 2.
" 3-lappet 3.
2. Sidestillede blomsterblade udad- og opadrettede collina
" " fremadrettede papilionacea
3. Ydre blomsterblade fremadrettede og hjørtemagtigt 4.
" " udad- eller opadrettede 9.
4. Sporen opadbøjet 5.
" nedadrettet 6.
5. Sporen omtrent af læbens længde morio
" meget længere end læben longicornu
6. Læbens midterlap mindre end sidelapperne, udelt .. coriophora
" " større " " 7.
7. Støttebladene af frugtknudens længde 8.
" " højst ½ x frugtknuden purpurea
8. Ydre blomsterblade noget grønlig lactea
" " uden grønt tridentata
9. Bladene linje-lanceyformede, bredest forneden, ingen
egentlig roset 10.
- Bladene bredere, med roset 11.
10. Læbens midterlap kortere end sidelapperne laxiflora
" " længere " " palustris
11. Sporen vandret. Ydre blomsterblade 3-5mm brancifortii
" opadrettet. Ydre blomsterblade større 12.
12. Blomsterne gule 13.
" " røde 14.
13. Læben uden røde prikker pallens
" med " " provincialis
14. Sporen længere end frugtknuden. Læbens sidelapper
nedadbøjede .. olbiensis
Sporen ikke længere end frugtknuden. Læbens sidelapper
ikke nedadbøjede mascula

Orchis coriophora L. Tægegøgeurt. 15-60cm. Ofte stinkende. Hjel-
mens blomsterblade tilspidsede. Blomsterne brune, røde, lyserøde el-
ler grønlig. Læben med purpurpletet og papilløst håret inderdel.
IV-VI. Alm.

O. laxiflora Lam. 20-60cm. Blomsterne mørkt rødlig. Underlæbens
midterfelt hvidt og oftest uprikket. Sporen 10-19mm, opad- eller opad-
rettet. Sumpe, fugtige enge. IV-VI. Sardinien. Alm. Korsika. Sj.

O. palustris Jacq. Kærgøgeurt. 15-100cm. Ligner foregående, men
blomsterne oftest lysere. Sporen 7-19mm, opad- eller nedadrettet
eller vandret. Su, pe, fugtige enge. VI-VII. Korsika. Sj.

O. mascula L. Tyndakset gøgeurt. IV-VI. Alm.

O. olbiensis Barla 10-25cm. Som foregående, men lavere, med en
3-8cm lang klase med 6-15 hvidlige eller lyserøde blomster. 2
underarter:

ssp. olbiensis: Sporen 13-19mm, 4/3-2 x læben, opadbøjet. III-VI.
Korsika.

• ssp. ichnusae (Corrias) Buttler: Sporen 9-14mm, 1-5/4 x læben,
lidet opadrettet. IV-V. Sardinien: Gennargentu, Iglesias-bjærgene.

O. pallens L. Bleg gøgeurt. 15-40cm. Bladene ca. 4 x så lange
som brede, uplettede. Sporen lidt kortere end frugtknuden. IV-VI.
Korsika. Sj.

O. provincialis Balbis Krumsporet gøgeurt. 15-35cm. Bladene ca.
5 x så lange som brede, kraftigt plettede. Sporen af frugtknuds
længde eller længere. IV-V. Alm.

O. collina Sol. Sækgøgeurt. (O. saccata Ten.) 10-40cm. Blomsteret
grønligbrunt. Underlæben m.m. vinrød. II-III. Sardinien. Sj.

O. papilionacea L. Sommerfuglegøgeurt. 15-40cm. Blomsterbladene
fremadrettede, men ikke hjælmdannende, stribede, vinrøde. Læben
ofte lys og med brudt stregmønster. IV-V. Alm. Pignatti adskiller
2 underarter: ssp. papilionacea med ensfarvet underlæbe og ssp.
grandiflora (Boiss.) Nelson med mønstret underlæbe.

O. brancifortii Biv. 10-25cm. Blomsten lyst rødlig. Ydre blo-
sterblade vinkelret udstående i eet plan, de to indre fremadret-
tede mod hinanden. Underlæben med 4 prikker nær svælget. IV-VI.
Sardinien: Nogle steder langs østkysten.

O. morio L. Salepgøgeurt. IV-VI. Sj.

O. longicornu Poirer Køllegøgeurt. 10-35cm. Minder om foregåen-
de. Underlæbens sideflige oftest retvinklet nedadbøjede, det hvide
midterfelt skarpt afsat. III-IV. Sj.

O. tridentata Scop. Tretandet gøgeurt. 15-45cm. Hjelmlbladene
langspidsede, blegt rødlig med mørkere striber. Læben rigeligt
rødlig prikket, med udelte midterflig. IV-V. Alm.

O. lactea Poirer Mælkegøgeurt. 10-20cm. Blomsterbladene med spids,
hvidlige, med grønlig eller rødlig striber. Læben hvid eller
lyserød, ret rødprykket. Midterfligen noget delt. III-IV. Sj.

O. purpurea Hudson Stor gøgeurt. IV-VI. Sj.

Anacamptis pyramidalis (L.) Richard Horndrager. V-VI. Alm.

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter Kruklæbe. 25-60cm. Akset
pyramideformet cylindrisk, tæt, med op til 30 blomster. Blomster-
bladene hjælmdannende, ikke spidse, af varierende farve og rød-
plettede indvendigt. Læben 13-20mm. Sporen kegelformet, 4-6mm.
II-IV. Sj.

Serapias. Hønsetunge. Læben med en nedadrettet yderflig og en
skjult inderdel inde i blomstens svælg.

1. Læben allerinderst med 2 åse 2.
" " " 1 sort vulst lingua
2. Læbens yderflig 7-11½ mm lang parviflora
" " over 12 mm lang 3.
3. Yderfligen ægformet, midt 1,7 x så bred som inderdelen ... 4.
" " lancetformet, højst 1,6 x så bred som inderdelen 5.
4. Stængel og blade purpurplettede forneden cordigera
" " ikke purpurplettede neglecta
5. Yderfligen 20-28 mm vomeracea
" 14-18 mm nurrica

Serapias neglecta De Not. Storblostmest hønsetunge. 10-30cm.
III-IV. Sj.

S. cordigera L. Purpurhønsetunge. 15-50cm. IV-VI. Sj.

S. vomeracea (Burm.) Briq. Plovskærshønsetunge. 20-60cm. IV-VI.
Alm.

• S. nurrica Corrias 20-35cm. IV-VI. Sardinien: Isola di S. Pietro,
Alghero til Caprera-øen. Korsika: Porto-Vecchio.

S. parviflora Parl. Småblomstmest hønsetunge. 10-30cm. IV-V. R.sj.

S. lingua L. 10-35 cm. III-V. Alm.

Ophrys. Flueblomst.

1. Griffelstøtten but 2.
" " spids 6.
2. Bægerbladene rødlig tenthredinifera
" " grønlig 3.
3. Læben tæt randhåret langs hele randen speculum
" " ikke langt randhåret 4.
4. Læbens midterlap med stærkt nedbøjet rand og derfor
" " halvkugleformet bombyliflora
Læbens midterlap ikke nedbøjet i randen 5.
5. Læbens lapper gule lutea
" " mørke fusca
6. Læben saddelformet: konkav på langs og konveks på tværs
" " ikke saddelformet bertolonii
" " med en m.m. ret spids 7.
7. Griffelstøtten af læbens længde og med bølget spids apifera
" " med en m.m. ret spids 8.
8. Læben med veludviklede, fremadrettede, hornagtige
" " sidelapper scolopax
" " uden " sidelapper 9.
9. Øvre 2 kronblade glatte 10.
" " " hårede 11.
10. Læben tæt langhåret langs randen atrata
" " ikke tæt randhåret sphegodes
11. Øvre 2 kronblade krusede morisii
" " " flade 12.
12. Øvre 2 kronblade mindst ½ x bægerbladene exaltata
" " " under ½ x " fuciflora

Ophrys fusca Link Mørk flueblomst. 10-40cm. Ydre blomsterblade
grønne. Læben m.m. flad, lang i det og butlappet, sortagtig med
et oftest mørkeblåt, bredt omvendt V-formet mærke. III-V. Alm.

O. lutea Cav. ssp. galilaea (Fl. & Bornm.) Soó Gul flueblomst.
10-25cm. Læben forholdsvis flad og lang i det, butlappet med let
udrandet midterflig, meget bredt gulrandet og ellers brun eller
sort med mørkeblåt mærke. IV-V. Sardinien: Alm. Korsika: Sj.

O. tenthredinifera Willd. Stor flueblomst. 10-30cm. Læben firkant-
et til trapezformet, helrandet med opadbøjet vedhæng i spidsen og
to knuder, oftest bredt gulrandet, ellers purpurbrun med et lille
hvidrandet, ofte blåt mærke. IV-V. Sj.

Ophrys apifera Hudson Snabelflueblomst. 20-50cm. Kronbladene lyserøde til hvide. Læben stærkt hvælvet, med langt, nedadbøjet vedhæng. Sidelapperne nedbøjede, tæthårede. Læben ofte brun med skjoldformet brunt, blå- og gulkantet mærke. V-VII. Sj.

O. speculum Link Spejlflueblomst. (*O. ciliata* Biv.) 5-25cm. Læben m.m.flad, noget forlænget, butlappet og med bred, udrandet midterflig, hvor det skinnende blålilla, gulrandede mærke fylder det meste. IV-V. Sj.

O. bombyliflora Link Humleflueblomst. 5-20cm. Kendelig ved den stærkt hvælvede, hårede, brune underlæbe og de gulgrønne blosterblade. Ret små blomster. IV-V. Sardinien: Alm. Korsika: Sj.

O. scolopax Cav. Sneppeflueblomst. 10-65cm. Blosterbladene oftest rødlig, de to indre ret små. Læben med opadbøjet, gult vedhæng i spidsen, med et blått eller brunt, hvidrandet, m.m. H-formet mærke, der ofte breder sig stærkt. IV. Korsika: Sj.

O. exaltata Ten. Høj flueblomst. (*O. crabronifera* Mauri). 20-60cm. Bægeret ofte rødligt. Læben ulappet, oftest med gult vedhæng, brun med bredt lådden rand. Mærket ofte som 2 små blå, hvidrandede pletter. III-IV. Korsika.

O. fuciflora (F.W.Schmidt) Moench Dødningeflueblomst. (*O. holoserica* Burm.f.) Geruter) 10-30cm. Blosterbladene røde. Læben brun med veludviklet spidsvedhæng og 2 indtil 3mm høje knuder. Mærket H-formet, hvidrandet, ofte med øjer ved siden. III-VI. Sardinien. Sj.

O. sphegodes Miller Edderkopflueblomst. 10-40cm. Blosterbladene grønne. Læben brun, lådden og helrandet. Mærket H-formet, ret langt, gråbrunt eller gråblåt. III-IV. Sj.

O. atrata Lindley Langstribet flueblomst. (*O. incubacea* Bianca). Meget nær foregående. III-V. Sj.

O. morisii (Mart.) Cif. & Giac. 15-40cm. Bægerbladene oftest rødlig til hvidlige, sjældnere grønne. Læben med gult vedhæng, ellers som hos *sphegodes*. III-IV. Sardinien.

O. bertolonii Moretti Rosenflueblomst. 10-35cm. Blosterbladene oftest røde. Læben sortebun, med bredt lådden rand og oftest lavtsiddende mørkeblåt mærke. IV-V. Korsika, her vel nok som *bertoloniiiformis* O. & E. Danesch, hvor læbens saddelform er mindre udtalt.

SLÆGTISOVERSIGT

Abies 5	Antirrhinum 115	Bunium 86
Abutilon 75	Aphanes 45	Bupthalmum 137
Acacia 48	Aphyllanthes 157	Bupleurum 88
Acanthus 120	Apium 89	Butomus 154
Acer 72	Aquilegia 29	Buxus 72
Aceras 194	Arabidopsis 33	Cachrys 88
Achillea 139	Arabis 35	Cakile 39
Achyranthes 16	Arbutus 93	Calamagrostis 182
Acinos 111	Arceuthobium 10	Calamintha 110
Aconitum 24	Arctium 142	Calendula 142
Adenostyles 133	Arenaria 16	Calepina 39
Adiantum 3	Argyrolobium 49	Callitriche 105
Adonis 26	Arisarum 187	Calluna 92
Adoxa 125	Aristolochia 10	Calycotome 48
Aegilops 178	Armeria 94	Calystegia 99
Aeluropus 185	Arnoseris 148	Camelina 36
Aeonium 41	Arrhenatherum 179	Campanula 128
Aesculus 72	Artemisia 141	Camphrosoma 14
Aetheorrhiza 151	Arthrocnemum 14	Capnophyllum 90
Aethionema 37	Arum 186	Capparis 31
Aethusa 87	Arundo 184	Capsella 36
Agave 162	Asparagus 162	Cardaria 38
Agrimonia 44	Asperula 121	Cardamine 34
Agropyron 177	Asphodelus 157	Carduncellus 146
Agrostemma 21	Asplenium 3	Carduus 143
Agrostis 181	Aster 133	Carex 189
Ailanthus 71	Asteriscus 137	Carlina 147
Aira 180	Asterolinon 93	Carpobrotus 16
Ajuga 106	Astragalus 49	Carrichtera 39
Alchemilla 45	Athyrium 4	Carthamus 146
Alisma 154	Atractylis 147	Catabrosa 174
Alkanna 101	Atriplex 14	Catananche 147
Alliaria 33	Atropa 112	Catapodium 172
Allium 159	Avellinia 181	Caucalis 91
Alnus 7	Avena 178	Celtis 8
Alopecurus 183	Azolla 5	Centaurea 145
Althaea 74	Baldellia 154	Centaureum 98
Althemia 156	Ballota 108	Centranthus 127
Alyssum 35	Barbarea 34	Cephalanthera 193
Amaranthus 15	Barlia 195	Cephalaria 127
Ambrosia 138	Bassia 14	Cerastium 17
Ambrosina 187	Bellardia 119	Ceratonia 47
Amelanchier 45	Bellis 134	Ceratophyllum 24
Ammi 89	Bellium 134	Cerintho 101
Ammoides 89	Berberis 29	Ceterach 4
Ammophila 182	Berula 87	Chaenorrhinum 115
Ampelodesmos 184	Beta 13	Chaerophyllum 86
Anacamptis 195	Biarum 186	Chaetonychia 20
Anacyclus 139	Bidens 137	Chamaerops 186
Anagallis 93	Bifora 86	Cheilanthes 2
Anagyris 48	Biscutella 37	Chelidonium 30
Anarrhinum 115	Biserrula 50	Chenopodium 13
Anchusa 102	Blackstonia 97	Chondrilla 150
Andropogon 186	Borago 103	Chrozophora 67
Andryala 149	Botrychium 1	Chrysanthemum 140
Anemone 25	Brachypodium 177	Cicendia 97
Angelica 90	Brassica 38	Cicer 50
Anogramma 3	Brimeura 159	Cichorium 147
Anthemis 138	Briza 174	Circaea 82
Anthericum 157	Bromus 175	Cirsium 144
Anthoxanthum 180	Broussonetia 8	Cistus 77
Anthriscus 86	Bryonia 81	Cladium 188
Anthyllis 62	Bufonia 17	Clematis 25
Antinoria 180	Bunias 33	Clinopodium 111

Clypeola 36
 Cneorum 71
 Cnicus 147
 Colchicum 157
 Coleostephus 140
 Colutea 49
 Conium 88
 Conringia 38
 Consolida 25
 Convallaria 161
 Convolvulus 99
 Conyza 133
 Coris 93
 Cornus 83
 Coronilla 63
 Coronopus 38
 Corrigiola 19
 Corydalis 30
 Corylus 8
 Corynephorus 181
 Cotula 140
 Crambe 39
 Crassula 40
 Crataegus 45
 Crepis 152
 Cressa 99
 Crithmum 87
 Crocus 164
 Crucianella 121
 Cruciata 123
 Crupina 145
 Crypsis 185
 Cryptogramma 3
 Cupressus 6
 Cuscuta 99
 Cutandia 172
 Cyclamen 93
 Cymbalaria 116
 Cymodocea 156
 Cynanchum 98
 Cynara 145
 Cynodon 185
 Cynoglossum 104
 Cynomorium 83
 Cynosurus 174
 Cyperus 188
 Cystopteris 4
 Cytinus 10
 Cytisus 48
 Dactylis 174
 Dactylorhiza 193
 Damasonium 154
 Daphne 75
 Dasypyrum 178
 Datura 113
 Daucus 91
 Delphinium 25
 Deschampsia 180
 Descurainia 33
 Dianthus 24
 Digitalis 117
 Digitaria 185
 Diplotaxis 38
 Dipsacus 127

Doronicum 141
 Dorycnium 61
 Draba 36
 Dracunculus 186
 Drosera 40
 Dryopteris 5
 Ecballium 80
 Echinaria 175
 Echinochloa 185
 Echinophora 86
 Echium 102
 Elaeoselinum 90
 Elatine 80
 Eleocharis 188
 Emex 12
 Ephedra 6
 Epilobium 82
 Epipactis 193
 Equisetum 1
 Eragrostis 185
 Erianthus 186
 Erica 92
 Erigeron 134
 Erinus 117
 Erodium 65
 Erophila 36
 Eruca 39
 Eryngium 85
 Erysimum 33
 Eucalyptus 81
 Euonymus 72
 Eupatorium 133
 Euphorbia 68
 Euphrasia 118
 Evax 134
 Exaculum 97
 Fedia 126
 Ferula 90
 Festuca 171
 Ficus 8
 Filago 134
 Foeniculum 87
 Fragaria 45
 Frankenia 80
 Fraxinus 97
 Fuirena 188
 Fumana 79
 Fumaria 30
 Gagea 157
 Galactites 145
 Galeopsis 108
 Galinsoga 138
 Galium 121
 Gastridium 181
 Gaudinia 179
 Genista 48
 Gennaria 193
 Gentiana 98
 Geranium 64
 Geum 44
 Gladiolus 165
 Glaucium 30
 Glechoma 110

Glinus 16
 Globularia 121
 Glyceria 175
 Glycyrrhiza 50
 Gomphocarpus 98
 Gnaphalium 135
 Gratiola 114
 Gymnadenia 193
 Gymnocarpium 5
 Gypsophila 23
 Hainardia 183
 Halimione 14
 Halimium 78
 Halocnemum 14
 Halopeplis 14
 Hedera 83
 Hedypnois 148
 Hedysarum 64
 Helianthemum 78
 Helianthus 138
 Helichrysum 136
 Heliotropium 101
 Hellebörus 24
 Hepatica 25
 Hermodactylus 163
 Herniaria 20
 Hesperis 33
 Hibiscus 75
 Hieracium 152
 Hippocrepis 63
 Hirschfeldia 39
 Holcus 181
 Holosteum 17
 Hordelymus 178
 Hordeum 178
 Hornungia 36
 Humulus 9
 Huperzia 1
 Hyacinthus 159
 Hydrocotyle 85
 Hymenocarpus 62
 Hymenolobus 36
 Hyoscyamus 112
 Hyoseris 148
 Hyparrhenia 186
 Hypecoum 30
 Hypericum 76
 Hypochoeris 149
 Iberis 37
 Ilex 72
 Illecebrum 20
 Imperata 186
 Inula 136
 Iris 163
 Isatis 33
 Isoetes 1
 Jasione 129
 Juglans 7
 Juncus 165
 Juniperus 6
 Kerneria 36
 Kickxia 116

Knautia 127
 Koeleria 179
 Kundmannia 88
 Lactuca 151
 Lagurus 180
 Lamarckia 174
 Lamium 108
 Lamyropsis 144
 Lapsana 147
 Laserpitium 90
 Lathyrus 53
 Laurentia 129
 Laurus 29
 Lavandula 112
 Lavatera 74
 Learsia 185
 Legousia 128
 Lemna 187
 Lens 52
 Leontodon 149
 Lepidium 37
 Leucanthemopsis 140
 Leucanthemum 140
 Leucojum 193
 Leucorchis 193
 Leuzea 145
 Ligusticum 90
 Lilium 158
 Limodorum 193
 Limoniastrum 96
 Limonium 95
 Linaria 115
 Linum 67
 Lippia 105
 Listera 193
 Lithospermum 101
 Littorella 125
 Lobularia 36
 Lolium 171a
 Ionicera 125
 Lophochloa 179
 Lotus 62
 Ludwigia 82
 Lunaria 35
 Lupinus 49
 Luzula 167
 Lychnis 21
 Lycium 112
 Lycopersicon 113
 Lycopus 111
 Lygeum 184
 Lysimachia 93
 Lythrum 81
 Magydaris 88
 Malcolmia 34
 Malope 73
 Malus 45
 Malva 73
 Mandragora 113
 Mantisalca 145
 Maresia 34
 Marrubium 107
 Marsilea 5

Matricaria 140
 Matthiola 34
 Medicago 56
 Melampyrum 118
 Melica 175
 Melilotus 55
 Melissa 110
 Melittis 108
 Menta 111
 Mercurialis 68
 Mesembryanthemum 16
 Mespilus 45
 Micromeria 110
 Micropus 134
 Miliun 184
 Minuartia 17
 Misopates 115
 Moehringia 17
 Moenchia 18
 Molinia 184
 Molinierella 180
 Moneses 92
 Monotropa 92
 Montia 16
 Morisia 39
 Morus 8
 Muscari 159
 Myagrum 33
 Mycelis 151
 Myoporum 120
 Myosotis 103
 Myosoton 18
 Myriophyllum 83
 Myrrhoides 86
 Myrtus 81
 Najas 156
 Nananthea 140
 Nardurus 172
 Narcissus 163
 Nardurus 172
 Narthecium 156
 Nasturtium 34
 Naufraga 85
 Nectaroscordon 161
 Neotinea 194
 Neottia 193
 Nepeta 109
 Nerium 98
 Neslia 36
 Nicotiana 113
 Nigella 24
 Notobasis 144
 Nuphar 24
 Nymphaea 24
 Nymphoides 98
 Ocimum 112
 Odontites 119
 Oenanthe 87
 Oenothera 82
 Olea 97
 Ononis 54
 Onopordum 145
 Ophioglossum 1

Ophrys 196
 Opopanax 90
 Orchis 194
 Origanum 111
 Orlaya 91
 Ornithogalum 159
 Ornithopus 63
 Orobanche 119
 Oryzopsis 184
 Osmunda 2
 Ostrya 8
 Osyris 9
 Otanthus 139
 Oxalis 64
 Paeonia 29
 Pallenis 137
 Pancratium 163
 Panicum 185
 Papaver 29
 Parapholis 183
 Parentucellia 119
 Parietaria 9
 Paris 162
 Paronychia 19
 Parthenocissus 73
 Paspalum 185
 Pastinaca 90
 Pedicularis 119
 Peganum 6
 Petasites 141
 Petrorrhagia 23
 Petroselinum 89
 Peucedanum 90
 Phagnalon 135
 Phalaris 183
 Phegopteris 3
 Phillyrea 97
 Phleum 182
 Phlomis 108
 Phragmites 184
 Phyllitis 4
 Physalis 113
 Physospermum 88
 Phyteuma 129
 Phytolacca 16
 Picnemon 144
 Picris 149
 Pilularia 5
 Pimpinella 86
 Pinguicula 121
 Pinus 5
 Pistacia 72
 Pisum 54
 Plagius 140
 Plantago 124
 Platanthera 193
 Platanus 40
 Platycapnos 31
 Plumbago 94
 Poa 172
 Podospermum 148
 Polycarpon 20
 Polycnemum 13
 Polygala 71

Polygonatum 162	Saponaria 138	Telina 48
Polygonum 10	Sarcopoterium 44	Tetragonolobus 62
Polypodium 5	Satureja 110	Teucrium 106
Polypogon 182	Saxifraga 42	Thalictrum 29
Polystichum 4	Scabiosa 127	Thapsia 91
Populus 7	Scandix 86	Theligonum 83
Portulaca 16	Schoenus 188	Thelypteris 3
Posidonia 155	Scilla 158	Thesium 9
Potamogeton 155	Scirpus 187	Thlaspi 37
Potentilla 44	Scleranthus 19	Thymelaea 75
Prasium 107	Scolymus 147	Thymus 111
Prenanthes 152	Scorpiurus 64	Tilia 73
Primula 93	Scorzonera 148	Tolpis 147
Prunella 110	Scrophularia 114	Tordylium 90
Prunus 45	Scutellaria 107	Torilis 91
Pseudorhiza 92	Securigera 62	Tragopogon 148
Psilurus 174	Sedum 41	Tragus 185
Psoralea 50	Selaginella 1	Tribulus 67
Pteridium 3	Sempervivum 40	Trifolium 58
Pteris 3	Senecio 141	Triglochin 155
Ptilostemon 144	Serapias 195	Trigonella 56
Ptychotis 89	Sesamoides 40	Trisetum 179
Puccinellia 174	Seseli 87	Tuberaria 78
Pulicaria 137	Sesleria 175	Tulipa 158
Pulsatilla 25	Setaria 186	Turgenis 91
Punica 82	Sherardia 121	Tussilago 141
Pycnocomon 128	Sideritis 108	Typha 187
Pyrola 92	Silene 21	Tyrimnus 145
Pyrus 45	Silybum 145	Ulex 49
Quercus 8	Simethis 157	Ulmus 8
Radiola 67	Sinapis 39	Umbilicus 40
Rnunculus 26	Sison 89	Urginea 158
Raphanistrum 26	Sisymbrium 33	Urospermum 149
Raphanus 39	Smilax 162	Urtica 9
Reichardia 151	Smyrnum 86	Vaccaria 23
Reseda 40	Solanum 113	Vaccinium 93
Rhagadiolus 148	Soleirolia 9	Valantia 124
Rhamnus 72	Solidago 133	Valeriana 126
Rhynchosinapis 39	Sonchus 150	Valerianella 125
Ricinus 68	Sorbus 45	Velezia 24
Ridolfia 89	Sorghum 186	Ventenata 179
Robinia 49	Sparganium 187	Verbascum 114
Romulea 164	Spartina 185	Verbena 104
Rorippa 34	Spartium 49	Veronica 117
Rosa 43	Spergula 20	Viburnum 125
Rosmarinus 112	Spergularia 20	Vicia 50
Rouya 91	Sphenopus 172	Vinca 98
Rubia 124	Spiranthes 193	Vincetoxicum 99
Rubus 43	Spirodela 187	Viola 76
Rumex 11	Sporobolus 185	Viscum 10
Rupia 155	Stachys 108	Vitex 104
Ruscus 162	Stellaria 17	Vitis 73
Ruta 71	Sternbergia 162	Vulpia 171a
Sagina 18	Stipa 184	Vulpiella 172
Sagittaria 154	Streptopus 161	Wahlenbergia 129
Salicornia 15	Suaeda 15	Withania 113
Salix 7	Succowia 39	Wolffia 187
Salsola 15	Symphytum 102	Xanthium 138
Salvia 112	Taeniatherum 178	Xeranthemum 147
Sambucus 125	Tamarix 80	Zannichellia 155
Samolus 93	Tamus 163	Zostera 155
Sanguisorba 44	Tanacetum 140	Zygophyllum 67
Sanicula 85	Taraxacum 150	
Santolina 138	Taxus 6	
	Teesdalia 37	

- Grenene leddede. Bladene modsatte, m.m. reducerede 2.
- " ikke leddede. Bladene ikke skælformet reducerede 4.
- Urteagtig enårig Salicornia
- Flerårig, i hvert fald med forveddet grund 3.
- Aksene med mange, kugle- til ægformede sideskud .. Halocnemum
- " uden sideskud Arthrocnemum
- Bladene små, halvkugleformede, tiltrykte stænglen Halopeplis
- " flade eller trinde 5.
- Bladene flade, m.m. stilkede 6.
- " trinde, uden tydelig stilk 9.
- Hunblomsten omgivet af 2 forblade, der forøges i frugt 7.
- Frugten uden sådanne forblade 8.
- Forbladene frie, i det mindste i deres øvre halvdel Atriplex
- " næsten helt sammenvoksede Halimione
- Frugtblosteret fortykket, sammenvokset med frugten Beta
- " ikke fortykket, ikke sammenvokset Chenopodium
- Bladene sylformede, ikke kødede 10.
- " kødede 11.
- Flerårig med forveddet grund. 4-talligt bloster Camphorosma
- Enårig. Blosteret 5-talligt Polycnemum
- Frugtblosteret med veludviklede tværvinger Salsola
- " uden blosteragtige tværvinger 12.
- Planten dunet som ung. Frugtblosterbladene med en påsat spids Bassia
- Planten glat. Frugtblosterbladene uden påsat spids Suaeda

CARYOPHYLLACEAE

- Fodflige til stede 2.
- " mangler 9.
- Alle blade spredte Corrigiola
- I det mindste de nedre blade modsatte eller i krans 3.
- Bladene linjeformede 4.
- " brede og flade 6.
- De 3 ydre bægerblade med hætte og brodspids Chaetonychia
- Bægerbladene ens og normale 5.
- 3 grifler. Fodfligene sammenvoksede Spergularia
- 5 " " frie Spargula
- Blomsterne i stilkede, endestillede kvaste Polycarpon
- " i siddende nøgler 7.
- Bægerbladene hvide og svampede og brodspidsede ... Illecebrum
- " ikke hvide 8.
- Blomsterne med tydelige, hindeagtige støtteblade Paronychia
- Blomsterne støtteblade uanselige Herniaria
- Bægerbladene næsten eller helt frie 10.
- " sammenvoksede 22.
- 2 grifler 11.
- 3-5 grifler 12.
- Ingen kronblade. 5-tallige blomster Scleranthus
- Med kronblade. 4-tallige blomster Bufonia
- Kronbladene kløvede eller tandede 13.
- " hele, svagt udrandede eller manglende 16.
- Blomsterne i skærm. Enårig. Tandede kronblade Holosteum
- " i kvast eller enlige 14.
- Kronbladene under halvt kløvede Cerastium
- " mindst " " 15.
- 5 grifler Myosoton
- 3 " Stellaria
- 4-5 grifler 17.
- 3 " 18.
- Bægeret bredt hindekantet Moenchia
- " næppe " Sagina
- Stænglen med en hårstribet. Enårig. Kronløs Stellaria
- " anderledes håret 19.

19. Bladene sylformede Minuartia
" bredere; elliptiske, ægformede eller runde 20.
20. Kirteldunet flerårig. Kronen oftest lyserød Minuartia
Højst lidt kirteldunet. Kronen hvid 21.
21. Alle bagerblade bredt hindekantede Moehringia
Højst de indre bagerblade bredt hindekantede Arenaria
22. 3-5 grifler 23.
2 25.
23. Bægeretænderne mindst af bægerrørets længde Agrostemma
" ikke forlængede 24.
24. 6-10 kapseltænder. Mest 3, sjældnere 5 grifler Silene
5 kapseltænder og 5 grifler Lychnis
25. Blomsten med yderbæger 26.
" uden " 27.
26. Bægerets ribbemellemrum ikke hindeagtige Dianthus
" " hindeagtige Petrorhagia
27. Bægeret krukkeformet med 5 brede vinger. Enårig Vaccaria
" uvinget 28.
28. Bægerets ribbemellemrum hindeagtige Gypsophila
" " ikke hindeagtige 29.
29. Bægeret rørformet, højst 1,2mm bredt Velezia
" bredere Saponaria

SOLANACEAE

1. Støvdragerne sammenbøjede 2.
" adskilte 4.
2. Kronen klokkeformet. Småbusk Withania
" hjul- eller tragtformet 3.
3. Bladene 2 x fjersnitdelte Lycopersicon
" hele til 1 x delte Solanum
4. Blomsterne i toppe eller klaser 5.
" enlige eller i små nøgler 6.
5. Kronen rør- eller smalt tragtformet. Bladene hele .. Nicotiana
" bredt tragtformet. Bladene tandede til indskårne Hyoscyamus
6. Ofte tornet busk Lycium
Urter 7.
7. Stængelløs rosetplante Mandragora
Med bladet stængel 8.
8. Frugten en kapsel. Enårig. Kronen 4-19cm, tragtformet Datura
" et bær 9.
9. Bægeret omvokser bærret som en slags kapsel Physalis
" " ikke bærret Atropa

SCROPHULARIACEAE

1. Kronen m.m. hjulformet med kort kronrør, næsten regelmæssig 2.
" ikke hjulformet 3.
2. 4-5 støvdragere. Kronen 5-tallig, gul Verbascum
2 " 4-tallig, mest blå Veronica
3. Kronrøret med en spore eller pukkel ved grunden 4.
" uden " " " 10.
4. Kronrøret ikke lukket af en pukkel 5.
" lukket af en pukkel 6.
5. Nedre blade mest modsatte, ikke rosetdannende ... Chaenorhinum
" " spredte. Med en veludviklet roset Anarrhinum
6. Kronen med en but pukkel ved grunden 7.
" " spids spore " " 8.
7. Enårig. Bægerfligene længere end kronrøret Misopates
Flerårig. Bægerfligene kortere end kronrøret Antirrhinum
8. Bladene smalle, m.m. siddende Linaria
" brede og stilkede 9.
9. Bladene ikke lappede, stilken kortere end pladen Kickxia
" lappede, stilken længere end pladen Cymbalaria

10. Bægeret med 4 tydelige og m.m. ens tænder 11.
" 5-tandet eller tolåbet 14.
11. Blomsterne i ensidige aks Odontites
" ikke i ensidige aks 12.
12. Kronens overlåbe med 2 skråt oprette lapper Euphrasia
" " hel eller udrandet 13.
13. Bægeret klokkeformet. Kronen hvid og lyserød Bellardia
" rørformet. Kronen rød eller gul Parentucellia
14. Kronrøret kort og m.m. kugleformet, længere end læberne Scrophularia
Kronrøret rør- til tragtformet 15.
15. Stængelbladene modsatte Gratiola
" spredte 16.
16. Blomsterne oprette, 6-9mm, lyserøde Erinus
" nikkende, 10-40mm Digitalis

RUBIACEAE

1. Blomsterne siddende i tætte aks Crucianella
" ikke i aks, mest i grenede stande 2.
2. Frugten omgivet af blade eller af en tornet udvækst
fra frugtstilken. Enårig 3.
Frugten fri og synlig 4.
3. Kronen lyseblå. Blomsterne i endestillede hoveder Sherardia
" hvidgul. " akselstillede Valantia
4. Frugten et bær. Kronen 5-fliget Rubia
" tør. Kronen 4-fliget 5.
5. Kronfligene lig eller kortere end kronrøret 6.
" længere end kronrøret 8.
6. Bladene i kranse på 2-4 Asperula
" " " 6-8 7.
7. Blomsterne i hoveder, oftest blå Asperula
" i kvaste, ikke blå Galium
8. Kransene med 4 blade. Gule blomster i korte kvaste Cruciata
Anderledes Galium

CAMPANULACEAE

1. Kronen delt næsten til grunden 2.
" højst halvt delt 3.
2. Blomsterknopperne rette. Kronfligene hurtigt frie ... Jasione
" krumme. " forbundne øverst Phyteuma
3. Kronen 10-30mm Campanula
" 3-7mm 4.
4. Planten stivhåret. Blomsterne m.m. siddende Campanula
" glat. Blomsterne langstilkede Wahlenbergia