REJSEFLORA

FOR

RUMÆNIEN

Denne rejseflora er lavet pa grundlag af Flora Europaea og Flora Romaniei af Al. Beldie, en ekskursionsflora i 2 små bind. Bogens første bind, omhandlende de Frikronede, er lagt an efter Flora Europaea, mens det sidste bind fra 1979 med de Helkronede og Enkimbladede er uafhængigt af Flora Europaea, og her har jeg nu og da fulgt Flora Romanieis artsopfattelser. Hyppighedsangivelser og blomstringstider stammer fra samme flora. Hvad de sidste angår, så forekommer de undertiden noget tilfældigt anbragte. For eksempel skulle Vårbrunrod blomstre i VI-VII i følge ekskursionsfloraen.
Jeg har nogle gange gengivet udbredelsesforholdene for mindre almindelige arter. Her står "Jud." for amt, "M." for bjærg eller bjærgkæde og "V." for dal. Flora Romaniei ville være udmærket som supplerende flora, da den også indeholder en del småtegninger, men den kan desværre ikke fås mere.

December 1999

Mogens Thornberg

1.

LYCOPODIACEAE

1. Stænglen gaffelgrenet, opstigende eller opret. Sporehusene ved grunden af almindelige blade ..... H. selago
   Stænglen ikke gaffelgrenet, men krybende med korte sidegrene. Sporehusene i særlige, endestillede aks 2.
2. Stænglen med modsatte, skælagtige blade i 4 rækker ..... 3.
   " " skruestillede blade 5.
3. Aksene enlige og siddende ..... D. alpinum
   " stilkede, ofte flere sammen 4.
4. Blågrøn. De tyndere grene 1,2-1,5mm brede, let affladede D. tristachyum
   Friskgrøn til gulgrøn. De tyndere grene 2-3mm brede, tydeligt affladede D. complanatum
5. Bladene opadrettede. Sporebladene så store som almindelige blade Le. inundata
   Bladene alsidigt vendte. Sporebladene mindre end de andre 6.
6. Bladspidsen hårformet forlænget. Aksene siddende ..... Ly. clavatum
   " spids eller tilspidset. Aksene stilkede Ly. annotinum

Huperzia selago (L.) Bernh. Otteradet ulvefod. VII-IX. Spredt.

Lepidotis inundata (L.) C.Börner Liden ulvefod. VII-IX. Sj.

Lycopodium annotinum L. Femradet ulvefod. VII-IX. Spredt.

L. clavatum L. Almindelig ulvefod. VII-IX. Spredt.

Diphasium complanatum (L.) Rothm. Flad ulvefod. VII-IX.

D. tristachyum (Pursh) Rothm. Cypresulvefod. VII-IX.

D. alpinum (L.) Rothm. Bjærgulvefod. 5-15cm. Skuddene i tætte bundter, med kvadratisk tværsnit, med 4 rækker nogenlunde lige store blade. Spr.

SELAGINELLACEAE

Selaginella selaginoides (L.) Link Nordisk dværgulvefod. 5-15cm. Bladene skruestillede, 1½-3mm, med 1-5 par store tænder. Mosagtig plante. VII-IX. Alm. i bjærgene.

S. helvetica (L.) Link Svejtsisk dværgulvefod. 4-10cm. Skuddene krybende med toradede blade. Aksene smalle, på oprette stilke. VI-VIII. Alm.

EQUISETACEAE

Equisetum. Padderokke. Nøgle til grønne skud.

1. Stænglen ikke eller lidet forgrenet ..... 2.
   " stærkt grenet 4.
2. Stænglen uden fremtrædende ribber ..... fluviatile
   " med tydelige ribber 3.
3. Stænglen tyk og trind. Bladkransene med over 8 tænder .... hiemale
   " spinkel og kantet. Bladkransene med 3-8 tænder variegatum
4. Stængelskedernes tænder færre end furerne ..... silvaticum
   " " så mange som furerne 5.

5. Stænglen ca.10mm tyk, med 20-40 fine ribber ..... telmateia
" sjældent over 7mm tyk, med under 20 tydelige ribber 6.
6. Stænglens midterhulrum over 2/3 x stængelbredden ..... fluviatile
" " under 2/3 x " 7.
7. Grenenes nederste led meget kortere end stængelskederne ..... 8.
" " " " længere " " 9.
8. Stængelskedernes tænder 1/3-2/3 x røret ..... palustre
" " højst 1/3 x røret ramosissimum
9. Grenene mest med 4 sylformede tænder ..... arvense
" " " 3 kort trekantede tænder pratense

Equisetum hiemale L. Skavgræs. Alm.

E. ramosissimum Desf. Grenpadderokke. 10-100cm. Stænglerne ru og hårde, mørkegrønne og uregelmæssigt grenede. Sidegrenenes skeder ofte let oppustede, med trådformede tandspidser. Akset 6-12mm, brodspidset. Spr.

E. variegatum Schleicher Liden padderokke. Sj.

E. fluviatile L. Dyndpadderokke. Alm.

E. palustre L. Kærpadderokke. Alm.

E. silvaticum L. Skovpadderokke. Alm.

E. pratense Ehrh. Lundpadderokke. Spredt.

E. arvense L. Agerpadderokke. Alm.

E. telmateia Ehrh. Elfenbenspadderokke. Alm.

FILICES

1. Fritflydende vandplanter ..... 2.
Rodfæstede land- eller sumpplanter 3.
2. Bladene modsatte, ca. 1cm lange (10-14x6-9mm), helrandede Salvinia
" spredte, toradede og taglagte, få mm lange Azolla
3. Firkløveragtige blade fra en krybende stængel ..... Marsilea
Bladene ikke firkløveragtige 4.
4. Sporehusene samlede på en omdannet, endestillet bladdel ..... 5.
" i sporehobe på bladets underside eller rand 6.
5. Den grønne del af bladet udelt og helrandet ..... Ophioglossum
" " " " " 1-4 x delt Botrychium
6. Sporehobene helt dækkede af tætsiddende skæl ..... 7.
" synlige eller dækkede af bladranden 8.
7. Bladet 1 x delt ..... Ceterach
" 2 x " Notholaena
8. Sporebærende og golde blade stærkt forskellige ..... 9.
" " " " m.m. ens 10.
9. Bladene 1 x delte ..... Blechnum
De golde blade 2 x delte Matteuccia
10. Sporehobene dækkede af den omrullede bladrand ..... Pteridium
" ligger frit på bladundersiden 11.
11. Sporehobene aflange eller linjeformede ..... 12.
" m.m. runde 14.

12. Bladet udelt og helrandet ..... Phyllitis
" 1-4 x delt 13.
13. Større bregne. Sløret med frynset rand .... Athyrium filix-femina
Mindre bregner (indtil 40cm). Sløret helrandet Asplenium
14. Sporehobene uden slør ..... 15.
" med et hindeagtigt slør eller en hårkrans 18.
15. Bladene 1 x delte ..... Polypodium
" 2-4 x delte 16.
16. Bladfligene mindre nedad ..... Athyrium distentifolium
De nedre bladflige størst 17.
17. Bladet 3 x delt , m.m. ligesidet trekantet ..... Gymnocarpium
" 2 x " , lancetformet trekantet Thelypteris phegopteris
18. Sløret består af en ring af hår ..... Woodsia
" hindeagtigt, dækker sporehoben 19.
19. Bladene 2 x delte med næsten helrandede afsnit ..... Thelypteris
" med tandede afsnit 20.
20. Sløret skjoldformet og midtfæstnet ..... Polystichum
" ikke skjoldformet 21.
21. Sløret hætteformet, fæstnet på den ene side ..... Cystopteris
" nyreformet Dryopteris

Ophioglossum vulgatum L. Slangetunge. VI-VII. Spredt.

Botrychium. Månerude.

1. Bladet fæstnet nederst på stilken, 2-3 x delt ..... multifidum
" " midt på stilken 2.
2. Bladet 3 x delt. Planten mest over 20 cm høj ..... virginianum
" 1-2 x delt. Planten højst 20cm 3.
3. Bladet 1 x delt med vifteformede afsnit ..... lunaria
" 2 x " " m.m. spidse " matricariifolium

Botrychium lunaria (L.) Swartz Alm. månerude. V-IX. Alm.

B. matricariifolium A.Braun Kamillebladet månerude. VI-VII. Sj.

B. multifidum (Gmelin) Rupr. Stilkmånerude. VII-IX. Spredt.

B. virginianum (L.) Swartz Stor månerude. 20-80cm. Bladet nedbøjet, trekantet, bredere end langt, svagt håret. VI-VIII. Sj.

Notholaena marantae (L.) Desv. (Cheilanthes m.) Pelsbregne. 4-35cm. Bladpladen linje-lancetformet, omtrent af den mørkebrune stilks længde, med glat, mørkegrøn overside og tæt lysskællet underside. VI-IX. Sj.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Ørnebregne. VII-IX. Alm.

Thelypteris limbosperma (All.) H.P.Fuchs Bjærgmangeløv. 30-100cm. Tueformet. Bladstilken 1/4-1/10 x pladen, brunskællet. VII-VIII. Spredt.

T. palustris Schott Kærmangeløv. 20-80cm. Bladene spredte på en krybende jordstængel. Stilken ca. = pladen, uskællet. VII-IX. Spredt.

T. phegopteris (L.) Slosson Dunet egebregne. VII-VIII. Alm.

Asplenium. Radeløv.

1. Bladet uregelmæssigt gaffeldelt ..... septentrionale
" 1-4 x fjersnitdelt 2.
2. Bladet 1 x fjersnitdelt ..... 3.
" 2-4 x fjersnitdelt 5.
3. Bladstilken næsten helt grøn ..... viride
" sortbrun 4.
4. Bladskaftet helt sortbrunt ..... trichomanes
" grønt øverst oppe adulterinum
5. Bladstilken overvejende grøn ..... 6.
" brunsort til rødbrun 7.
6. Bladpladen tynd, m.m. kirtelhåret ..... lepidum
" ret kraftig, oftest glat ruta-muraria
7. Bladene bløde og matte. De yderste flige kile-vifteformede cuneifolium
Bladene stive og skinnende. De yderste flige æg-lancetformede 8.
8. Bladene stærkt skinnende. De yderste flige udtrukne ..... onopteris
" skinnende. Fligene ikke udtrukne adiantum-nigrum

Asplenium trichomanes L. Rundfinnet radeløv. VI-IX. Alm. 3 underarter:
ssp. inexpectans Lovis: Bladpladen brat afskåret foroven. Yderste afsnit bredt og iøjnefaldende. Mest på kalk.
ssp. trichomanes: Bladpladen jævnt tilspidset. Afsnittene rundagtige; de øvre adskilte og skævt påsatte. Mest kalksky.
ssp. quadrivalens D.E.Meyer: Bladpladen jævnt tilspidset. Afsnittene aflange og parallelsidede; de øvre tætstillede. Mest på kalk.

A. adulterinum Milde Brunt radeløv. 4-20cm. Den forreste 1/10-1/3 af bladskaftet grønt, ellers sortebrunt. På serpentin. VII-VIII. Sj.

A. viride L. Grønt radeløv. 5-15cm. Bladfligene ca. 5mm, lysegrønne. VII-VIII. Alm.

A. adiantum-nigrum L. Sort radeløv. VII-VIII. Spredt.

A. onopteris L. Fjerradeløv. 10-40cm. Ligner foregående meget, men afsnittene noget opadbøjede, de yderste piskeformet udtrukne.VII-VIII.Sj.

A. cuneifolium Viv. Kileradeløv. 8-15cm. Lysere i det end de 2 foregående. Kan minde om en stor Murrude. Mest på serpentin. VII-VIII.

A. septentrionale (L.) Hoffm. Nordisk radeløv. VII-VIII. Alm.

A. ruta-muraria L. Murrude. VII-IX. Alm.

A. lepidum C.Presl Kirtelradeløv. 3-10cm. Ligner meget foregående, men bladene oftest med mange, kortstilkede kirtler. VII-IX. Sj.

Ceterach officinarum DC. Miltbregne. 5-15cm. Tæt roset. Bladene læderagtige og mørkegrønne ovenpå, rustfiltede nedenunder, 1 x delte med butte flige, der er kun lidt længere end brede. VI-VIII. Spredt.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Hjortetunge. 20-60cm. Bladene stedsegrønne, udelte, med hjærteformet grund. Linjeformede sporhobe. Spredt.

Athyrium filix-femina (L.) Roth Fjerbregne. Sporehobene aflange med blivende slør. VII-IX. Alm.

Athyrium distentifolium Tausch Fjældfjerbregne. 50-150cm. Ligner foregående, men sporehobene runde og sløret meget tidligt affaldende.Spr.

Cystopteris. Bægerbregne.

1. Planten tueformet. Bladstilken kortere end pladen ..... 2.
   Krybende jordstængel. Spredte blade. Stilken længere end pladen 3.
2. Bladstrengene udmunder i bladtænder ..... fragilis
   " " i indbugtninger alpina
3. Bladet mørkegrønt. Afsnittene udad tilsmalnede ..... montana
   " gulgrønt. Afsnittene delvist parallelsidede sudetica

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Alm. bægerbregne. VII-IX. Alm.

C. alpina (Wulf.) Lk. (C. regia) Alpebægerbregne. Ligner foregående meget, men med udrandede spidser på bladafsnittene. På kalk. VII-IX.

C. montana (Lam.) Desv. Bjærgbægerbregne. 10-40cm. Bladene enlige, 3 x delte, med bredt 3-5-kantet omrids. Afsnittenes inderste småafsnit længere end de ydre. VII-VIII. Spredt.

C. sudetica A.Br.& Milde Sudetisk bægerbregne. 20-40cm. Som foregående, men omridset bredt 3-kantet. Afsnittenes småafsnit nogenlunde lige store hele vejen. VII-VIII. Sj.

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Strudsevinge. VII-IX. Spredt.

Polystichum. Skjoldbregne. Ligner gennemgående Mangeløv, men småafsnittene usymmetriske og stærkere brodspidsede.

1. Bladet 1 x delt ..... lonchitis
   " 2-3 x delte 2.
2. Bladet blødt, håret på begge sider, overvintrer ikke ..... braunii
   " stift, glat på oversiden 3.
3. Småafsnittene tydeligt stilkede, ikke nedløbende ..... setiferum
   " m.m. siddende og nedløbende aculeatum

Polystichum lonchitis (L.) Rothm. Krumfinnet skjoldbregne. 15-60cm. Bladet stift og overvintrende, med 15-50 par seglformede flige.VII-IX.

P. aculeatum (L.) Roth Alm. skjoldbregne. 30-90cm. De nederste flige 1/2-1/3 kortere end de midterste. VII-VIII. Alm.

P. setiferum (Forsskål) Woynar Blød skjoldbregne. 30-120cm. Som aculeatum, men de nederste flige kun lidt kortere end de midterste. Alm.

P. braunii (Spenner) Fée Håret skjoldbregne. VII-VIII. Spredt.

Woodsia. Frynsebregne.

1. Bladstilken grønlig til stråfarvet, stort set glat ..... pulchella
   " rødbrun, m.m. beklædt med skæl og hår 2.
2. Bladundersiden med hår og skæl ..... ilvensis
   " kun med hår alpina

Woodsia ilvensis (L.) R.Br. Alm. frynsebregne. 4-20cm. Ligner en lille Bægerbregne. Bladet mørke- til brunliggrønt. Længste bladafsnit med

4-8 par lapper. VII-VIII. Sj.

Woodsia alpina (Bolton) S.F.Gray Fjældfrynsebregne. 5-15cm. Bladet bleg- til gulliggrønt. Afsnittene med 1-4 par lapper. M.Maramureş.

W. pulchella Bertol. Glat frynsebregne. 3-12cm. Bladet oftest gulgrønt og gennemskinneligt. Ligner et lille Grønt radeløv. Længste afsnit 4-7 mm, med 2-7 par lapper eller flige. VII-VIII. M.Bucegi: Bucşoiu. M.sj.

Dryopteris. Mangeløv.

1. Bladene 1-2 x delte ..... 2.
   " 3-4 x " forneden 4.
2. 10-20 par flige. Golde og sporebærende blade lidt uens .. cristata
   20-35 " " . Bladene ens 3.
3. En sort plet inderst på undersiden af fligenes midterribbe affinis
   Ingen sådan sort plet filix-mas
4. Bladstilkens skæl ensfarvet lyse ..... 5.
   " " med mørk midterribbe eller grund 6.
5. Tænderne ikke brodspidsede, lange, smalle og spidse ... submontana
   " brodspidsede carthusiana
6. Bladet smalt lancetformet. En sort plet inderst på undersiden af fligenes midterribbe ..... remota
   Bladet trekantet til æg-lancetformet. Ingen sådan sort plet 7.
7. Bladet lysegrønt. Nederste afsnits inderste nedre småafsnit 1/2 x hovedafsnittet ..... expansa
   Bladet mørkegrønt. Nederste afsnits inderste nedre småafsnit kortere end 1/2 x hovedafsnittet dilatata

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Alm. mangeløv. VII-IX. Alm.

D. affinis (Lowe) FJ Guldskælsmangeløv. 30-100cm. Bladstilk og skaft tæt skællede af rødlige til kastanjebrune skæl. VII-IX.

D. submontana (FJ & Jermy) FJ. Melet mangeløv. 20-60cm. Bladstilken mest 1/2 x pladen eller lidt længere, tæt kirtlet og skællet. Bladpladen mørkegrøn, tæt dækket af citronduftende kirtler og lidt klæbrig.

D. cristata (L.) Gray Butfinnet mangeløv. VII-IX. Sj.

D. remota (A.Br.) Druce 30-90cm. Bladet mørkegrønt. Småafsnittene svagt lappede. Den sorte plet 2-8mm lang, forsvinder ved tørring.

D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs Smalbladet mangeløv. VII-IX. Alm.

D. dilatata (Hoffm.) A.Gray Bredbladet mangeløv. VII-IX. Spredt.

D. expansa (Presl) FJ & Jermy Finbladet mangeløv. VII-IX.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Tredelt egebregne. Lysegrøn. Nederste afsnits største sideflig med 6-10 par lapper. VII-VIII. Alm.

G. robertianum (Hoffm.) Newm. Kalkegebregne. 10-30cm. Bladet har samme udseende som hos foregående, men er mørkegrønt. Nederste afsnits største sideflig mest med 10-20 par lapper. Bladskaftet kortkirtlet.

Blechnum spicant (L.) Roth Kambregne. VII-IX. Spredt.

Polypodium vulgare L. Almindelig engelsød. Bladafsnittene rører ofte kun hinanden med hindekanten. VII-IX. Alm.

P. interjectum Shivas Storbladet engelsød. Bladafsnittene rører hinanden med det grønne bladkød. VII-IX. M.sj.

Marsilea quadrifolia L. Kløverbregne. En krybende jordstængel med grupper af 7-20cm langt stilkede firkløverblade. Fra jordstænglen udgår nogle 1-2cm langt stilkede, runde sporefrugter. IX-X. Spredt.

Salvinia natans (L.) All. Svømmeblad. Enårig vandplante. Stænglen 5-10 cm lang med finvortede, elliptiske til ægformede blade på 10-14mm. Sporehobe ved bladenes grund. VI-IX. Alm.

Azolla filiculoides Lam. Stor andemadsbregne. 1-10cm. Grenet, levermoslignende flydeplante med rødder. De øvre bladlapper butte med bred hindekant. VIII-X. Indslæbt.

A. caroliniana Willd. Liden andemadsbregne. 7-25mm. De øvre bladlapper halvspidse, med meget smal hindekant. VIII-X. Indslæbt.

PINACEAE

Abies alba Miller Almindelig ædelgran. Alm.

Picea abies (L.) Karsten Rødgran. Alm.

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco Douglasgran. Dyrket.

Larix decidua Miller Europæisk lærk. Spredt

Pinus. Fyr.

1. Nålene i knipper på 5 ..... 2.
   " " " " 2 3.
2. Nålene 5-8cm, stive. Barken rødliggrå ..... cembra
   " 5-14cm, bløde. Barken grågrøn til brun strobus
3. Nålene mest over 7cm ..... nigra
   " " under 7cm 4.
4. Barken rødbrun. Nålene blågrønne. Stilkede kogler .... silvestris
   " gråbrun. " mørkegrønne. Siddende kogler mugo

Pinus nigra Arnold Østrigsk fyr. 2 underarter:
ssp. nigra: Nålene rette eller krummede. Bladskederne 10-16mm. Dyrket.
ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe: Nålene vredne eller uregelmæssigt krummede. Bladskederne (15)18-26mm. Spredt.

P. silvestris L. Skovfyr. Spredt.

P. mugo Turra Bjærgfyr. Spredt.

P. cembra L. Stenfyr, Cembrafyr. 10-25m. Kvistene kraftigt orangebrunt filtede. Spredt.

P. strobus L. Weymouthsfyr. Dyrket.

CUPRESSACEAE

6 årer. Blosteret 1,5-2mm. Nødden 2-2,5mm. VIII-X. Spredt.

Polygonum aviculare L. Hønsegræs. V-IX. Alm.

P. arenastrum Bor. Almindelig pileurt.

P. minus Hudson Liden pileurt.

P. mite Schrank Fjærnblomstret pileurt. 10-60cm. Bladene lancetformede, tilsmalnede i begge ender, randhårede. Aksene hængende. VII-IX.

P. hydropiper L. Bidende pileurt. VII-IX. Alm.

P. persicaria L. Ferskenpileurt. VII-IX. Alm.

P. lapathifolium L. Bleg pileurt. VII-IX. Alm. 3 underarter:
ssp. lapathifolium: Knudet pileurt. Bladene lancetformede, undersiden svagt håret. Stænglen rødplettet. Frøet med kredsformet grund.
ssp. pallidum (With.) Fr.: Bleg pileurt. Bladene lancetformede, undersiden tæt gråhåret. Stænglen næppe rødplettet. Frøet med bred, afskåren grund.
ssp. brittingeri (Opiz) Rech.: Bladene bredt omvendt ægformede til elliptiske, tæt uldhårede nedenunder som unge. Stænglen lilla.

P. amphibium L. Vandpileurt. VI-IX. Alm.

P. orientale L. Nikkende pileurt. 50-100cm. Tæt dunet overalt. Skederne tit med grønne, bladlignende lapper langs randen. Bladene spidst ægformede, indtil 20cm. Blomsterne m.m. røde. Dyrket og forvildet.

P. bistorta L. Slangeurt. 20-100cm. Opret. Nedre blade 5-15cm, aflangt ægformede med afstudset grund. Stænglen ugrenet med 1 tæt, valseformet og lyserødt aks. VI-VIII. Alm.

P. viviparum L. Topspirende pileurt. 5-25cm. Opret. Bladene m.m. lancetformede, oftest 2-3cm. Akset 2-6cm, tyndt og hvidblomstret. VI-VIII.

P. alpinum All. Alpepileurt. 30-80cm. Opret flerårig med 1-3cm brede, aflangt-lancetformede blade. Hvide eller blegrøde blomster i en uregelmæssig top. VII-VIII. Sj.

P. convolvulus L. Snerlepileurt. VI-IX. Alm.

P. dumetorum L. Vingepileurt. VII-IX. Alm.

P. aubertii Louis Henry Arkitektens trøst. -5m eller mere. Forveddede, klatrende stængler. Bladene 3-8cm. Blomsterne hvide eller bleggrønne, lyserøde i frugt. Dyrket og forvildet.

P. cuspidatum Sieb.& Zucc. (Fallopia japonica) Japanpileurt. Forvildet.

Fagopyrum. Boghvede. Bladene bredt trekantet-pilformede. Blosterbladene næsten helt frie.

F. esculentum Moench Agerboghvede. Blosteret 3-4mm, lyserødt. Nødden 5-6mm, med jævne sider og kanter. VII-IX. Dyrket og forvildet.

F. tataricum (L.) Gaertner Tatarisk boghvede. Blosteret 2mm, grønlighvidt. Nødden med uregelmæssigt takkede kanter. VIII-X. Dyrk.& forv.

Oxyria digyna (L.) Hill Fjældsyre. 5-20cm. De grundstillede blade noget vorterodsformede, 1-3cm, noget kødede. Syreagtige blomster i en lille, åben klase, men kun med 2 blosterblade i hver krans. VII-VIII. Spredt.

Rumex. Skræppe.

1. Bladene med spyd- eller pilformet grund ..... 2.
" " hjærteformet, afrundet eller kileformet grund 8.
2. Bladene omtrent så lange som brede ..... 3.
" længere end brede 4.
3. Blomsterne 2-tallige ..... Oxyria digyna
" 3-tallige scutatus
4. Frugtblosteret under 2mm. Bladgrunden spydformet ..... acetosella
" over 2mm. " pilformet 5.
5. Ydre blosterblade 2,5-4mm i frugt. Tenformede rødder ... tuberosus
" " 1,5-2,5mm i frugt. Rødderne ikke tenformede 6.
6. Blomsterstanden rigt grenet og tæt ..... thyrsiflorus
" svagt grenet og åben 7.
7. Bladskederne næsten helrandede ..... arifolius
" frynsede eller tandede acetosa
8. Indre blosterblade uden bruskkorn ..... 9.
Mindst 1 indre blosterblad med tydeligt bruskkorn 12.
9. Grundbladene med kileformet eller afrundet grund ..... 10.
" " hjærteformet grund 11.
10. Nedre stængelblade højst 4 x så lange som brede ..... longifolius
Alle blade smalt linje-lancetformede pseudonatronatus
11. Grundbladene 1-1,5 x så lange som brede. Bjærgplante .... alpinus
" 1,5-2,5 x så lange som brede. Flodplante aquaticus
12. Indre blosterblade helrandede til svagt tandede ..... 13.
" " med tænder på over 1mm 21.
13. Nedre blade næsten så lange som brede ..... confertus
" " længere end brede 14.
14. Indre blosterblade 3-4mm, tungeformede ..... 15.
" " 5-8mm, bredere 16.
15. Næsten alle nøgler med støtteblade ..... conglomeratus
Kun de nedre " " " sanguineus
16. Vandplante. Nedre blade ofte over 50cm ..... hydrolapathum
Landplanter. Bladene mindre 17.
17. Blosterbladene ca. 1,5 x så brede som bruskkornet. Grundbladene med afrundet spids, ca. 2 x så lange som br. obtusifolius
Indre blosterblade ca. 2-5 x så brede som bruskkornet. Grundbladene m.m. spidse 18.
18. Grundbladene ca. 3 x så lange som brede, bleggrønne ..... 19.
" 4-5 x så lange som brede, mørkegrønne 20.
19. Bladenes sideribber udgår med en vinkel på 45-60° ..... patientia
" " " " " " 60-90° kerneri
20. Indre blosterblade næsten helrandede ..... crispus
" " finttandede stenophyllus
21. Flerårig. Blostertænderne kortere end blosterets bredde ..... 22.
Enårig. Tænderne ofte længere end blosterbladets " 23.

22. Blomsterstilkene tykke. Blomsterstanden åben med udspærrede grene ..... pulcher
Blomsterstilkene tynde. Blomsterstanden tæt obtusifolius
23. Indre blosterblade 4-5mm, med kraftige tænder ..... dentatus
" " 2-3,5mm, med børsteformede tænder 24.
24. Mellemste stængelblade langstilkede, ofte med udvidet grund ucranicus
Mellemste blade kortstilkede, med kileformet grund 25.
25. Blomsterstilkene stive. Modne plante brungrøn ..... paluster
" tynde. " " gullig maritimus

Rumex acetosella L. Rødknæ. V-VII. Alm. 3 underarter:
ssp. tenuifolius (Wallr.) Löve: Bladene smalt linjeformede, indtil 10 x så lange som brede. Toppen begynder under stængelmidten. Stænglen liggende eller opstigende.
ssp. acetoselloides (Balansa) den Nijs: Bladene med 2-5-kløvede grundflige. Nødden fri af blosteret, skinnende.
ssp. multifidus (L.) Schübler & al.: Bladene mest med 2-5-kløvede grundflige. Nødden m.m. sammenvokset med blosteret, mat.

R. scutatus L. Skjoldsyre. 10-50cm. Bladene ofte spydformede, undertiden vorterodsformede. Toppen åben og fågrenet. Indre blosterblade 4,5-6 mm, m.m. runde. VI-VIII. Sj.

R. tuberosus L. Knoldsyre. 10-60cm. Ligner Alm. syre, men med tenformet fortykkede rødder. Nedre blade 1-2cm brede. VII-VIII. Sj.

R. arifolius All. Bjærgsyre. 30-100cm. Bladene tynde, de nedre på stænglen næsten trekantede, knap 2 x så lange som brede med næsten vandret udstående spidser. VI-VIII. Alm.

R. acetosa L. Alm. syre. VI-VII. Alm.

R. thyrsiflorus Fing. Dusksyre. VII-VIII. Sj.

R. alpinus L. Sæterskræppe. 50-100cm. Grundbladene meget store, indtil 50cm. Toppen tæt. Blomsterstilkene med udvidet spids. Indre blosterblade 4,5-5x3,5-5mm. VII-VIII. Alm.

R. aquaticus L. Dyndskræppe. VII-VIII. Spredt.

R. pseudonatronatus Borbas Flodskræppe. 80-150cm. Nedre stængelblade 6-8 x så lange som brede, øvre 8-15 x så lange, alle bølgede. Toppen smal og lang og meget tæt. VII-VIII. Flodenge. Sj.

R. longifolius DC. Byskræppe. VII-VIII. Sj.

R. confertus Willd. Hjærtebladet skræppe. 40-100cm. Nedre blade ca. 15x12cm, med trekantet-hjærteformet omrids. Indre blosterblade ca. 6x8 mm, bredt nyre-skjoldformede. VI-VII. Spredt.

R. hydrolapathum Hudson Vandskræppe. VII-VIII. Spredt.

R. kerneri Borbas Sortbrun skræppe. 60-120cm. Grundbladene æg-lancetformede med hjærteformet grund. Indre blosterblade sortbrune, 5x6mm, med 0,2-0,5mm lange tænder forneden. V-VII. Spredt.

Rumex patientia L. Engelsk spinat. 80-200cm. Bladene tynde med bølget rand. Bladstilken furet ovenpå. Stænglen stærkt furet, ofte rød.VI-VII.
ssp. orientalis (Bernh.) Danser: Blosterbladene 6-8x8-10mm.
ssp. patientia: Blosterbladene under 8mm brede, omtrent så lange som brede, med tydeligt hjærteformet grund og butte.
ssp. recurvatus (Rech.) Rech.f.: Blosterbladene under 8mm brede, længere end brede, spidse og med m.m. afskåret grund.

R. crispus L. Kruset skræppe. VII-VIII. Alm.

R. stenophyllus Ledeb. Smalbladet skræppe. 20-60cm. Nær foregående, men bladene oftest mindre krusede. Blosterbladene lidt brede i det, med finttandet rand. VII-VIII. Spredt.

R. conglomeratus Murray Nøgleskræppe. VII-IX. Alm.

R. sanguineus L. Skovskræppe. VII-VIII. Alm.

R. pulcher L. Violinskræppe. 20-60cm. Nedre blade ofte violinformede. Toppen med udstående grene, zigzagbøjet foroven. Nøglerne ofte adskilte forneden og bladede. Blosteret kraftigt netåret. VI-VII. Spredt. 2ssp.:
ssp. pulcher: Blosteret med mest 4 par 1-2mm lange tænder.
ssp. divaricatus (L.) Murb.: Blosteret med indtil 8 par korte og ofte uregelmæssige tænder.

R. obtusifolius L. Butbladet skræppe. VI-IX. Alm. 4 underarter:
ssp. transiens (Sim.) Rech.f.: Alle blosterblade med bruskkorn, tandede.
ssp. silvester (Wallr.) Rech.: Blosterbladene m.m. helrandede, alle med bruskkorn.
ssp. obtusifolius: 1 bruskkorn. Blosterbladet but, m.m. ægformet.
ssp. subalpinus (Schur) Celak.: 1 bruskkorn. Blosterbladet smalt trekantet eller tungeformet, spidst.

R. dentatus L. ssp. halacsyi (Rech.) Rech.f. Øreskræppe. 20-70cm. Nedre blade 5-10x1,5-4cm, ofte med udvidet grund. Blosterbladene 4-6x2-3mm, med 3 bruskkorn. VI-VII. Jud.Tulcea: Donaudeltaet.

R. paluster Sm. Sumpskræppe. VIII-IX. Spredt.

R. maritimus L. Strandskræppe. VI-VII. Spredt.

R. ucranicus Besser Dværgskræppe. 8-35cm. Ofte rødlilla, spinkel plante. Blosterbladene 2x1mm, meget spidse, med ca. 3 par tænder og et stort, orange bruskkorn. Flodbredder. VI-VII. Sj.

CHENOPODIACEAE

1. Bladene flade, de største som oftest over 5mm brede ..... 2.
   " linje- eller trådformede, trinde, skælagtige eller væk 10.
2. 1-2m lange, klatrende skud ..... Hablitzia
   Ikke klatrende 3.
3. Frugten omgivet af 2 forøgede forblade, men uden blosterblade .. 4.
   " anderledes 7.
4. Planten dunet ..... 5.
   " glat eller melet 6.

5. Forbladene med et langt, sylformet vedhæng ..... Ceratocarpus
" uden noget sylformet vedhæng Kraschenninnikovia
6. Forbladene frie, ihvertfald i den øvre halvdel ..... Atriplex
" sammenvoksede næsten helt til spidsen Halimione
7. Bladene lancetformede og helrandede, Planten m.m. håret ..... 8.
Anderledes 9.
8. Blomsterne skjulte af taglagte støtteblade ..... Corispermum
" fritsiddende Kochia scoparia
9. Frugtblosteret fortykket, sammenvokset med frugten ..... Beta
" ej " , ikke sammenvokset Chenopodium
10. Stænglen leddelt, modsat grenet ..... 11.
" ikke leddelt 12.
11. Enårig. Uden blade ..... Salicornia
Flerårig. Med små grupper af kødede blade Halocnemum
12. Frugtblosteret med en vinge, køl eller torn på ryggen ..... 13.
" uden vedhæng 15.
13. Planten helt glat. Bladene brod- eller tornspidsede .... Salsola
" m.m. håret 14.
14. Blosterbladene i frugt med en lille torn på ryggen ..... Bassia
" " " " " vinge eller knude Kochia
15. Bladene med en m.m. stikkende spids ..... 16.
" ikke stikkende 17.
16. Frugten skjult af 2 store forblade ..... Ceratocarpus
" anderledes Polycnemum
17. Nødden vinget. Blomsterne skjulte af støtteblade ... Corispermum
" uvinget 18.
18. Blomsterne med 2 tydelige forblade. Frugtblosteret hårdt eller brusket ..... Petrosimonia
Blomsterne uden eller med meget små forblade. Frugtblosteret kødet eller hindeagtigt 19.
19. Planten glat. Blosterbladene kødede og ensartede ..... Suaeda
" dunet. " hindeagtige og uens Camphorosma

Polycnemum. Bruskurt. Enårige med stive, sylformede blade. Blomsterne enlige i hjørnerne af bladlignende støtteblade, med 2 forblade.

1. Bladene 0,1-0,3mm tynde, ofte kirteldunede ..... heuffelii
" mindst 1/2 mm tykke, oftest glatte 2.
2. Nedre blade 1-2cm. Forbladene op til 2 x blosteret ..... majus
" " 3-10mm. " af blosterets længde 3.
3. Øverste støtteblade mindst 3 x blosteret ..... arvense
" " højst 2-3 x " verrucosum

Polycnemum majus A.Br. Stor bruskurt. 5-20cm. Først kruset dunet, senere glat. Forbladene 1-2 x blosteret. VII-VIII. Spredt.

P. arvense L. Agerbruskurt. 5-30cm. Stængel og grene rette til enkelt opadbøjede, mest grønne. VII-IX. Spredt.

P. verrucosum A.F.Lang Vortet bruskurt. 5-15cm. Stænglen og grenene tynde, mest vidt udrakte, slangeagtigt opstigende, ofte rødlillat anløbne. VIII-IX. Sj.

Polycnemum heuffelii A.F.Lang Trådbruskurt. 5-25cm. Mest pyramideformet grenet med skrået opadrettede grene. Bladene indtil 12mm lange, først krumme, senere vandret udstående. VII-IX. Spredt.

Hablitzia tamnoides Bieb. 1-2m. Flerårig. Skuddene med spredte, bredt ægformede blade på 2,5-3cm med hjærteformet grund. Blomsterne i lange, akselstillede klaser. X. Dyrket.

Beta trigyna W.& K. Trearret bede. 30-100cm. Flerårig. Grundbladene indtil 20cm, bredt ægformede. Blosteret hvidliggult, opret i frugt. VI-VII. Sj.

B. vulgaris L. Foderbede. Blosteret grønt. Dyrket.

Chenopodium. Gåsefod.

1. Planten klæbrigt dunet, med aromatisk duft ..... 2.
" glat eller melet, ikke aromatisk 5.
2. Bladene hele, kun de større tandede til lappede ..... ambrosioides
" fjerlappede eller fjerdelte 3.
3. Flerårig, nedliggende og smalfliget ..... multifidum
Enårig, opret og bredfliget 4.
4. Planten tydeligt klæbrig. Bladundersidens kirtler stilkede botrys
" næppe klæbrig. Undersidens kirtler siddende schraderanum
5. Flerårig med trekantet-spydformede blade ..... bonus-henricus
Enårig 6.
6. Frøene lodretstillede. Blomsterstanden aldrig melet ..... 7.
" vandretstillede 11.
7. Bladundersiden tæt blågråt melet ..... glaucum
" grøn og glat 8.
8. Blomsterne i tætte, kugleformede nøgler i bladhjørnerne ..... 9.
Blomsternøglerne i toppe eller aflange aks 10.
9. Alle nøgler med støtteblade ..... foliosum
Øvre " uden " capitatum
10. Nedre stængelblade æg-rudeformede, bugtede til bugtet-tandede rubrum
Nedre stængelblade (rudeformet) trekantede, helrandet-tandede botryodes
11. Større stængelblade med m.m. hjærteformet grund ..... hybridum
Bladenes grund m.m. kileformet 12.
12. Blomsterstandsaksen og bægerets yderside glatte ..... 13.
" " " " m.m. melede 14.
13. Bladene helrandede, afrundet rudeformede ..... polyspermum
" tandede, de større trekantede urbicum
14. Bladene rudeformede, helrandede eller med 1-2 store tænder forneden. Planten lugter af rådden fisk ..... vulvaria
Bladene m.m. tandede eller lappede 15.
15. Bladoversiden mørkegrøn og lidt skinnende ..... murale
" ikke skinnende 16.
16. Bladene omtrent så lange som brede ..... opulifolium
" udpræget længere end brede 17.
17. Frøskallen stærkt grubet. Bladene tydeligt 3-lappede ficifolium
" ikke grubet 19.

18. Frøene butkantede. Blosterbladene med skarp køl ..... suecicum
" skarpkantede. Blosterbladene m.m. afrundede 19.
19. Bladene aflange, butte, næsten parallelsidede, næppe tandede striatum
Bladene rude-ægformede til lancetformede, ofte spidse, ikke udpræget parallelsidede album

Chenopodium botrys L. Klæbrig gåsefod. 5-50cm. Bladene med op til 4(6) par lapper. Bladet op i blomsterstanden. VIII-X. Spredt.

C. multifidum L. Fliget gåsefod. 30-100cm. Bladene smalt og ofte dybt fligede. Blomsterne i små nøgler i de øvre bladhjørner. VII-IX. Sj.

C. schraderanum Schultes Egebladet gåsefod. 30-100cm. Bladene med oftest 3-5 par bugtede til fjersnitdelte lapper. Planten med basilikumlugt. VII-IX. Sj.

C. ambrosioides L. Vellugtende gåsefod. 20-80cm. Bladene 4-12cm, mest lancetformede, med bugtet-tandet rand. VI-IX. Forvildet.

C. bonus-henricus L. Stolthenriks gåsefod. V-IX. Alm.

C. foliosum Asch. Aksjordbærspinat. 30-60cm. Nedre blade trekantet-rudeformede, groft spidstandede. Frugtbægeret rødt og kødet. VI-IX. Sj.

C. capitatum (L.) Asch. Purpurrød jordbærspinat. 30-60cm. Bladene trekantede, ofte mindre tandede end foregåendes. VI-VIII. ?

C. glaucum L. Blågrøn gåsefod. VII-IX. Alm.

C. rubrum L. Rød gåsefod. VII-IX. Alm.

C. botryodes Sm. Druegåsefod. VII-IX.

C. hybridum L. Hjærtebladet gåsefod. V-VII. Alm.

C. polyspermum L. Mangefrøet gåsefod. VII-VIII. Alm.

C. vulvaria L. Stinkende gåsefod. 10-65cm. Stærktgrenet og grålelet. Bladene rude- eller ægformede, m.m. tæt melede nedenunder. V-IX. Spr.

C. urbicum L. Rank gåsefod. 50-100cm. Planten glat eller meget lidt melet, rank med meget oprette grene. Planten altid grøn, bladoversiden svagt skinnende. Nedre blade ofte trekantede. VII-IX. Alm.

C. murale L. Murgåsefod. 10-90cm. Bladene noget rudeformede og ret tættandede. VII-IX. Spredt.

C. ficifolium Sm. Sildig gåsefod. 20-90cm. Stænglen ofte med en kraftig, rød plet ved grunden af grenene. Bladets midterlap m.m. aflang og parallelsidet. VII-VIII. Sj.

C. opulifolium Schrader Kortbladet gåsefod. 30-100cm. Bladene æg-rudeformede, med en kort og bred lap på hver side. VII-IX. Alm.

C. album L. Hvidmelet gåsefod. VII-IX. Alm.

C. striatum (Krasan) J.Murr. (C. strictum) Stribet gasefod. Stænglen rødstribet. VII-IX.

Chenopodium suecicum J.Murr. Grøn gåsefod. Stænglen uden rødt. VII-IX.

Atriplex. Mælde.

1. Modne forblade halvt sammenvoksede og m.m. forhærdede ..... 2.
" " ikke " og ikke " 3.
2. Blomsterstanden kun med blade ved grunden ..... tatarica
" med blade til spidsen rosea
3. Bladundersiden hvid, oversiden mørkegrøn ..... nitens
" af samme farve som oversiden 4.
4. Forbladene runde og butte, netårede ..... hortensis
" spidse, ikke netårede 5.
5. Bladene linje-lancetformede ..... litoralis
" bredere 6.
6. Forbladene næsten helrandede, rundt hjærteformede ... oblongifolia
" tandede, m.m. rudeformede 7.
7. Nedre blade trekantede med tvær grund ..... hastata
" " lancet-rudeformede med kileformet grund patula

Atriplex hortensis L. Havemælde. 30-150cm. Nedre blade bredt ægformet-trekantede, svagt tandede til helrandede, mat grønne eller rødligt anløbne, op til 10cm lange. VII-VIII. Dyrket og forvildet.

A. nitens Schkuhr Glansmælde. 60-80cm. Bladene med skinnende overside og tandet rand. Forbladene netårede, helrandede med en spids. VII-IX.

A. oblongifolia W.& K. Langbladet mælde. 30-120cm. Bladene grågrønne, melede, lancet-rudeformede med bugtet-tandet rand. VII-IX. Alm.

A. rosea L. Rosenmælde. 25-80cm. Bladene trekantet-rudeformede eller æg-rudeformede, tæt og spidst tandede. Planten m.m. hvidskællet. Alm.

A. tatarica L. Aksmælde. 30-150cm. Planten hvidlig. Bladene m.m. dybt bugtet-tandede, af forskellig form. Forbladene rudeformede, ofte trelappede. VII-X. Alm.

A. litoralis L. Strandmælde. VII-IX. Alm.

A. patula L. Svinemælde. VII-X. Alm.

A. hastata L. (A. prostrata) Spydmælde. VI-IX. Alm.

Halimione pedunculata (L.) Aellen Stilket kilebæger. 10-30cm. Opret, sølvmelet enårig med spredte, aflange, helrandede blade og langstilkede frugter med omvendt trekantede, fortil trelappede forblade. VII-IX.Spr.

H. verrucifera (Bieb.) Aellen Vortet kilebæger. 20-60cm. Lav, liggende sølvmelet busk. Bladene elliptiske og helrandede, de nedre modsatte. Siddende frugter med ca. 2mm store, runde og tandede, vortede forblade.

Kraschenninnikovia ceratoides (L.) Güldenst. Uldmælde. 30-100cm. Rustfarvet eller sjældnere gråfiltet busk med 12-40mm lange, lancetformede blade. Blomsterne i aks med de 4-tallige hanblomster øverst og de tæthårede hunblomster nederst. VII-IX. Jud.Cluj: Borşa.

Ceratocarpus arenarius L. Tvetorn. 10-30cm. Grå- eller rustfiltet, stjærnehåret, stærktgrenet enårig. Bladene 1-4cm, m.m. linjeformede.

Forbladene 5-7mm, trekantet-kileformede med et udstående, sylformet vedhæng. VII-IX. Spredt.

Camphorosma monspeliaca L. Kamferurt. 10-60cm. Flerårig, kamferlugtende dværgbusk. Bladene 2-10mm, linjeformede og stive, ofte i knipper. 4 uens store blosterblade. Blomsterne i endestillede aks. VII-IX. Spr.

C. annua Pallas Enårig kamferurt. 5-30cm. Svagt dunet, undertiden glat enårig. Bladene 5-15mm, linjeformede, noget kødede. Aflange, 4-tallige blomster med uens blosterblade. VII-IX. Spredt.

Bassia hirsuta (L.) Asch. Tangurt. 10-60cm. Ligner Strandgåsefod, men grenene til sidst skruesnoede. Blostertornene dunede. VII-IX. Sj.

B. sedoides (Pallas) Asch. Opret tangurt. 10-100cm. Blostertornene glatte i spidsen. Grå, opret enårig. Stænglen og de oprette grene filtet krushårede. Bladene kødede, linjeformede, indtil 12mm, med lange, m.m. tiltrykte hår. VII-IX. Sj.

Kochia. Blomstermælde. Frugtblosteret oftest med en tværvinge.

K. prostrata (L.) Schrader Liggende blomstermælde. 10-60cm. Lille busk. Stænglerne svagt til tæt hårede. Stive, spidse, sylformede blade indtil 12mm. Frugtblosterets vinger runde og kronbladsagtige. VII-IX. Spredt.

K. laniflora (Gmelin) Borbas Sandblomstermælde. 5-80cm. Bladene bløde, op til 2,5cm, lysegrønne, m.m. silkehårede, de nedre knippestillede. Frugtblosterets vinger spidst ægformede. V-IX. Sj.

K. scoparia (L.) Schrader Sommercypres. 20-150cm. Opret enårig. Bladene 3-strengede. Det modne blosters vinge smal og uregelmæssigt frynset, undertiden knudeformet. VII-IX. Dyrket og forvildet.

Corispermum. Lusefrø. Stærkt sammentrykt, vinget nød bag et dækblad. Dækbladene aksstillede, ofte taglagte og hindekantede.

1. Frøets vinge hindeagtig ..... 2.
" " tyk, højst hindeagtig i kanten 3.
2. Blomsterne i lange, løse aks ..... canescens
" i korte, tætte aks marschallii
3. Bladene linjeformede, lidt kødede ..... nitidum
" flade hyssopifolium

Corispermum marschallii Steven Gråt lusefrø. 30-40cm. Planten først gråt stjærnehåret, siden glat. Bladene halvtrinde med flad overside. Frugten 4mm, vingen svagt tandet. VII-IX. Sj.

C. canescens Kit. Stort lusefrø. 30-70cm. Ofte dunet. Bladene linjeformede. VII-IX. Sj.

C. nitidum Kit. Skinnende lusefrø. 10-40cm. Planten ofte rødligt anløben, svagt dunet, lidt skinnende. VIII-IX. Spredt.

C. hyssopifolium Stephan Smalvinget lusefrø. 15-60cm. Akset langt, åbent forneden, tæt foroven. Frugterne 4-5mm. VII-IX. Sj.

Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb. Knopkveller. 20-50cm. Stærkt-

grenet halvbusk med oprette grene med små knoplignende bladgrupper forneden og kvellerlignende aks foroven. VIII-X. Sj.

Salicornia europaea L. Alm. kveller. Endeaksets nedre blomstrende led 3-5mm brede på det smalleste sted og 3½-6mm brede på det bredeste sted.

S. prostrata Pallas Slank kveller. 5-30cm. Mest opret trods navnet. Endeaksets nedre blomstrende led 2-2,5mm brede på det smalleste sted og 2,5-3mm på det bredeste sted. VII-IX.

Suaeda splendens (Pourret) G.& G. Børstegåsefod. 10-50cm. Ligner den følgende, men bladene lyst hvidgrønne, gennemskinnelige, ofte brodspidsede eller med en 1mm lang stak. VII-IX. Jud.Tulcea.

S. maritima (L.) Dum. Strandgåsefod. VII-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. maritima: Bladoversiden flad. Frøene tydeligt netmønstrede.
ssp. salsa (L.) Soó: Bladoversiden furet. Frøene næsten jævne.

Salsola kali L. Sodaurt. Bladene 1-2mm tykke, m.m. stive og stikkende, uden udvidet grund, kun de nederste modsatte. VI-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. ruthenica (Iljin) Soó: Russisk sodaurt. Planten grågrøn. Forbladene frie, ikke opsvulmede. Blosteret oftest vinget.
ssp. tragus (L.) Nyman: Brusket sodaurt. Planten gullig. Forbladene opsvulmede og noget sammenvoksede. Blosteret uvinget. På strande.

S. soda L. Blød sodaurt. 20-70cm. Glat. Bladene 2-4mm tykke, bløde og kødede, ikke stikkende, de nedre og midterste modsatte, med udvidet og noget stængelomfattende grund. VII-IX. Spredt.

Petrosimonia. Ofte dunede enårige. 2 forblade, der forhærdes og indeslutter frugten. 2-5 blosterblade.

P. triandra (Pallas) Simonkai 5-35cm. Liggende eller udstrakt. Bladene ca. 1mm tykke, indtil 5cm lange, de mellemste og øvre spredte. 2 blosterblade og 2 støvdragere. VII-VIII. Spredt.

P. oppositifolia (Pallas) Litv. 5-40cm. Opret eller udstrakt. Bladene 2-3mm tykke, meget kødede, indtil 4cm lange, de øvre spredte. 2 blosterblade, 5 støvdragere. VII-VIII. Sj.

AMARANTHACEAE

Amaranthus. Amarant.

1. Blomsterstanden en endestillet, sammensat dusk ..... 2.
   Ingen endestillet dusk, men akselstillede blomsterstande 7.
2. Forbladene langspidsede, mindst af blosterets længde. Kapslen åbnes på tværs ..... 3.
   Forbladene meget kortspidsede, kortere end blosteret. Frugten åbnes ikke eller åbnes uregelmæssigt 6.
3. Blosterbladene spatelformede, bredest foroven ..... retroflexus
   " m.m. lancetformede 4.
4. Toppen rød, sjældnere gul; stor og tæt ..... hypochondriacus
   " grøn 5.
5. Forbladene 1,5 x blosteret, 2-4mm hybridus
   " 2 x " , 4-6mm powellii

6. Stænglen glat foroven. Bladene ofte med en plet ..... lividus
" tæt dunet. Bladene uplettede deflexus
7. Frugten åbnes ikke. Bladene stærkt krusede ..... crispus
" " på tværs. Bladene ikke krusede 8.
8. 4-5 blosterblade ..... blitoides
2-3 " 9.
9. Forbladene 2 x blosteret, sylspidsede ..... albus
" ca. = blosteret graecizans

Amaranthus retroflexus L. Opret amarant. 15-100cm. Stænglen mest bleggrøn, tæt krushåret foroven. Dusken tæt og kort, hvidgrøn. VII-XI. Alm.

A. hypochondriacus L. Rød amarant. Dyrket og forvildet.

A. hybridus L. (A. chlorostachys) Topamarant. Toppen løs, ofte med mange grene. Griffelgrenene med tynd grund. VII-IX. Sj.

A. powellii S.Watson Nåleamarant. Toppen stiv, med få grene. Griffelgrenene med tyk grund. Forbladenes ribbe meget kraftig. VIII-IX. Alm.

A. blitoides S.Watson Mældeamarant. 15-50cm. Stænglen liggende. Blade ofte med en 0,5-1mm lang brod og mest med en smal, hvidlig bruskrand.

A. crispus (Lesp.& Thev.) Terracc. Kruset amarant. 5-40cm. Liggende eller opstigende. Stænglerne tætdunede. Bladene mest 0,5-1,5cm, m.m. rudeformede. 5 blosterblade. VIII-X. Spredt.

A. albus L. Hvid amarant. 10-50cm. Opret til liggende, hvidlig og stærkt grenet stængel. Bladene aflange, 0,5-2,5cm. VII-IX. Alm.

A. graecizans L. Vild amarant. 10-70cm. Stænglen opret til opstigende, grøn, hvidlig eller rødlig. Bladet 2-4cm, brodden højst 0,5mm. Alm.

A. deflexus L. Brodspidset amarant. 40-90cm. Liggende flerårig. Bladene 3-5cm, æg-rudeformede. Frugten 2,5-3mm, med 2-3 tydelige længderibber og hindeagtigt opblæst. VII-IX. Spredt.

A. lividus L. (A. blitum) Pletamarant. 10-80cm. Stænglen glat foroven. Frugten 1,5-2,5mm, uden tydelige længderibber. Bladene æg-rudeformede, udrandede fortil, ofte med en mørk eller lys plet. VII-IX. Alm.

NYCTAGINACEAE

Oxubaphus nyctagineus (Michaux) Sweet (Mirabilis n.) Parasolurt. 20-60cm. Opret, gaffelgrenet flerårig med modsatte, æg-hjærteformede, stilkede og spidse blade på 5-10x4-8cm. 3-5 røde blomster sammen, omgivne af et op til 2cm bredt, tydeligt året svøb, der til sidst bliver hindeagtigt. Blosteret enkelt, klokkeformet, 12x8mm. Forvildet.

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca americana L. Kermesbær. 10 støvdragere og 10 sammenvoksede frugtanlæg. VI-IX. Forvildet.

P. esculenta Van Houtte Ottehannet kermesbær. 8 støvdragere og 8 frie

frugtanlæg. Dyrket og forvildet.

MOLLUGINACEAE

Enårige urter med blade af forskellig størrelse i kranse. Små blomster med 5 frie bægerblade og ingen kronblade.

Mollugo cerviana (L.) Ser. Spergeltæppeurt. 5-20cm. Opstigende til opret. Kransene med mest 8 lidt uens blade på 7-12x1/2-1mm. Blomsterne i ende- eller sidestillede småskærme, 1,5-2mm, grønne med hvid hindekant. VI-IX. Spredt. Jud.Dolj, Jud.Olt., Jud.Galaţi.

Glinus lotoides L. Filtet tæppeurt. 10-60cm. Liggende, gråt stjærnefiltet. Bladene bredt ægformede til næsten runde, 2-3,5x1-1,5cm. Blomsterne i nøgler på 2-10 i bladhjørnerne, 4-8mm, gule mod spidsen, med en del hvide, oftest trekløvede staminodier. VII-IX. Jud.Olt: Orlea.

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L. Portulak. 5-50cm. Ofte liggende enårig. Bladene kødede, skinnende, mørkegrønne, spredte forneden, tætstillede foroven under blomsterne, spatelformede. Blomsterne 6-8mm, få sammen mellem de øvre blade, med gul krone. V-X. Alm.

Montia fontana L. Vandarve. Sj. 4 underarter ?:
ssp. chondrosperma (Fenzl) Walters: Liden vandarve. Planten gulgrøn. Frøene matte, helt dækkede af butte knuder.
ssp. fontana: Stor vandarve. Planten grøn. Frøene jævne og stærkt skinnende.
ssp. variabilis Walters: Vortet vandarve. Planten grøn. Frøene noget skinnende; kølen med forskelligt udviklede lave, brede, knuder.
ssp. amporitana Sennen: Som foregående, men kølen med rækker lange, spidse, knuder.

CARYOPHYLLACEAE

1.	Fodflige forefindes	2.
	" mangler	6.
2.	Bladene linjeformede	3.
	" brede og flade	4.
3.	3 grifler. Fodfligene sammenvoksede	Spergularia
	5 " . " frie	Spergula
4.	Blomsterne med store, hindeagtige støtteblade	Paronychia
	Støttebladene uanselige	5.
5.	Blomsterne i nøgler i bladhjørnerne	Herniaria
	" i endestillede kvaste	Polycarpon
6.	Bægerbladene helt eller næsten frie	7.
	" sammenvoksede	21.
7.	2 grifler	8.
	3-5 grifler	10.
8.	Ingen kronblade. 5-tallige blomster	Scleranthus
	Med kronblade. 4-tallige blomster	9.
9.	Flerårig. Kronen 1,5 x bægeret	Moehringia muscosa
	Enårig. Kronen 1/2 x bægeret	Bufonia

10. 4-5 grifler ..... 11.
3 " 14.
11. Bladene linje-sylformede ..... Sagina
" flade 12.
12. Kronbladene kløvede næsten til grunden ..... Myosoton
" hele til 1/2 kløvede 13.
13. Glat enårig. Kronbladene hele eller udrandede ..... Moenchia
Mest håret. " mest kløvede Cerastium
14. Blomsterne i skærm. Kronbladene tandede. Enårig ..... Holosteum
" ikke i skærm. Kronbladene hele eller kløvede 15.
15. Ingen kronblade ..... 16.
Med kronblade 17.
16. Bladene smalle ..... Minuartia
" ægformede Stellaria
17. Kronbladene kløvede ..... 18.
" hele eller lidt udrandede 19.
18. Kronbladene mindst 1/2 kløvede ..... Stellaria
" under 1/2 " Cerastium
19. 3 kapseltænder. Bladene mest sylformede ..... Minuartia
Dobbelt så mange kapseltænder som grifler 20.
20. Frøene med et fedtvedhæng. Bladene ofte linjeformede Moehringia
" uden " . " mest ægformede Arenaria
21. 3-5 grifler ..... 22.
2 " 26.
22. Frugten et sort bær. Bægeret bredt klokkeformet ..... Cucubalus
" en kapsel. Bægeret ikke bredt klokkeformet 23.
23. Bægertænderne mindst af rørets længde ..... Agrostemma
" ikke forlængede 24.
24. Bægerribberne utydelige. Lav bjærgplante ..... Saponaria pumilio
" tydelige 25.
25. Dobbelt så mange kapseltænder som grifler. Mest 3 grifler Silene
5 kapseltænder og 5 grifler Lychnis
26. Bægeret med dækblade under eller omkring sig ..... 27.
" uden " 28.
27. Bægerets ribbemellemrum ikke hindeagtige ..... Dianthus
" " hindeagtige Petrorhagia
28. Bægeret krukkeformet, med 5 brede vinger ..... Vaccaria
" uvinget 29.
29. Bægerets ribbemellemrum ikke hindeagtige ..... Saponaria
" " hindeagtige 30.
30. Bægeret 5-7mm. Bladene 3-strengede ..... Petrorhagia illyrica
" $1\frac{1}{2}$-4mm Gypsophila

Arenaria. Sandvåner.

1. Enårig. Kronen kortere end bægeret ..... 2.
Flerårig. Kronen omtrent lig eller længere end bægeret 3.
2. Kapslen ægformet, tydeligt udvidet forneden ..... serpyllifolia
" cylindrisk, lidet udvidet " leptoclados

3. Bægeret bredt hindekantet. Nedre blade 3-12cm lange ..... 4.
" smalt " . Bladene mindre 5.
4. Bægerbladene tilspidsede ..... rigida
" meget butte procera
5. Ikke rodslående. Kronen tydeligt længere end bægeret ..... ciliata
Krybende og rodslående. Kronen ca. = bægeret 6.
6. Bægerbladene bredt ægformede, butte eller halvspidse ..... biflora
" lancetformede, spidse eller tilspidsede rotundifolia

Arenaria rigida Bieb. Rank sandvåner. 7-40cm. Glat. Nedre blade 3-12cm x 1/2-3/4mm. Blomsterne i en tæt, aflang top. Kronen ca. = bægeret. Sj.

A. procera Sprengel ssp. glabra (Williams) Holub Græsbladet sandvåner. 20-40cm. Nedre blade 3-12cm x 1mm. Blomsterne i en meget åben top.VI-VII

A. ciliata L. Randhåret sandvåner. 3-7cm. Lav pudeplante. Bægerbladene ofte randhårede forneden. Blomsterne 12-15mm brede. VII-VIII. Alm.

A. biflora L. Tveblomstret sandvåner. 5-20cm. Bladene aflange til rundagtige, jævnt tilsmalnende i stilken. Blomsterne 1-2 sammen. Kronbladene omvendt ægformede. VII-IX. Alm.

A. rotundifolia Bieb. Rundbladet sandvåner. Bladene runde eller bredt elliptiske, noget indsmalnede ved stilken. Blomsterne mest 2-5 sammen. Kronbladene ægformet-elliptiske. VII-IX. Spredt.

A. serpyllifolia L. Markarve. V-IX. Alm.

A. leptoclados (Rchb.) Guss. Spæd markarve. V-VI. Spredt.

Moehringia. Skovarve.

1. Enårig. Alle blade ægformede ..... trinervia
Flerårig. Ihvertfald de øvre blade smalle 2.
2. Blomsterne 4-tallige. Planten glat ..... muscosa
" 5-tallige. Stænglen m.m. dunet forneden 3.
3. Bladene tydeligt 3-strengede ..... pendula
" med 0-1 ribber 4.
4. Øvre blade under 1mm brede. Stænglen dunet hele vejen grisebachii
" " over 1mm " . " " forneden jankae

Moehringia trinervia (L.) Clairv. Skovarve. V-VII. Alm.

M. muscosa L. Mosskovarve. 5-20cm. Glat og tyndstænglet. Bladene 2-3 cm x 1/2-1mm. Bægerbladene smalt lancetformede. Kronen 1,5 x bægeret, mest 4-tallig. V-VII. Alm.

M. pendula (W.& K.) Fenzl Hængende skovarve. 15-90cm. Krybende og ofte hængende med trådformede stængler. Bladene 10-40x1-4mm, tilspidsede. Kronen 1,5-2 x bægeret. VI-VIII. Alm.

M. grisebachii Janka 5-15cm. Oprette, ret stive stængler. Bladene lidt kødede. Kvastene mest 3-6-blomstrede. Kronen = bægeret. V-VIII.Sj.

M. jankae Griseb. 5-15cm. Oprette, ret stive stængler. Kvastene få-

blomstrede. Kronen lidt kortere end bægeret. VI-VII. Sj. Jud-Tulcea: Macinului. Jud.Constanţa: Hirşova, Cheia.

Minuartia. Norel.

1. Bægerbladene overvejende hindeagtige ..... 2.
" " urteagtige 6.
2. Blomsterstilke og bægerblade kirteldunede ..... 3.
" " " glatte eller svagt dunede 4.
3. Kronen lig eller lidt længere end bægeret ..... adenotricha
" 2/3 x bægeret glomerata
4. Blomsterstilkene mest 2-4 x bægeret ..... setacea
" " kortere end bægeret eller lig det 5.
5. Nogle blomster stilkede. Støttebladene rette ..... rubra
Alle " siddende. " krogspidsede hamata
6. Enårig ..... 7.
Flerårig 10.
7. Kronen mindst lig bægeret ..... 8.
" kortere end " 9.
8. Stænglerne liggende ..... mesogitana
" oprette bilykiana
9. Kapslen kortere end bægeret, dette 2-3(3,25)mm ..... viscosa
" 1-1,5 x bægeret, dette 3-4mm hybrida
10. Bægerbladene butte og aflange ..... 11.
" spidse, ægformede til linje-lancetformede 13.
11. Kronen kortere end bægeret eller manglende ..... sedoides
" mindst lig bægeret 12.
12. De nedre blade 7-12mm. Bægeret mest uden kirtler ..... laricifolia
" " " 10-20mm. " kirteldunet capillacea
13. Bægerbladene med 3 ribber ..... verna
" " 5-7 ribber 14.
14. Golde skuds blade græsagtige, 2-4cm lange ..... graminifolia
" " " med børsteformet spids 15.
15. Løsttuet. Kronen 1,2-1,5 x bægeret ..... hirsuta
Tættuet. " indtil 1,2 x bægeret recurva

Minuartia mesogitana (Boiss.) Hand.-Mazz. Udstrakt norel. 5-12cm. Bladene linjeformede, lidt kødede. Kvastene åbne med udstående stilke. Krone og kapsel 1-1,5 x bægeret. V-VII. Sj.

M. viscosa (Schreber) Sch.& Th. Klæbrig norel. 5-10cm. Stænglerne mest grenede fra over midten, grenene ofte oprette. Planten mest kirteldunet.

M. bilykiana Klokov 3-10cm. Nær foregående, men stænglerne lidt kødede; grenene ofte udstående. Bægeret 2,3-3mm. V-VI. Jud.Constanţa: Murfatlar.

M. hybrida (Vill.) Schischkin Tyndbladet norel. 3-10cm. Kraftigere end viscosa, grenet ved grunden og fra over midten. Ofte kirteldunet, i det mindste foroven. V-VI. Sj.

M. hamata (Hausskn.) Mattf. Hagenorel. 3-7cm. Svagt krushåret enårig. Støttebladene 3-årede, bredgrundede. Bægerbladene 4mm, til sidst forhærdede, 3-strengede. VI-VII. Sj. Jud.Mehedinţi.

Minuartia glomerata (Bieb.) Degen Nøgleblomstret norel. 10-20cm. Opret, kirteldunet 1-2(-fler)årig. Bladene i knipper. Blomsterne i nøgler. Bægeret 4-6mm. Kronen 1/2 x bægeret. V-VI. Spredt.

M. rubra (Scop.) McNeill (M. fastigiata) Knippenorel. 5-25cm. Stift opret toårig. Stænglerne ofte rødbrune forneden. Blomsterstilkene ofte lig bægeret. Kronen 1/3 x dette. VI-VII. Sj.

M. setacea (Thuill.) Hayek Børstenorel. 10-15cm. Tueformet med oprette skud. Flerårig. Bladene 8-15x0,2mm, mest oprette med 3-året grund. Alm.
ssp. setacea: Kronen 3,5-4,5mm, bægeret 3-3,5mm, æg-lancetformet. De blomstrende skud med 5-20 blomster.
ssp. banatica (Rchb.) Prodan: Kronen 5-5,5mm. Bægeret 3,5-4,5mm, smalt lancetformet. Blomstrende skud med 2-5 blomster.

M. adenotricha Schischkin Som foregående, men bladene 0,3mm tykke. Kvastene 1-6-blomstrede. Blomsterstilkene 2-6mm. Bægeret 4-5mm. V-VI. Jud. Constanţa: Hirşova, Gura Dobrogei. Jud.Tulcea: Turda, Cerna.

M. hirsuta (Bieb.) Hand.-Mazz. Dunet norel. 10-20cm. Oftest m.m. kirteldunet. Blomsterstilkene længere end bægeret. IV-VI. Sj. 2 ssp.:
ssp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz.: Bladene 20-30mm, oprette.
ssp. falcata (Griseb.) Mattf.: Bladene 5-15mm, ofte stive og krummede.

M. recurva (All.) Sch.& Th. Krumbladet norel. 5-10cm. Stænglerne forveddede, ofte sorte forneden. Spredt kirteldunet. Kvastene med 1-3(5) blomster. VII-VIII. Spredt.

M. graminifolia (Ard.) Jav. Græsbladet norel. 5-15cm. Tæt tueformet med lange, krybende stængler. Bladene stive, 1,5-2mm brede. Kronen 1,25 x bægeret. Oftest tæt kirteldunet. V-VII. Sj.

M. verna (L.) Hiern. Vårnorel. 3-15cm. Stænglen mest kirteldunet foroven. Bægerbladene æg-lancetformede. Kronen 1-1,5 x bægeret. V-VIII.Alm.
ssp. oxypetala (Wol.) Halliday: Kronbladene spidse, bredest under midten, tydeligt kortere end bægeret. M.Rodnei.
ssp. collina (Neilr.) Halliday: Bladknipper i bladhjørnerne. Kvastene med 6-mange blomster. Gule støvknapper.
ssp. verna: Stænglen uden bladknipper. Kvastene med 1-7 blomster. Lilla støvknapper. Bægerbladene 2,5-3,5mm, lancetformede. Bladribberne meget tætliggende. Alm.
ssp. gerardii (Willd.) Graebn.: Som ssp. verna, men bægerbladene 3,5-4,5mm, ægformede. Bladribberne veladskilte af brede furer.

M. capillacea (All.) Graebn. Hårnorel. 8-12cm. Stænglen tæt kirteldunet foroven. Bladene 15-20x0,3-0,4mm, halvstive. Kvastene med 1-3(-6) blomster. Kronen 1,5-2 x bægeret. V-VII. Sj.

M. laricifolia (L.) Sch.& Th. ssp. kitaibelii (Nym.) Mattf. Stivbladet norel. 8-30cm. Bladene stive og noget krummede. Kvastene med 1-6 blomster. Kronen 1,5-2 x bægeret, 8-12mm. VII-VIII. Sj.

M. sedoides (L.) Hiern. Dværgnorel. 1-5cm. Tætte, flade puder. Planten glat. Bladene 3-5mm, furede. Blomsterne enlige, siddende eller kortstilkede. Bægeret 2-3mm, lysegrønt. Kapslen 1,5-2 x bægeret. VII-VIII. Alm.

Bufonia tenuifolia L. Liden sivblomst. 5-20cm. Vækst som de enårige Minuartiae, men de sylformede blade mere oprette. Blomsterne 4-tallige. Bægerbladene uens, stærkt tilspidsede. Sj. VII-VIII.

Stellaria. Fladstjærne.

1. Bladene brede, alle eller de nedre stilkede ..... 2.
" smalle, gennemgående siddende 5.
2. Kronen 2 x bægeret. Nedre blade med hjærteformet grund .. nemorum
" højst 1,5 x bægeret. Nedre blade med afrundet grund 3.
3. Mest 10 støvdragere. Kronen 1-1,5 x bægeret, dette 5-7mm neglecta
" 1-5 " . " 0-1 x bægeret, dette 2-5mm 4.
4. Mest med krone. Frøene 0,9-1,3mm, mørkt rødbrune ..... media
" uden " . " 0,6-0,9mm, lysebrune pallida
5. Øvre støtteblade uden hindekant. Kronen ca. 1/2 kløvet holostea
" " med " . " næsten helt kløvet 6.
6. Øvre stængelkanter finvortet ru ..... longifolia
" " jævne 7.
7. Kronbladene ca. 3/4 x bægerbladene, disse 2,5-3,5mm ..... alsine
" 1-1,5 x bægerbladene, disse 4-7mm 8.
8. Støttebladene samt løvbladenes grund randhårede ..... graminea
" " " " glatte palustris

Stellaria nemorum L. ssp. nemorum Lundfladstjærne. V-X. Alm.

S. media (L.) Vill. Almindeligt fuglegræs. III-X. Alm.

S. neglecta Weihe Skovfuglegræs.

S. pallida (Dumort) Piré Blegt fuglegræs.

S. holostea L. Stor fladstjærne. IV-VI. Alm.

S. alsine Grimm Sumpfladstjærne. V-VII. Alm.

S. palustris Retz. Kærfladstjærne. V-VII. Spredt.

S. graminea L. Græsbladet fladstjærne. V-VII. Alm.

S. longifolia Muhl. Skovfladstjærne. 5-25cm. Bladene 5-40mm, randen og undersidens midterribbe ru. Støttebladene hindeagtige, ofte med grøn ribbe. Bægeret 3mm, kronen 1-1,3 x bægeret. V-VIII. Sj.

Holosteum umbellatum L. Skærmarve. 5-20cm. Rosetplante med 1-3 par stængelblade. 4-10 uens skærmstilke, der nedbøjes efter blomstringen.

Cerastium. Hønsetarm.

1. Enårig ..... 2.
(2-)flerårig 8.
2. 3 grifler. Stænglens hår meget kortere end stængelbredden dubium
5 " . " " omtrent af stænglens tykkelse 3.
3. Bægerbladets spids med fremadrettede, ukirtlede hår ..... 4.
" " uden " hår 5.
4. Frugtstilken 1/3-1 x bægeret ..... glomeratum
" 2-3 x bægeret brachypetalum

5. Alle støtteblade bredt hindekantede ..... semidecandrum
   Støttebladene smalt eller ikke hindekantede 6.
6. Blomsterstilkene mest kortere end bægeret ..... gracile
   " længere end bægeret 7.
7. Nedre støtteblade helt urteagtige, hårede på begge sider pumilum
   " " meget smalt hindekantede, glatte ovenpå glutinosum
8. 3 grifler. Planten glat med en hårstribe på stænglen cerastioides
   5 " 9.
9. Kronen 0,9-1,3 x bægeret. Støvknapperne 0,3-0,7mm ..... fontanum
   " 1,4-2,5 x " . " 0,7-1,2mm 10.
10. Planten med lange, bløde hår ..... alpinum
    " dunet til glat, uden lange, bløde hår 11.
11. Med bladknipper eller knopper i stænglens bladhjørner ..... 12.
    Uden " " " " " " 14.
12. Længste blade 3-5cm lange, 1-2mm brede ..... banaticum
    Bladene kortere og ofte bredere 13.
13. Nedre blade tilsmalnende og kortstilkede. Frøene 1,1-1,7mm lerchenfeldianum
    Bladene siddende. Frøene ikke over 1mm arvense
14. Støttebladene uden hindekant, bladagtige ..... latifolium
    Ihvertfald de øvre støtteblade hindekantede 15.
15. Bægerbladene 7-10mm ..... transsilvanicum
    " 3-6mm 16.
16. Bladene mest 3-5cm. Skovplante ..... silvaticum
    " 1-1,5cm. Fjældplante carinthiacum

Cerastium cerastioides (L.) Britton Tregriflet hønsetarm. 5-15cm. Bladene bleggrønne, lidt kødede. Kronen 1,5-2 x bægeret. Kvastene 1-3-blomstrede. Bægeret 4-7mm, med kirtelhåret grund, ellers glat. VII-VIII.

C. dubium (Bast.) Guepin Gaffelhønsetarm. 10-30cm. Planten klæbrig af ganske korte kirtelhår. Støttebladene urteagtige. Kronen 1,3 x bægeret. Frugtstilkene oprette. V-VI. Spredt.

C. banaticum (Rochel) Heuffel Knudret hønsetarm. 10-40cm. Stænglerne med korte, nedadrettede hår og lidt fortykkede bladfæster. Bægeret 5-9 mm. V-VIII. Spredt.

C. lerchenfeldianum Schur 5-20cm. Nær den følgende. Bladene glatte eller uregelmæssigt randhårede, de øvre æg-lancetformede. Spredt.

C. arvense L. Storblomstret hønsetarm. IV-IX. Alm. 3 underarter:
ssp. arvense: Løsttuet. Golde skud næsten så lange som de blomstrende.
ssp. ciliatum (W.& K.) Rchb.: Tættuet. Golde skud meget kortere end de blomstrende. Bladene tydeligt og regelmæssigt randhårede, ellers glatte
ssp. calcicolum (Schur) Borza: Som den foregående, men bladene uregelmæssigt eller ikke randhårede, ofte fladehårede.

C. alpinum L. Fjældhønsetarm. 5-20cm. Bladene ca. 10x5mm. Øvre støtteblade med meget smal hindekant, nedre uden. 1-5 blomster. Bægeret 7-10 mm. VI-IX. Alm. 2 underarter:

ssp. alpinum: Planten grågrøn. Alle blade jævnt hårede.
ssp. lanatum (Lam.) A.& G.: Planten hvid eller grå. I det mindste de yngre blade med en tot lange uldhår i spidsen.

Cerastium latifolium L. Bredbladet hønsetarm. 2-10cm. Løst tueformet. Bladene 12-30x5-10mm, stive og blåliggrønne. Kirteldunet. Bægeret 5-7 mm, bredt hindekantet. VII-VIII.

C. carinthiacum Vest Skinnende hønsetarm. 5-20cm. Bladene 10-25x3-8mm ofte glatte, skinnende. De fleste støtteblade bredt hindekantede. Kapslen mindst 2 x bægeret. VII-VIII. M.Fagaras.

C. transsilvanicum Schur Hindebladet hønsetarm. 10-40cm. Bladene 2-5 cm x 4-7mm på de blomstrende skud. Støttebladene hindeagtige og butte. Kvasten mangeblomstret. VI-VIII. Spredt. M.Rodnei, M.Bistriţei (Ceahlau), M.Ciucaş, M.Birsei, M.Bucegi, M.Fagaraş, M.Capaţinii, M.Paring.

C. silvaticum W.& K. Skovhønsetarm. 15-70cm. De større blade 40-50 x 13-18mm, de nedre stilkede. Kvasten kirtlet. Bægeret 3-6mm. Kronen 1,4-2 x bægeret. VI-VII. Spredt.

C. fontanum Baumg. Almindelig hønsetarm. IV-X. Alm. 3 underarter:
ssp. triviale (Link) Jalas: Bægeret 3-5mm. Kapslen indtil 12mm. Frøene 0,4-0,8mm.
ssp. fontanum: Bægeret 6-9mm. Kapslen 12-18mm. Uden kirtelhår. Alle støtteblade glatte ovenpå. Frøene 0,8-1,2mm.
ssp. macrocarpum (Schur) Jalas: Som foregående, men ihvertfald kvasten kirtelhåret og de nedre støtteblade hårede ovenpå.

C. brachypetalum Pers. Stivhåret hønsetarm. IV-VI. Alm. 2 underarter:
ssp. brachypetalum: Blomsterstilke og bægre uden kirtelhår.
ssp. tauricum (Sprengel) Murb.: Blomsterstilke og bægerblade med lange kirtelhår mellem de almindelige hår.

C. glomeratum Thuill. Opret hønsetarm. III-IX. Alm.

C. semidecandrum L. Femhannet hønsetarm. III-VI. Alm.

C. pumilum Curt. Liden hønsetarm. 5 støvdragere. IV-VI.

C. glutinosum Fries Klæbrig hønsetarm. 6-10 støvdragere. IV-VI.

C. gracile Dufour Grenet hønsetarm. 5-20cm. Ofte meget grenet med udstående grene, kirtelhåret over det meste. Kronen 1/5 kløvet. Støttebladene urteagtige. IV-VI. Sj.

Moenchia mantica (L.) Bartl. Femtalsbrodbæger. 15-30cm. Lidt bleggrøn hønsetarmsagtig enårig. Trådformede blomsterstilke. Bredt hindekantede spidse bægerblade på 6-9mm. Kronen 1,5-2 x bægeret. V-VI. Spredt.

Myosoton aquaticum (L.) Moench Kløvkrone. VI-IX. Alm.

Sagina. Firling.

1. Enårig. 4-tallige blomster ..... 2.
   Flerårig 3.
2. Bladene kun randhårede ved grunden ..... micropetala
   " spredt randhårede til over midten apetala

3. Blomsterne 4-tallige ..... procumbens
" 5-tallige 4.
4. Stængelbladene med en brod på 3/4-1,5 x bladbredden ..... subulata
" " " " " 0-3/4 x bladbredden 5.
5. De 2 øverste bladpar kortere end stængelleddene ..... nodosa
" " " " ca. lig stængelleddene saginoides

Sagina nodosa (L.) Fenzl Knudefirling. VI-VIII. Spredt.

S. subulata (Swartz) Presl Sylfirling. VI-VIII. Sj.

S. saginoides (L.) Karsten Sæterfirling. 2-5cm. Stænglerne glatte, 1(2)-blomstrede. Bladene 5-10mm, med kort brod. Kronen 0,8-1,5 x bægeret, dette og blomsterstilken mest kirtlede. VI-VII. Spredt.

S. procumbens L. Alm. firling. V-IX. Alm.

S. micropetala Rausch Kronløs firling. 3-10cm. Frugtbægeret oftest udstående efter frøspredning. Ydre bægerblade ofte rødrandede. V-IX. ?

S. apetala Ard. Markfirling. Frugtbægeret tiltrykt kapslen. Ydre bægerblade aldrig rødrandede. V-IX. Spredt.

Scleranthus uncinatus Schur Krogknavel. 5-12cm. Enårig. Bægerbladene med krogformet, indadvendt spids, højst 0,1mm hindekantede. VI-VII.Alm

S. perennis L. Flerårig knavel. Bredt hindekantet bæger. Flerårig.
ssp. perennis: Frugten 2-4,5mm. Stænglerne opstigende-oprette.
ssp. marginatus (Guss.) Arc.: Frugten 4,5-5,5mm. Med mange, lange, liggende stængler, der ikke er gaffelgrenede.
ssp. dichotomus (Schur) Stoj.& Stef.: Frugten 5-6,5mm. Stænglerne opstigende og gaffelgrenede.

S. annuus L. Enårig knavel. Bægerets hindekant højst 0,1mm. Enårig.
ssp. annuus: Frugtbægerbladene opret-udstående.
ssp. polycarpos (L.) Thell.: Frugtbægerbladene m.m. indadbøjede.

Paronychia. Negleurt. Liggende, stærktgrenede flerårige med blomsternøgler med blomsterne siddende mellem iøjnefaldende, sølvhvide støtteblade.

P. kapela (Hacq.) Kerner Nedliggende negleurt. 5-15cm. Bladene 3-5mm. Blomsternøglerne 8-15mm. Støttebladene 3-5mm. ?

P. cephalotes (Bieb.) Besser Storbægret negleurt. 5-15cm. Bladene 5-10 mm. Blomsternøglerne 8-12mm. Støttebladene 5-7mm. Bægeret 2,5-4mm. Spr.

Herniaria. Brudurt.

1. Bægeret glat eller spredt håret. Bladene mest glatte ..... glabra
" tæt dunet. Planten gråhåret 2.
2. Enårig. Nøglerne ca. 10-blomstrede. Bægeret med brod ..... hirsuta
Flerårig. Nøglerne 3-6-blomstrede. Bægeret uden " incana

Herniaria glabra L. Almindelig brudurt. VI-IX. Spredt.

H. incana L. Grå brudurt. 10-25cm. Bladene 4-12mm, lancetformede, tæt stift hvidhårede. Bægerbladene 1-1,5mm. VII-IX. Spredt.

Herniaria hirsuta L. Håret brudurt. Bladene 3-8mm, elliptiske til omvendt lancetformede. Bægerbladene 0,5-0,75mm. V-VIII. Sj.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. Almindeligt mangefrø. 5-15cm. Mest stærktgrenet, opret enårig. Bladene 4 i krans, de større 8-12x3-5mm. Mange små, endestillede blomster med bæger på 2mm og en mindre, klar krone.

Spergula arvensis L. Alm. spergel. Bladundersiden furet. VI-X. Alm.

S. morisonii Bor. Vårspergel. 5-30cm. Bladundersiden ikke furet. Kronbladene ægformede og butte, overlappende. 5-10 støvdragere. IV-VI. Sj.

S. pentandra L. Femhannet spergel. 5-20cm. Bladundersiden ikke furet. Kronbladene lancetformede og spidse, ikke overlappende. Oftest 5 støvdragere. IV-V. Sj.

Spergularia media (L.) Presl Vingefrøet hindeknæ. VII-IX. Spredt.

S. marina (L.) Griseb. Kødet hindeknæ. V-IX. Spredt.

S. rubra (L.) Presl Markhindeknæ. V-IX. Alm.

Lychnis.

1. Kronbladene delte i 4 linjeformede flige ..... flos-cuculi
" hele til noget kløvede 2.
2. Planten hvidfiltet. Kronen mørkt rødlilla ..... coronaria
" grøn, glat eller svagt håret 3.
3. Blomsterstanden med 1-3 blomster ..... nivalis
" mangeblomstret 4.
4. Bægeret rør- til klokkeformet ..... atropurpurea
" kølleformet viscaria

Lychnis coronaria (L.) Desr. Fiksernellike. 30-100cm. Bladene lancetformede, 4-5cm. Bægeret 15-20mm, ellipsoidisk. VI-IX. Alm.

L. flos-cuculi L. Trævlekrone. V-VII. Alm.

L. viscaria L. Tjærenellike. Kapselstilken over 3mm, mindst 1/2 x den modne kapsel.

L. atropurpurea (Griseb.) Nyman Mørk tjærenellike. 20-75cm. Som den foregående, men kapselstilken højst 2mm, under 1/2 x den modne kapsel. Kronens farve mørkere rødlilla. V-VI. Jud.Harghita: Sinodminic. Jud.Caraş-Severin: Mehadia.

L. nivalis Kit. Snetjærenellike. 5-20cm. Stænglen ikke klæbrig. 1-2 par stængelblade. Bægeret 10-12mm. Kronen blegt rødlilla eller hvid, tvelappet. VII-VIII. M.Rodnei. 1820-2290m.

Agrostemma githago L. Klinte. VI-IX. Alm.

Silene. Limurt.

1. 5 grifler. Kapslen med 10 tænder. Tvebo ..... 2.
3 " . " " 6 " 4.
2. Bægeret tenformet, 10-15x4mm. Kronen lyserød (sj. hvid) .... dioica
" opblæst. Kronen hvid 3.

3. Bægeret 15-30mm, med 20 tydelige årer (i det mindste hos hun-blomsterne) ..... alba
   Bægeret 10-12mm, med 10 utydelige ribber heuffelii
4. Bægeret med 20-30 ribber, i hvert fald i nedre halvdel ..... 5.
   " " 10 ribber 7.
5. 30 bægerribber. Enårig. Lyserød krone ..... conica
   20 " . Flerårig 6.
6. Bægeret med 10 lange og 10 korte ribber ..... csereii
   " " 20 ens ribber vulgaris
7. Enårig ..... 8.
   2-flerårig 14.
8. Planten glat ..... 9.
   " håret 10.
9. Blomsterne i et hovede med svøbblade under sig ..... compacta
   " i en halvskærm uden svøbblade under sig armeria
10. Bægeret 22-30mm. Bægertænderne 8-10mm, sylformede .... noctiflora
    Bægertænderne kortere, ikke sylformede 11.
11. Kronbladene hele eller udrandede ..... gallica
    " kløvede 12.
12. En 1-2 x grenet blomsterstand. Kronen mest hvid ..... dichotoma
    Blomsterne i svikler, lyserøde 13.
13. Blomsterne m.m. siddende. Frugtbægeret kølleformet .... trinervia
    Nedre blomster langstilkede. Frugtbægeret opblæst pendula
14. Små, enkønnede blomster. Bægeret 2-5mm. Kronbladene hele ..... 15.
    Større, tvekønnede blomster. Kronbladene oftest kløvede 19.
15. Bægre og blomsterstilke dunede ..... borysthenica
    " " " glatte 16.
16. Nedre stængelhår over 1mm ..... 17.
    " " under 1mm 18.
17. Kronbladene lysegule. Blomsterstanden tilspidset ..... exaltata
    " mørkegule. " rudeformet chersonensis
18. Kvastene ikke tætte, stilkede. Stænglen lidt klæbrig midtpå otites
    " tætte, m.m. siddende. Stænglen meget klæbrig midtpå donetzica
19. Blomsterne i en åben top med modsatte grene med mindst 1 3-blomstret kvast ..... 20.
    Blomsterne ikke i en åben top med modsatte kvaste 26.
20. Bægeret glat ..... 21.
    " dunet til håret 22.
21. Bægeret 9-12mm ..... chlorantha
    " 20-25mm bupleuroides
22. Kronen uden bikrone ..... 23.
    " med en bikrone i form af tænder eller skæl 24.
23. Flerårig med golde skud. Toppen åben ..... italica
    Toårig, uden " " . " mere tæt nemoralis
24. Bægerets grund tilsmalnet ..... viridiflora
    " " tværtafskåret 25.
25. Kronens negl 5-8mm, uden øren. Bægertænderne m.m. ens .... nutans
    " " 2,5-4,5mm, spidsøret. Bægertænderne mest uens dubia

26. Kronbladene 4-tandede. Bægeret 3,5-7mm ..... pusilla
" hele eller kløvede 27.
27. Blomsterstanden med over 5 blomster ..... 28.
" " højst 5 " 34.
28. Blomsterstanden halvskærm- eller hovedformet. Engangsblomstrende 9.
" anderledes. Med golde skud 29.
29. Blomsterne ikke i kvast. Kronbladene tydeligt kløvede ..... 30.
" i kvast. Kronbladene afskårne til udrandede 33.
30. Hele planten kraftigt klæbrigt kirtlet ..... viscosa
Højst stænglen klæbrig 31.
31. Bægeret 20-25mm ..... bupleuroides
" 8-15mm 32.
32. Kronbladene gule. Bægeret 8-11mm ..... flavescens
" hvide. " 12-15mm multiflora
33. Bægeret 9-12mm ..... lerchenfeldiana
" 4-6mm rupestris
34. Bægeret håret ..... 35.
" glat 38.
35. Bægeret uden kirtelhår. Kronen gul ..... flavescens
" med " 36.
36. Bægeret stærkt opblæst ..... zawadzkii
" ikke stærkt opblæst 37.
37. Bladene linjeformede ..... supina
" ægformede thymifolia
38. 10-30cm høj. Kronen hvid eller grønlig ovenpå ..... saxifraga
1-8cm høj. Kronen lyserød. Pudeplante 39.
39. Bægeret 12-15mm ..... dinarica
" 7-9mm acaulis

Silene italica (L.) Pers. Italiensk limurt. 30-80cm. Kronen hvidlig med rødlig til grønlig underside, 2/3 kløvet. Stænglen kirteldunet. Bægeret 14-21x2-3mm. Kronens negl ofte randhåret. V-VIII. Sj.

S. nemoralis W.& K. Lundlimurt. Mest 60-80cm. Som den foregående, men kronbladets negl oftest glat. V-VIII. Alm.

S. nutans L. Nikkende limurt. Bladene mest dunede. Kapslen ca. 3 x kapselstilken. V-VII. Alm.

S. dubia Herbich Som foregående, men bladene kort randhårede og ofte også yderst korthårede. Kapslen ca. 4-5 x kapselstilken. Alm.

S. viridiflora L. Grønblomstret limurt. 30-80cm. Vækst som nutans, med grønlighvide kronblade. Kun toppen kirtlet. Støvdragerne ofte længere end kronen. VI-VII. Spredt.

S. bupleuroides L. Langblomstret limurt. 25-80cm. Bladene grågrønne og glatte, de øvre smalle. Kronen hvid, lyserød eller grønlig. Alm.

S. chlorantha Sm. Hedelimurt. 30-80cm. Planten glat og ofte blågrøn med fåbladede stængler. Toppen let nikkende med vandrette eller hængende blomster. Kronen blegt gulgrøn. VI-VIII. Spredt.

S. multiflora (Ehrh.) Pers. Mangeblomstret limurt. 30-60cm. Bægeret

14-16mm, glat eller meget korthåret. Kronen hvid. VI-VII.

Silene viscosa (L.) Pers. Klæbrig limurt. V-VI. Spredt.

S. borysthenica (Gruner) Walters Småblomstret limurt. 30-80cm. Hele planten, også topgrenene tæt dunede. Bægeret 2-3mm. Kapslen ca. 3mm, m.m. rund. V-VII. Sj.

S. otites (L.) Wibel Klitlimurt. 10-50(140)cm. Få og små stængelblade, m.m. uden akselstillede skud. V-VII. ?

S. donetzica Kleopow 90-150cm. Stænglen kraftig. Mange stængelblade, med bladskud i de nedre bladhjørner. V-VII.

S. exaltata Friv. Høj limurt. 80-200cm. Mange nogenlunde lige store bladpar, de nedre ofte med bladknipper. Bladene efterhånden omrullede.

S. chersonensis (Zap.) Kleopow -150cm. Nær foregående. Bladene udstående eller lidt nedbøjede. V-VII.

S. zawadzkii Herbich Bredbladet pragtstjærne. 15-30cm. Grundbladene elliptiske, tæt randhårede. 1-3 par stængelblade. Bægeret 15-17mm håret. Kronen hvid. VI-VII. Spredt: M.Maramureş, M.Rodnei, M.Rarau, M.Bistriţei, M.Giurgeu.

S. vulgaris (Moench) Garcke Blæresmælde. VII-VIII. 4 underarter:
ssp. prostrata (Gaudin) Chater: Stænglerne udstrakte, 1-5-blomstrede. Støttebladene mest urteagtige. Bladene ægformede, bruskrandede.
ssp. glareosa (Jordan) MJ & Turrill: Som foregående, men bladene lancetformede, 2-5mm brede, uden bruskrand.
ssp. vulgaris: Stænglerne m.m. oprette, flerblomstrede. Støttebladene mest hindeagtige. Bladene 3-12x1-2,5cm, æg-lancetformede.
ssp. commutata (Guss.) Hayek: Som foregående, men bladene 4-9x2-4cm, bredt aflangt-ægformede til ægformet-elliptiske.

S. csereii Baumg. Ægbladet blæresmælde. 50-100cm. Nær foregående, men stængelbladene bredt ægformede, lidt stængelomfattende. Bægeret mindre og mindre opblæst. Kapselstilken ca. 1mm. VII-VIII. Spredt.

S. flavescens W.& K. Gul limurt. 15-30cm. Stænglen kortdunet forneden, klæbrig foroven. Grundbladene spatelformede, ret tæt hårede. Blomsterne mest 1-2 sammen. Bægeret ca. 10mm, valseformet, håret. VI-VII. Sj.

S. supina Bieb. Lav limurt. 15-40cm. Stænglerne liggende. Bladene linjeformede. 2-5 blomster. Bægeret 17-20mm. Kronen hvid med lille bikrone. V-VII. Sj.

S. thymifolia Sibth.& Sm. Timianbladet limurt. 15-20cm. Stænglerne liggende. Bægeret 12-15mm, smalt kølleformet. Sandstrand. VII-VIII. Jud.Constanţa: mellem Mangalia og Mamaia.

S. saxifraga L. Stenlimurt. Stænglerne klæbrige foroven, mest 1-blomstrede. Bladene 15-30x1-1,5mm, de midterste ofte 4 sammen. Kapselstilken 4-5mm. VI-VII. Sj.

S. acaulis (L.) Jacq. Tuelimurt. Bladene 4-12mm, linjeformede og stift randhårede. Bægeret svagt 10-året. VII-IX. Alm. 2 underarter:

ssp. longiscapa (Kerner) Hayek: Blomsterstilken 1-3cm. Bægerets grund afskåret. Kapslen 1,5-2 x bægeret.
ssp. exscapa (All.) J.Braun: Blomsterstilken 1-5mm. Bægergrunden m.m. kileformet. Kapslen ikke meget længere end bægeret.

Silene dinarica Sprengel Dunet tuelimurt. Som foregående, men stænglerne m.m. dunede, mest med 2-4 par blade. Bægeret netåret. VII-VIII. Sj: M.Fagaraş, M.Cozia, M.Godeanu.

S. rupestris L. Fjældlimurt. 10-20cm. Glat og blågrøn med spidse, lancetformede blade på 1,5-3cm. Åben, mangeblomstret kvast. Kronen mest hvid. VI-IX. Sj. M.Maramureş.

S. lerchenfeldiana Baumg. Opstigende limurt. 3-20cm. Glat og blågrøn, liggende til opstigende stængler fra grundbladshjørnerne. Kronen hvid til lyserød. VII-VIII. Sj.

S. pusilla W.& K. Strålefrø. 8-15cm. Med spinkle stængler og smalle blade. Bægeret mest glat, tænderne 1,5-2,5mm. Kronen mest hvid. VII-IX.

S. armeria L. Knippelimurt. 15-60cm. Mest enårig. Blomsterstilkene 2-15mm. Kronen mest lyserød. Bægertænderne korte og butte. Bægeret 12-15mm. Kronen udrandet. VI-VIII. Spredt.

S. compacta Fischer Hovedlimurt. 30-80cm. Blågrøn. Stænglen klæbrig foroven. Stærkt lyserøde blomster med hele kronblade. Bægeret 13-20mm. VI-VIII. Sj.

S. noctiflora L. Natlimurt. VII-IX. Alm.

S. alba (Miller) E.H.L.Krause Aftenpragtstjærne. VI-IX. Alm.

S. dioica (L.) Clairv. Dagpragtstjærne. V-IX. Spredt.

S. heuffelii Soó Lundpragtstjærne. 30-40cm. Nær alba, men bladene større, ofte meget tynde. Blomsterne mindre. Kronens plade mest 4-6mm. Kronskællene ca. 1mm. V-VI. Alm.

S. trinervia Seb.& Mauri (S. gallinyi) Stivhåret limurt. 20-60cm. Dobbelt behåring af korte og lange børster. Bægeret tiltrykt aksen, med tykgrundede ribbehår. Rødlilla krone. VI-VII. Sj.

S. pendula L. Rød limurt. 20-40cm. Stænglen dunet. Klasen ensidig. Frugtbægeret opblæst og indsnævret foroven, 13-18mm. VI-VIII. Forvildet.

S. dichotoma Ehrh. Gaffellimurt. 30-40cm. Blomsterstanden med 2-4 sviklер, oftest med midterblomster. Blomsterne siddende. Bægeret 7-15mm, lidt stivbørstet på ribberne. V-VI. Spredt.

S. gallica L. Fransk limurt. 10-50cm. Sviklen altid ugrenet. Bægeret 7-10mm, opret i blomst, indsnævret foroven, med langt stivhårede ribber. Kronen hvid eller rød. VI-VII. Spredt.

S. conica L. Keglelimurt. IV-VI. Spredt.

Cucubalus baccifer L. Bærsmælde. 60-120cm. Stærktgrenet, tyndstænglet, dunet flerårig. Bægeret bredt klokkeformet. Kronbladene smalle, kløvede

og grønlighvide. VII-IX. Alm.

Gypsophila. Gipsurt.

1. Enårig uden golde skud ..... muralis
   Flerårig, med golde skud 2.
2. Blomsterne m.m. siddende i tætte, hovedformede nøgler ..... 3.
   " tydeligt stilkede 4.
3. Stænglen 4-20cm, ugrenet, med 1 blomsternøgle ..... petraea
   " 20-80cm, grenet glomerata
4. Kvasten kirtelhåret ..... 5.
   " glat 6.
5. Bladene 1-strengede, linjeformede, 1-4mm brede ..... fastigiata
   Fleste blade 3(5)strengede, m.m. lancetformede acutifolia
6. Nedre blade 10-35mm brede ..... perfoliata
   Bladene 1-4mm brede 7.
7. Kvasten åben. Blomsterstilkene 2-3 x bægeret ..... paniculata
   " tæt. " kortere end bægeret collina

Gypsophila muralis L. Murgipsurt. 4-25cm. Stænglerne grenede, glatte forneden, m.m. fintdunede foroven. Bladene 1/2-3mm brede, blågrønne. Blomsterstilkene trådformede. VI-X. Alm.

G. petraea (Baumg.) Rchb. Hovedgipsurt. Tæt tueformet. Bladene 2-5cm x 1mm. Hovedet 1-2cm bredt, ofte kugleformet, med hinadeagtige, store, trekantet-ægformede svøbblade. VI-VIII. Alm.

G. glomerata Pallas Nøglegipsurt. M.m. tueformet. Bladene 2-10cm x 1-4mm, blågrønne. Blomsterhovederne langstilkede, med svøb af hindeagtige, spidst-trekantede blade. V-VIII. Sj.

G. perfoliata L. (G. trichotoma) Gennemvokset gipsurt. 30-100cm. Gulgrøn. Nedre blade 2-8cm. Bladene kort sammenvoksede ved grunden, dunede, 3-7-strengede. VI-VII. Sj.

G. paniculata L. Brudeslør. 50-90cm. Blågrøn og mest glat. Bladene 2-7cm x 2,5-10mm. Bægeret 1,5-2mm. VI-IX. Spredt.

G. collina Steven Bakkegipsurt. 5-100cm. Glat og blågrøn. Bladene linjeformede. Bægeret 2-2,5mm. VI-VIII. Spredt.

G. fastigiata L. Sandgipsurt. 5-100cm. Bladene 2-8cm. Bægeret 2-3mm. Kronen ca. 1,5 x bægeret. VI-VIII. Sj.

G. acutifolia Steven Spidsbladet gipsurt. 20-170cm. Bladene 2-8cm x 2-10mm. Bægeret 3-3,5mm. Kronen 2 x bægeret. VII-VIII. Dyrket og forv.

Saponaria. Sæbeurt.

1. Lysegule blomster i endestillede hoveder ..... bellidifolia
   Blomsterne lyserøde til hvide 2.
2. Stænglerne 1-blomstrede. 5-15cm høj. Mest 3 grifler ..... pumilio
   " mangeblomstrede. 2 grifler. 25-90cm høj 3.
3. Planten m.m. glat. Kronens plade 10-15mm, m.m. hel ... officinalis
   " kirtlet-stivhåret. Kronens plade ca. 5mm, kløvet glutinosa

Saponaria bellidifolia Sm. Rosetsæbeurt. 10-25cm. Grundbladene spatelformede, 2,5-7cm. 1(2) par stængelblade. Hovedet 1-3cm bredt med 1 par støtteblade. VI-VII. Sj.

S. pumilio (L.) Fenzl (S. pumila) Lav sæbeurt. Tueformet. Stænglerne ofte kortere end blomsterne. Bægeret 13-20mm, oppustet, håret og buttandet. VIII-IX. Sj. i fjældet. M.Iezer, M.Fagaraş.

S. glutinosa Bieb. Klæbrig sæbeurt. 25-70cm. Kvasten ofte tæt, en halvskærmagtig top. Bægeret 18-25mm, smalt og spidstandet. Kronen blegrød. V-VI. Sj: Donau mellem Sviniţa og Orşova.

S. officinalis L. Almindelig sæbeurt. VI-IX. Alm.

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert Konellike. 30-60cm. Glat enårig. Stærkt grenet kvast. Bægeret pæreformet med 5 brede vinger. Kronen lyserød, afstudset eller tolappet. VI. Spredt.

Petrorhagia illyrica (Ard.) Ball & Heyw. ssp. haynaldiana (Will.) Ball & Heyw. Rødhannet knopnellike. 10-30cm. Knippeagtig flerårig. Bægeret uden dækblade under sig, 5-8mm. Bladene 3-strengede. Kronbladene 5,5-10 mm, hvide, ofte med rødplettet grund. VI-IX. Alm.

P. saxifraga (L.) Link Fjældknopnellike. 5-45cm. Knippeagtig flerårig. Bægeret med 4 dækblade, 3-6mm. Bladene 1-strengede. Kronbladene 4,5-10 mm, hvide eller blegrøde. VI-VII. Sj.

P. prolifera (L.) Ball & Heyw. Glat knopnellike. 10-20(50)cm. Enårig. Blomsterne i et hovede, hvor bægeret dækkes helt af meget store, brunlige støtteblade. V-IX. Alm.

Dianthus. Nellike.

1. Bladskederne højst 2(sj. 3) x så lange som stængelbredden ..... 2.
   " mindst 3 x så lange som stængelbredden 25.
2. 1-2-årig ..... 3.
   Flerårig 4.
3. Bægeret 15-20x2-3mm. Kronen mørkerød ..... armeria
   " ca. 10x1,5mm. " lyserød pseudarmeria
4. Kronbladene mindst 1/3 frynsede ..... 5.
   " tandede til næsten helrandede 9.
5. Bladene uden en tyk rand. Kronen mest rød ..... superbus
   Øvre blade med en tyk rand eller ribber nær randen 6.
6. Bladene tilsmalnede fra over midten. 1-4(10) par stængelblade .. 7.
   " " " nær grunden 8.
7. Kronbladenes plade med en plet nær grunden ..... arenarius
   " " uplettet spiculifolius
8. Planten mest blågrøn. 8-14(6-19) par stængelblade ..... serotinus
   " grøn. Mest 2-5 par stængelblade petraeus
9. I det mindste nogle blade butte eller halvbutte ..... 10.
   Alle blade spidse eller tilspidsede 14.
10. Mange blomster i et tæt hovede ..... 11.
    Blomsterne enlige 12.

11. Nedre blade kortstilkede. Højbladene kortere end blomsterne ..... compactus
    Alle blade siddende. Højbladene = blomsterne ..... barbatus
12. Kronbladene plettede ..... deltoides
    " uplettede ..... 13.
13. Mindst 5 par stængelblade ..... callizonus
    Højst 4 " " ..... glacialis
14. Bladene tynde og flade, uden tyk rand eller randnær ribbe ..... 15.
    Ihvertfald de øvre blade med en tyk rand eller ribbe ..... 21.
15. Yderbægerbladene tydeligt og bredt hindekantede ..... 16.
    " ikke tydeligt hindekantede ..... 17.
16. Bægertænderne tilspidsede ..... membranaceus
    " butte ..... dobrogensis
17. Kronbladene glatte ..... pallens
    " hårede inderst ..... 18.
18. Yderbægeret mindst af bægerets længde, bladagtigt ..... 19.
    " kortere end bægeret ..... 20.
19. Bladene 7-9-strengede. Kronen ej hvidplettet ..... trifasciculatus
    " 3-5-strengede. " hvidplettet ..... guttatus
20. 1-få kraftige stængler med mest 7-15 par blade ..... collinus
    Mange, spinkle stængler med mest 3-4 " " ..... pratensis
21. Kronens underside grønlig ..... 22.
    " " ikke grønlig ..... 23.
22. Kronens overside med hår (skægget) ..... campester
    " " uden hår ..... pallens
23. De fleste blomster med 6 yderbægerblade ..... nardiformis
    " " " " 4 " ..... 24.
24. Grundbladene visne under blomstringen ..... leptopetalus
    " grønne " " ..... petraeus
25. Øverste blade stærkt udvidede nær grunden ..... 26.
    " " ikke " " " ..... 27.
26. Bægeret 8-8,5mm. Bladene 1-1,5mm brede ..... kladovanus
    " 10-17mm. " ca. 2mm " ..... capitatus
27. Bladene tynde og flade, uden nogen tyk rand ..... 28.
    " med en tyk rand eller ribbe nær randen ..... 29.
28. Yderbægerbladene bredt hindekantede ..... 16.
    " ikke bredt hindekantede ..... membranaceus
29. Bægertænderne butte ..... bessarabicus
    " tilspidsede ..... 30.
30. Yderbægerbladene fortil med bølget rand ..... banaticus
    " uden nogen " " ..... 31.
31. Højblade, yderbæger, stængler og blade fintdunede ..... puberulus
    " og yderbæger glatte ..... 32.
32. Bladene 1/2-1mm brede ..... 33.
    " 1-5mm brede ..... 36.
33. Blomsterne i tætte hoveder ..... 34.
    " 1-4(-6) sammen, oftest tydeligt stilkede ..... 35.
34. Yderbægeret tilsmalnet i en stak. Kronens plade 5-7mm ..... pinifolius
    " med påsat spids. Kronens plade 3-5mm ..... vandasii

35. Stængelbladene mindst lig stængelleddene ..... tenuifolius
" kortere end " henteri
36. Yderbægerbladene sort- eller mørkebrune, med en påsat spids på 3-6mm ..... carthusianorum
Yderbægerbladene rødlige eller brune, anderledes 37.
37. Bægeret 17-22mm. Kronens plade 5-8mm ..... giganteus
" 10-14mm. " " 3-5mm pontederae

Dianthus collinus W.& K. Rank nellike. 20-80cm. Bladene 3-8mm brede. Få-ingen grundblade under blomstringen. 3-5 bladribber. Mest 2-8 blomster, ofte i 2 ret løse hoveder. Bægeret 14-18mm. VI-X. Alm. 2ssp.:
ssp. collinus: Planten kortdunet.
ssp. glabriusculus (Kit.) Soó: Planten glat.

D. pratensis Bieb. ssp. racovitzae (Prodan) Tutin 40-60cm. Bladene 2-7cm x 2-4mm. 1-2 langstilkede blomster. Ydre yderbægerblade ca. 10 mm. Bægeret 10-17x4-5mm, bredest midtpå.

D. trifasciculatus Kit. Trehovedet nellike. 30-60(80)cm. Bladene 4-10 mm brede. Mest 10-20 par stængelblade. Blomsterne ofte i 3 stilkede hoveder. Grønspidsede yderbægerblade. VII-IX. 3 underarter:
ssp. deserti (Prodan) Tutin: Kronens plade ca. 4mm, lyslilla. Sj.
ssp. trifasciculatus: Kronens plade ca. 10mm, lyserød. Hovederne kortstilkede. Bægeret ca. 16mm. Alm.
ssp. euponticus (Zap.) Kleopow: Kronens plade ca. 10mm, rødlilla. Hovederne langstilkede, ofte flere end 3. Bægeret 10-13mm.

D. guttatus Bieb. Dråbenellike. 20-45cm. Bladene 1-3mm brede. Blomsterne mest enlige. Bægeret 15-17mm. Kronen med lyserød, hvidprikket overside og gulgrøn underside. VI-VII. Sj.

D. membranaceus Borbas Hindekantet nellike. 30-70cm. Mest 3-6-blomstrede hoveder. Bægeret 12-18mm, tilsmalnet opad, med hvidrandede tænder. Rødlilla krone. VI-VIII. Spredt.

D. dobrogensis Prodan 30-60cm. Nær foregående, men bægeret ca. 10mm. Kronen lyserød, uden behåring. VI-VIII. Sj.: Jud.Constanţa: Murfatlar. Jud.Tulcea: Jurilovca.

D. barbatus L. Studenternellike. 30-60cm. Bladene lancetformede, 5-18mm brede. Kronen rødlilla, kortskægget. Bæger og yderbæger mest grønne. Dyrket og forvildet.

D. compactus Kit. 30-70cm. Som foregående, men bæger og yderbæger mest brunlilla. VI-VIII. Alm.

D. callizonus Schott & Kotschy Bæltenellike. 5-20cm. 1-blomstrede stængler. Nedre blade butte. Grønspidsede yderbægerblade. Bægeret ca. 16mm, bredere opad. Karminrød krone. VII-VIII. M.Piatra Craiului SV for Brasov, alm. på V-siden.

D. glacialis Haenke ssp. gelidus (Schott & al.) Tutin Isnellike. 2-10 cm. Bladene randhårede forneden. Bægeret 12-16x5-7mm, bredere opad. Kronens plade 10-12mm. VII-VIII. Spredt.

Dianthus petraeus W.& K. (D. kitaibelii) Stennellike. 10-30cm. Løsttuet. Bladene tilspidsede. Mest 2-5 par stængelblade. Yderbægeret 1/5-1/4 x bægeret. Kronen mest hvid. VI-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. petraeus: Bægertænderne glatrandede. Kronen 1/3-1/2 fliget.
ssp. simonkaianus (Peterfi) Tutin: Bægertænderne med tæthåret rand. Kronen tandet. Jud.Cluj.

D. spiculifolius Schur Skægnellike. Nær foregående. Bægertænderne med tæthåret rand. Kronens plade 10-15mm, skægget.

D. serotinus W.& K. Høstnellike. 20-30cm. Bægeret 20-28x2,5-4mm, tilsmalnet fra under midten. Kronen mest flødefarvet. VII-IX. Sj.

D. superbus L. Strandnellike. VI-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. superbus: Stænglen grøn, liggende til opstigende, mangeblomstret. Kronens plade med en grøn plet ved grunden. Lavlandet.
ssp. speciosus (Rchb.) Pawł.: Stænglen blågrøn, opret, 1-fåblomstret. Kronen sortprikket ved grunden. I bjærgene.

D. arenarius L. ssp. borussicus (Vierh.) Kleopow Sandnellike. 20-30cm. Bladene ofte under 1mm brede. 2-4 yderbægerblade op til 1/4 x det 16-25 mm lange og næsten valseformede bæger.

D. deltoides L. Bakkenellike. VI-IX. Spredt.

D. campester Bieb. Marknellike. 15-40cm. Bladene ca. 1mm brede, de nedre visne under blomstringen. Kronen lyserød eller rødlilla ovenpå. 4-6 hindekantede yderbægerblade. VI-VII. Sj. 2 underarter:
ssp. campester: Bladene 3-strengede, skeden 2-4mm.
ssp. serbanii Prod.: Bladene 5-strengede, skeden indtil 7,5(10)mm.

D. pallens Sm. Bleg nellike. 30-60cm. Mest blådugget. Fortykkede bladfæster. Bægeret 18-22x4mm, valseformet og bleggrønt. Kronen mest hvid ovenpå. VI-VII. Spredt.

D. leptopetalus Willd. Smalkronet nellike. 30-60cm. Bægeret 27-33mm, tilsmalnet fra under midten. Kronens plade aflang eller smalt rudeformet 4-4,5mm bred, hvid ovenpå. VI-VII. Spredt.

D. armeria L. Kostnellike. VI-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp. armeria: Indre yderbægerblade lancetformede. Bægeret grønt.
ssp. armeriastrum (Rchb.) Pawł.: Indre yderbægerblade ægformede. Bægeret rødlillat.

D. pseudarmeria Bieb. Lys kostnellike.20-40cm.Som foregående, men yderbægerbladene ægformede og brat tilsmalnede i en sylspids. VI-VII. Sj.: Jud.Constanța, Jud.Tulcea, Jud.Galați.

D. nardiformis Janka Katteskægsnellike. 5-15cm. Tættuet. Grundbladene ca. 10mm, børsteformede, halvtrinde, ca. 1/2mm brede. 6-10 par stængelblade. Bægeret 15-18mm. Lyserød krone. Jud.Constanța, Jud.Tulcea. Sj.

D. capitatus Balbis Hovednellike. 30-70cm. De 1-2 øvre bladpar med stærkt udvidet grund. Tætte, mangeblomstrede hoveder. Støttebladene ca. = bægeret, ægformede, læderagtige. VI-VIII. Spredt. 2 underarter:

ssp. capitatus: Yderbægerbladene ca. = bægeret. Kronen håret.
ssp. andrzejowskianus Zap.: Yderbægerbladene 1/2-2/3 x bægeret. Kronens plade glat.

Dianthus pinifolius Sm. ssp. serbicus Wettst. Fyrrenålsnellike. 20-40 cm, tættuet. Bladene med tydelig midterribbe og stærkt fortykket rand. Ofte 6 yderbægerblade. Rødlilla krone. VI-VII. Sj.

D. giganteus D'Urv. Høj nellike. 30-100cm. Meget kraftig, undertiden blådugget. Bladene 2-4mm brede, bredest midtpå. Hovederne med 15-50 rødlilla blomster. Brunligt yderbæger. VI-VII. Alm.

D. pontederae Kerner Græsnellike. 25-60cm. Nær foregående, men spinklere. 8-16 blomster sammen. Kronen mest lyserød. VI-VII. Spredt. 2ssp:
ssp. pontederae: Bægeret ca. 10mm. Nedre yderbægerblade brune, brat tilsmalnede i en kort stak.
ssp. giganteiformis (Borbas) Soó: Bægeret 13-15mm. Nedre yderbægerblade stråfarvede og tilspidsede.

D. vandasii Velen. Nær foregående. Grundbladene børsteformede, ½-1mm brede, indrullede. Nedre stængelblade længere end stængelleddene. Yderbægerbladene med påsat spids. Jud-Dolj: Dioşti ?

D. banaticus (Heuffel) Borbas 30-100cm. Nær giganteus. Bægeret 12-15 x 3-4,5mm (17-20mm hos gig.). Hovederne mere fåblomstrede. Yderbægerbladene mørkebrune. VI-VII. Spredt.

D. kladovanus Deg. 25-40cm. Nær pontederae. Bægertænderne halvbutte og brodspidsede. VI-VII. Sj.

D. bessarabicus (Kleopow) Klokov. 30-50cm. Kraftig. Blomsterne ofte i et hovede. Støttebladene aflange, ofte grønspidsede. Yderbægeret hindekantet. Kronens plade 10-15mm, mørkt rødlilla.

D. carthusianorum L. Kartøjsernellike. 20-60cm. Yderbægerbladene med afrundet eller tværr spids med lang, påsat stak. Blomsterne i et ofte tæt hovede. Kronens plade 6-12mm. VI-VIII. Alm.

D. puberulus (Sim.) Kerner Dunet kartøjsernellike. 25-50cm. Som foregående. Kronens plade under 10mm, lyserød. VI-VII. Alm.

D. tenuifolius Schur Smalbladet nellike. 8-25cm. Som carth., men med talrige stængler. Støttebladene mindst lig hovedet. Bægeret 2-3mm bredt. VII-VIII. Alm. i bjærgene.

D. henteri Heuffel 15-30cm. Bladene ca. 1/2mm brede, ret stive. Mest 2-3 blomster sammen. Bægeret 12-14x4-5mm, næsten valseformet, grønt eller lillat med brune tænder. VI-VII. Spredt.

NYMPHAEACEAE

Nymphaea alba L. Nøkkerose. Bladenes nedre sideribber rette eller svagt bøjede. Blomsten 10-20cm bred med 20-25 kronblade. Støvfanget fladt med 14-20 arstråler. VI-IX. Alm.

N. candida C.Presl Liden nøkkerose. Bladene 10-25cm brede med bøjede nedre sideribber. Blomsten 4-12cm bred, med firkantet grund og 15-18

kronblade. Støvfanget indadhvælvet med 8-12 arsträler. VII-IX. Sj.

Nymphaea lotus L. Ægyptisk lotus. Bladene 20-50cm brede, skjoldformet-runde, med bølget og tornet-tandet rand. Bægerbladene tydeligt hvidårede. 12-25 hvide kronblade med noget lilla yderside. VII-IX. Jud.Bihor: Oradea la Baile 1 mai, Maile Felix, Pir.Peţea og Pir.Cordau.

Nuphar luteum L. Gul åkande. VI-VIII. Alm.

NELUMBONACEAE

Nelumbo nucifera Gaertner Indisk lotus. Bladene skjoldformede, 30-100 cm brede, næsten runde, rager nogle dm op over vandet. 16-23cm brede, lyserøde åkandeblomster. VI-VIII. Forvildet.

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum demersum L. Tornfrøet hornblad. Bladene ret stive. 1-2 x delte. Nødden med 3 horn. VI-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. demersum: Nødden ikke vinget. Nedre torne trinde, skrät bagudrettede. Alm.
ssp. platyacanthum (Cham.) Nyman: Nødden med en m.m. bred vinge mellem tornenes grund. Nedre torne affladede, udadrettede. Donaudeltaet.

C. submersum L. Tornløst hornblad. Bladene blødere, 3 x delte. Nødden med 0-1 kort horn. VI-VII. Spredt.

RANUNCULACEAE

1.	Blomsterne uregelmæssige	2.
	" regelmæssige	4.
2.	Øvre kronblad hjælmformet krummet. Ingen spore	Aconitum
	" " ikke hjælmformet, men forlænget i en spore	3.
3.	1 bælgkapsel. Enårig	Consolida
	3 bælgkapsler. Flerårig	Delphinium
4.	Blosteret dannet af ensartede blade	5.
	" med tydeligt bæger og krone	18.
5.	Frugten et bær	Actaea
	" tør	6.
6.	Frugterne bælgkapsler	7.
	" nødder	14.
7.	De indre blosterblade sporeformet forlængede	Aquilegia
	Ingen sporedannende blosterblade	8.
8.	De 5 bælgkapsler mindst 1/2 sammenvoksede, langgriflede	Nigella
	Bælgkapslerne indbyrdes frie	9.
9.	Blomsterne smørgule	10.
	" af en anden farve	12.
10.	Bladene hele og nyreformede	Caltha
	" delte	11.
11.	Stængelbladene i en krans på 3 under blomsten	Eranthis
	" spredte	Trollius
12.	Bladene hånd- eller fodfligede, 1 x delte	Helleborus
	" 2-3 x fjersnitdelte eller trekoblede. Blomsten hvid	13.

13. Bladene 2 x trekoblede. Åben, fåblomstret stand ..... Isopyrum
" 2-3 x fjersnitdelte. En lang, smal klase Cimicifuga
14. Bladene modsatte ..... Clematis
" spredte, i roset eller krans 15.
15. Bladene linjeformede, alle i roset ..... Myosurus
" brede og delte 16.
16. Stængelbladene spredte ..... Thalictrum
" i en krans på 3 17.
17. Nødden med et langt, fjerformet næb ..... Pulsatilla
" kortnæbbet Anemone
18. Blomsterne blå. Ingen stængelblade ..... Hepatica
" ikke blå, mest med stængelblade 19.
19. Blomsterne hvide ..... 20.
" gule eller røde 21.
20. 6-13 kronblade. Bladene 3-4 x delte ..... Callianthemum
5 " Ranunculus
21. 3 bægerblade ..... Ranunculus ficaria
5 " 22.
22. Sortlilla støvknapper eller 10-20 kronblade ..... Adonis
Gule støvknapper og 5 kronblade 23.
23. Nødden med et næb på 2-3 x nødden ..... Ceratocephalus
" " " kortere næb Ranunculus

Helleborus odorus W.& K. Vellugtende nyserod. 15-45cm. Blomsterne lyst gulgrønne, 5-7cm brede. Bladene hånd- til lidt foddelte med mest 5-7 afsnit, glatte. II-IV. Spredt.

H. dumetorum W.& K. Lundnyserod. -45cm. Blomsterne grønne, 3,5-5cm brede, lugtløse. Bladene fodfligede med 9-11 afsnit, glatte.

H. purpurascens W.& K. Purpurnyserod. 15-35cm. Blomsterne dybt rødlilla, 5-7cm brede. Bladene mest fodfligede, med mest 5 hovedafsnit. Alm.

Eranthis hiemalis (L.) Salisb. Vinterblomme. II-III. Forvildet.

Callianthemum coriandrifolium Rchb. Alpesmykkeblomst. 5-20cm. Hvide, anemonelignende blomster, dog med 5 bægerblade. Bladene 2,5-9cm, 2-3 x persilleagtigt fjersnitdelte. VI-VII. Sj.

Nigella. Sortkommen. Enårige med linjeformet fjersnitdelte blade. 5 blosterblade samt 5 små honningblade.

N. arvensis L. Agersortkommen. 10-30cm. Kronbladene hvide eller lyseblå. Støvknapperne med brodspids. Bælgkapslerne 1/2 sammenvoksede, omvendt kegleformede i frugt med skråt oprette grifler. VII-IX. Alm.

N. sativa L. Ægte sortkommen. 20-40cm. Blosteret hvidt med grønlig eller blålig spids. Støvdragerne uden brodspids. Bælgkapslerne 2/3 sammenvoksede, nærmest halvkugleformede i frugt, med oprette grifler. Forv.

N. damascena L. Jomfruen i det grønne. 20-40cm. Den lysebla blomst omgives af et svøb af 5 bladlignende højblade. V-VII. Forvildet.

Trollius europaeus L. Engblomme. VI-VII. Alm.

Isopyrum thalictroides L. Muslingeblomst. 10-30cm. Bladene blågrønne, som små akelejeblade. Et enkelt, hvidt, let affaldende, anemoneagtigt, 5-bladet bloster, 10-20mm bredt. IV-V. Alm.

Actaea spicata L. Druemunke. V-VII. Alm.

Cimicifuga europaea Schipcz. Sølvlys. 40-100(200)cm. Bladene meget store, 2-3 x delte med spidse, uregelmæssigt, dybt dobbelt savtakkede, ægformede småblade. Blomsterne i meget lange og smalle, hvide klaser med iøjnefaldende støvdragere. VII-VIII. Spredt.

Caltha palustris L. Engkabbeleje.

Aconitum. Stormhat.

1. Hjælmen ca. 3 x så høj som bred. Honningsporerne spiralsnoede ... 2.
   " 1-2 x så høj som bred. Honningsporerne ej " 5.
2. Blomsten blå ..... moldavicum
   " gul 3.
3. Hjælmen med en bred grund og smal overdel ..... lasiostomum
   " sækformet, ikke meget bredere forneden 4.
4. Bladfligene 3-kløvede til midten ..... vulparia
   " fjerfligede til over midten lamarckii
5. Blomsterne gule. Blosteret blivende ..... anthora
   " blå. " affaldende 6.
6. Hjælmen højere (indtil 2 x) så lang som bred ..... 7.
   " bredere end høj 9.
7. Toppen helt uden kirtelhår ..... variegatum
   " med ihvertfald nogle kirtelhår 8.
8. Støttebladene linjeformede ..... paniculatum
   " ægformede toxicum
9. I det mindste nogle forblade tandede til kløvede ..... firmum
   Forbladene udelte til helrandede 10.
10. Oftest over 80cm. Hjælmen 18-25mm ..... romanicum
    10-60(80)cm. Hjælmen 12-20mm tauricum

Aconitum lasiostomum Rchb. Rudefliget stormhat. 70-150cm. En stor, mangeblomstret blomsterstand. 4-6 3-kløvede bladafsnit. VII. M.Rodnei. Jud. Neamț: Mrea Horaița. Jud.Suceava: Dragoleşti.

A. moldavicum Hacq. Mørk stormhat. 4-6 trekløvede bladafsnit. Hjælmen sækformet. Blomsterstanden kort krushåret. VI-VIII. 2 underarter:
ssp. moldavicum: 50-100cm. Blomsterne i top. Mangebladet. Alm.
ssp. hosteanum (Schur): -60cm. Blomsterne i klase. Fåbladet.

A. vulparia Rchb. Gul stormhat. 50-150cm. Bladene mørkegrønne med 4-6 afsnit. Hovedblomsterstanden lille, fåblomstret. VI-VII. Spredt.

A. lamarckii Rchb. Pyrenæisk stormhat. 40-200cm. Bladene lysegrønne med 7-8 afsnit. Blomsterstanden stor og mangeblomstret.

A. anthora L. Finbladet stormhat. 50-100cm. Stænglen dunet. Bladene 3-4 x delte, fligene 1-2mm brede. Hjælmen 8-12x14-16mm, m.m. halvkugleformet. VII-IX. Alm.

Aconitum variegatum L. Broget stormhat. 60-150cm. Forbladene spaltede, sidder m.m. lige under blomsten. Honningbladene rette. Hjælmen ca. 2 x så høj som bred. VIII-IX. Spredt. 2 underarter:
ssp. variegatum: Hjælmen tydeligt krummet. Topgrenene m.m. udstående.
ssp. gracile (Rchb.) Gayer: Hjælmen næsten lige. Topgrenene oprette.

A. toxicum Rchb. Kirtelstormhat. 80-200cm. Hjælmen ca. 1,5 x så høj som bred, buklet foroverbøjet. VII-VIII. Spredt.

A. paniculatum Lam. Topstormhat. 50-120cm. Honningbladene buede. Hjælmen kun lidt højere end bred. VII-VIII. Alm.

A. firmum Rchb. Bredfliget stormhat. 70-100cm. Bladene ikke tætstillede under den oftest fåblomstrede klase. VII-IX. Alm.

A. tauricum Wulfen Sæterstormhat. 10-70cm. Bladene tætstillede under klasen. VIII-IX. Alm.

A. romanicum Wol. (A. flerovii) 60-150cm. Hjælmen næsten halvkugleformet, ca. 2cm høj. Endeklasen fåblomstret, 5-8cm. Bladene med en næsten lige grund. Klasen m.m. glat. VII-IX. Jud.Neamţ: M.Magura i V.Bistricioarei. Jud.Suceava: Pocorita på M.Eva.

Delphinium fissum W.& K. Kløvet ridderspore. 50-150cm. Bladene 2-3 x håndelte til grunden, fligene 1-2mm brede. Indre blosterblade hvide med blå spids, længere end de ydre. VI-VIII. Spredt.

D. elatum L. Stor ridderspore. 50-150cm. Bladene håndformet 3-7-delte. Indre blosterblade sortagtige, kortere end de ydre. Bladene med m.m. hjærteformet grund, afsnittene ikke frie. VI-VII. Alm.

D. simonkaianum Pawł. 60-150cm. Som elatum, men bladene med m.m. kileformet grund, afsnittene næsten frie, under 1cm brede. VII-VIII. Sj. Jud.Alba: Rund i M.Mare, M.Trascau. Jud.Mureş: Ml. Balea og Ercea i Dl. Copacel. Jud.Harghita: Tulgheş la Pietrele Roşii. Jud.Vilcea: M.Capaţinii. Jud.Dimboviţa: V.Dimbovicioarei.

Consolida orientalis (Gay) Schrödinger Hyacintridderspore. 30-50cm. Blomsterne i klase. Nedre støtteblade fligede. Forbladene når blomstens grund. Sporen under 12mm. VI-VII. Alm.

C. ajacis (L.) Schur (C. ambigua) Haveridderspore. 30-60cm. Blomsterne mest i klase. Nedre støtteblade fligede. I det mindste de nedre forblade når ikke blomsten. Sporen 13-18mm. VI-VIII. Dyrket og sj. forvildet.

C. regalis S.F.Gray Kornridderspore. 30-80cm. Blomsterne i en stærkt grenet top. Nedre støtteblade hele. VI-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. regalis: Stænglen svagt grenet, toppen tæt. Blomsten 12-15mm.
ssp. paniculata (Host) Soó: Stænglen stærkt grenet, toppen meget åben. Blomsten 9-11mm.

Anemone. Simmer.

1. Blomsterne gule ..... ranunculoides
" hvide 2.
2. Stænglen med en skærm af 3-8 blomster ..... narcissiflora
" 1-blomstret 3.

3. Blosterbladene glatte på ydersiden ..... nemorosa
" hårede " " 4.
4. 5 blosterblade på 20-35x10-20mm ..... silvestris
8-10 blosterblade på 12-20x5-9mm baldensis

Anemone nemorosa L. Hvidsimmer. III-V. Alm.

A. ranunculoides L. Gul simmer. III-V. Alm.

A. narcissiflora L. Bjærgsimmer. 20-40cm. Uldhåret. Bladene håndformet delte. Med 3 siddende og ligeledes delte stængelblade under skærmen. 5(6) blosterblade. V-VII. Alm.

A. silvestris L. Filtet simmer. 15-50cm. Filtet med håndfligede blade. 15-30cm. V-VI. Alm.

A. baldensis L. Stensimmer. 6-25cm. Stænglen lådden. Bladene 2 x håndsnitdelte med fligede afsnit. VII-VIII. Sj. (Pulsatilla alba uden frugt ligner den meget, men har 6-7 blosterblade og ikke 8-10).

Hepatica nobilis Miller Blåsimmer. IV-V. Spredt.

H. transsilvanica Fuss Ungarsk simmer. 5-20cm. Bladlapperne med 3-5 store rundtakker. Blomsterne 25-40mm brede, oftest med 8-9 elliptiske blosterblade. IV-V. Spredt.

Pulsatilla. Kobjælde.

1. Stængelbladene kortstilkede, af grundbladenes type ..... alba
" siddende, smalfligede, ulig grundbladene 2.
2. Grundbladene håndfligede ..... patens
" fjersnitdelte 3.
3. Blomsterne oprette ..... 4.
" nikkende 5.
4. Grundbladene 3-4 x delte med 7-9 hovedafsnit ..... vulgaris
" 2 x " " 3-5 " halleri
5. Blosteret under 1,5 x støvdragerne, med krum spids ..... pratensis
" mindst 2 x " , uden " " montana

Pulsatilla alba Rchb. Hvid kobjælde. 6-30cm. Bladene 3 x fjersnitdelte. 6-7 hvide blosterblade på 1-2x1/2-1cm. V-VII. Alm.

P. pratensis (L.) Miller ssp. hungarica Soó Nikkende kobjælde. Underarten med blomsten gul indvendigt. III-V. Sj.

P. montana (Hoppe) Rchb. Bjærgkobjælde. 5-15cm. Grundbladene 3 x delte, til stede under blomstringen. Mørklilla blomst. III-IV. Alm.

P. vulgaris Miller ssp. grandis (Wenderoth) Zamels Opret kobjælde. Bladene kommer frem efter blomstringen. III-IV. Spredt.

P. halleri (All.) Willd. ssp. slavica (Reuss) Zamels Filtet kobjælde. 5-12cm i blomst. Grundbladene udvikles under blomstringen, ofte tæt uldhårede. IV-V. Jud.Iaşi: Mirzeşti.

P. patens (L.) Miller Åben kobjælde. 5-30cm. Kronbladene m.m. udstående. III-IV. Spredt.

Clematis. Skovranke.

1. Kronen blå ..... 2.
" hvid 3.
2. Bladene fjersnitdelte. Forveddet slyngplante ..... alpina
" udelte, ægformede. Opret staude integrifolia
3. 1-1,5m høj, opret staude. Kronen glat med filtet rand ..... recta
Slyngplante. Kronbladene filtede på begge sider vitalba

Clematis integrifolia L. Ægbladet skovranke. 30-60cm. Bladene indtil 9x5cm. Stænglen ender i en stor, mørkeblå blomst med kronblade på 4-5 cm. V-VI. Spredt.

C. recta L. Opret skovranke. Bladene blågrønne, op til 25cm, 1 x fjersnitdelte med 5-7 afsnit. Blomsterne 2cm brede, i store, endestillede toppe. VI-VII. Alm.

C. vitalba L. Almindelig skovranke. VI-IX. Alm.

C. alpina (L.) Miller Alpeskovranke. 1-2m. Bladene 2 x trekoblede med smalt ægformede afsnit. Blomsterne m.m. lyseblå, nikkende. Kronbladene 2,5-4cm. VI-VII. Alm.

Adonis. Adonis. Stærkt fligede blade. Forlænget frugtstand.

1. Flerårig. Gule støvknapper. Mindst 10 gule kronblade ..... 2.
Enårig. Sortlilla støvknapper. 5-8 røde (sj. gule) kronblade 3.
2. Bladfligene smalt linjeformede og helrandede ..... vernalis
" linje-lancetformede og tandede volgensis
3. Nøddens overkant næsten ret, uden noget hak op ..... annua
" " med et kantet eller afrundet fremspring 4.
4. Bægerbladene hårede. Nødden med sort spids ..... flammea
" glatte. " helt grøn aestivalis

Adonis vernalis L. Våradonis. 10-40cm. Blomsterne 4-8cm brede. 10-20 elliptiske kronblade. Bægeret 1/2 x kronen. Nødderne ret tæt dunede.

A. volgensis Steven Tandet adonis. 15-45cm. Flere smalt lancetformede kronblade end hos vernalis. Bægeret 1/3 x kronen. Nødderne kun dunede ved grunden. IV-V. Sj.

A. annua L. Høstadonis. 15-35cm. Bægerbladene glatte. Kronbladene skarlagenrøde med sort grund. Frugten 3,5-5mm. VI-IX. Dyrket og forv.

A. flammea Jacq. Skarlagenadonis. 20-50cm. Nødden 2,5-4mm, med et hak op lige ved næbbet. Kronen skarlagen- til blodrød, sjældent gul, mest med sort grund. V-VII. Sj.

A. aestivalis L. Junkeren i det grønne. 20-60cm. Kronbladene mønjerøde, sjældnere gule, med sort grund. Nødden mest 3,5-6mm, overkantens fremspring 1/2-1/3 fra næbbet. V-VII. Alm.

Ranunculus. Smørblomst.

1. Blomsterne hvide ..... 2.
" gule 13.

2. Vandplante ..... 3.
   Landplante 9.
3. Bladene ofte over 8cm, lig eller længere end stængelleddene .... 4.
   " under 8cm, kortere end stængelleddene 5.
4. Blomsterbunden tydeligt håret ..... penicillatus
   " m.m. glat fluitans
5. Bladene fligede i 1 plan, ikke sammenfaldende ..... circinatus
   " sammenfaldende uden for vandet 6.
6. Kronbladene 3,5-5,5mm, ikke overlappende. Ingen flydeblade ..... 7.
   " 5-15mm, overlappende. Ofte med flydeblade 8.
7. Modne frugt over 1,5mm, m.m. ægformet ..... trichophyllus
   " " under 1mm, m.m. kugleformet rionii
8. Frugtstilken kortere end det tilhørende flydeblads stilk. Honningkirtlen kredsrund. Tandede bladlapper aquatilis
   Frugtstilken længere end det tilhørende flydeblads stilk. Honningkirtlen pæreformet. Rundtakkede bladlapper peltatus
9. Grundbladene rundagtige, hele og rundtakkede ..... crenatus
   Bladene delte 10.
10. Stænglen 30-120cm, flerblomstret ..... 11.
    " 5-15cm, 1-2-blomstret 12.
11. Grundbladenes midterafsnit kortstilket ..... aconitifolius
    " " ustilket platanifolius
12. Bægeret stærkt rustfiltet ..... glacialis
    " glat alpester
13. Luftbladene alle udelte ..... 14.
    I det mindste nogle luftblade delte 21.
14. 3 bægerblade ..... ficaria
    5 " 15.
15. Grundbladene nyreformede. Stængelbladene kile-vifteformede flabellifolius
    Anderledes 16.
16. Det nederste stængelblade så bredt som langt ..... thora
    Stængelbladene længere end brede 17.
17. Blomsterne siddende ..... lateriflorus
    " stilkede 18.
18. Med fintfligede vandblade ..... polyphyllus
    Alle blade hele 19.
19. 50-150cm høj. Opret. Blomsten 3-5cm bred ..... lingua
    Lavere. Blomsten højst 2cm bred 20.
20. Enårig. Blomsten 5-9mm bred. Nødden finvortet ophioglossifolius
    Flerårig. Blomsten 8-18mm bred. Nødden jævn flammula
21. Stænglerne krybende og rodslående ..... repens
    " ikke krybende eller rodslående 22.
22. Enårig ..... 23.
    Flerårig 26.
23. Mange nødder på ca. 1mm i et forlænget hovede ..... sceleratus
    4-30 nødder i et rundt hovede 24.
24. Nødderne 2-4mm, jævne eller fintprikkede ..... sardous
    " 5-8mm, med tornede sider 25.

25. Bladene svagt lappede. Bægeret nedadrettet ..... muricatus
" smalfligede. Bægeret udstående arvensis
26. Bægerbladene nedadrettede ..... 27.
" udstående 30.
27. Frugtstanden forlænget. Nogle rødder fortykkede ..... 28.
" rund 29.
28. Tiltrykt silkehåret. Lange, smalle bladflige ..... illyricus
Udstående håret oxyspermus
29. Blomsterstilken trind. Alle rødder tynde .. constantinopolitanus
" furet bulbosus
30. Frugtstanden forlænget ..... 31.
" rund 32.
31. Grundbladene 2-3 x fjersnitdelte ..... millefoliatus
" 1 x fodfligede pedatus
32. Nødderne dunede, svagt sammentrykte. 1 x smalfligede stængelbl.33.
" glatte, tydeligt sammentrykte 35.
33. Grundbladene runde-nyreformede, udelte, tandede ..... cassubicus
" m.m. delte 34.
34. Stængelbladenes flige tandede eller lappede ..... fallax
" " helrandede auricomus
35. Blomsterstilken furet ..... 36.
" trind 37.
36. Grundbladene smalfligede ..... polyanthemos
" bredt 3-lappede nemorosus
37. 10-15cm høj, 1-3-blomstret bjærgplante. Haret blomsterbund .. 38.
15-80cm høj, oftest flerblomstret 39.
38. Bladene m.m. glatte ..... pseudomontanus
" dunede oreophilus
39. Stængel og blade tiltrykt dunede eller halvglatte ..... 40.
" " " stivhårede 41.
40. Bladene med 3-5 brede lapper. Håret blomsterbund .... carpaticus
" smalfligede. Glat blomsterbund acer
41. Frugtens næb stærkt krummet ..... lanuginosus
" " ret strigulosus

Ranunculus constantinopolitanus (DC.) D'Urv. Tæthåret smørblomst. 25-50cm. Tæt udstående-dunet forneden, tiltrykt-dunet foroven. Bladlapperne bredt ægformede med tandede lapper. IV-V. Sj.

R. polyanthemos L. Mangeblomstret smørblomst. V-VII. Alm.

R. nemorosus DC. Lundsmørblomst. VI-VII. Alm.

R. repens L. Lav smørblomst. V-VIII. Alm.

R. lanuginosus L. Uldhåret smørblomst. V-VII. Spredt.

R. acer L. Bidende smørblomst. V-VIII. Alm.

R. strigulosus Schur Bladene lidt tykke og læderagtige med brede afsnit. Bægeret med m.m. udstående, ved grunden kortere og mod spidsen længere hår. V-VIII.

R. pseudomontanus Schur Grundbladene bredt 3-5-lappede. Stængelblade-

ne smalfligede. Nødden meget kortnæbbet. VI-IX. Alm.

Ranunculus oreophilus Bieb. Kortnæbbet bjærgsmørblomst. Som foregående, men roden med hårbundter foroven. V-VIII. Alm.

R. carpaticus Herbich Karpatisk smørblomst. 15-40cm. Lang, krybende jordstængel. 1-3 op til 15cm brede grundblade. Dunede bægerblade. Kronbladene ca. 20mm. VI-VII. Alm.

R. bulbosus L. Knoldsmørblomst. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. bulbosus: Stængelgrunden knoldformet fortykket.
ssp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc.: Stængelgrunden ikke eller næppe fortykket.

R. sardous Cr. Stivhåret smørblomst. V-IX. Alm.

R. muricatus L. Pigsmørblomst. 5-35cm. Opret med hul stængel. Bladene groft takkede til 3-5-lappede. Nødderne kortpiggede, med et næb på 2-3 mm. V-VI. Sj.

R. arvensis L. Agersmørblomst. 5-30cm. Opret og grenet foroven. 3-7 oftest langtornede nødder med et næb på 3-4mm. V-VII. Alm.

R. oxyspermus Willd. Spidsfrugtet smørblomst. 10-40cm. Bladene mest tydeligt længere end brede, med dybt delte lapper. Nødderne med et ret næb, længere end nødden. V-VI. Sj.

R. illyricus L. Steppesmørblomst. 10-35cm. Hvidfiltet. Grundbladene 1-2 x delte med 2-3mm brede, helrandede flige. V-VI. Spredt.

R. pedatus W.& K. Fodfliget smørblomst. 15-30cm. Næsten helt glat. Grundbladene fodformet 3-5-delte med helrandede eller dybt todelte flige. Hindeagtige nødder. IV-V. Spredt.

R. millefoliatus Vahl Fjerfliget smørblomst. 10-30cm. Grundbladene stærkt smalfligede, fligene 3/4-1mm brede. Frugthovedet kort aflangt.

R. auricomus L. Nyrebladet smørblomst. V-VI. Alm.

R. fallax (Wimmer & Grab.) Kerner Rundbladet smørblomst. 20-50cm. Mellemform mellem den foregående og efterfølgende. IV-VI. Alm.

R. cassubicus L. Kassubisk smørblomst. 20-50cm. Grundbladene læderagtige, mørkegrønne, sav- til rundtakkede, op til 10cm brede. IV-VI. Alm.

R. flabellifolius Heuffel Vifteblad smørblomst. 20-30cm. Grundbladene rundtakkede. Stængelbladene kileformede, helrandede, dog med afrundet, savtakket yderdel. IV-VI. Jud.Caraş-Severin: Caraşova, Oravita, Prigor, Plavişeviţa.

R. sceleratus L. Tiggersmørblomst. V-VIII. Alm.

R. ficaria L. Vorterod. IV-V. Alm. 2 underarter:
ssp. bulbifer Lawalrée: Bladene ikke i roset. Med yngleknopper i bladhjørnerne efter blomstringen.
ssp. calthifolius (Rchb.) Arc.: Bladene i roset. Ingen yngleknopper.

R. thora L. Giftsmørblomst. 10-30cm. Ingen grundblade under blomstrin-

gen. Nederste stængelblad 8-13cm, nyreformet og takket, de øvre små. 1-få blomster. VI-VII. Sj.

Ranunculus alpester L. Alpesmørblomst. 3-12cm. Glat og skinnende. Bladene med 3-5 lapper, hver med 3-5 tænder eller lapper. VI-IX. Sj.

R. crenatus W.& K. Rundtakket smørblomst. 4-12cm. Glat flerårig. 1-2 små, smalle stængelblade. 1-2 blomster, 2-2,5cm brede. VI-VIII. Spredt.

R. aconitifolius L. Stormhattesmørblomst. 20-50(-100)cm. Bladene dybt håndformet 3-5-delte med m.m. smalt rudeformede, savtakkede afsnit. Blomsterstilken dunet under blomstringen, 1-3 x støttebladet. Spredt.

R. platanifolius L. Lønbladet smørblomst. 40-120cm. Nær foregående. Blomsterstilken altid glat, 4-5 x støttebladet. VI-VII. Alm.

R. glacialis L. Issmørblomst. 10-15cm. Oftest glat bortset fra bægeret. Bladene med 3, oftest stilkede og atter dybt delte afsnit. VII-IX. Sj.

R. flammula L. Kærsmørblomst. VI-IX. Alm.

R. lingua L. Langbladet smørblomst. VI-VII. Alm.

R. ophioglossifolius Vill. Tungesmørblomst. 10-40cm. Bladene lancet- til bredt ægformede, ofte svagt tandede. Stænglen slap, opstigende. Nødderne 1,5mm. IV-VII. Sj.

R. lateriflorus DC. Stilkløs smørblomst. 5-25cm. Stærktgrenet enårig. Blomsterne 2,5-3mm, i stænglens forgreningspunkter og modsat bladene. Lysegul krone. IV-V. Spredt.

R. polyphyllus W.& K. Forskelligbladet smørblomst. 10-15cm. Krybende og opstigende. Vandbladene trådfligede; luftbladene 5-10mm, hele til svagt 3-lappede. Blomsterne små, 3-6mm. IV-V. Sj.

R. peltatus Schrank Storblomstret frøpeber. V-VIII. Spredt.

R. aquatilis L. Almindelig frøpeber. V-VIII. Spredt.

R. trichophyllus Chaix Hårfliget frøpeber. VI-VIII. Alm.

R. rionii Lagger Enårig frøpeber. V-VIII. Spredt.

R. circinatus Sibth. Kredsbladet frøpeber. VI-VIII. Sj.

R. fluitans Lam. Flodfrøpeber. Ingen flydeblade. Udvoksede blade 10-30 cm lange, afsnittene m.m. parallelle. VI-VIII. Sj.

R. penicillatus (Dum.) Bab. (R. pseudofluitans) Penselfrøpeber. Som foregående, men undertiden med flydeblade. V-VIII. Sj.

Ceratocephalus testiculatus (Cr.) Roth Ret kartefrø. 2-5cm. Enårig rosetplante med håndfligede blade. Små gule blomster med bæger. Ret stor, ægformet frugtstand. III-IV. Alm.

Myosurus minimus L. Musehale. IV-V. Alm.

Aquilegia transsilvanica Schur Storblomstret akeleje. 15-45cm. Sporen knap 1/2 x blosteret, hagekrummet. Ydre blosterblade 22-40x16-22mm,

blålilla. VII-VIII. Sj. M.Bucegi, M.Iezer, M.Fagaraş (alm.), M.Paring.

Aquilegia nigricans Baumg. Mørk akeleje. 15-80cm. Stænglen kirtelhåret. Støvdragerne rager 2-10mm ud af blosteret. Ydre blosterblade 25-35mm. Sporen krummet, mindst lig blosteret. VI-VII. Spredt.
ssp. nigricans: 40-80cm. Med mange blå til mørkt blålilla blomster.
ssp. subscaposa (Borbas) Soó: 15-30cm. 1-3 klart blå blomster.

A. vulgaris L. Alm. akeleje. Sporen mindst lig blosteret. Stænglen uden kirtelhår. Støvdragerne højst 1(-5?)mm udragende. VI-VII.

Thalictrum. Frøstjærne.

1. Blomsterne i klase. Stænglen med 0(-1) blade ..... alpinum
" i top. Stænglen flerbladet 2.
2. Støvtråden foroven så bred som støvknappen ..... aquilegifolium
" trådformet 3.
3. Bladafsnittene ca. så brede som lange ..... 4.
" 2-10 x så lange som brede 5.
4. Stængel og blade tætkirtlede ..... foetidum
" " " glatte minus
5. Støvdragerne hængende. Støvknapperne brodspidsede ..... simplex
" oprette. " højst meget kort brodspids. 6.
6. Uden udløbere. Bladene uden skedelapper ..... lucidum
Med " . Unge blade med små (1mm) skedelapper flavum

Thalictrum aquilegifolium L. Akelejefrøstjærne. 40-120cm. Bladene 2-3 x trekoblede, småbladene højst 1,5 x så lange som brede. Støvtrådene lyslilla eller hvide. V-VIII. Alm.

T. alpinum L. Fjældfrøstjærne. 5-12cm. Bladene 1-2 x delte med rundagtige, tandede småblade. Blomsterne grønlilla, først hængende, siden oprette. V-VII. Sj.

T. foetidum L. Stinkende frøstjærne. 20-40cm. Planten stinkende. Småbladene højst 2-4(5)mm lange, virker rynkede på grund af de indsænkede ribber. Gule, hængende blomster. VI-VIII. Spredt.

T. minus L. Liden frøstjærne. V-VIII. Alm. 3 underarter:
ssp. saxatile Schinz & Keller: Bladene samlede på eller under stængelmidten. Småbladsundersiden med fremtrædende ribber.
ssp. minus :Bladene m.m. jævnt fordelte. Toppen grener sig over stængelmidten. Småbladene mest 4-15mm brede.
ssp. majus (Cr.) Rouy & Fouc.: Toppen grener sig ved stængelmidten. Bladene m.m. jævnt fordelte. Småbladene mest 10-30mm brede.

T. simplex L. Rank frøstjærne. VI-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. simplex: Øvre småblade 3-5mm brede, lappede eller tandede.
ssp. galioides (Nest.) Borza: Alle småblade 1-2mm brede, udelte.

T. lucidum L. Skinnende frøstjærne. 60-120cm. Bladoversiden skinnende. Ingen udløbere og derfor ikke bestanddannende. Stænglen mat og furet. Nedre småblade 16-25x3-5mm. VII-VIII. Alm.

T. flavum L. Gul frøstjærne. VI-VIII. Spredt.

PAEONIACEAE

Paeonia. Bonderose.

1. Nedre blade med over 40 flige, hver under 5mm bred ... tenuifolia
   " " " under 40 afsnit, hvert over 5mm bredt 2.
2. Nedre blade med 17-30 smalt elliptiske afsnit ..... peregrina
   Alle blade med 9-16 elliptiske til rundagtige afsnit 3.
3. Småbladene rundagtige med bølget rand ..... daurica
   " elliptiske til ægformede, flade mascula

Paeonia tenuifolia L. Smalfliget bonderose. 10-50cm. Bladundersiden dunet. Blomsten 6-8cm bred. Gule støvtråde. IV-V. Spredt.

P. peregrina Miller Balkanbonderose. 50-80cm. Yderste bladafsnit indtil 8-9x1cm, med børster langs oversidens ribber. Blomsten 7-13cm bred. Støvtrådene røde. V-VI. Spredt mod syd.

P. mascula (L.) Miller Storbladet bonderose. 50-70cm. Bladene 2 x trekoblede. Blomsten 8-14cm bred. 3-5 bælgkapsler. IV-V. Sj. SV.

P. daurica Andrews Rundbladet bonderose. 50-70cm. Som foregående, men 2-3 bælgkapsler. V-VI. Jud.Mehedinţi: Virciorova på M.Ciocanu. Jud.Buzau: Salcia på Plaiul Saraţii. Mrea Ciolanu på Dl. Poiana Rotunda.

BERBERIDACEAE

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach Fingret blærekapsel. 5-20cm. Hver stængel med 1 grund-og 1 stængelblad samt 1 klase. Grundbladet 3-koblet og derefter 4-7-fingret. Stængelbladet hånddelt. Klasen med 6-12 gule 6-talsblomster. IV. Sj. Jud.Tulcea: Agighiol, Izvoarele på Dl.Consul, Greci, Derna, Luncaviţa.

Berberis vulgaris L. Alm. surtorn. V-VI. Spredt.

PAPAVERACEAE

Papaver. Valmue.

1. Flerårig. Kronen gul (sj. hvid) ..... corona-sancti-ctephani
   Enårig. Kronen rød, rødlilla (eller sj. hvid) 2.
2. Stængelbladene blågrønne og stængelomfattende ..... somniferum
   " grønne, ikke " 3.
3. Kapsel og frugtknude med børster ..... 4.
   " " " glatte 5.
4. Modne kapsel 2-4 x så lang som bred ..... argemone
   " " indtil 2 x så lang som bred hybridum
5. Kapslen 1-1,5 x så lang som bred ..... rhoeas
   " 2-3 x " " " " 6.
6. Støvknapperne mørklilla. Planten stivhåret ..... dubium
   " gule. Planten halvglat laevigatum

Papaver somniferum L. Opiumsvalmue. VI-VIII. Forvildet.

P. rhoeas L. Kornvalmue. V-VII. Alm.

P. dubium L. Gærdevalmue. V-VI. Alm.

Papaver laevigatum Bieb. Glat valmue. Som foregående, men arskiven lidt udadhvælvet (m.m. flad hos dubium.). Jud.Mehedinți.

P. argemone L. Køllevalmue. V-VI. Spredt.

P. hybridum L. Vinvalmue. 20-50cm. Kronen vinrød med sort grund. Kapslen 10-15x7-8mm, omvendt æg- til kugleformet. V-VII. Spredt.

P. corona-sancti-stephani Zap. Rumænsk alpevalmue. 5-20cm. Bladene 1-2 x delte, fligene 1-2mm brede. VII-VIII. Sj. M.Țibleș, M.Rodnei, M.Bucegi, M.Birsei (Piatra Craiului), M.Fagaraș (Riiosu, Capra Budei, Muncel), M.Godeanu (Piatra Iorgovanului, Piule).

Glaucium flavum Cr. Strandhornskulpe. 30-90cm. Stærkt blågrøn 2-flerårig med store, gule valmueblomster. Kapslen linjeformet, 15-30cm, ikke indsnøret mellem frøene. Frugtknuden knudret i hele sin længde.VI-VIII.

G. leiocarpum Boiss. Mørkegul hornskulpe. Som den foregående, men blomsten mørkegul. Kapslen højst 10cm, lidt indsnøret mellem frøene. Frugtknuden kun knudret i spidsen. Øst.

G. corniculatum (L.) Rud. Rød hornskulpe. 30-40cm. Dunet enårig med indtil 3cm lange, orange eller røde kronblade. Kapslen indtil 20cm, med tiltrykte børster. VI-VIII. Alm.

Chelidonium majus L. Svaleurt. V-IX. Alm.

Corydalis. Lærkespore.

1. 1-2-årig. Hvide blomster i akselstillede klaser ..... capnoides
   Flerårig. Endestillet klase 2.
2. Støttebladene fligede ..... 3.
   " hele 4.
3. Klasen med oftest 6-10 blomster. Griflen ret ..... pumila
   " " " 10-20 blomster. Griflen knæbøjet forneden solida
4. Klasen med 2-8 blomster på 10-15mm ..... intermedia
   " " 10-20 blomster på 18-30mm bulbosa

Corydalis capnoides (L.) Pers. Hvid lærkespore. 10-40cm. Klaserne med 5-8 hvide blomster med gul spids på 11-16mm. Nedre støtteblade fligede, øvre hele. V-VI. Spredt.

C. bulbosa (L.) DC. Hulrodet lærkespore. IV-V. Alm. 2 underarter:
ssp. bulbosa: Knolden hul. Midtersmåbladet m.m. siddende.
ssp. marschalliana (Pallas) Chater: Knolden fyldt. Midtersmåbladet kortstilket. Kronen hvid eller gul, sjældent rødlilla.

C. intermedia (L.) Merat Liden lærkespore. IV. Sj.

C. pumila (Host) Rchb. Fingerlærkespore. IV. Sj.

C. solida (L.) Clairv. Langstilket lærkespore. III-IV. Alm. 2 ssp.:
ssp. solida: Øverste støtteblade delte. Kronen rødlilla. Alm.
ssp. slivenensis (Velen.) Hayek: Øverste støtteblade hele. Kronen blegt rødlilla eller gullighvid. Spredt.

Fumaria. Jordrøg.

1. Frugtstilken tilbagebøjet ..... 2.
" skråt udstående til opret 3.
2. Kronen 7-10mm, lyserød. Frugten lidt bredere end lang .... petteri
" 5-6mm, blegrød. " rundagtig kralikii
3. Bægerbladene 0,5-1(-1,5) x 1/4-3/4 mm, smallere end kronen ..... 4.
" 1,5-3,5 x 3/4-3 mm 6.
4. Støttebladet mindst lig blomsterstilken. Kronen hvid .. parviflora
" kortere end " . " lyserød 5.
5. Blomsterstilken 4mm. Støttebladet højst 1/3 x stilken schleicheri
" indtil 2,5(3)mm. Støttebladet over 1/3 x stilken vaillantii
6. Støttebladet længere end blomsterstilken ..... densiflora
" højst lig blomsterstilken 7.
7. Frugten ca. 2x2mm, tilspidset fortil ..... jankae
" afskåret eller svagt udrandet fortil 8.
8. Frugten ca. 2x2mm, rundagtig ..... rostellata
" 2x2,5-3mm, omvendt nyreformet officinalis

Fumaria petteri Rchb. ssp. thuretii (Boiss.) Pugsley Spidsbladet jordrøg. 15-30cm. Klasen kortstilket til m.m. siddende. Støttebladet ca. = frugtstilken. Klasen med 15-35 blomster. IV-V. Sj.

F. kralikii Jordan Spidsbægret jordrøg. 10-25cm. Klasen med 10-18 blomster. Støttebladet m.m. = frugtstilken. IV-V. Sj.

F. densiflora DC. Tætblomstret jordrøg. 10-30cm. Klasen med 20-25 blomster, stilken meget kort. Kronen 6-7mm, lyserød. Bægeret 2,5-3,5 x 2-3mm. Frugten rundagtig, kølet. V-IX. Spredt.

F. rostellata Knaf Næbjordrøg. 15-50cm. Klasen med 15-25 blomster, med kort stilk. Kronen 7-9mm. Bægeret 2-2,5 x ca.1,5mm, tandet. VI-VII.Alm.

F. officinalis L. Lægejordrøg. V-IX. Spredt.

F. jankae Hausskn. Kronen 4-5mm. Bægeret 1,5x3/4mm. VI-VII. Jud.Bihor: Sacueni.

F. schleicheri Soyer-Will. Mørk jordrøg. 10-30cm. Klasen med oftest 12-20 blomster, først lig, senere længere end stilken. Støttebladet ca. 1/3 x frugtstilken. Kronen mørkrosa, 5-6mm. Bægeret 1x0,5-0,75mm. Alm.

F. vaillantii Loisel. Bleg jordrøg. 5-30cm. Klasen mest med 6-12 blomster. Støttebladet ca. 3/4 x frugtstilken. Kronen 5-6mm, blegrød. Bægeret 0,7-1x0,3-0,5mm, m.m. fliget-tandet. V-X. Alm.

F. parviflora Lam. Småblomstret jordrøg. 10-20cm. Bladene med furede flige. Klasen m.m. siddende. Bægeret 0,5-1x0,5-0,75mm. V-IX. Spredt.

CRUCIFERAE

1. Skulpen hængende og fladtrykt ..... 2.
" ikke hængende 4.
2. Blomsten hvid ..... Peltaria
" gul 3.

3. Skulpen skiveformet. Med grenede hår. Enårig ..... Clypeola
" længere end bred, dråbeformet. M.m. glat Isatis
4. Langskulpet. Skulpen over 3 x så lang som bred ..... 5.
Kortskulpet. " højst 3 x så lang som bred 34.
5. Ledskulpe ..... 6.
Almindelig langskulpe 8.
6. Kronen gul eller hvid ..... Raphanus
" rødlilla 7.
7. Bladene ikke kødede. Spredt kirtelhåret ..... Chorispora
" kødede. Glat Cakile
8. Planten glat eller kun med ugrenede hår ..... 9.
" med grenede hår 27.
9. Bægerbladene oprette. Bægeret lukket ..... 10.
" opret-udstående eller udstående. Bægeret åbent 12.
10. Skulpen med sværdformet næb ..... Eruca
" uden " " 11.
11. Alle blade helrandede og med pilformet grund ..... Conringia
Anderledes Erucastrum gallicum + Brassica elongata
12. Skulpens klapper med 3-7 ribber ..... 13.
" " " 0-1 " 15.
13. Kronen hvid ..... Alliaria
" gul 14.
14. Skulpen med et kantet næb på mindst 10mm ..... Sinapis
" uden næb Sisymbrium
15. Skulpens klapper uden tydelig ribbe ..... 16.
" " med " " 21.
16. Skulpens klapper flade. Skulpen stærkt sammentrykt ..... 17.
" " hvælvede. Skulpen ikke stærkt sammentrykt 19.
17. Skulpen under 7 x så lang som bred ..... Draba
" over 7 x " " " " 18.
18. Bladene snitdelte med frie småblade ..... Cardamine
" højst fligede Arabis
19. Kronen hvid ..... Nasturtium
" gul 20.
20. Frøene 1-radede ..... Barbarea
" 2-radede Rorippa
21. Skulpen stærkt sammentrykt ..... 22.
" ikke stærkt sammentrykt 23.
22. Stængelbladene siddende ..... Arabis
Nedre og midterste stængelblade stilkede Cardaminopsis
23. Frøene 2-radede ..... Diplotaxis
" 1-radede 24.
24. Kronen hvid ..... Arabidopsis
" gul 25.
25. Skulpeklapperne hvælvede ..... Brassica
" kølede 26.
26. Skulpen uden næb, højst svagt knudret ..... Barbarea
" med næb og knudret Erucastrum

27. Bladene fint 2-3 x delte ..... Descurainia
" 0-1 x delte 28.
28. Bægeret opret ..... 29.
" opret-udstående til udstående 32.
29. Kronen gul, bleggul eller orangebrun, uden lilla arer ..... 30.
" rød, hvid eller bleggul med lilla årer 31.
30. Skulpen med tværstillede, tvegrenede hår. 2-radede frø .. Syrenia
" uden " " " . 1-radede " Erysimum
31. Skulpen trind og lang. Støvfanget dybt tvelappet ..... Hesperis
" flad, 7-18mm. " hovedformet Aubrieta
32. Frøene 2-radede. Skulpen flad og kort ..... Draba
" 1-radede 33.
33. Skulpeklapperne hvælvede ..... Arabidopsis
" flade 18.
34. Kronen gul ..... 35.
" hvid, rød eller manglende 47.
35. Skulpen brilleformet og flad ..... Biscutella
" ikke brilleformet 36.
36. Nedre blade fligede til fjersnitdelte ..... 37.
Alle blade helrandede eller tandede 41.
37. Stænglen noget ru af store kirtler ..... Bunias
" uden sådanne kirtler 38.
38. Øvre blade dybt hjærteformede og helrandede Lepidium perfoliatum
Bladene anderledes 39.
39. Frugten toleddet med ribbet overdel og lille underdel Rapistrum
" uleddet 40.
40. Kronen bleggul ..... Camelina
" kraftigt gul Rorippa
41. Stængelbladene med m.m. omfattende grund ..... 42.
" " tilsmalnet grund eller manglende 45.
42. Frugten kuglerund ..... 43.
" æg-, pære- eller omvendt pæreformet 44.
43. Flerårig. Den modne frugt med griffel ..... Rorippa austriaca
Enårig. Den modne frugt uden griffel Neslia
44. Frugten æg- til pæreformet, uden pig ..... Camelina
" omvendt pæreformet, med pig Myagrum
45. Skulpen trind, kugle- eller ægformet, 10-12mm tyk .... Alyssoides
" m.m. flad (eller også tyndere) 46.
46. Skulpen ca. 2 x så lang som bred ..... Draba
" ca. 1 x " " " " Alyssum
47. Skulpen tydeligt smalvægget ..... 48.
" bredvægget, trind eller kugleformet 60.
48. Klaserne sidestillede. Frugten rynket ..... Coronopus
" endestillede. " jævn 49.
49. Skulpen bredest forneden, but omvendt hjærteformet ..... Cardaria
" " foroven eller midtpå 50.
50. Skulpen vinget eller stærkt kølet ..... 51.
" hverken vinget eller stærkt kølet 56.
51. 2 store og 2 små kronblade ..... Iberis
Kronbladene ens eller lidt uens 52.

52. Stængelbladene med omfattende grund ..... 53.
" " tilsmalnet " 54.
53. Tæthåret ..... Lepidium
Glat eller svagt håret Thlaspi
54. Skulpens vinger bredere end skulperummet ..... Aethionema
" " højst brede foroven 55.
55. Lav rosetplante med fåbladet stængel, 4-15cm høj ..... Teesdalia
Stænglen højere og mangebladet Lepidium
56. Skulpens sider rette, danner en spids vinkel nedad .... Capsella
" " krumme 57.
57. Flerårig ..... Hutchinsia
Enårig 58.
58. Skulpestilkene opret-udstående. Klaserne åbne ..... Hymenolobus
" udstående. Klaserne tætte 59.
59. Stængelbladene fjersnitdelte ..... Hornungia
" m.m. hele eller manglende Teesdalia
60. Kronen rødlilla ..... Lunaria
" hvid 61.
61. Kronbladene dybt tvekløvede ..... 62.
" hele 63.
62. Lav rosetplante ..... Erophila
Med bladet stængel Berteroa
63. Bægerbladene oprette ..... Camelina
" opret-udstående 64.
64. Skulpen håret, med et næb på skulpens længde ..... Euclidium
" uden nogen næblignende griffel 65.
65. Kronbladene lidt uens. Stængelbladene med øret grund .. Calepina
" helt ens 66.
66. Skulpen med et lille tværled under sig ..... Crambe
" uden noget tværled under sig 67.
67. Nedre blade 30-50cm lange, bredt lancetformede ..... Armoracia
" " meget mindre 68.
68. Skulpen fladtrykt ..... Draba
" hvælvet 69.
69. Grundbladene omtrent så lange som brede. Helt glat .. Cochlearia
" længere end brede 70.
70. Planten fint stjærnehåret. Tæt tueformet ..... Schivereckia
" uden stjærnehår Kernera

Sisymbrium. Vejsennep.

1. Skulpen under 2cm, stift opret ..... officinale
" over 2cm, udstående 2.
2. Alle blade udelte ..... strictissimum
Nedre blade lappede til snitdelte 3.
3. Frugtstilken så tyk som den 5-10cm lange skulpe ..... 4.
" tyndere end den 2-6cm " " 5.
4. Planten grøn. Stænglen forneden med 1-3mm lange børstehår altissimum
Planten svagt gråhåret. Stænglen 1mm langt blødhåret orientale

5. Øverste skulper rager op over de bleggule blomster ..... irio
" " kortere end blomsterne 6.
6. Bladenes sideflige trekantet-lancetformede ..... loeselii
" " linjeformede polymorphum

Sisymbrium strictissimum L. Stor vejsennep. 50-100(150)cm. Flerårig med lancetformede, tandede til næsten helrandede blade. Kronbladene 4,5-10mm, mørkegule. Skulperne 3-8cm. VI-VII. Alm.

S. irio L. Glat vejsennep. 10-60cm. Glat eller med lange, krumme hår. Kronbladene små, 2,5-3,5mm, lidt længere end bægeret. Skulpen knudret. VI-VII. Sj.

S. loeselii L. Stivhåret vejsennep. VI-VIII. Alm.

S. polymorphum (Murray) Roth Langfliget vejsennep. 20-100cm. Halvglat eller stivhåret forneden. Bladenes endeflig ægformet. Kronen 6-9mm. Skulpens griffel sjældent over 0,7mm. Støvknappen 1,5-3mm. V-VI. Spredt.

S. altissimum L. Ungarsk vejsennep. V-VII. Alm.

S. orientale L. Blød vejsennep. 50-80cm. Øvre blade linjeformede eller spydformet trefligede. Kronbladene 6-9mm. Skulpens griffel 1-3,5mm, køl-leformet. VI-VII. Alm.

S. officinale (L.) Scop. Rank vejsennep. V-IX. Alm.

Descurainia sophia (L.) Webb Barberforstand. V-VII. Alm.

Alliaria petiolata (Beib.) Cavara & Grande Løgkarse. IV-VI. Alm.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Almindelig gåsemad. IV-V. Alm.

Myagrum perfoliatum L. Pigskulpe. 15-100cm. Glat 1-2-årig. Blågrøn og stinkende. Nedre blade bølget-tandede til fligede; stængelbladene siddende, trekantet-lancetformede og helrandede. VI-VII. Spredt.

Isatis tinctoria L. Farvevajd. Skulpen 11-27x3-7mm, 3-5 x så lang som bred. V-VII. Spredt.

I. praecox Kit. Ægskulpet vajd. 50-100cm. Skulpen 7-14x3-6mm, 2-3 x så lang som bred. V-VII.

Bunias orientalis L. Takkeklap. V-VIII. Alm.

Erysimum. Hjørneklap.

1. Støvfanget dybt tolappet. Bægeret mørkkirtlet ..... cheiri
" højst svagt tolappet. Bægeret uden kirtler 2.
2. Skulpen stærkt sammentrykt fra siden ..... cuspidatum
" med firkantet tværsnit 3.
3. Støvknapperne 0,5-1,2mm. Enårig (sj. toårig) ..... 4.
" 1-4mm. 2-flerårig 5.
4. Kronbladene 6-10mm. Griflen 2-5mm ..... repandum
" 3-6mm. " 0-1,5mm cheiranthoides
5. Bladhårene mest tvegrenede ..... 6.
" " flergrenede 8.

6. Skulpevinklen 30-60°. Bægerbladenes grund sækformet ..... comatum
" 10-30°. " " ikke sækformet 7.
7. Grundbladene helrandede til finttandede ..... diffusum
" bugtet-tandede crepidifolium
8. Skulpen med mange tvegrenede hår ..... 9.
" m.m. uden " " 11.
9. Stængelgrunden med tætsiddende bladstilksrester ..... exaltatum
" anderledes 10.
10. Nedre stængelblade langstilkede. Skulpen 1,2-1,5mm tyk witmannii
" " siddende til kortstilkede. Skulpen 0,8-1,2 mm tyk odoratum
11. Bægerbladene 4-6mm ..... hieraciifolium
" 6-8,5mm hungaricum

Erysimum cheiri (L.) Cr. (Cheiranthus c.) Gyldenlak. 13-45cm. Kronbladene mørkegule til orangebrune. Skulpen fladtrykt, 5-6mm bred. Forvildet

E. comatum Pancic Slangehjørneklap. 5-40cm. Stængelgrunden med tætsiddende bladstilksrester. Bladene ofte tætstillede, helrandede. Bægeret 7,5-11mm. Kronen 13-19x3,5-5,5mm. Skulpen 4-10cm. V-VI. Spredt.

E. diffusum Ehrh. Grå hjørneklap. 30-100cm. Mellemste og øvre stængelblade mest med tilbagebøjet spids. Skulpens hjørner bliver ikke glatte. Bægeret 6-8mm. Kronen 10-15x2,5-4mm. V-VII. Alm.

E. crepidifolium Rchb. Gåsedræberhjørneklap. 15-60cm. Med tve- og flergrenede hår. Bægeret 5-8mm. Kronbladene 10-18x2-4mm, mest dunede med 3-4-grenede hår. Skulpen med 3-4-grenede hår. V-VI. Spredt.

E. odoratum Ehrh. Honninghjørneklap. 20-80cm. Stærktlugtende blomster. Skulpens kanter bliver glatte. Bægeret 6-10mm. Kronen 12-18x4-8mm. Bladene bugtet-tandede. Skulpens hår mest tvegrenede. V-VII. Alm.

E. witmannii Zaw. Hvidgul hjørneklap. 10-50cm. Bladene mest bugtet-tandede. Bægerbladene 8-12mm. Kronbladene 15-24x5-9mm, gule eller hvidgule.
ssp. transsilvanicum (Schur) Ball: Stængelbladene linjeformet-aflange, oprette og ofte tiltrykte.
ssp. witmannii: Stængelbladene lancetformede eller aflangt-lancetformede, m.m. udstående. Spredt.

E. exaltatum Andrz. Høj hjørneklap. 40-120cm. Bladene m.m. helrandede til bugtet-tandede. Bægeret 7,5-10mm. Kronen 12-19x3,5-4,5mm. Skulpen 6-10cm x 1-1,2mm, 10-20° udstående. Griflen 1,5-2,5mm.

E. hieraciifolium L. Rank hjørneklap. 30-70cm. Bladene bugtet-tandede. Kronen 8-10x2-3,5mm. Skulpen 3-6cm. Griflen 1-2mm. VI-VII. Spredt.

E. hungaricum Zap. Finttandet hjørneklap. 30-100cm. Bladene helrandede til bugtet-tandede. Bægeret 6-8,5mm. Kronen 10-15x3-4mm. Skulpen 4,5-9 cm. Griflen 0,8-2mm.

E. cuspidatum (Bieb.) DC. Sværdhjørneklap. 20-70cm. Hårene 3-4-grenede. Skulpen 10-30x2,5-3,5mm, opret, grå med glatte kanter. Klapperne kølede eller smalvingede. VI-VII. Spredt.

Erysimum repandum L. Udspærret hjørneklap. 5-35cm. Skulperne 4,5-10cm, m.m. vinkelret udstående; stilken ca. så tyk som skulpen. Bægeret 3-6mm. Kronen 6.10x1-2mm. Griflen 2-5mm. IV-VI. Alm.

E. cheiranthoides L. Gyldenlakhjørneklap. VI-VII. Alm.

Syrenia. Griffelskulpe. Skulpen med tværstillede tvegrenede hår. Bleggul krone. Toårig. Frøene 2-radede. Helrandede, linjeformede blade.

S. cana (Piller & Mitterp.) Nielr. Grå griffelskulpe. 25-80cm. Skulpen 5-25x1,5-4mm, med kvadratisk tværsnit. Griflen 3,5-7mm. Skulpeklapperne kølede. VI-VIII. Spredt.

S. montana (Pallas) Klokov Kortstilket griffelskulpe. 30-90cm. Skulpen 6-15x2-4mm, fladtrykt, hvid med grønne kanter. Griflen 6-12(14)mm. VI-VII. Sj. Jud.Constanţa: Constanţa la Mamaia. Jud-Tulcea: Caraorman.

Hesperis. Aftenstjærne.

1. Kronen gulliggrøn med lilla årer ..... tristis
" rødlilla eller hvid 2.
2. Mellemste og øvre stængelblade m.m. kortstilkede ..... matronalis
" " " " siddende, m.m. omfattende 3.
3. Blomsterne hvide ..... nivea
" rødlilla eller lyserøde 4.
4. Planten kirteldunet ..... silvestris
" uden kirtelhår oblongifolia

Hesperis tristis L. Natviol. 35-50cm. Kun de nederste stængelblade stilkede, ellers alle siddende. Bladene æg-lancetformede, m.m. helrandede. Kronen 20-25mm. Skulpen 4-18cm. IV-VI. Spredt.

H. matronalis L. Aftenstjærne. VI-VII. Spredt.
ssp. matronalis: Nedre blade mest med ugrenede hår. Rød krone.
ssp. candida (Kit.) Hegi & Schmid: Som foregående, men med hvid krone.
ssp. cladotricha (Borb.) Hayek: Nedre blade med mange grenhår. Rød krone
ssp. obtusa (Monch) Soó: Nedre blade m.m. glatte. Rød krone.
ssp. moniliformis (Schur) Borza: Nedre blade m.m. glatte. Hvid krone.

H. silvestris Cr. Skovaftenstjærne. 40-80cm. Planten med kirtelbørster, især foroven. Nedre blade lyreformede. V-VII. Spredt.

H. oblongifolia Schur Aflangbladet aftenstjærne. 30-45cm. Bladene tandede, de nedre ofte glatte. VI-VII. M.Ciucaş, M.Birsei, M.Bucegi.

H. nivea Baumg. Snehvid aftenstjærne. 30-50cm. Med lange og korte ugrenede samt grenede hår, de sidste mangler i plantens nedre del. Blomsterstilkene dunede. VII-VIII. Spredt.

Chorispora tenella (Pallas) DC. Hønseræddike. 10-60cm. Enårig med lancetformede blade. Kronen 10-12mm, rødlilla. Bægeret opret. Skulpen 15-30 x 2-3mm (uden næb) knudret; med et næb på 15-30mm. IV-V. Spredt

Euclidium syriacum (L.) R.Br. Fuglenæb. 10-40cm. Tæt grådunet enårig. Stænglen kantet og rigt grenet. Bladene lancetformet-aflange, svagt tandede. Kronen 1-1,5mm. Frugterne i forlængede klaser. V. Spredt.

Barbarea vulgaris R.Br. Almindelig vinterkarse. Øvre blade tandede til lappede. Griflen 2-3,5(4)mm. Grundbladene med flere par sideflige. Alm.

B. stricta Andrz. Rank vinterkarse. Øvre blade tandede til lappede. Griflen 0,5-1,5(1,8)mm. Skulperne oprette. Grundbladene med få, meget små sidelapper og bredt elliptisk endeafsnit. IV-VI. Sj.

B. lepuznica Nyarady Øvre blade fligede. Skulpestilken 6-8mm. Skulpen 15-20mm. Griflen ca. 3mm. Grundbladene hjærteformet trekantede, med 0-få sidelapper. IV-VI. M. Retezat, M. Godeanu.

Rorippa. Guldkarse.

1. Kronen højst af bægerets længde, 1-3mm ..... 2.
   " mindst 1,5 x bægeret, 3-5mm 3.
2. Blomsterstanden mangegrenet og halvskærmformet ..... prolifera
   " ikke halvskærmformet palustris
3. Stængelbladene hele, med tydelige øren ..... austriaca
   " m.m. delte eller uden tydelige øren 4.
4. Øvre stængelblade tandede, men ikke lappede ..... amphibia
   " " lappede 5.
5. Med grundbladsroset under blomstringen. Stængelbladene mest ørede 6.
   Uden " " " næppe " 7.
6. Skulpen 3-6mm, bredt ellipsoidisk ..... pyrenaica
   " 12-20mm, linje-lancetformet lippizensis
7. Øvre blade stilkede og fjerfligede ..... silvestris
   " " m.m. siddende, mindre dybt delte prostrata

Rorippa austriaca (Cr.) Besser Østrigsk guldkarse. 30-90cm. M.m. glat flerårig med udløbere. Bladene uregelmæssigt tandede, de nedre kortstilkede, de øvre med dybt hjærteformet grund. Kugleformet skulpe. Alm.

R. amphibia (L.) Besser Vandpeberrod. V-VII. Alm.

R. prostrata (Berg.) Sch.& Th. Nedliggende guldkarse. 30-90cm. En mellemform mellem amphibia og silvestris.

R. silvestris (L.) Besser Vejguldkarse. VI-VIII. Alm.

R. palustris (L.) Besser Kærguldkarse. VI-VIII. Alm.

R. prolifera (Heuffel) Neilr. Grenet guldkarse. 40-60cm. Bladene med 2-4 par sideflige. Talrige korte klaser i halvskærm. Skulpen 3-8mm, ca. 1/2 x stilken. VI-IX. Sj.

R. pyrenaica (Lam.) Rchb. Smalfliget guldkarse. 5-40cm. Flerårig med kortdunet stængelgrund. Grundbladene hele eller lyreformede med afrundede flige; stængelbladene m.m. siddende med smalle øren. V-VI. Alm.

R. lippizensis (Wulfen) Rchb. Karstguldkarse. 10-20cm. Nær foregående. Stængelbladene med 1-4 par smalle flige. Grundbladene med 0-4 par smalle sideflige. Kronen 4-5mm. V-VII. Sj: Tirgoviște la Teiș.

Armoracia rusticana Gaertner & al. Peberrod. Skulpen 4-6mm. Forvildet.

A. macrocarpa (W.& K.) Kit. Storfrugtet peberrod. Som den foregående, men grundbladene oftest helrandede. Skulpen 10-15mm, ægformet eller el-

liptisk. 10 frø i hvert skulperum. Sj: Jud-Caraş-Severin: Ostrovul Moldova Veche, Donaudalen ml. Baziaş - Pojejena, Şuşca. Jud.Dolj: Pisculeţ

Nasturtium officinale R.Br. Tykskulpet brøndkarse. V-VII. Spredt.

Cardamine. Springklap og Tandrod.

1. Bladstilken med små, stængelomfattende øren ..... 2.
" uden stængelomfattende øren 4.
2. Nedre blade hele eller trekoblede ..... resedifolia
" " fjersnitdelte 3.
3. Kronbladene (0-)2-3mm, næppe længere end bægeret ..... impatiens
" 4-6mm, mindst 2 x bægeret graeca
4. Kronbladene under 3mm, ikke meget længere end bægeret ..... 5.
" over 4mm, tydeligt længere end bægeret 7.
5. Planten helt glat. Småbladene med kileformet grund ..... parviflora
" svagt håret. Småbladene med afrundet grund 6.
6. Med tydelig bladroset. Skulperne rager op over knopperne hirsuta
Uden " " . " næppe højere end knopperne flexuosa
7. Bladene danner en krans under klasen ..... 8.
" spredte 10.
8. Bladene fjersnitdelte. Kronen mørkt rødlilla ..... quinquefolia
" trekoblede eller håndsnitdelte 9.
9. Kronen bleggul. Støvdragerne udragende ..... enneaphyllos
" rødlilla. " indesluttede glanduligera
10. Med yngleknopper i de øvre bladhjørner. Lyserød krone bulbifera
Uden " 11.
11. Blågrøn enårig. Kronbladene udrandede ..... glauca
Grøn flerårig. Kronbladene afrundede eller afskårne 12.
12. Støvknapperne oftest sortlilla. Over 5 stængelblade ..... 13.
" gule. Højst 5 stængelblade 14.
13. 2-5(7) blomster. 5-8 par småblade ..... opizii
9-24 blomster. Højst 5 par småblade amara
14. Bægeret 4-6mm. Kronen 12-19mm ..... palustris
" 2-4mm. " 4-12mm 15.
15. Med mange sidestillede klaser ..... matthioli
Uden " " " pratensis

Cardamine bulbifera (L.) Cr. Tandrod. IV-V. Alm.

C. quinquefolia (Bieb.) Schmalh. Mørk tandrod. 15-40cm. Bladene med 2-3 par randhårede, lancetformede, uregelmæssigt dobbelt savtakkede småblade. Kronen 14-18mm, 2 x støvdragerne. IV-V. Jud.Vrancea: Focşani på Dl. Deleanu. Jud.Iaşi: Huşi in Pad. Dobrina.

C. enneaphyllos (L.) Cr. Gul tandrod. 20-30cm. Bladene mest trekoblede med æg-lancetformede, dobbtl savtakkede småblade. Blomsterne noget nikkende. Kronen 12-16mm. III-IV. Sj.

C. glanduligera O.Schwarz Rød tandrod. 12-30cm. Bladene trekoblede. Småbladene randhårede. Kronbladene 12-22mm, 2 x støvdragerne. IV-VI.Alm

C. amara L. Vandkarse. IV-VI. Alm.

Cardamine opizii J.& C.Presl Bjærgvandkarse. 10-50cm. 13-46 stængelblade, der sidder sammentrængte under blomsterstanden.

C. matthioli Moretti Flerstænglet karse. 10-50cm. Ofte stærkt grenet fra grunden eller midten. Skulpen 1-1,5mm tyk (2-2,5mm hos pratensis). Grundbladene med tiltrykte hår. IV-VI.

C. palustris (Wimmer & Grab.) Peterm. Sumpkarse. IV-VI.

C. pratensis L. Engkarse. Alm. 2 underarter:
ssp. pratensis: 2-4 stængelblade, de øvres småblade tydeligt smallere end de nedres. IV-VI.
ssp. rivularis (Schur) Simk.: 4-flere stængelblade, de øvres og nedres småblade ret ens. Bækkarse. VI-VII.

C. glauca Sprengel Blågrøn karse. 10-25cm. Fleste grundblade med 1-2 par sidesmåblade , øvre blade med 2-4 par. Kronbladene 5-8mm, gulligh-vide. VI-VII. M.Paring.

C. resedifolia L. Resedakarse. 2-15cm. Glat flerårig. Øvre blade med 3-7 småblade. Kronen 5-6mm. Skulpen 12-22mm. VI-VIII. Spredt.

C. graeca L. Kildekarse. 10-30cm. Nedre blade med 4-5 par småblade. Skulperne 3,5-5cm, lidt ensidige, vingede; griflen 4-8mm. III-IV. Sj.

C. parviflora L. Damkarse. 7-30cm. Glat enårig. Øvre blade med 5-8 par aflangt linjeformede, helrandede småblade. Kronen 1,8-2,5mm. V-VII. Sj.

C. impatiens L. Kronløs karse. V-VIII. Alm.

C. flexuosa With Skovkarse. V-VI. Alm.

C. hirsuta L. Rosetkarse. V-VI. Alm.

Cardaminopsis. Kalkkarse.

1. Grundbladene kredsrunde eller med kredsrundt endeafsnit .. halleri
" anderledes 2.
2. Stænglen håret. Blomsterstilkene 3-5mm under blomstringen arenosa
" m.m. glat. " 5-8mm " " neglecta

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek Sandkalkkarse. 15-40cm. Grundbladene fjerfligede. Kronbladene 6-8(9)mm. IV-VI. Alm.

C. neglecta (Schultes) Hayek Glat sandkarse. 5-20cm. Nedre blade lyre-formede til fjerfligede eller næsten hele; stængelbladene hele eller med 1-2 grundflige. Kronbladene 5-6mm. V-VII. Sj.

C. halleri (L.) Hayek Engkalkkarse. 10-50cm. Med udløbere. Stængelbla-dene kortstilkede og ægformede. Kronen 4-6mm. V-VIII. 2 underarter:
ssp. halleri: Få og korte udløbere. Mange 20-40cm høje stængler. Nedre stængelblade aflange og tandede. Frugtstilke 5-10mm.
ssp. ovirensis (Wulfen) Hegi & E.Schmid: Mange, tynde udløbere. Få 10-20cm høje stængler. Nedre stængelblade rundagtige til ægformede, helran-dede til rundtakkede. Frugtstilke 10-14mm.

Arabis. Kalkkarse.

1. Grundbladene dunede; stængelblade glatte og blågrønne ..... glabra
" og de nedre stængelblade ensartet behårede 2.
2. Skulpen 10-14cm, m.m. vandret udstående som moden ..... turrita
" højst 9cm, ikke vandret stillet 3.
3. Enårig. Kronen 2-4mm. Skulpen 1-3,5cm x 0,5-1mm ..... recta
2-flerårig 4.
4. Bladene helrandede med midtfæstnede hår ..... procurrens
" " eller tandede, uden midtfæstnede hår 5.
5. Stængelbladene med afrundet grund ..... 6.
" " m.m. omfattende grund 8.
6. Planten næsten helt glat og skinnende ..... jacquinii
" m.m. dunet 7.
7. Bladene afrundede fortil. Ofte 8-14 blomster ..... muralis
" spidse eller butte. Mest med over 20 blomster 9.
8. Planten med krybende stængler og golde rosetter ..... alpina
" uden " " " " " 9.
9. Alle stængelled helt eller næsten glatte ..... allionii
De nedre stængelled hårede 10.
10. Stænglen forneden mest med midtfæstnede hår ..... planisiliqua
" " " " lange hår 11.
11. Stængelbladene med pilformet grund ..... sagittata
" " hjærteformet eller afrundet grund 12.
12. Kronen 4-4,5mm. Skulpen 35-45(25-60)mm. Frøene 0,9-1,3mm hirsuta
" 5-7mm. Skulpen 15-35mm. Frøene 1,3-1,7mm hornungiana

Arabis glabra (L.) Bernh. Tårnurt. V-VI. Spredt.

A. planisiliqua (Pers.) Rchb. Tætbladet kalkkarse. 50-80cm. Skulpen knudret. Stængelbladene ganske tætstillede, 20-55. V-VI.

A. sagittata (Bertol.) DC. Rank kalkkarse. 35-80cm. Ligner hirsuta, men skulpen kun med tydelig ribbe i nedre halvdel. Stængelbladene med 1-2mm lange øren, mest meget længere end stængelleddene (mest kortere end hos hirsuta). V-VII. Spredt.

A. hirsuta (L.) Scop. Stivhåret kalkkarse. V-VII. Alm.

A. hornungiana Schur Kortere end hirsuta. Stænglerne altid ugrenede. Stængelbladene smallere og mindre, aflange, ørede og tandede. Alm.

A. allionii DC. Glat kalkkarse. 20-40cm. Alle stængelblade med helt eller næsten glatte flader. Skulperne rager op over blomsterne. En 10 stængelblade. VI-VII. Spredt.

A. muralis Bertol. Murkalkkarse. 10-30cm. 6-14 stængelblade, gråfiltede af 3-6-grenede hår, mest buttandede. Kronbladene 6-8mm. Længere skulper 4-7cm. V-VI. Sj.

A. turrita L. Ensidig kalkkarse. 10-70cm. Klasen bladet forneden. Blomsterne gullighvide. Skulperne ensidigt rettede som modne og noget krummede. M.m. aflange blade med hjærteformet grund. IV-V. Alm.

A. recta Vill. (A. auriculata) Øret kalkkarse. 10-40cm. Stænglen u- el-

ler svagt grenet, med 2-5-grenede hår forneden og 5-12 ørede blade. Bægeret 1,5-2mm. Skulpestilken så bred som skulpen. IV-V. Spredt.

Arabis procurrens W.& K. Krybende kalkkarse. 8-30cm. Med lange udløbere. Stænglen glat. Bladoversiden glat. Kronen 8-10mm. Skulperne udstående, 12-35mm. IV-V. Spredt.

A. jacquinii G.Beck Skinnende kalkkarse. 15-30cm. Grundbladene mørkegrønne og skinnende. 4-10 stængelblade, der er kødede. Klasen tæt, tit med over 20 blomster. Kronen 5,5-7mm. VI-VII. Sj.

A. alpina L. Fjældkalkkarse. 5-40cm. Flerårig med groft tandede blade og brede stængelblade, grønne og ru af stjærnehår. Stængelbladene med hjærteformet til øret grund. IV-VIII. Alm.

Aubrieta. Blåpude. Flerårige med stjærnehårede, omvendt æg- til rudeformede blade med 1-3 par tænder. Rødlilla kronblade på 12-22mm. Skulpen med en griffel på 3-11mm.

A. columnae Guss. ssp. croatica (Schott & al.) Mattf. 10-20cm. Skulpen 2-4 x så lang som bred, ikke så stærkt sammentrykt; 7-16x2,5-4,5mm. Griflen 3-7mm. Bladene med 1 par små tænder nær spidsen. VII-VIII. M.Paring (Coasta lui Rusu).

A. intermedia Heldr.& Oprh. Fladskulpet blåpude. 5-25cm. Skulpen mest 4-6 x så lang som bred, stærkt fladtrykt; 13-18(12-20) x 2,5-4(5) mm. Griflen 5-11mm. 1-3 par bladtænder. VII-VIII. M.Piatra Craiului.

Lunaria rediviva L. Vedvarende måneskulpe. 30-140cm. Flerårig. Skulpen 3,5-9cm, spids i begge ender. V-VII. Spredt.

L. annua L. Judaspenge. Toårig. Skulpen elliptisk. IV-VI. 2 underarter
ssp. annua: Rødderne ikke tenformet fortykkede. Dyrket.
ssp. pachyrhiza (Borbas) Hay.: Rødderne tenformet fortykkede. Sj.

Peltaria alliacea Jacq. Skiveskulpe. 40-60cm. Glat flerårig med helrandede, ørede og æg-lancetformede blade. Kronen 3-4mm, hvid. Skulpen meget bredvinget, fladt dråbeformet, op til 10x9mm. V-VII. Sj.

Alyssoides utriculata (L.) Moench Stilket blæreskulpe. 20-40cm. Flerårig. Grundbladene aflange, 2-5cm, stjærnehårede; stængelbladene ofte glatte. Bægeret opret. Skulpen æg-kugleformet, med en griffel på 7-10 mm. IV-VI. Sj.

Alyssum. Krognål.

1. 1-2-årig ..... 2.
   Flerårig 9.
2. Skulpen glat ..... 3.
   " dunet 5.
3. Bægeret blivende ..... minutum
   " affaldende 4.
4. Skulpen bredrandet, 3-4,5mm, m.m. kredsrund ..... desertorum
   " smalrandet, 4-7mm, elliptisk linifolium
5. Bægeret blivende ..... alyssoides
   " affaldende 6.

6. Skulpen også med udstående hår ..... 7.
" kun med tiltrykte hår 8.
7. Kronbladene jævnt tilsmalnede nedad. Griflen 0,7-1,3mm strigosum
" indsnævrede midtpå. Griflen 1,2-2,5mm hirsutum
8. Frugtklasen løs. Kronbladene udrandede. Griflen 2-3mm .. rostratum
" tæt. " afskårne. Griflen 3-4,5mm wierzbickii
9. Blomstrende skud sidestillede. Skulpen glat ..... 10.
" " endestillede 11.
10. Skulpeklapperne hvælvede ..... petraeum
" flade saxatile
11. Blomsterstilke eller skulper også med lange, udstående hår ... 12.
" " " kun med stjærnehår 14.
12. Mellemste stængelblade ofte mindst 10mm brede ..... wierzbickii
" " under 10mm brede 13.
13. Kronbladene hele. Tæt tue- til pudeformet ..... pulvinare
" m.m. udrandede. Løst tueformet til spredt repens
14. Bladene tofarvede, grønne ovenpå, grå til hvide nedenunder ... 15.
" med samme farve på over- og undersiden 18.
15. Hårene dækker skulpen helt ..... tortuosum
" " ikke skulpen helt 16.
16. Skulpeklapperne usymmetrisk opblæste ..... corymbosoides
" flade 17.
17. Planten tæt håret, hårene med lange, udstående grene ... pichleri
" tiltrykt dunet, hårene med tiltrykte grene murale
18. Skulperummene med 2 frø, klapperne ikke usymmetrisk opblæste 19.
" " 1 " , " mest " " 20.
19. Grundbladene m.m. brat tilsmalnede i stilken ..... stribrnyi
" m.m. jævnt " " " montanum
20. Bladhårene mindst 0,5mm brede ..... 21.
" højst 0,4mm " 22.
21. Øvre stængelblade længere end de nedre ..... borzaeanum
" " kortere " " " caliacrae
22. Skulpen 2-2,5mm bred. Griflen 0,5-1mm ..... tortuosum
" 2,5-3,3mm bred. Griflen 1-1,5mm obtusifolium

Alyssum petraeum Ard. (Aurinia p.) Klippeguldslør. 15-60cm. Grundbladene bugtede til fligede. Blomsterstanden klaseformet. Skulpen 3-5mm. Griflen 1-1,5mm. Frøenes vinge 0,1(-0,3)mm bred. V-VI. Spredt.

A. saxatile L. (Aurinia s.) Guldslør. 10-40cm. Grundbladene bugtetfligede til helrandede. Blomsterstanden halvskærmformet. Skulpen 5mm. Griflen 1mm. Frøenes vinge 0,3-1mm bred. IV-V. Alm.

A. linifolium Stephan Hørbladet krognål. 8-35cm. Tæt grådunet med linjeformede blade. 4-6 frø i hvert skulperum. Griflen 0,3-0,6mm.IV-V. Sj.

A. alyssoides (L.) L. Grådodder. IV-VII. Alm.

A. desertorum Stapf Steppekrognål. 2-20cm. Grågrøn med linje-lancetformede blade. Frugtklasen lang og tæt. Skulpen udrandet, med affladet rand. Griflen 0,5-1mm. III-V. Alm.

Alyssum minutum Schlecht. Glatskulpet grådodder. 3-12cm. Grågrøn. Frugtklaserne m.m. lange, tætte. Skulpen kredsrund, udrandet, hvælvet med affladet rand, 3-4mm. Griflen 0,5-1mm. IV-V. Sj.

A. strigosum Banks & Sol. Hårskulpet krognål. 5-15cm. Grågrøn. Skulpen 3,5-6mm, rundagtig med stjærnehår samt udstående, tvedelte hår.

A. hirsutum Bieb. Flerstænglet krognål. 5-30cm. Lange, tætte frugtklaser. Skulpen kredsrund, 5-7mm; de udstående hår med knudeformet grund. IV-V. Sj.

A. rostratum Steven Langklaset krognål. 20-40cm. Grå til grågrøn. Meget lange frugtklaser. Kronbladene 4,5-6mm, dunede udvendigt. Skulpen 2,5-5,5mm, med affladet rand. V-VI. Spredt.

A. repens Baumg. Krybende krognål. 5-40cm. De golde skud ender i rosetter. Kronbladene 4,5-7mm, udrandede, mest glatte udvendigt. VI-VIII.
ssp. repens: Stænglerne 5-20cm, ugrenede, udstrakte til opstigende. Alm.
ssp. trichostachyum (Rupr.) Hayek: Stænglerne indtil 40(50)cm, oprette eller opstigende. Spredt.

A. wierzbickii Heuffel Høj krognål. 40-80cm. Kratig opret 2-flerårig. Oftest uden golde skud. Bladhårene ca. 0,5mm brede. Skulpen 4-6mm, m.m. rundagtig. Griflen 3-4,5mm. V-VI. Jud.Caraş-Severin.

A. pulvinare Velen. 6-15cm. Med mange rosetter og korte golde skud. Bladhårene ca. 1mm brede. Kronen 5-6mm. Skulpen 4-5,5mm. Griflen 3-5mm. V-VI. Jud.Mahadinţi: Gura Vaii.

A. montanum L. Bjærgkrognål. 5-25cm. Skulpen 3,5-6mm, rund til bredt elliptisk, udrandet til afskåret, hvælvet, med tydelig rand, oftest tæt stjærnehåret. IV-VI. 2 underarter:
ssp. montanum: Mange golde rosetter. Liggende eller opstigende. Kronbladene 4-5mm, gyldengule. Griflen 1-3mm. Sj.
ssp. gmelinii (Jordan) Hegi & Schmid: Få rosetter. Opstigende til opret. Kronbladene 3-4mm, lysegule til bleggule. Griflen 2-3,5mm. Sj.

A. stribrnyi Velen. 6-20cm. Grå eller sølvfarvet, med få lange, golde stængler. Bladhårene 0,6-0,7mm brede, mangegrenede. Kronbladene udrandede. Skulpen rundagtig, 4-5mm, tætdunet. Griflen 2-3,5mm. V-VI. Sj.

A. murale W.& K. Murkrognål. 25-70cm. Kronbladene 2-3,5mm, mest hele. Blomsterstanden halvskærmformet med kraftige, stive blomsterstilke. Bladene spidse. VI-VIII. Alm.

A. pichleri Velen. VI-VIII. Sj.

A. corymbosoides Form. 15-35cm. Med lange golde skud. Bladene grønne ovenpå, grågrønne nedenunder. Bægeret 1,5-2mm. Kronen 2-3mm. Skulpen 2,5-4mm. Griflen 0,5-1mm.

A. caliacrae Nyarady 10-30cm. Udstrakt til opstigende. Bladhårene 0,5-1 mm brede. Bægeret 2mm. Kronen 2-2,8mm. Skulpen 3-5mm, udrandet, prikket. Griflen 0,6-1,5mm

Alyssum borzaeanum Nyarady 10-30cm. Stængelbladene hvidlige. Bægeret ca. 1,5mm. Kronen 2-2,3mm. Skulpen 2-3x2-3mm, omvendt hjærteformet, grå. Griflen ca. 1mm. V-VI. Sandstrand langs Sortehavet. Jud.Constanţa.

A. obtusifolium Steven Butbladet krognål. 10-30cm. Stængelbladene hvide. Bægeret 2-3mm. Kronen 2,5-3,5mm. Skulpen 2,3-3,6mm, svagt dunet.V-VI

A. tortuosum Willd. Vreden krognål. 6-35cm. Med få, lange golde skud. Bladene grå eller hvide. Bægeret ca. 2mm. Kronen ca. 2,5mm. Skulpen 3-4 mm, tæt gådunet.

Berteroa incana (L.) DC. Kløvplade. V-X. Alm.

Clypeola jonthlaspi L. Hængeskulpe. 2-15cm. Opstigende, gådunet, gulblomstret enårig. Let kendelig ved de hængende, kredsrunde, vingede skulper på 2-5mm.

Schivereckia podolica (Besser)Andrz 8-25cm. Løst tueformet, fint stjærnehåret flerårig. Grundbladene omvendt lancetformede, i roset, med 0-5 par tænder. Kronbladene 4-6mm. Skulperne 3-8,5mm x 2-2,7mm. III-V. Sj.: Jud.Botoşani: Stinca-Ştefaneşti.

Draba. Gæslingeblomst.

1. Enårige. Kronen 2-2,5mm ..... 2.
   Flerårige 3.
2. Kronen hvid. Rosetbladene m.m. takkede ..... muralis
   " bleggul. Rosetbladene m.m. helrandede nemorosa
3. Gule blomster. Ingen stængelblade ..... 4.
   Hvide " . Med stængelblade (sj. uden) 8.
4. Bladene under 1,5mm brede ..... 5.
   " 1,75-4mm brede 6.
5. Skulpen glat. Bladene 1-1,4mm brede ..... aizoides
   " tæt håret. Bladene 0,5-0,75mm brede haynaldii
6. 1-5cm høj. Klasen næsten hovedformet ..... compacta
   Mest 5-20cm høj. Klasen forlænget 7.
7. Kronbladene bredt omv.ægf., 4-4,5mm, længere end støvdr. lasiocarpa
   " smalt " " , 3,5-4mm, lig støvdragerne elongata
8. Stænglen glat ..... 9.
   " håret, i det mindste forneden 10.
9. Grundbladsrandhårene ugrenede nær grunden, grenede mod spidsen dorneri
   Grundbladenes randhår alle ugrenede fladnizensis
10. Skulpens griffel 1-2mm ..... stellata
    " " under 1mm, næsten manglende 11.
11. Blomsterstilkene og stænglens øvre del glat ..... carinthiaca
    " " " " " spredt hårede kotschyi

Draba aizoides L. Solgæslingeblomst. 3-10cm. Bladene 7-17 x 0,5-1,5mm, randhårede, men ellers glatte. Skulpen 6-12mm, mest glat. IV-V. Sj.

D. lasiocarpa Rochel Mangeblomstret gæslingeblomst. 8-20cm. Skulpen 6-8x2.5-3mm, stivbørstet, især på randen. VI-VIII. Alm.

D. elongata Host Smalkronet gæslingeblomst. Skulpen 6-10x2-3mm. Ellers

som foregående. VI-VIII.

Draba compacta Schott Dværggæslingeblomst. Griflen 0,5mm. VI-VIII. M. Bucegi, M.Birsei.

D. haynaldii Stur Låddenskulpet gæslingeblomst. 1-6cm. Klasen med 3-8 blomster. Bladene 5-7mm. Skulpen 5-7x2,3mm, bredt ægformet, opblæst mod grunden, m.m. tæt stivhåret. Griflen 1-2mm. VI-VIII. M.Bistriței (Ceahlau), M.Bucegi, M.Birsei.

D. stellata Jacq. ssp. simonkaiana (Jav.) Stjærnehåret gæslingeblomst. 2-7cm. Stænglen stjærnehåret forneden. Nedre blade 4-8mm, grå̊t stjærnehårede. Skulpen 6-10mm, glat. VI. M.Paring (Badea) M.Retezat (V.Riușorului).

D. carinthiaca Hoppe Kærntisk gæslingeblomst. 2-15cm. Grundbladene dækkede af gren- og stjærnehår, randhårede mod grunden. 0-3 stængelblade. 4-8 blomster. Skulpen 3-8mm, glat. VII-VIII. Spredt.

D. kotschyi Stur Rumænsk gæslingeblomst. 2-13cm. Stænglen opstigende og bugtet. Stængelbladene ægformede og tydeligt tandede. VI-VIII. Spr.

D. fladnizensis Wulfen Fjældgæslingeblomst. 1-5(8)cm. Grundbladene altid uden stjærnehår, oftest med glatte flader. 0-1(2) stængelblade. Griflen 0,1-0,4mm. VI-VII. Sj.

D. dorneri Heuffel Frynset gæslingeblomst. 3-8(15)cm. Nær foregående, men griflen 0,5-0,75mm. VI-VII. M.Retezat.

D. muralis L. Murgæslingeblomst. 10-30cm. Oftest enstænglet, med grundroset. Øvre blade med 4-6 par tænder. Blomsterne i en forlænget klase. Skulpen 4-7x2-3mm. Griflen 0,1-0,2mm. V-VI. Spredt.

D. nemorosa L. Sandgæslingeblomst. 10-30cm. Kronbladene tydeligt udrandede. Stængelbladene med tilsmalnet grund. Stilkene meget længere end skulperne, ganske tynde. IV-VI. Alm.

Erophila. Værgåslingeblomst. III-IV. Alm. 3 arter:

1. Skulpen højst 5mm, omvendt ægformet til m.m. rund ..... spathulata
" ofte over 5mm, smallere 2.
2. Bladene med mange stjærne- og grenhår og 0-få alm. hår ..... verna
" " " ugrenede og få grenede hår praecox

Erophila verna (L.) Chev. Bægeret 1,5-2mm. Skulpen 6-10mm. Skulpestilkene 10-25mm.

E. praecox (Steven) DC. Bægeret 1-1,5mm. Skulpen 4-6mm. Skulpestilkene 2-12mm.

E. spathulata Lang Bægeret ca. 1mm. Bladene med korte grenhår. Skulpestilkene 3-18mm.

Cochlearia pyrenaica DC. Spidsskulpet skørbugsurt. 15-30cm. Grundbladene oftest nyreformede. Skulpestilkene højst lig skulpen. Denne 4-7mm, tilsmalnet i begge ender, ægformet-ellipsoidisk. VI-VII. Sj.

Kernera saxatilis (L.) Rchb. Kugleskulpe. 10-30cm. Flerårig med bladro-

set af m.m. tandede, spatelformede blade. Stænglen med nogle blade, håret forneden. Kronen 2-4mm. VI-VII. Alm.

Camelina. Dodder.

1. Skulpen 1,7-3,1mm tyk. Stængel og blade med mange ugrenede hår .. 2.
" 3,1-6,5mm " . " " " glatte eller grenhårede 3.
2. Kronen gullighvid, 6-8mm ..... rumelica
" lysegul, 2,5-4,5mm microcarpa
3. Kronbladene 4-4,5mm ..... sativa
" 4,5-6mm 4.
4. Skulpen 6,5-8,5mm, lidt indtrykket foroven ..... alyssum
" 9-12mm, afrundet foroven macrocarpa

Camelina rumelica Velen. Bleg dodder. 20-40cm. De ugrenede hår 2-3,5mm lange. Højst med grenede hår på bladranden. Skulpen pæreformet, 5-8mm.

C. microcarpa Andrz. Småskulpet dodder. 20-60cm. De ugrenede hår højst 2mm lange. Oftest talrige grenede hår. V-VII.

C. sativa (L.) Cr. Hundehør. 30-70cm. Skulpen tydeligt netåret, 6-9mm lang og 4-5½mm bred. V-VII.

C. alyssum (Miller) Thell. Hjærteskulpet dodder. 30-100cm. Planten næsten glat. Bladene bugtet-tandede til bugtet-fjerfligede. VI-VII. Spr.

C. macrocarpa Wierzb. Storskulpet dodder. Ofte over 60cm. Skulpestilkene forlængede, ofte udstående. Klasen ret åben. V-VII. I hørmarker.

Neslia paniculata (L.) Desv. Rundskulpe. 15-60cm. Stjærnedunet enårig med pilformede stængelblade og 2mm lange, gule kronblade. Skulpen mest rundagtig, 1,5-3mm. V-VI. Alm.

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. HYrdetaske. Kronen 2-3mm, ca. 2 x bægeret, hvid. IV-VII. Alm.

C. rubella Reuter Rødlig hyrdetaske. 10-30cm. Kronen næppe længere end bægeret, ofte rødlig, i det mindste på kanten. IV-VII. Sj.

Hutchinsia alpina (L.) R.Br. ssp. brevicaulis (Hoppe) Arc. Lav gemsekarse. 2-5cm. Flerårig med flere rosetter med fjerfligede til -snitdelte blade. Skulpen 3½-4x1-2mm, ægformet og spids. VI-VIII. Spredt.

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. Hindeskulpe. 5-15cm. Enårig med spredte, ugrenede hår. Nedre blade oftest 1 x fjersnitdelte. Kronen 1½-3mm, lidt længere end bægeret. Skulpen 2-5mm med gennemskinnelige klapper.

Hornungia petraea (L.) Rchb. Stenkarse. 3-15cm. Bladene fjersnitdelte. Bægeret 0,5-0,8mm. Kronen 0,7-1mm. Skulpen 2-2,5x1,5-2mm; klapperne med tydelig ribbe. Enårig. IV-V. Sj.

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. Flipkrave. IV-V. Sj.

Thlaspi. Pengeurt.

1. Enårig ..... 2.
Flerårig 4.

2. Stænglen trind. Stængelbladene med hjærteformet grund perfoliatum
" kantet. " " pilformet grund 3.
3. Stænglen håret forneden. Skulpen smalvinget foroven .... alliaceum
" helt glat. Skulpen bredvinget arvense
4. Skulpens vinge ca. 1/2mm bred ..... avalanum
" " over 1mm " 5.
5. Støvdragerne ca. lig kronbladene eller længere ..... dacicum
" meget kortere end kronbladene 6.
6. Vinklen ved grunden af skulpens hak højst 90° ..... praecox
" " " " " " over 90° jankae

Thlaspi arvense L. Alm. pengeurt. IV-VI. Alm.

T. alliaceum L. Løgpengeurt. 20-60cm. Med løglugt. Skulpen 6-8mm, kun vinget foroven, omvendt ægformet. V-VI. Sj.

T. perfoliatum L. Hjærtebladet pengeurt. 5-20cm. Glat og blågrøn. Stængelbladene spidst ægformede med hjærteformet grund. III-VI. Alm.

T. dacicum Heuffel Hornet pengeurt. 5-25cm. Grundbladene brat tilsmalnede i stilken. Kronbladene 3-5mm. Skulpen bredvinget, med et bredt og fladt hak. VI-VII. Spredt. 3 underarter:
ssp. korongianum (Czetz): Skulpen næppe udrandet foroven. Griflen rager tydeligt ud af hakket. M.Rodnei, M.Bucegi.
ssp. dacicum: Skulpen tydeligt udrandet foroven. Griflen rager ikke ud af hakket. Kronbladene 3mm. Skulpen 6-9mm. Griflen over 1/2 x hakket.
ssp. banaticum (Uechtr.) Jav.: Som foregående, men kronbladene 4,5mm. Skulpen 9-12mm. Griflen under 1/2 x hakket. M.Birsei, M.Paring, M.Mehedinţi, M.Ţarcu, M.Godeanu.

T. praecox Wulfen Tidlig pengeurt. 10-35cm. Bægeret 2-3mm, lillaspidset. Grundbladene 50x13mm, spatelformede, ofte lilla nedenunder. Skulpen 7-9mm, smalt omvendt hjærteformet. Griflen 2-3,5mm. VI-VII. Sj.

T. jankae Kerner 10-35cm. Nær foregående, men skulpen mest 5-8mm, trekantet-omvendt hjærteformet. Griflen 1-1,5mm. V-VI. Sj. Jud.Mehedeinţi.

T. avalanum Pancic (T. kovatsii) Krybende pengeurt. 8-30cm. Jordstænglen med udløbere. Rosetbladene bredt elliptiske til rundagtige, langstilkede. Stængelbladene med butte øren. Skulpen 5-7mm. IV-V. Alm.

Aethionema saxatile (L.) R.Br. Tandtråd. 5-20cm. Glat og blågrøn, mest grenet flerårig med m.m. spatelformede blade. Kronen hvid eller rødlig, 2-5mm. Skulpen rundagtig, 1-2mm bredt vinget, med et smalt hak foroven.

Iberis saxatilis L. Klippesnepude. 5-10cm. Lille, krybende, stedsegrøn busk. Bladene linjeformede, 1-2mm brede. Skulpen 5-8mm, omvendt ægformet med et but hak og 2 vingede takker foroven. IV-V. Sj.

Biscutella laevigata L. Almindelig brilleskulpe. 10-50cm. Flerårig rosetplante med m.m. lancetformede, tandede grundblade og nogle stængelblade. Lysegule blomster. Skulpen af form som et liggende ottetal, 4-8 x 8-14mm. V-VII. Alm. 2 underarter:

ssp. laevigata: Grundbladene over 4 x så lange som brede, det største 7,5-9,5cm langt.
ssp. austriaca (Jordan) Mach.-Laur.: Grundbladene højst 4 x så lange som brede, det største mest 3,5-5(7,5)cm langt.

Lepidium. Karse.

1. Kronen bleggul. Øvre blade hjærteformede ..... perfoliatum
" hvid eller manglende 2.
2. Øvre stængelblade med pilformet grund ..... 3.
" " " tilsmalnet grund 4.
3. Bladene glatte, blågrønne og tykke ..... cartilagineum
" hårede campestre
4. Frugtstilken 1/2-3/4 x den 5-6mm lange skulpe ..... sativum
" 1-3 x den højst 4mm " " 5.
5. Flerårig. Næsten helt glat ..... 6.
1-2-årig 7.
6. Stængelbladene m.m. linjeformede ..... graminifolium
" æg- til lancetformede latifolium
7. Kronen længere end bægeret ..... virginicum
" manglende eller meget lille ruderale

Lepidium campestre (L.) R.Br. Salomons lysestage. V-VI. Alm.

L. sativum L. Havekarse. 20-40cm. Glat enårig. Stænglen blådugget. Nedre blade fjersnitdelte med smalle, tandede afsnit. V-VII. Dyrk.&forv

L. virginicum L. Virginsk karse. 30-50cm. Stængelbladene lancetformede og skarpttandede. Skulpen 3-4x2,5-3,5mm. VI-VII. Spredt.

L. ruderale L. Stinkende karse. V-VII. Alm.

L. perfoliatum L. Hjærtebladet karse. 20-40cm. 1-2-årig. Nedre stængelblade 2 x fjersnitdelte, øvre ægformede til runde og dybt stængelomfattende, helt helrandede. Skulpen ca. 4x4mm. V-VII. Alm.

L. cartilagineum (Mayer) Thell. ssp. crassifolium (W.& K.) Thell. Tykbladet karse. 20-30cm. Flerårig med bugtede stængler. Nedre blade med tilsmalnet grund. Kronen 2 x bægeret. Skulpen 2,5-3mm. V-VI. Sj.

L. latifolium L. Strandkarse. VI-VII. Spredt.

L. graminifolium L. Græsbladet karse. 40-70cm. Nedre blade tandede til lappede; øvre m.m. linjeformede. Skulpen 2,5-4mm, ægformet. VI-VII. Sj.

Cardaria draba (L.) Desv. Hjærteskulpet karse. V-VI. Alm.

Coronopus squamatus (Forsskål) Asch. Ravnefod. Bladene 3-8cm, endeafsnittet 8-16x1-3mm. Skulpen 2-3x3,5-4mm, rynket, nyreformet med en spids. V-VIII. Spredt.

C. didymus (L.) Sm. Liden ravnefod. 5-25cm. Bladene 1-2cm, endeafsnittet 3x1mm. Skulpen 1,5-2x3mm, netåret og indsnøret på midten og derved dobbelt kugleformet. V-VIII. Spredt.

Conringia orientalis (L.) Dum. Hvidlig kålurt. 10-50cm. Grundbladene stilkede, stængelbladene ægformede til elliptiske med bredt pilformet

grund. Kronbladene 10-13mm, gullig- eller grønlighvide. Skulpen 4-kantet. Griflen 1,5-2mm. V-VI. Spredt.

Conringia austriaca (Jacq.) Sweet Gul kålurt. Som foregående, men kronbladene 6-8mm, citrongule. Skulpen 8-kantet. Griflen 3-4mm. VI-VII. Sj.

Diplotaxis. Mursennep.

1. Kronbladene hvide, lillaårede ..... erucoides
" gule 2.
2. Kronbladene 8-14mm lange. Stænglen bladet ..... tenuifolia
" 3-7mm " . " oftest bladløs 3.
3. Kronbladene 6-8x3-4mm. Ydre støvdragere frugtbare ..... muralis
" 3-4x1mm. " " golde viminea

Diplotaxis erucoides (L.) DC. Enårig. Stænglerne sparsomt stivhårede. Nedre blade fjerdelte, øvre tandede. Skulpen med et næb på indtil 6mm. V-IX. Sj.

D. tenuifolia (L.) DC. Sandsennep. V-IX. Spredt.

D. muralis (L.) DC. Mursennep. V-IX. Alm.

D. viminea (L.) DC. Stinkende mursennep. 5-30cm. Glat eller svagt håret. Bladene lyreformet fjerlappede. Kronen svovl- eller citrongul. Sj.

Brassica. Kål.

1. Øvre blade stængelomfattende ..... 2.
" " med tilsmalnet grund 3.
2. Nedre blade hårede og grønne ..... rapa
Planten glat og blågrøn napus
3. Skulperne tiltrykte ..... nigra
" udstående 4.
4. Bægerbladene oprette. Et skulpeskaft på 2-4mm ..... elongata
" opret-udstående. Intet skulpeskaft juncea

Brassica elongata Ehrh. Sortehavskål. VI-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. elongata: Bladene bugtet-fjerfligede.
ssp. integrifolia (Boiss.) Breistr.: Bladene helrandede.

B. napus L. Raps. IV-VIII. Dyrket og forvildet.

B. rapa L. Agerkål. IV-VIII. Alm.

B. juncea (L.) Czern. Sareptasennep. 60-100cm. Øvre stængelblade kortstilkede. Skulpens næb 5-12mm. V-VIII. Spredt.

B. nigra (L.) Koch Sort sennep. Skulperne 1-2cm, kølede. VI-VII. Alm.

Sinapis arvensis L. Agersennep. Skulpens næb lidet sammentrykt. Alm.

S. alba L. Gul sennep. Skulpens næb stærkt sammentrykt. VI-VII. Alm.
ssp. alba: Bladene lyreformede. Skulpeklapperne oftest stivhårede.
ssp. dissecta (Lag.) Bonnier: Bladene 2 x delte, ikke lyreformede. Skulpeklapperne svagt hårede eller glatte. Spredt.

Eruca vesicaria (L.) Cav. ssp. sativa (Miller) Thell. Salatsennep. 20-80cm. Enårig. Kronbladene 15-20mm, hvide eller bleggule med lilla å-

rer. Skulpen tiltrykt aksen, med et sværdformet næb på 7-10mm.V-VII.Spr.

Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E.Schulz Karsesennep. 20-50cm. Tæt stivhåret med nedadrettede hår, i det mindste forneden. Bladene fligede, med 6-8 par lapper, de 2 nederste stængelomfattende. Ingen støtteblade. Gul krone. Bægeret udstående. V-VII. Sj.

E. gallicum (Willd.) O.E.Schulz Svinesennep. 20-50cm. Nær foregående, men nederste bladflige ikke stængelomfattende. Klasen med støtteblade. Bægeret opret. Lysegul eller hvidlig krone. V-VII. Sj.

Cakile maritima Scop. ssp. euxina (Pobed.) Nyarady Strandsennep. Sj.

Rapistrum perenne (L.) All. Flerårig knopskulpe. 30-100cm. Flerårig. Tæt stivhåret forneden, glat foroven. Bladene fjerfligede med ca. 6 par kantet-tandede flige. Skulpen 7-10mm; dens øvre led 3-4,5mm, jævnt tilsmalnet i et næb på 1/2-1mm. Alm.

R. rugosum (L.) All. Enårig knopskulpe. 15-60cm. Enårig. Nedre blade fligede, øvre ofte hele. Skulperne noget tiltrykte aksen, tværdelte med en æg-kugleformet overdel med en brat afsat griffel på 1-3mm.V-VIII.Sj.

Crambe tataria Sebeok Tatarisk strandkål. 60-90cm. Flerårig. Bladene 2-3 x fjersnitdelte, noget tykke, med stivhåret underside. Kronen 3,5-6 mm. Skulpens øvre del m.m. kugleformet, undertiden noget firkantet, 3-6 mm. Tørenge og vejskrænter. IV-VI. Spredt.

C. maritima L. Strandkål. V-VII. Sj. på Sortehavskysten.

Calepina irregularis (Asso) Thell. Netskulpe. 20-50cm. 1-2-årig. Nedre blade bugtede til lyreformede, øvre udelte med pilformet grund. Kronbladene uens: 2mm og 2,5-3mm. Skulpen 2,5-4mm æg-kugleformet, med et kort, tykt næb. IV-VI. Spredt.

Raphanus raphanistrum L. Kiddike. V-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. raphanistrum: Skulpen 3,5-4mm tyk. Alm.
ssp. landra (Moretti) Bonnier & Layens: Skulpen 5-8mm tyk. Indslæbt.

RESEDACEAE

Reseda. Reseda.

1. Alle blade fjersnitdelte ..... 2.
   De nedre blade hele 3.
2. Bladene med 5-15 par sideflige ..... alba
   " " 1-2(-4) par sideflige, ofte 2 x delte lutea
3. 4 bæger- og kronblade. Alle blade hele. Oprette kapsler ... luteola
   5-6 bæger- og kronblade. Øvre blade ofte delte 4.
4. Kronbladene med 9-15 spatelformede flige ..... odorata
   " " m.m. linjeformede " 5.
5. Kapslen med næsten kvadratisk omrids ..... inodora
   " nærmest pæreformet phyteuma

Reseda luteola L. Farvereseda. VI-IX. Alm.

R. alba L. Hvid reseda. 20-80cm. Kronen hvid. Kronbladene mest 3-delte.

Kapslen 8-15mm, ellipsoidisk, tilsmalnet foroven. VI-VIII. Dyrket & forv.

Reseda phyteuma L. Rapunselreseda. 10-40cm. Øvre blade undertiden tredelte. Kronbladene grønlighvide, 5-9-fligede. Kapslen nikkende, 13-14mm. VI-IX. Sj.

R. inodora Rchb. Lugtløs reseda. 20-60cm. Øvre blade ofte med 1-2 par sideflige og en stor endeflig. Kronbladene med 11-17 flige. Kapslen med forskellig orientering. VI-VII. Spredt.

R. odorata L. Vellugtende reseda. 30-60cm. Bladene omvendt lancet- til omvendt ægformede, nogle med 1-2 par sideflige. Kapslen 9-11x7-11mm, nikkende og noget kugleformet. VI-IX. Dyrket og forvildet.

R. lutea L. Gul reseda. VI-IX. Alm.

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L. Vandklap. Svømmende, noget blærerodsagtig vandplante med kransstillede, 1-1,5cm lange blade med en 4-6 børsteformede flige og en sammenklappelig klap. Enlige, grønlighvide blomster fra bladhjørnerne, der dog sjældent udvikles. VI-VII. Spredt. Alm. i Donaudeltaet.

Drosera rotundifolia L. Rundbladet soldug. VI-VIII. Spredt.

D. anglica Hudson Langbladet soldug. Bladpladen 4-8 x så lang som bred. Stænglen midterstillet, tydeligt længere end bladene. VII-VIII. Sj.

D. intermedia Hayne Liden soldug. Bladpladen 2-4 x så lang som bred. Stænglen sidestillet, ikke meget længere end bladene. VII-VIII. Spredt.

CRASSULACEAE

Sempervivum. Husløg. Husløg med udstående, ikke frynsede kronblade.

1. Kronbladene klart grønliggule ..... zeleborii
" røde (sj. gullige) 2.
2. Rosetbladene ca. 10x3mm. Kronbladene 12-20mm ..... montanum
" 20-40x10-15mm. Kronbladene 9-10mm 3.
3. Unge blade dunede på begge sider ..... marmoreum
" " kun randhårede tectorum

Sempervivum zeleborii Schott Gulgrønt husløg. 12-20cm. Rosetterne m.m. kugleformede, ca. 3cm brede. Bladene grågrønne, uensartet randhårede, ca. 15x8mm. Kronbladene ca. 9x1,5mm. VII-VIII. Spredt.

S. montanum L. Bjærghusløg. 5-10cm. Rosetten højst 2cm bred; bladene dunede på begge sider. Kronbladene vinrøde (sj. gullige). VII-IX. Spr.

S. marmoreum Griseb. Hvidkantet husløg. 10-30cm. Bladene 25x12mm, olivengrønne, ofte rødt anløbne, med kraftige, nedbøjede randhår. Rosetten ca. 6cm bred. Kronbladene røde med hvid kant. VII-VIII. Spredt.

S. tectorum L. Alm. husløg. VII-IX. Dyrket og forvildet.

Jovibarba. Husløg. Husløg med lysegule, oprette, frynsede kronblade.

Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz Kuglehusløg. 10-25cm. Rosetterne 2,5-3 (4)cm brede, kugleformede, med indadkrummede blade på 10-15x5-7mm. Kronbladene 15-17mm, frynsede. VII-IX. Spredt.

J. heuffelii (Schott) A.& D.Löve Fladt husløg. 10-30cm. Rosetterne 5-7 (-12)cm brede, åbne, med udstående blade på 25-60x10-15mm. Kronbladene 10-12mm, randhårede, men næppe frynsede. VII-VIII. Spredt.

Sedum. Stenurt.

1. Bladene flade ..... 2.
" m.m. trinde 5.
2. Enårig. Blomsterne i en åben top ..... cepaea
Flerårig. Blomsterne i tætte halvskærme 3.
3. Kronbladene 10-12mm, oprette og røde ..... spurium
" 3-5mm, udstående 4.
4. Blomsterne gulgrønne eller hvidgrønne ..... maximum
" røde telephium
5. Blomsterne gule ..... 6.
" hvide eller røde 11.
6. Bælgkapslerne oprette. Bladene spidse. 7-tallig krone ... reflexum
" udstående. Bladene butte. 5-tallig " 7.
7. Enårig ..... annuum
Flerårig med golde skud 8.
8. Kronbladene matgule, 3-3,5mm, lidt længere end bægeret .. alpestre
" klart gule, 4-8mm, 2 x bægeret 9.
9. Visne blade blivende, hvide inderst, grå/sorte yderst sartorianum
" " affaldende eller ensfarvet hvide 10.
10. Bladene ægformede, bredest forneden ..... acre
" valseformede, ofte i 5-6 rækker sexangulare
11. Kronbladene 8-10mm, oprette. Bladene tilspidsede .... ochroleucum
" udstående. Bladene butte 12.
12. Blomsterne 6(-9)-tallige ..... hispanicum
" 5-tallige (sj. enkelte 4- eller 6-tallige) 13.
13. Flerårig ..... 14.
Enårig 15.
14. Planten glat. Bladene mest valseformede, spredte ..... album
" kirteldunet foroven. Bladene kort ægformede dasyphyllum
15. Planten kirteldunet foroven ..... rubens
" glat 16.
16. Kronen lidt længere end bægeret. 10(12) støvdragere ..... atratum
" 2 x bægeret. (4)5 støvdragere caespitosum

Sedum maximum (L.) Hoffm. VII-X. 2 underarter:
ssp. maximum: Alm. sankthansurt. Opret. 30-80cm. Bladene 5-10cm, grønne eller blågrønne. Alm.
ssp. ruprechtii Jalas: Hvidlig sankthansurt. 15-40cm. M.m. udstrakt. Bladene 2-5cm, blåduggede. Blomsterne hvidlige. Jud.Caraş-Severin.

S. telephium L. VI-VIII. Spredt. 2 underarter:
ssp. telephium: Rød sankthansurt. Øvre blade med afskåret grund.
ssp. fabaria (Koch) Kirschl.: Klippesankthansurt. Bladene aflangt-lan-

cetformede med kileformet grund, tandede.

Sedum spurium Bieb. Rød stenurt. VI-VIII. Dyrket og forvildet.

S. ochroleucum Chaix Bleggul stenurt. 15-30cm. Bladene 10-20x1-2mm. Kronbladene oprette, 7-10mm, flødefarvede eller grønlighvide. Bælgkapslerne oprette. Bladene med en spore ved grunden. VI-VII. Sj.

S. reflexum L. Bjærgstenurt. VI-VIII. Sj.

S. acre L. Bidende stenurt. V-VII. Alm.

S. sartorianum Boiss. Skællet stenurt. 5-20cm. Bladene kegleformede til aflangt-linjeformede. V-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp. sartorianum: Stænglen 2-3mm tyk, forveddet. Kvasten tæt.
ssp. hillebrandtii (Fenzl) Webb: Stænglen 1-1,5mm tyk, ikke forveddet. Kvasten åben med m.m. oprette grene.

S. sexangulare L. Seksradet stenurt. VI-VII. Spredt.

S. alpestre Vill. Alpestenurt. 5-8cm. Bladene 4-6mm, gennemgående bredest over midten, lidt flade; i runde knipper på de golde skud. Blomsterne i korte, 2-5-blomstrede svikler. VIII. Alm.

S. album L. Hvid stenurt. VI-VII. Sj.

S. dasyphyllum L. Tykbladet stenurt. 3-8cm. Oftest helt kirteldunet. Bladene blåduggede, ofte 3x2,5mm, 1-1,5 x så lange som brede, tit modsatte. Kronbladene 3mm, hvide med rød åre. VII-VIII. Sj.

S. cepaea L. Topstenurt. 15-30cm. Bladene mest modsatte eller i kranse på 3-4. Blomsterne i en lang top, der indtager det meste af stænglen, blegrøde med rød åre. VI-VII. Sj.

S. atratum L. Mørk stenurt. 3-10cm. Bladene 4-6mm, lidt kølleformede. Bægeret rødligt med indsænkede punktkirtler. Planten ofte mørkt rødlig. VI-VIII. Alm.

S. annuum L. Liden stenurt. 3-10cm. Planten undertiden rødligt anløben. Bladene 6mm, affladede på begge sider. Kronen 2 x bægeret. VI-VIII. Alm.

S. rubens L. Rødlig stenurt. 5-12cm. Noget blågrøn og ofte rødlig. Kronbladene 6mm, skarpt tilspidsede. Griflerne lange. V-VI. Sj.

S. caespitosum (Cav.) DC. Brodkronet stenurt. 2-5cm. Ofte rødlig. Bladene 5-6mm. Kronbladene 3mm, brodspidsede, hvide med lyserødt skær. Sj.

S. hispanicum L. Grå stenurt. 7-15cm. Mest enårig. Glat eller kirtelhåret. Bladene 7-18mm, blågrønne, halvtrinde. Kronbladene 5-7mm, tilspidsede, hvide med lyserød åre. VI-VII. Alm.

Rhodiola rosea L. Rosenrod. 10-35cm. Bladene flade, blågrønne, glatte og ofte savtakkede. Blomsterstanden noget halvskærmformet, med grøngule 3-4mm store firtalsblomster. VI-VIII. Alm.

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga. Stenbræk.

1. Bladene modsatte. Blomsterne rødlilla ..... 2.
" spredte eller i roset 3.
2. Bægerbladene randhårede. Blomsterne enlige ..... oppositifolia
" ikke randhårede. Blomsterne 1-3 sammen retusa
3. Bladgrunden afskåret eller hjærteformet ..... 4.
" tilsmalnet 8.
4. Blomsterne gule ..... cymbalaria
" hvide 5.
5. 1-2 stængelblade. Bladene med bruskrand ..... rotundifolia
Mange " . " uden " 6.
6. Ingen yngleknopper i stænglens bladhjørner ..... carpathica
Med " " " " 7.
7. Bladene glatte, sjældent krushårede på undersiden ..... cernua
" kirtelhårede bulbifera
8. Bladene læderagtige, med kalkudskillende kirtler i randen ..... 9.
" blødere, uden kalkudskilledende randkirtler 13.
9. Kronbladene hvide eller svagt lyserøde ..... 10.
" orangegule til gulgrønne 11.
10. Bladene tiltrykt savtakkede. Kronbladene 4-6mm ..... paniculata
" helrandede. Kronbladene 7-14mm marginata
11. Kronbladene gulgrønne, kortere end bægeret ..... luteoviridis
" orangegule, 1-2 x bægeret 12.
12. 20-60cm høj. Stænglen grenet i øvre halvdel. Toårig ..... mutata
6-25cm høj. Stænglen grenet fra grunden. Flerårig demissa
13. Kronen højst lig bægeret, grøn med lillat skær ..... hieraciifolia
" længere end " , anderledes farvet 14.
14. Bladene kileformede og fingret-tandede fortil ..... 15.
" helrandede til lavt tandede 18.
15. 1-2-årig uden golde skud ..... 16.
Flerårig med " " 17.
16. Enårig. Nedre blade visne under blomstringen ..... tridactylites
Toårig. " " friske " " adscendens
17. Kronbladene 11-14mm, hvide ..... pedemontana
" 3-4mm, mest gule moschata
18. Bladene brede: rude- til bredt spatelformede ..... 19.
" smalle: lancet- til linjeformede 21.
19. Bægerbladene oprette ..... nivalis
" nedadrettede 20.
20. Bladene med klar bruskrand ..... cuneifolia
" uden bruskrand stellaris
21. Bladene glatte, men med 7-10 par stive randbørster ..... bryoides
" uden stive randbørster 22.
22. Veludviklede bladrosetter, fåbladede stængler ..... 23.
Uudviklede bladrosetter, mangebladede stængler 24.
23. Kronbladene mest gule, 3-4mm ..... moschata
" hvide, 5-7mm androsacea
24. Bladene lancetformede og flade. Frugtbægeret nedadrettet hirculus
" m.m. linjeformede og kødede. Bægeret opret aizoides

Saxifraga hieraciifolia W.& K. Rank stenbræk. 5-40cm. Bladene 3-7cm, m.m. rudeformede. Stænglen tyk og kødet, bladløs, tæt kirteldunet. Bægeret nedbøjet i frugt. Kronbladene 1,5-3mm. VII-VIII. Sj.

S. nivalis L. Snestenbræk. 5-20cm. Stænglen tæt kirteldunet med nogle hvide, krusede hår. Bladene 15-35mm, korttandede, ofte mørkerøde nedenunder. Kronbladene 3mm, lidt længere end bægeret. ?

S. cuneifolia L. Kilestenbræk. 10-25cm. Rundagtigt spatelformede, helrandede til svagt tandede blade. Hvidlig frugtknude. Skovplante. Alm.

S. stellaris L. ssp. alpigena Temesy Stjærnestenbræk. 5-20cm. Bladene æg- til bredt kileformede, noget kødede, med 4-6 par butte tænder. Kronbladene hvide med 2 gule prikker. VII-VIII. Alm.

S. rotundifolia L. Rundbladet stenbræk. 15-40cm. Bladpladen rundagtig til nyreformet, rund- til groft savtakket, 2,5-5cm bred. Kronbladene 6-11 mm, hvide, ofte med gule prikker forneden. VI-VIII. Spredt. 2 underarter: ssp. rotundifolia: Nedre topgrene mest med 3-flere småprikkede blomster. ssp. heucherifolia (Briseb.& Schenk) Engler: Nedre topgrene mest 2-blomstrede. Kronbladene med mange, store, rødlilla prikker.

S. bryoides L. Enblomstret stenbræk. 2-5cm. Tættuet med rosetter. Bladene ca. 5mm og indadkrummede. Blomsterne mest enlige. Kronbladene bredest midtpå, hvidgule med mørkere grund, 4-6mm. VII-VIII. Spredt.

S. hirculus L. Gul stenbræk. VII-IX. Sj.: Jud.Harghita.

S. cymbalaria L. Ærenprisstenbræk. 10-30cm. Glat-fåhåret 1-2-årig med skinnende, lidt kødede, m.m. nyreformede blade med 7-9 trekantede tænder. V-VI. Jud.Bacau: Baile Slanic, Poiana Sarata i Pasul Oituz, ml. V.Oituzului og V.Uzului. Fugtige, skyggefulde klipper.

S. tridactylites L. Trekløftstenbræk. Kronen 2-3mm. IV-VI. Spredt.

S. adscendens L. Opstigende stenbræk. 3-25cm. Nær foregående, men kronen 3-5mm. VI-VIII. Alm.

S. aizoides L. Solstenbræk. 5-25cm. Bladene 13-15x2-3mm, spidse. Kronen kraftigt gul eller orange, ofte rødplettet. VI-VIII. Alm.

S. pedemontana All. ssp. cymosa Engler Fingerstenbræk. 5-15cm. Bladene bløde, med 5-11 flige fortil. Blomsterne i en ret tæt halvskærmagtig kvast. Bægerbladene meget længere end underbægeret. VI-VII. Spredt.

S. androsacea L. Skjoldstenbræk. 2-4(-12)cm. Grundbladene 10-12x2,5 (2-5)mm, med få lange randhår, helrandede eller kort tretandede. Kvastene med 1-3 hvide blomster. VI-VIII. Alm.

S. moschata Wulfen Moskusstenbræk. 2-5cm. Tætkirtlet og med moskuslugt. Bladene mest 3-fligede (evt. med 0-5 flige). Blomsterne mest matgule, men kan være hvide eller matrøde. VII-VIII. Alm.

S. bulbifera L. Kirtlet knopstenbræk. 20-40cm. Ligner Kornet stenbræk, men stænglen først grenet i spidsen. Kronbladene 7-10mm, med kirtelhåret overside. VI-VII. Spredt.

Saxifraga carpathica Rchb. Storkenæbsstenbræk. 6-15cm. Som Kornet stenbræk, men kronbladene 5-7x2-3mm, lyserødt årede eller anløbne. Frugtknuden oversædig. VII-VIII. Sj.

S. cernua L. Knopstenbræk. 10-30cm. Stænglerne ofte 1-blomstrede eller også helt uden blomster. Stænglen bugtet og skør. VI-VIII. Sj.

S. oppositifolia L. Purpurstenbræk. Stænglerne liggende til opstigende. Bladene rundagtige til omvendt ægformede, med 1-5 kalkkirtler og randhårede forneden. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. oppositifolia: Bladene 2,5-5mm. M.m. løsttuet.
ssp. rudolphiana (Hornsch.) Engl.& Irmsch: Bladene 1,5-2(2,5)mm. Meget tættuet; danner faste puder.

S. retusa Gouan Afstudset stenbræk. Ligner den foregående, men bladene glatte og skinnende, stærkt tilbagebøjede, højst svagt randhårede forneden, 4-radet taglagte. VI-VIII. Sj.

S. marginata Sternb. Kantet stenbræk. 3-9cm. Tæt tueformet med rosetagtige eller søjleformede skud. Bladene 3-12x1-5mm, tydeligt hindekantede. 2-8 hvide eller blegrøde blomster. VII-VIII. Spredt.

S. luteoviridis Schott & Kotschy Gulgrøn stenbræk. 7-9cm. Grundbladene grågrønne, 10-20mm, spatel- til omvendt lancetformede, ofte lilla nedenunder. Bægeret tæt langkirtlet. VII-VIII. Alm.

S. paniculata Miller Klippestenbræk. 15-30cm. Bladene blågrønne, bredere i øvre halvdel, opadbøjede. Topgrenene kirtelhårede, 1-3-blomstrede. Stænglen ofte kun grenet i øvre 1/3. VII-VIII. Alm.

S. mutata L. Safrangul stenbræk. Bladene 10-70x7-12mm, helrandede og randhårede. Kirtelhåret top. Blomsterne i en åben top. Kronen 2 x bægeret. VII-VIII. Sj.: Jud.Braşov: Stupini.

S. demissa Schott & Kotschy Som foregående, men blomsterstanden tæt med kort hovedakse og derfor mange klaser eller svagt grenede toppe. Kronen 1-1,5 x bægeret. VII-VIII. M.Ciucaş. M.Birsei, M.Bucegi.

Chrysosplenium alternifolium L. Alm. milturt. Spredte blade. IV-VI.Alm

C. alpinum Schur Bjærgmilturt. 3-15cm. Bladene modsatte, ret glatte. Bægerbladene rundagtige, ofte bredere end lange, med hætteformet spids. VI-VII. M.Maramureş, M.Rodnei, M.Caliman, M.Bistriţei (Ceahlau), M.Birsei, M.Bucegi ?, M.Fagaraş, M.Retezat.

PARNASSIACEAE

Parnassia palustris L. Leverurt. VII-IX. Alm.

HYDRANGEACEAE

Philadelphus coronarius L. Pibeved, Uægte jasmin. 1-3m. Busk med modsatte, kortstilkede, lavt fjærnttandede, elliptiske, tilspidsede blade på 5-8cm. 1-10 hvide firtalsblomster i klase med mange støvdragere og mest 4 griffelgrene. V-VI. Dyrket og forvildet.

GROSSULARIACEAE

Ribes rubrum L. Haveribs. Blomsten fladt skålformet, med honningskive mellem støvdragere og grifler. Støvknapper dobbelt så brede som lange. IV-V. Dyrket og forvildet.

R. spicatum Robson Vild ribs. Blomsten svagt klokkeformet, uden honningskive. Støvknapperne kvadratiske. IV-V. Spredt.

R. petraeum Wulfen Klipperibs. 1-3m. Bladene op til 15x15cm, spidslappede. Bladstilken med lange kirtelhår og krusede hår. Kronen randhåret. Klasens akse tæt krushåret. Bærret rødt. V-VI. Alm.

R. nigrum L. Solbær. IV-V. Spredt.

R. uva-crispa L. Stikkelsbær. IV-VI. Alm.

R. alpinum L. Fjældribs. IV-VI. Alm.

PLATANACEAE

Platanus hybrida Brot. Almindelig platan. -30m. Træ med lønagtige, men spredte blade. Bladene højst 1/2 delte, med afskåret eller hjærteformet grund. Dyrket.

ROSACEAE

Spiraea. Spiræa.

1. Blomsterstanden en endestillet, m.m. valseformet top salicifolia
" " enkel skærm eller halvskærm 2.
2. Blomsterstanden siddende eller meget kortstilket ... hypericifolia
" stilket 3.
3. Bladene med 3 længderibber ..... 4.
" fjerstrengede 5.
4. Ribberne tydelige. Kronbladene kortere end støvdragerne .. crenata
" utydelige. " længere " " vanhouttei
5. Grenene kantede. Kronbladene ca. 6mm ..... chamaedryfolia
" trinde. " 2-3mm media

Spiraea salicifolia L. Pilebladet spiræa. 1-2m. Bladene 4-8x1-2cm, glatte og ofte dobbelt savtakkede. Støvdragerne 2 x de oftest lyserøde kronblade. VI-VII. Spredt.

S. chamaedryfolia L. (S. ulmifolia) Ælmebladet spiræa. 1-2m. Blomsterne hvide, i halvskærm. Bladene rude-ægformede, indtil 7x4cm, uregelmæssigt eller dobbelt savtakkede. VI-VIII. Alm.

S. media F.Schmidt Hovedspiræa. ½-1½m. Toppen næsten kugleformet. Kronbladene hvide eller bleggule. Bladene bredt elliptiske, indtil 5x2 cm, svagt hårede eller filtede nedenunder som unge. V-VI. Spredt.

S. crenata L. Treåret spiræa. -1m. Blomsterstanden halvskærmformet, ca. 2cm bred. Hvide blomster. Bladene indtil 4x2cm, helrandede eller takkede fortil. V-VI. Sj.

S. vanhouttei (Briot) Zabel -2m. Stænglerne buekrummede. Bladene 2-3,5 cm, rudeformede eller omvendt ægformede, spidse, indskåret-tandede, ofte svagt 3-5-lappede. Hvide kronblade. VI-VII. Dyrket og forvildet.

Spiraea hypericifolia L. Viftespiræa. -1,5m. Blomstrende skud buekrummede, golde oprette. Bladene 1-2,5cm, med 3-5 længderibber og 3-5 rundtakker fortil, m.m. glatte. Hvid krone. IV-VI. Dyrket og forvildet.

Aruncus dioicus (Walter) Fernald Fjerbusk. 80-150cm. Bladene 2-3 x fjersnitdelte med skarpt dobbelt savtakkede, tilspidsede, ægformede småblade. Blomsterstanden stor og pyramideformet med mange små, hvide blomster med 3 bælgkapsler. V-VIII. Spredt.

Filipendula vulgaris Moench Knoldet mjødurt. V-VII. Alm.

F. ulmaria (L.) Maxim. Alm. mjødurt. VI-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. ulmaria: Bladundersiden hvidfiltet. Alm.
ssp. denudata (Presl) Hayek: Bladundersiden glat og fåhåret. Alm.

Rubus. Klynger. Brombærnøglen er taget fra Flora Romaniei. Arterne nævnes kun i nøglen.

1. Skuddene urteagtige. Fodfligene frie. Oprette kronblade saxatilis
" forveddede. Fodfligene sammenvoksede med bladstilken 2.
2. Bladene udelte. Årsskuddene uden torne. Lyserød krone ... odoratus
" sammensatte 3.
3. Modne frugt rød eller orange. Bladundersiden hvidfiltet ..... 4.
" " sortagtig 5.
4. Stænglen med tætte, rødlige børster. Lyserød krone phoenicolasius
" ikke med tætte børster. Hvid krone idaeus
5. Stænglen blådugget. 3 småblade. Lancetformede fodflige ... caesius
Anderledes. (Brombær) 6.
6. Årsskuddene med uens torne, både korte og lange; årsskud og blomsterstand ofte med stilkkirtler ..... 7.
Tornene m.m. ens, sidder hovedsageligt på stænglens kanter; årsskud og blomsterstand m.m. uden eller med siddende kirtl. 44.
7. Årsskuddene fåkirtlede. Øvre blade ofte med stjærnehåret overside. Gulhvide kronblade ..... canescens
Årsskuddene ofte mangekirtlede. Bladoversiden uden stjærnehår. Kronbladene ikke gullige 8.
8. Blomsterstandsaksens kirtelbørster mest længere end aksebredden 9.
" " " kortere " " 21.
9. Årsskuddene kantede ..... 10.
" trinde 13.
10. Blomsterne hvide ..... 11.
" lyserøde 12.
11. Øvre blades undersider grå- til hvidfiltede ..... hebecarpos
" " " grønne koehleri
12. Endesmåbladet elliptisk-rudeformet eller omvendt-æg-rudeformet. Blomsterstanden topformet ..... hystrix
Endesmåbladet bredt ægformet til rundagtigt. Fåblomstret blomsterstand pseudodoftanensis
13. Tornene med fladtrykt grund ..... 14.
" m.m. trinde 15.
14. Kronbladene kraftigt lyserøde. Bladundersiden grå/hvid schleicheri
" hvide. Bladundersiden grøn opiparus

15. Endesmåbladet med afrundet grund ..... glandulosus
" " m.m. hjærteformet grund 16.
16. Kirtler og børster gule eller farveløse ..... 17.
" " " rødlilla, mørklilla eller brune 19.
17. Blomsterstandsgrenenes blade med hvid underside ... niveoserpens
" " " grøn eller grå underside 18.
18. Bægeret tæt tornet ..... rivularis
" med 0-få torne serpens
19. Blomsterne røde eller lyserøde ..... amoenus
" hvide (sj. svagt blegrøde) 20.
20. Blomsterstandsaksens torne 3-4 x aksebredden ..... romanicus
" " lidt længere end aksebredden hirtus
21. Årsskuddet spinkelt; tornene ikke længere end stængelbredden 22.
" kraftigere; " ofte " " " 23.
22. Tornene med fladtrykt grund ..... scaber
" m.m. trinde tereticaulis
23. Årsskuddenes torne kun noget forskellige ..... 24.
" " tydeligt " 35.
24. Bladundersiden grøn ..... 25.
Øvre blades undersider hvidfiltede 30.
25. Årsskuddene kantede. Alle blade med 5 småblade ..... 26.
" butkantede til m.m. trinde. 3-5 småblade 29.
26. Endesmåbladet aflangt ægformet til æg-lancetformet ..... gremlii
" ægformet, bredt ægformet til rundagtigt 27.
27. Kronbladene hvide eller svagt lyserøde. Støvdragerne hvide colemannii
Kronblade og støvdragere lyserøde 28.
28. Blomsterstanden m.m. kirtlet ..... muelleri
" ukirtlet laetecoloratus
29. Blomsterstanden med korte stilkkirtler ..... hebecaulis
" ukirtlet chlorocladus
30. Kronbladene rundagtige ..... 31.
" ægformede eller elliptiske, længere end brede 32.
31. Blomsterstanden kirtlet ..... vestitus
" ukirtlet pilifer
32. Årsskuddene glatte eller med knippestillede hår ... macrostachys
" m.m. tæthårede 33.
33. Bægerbladene oprette eller opret-udstående under blomstringen.
Stænglerne tydeligt kantede ..... doftanensis
Bægerbladene tilbagebøjede under blomstringen 34.
34. Årsskuddene trinde. 3 småblade ..... tenuispinosus
" kantede. 5 " adscitus
35. Blomsterstandsaksen kort eller ofte svagt håret til glat,
dens kirtler længere end hårene ..... 36.
Blomsterstandsaksen tydeligt udstående håret, kirtlerne
tydeligt kortere end hårene 41.
36. Årsskuddene m.m. trinde. 3-5 småblade ..... 37.
" kantede eller svagt kantede, dog med flade sider 38.

37. Blomsterstilkene med få og ulige lange kirtler .... vallisparsus
" " " korte, lige " " persanimontis
38. Blomsterne i en åben klase. Lyserød krone og støvdragere rubristamineus
Blomsterne i en top. Hvide blomster 39.
39. Blomsterstandens kirtler lyserøde ..... fagetanus
" " hvide 40.
40. Bægerbladene udstående eller oprette under blomstringen melanoxylon
Bægerbladene nedbøjede under blomstringen omalus
41. Øvre blade grå- eller hvidfiltede nedenunder ..... 42.
Alle blade grønne nedenunder 43.
42. Blomsterstanden med få torne. Støvdragerne ca. = griflerne apiculatus
Blomsterstanden med mange torne. Støvdragerne længere end griflerne radula
43. Bægerbladene udstående eller oprette under blomstringen thyrsiflorus
Bægerbladene oftest nedbøjede under blomstringen fuscus
44. Årsskuddene oprette og glatte. Blomsterne i klase eller top 45.
" buekrummede, ofte med rodslående spids. Blomsterne i top 49.
45. Årsskuddenes torne 1-3mm, kegle- eller sylformede .... nessensis
" " længere og kraftigere 46.
46. Nedre småbladspar næsten siddende. Støvdragerne kortere end griflerne ..... plicatus
Nedre småbladspar tydeligt kortstilkede. Støvdragerne mest lig eller længere end griflerne 47.
47. Årsskuddene dybt furede. Blomsterstanden med 0-få torne sulcatus
" ikke " " " mange torne 48.
48. 5-7 småblade. De øvre blade varigt dunede til næsten filtede på undersiden ..... affinis
5 småblade, der ofte er glatte som modne divaricatus
49. Bægerbladene med hvidfiltet yderside, tilbagebøjede i frugt 50.
" " gråfiltet " , oprette eller udstående i frugt 66.
50. Nedre småbladspar meget kortstilket eller næsten siddende ... 51.
" " tydeligt stilket 59.
51. Årsskuddene tynde, furede i øvre halvdel, med knippestillede hår. 3-5 småblade ..... arduennensis
Årsskuddene kraftige. Altid 5 småblade 52.
52. Bladoversiden stjærnehåret ..... moestus
" glat eller med ugrenede hår 53.
53. Årsskuddene ret tæt hårede med alm. og knippestillede hår subvillosus
Årsskuddene glatte eller meget fåhårede 54.
54. Årsskuddene trinde eller meget butkantede, med flade kanter 55.
" som oftest tydeligt furede 56.
55. Endesmåbladet med en 2cm lang spids ..... drautensis
" " " kort spids thyrsanthus

56. Bladundersiden grøn eller grågrøn ..... constrictus
" grå- eller hvidfiltet 57.
57. Blomsterstanden med blade næsten til spidsen ..... phyllostachys
" uden " eller højst med 1-2 forneden 58.
58. Endesmåbladet bredt ægformet-elliptisk eller rundagtigt thyrsanthus
Endesmåbladet aflangt ægformet eller aflangt omvendt ægformet candicans
59. Blomsterstandens torne udstående, rette eller noget krumme .. 60.
" " seglkrummede 64.
60. Bladtænderne ikke længere end brede ..... margaritae
" længere end brede 61.
61. Årsskuddene glatte eller halvglatte ..... 62.
" fint dunede eller spredt hårede 63.
62. Alle endesmåblade runde med hjærteformet grund ..... banaticus
Blomstrende skuds blade med elliptisk eller elliptisk-ægformet endesmåblad med tilsmalnet grund geniculatus
63. Bladundersiden tiltrykt hvidfiltet, uden længere hår ... bifrons
" hvidfiltet, desuden med længere hår cuspidifer
64. Årsskuddene hårede og furede ..... chloocladus
" glatte eller halvglatte 65.
65. Årsskuddene kantede eller med lidt konkave sider ..... discolor
" furede. Blomsterstanden med 0-få torne vestii
66. Småbladene fligede ..... laciniatus
" hele 67.
67. Frugtbægeret opret eller udstående ..... 68.
" nedbøjet 72.
68. Årsskuddene skarpkantede. 5 småblade. Bægerbladene uden vedhæng. Støvdragerne mest lidt længere end griflerne ..... 69.
Årsskuddene trinde/butkantede. 3-5 småblade. Bægerbladene med vedhæng. Støvdragerne lig eller kortere end griflerne 70.
69. Blomsterstanden med stilkkirtler ..... bracteosus
" uden " vulgaris
70. 5(4) småblade. Årsskuddene kantede foroven ..... loretianus
3 " " trinde eller butkantede 71.
71. Bladundersiden ensartet håret ..... myricae
" halvglat moldavicus
72. Årsskuddene trinde eller butkantede ..... silvaticus
" tydeligt kantede 73.
73. Øvre blade m.m. tofarvede ..... 74.
Bladene ensfarvede 75.
74. Øvre blade stærkt tofarvede ..... rhombifolius
" " lidt " subvillicaulis
75. Bladundersiden halvglat. Kronbladene udrandede ..... questieri
" m.m. dunet til filtet. Kronbladene hele macrophyllus

Rubus saxatilis L. Fruebær. VI-VII. Spredt.

R. odoratus L. Rosenbrombær. -3m. Oprette, hårede og kirtlede stængler. Bladene indtil 25cm, 5-lappede. Blomsterne 3-5cm brede. Dyrket.

Rubus phoenicolasius Maxim. Vinbrombær. 2-3m. Mest med 3 bredt ægformede småblade. En kort, endestillet klase. Store, kirtelhårede bægerblade. Indadbøjede kronblade. Dyrket og forvildet.

R. idaeus L. Hindbær. V-VII. Alm.

R. caesius L. Korbær. V-IX. Alm.

Rosa. Rose.

1. Griflerne sammenvoksede til en søjle ..... 2.
" frie 3.
2. Griffelsøjlen kortere end de indre støvdragere ..... stylosa
" mindst lig " " " arvensis
3. Bægerbladene m.m. helrandede ..... 4.
De 3 ydre bægerblade tydeligt fligede eller lappede 8.
4. Blomsterne gule ..... foetida
" røde eller hvide 5.
5. Bladundersiden dunet. Tykke, rynkede blade ..... rugosa
" glat 6.
6. Småbladene dobbelt savtakkede ..... pendulina
" enkelt " 7.
7. Kronen hvid. Stænglen tæt finttornet ..... pimpinellifolia
" rød glauca
8. Bladene stift læderagtige. Kronbladene 3-4,5cm ..... gallica
" ikke stift læderagtige. Kronbladene 1-2,5cm 9.
9. Tornene rette eller svagt krummede ..... 10.
" stærkt hagekrummede 11.
10. Bladundersiden glat med enkelte kirtler ..... jundzillii
" filtet rosae tomentosae
11. Bladundersiden tætkirtlet og æbleduftende .... rosae rubiginosae
" højst kirtlet på ribberne rosae caninae

Rosa arvensis Hudson Hvid slyngrose. 0,3-2m. Stænglen tynd, liggende eller klatrende, fåtornet. Hybenstilkene med stilkkirtler. Kronen hvid. Hybenet rødt, kugle- til ægformet. VI-VII. Alm.

R. pimpinellifolia L. Klitrose. V-VI. Alm.

R. foetida J.Herrmann Gul rose. 1-4m. Tornene rette. Bladene mørkegrønne, dobbelt savtakkede. Bægerbladene kirtelbørstede. Hybenet kugleformet, rødt, ca. 10mm. Dyrket og forvildet.

R. glauca Pourret Kobberrose. 1-3m. Kvistene purpurfarvede, ofte blådugggede. Bladene blågrønne eller purpurfarvede. Hybenet kugleformet, brunligrødt. VI-VII. Sj.

R. rugosa Thunb. Rynket rose. Dyrket og forvildet.

R. pendulina L. Klipperose. 0,5-2m. 0-få rette torne. Kronen lysende rød. Hybenet hængende, æg- eller flaskeformet, mest med kirtelbørster. VI-VIII. Alm.

R. gallica L. Sukkerrose. 30-80cm. Stængler og kviste med uens torne

og kirtelbørster. Bladene mat blågrønne ovenpå, blegere, dunede og kirtlede nedenunder. Stærkt duftende blomster. VI. Alm.

Rosa stylosa Desv. Griffelrose. 0,5-3m. Med kraftige, krumme torne. Ydre bægerblade med kirteltandede flige. Bladoversiden skinnende, undersiden grågrøn og tæt dunet. VI. Sj.

R. jundzillii Besser Netåret rose. 1-2m. Bladene svagt læderagtige, undersiden med fremtrædende ribbenet, glatte, med få kirtler på ribberne. Hybenstilken med stilkkirtler. VI. Spredt.

Rosae caninae. Hunderoser.

1. Griffelåbningen bred, over 1mm ..... 2.
" smal, under 1mm 5.
2. Bladundersiden glat. Bladene ofte blågrønne ..... 3.
" håret 4.
3. Hybenbægeret opret. Hybenstilken 2-20mm ..... dumalis
" udstående til nedbøjet. Hybenstilken 20-30mm subcanina
4. Hybenbægeret opret/udstående. Bladet blågrønt ..... coriifolia
" nedbøjet. Bladet mest græsgrønt subcollina
5. Bladundersiden håret ..... 6.
" glat 7.
6. Bladundersiden med kirtler på ribberne ..... obtusifolia
" uden " " " dumetorum
7. Blomsterstilken med kirtelbørster ..... 8.
" glat 9.
8. Småbladene enkelt savtakkede, tænderne så brede som lange andegavensis
Småbladene dobbelt savtakkede, tænderne længere end brede nitidula
9. Bladundersiden uden kirtler ..... canina
" med nogle kirtler på ribberne 10.
10. Småbladenes tænder uden kirtler ..... squarrosa
Småbladene kirteltandede nitidula

Rosa canina L. Glat hunderose. V-VI. Alm.

R. squarrosa (Rau) Bor. Kirtelfliget hunderose. V-VI. Alm.

R. andegavensis Bast. Korttandet hunderose. V-VI. Alm.

R. nitidula Besser Kirteltandet hunderose. V-VI. Spredt.

R. dumalis (Bechst.) Boulay (R. vosagiaca) Blågrøn rose. VI-VII. Spr.

R. subcanina (Christ) DT & Sarnth. Langstilket blågrøn rose. VI-VII.

R. coriifolia Fr. (R. caesia) Håret blågrøn rose. V-VI. Spredt.

R. subcollina (Christ) DT & Sarnth. Tidlig hunderose. V-VI.

R. obtusifolia Desv. Rubladet rose. V-VIII. Alm.

R. dumetorum Thuill. (R. corymbifera) Håret hunderose. V-VI. Alm.

Rosae tomentosae. Filtroser.

1. Tornene helt lige. Frugtbægeret opret. Småbladene 3-5cm .. villosa
" m.m. krummede 2.
2. Hybenbægeret tilbagebøjet, tidligt affaldende ..... tomentosa
" opret og blivende. Småbladene svagt dun. scabriuscula

Rosa tomentosa Sm. Langstilket filtrose. VII. Alm.

R. scabriuscula Sm. Rubladet filtrose. VII. Spredt

R. villosa L. Spansk hyben. VI. Dyrket og forvildet. Oprindelig?

Rosae rubiginosae. Æbleroser.

1. Griflerne m.m. glatte. Griffelåbningen under 1mm bred ..... 2.
" tæthårede. " over 1mm " 4.
2. Småbladene med kileformet grund ..... agrestis
" " afrundet grund 3.
3. Stænglen med torne og mange børster og kirtelbørster ..... turcica
" kun med torne. Hybenstilken med stilkkirtler micrantha
4. Blomsterstilk og hyben med stilkkirtler ..... 5.
" " " glatte 6.
5. Hybenbægeret nedbøjet og snart affaldende ..... turcica
" opret og blivende rubiginosa
6. Hybenbægeret nedbøjet og snart affaldende ..... caryophyllacea
" opret og blivende elliptica

Rosa rubiginosa L. Æblerose. VI-VII. Alm.

R. elliptica Tausch Kilebladet rose. V-VIII. Sj.

R. agrestis Savi Lugtløs æblerose. V-VII. Alm.

R. micrantha Borrer Småblomstret rose. VI. Spredt.

R. caryophyllacea Besser Nellikerose. V-VI. Spredt.

R. turcica Rouy Lav æblerose. VI. Sj.

Agrimonia. Agermåne.

1. Kronbladene bleggule. Indre bægerbørster sammenknebne ..... pilosa
" gyldengule. Bægerbørsterne ej " 2.
2. Blomsterstilkene 4-10mm. Støttebladene ofte hele og ægform. repens
" 1-4mm. Nedre støtteblade trelappede 3.
3. Modne blomsterbund mindst 3/4 furet ..... eupatoria
" " 1/2 furet procera

Agrimonia pilosa Ledeb. Bleg agermåne. 50-150cm. Modne frugt med børster på 4-5x3mm, furet i hele sin længde, m.m. glat bortset fra børsterne. VI-VIII. Spredt.

A. eupatoria L. Alm. agermåne. Nederste bægerbøster vandret udstående til opadrettede. VI-IX. Alm.

A. procera Wallr. Vellugtende agermåne. Nederste bægerbørster m.m. nedadrettede. VI-VII. Spredt.

A. repens L. Langstilket agermåne. 50-100cm. Bladene store og læderag-

tige, mørkegrønne ovenpå. Blomsterbunden dybt 3/4 furet. Yderste børster nedbøjede. Forvildet.

Aremonia agrimonioides (L.) DC. Lav agermåne. 5-40cm. En mindre Agermåned med 2-3 blomster sammen i en løs kvast. Blomsterbunden uden børster. Småbladene aftager i størrelse mod bladgrunden. V-VI. Spredt.

Sanguisorba officinalis L. Kvæsurt. IV-VII. Alm.

S. minor Scop. Bibernelle. IV-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. minor: Blodstillende bibernelle. Underbægeret kantet, med netårede sider.
ssp. muricata Briq.: Vingefrøet bibernelle. Underbægeret vinget med grubet-vortede sider.

Dryas octopetala L. Rypelyng. 8-12cm. Lav, tæppedannende dværgbusk med aflangt ægformede, rundtakkede blade med mørk, rynket overside og hvidfiltet underside. Oftest 8 hvide kronblade. Griflen fjerhåret og forlænget i frugt. VI-VII. Alm.

Geum. Nellikerod.

1. Stænglerne enblomstrede. Blomsterne gule, 2,5-4cm brede ..... 2.
" flerblomstrede 3.
2. Uden udløbere. Endesmåbladet meget større end sidesmåbl. montanum
Med " . " lidt " " " reptans
3. Blomsterne nikkende. Rødbrunt bæger, laksefarvet krone .... rivale
" oprette. Grønt bæger og gul krone 4.
4. Kronbladene 8-10mm. 200-250 frugter i hver blomst ..... aleppicum
" 4-7mm. Ca. 70 frugter i blomsten urbanum

Geum reptans L. Krybende nellikerod. 5-30cm. Småbladene dybt tandede. VI-IX. Spredt.

G. montanum L. Bjærgnellikerod. 5-30cm. Endesmåbladet noget trelappet eller uregelmæssigt tandet. V-IX. Alm.

G. rivale L. Engnellikerod. IV-VI. Alm.

G. urbanum L. Febernellikerod. V-X. Alm.

G. aleppicum Jacq. Russisk nellikerod. 80-120cm. Ligner den foregående men blomsterne påfaldende større. Planten stift gulhåret. VI-VIII. Spr.

Waldsteinia. Lospote. Lave rosetplanter med gule blomster. Bladene 3-koblede eller nyreformet 5-lappede, indskårne som hos Engnellikerod.

W. geoides Willd. Lappet lospote. 7-25cm. Kort krybende jordstængel. Bladene bredt hjærte-nyreformede med 5-7 groft savtakkede lapper. IV-V. Spredt.

W. ternata (Stephan) Fritsch Trekoblet lospote. 10-15cm. Med overjordiske udløbere. Bladene trekoblede med brede, uregelmæssigt lappet-tandede småblade. IV-V. Spredt.

Potentilla. Potentil.

1. Kronen mørkt rødbrun ..... palustris
" gul eller hvid 2.
2. Kronen hvid ..... 3.
" gul 6.
3. Nedre blade finnede, øvre 3-koblede ..... rupestris
Alle blade 3-5-fingrede 4.
4. Grundbladene 3-koblede ..... micrantha
" 7-5-fingrede 5.
5. Kronen kortere end bægeret ..... haynaldiana
" længere " " alba
6. Grundbladene finnede ..... 7.
" fingrede 9.
7. Flere blomster i kvast ..... bifurca
Blomsterne enlige fra bladhjørnerne 8.
8. Bladundersiden sølvhvid. Med udløbere ..... anserina
" grøn. Ingen udløbere supina
9. Blomsterne 4-tallige ..... 10.
" 5-tallige 11.
10. Alle blade siddende eller højst 1/2 cm stilkede ..... erecta
Nedre stængelblade med en 1-2cm lang stilk anglica
11. Alle stængler krybende og rodslående ..... reptans
Stænglen opret eller udstrakt, sjældent rodslående 12.
12. Med 3 småblade (evt. få 5-finnede blade foroven) ..... 13.
5-9-koblede småblade 14.
13. Kronen højst lig bægeret. Endestillet blomsterstængel norvegica
" længere end bægeret. Sidestillede blomsterstængler ternata
14. Blomstrende stængler endestillede, 0-få sidestillede rosetter 15.
" " sidestillede fra grundrosetterne 25.
15. Yderbægerbladene 1,5-2 x bægerbladene, altid mindst så brede som disse ved grunden. Kronbladene 12-15mm ..... 16.
Yderbægerbladene lig eller lidt længere end bægerbladene, smallere end disse 19.
16. Yderbægerbladene halvbutte. Grundsmåbladene omv.ægf. astracanica
" spidse. Grundsmåbladene af en anden form 17.
17. Kvasten tæt og hovedformet. Bladundersiden filtet .. emilii-popii
" åben. Bladundersiden ikke filtet 18.
18. Nedre stængelsmåblade svagt tandede mod spidsen ..... taurica
" " savtakkede hele vejen bornmuelleri
19. Stængelhårene tiltrykte. Bladundersiden filtet ..... 20.
" udstående, 2-5mm. Bladundersiden ikke filtet 23.
20. Griflen svagt fortykket mod spidsen ..... collina
" smallere mod spidsen 21.
21. Bladundersiden gråfiltet. Bladranden ikke omrullet .... inclinata
" hvidfiltet. " ofte " 22.
22. Grundsmåbladene med 3-7 halvbutte tænder ..... argentea
" " 9-11 spidse tænder neglecta
23. Småbladene dybt indskåret-tandede til fjersnitdelte ... laciniosa
" svagt " " " takkede 24.
24. Kronen 7-9mm. Spinkel, ofte med flere opstigende stængler pedata
" 9-12mm. Kraftig, ofte med 1 opret stængel recta

25. Bladundersiden med krusede hår, m.m. filtet ..... collina
" " rette hår 26.
26. Småbladene 3-6cm med 6-12 tandpar. Griflen tyk forneden ..... 27.
" 1-2(3)cm med 2-6(8) par tænder. Griflen tyk foroven 28.
27. Kronen 1,5-2 x bægeret. Mest 5 småblade ..... chrysantha
" 1-1,5 x " . 5-9 småblade thuringiaca
28. Grundbladene med 7-9 småblade ..... 29.
" overvejende med 5 småblade 30.
29. Yderbægeret meget smallere end bægerbladene ..... patula
" kun lidt smallere end bægerbladene heptaphylla
30. Stænglen forneden omskedet af blivende, æg-lancetformede fodflige af visne blade ..... 31.
Grundbladenes fodflige linjeformede, visner sammen med grundbladene 32.
31. Bladranden med udstående, ikke sølvglinsende hår ..... crantzii
" " tiltrykte, sølvglinsende hår aurea
32. Bladundersiden uden grenede hår ..... tabernaemontani
" med " " 33.
33. Bladene(3)5-fingrede, undersiden tæt stjærnehåret ..... cinerea
" 5-7-fingrede, " svagt " pusilla

Potentilla bifurca L. Gaffelpotentil. 20-40cm. 3-7 par småblade med karakteristisk 2-3-delt spids, ellers helrandede. Kronbladene 4-8mm. VI-IX. Jud.Tulcea: Macin, Greci, Casimeca.

P. palustris (L.) Scop. Kragefod. VI-VIII. Spredt.

P. anserina L. Gåsepotentil. V-VIII. Alm.

P. rupestris L. Klippepotentil. 20-60cm. Nedre blade med 5-7 småblade. Stængelbladene jordbæragtige. Stænglen rødbrun og tætdunet. V-VI. Sj.

P. argentea L. Almindelig sølvpotentil. VI-VII.

P. neglecta Baumg. Håret sølvpotentil. VI-VII.

P. inclinata Vill. Skærmpotentil. 15-50cm. Stænglerne mest opstigende. Småbladene indskåret tandede til fligede, med 6-12 par tænder. Mellemform mellem argentea og recta. V-VIII. Alm.

P. collina Wibel Bakkepotentil. 10-30cm. Mellemform mellem argentea og tabernaemontani, pusilla og cinerea. IV-VII. Alm. 3 underarter:
P. collina: Ingen golde rosetter under blomstringen. Stænglen kraftigt bueformet opstigende. Bladundersiden tæt hvidt til sølvgrået filtet.
P. thyrsiflora Zimmeter: Med golde rosetter under blomstringen. Kronbladene 2 x bægeret. Grundmidtersmåbladet med (3)4-7 par tænder. Sj.
P. leucopolitana P.J.Müller: Med eller uden golde rosetter. Stænglen med nedliggende grund. Bladundersiden grået til grågrønt filtet. Grundmidtersmåbladet med 1-3(4) par tænder. Kronen lidt længere end bægeret.

P. supina L. Sandpotentil. 10-40cm. Grundbladene med 2-5 par småblade, de øvre ofte 3-koblede. Kronen kortere end bægeret. 1-fåårig.VI-IX.Spr.

Potentilla norvegica L. Norsk potentil. 10-40cm. Mest enårig. Enkelte øvre blade kan være finnede med 4-5 småblade. Småbladene 2-7xl-4cm, med 8-12 par tænder. Stænglen rødlig. VI-IX. Sj.

P. astracanica Jacq. 20-25mm. Grundsmåbladene svagt tandede.IV-VII.

P. emilii-popii Nyarady 15-35cm. VI. Sj. Jud.Constanţa: Adamclisi, Hagieni, Coroana.

P. taurica Willd. 20-50cm. Nedre stængelsmåblade aflangt ægformede. Kronbladene svovlgule. V-VII. Spredt.

P. bornmuelleri Borbas 5-40cm. Nedre stængelsmåblade bredt ægformede. Kronbladene smørgule. IV-V. Sj. Dobr.

P. recta L. Rank potentil. Bladene m.m. grønne på begge sider, svagt indskåret-tandede. V-VII.

P. laciniosa Nestler Fliget potentil. 20-45cm. Bæger- og yderbægerblade tilspidsede. V-VII.

P. pedata Nestler 20-40cm. Bladene savtakkede, spredt gråhårede på begge sider. VI-VII. Spredt.

P. chrysantha Trev. Kvastpotentil. 10-50cm. IV-VI. Spredt.

P. thuringiaca Bernh. Tysk potentil. 15-30cm. Grundbladene mest 7-fingrede. Kronen mørkegul. Stængelbladene mest 5-fingrede. IV-VI. Alm.

P. crantzii (Cr.) Beck Guldpotentil. 2-10(20)cm. Stænglen med opret-udstående behåring. Kun hoved- og sideribber synlige på bladundersiden. Småbladets endetand ca. så stor som sidetænderne. V-VIII. Spredt.

P. aurea L. Randhåret potentil. 5-20cm. Stænglen tiltrykt håret. Bladundersiden tydeligt netåret. Småbladets endetand altid mindre end sidetænderne. VI-IX. Spredt.

P. ternata C.Koch (P. aurea ssp. chrysocraspeda) 3-10cm. Som foregående, men bladene med 3 småblade med butte tænder. VI-VIII. Alm.

P. heptaphylla L. Mat potentil. 5-15cm. Planten kirtelhåret, især på blomsterstilkene. Udstående stængelhår. III-V. Spredt.

P. patula W.& K. Ungarsk potentil. 10-20cm. Helt uden kirtelhår. Stænglen med opret-udstående hår. IV-VI. Spredt.

P. tabernaemontani Asch. Vårpotentil. 5-15cm. Bladoversiden glat eller fåhåret, mørkegrøn og noget skinnende. Blomsterstilkene uden stjærnehår, med korte opadrettede og lange udadrettede hår. III-V. Sj.

P. pusilla Host Stjærnehåret vårpotentil. 5-15cm. Bladoversiden matgrøn, ikke skinnende. Blomsterstilkene oftest med korte og lange kirtelhår samt længere buekrummede alm. hår. V-VIII. Sj.

P. cinerea Chaix Grå potentil. 5-15cm. Bladoversiden grågrøn og tæt stjærnehåret til grøn; undersiden grå. Blomsterstilkene tæt stjærnehårede, med eller uden alm. og kirtelhår. III-VI. Alm.

Chamaecytisus lindemannii (Krecz.) Klaskova -120cm. Grenene opstigende, med grønlige hår. Småbladene 25-35x4-6mm. Bælgen 30mm, tæt lådden-filtet. Jud.Teleorman: Brinceni. Jud.Tulcea: Babadag.

C. ratisbonensis (Schäffer) Rothm. Udstrakt gedekløver. 30-45cm. Udstrakt eller opstigende. Småbladene 10-15x4-6mm. Ensidig blomsterstand med knipper på 1-2 blomster. Bælgen 20-30mm, tiltrykt dunet. IV-V. Spr.

C. supinus (L.) Link Hovedgedekløver. 20-60cm. Kvistene udstående hårede. Småbladene 15-35x7-14mm. 2-8 blomster sammen. Fanen ofte brunplettet. Bælgen 20-35mm, udstående håret. VI-VIII. Spredt.

C. austriacus (L.) Link Østrigsk gedekløver. 15-70cm. Opret eller udstrakt. Blomsterne mest 2-8 sammen. Kronen mørkegul. Bælgen 20-30mm, silkehåret. VII-VIII. Alm.

C. heuffelii (Wierzb.) Rothm. Sølvfrugtet gedekløver. 20-50cm. Opret. Småbladene glatte eller svagt hårede ovenpå. 2-5(8) blomster sammen. Bælgen tæt sølvhvidt silkehåret. VI-VIII. Spredt.

C. jankae (Velen.) Rothm. Lav gedekløver. Udstrakte stængler med oprette grene på 8-10cm. Småbladene tæt sølvhvidt silkehårede. Blomsterne 2-4 sammen. Bæger og bælg silkehårede. Jud.Constanţa: Mangalia, Hagieni.

C. danubialis (Velen.) Rothm. 40-70cm. Stærkt grenet, med sølv-silkehårede kviste. Småbladene 20x2-3mm, sølvsilkehårede på begge sider. 3-7 blomster sammen. Kronen bleggul. Bælgen 20x4mm, tæt uldhåret.

C. albus (Hacq.) Rothm. Hvid gedekløver. 30-80cm. Oprette eller opstigende grene med både udstående og tiltrykte hår. Småbladene 20-30x7-12 mm. 5-8 blomster sammen. VI-VIII. Alm.

C. banaticus (Griseb.) Rothm. Bleg gedekløver. 30-80cm. Opret med tiltrykte hår på kvistene. Småbladene tiltrykt hårede på begge sider. 5-8 blomster sammen. Alm.

C. rochelii (Wierzb.) Rothm. Mangeblomstret gedekløver. 50-100cm. Grenene oprette med m.m. udstående hår. Småbladene 20-25x6-8mm. Kronen bleggul. Bælgen ca. 30mm, tiltrykt lådden. VI-VII. Sj.

Genista. Visse.

1. Blomsterne i endestillede hoveder. Modsatte grene ..... radiata
   " i klaser eller akselstillede knipper 2.
2. Bladene trekoblede. Småbladene 5-25x1-2mm ..... sessilifolia
   1 småblad 3.
3. Planten tornet ..... germanica
   " ikke tornet 4.
4. Køl og fane glatte ..... 5.
   " " " hårede 6.
5. Stænglen oftest trevinget. Bladet smalt hindekantet ... januensis
   " trind. Bladet ikke hindekantet tinctoria
6. Blomsterne i knipper nær hovedgrenenes spidser ..... albida
   " mest i lange klaser på opstigende grene pilosa

Genista tinctoria L. Farvevisse. VI-VII. Alm. 3 underarter:
ssp. oligosperma (Andrae) Prod.: -20cm. Udstrakte stængler med opstigende blomsterskud med 1-2cm lange klaser. Bladenes sideribber utydelige
ssp. tinctoria: Større med tydelige sideribber. Bladene lancetformede og spidse. Stængler, bægre og bælge glatte eller tiltrykt hårede.
ssp. ovata (W.& K.) Arc.: Større med tydelige sideribber. Bladene elliptiske eller ægformede, butte. Stængler, bægre og bælg udstående hårede.

G. januensis Viv. Trekantsvisse. 10-50cm. Glat. Golde skuds blade indtil 30x5mm, blomstrende skuds 5-12x2-4mm, alle med klar og svagt finttandet rand. V-VIII. Sj.

G. albida Willd. 8-20cm. Bladene 3-10x1,5-4mm, siddende, hårede på begge sider, elliptiske til omvendt ægformede. Bægeret 5-7mm. VI.Jud.Tulcea

G. pilosa L. Håret visse. 5-70cm. Bladene 5-12mm, mest omvendt lancetformede, kortstilkede til halvsiddende, m.m. glatte ovenpå. Bægeret 4-5 mm. V-VII. Spredt.

G. germanica L. Tysk visse. 10-60cm. Bladene 4-5mm brede, enkle, undersiden langhåret. Fanen ægformet og spids. V-VI. Sj.

G. radiata (L.) Scop. Strålevisse. 20-40(100)cm. Stærktgrenet, gyvelagtig busk med stive, 6-ribbede grene. Modsatte trekoblede blade. Småbladene 5-20x2-4mm. 4-12 blomster sammen. V-VI. Sj.

G. sessilifolia DC. Fugleklovisse. -50cm. Opret busk. Smalle, ofte indrullede småblade. Blomsterne i lange, løse klaser. Bladagtige støtteblade. V-VI. Jud.Constanţa: Hagieni, Independenta.

Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs Nedliggende vingevisse. 10-25cm. Krybende stængler med opstigende, leddelte, noget læderagtige kviste. Tætte, endestillede, gule klaser. V-VII. Alm.

Spartium junceum L. Spansk gyvel. 1-3m. Grøn, risformet busk med enkle, affaldende blade. Blomsterne 2-2,5cm, i løse, mangeblomstrede klaser. VI-IX. Dyrket og forvildet.

Lupinus. Lupin. Ingen oprindelige arter. Omtales derfor kun i nøglen.

1. Flerårig ..... 2.
   Enårig 3.
2. 6-17 småblade på 7-15x1,5-3cm ..... polyphyllus
   7-11 " " 1,5-6 x ca.1 cm perennis
3. Kronen gul ..... luteus
   " blå eller hvid 4.
4. Bægerets overlæbe svagt 2-tandet. Kronen hvid ..... albus
   " " tvekløvet. Kronen blå 5.
5. Kronen 15-17mm; fanen med en lys plet ..... varius
   " 11-13mm, ensfarvet angustifolius

Robinia pseudacacia L. Uægte akacie, Bælgtorn. V-VI. Dyrket og forv.

Galega officinalis L. Lægestregbælg. 40-150cm. Flerårig urt med talrige oprette, mest ugrenede stængler. Uligefinnede blade. Blomsterne hvide

til blegblå i langstilkede klaser fra bladhjørnerne. Bælgen 2-5cm, trind og indsnøret mellem frøene. VII-VIII. Alm.

Colutea arborescens L. Blærebusk. 2-4m høj busk med uligefinnede blade og 3-8-blomstrede klaser. Let kendelig på den 5-7x3cm store, stærkt oppustede bælg. VI-VII. Sj.

Caragana arborescens Lam. Sibirisk ærtetræ. 3-7m. 4-6 par småblade. Bladskaftet 3-7cm. Blomsterne mest 2-5 sammen. Kronen 15-22mm. Bælgen 3-6cm lang. V-VI. Dyrket og forvildet.

C. frutex (L.) C.Koch Firkoblet ærtetræ. -1m. 2 par småblade. Bladskaftet indtil 1,5cm. Blomsterne 1-3 sammen. Kronen 15-25mm. Bælgen 2,5-4,5cm. V-VI. Sj.

Astragalus. Astragel.

1. De fleste hår udelte og grundfæstnede ..... 2.
   " " " på stængel og blade midtfæstnede (den ene arm kan være meget kort) eller tvegrenede fra grunden 17.
2. Klasen sidder midt i rosetten ..... 3.
   Med bladet stængel 5.
3. Planten mest med tiltrykte hår ..... depressus
   " " " udstående hår 4.
4. Fanen håret udvendigt ..... pubiflorus
   " glat exscapus
5. Frugtbægeret opblæst. Kronen blivende ..... ponticus
   " ikke opblæst. Kronen affaldende 6.
6. Kronen ensfarvet gul eller gullig ..... 7.
   " i det mindste delvist lilla 14.
7. Fanen mindst 17mm ..... 8.
   " under 17mm 9.
8. Fanen håret udvendigt ..... dasyanthus
   " glat haarbachii
9. Bælgen æg-kugleformet. Øvre fodflige forbundne ..... cicer
   " anderledes. Øvre fodflige frie 10.
10. Enårig ..... contortuplicatus
    Flerårig 11.
11. Bælgen 10-16mm ..... galegiformis
    " 20-40mm 12.
12. Småbladene under 7mm brede. Bælgen 10-15mm bred .. penduliflorus
    " mindst 7mm brede. Bælgen 4-6mm " 13.
13. Bægertænderne bredt trekantede, ca. 1/2mm ..... frigidus
    " linjeformede, over 1mm glycyphyllos
14. Fodfligene mindst 1/3 sammenvoksede ..... pseudopurpureus
    " ikke eller under 1/3 sammenvoksede 15.
15. Den unge bælg glat ..... australis
    " " " håret 16.
16. Stængelbladene kortere end fodfligene ..... depressus
    " længere " " alpinus
17. Enårig ..... hamosus
    Flerårig 18.

18. Bladenes hår bugtede og opret-udstående ..... dolichophyllus
" " m.m. rette, tiltrykte 19.
19. Blomsterne hængende under blomstringen ..... 20.
" udstående eller oprette 21.
20. 40-80cm høj. 15-20 par småblade ..... falcatus
Stængelløs. 6-14 par småblade depressus
21. Klasen udgår midt fra rosetten ..... 22.
Med bladet stængel 23.
22. (7)10-20 par småblade. Bælgen 25-45mm, lidt krum monspessulanus
5-8(-12) " " . " 12-20mm, krum spruneri
23. Fodfligene mindst 1/2 forbundne ..... 24.
" frie, undtagen måske de allernederste 27.
24. Småbladene over 10mm brede ..... roemeri
" under 10mm " 25.
25. 2-7 par småblade. Kronen mest gullig ..... subuliformis
7-15 " " . " " lilla 26.
26. Klasen kugleformet. Fanen blålilla og udrandet pseudopurpureus
" ægformet/aflang. Fanen næsten linjeformet onobrychis
27. Bægeret 2-4mm. Fanen højst 12mm ..... 28.
" mindst 5mm. Fanen over 12mm 29.
28. Bægertænderne trekantet-ægformede, indtil 1/4 x røret austriacus
" linje-lancetformede, 1/2-3/4 x røret sulcatus
29. Stænglen helt urteagtig ..... 30.
" forveddet ved grunden 31.
30. Kronen hvidliglilla ..... roemeri
" gul asper
31. Længere blades småblade 1/2-1mm brede og børsteformede ..... 32.
" " " over 1mm " , ikke børsteformede 33.
32. Klasen nærmest skærmagtig ..... corniculatus
" aflang og løs subuliformis
33. Selve bælgen ca. = bægeret, næsten udstående håret .. vesicarius
Bælgen rager ud af bægeret, med opstigende hår 34.
34. Kronen lilla ..... 35.
" gullig 36.
35. Klasen 2-4cm, ægformet og tæt ..... cornutus
" 8-20cm, løs varius
36. Kronen hvidlig. Klasen 2-5cm, tæt og ægformet ..... glaucus
" gullig. Klasen løs og indtil 15cm lang peterfii

Astragalus contortuplicatus L. Ringastragel. 10-40cm. Klasestilken 1/2 x bladene. Klasen tæt med 5-12 gule blomster. Fanen ca. 6mm. Bælgen hindeagtig, ringkrummet, ca. 7mm i tværmål. VI-VII. Sj.

A. haarbachii Spruner 5-50cm. Mest enårig. 8-12 par småblade, udrandede. Klasen med 7-18 blomster. Fanen 20-25mm. Bægertænderne 2/3 x røret. Bælgen 25-30x10-15mm, ret dybt furet nedenunder. V-VI. Sj.

A. hamosus L. Krogastragel. 20-50cm. 9-11 par småblade. Klasestilken 1/2 x bladene. Klasen med 5-14 gule blomster. Fanen 7-8mm. Bælgen 20-50x2-3mm, halvkredsformet krummet. IV-VII. Sj.

A. cicer L. Rundbælgsastragel. 20-60cm. 10-15 par småblade. Klase-

stilken 1/2-2/3 x bladene. Fanen 14-16mm. Bælgen 10-15mm, opblæst, med korte, sorte og hvide hår. VI-VII. Alm.

Astragalus pseudopurpureus Gusuleac Brodastragel. 10-40cm. 7-15 par udrandede småblade. Bægeret 8-10mm. Kronen ca. 18mm, blålilla. Bælgen 10-15mm, hvidlådden. V-VII. Jud.Bacau: Cheile Bicazului (Dl.Glodului, Dl.Panta).

A. galegiformis L. Stilkbælget astragel. 40-100cm. 11-16 par småblade. Klasestilken 1/2 x bladene. Klasen 10-20cm. Bælgen sidder på en kort stilk. VI-VIII. ?

A. frigidus (L.) A.Gray Isastragel. 10-35cm. Opret. 3-8 par smablade. Klasestilken 1-1,5 x bladene. Klaserne 2-5cm. Kronen gullighvid. Bælgen 20-30x6mm, først tæt sort- og hvidhåret. VII-VIII. Spredt.

A. penduliflorus Lam. Blæreastragel. 30-50cm. Opret. Stænglen ihvertfald håret forneden. 7-15 par friskgrønne småblade. Fodfligene 7-10x3 mm. Bælgen stærkt opblæst, 20-30x10-15mm. VII-VIII. Sj.

A. alpinus L. Fjældastragel. 8-30cm. Liggende til opstigende. 7-12 par småblade. Fanen lilla med blå årer; vingerne hvide; kølen hvid med blålilla spids. VII-VIII. Sj.

A. depressus L. Lav astragel. 1-5(-10)cm. 6-14 bladpar. Klasestilken 1-6cm. Bægeret 4-6mm. Kronen 10-12mm, hvidlig eller blålilla. Fanen udrandet. Bælgen 15-22x3-4mm. VI-VII. Sj.

A. australis (L.) Lam. Mørkspidset astragel. 10-30cm. Liggende til opstigende. Kronen gullighvid (sj. hvid). Fanen undertiden mørkspidset. Kølen med mørklilla spids. Vingerne ofte 2-lappede. VI-VIII. Spredt.
ssp. australis: Bægertænderne kortere end røret.
ssp. bucsecsii Jav.: Bægertænderne ca. = røret. M.Ceahlau, M.Bucegi.

A. glycyphyllos L. Sød astragel. V-VI. Alm.

A. dasyanthus Pallas Lådden astragel. 20-45cm. Opstigende til opret. 11-20 par småblade. Klasestilken 10-20cm med 10-30 blomster. Bægeret 12-15mm. Kronen 17-21mm, gul. V-VI. Spredt.

A. pubiflorus DC. 5-10cm. 8-14 par småblade. Klasestilken ca. 1cm. Klasen tæt med 4-10 gule blomster på 25-30mm. Bægeret 12-15mm. VI-VII.

A. exscapus L. Stængelløs astragel. 10-30cm. Mest stængelløs. 12-19 par småblade, 5-10mm brede, tæthårede på begge sider. Bægeret 12-15mm. Klasestilken meget kort, med 3-10 gule blomster på 20-30mm. V-VI. Sj.
(Her som den endemiske ssp. transsilvanicus (Barth) Jav. med m.m. glat bæger).

A. ponticus Pallas 50-100cm. Opret. Bladene 10-30cm med 15-25 par m.m. glatte småblade. Klasestilken indtil 1cm. Bægeret 10-15mm. Kronen gul, 15-22mm. Klasen ægformet. V-VI. Spredt.

A. falcatus Lam. Seglastragel. 40-80cm. Opret. Bladundersiden tæthåret. Kronen gul, 9-12mm. Bælgen 15-25mm, aflang og lidt krum. ?

Astragalus asper Jacq. Rank astragel. 20-70cm. Opret. 8-15 par småblade på 15-25x1-2mm. Klasestilkene 1-2 x bladene. Klasen lang og tæt. Bægeret 8-14mm. Kronen 15-20mm. Bælgen 12-25x3mm. V-VI. Spredt.

A. roemeri Simonkai Kalkastragel. 40-70cm. Opret. Bladene 7-12cm med 4-6 par småblade på 2,5-6cm. Klasestilken ca. 2 x bladet. Kronen 20-25 mm, hvidliglilla. VI-VII. Jua.Alba: Poşaga på M.Scarişoara-Belioara. Jud.Harghita: Tulgheş la Pietrele Roşii, M.Ghilcoş, M.Suhardu. Jud.Neamţ: Bicaz-Chei.

A. austriacus Jacq. Østrigsk astragel. 10-60cm. Opret eller opstigende. 5-10 par småblade på 5-15x¾-2½mm. Klaserne lange og løse med 8-23 lyseblå blomster med lilla kølspids på 5-8mm. VI-VIII. Spredt.

A. sulcatus L. Vikkeastragel. 25-80cm. Opret. Bladene 5-7cm med 6-11 par småblade på 10-30x1/2-3mm. Klasestilken 1-1,5 x bladene, med 5-20 bleglilla til lyseblå blomster på 7-8mm. V-VII. Sj.

A. onobrychis L. Faneastragel. 10-60cm. Ofte stærkt rødlilla blomster på 15-30mm, hvor fanen er 6-8mm længere end vingerne. 8-15 par småblade, 1-3mm brede. Udstrakt eller opstigende. VI-VII. Alm.

A. dolichophyllus Pallas 5-15cm. Stænglen 0-2cm. Klasestilken meget kort, med 5-20 bleggule blomster på 20-30mm. Bægeret 10-13mm, låddent. Bladene tæthårede. VI-VII. Sj. Jud-Tulcea.

A. monspessulanus L. Fransk astragel. Bladene 7-20cm. Klasestilken 1-2 x bladene med 7-30 rødlige blomster på 20-30mm. Bægeret 9-16mm. IV-VI. Spredt.

A. spruneri Boiss. Nær foregående, men bægeret 12-18mm og kronen hvid, bleg- eller lyslilla. V-VI. Jud.Constanţa: Mangalia, Hagieni.

A. subuliformis DC. Sylbladet astragel. 2-10cm. Bladene 2-6cm med 2-7 par småblade på 4-15x0,5-1mm. Klasestilken 1-1,5 x bladene. Klasen meget løs med 3-10 mest gullige blomster på 17-23mm. VI-VII. Murfatlar.

A. corniculatus Bieb. 2-10cm. Nær foregående, men bladene tæthårede på begge sider. Kronen blålilla. VI-VII. Sj.

A. cornutus Pallas 20-40cm. Bladene 5-9cm med 4-9 par småblade. Fodfligene 3-9mm. Klasestilken ca. = bladet. Kronen 18-20mm. Bægeret 7-12 mm. Bælgen 10-18x3-4mm. VI-VII. Sj. østpå.

A. varius Gmelin Langklaset astragel. 10-50cm. Opret. Bladene 4-8cm med 5-11 par småblade. Fodfligene 2-5mm. Bægeret 8-10mm. Kronen 15-20 mm. Bælgen 12-20x2-3mm. VI-VII. Sj.

A. glaucus Bieb. 5-10cm. Bladene 3-6cm med 3-6 par småblade. Fodfligene 3-5mm. Bægeret 9-12mm, tænderne 3-4mm. Kronen 18-25mm. VI-VII. Sj.

A. vesicarius L. Broget astragel. 10-30cm. Opret. Stængel og blade tæt sølvgrået hårede. 5-10 par småblade. Klasestilken 2-3 x bladene. Kronen 17-23mm. V-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp. vesicarius: Fanen rødlilla eller lilla, vinger og køl blegere eller hvidlige.

ssp. pseudoglaucus (Klokov): Blomsterne ensfarvet gule.

Astragalus peterfii Jav. -20cm. Nær foregående, men småbladene linje- til linje-lancetformede. Bælgen 15-25mm, 1,5-2 x bægeret, med tætte opstigende hår. V-VI. Jud.Cluj: Suatu.

Oxytropis. Spidsbælg.

1. Med stængelblade ..... 2.
   Klasen udgår fra rosettens midte 3.
2. Blomsterne blålilla ..... Astragalus pseudopurpureus
   " lysegule pilosa
3. Kronen rent blå. Klasen næsten kugleformet ..... carpatica
   " højst blålilla 3.
4. Blomsterne kortstilkede, 10-12mm ..... pyrenaica
   " siddende, 15-20mm. Fodfligene 2-3 x de nederste småbl. 4.
5. Kronen kraftigt blå- til rødlilla. Planten tæt silkehåret halleri
   " mest gullig. Planten fåhåret til glat campestris

Oxytropis carpatica Uechtr. Karpatisk spidsbælg. Klasestilken kort tiltrykt håret. Mest over 12 par halvglatte småblade. Fodfligene frie. Fanen 10-16mm. Bælgen 20-25x8mm. VII-VIII. Spredt.

O. pyrenaica G.& Gr. Pyrenæisk spidsbælg. Klasestilken med lange, m.m. udstående hår. Fodfligene ca. = de nedre småblade, indbyrdes frie. Bælgstilken ca. 1/2 x bægerrøret. VII-VIII. Sj.

O. campestris (L.) DC. Markspidsbælg. Klasestilken med 0,5-1,5mm lange hår. Fodfligene indbyrdes sammenvoksede og 1/3-1/2 forbundne med bladstilken. VII-VIII. Spredt.

O. halleri Bunge Silkehåret spidsbælg. Klasestilken med 1,5-3mm lange hår. Fodfligene m.m. frie indbyrdes, kort forbundne med bladstilken.Alm

O. pilosa (L.) DC. Håret spidsbælg. 20-50cm. Stænglen kraftig, udstående håret. 9-13 par tiltrykt hårede småblade. Flere klaser fra bladhjørnerne. Kronen 12-14mm. VI-VIII. Spredt.

Glycyrrhiza. Lakridsplante. Flerårige. Kronen bleglilla.

G. glabra L. Lakridsplante. 50-100cm. Kronen 8-12mm. Klasen forlænget i frugt. Bælgen -3cm, glat eller kirtelbørstet. 9-17 småblade. Sj.

G. echinata L. Pigget lakrids. 50-150cm. Kronen 4-6mm. Klasen hovedformet i frugt. Bælgen 12-16mm, spidst ægformet, m.m. tæt kirtelbørstet. 5-13 småblade. VI-VII. Spredt.

Amorpha fruticosa L. Særkrone. 1-3m. Busk. Blå eller lilla blomster uden vinger og køl på 6mm i noget ensidige, ende- og ofte knippestillede klaser. 5-12 par kirtelprikkede småblade. V-VII. Dyrket og forvildet.

Psoralea bituminosa L. Tjærekløver. 20-50cm. Opret flerårig med langstilkede, kirtelprikkede kløverblade. Blålilla blomster i langstilkede, ægformede hoveder. Bælgen ægformet med et seglformet næb. V-VI. Sj.

Vicia. Vikke.

1. Klasen kortstilket, stilken kortere end 1 blomsts længde ..... 2.
" langstilket, " længere " " " " 13.
2. Alle blade uden slyngtråd ..... 3.
Øvre " med " 4.
3. 1-3 par småblade. Hvid krone med sorte vinger ..... faba
7-13 par " . Bleggul krone med rødligt skær truncatula
4. Fanen dunet ..... 5.
" glat 6.
5. Blomsterne (1)2-4 sammen. Bladene ofte siddende ..... pannonica
" enlige. Bladstilken = et bladskaftsled hybrida
6. Kronen gul ..... 7.
" blå- eller rødlilla 8.
7. Kronen svovlgul. Nedre bægertænder 2-3 x de øvre ..... lutea
" bleggul. Bægertænderne omtrent ens grandiflora
8. Bægertænderne ulige store, bægerrøret skråt afskåret ..... 9.
" ret ens, bægerrøret lige afskåret 11.
9. Småbladene 1-2mm brede, 3-spidsede ..... peregrina
" 4-40mm " , ikke 3-spidsede 10.
10. Flerårig. 3-6 bladpar ..... sepium
Enårig. 2-3 bladpar narbonensis
11. Kronen 5-8mm. Frøene knudrede ..... lathyroides
" 10-30mm. Frøene jævne 12.
12. Underjordiske stængler med kronløse blomster og bælge amphicarpa
Uden underjordiske blomster sativa
13. Fodfligene uens, 1 linjeformet og 1 håndfliget ..... articulata
" ens 14.
14. Bægertænderne ens, mindst af rørets længde ..... 15.
" uens, de øvre kortere end bægeret 16.
15. Bladene uden slyngtråd ..... ervilia
" med " hirsuta
16. Bladene uden slyngtråd. Kronen bleggul ..... 17.
De øvre blade med slyngtråd 18.
17. Småbladene butte med brod. Klasen med 3-8 blomster .. truncatula
" spidse. Klasen med 6-20 blomster sparsiflora
18. Kronen 4-8mm, bleglilla. Klasen med 1-6 blomster ..... 19.
" mindst 9mm 20.
19. Klaserne med 2-5 blomster; stilken med en kort stak tenuissima
" " 1-2 " ; " uden stak tetrasperma
20. Kronen lysegul. Småbladene 1,5-4cm brede ..... pisiformis
" hvid, blå eller rødlilla 21.
21. Kronen hvid med lilla årer ..... 22.
" anderledes 23.
22. Kronen lillaspidset. Planten 1-årig ..... biennis
" ikke lillaspidset. Planten flerårig silvatica
23. 3-5 par småblade. Fodfligene tandede ..... dumetorum
6-20 " " . " ikke tandede 24.
24. Fanens plade 1/2 x neglen ..... villosa
" " mindst af neglens længde 25.
25. Småbladene 2-2,5 x så lange som brede. Sideribberne udgår
med en vinkel på 45-60° ..... cassubica

Småbladene 3-5 x så lange som brede. Sideribberne udgår med en vinkel på 30° 26.
26. Kronen 8-12mm. Fanens plade lig neglen ..... cracca
" 12-18mm. " " længere end neglen 27.
27. Småbladene 2-6mm brede. Klasen med 15-30 blomster ... tenuifolia
" 1-2mm " . " " 8-20 " dalmatica

Vicia sparsiflora Ten. Bleggul vikke. 30-100cm. Spredt dunet. 13-21 lancetformede småblade. Klaserne kortere end bladene. Kronen 15-25mm. IV-VI. Jud.Mehedinţi, Jud-Dolj.

V. pisiformis L. Ærtevikke. 1-2m. Glat. 3-5 par runde til ægformede småblade. Bægertænderne uens, kortere end bægerrøret. Klasen med 8-30 blomster på 13-20mm. VI-VII. Spredt.

V. cracca L. Musevikke. VI-VIII. Alm.

V. tenuifolia Roth Langklaset vikke. VI-VIII. Alm.

V. dalmatica A.Kerner Børstevikke. Som den foregående, men småbladene linje- til børsteformede. VI-VIII. Sj.

V. cassubica L. Kassubisk vikke. VI-VII. Spredt.

V. silvatica L. Skovvikke. VI-VII. Alm.

V. dumetorum L. Kratvikke. VI-VII. Alm.

V. villosa Roth Sandvikke. V-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. villosa: Stænglen lådden. Bægertænderne udstående randhårede.
ssp. varia (Host) Corb.: Stænglen glat eller svagt dunet. Bægertænderne glatte eller tiltrykt dunede.

V. biennis L. Tofarvet vikke. 30-150cm. Glat eller svagt dunet. 3-6 par aflange småblade. Klasen med 5-20 blomster på 10-15mm. VI-IX. Sj.

V. articulata Hornem. Enblomstret vikke. 20-70cm. Glat enårig. Bægertænderne lidt uens, længere end røret. Kronen 8-17mm, hvid eller blegblå, undertiden sortspidset. V-VI. Dyrket og forvildet.

V. ervilia (L.) Willd. Linsevikke. 15-50cm. Glat eller dunet enårig. 8-12 par småblade. Klaserne med 1-4 blegrøde blomster på 6-9mm. Forv.

V. hirsuta (L.) S.F.Gray Tofrøet vikke. V-VIII. Alm.

V. tenuissima (Bieb.) Sch.& Th. Spinkel vikke. 15-60cm. Enårig. Kronen 6-9mm, blegt rødlilla. Bælgen med 4-6 frø. V-VI. Spredt.

V. tetrasperma (L.) Schreber Taddervikke. V-VII. Alm.

V. truncatula Fischer 30-50cm. Svagt dunet flerårig. Klasen med 3-8 blomster på 17-20mm. VI-VII. Sj.

V. sepium L. Gærdevikke. V-VI. Alm.

V. grandiflora Scop. Storblomstret vikke. 30-60cm. Enårig. Blomsterne ofte 2 sammen på 2-8mm lange stilke, bleggule med lillat eller grønligt anløben fane, 25-35mm. Bælgen dunet. V-VII. Alm.

Vicia pannonica Cr. Ungarsk vikke. 20-50cm. Dunet enårig. 2-4 blomster sammen. Kronen gullig til brunlilla, mest med en rødbrun midterstribe på fanen, 14-22mm. 4-10 par småblade. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. pannonica: Kronen hvidlig til bleggul.
ssp. striata (Bieb.) Nyman: Kronen brunlilla.

V. sativa L. Fodervikke. VI-VII. Alm. 3 underarter:
ssp. nigra (L.) Ehrh. (ssp. angustifolia): Smalbladet vikke. Kronen 15-16mm, fanen omtrent vinkelret opadbøjet. Bælgen 3-6mm bred, ikke indsnøret mellem frøene.
ssp. sativa: Kronen 18-30mm. Bælgen 6-11mm bred, indsnøret mellem frøene, brun eller gulbrun.
ssp. cordata (Wulfen) A.& Gr.: Kronen 18-20mm. Bælgen 4,5-6mm bred, ikke indsnøret mellem frøene, mørkebrun eller næsten sort.

V. amphicarpa Dorthes Knoldvikke. Som foregående. Kronen 20-25mm. Bælgen 4-6mm bred, ikke indsnøret mellem frøene, mørkebrun, oftest glat. V-VI. Sj. Jud.Constanţa: Hagieni.

V. lathyroides L. Vårvikke. IV-VI. Alm.

V. peregrina L. Markvikke. 20-40cm. Svagt dunet enårig. 3-7 bladpar. Blomsterne 1-2 sammen, rødlilla, 10-16mm. V-VII. Sj.

V. lutea L. Gul vikke. 20-60cm. Enårig. Blomsterne 1-3 sammen, (15) 20-35mm. Småbladene 1,5-3mm brede. Bælgen 8-14mm bred, håret.V-VI.Spr.

V. hybrida L. Svovlvikke. 20-40cm. Halvglat til dunet enårig. Blomsterne 18-30mm, bleggule (sj. lilla). Bægertænderne uens. Bælgen 8-10 mm bred, dunet. ?

V. narbonensis L. Fransk vikke. 20-60cm. Dunet, opret enårig. Småbladene 2-5x1-4cm, helrandede eller tandede, kort randhårede, grågrønne. Fodfligene ca. 1cm. Blomsterne 1-4 sammen, mørkt rødlilla. V-VI. Spr.

V. faba L. Hestebønne. VI-VII. Dyrket.

Lens culinaris Med. Almindelig linse. 10-40cm. Vikkelignende enårig med 3-8 par småblade. 1-3 blegblå eller rødlilla blomster sammen på 4-7mm i en langstilket klase. V-VII. Dyrket og sj. forvildet.

Lathyrus. Fladbælg.

1. Ingen slyngtråd ..... 2.
   Med slyngtråde 11.
2. Bladet udelt og græsagtigt. Enårig. Karminrød blomst .. nissolia
   " med småblade. Flerårige 3.
3. Kronen gul, brungul, orangegul eller gullighvid ..... 4.
   " rødlilla til blålilla 8.
4. Kronen bleggul. Småbladene ligestrengede ..... 5.
   " ikke bleggul. Småbladene fjerstrengede 6.
5. Bægeret glat eller randhåret ..... pannonicus
   " dunet pallescens
6. Kronen brun- eller orangegul. Kirtlet bladunderside ..... aureus
   " rengul. Bladundersiden uden kirtler 7.

7. Nedre bægertænder ca. af rørets længde ..... transsilvanicus
" " under 1/3 af rørets længde laevigatus
8. 1 par småblade. Fodfligene 8-15mm brede ..... laxiflorus
2-6 par småblade. Fodfligene 1-8mm brede 9.
9. Bladundersiden mat. 4-6 par småblade. Fodfligene 4-10mm ... niger
" skinnende. 2-3 par småblade. Fodfligene 10-25mm 10.
10. 3-8 blomster på 1,5-2cm. Bælgen uden kirtler ..... vernus
6-12 " " 1-1,5cm. " brunkirtlet venetus
11. Kronen gul ..... 12.
" ikke gul 14.
12. Ingen småblade, men 2 store, spydformede fodflige. Enårig aphaca
1 par småblade. Flerårig 13.
13. Småbladene lancetformede, 2-9mm brede ..... pratensis
" ægformede, 8-15mm brede hallersteinii
14. 2-5 par småblade ..... paluster
1 " " 15.
15. Flerårig ..... 16.
Enårig 18.
16. Stænglen uvinget. Klasen med 2-7 mørkrosa blomster ... tuberosus
" vinget 17.
17. Fodfligene mindst 1/2 x så brede som stænglen ..... latifolius
" under " " " " " " silvester
18. Kronen teglstens- til orangerød ..... 19.
" med en anden farve 20.
19. Blomsterstilken 5-20mm, med stak ..... sphaericus
" 10-40mm, uden stak setifolius
20. Kronen rød med blegblå vinger ..... hirsutus
" ensfarvet 21.
21. Blomsterstilken 1-3cm. Bælgens rygside med 2 køle ..... cicera
" 3-6cm. " " " 2 vinger sativus

Lathyrus vernus (L.) Bernh. Vårfladbælg. IV-V. Alm.

L. venetus (Miller) Wohlf. Firbladet fladbælg. 20-40cm. Som den foregående, men klasen nikkende foroven. Ofte flerstænglet. V-VI. Spredt.

L. niger (L.) Bernh. Sort fladbælg. VII-VIII. Alm.

L. laevigatus (W.& K.) Gren. Bjærgfladbælg. 20-60cm. Mest 4 par småblade på 3-7x1-3cm. Klasen med 3-12 blomster på 15-25mm. V-VI. Alm.

L. transsilvanicus (Sprengel) Fritsch 20-50cm. 2-4 par småblade, 2-5 cm brede. Kronen 20-25mm. V-VI. Spredt.

L. aureus (Steven) Brandza Gylden fladbælg. 20-70cm. 3-6 par småblade 2,5-5cm brede. Nedre bægertænder af rørets længde. Kronen 17-22mm. Unge bælg tæt kirtlet. V-VIII. Spredt.

L. pannonicus (Jacq.) Garcke Hvid fladbælg. 20-50cm. 2-3(4) par småblade på 2-7cm x 2-5mm. Fodfligene 1-2cm. Klasen med 3-9 blomster på 12-20mm. Kronen gullighvid med rødligt skær. V-VI. 2 underarter:
ssp. pannonicus: Klasen længere end støttebladet. Bægertænderne oftest randhårede. Sj.

ssp. collinus (Ortmann) Soó: Klasen kortere end støttebladet. Bægertænderne mest glatte.

Lathyrus pallescens (Bieb.) C.Koch Bleg fladbælg. 20-40cm. Som den foregående, men dunet. Fodfligene ofte halvt spydformede. V-VI. Spredt.

L. pratensis L. Gul fladbælg. Fodfligene mindre end småbladene, 1-3cm x 3-6mm. Klasen med 5-12 blomster på 10-16mm. VI-VII. Alm.

L. hallersteinii Baumg. Spydfladbælg. 30-120cm. Fodfligene mindst lig småbladene, 20-40x6-12mm. Klaserne med 2-6 blomster på 14-20mm.V-VII.Alm

L. paluster L. Kærfladbælg. VI-VIII. Spredt.

L. laxiflorus (Desf.) Kuntze Fyrrefladbælg. 20-50cm. Småbladene spidse, bredt lancet- til afrundet rudeformede. Fodfligene tilsvarende. Klasen med 2-6 blålilla blomster på 15-20mm. V-VI. Sj.

L. tuberosus L. Knoldfladbælg. VI-VIII. Alm.

L. silvester L. Skovfladbælg. VII-VIII. Alm.

L. latifolius L. Havefladbælg. 60-200cm. Bladstilken mindst så bredt vinget som stænglen. Småbladene 1/2-5cm brede, tydeligt netårede. Klaserne stift oprette, længere end støttebladene. VII-VIII. Spredt.

L. sphaericus Retz. Enblomstret fladbælg. 10-60cm. Kronen 10-13mm. Bælgen 3-7cm x 4-7mm, tydeligt længdstribet. V-VI. Sj.

L. setifolius L. Børstefladbælg. 10-60cm. Kronen 8-11mm. Bælgen 15-30 x 7-11mm, uden længdestriber. IV-VI. Sj.

L. cicera L. Purpurfladbælg. 10-60cm. Kronen 10-14mm, rødlilla. Planten glat. Småbladene 2-5mm brede. Bælgen 20-40x5-10mm. V-VII. Spredt.

L. sativus L. Sædfladbælg. 10-60cm. Kronen 12-18(24)mm, lyseblå (sj. lyserød eller hvid). Bælgen 20-40x10-15mm. V-VI. Dyrket og forvildet.

L. hirsutus L. Håret fladbælg. 20-100cm. Klasen med 2-3 blomster på 7-15mm. Bælgen 20-50x5-10mm, rusthåret. VI-VII. Alm.

L. nissolia L. Græsbladet fladbælg. 10-50cm. 1(2) langstilkede, karminrøde blomster på 6-7mm. Den udfladede bladstilk 5-10x1/2cm. VI-VII. Alm.

L. aphaca L. Bladløs fladbælg. 20-60cm. Selve bladet reduceret til en slyngtråd, men med 2 store, spydformede eller spadeformede akselblade. Blomsterne 6-18mm, langstilkede og mest enlige. VI-VII. Spredt.

Pisum sativum L. Ært. Klaserne højst lidt længere end bladene. Kronen hvid til rødlilla. V-VI. Dyrket. 2 underarter:
ssp. sativum. Kronen hvid. Fodfligene uden plet. Småbladene hele.
ssp. arvense (L.) Celak.: Markært. Kronen med mørklilla fane og rødlilla vinger. Fodfligene med en plet forneden. Småbladene ofte tandede.

P. elatius Bieb. Vildært. 50-160cm. Kronen med rødlilla fane og sortlilla vinger. Klaserne længere end bladene. V-VI. Sj.

Ononis pusilla L. Liden krageklo. 10-25cm. Kronen gyldengul, oftest kortere end bægeret. Blomsterne næsten siddende enkeltvis i bladhjør-

nerne, 6-8mm lange. Småbladene 5-13mm. VI-VII. Sj.

O. spinosa L. Strandkrageklo. Mest tornet. Blomsterne oftest enlige. ssp. spinosa: Med kraftige torne. Bælgen mindst lig bægeret. VI-VII.Spr ssp. austriaca (G.Beck) Gams: Uden eller mest med svage torne. Bælgen kortere end bægeret. Jud.Bihor.: Baiţa.

O. arvensis L. Stinkende krageklo. Blomsterne mest parvise, i tætte klaser. VI-VII. 2 underarter:
ssp. arvensis: Kronen 15-20mm. Blomsterstandsaksen mest langhåret. Mest uden torne. Alm.
ssp. spinosiformis (Simk.): Kronen 10-15mm. Blomsterstandsaksen mest korthåret eller også tosidigt håret. Mest med torne. Spredt.

Melilotus. Stenkløver.

1. Kronen hvid ..... 2.
" gul 3.
2. Klasen mangeblomstret. Kronen 4-5mm. Blomsterstilken 1-1,5mm albus
" med indtil 10 blomster. Kronen 5-6mm. Blomsterstilken 2-4mm. Klaserne 3-5 sammen arenarius
3. Mellemste blades fodflige savtakkede. Kronen 3-3,5mm ..... dentatus
" " " m.m. helrandede 4.
4. Kølen så lang som fane og vinger. Tværrynket bælg ..... altissimus
" kortere end " " " . Netåret bælg officinalis

Melilotus albus Med. VI-IX. Alm.

M. arenarius Grec. Sandstenkløver. 100-150cm. Bælgen 6-7mm. Klitter. VI-VIII. Jud.Constanţa: Mellem Tuzla og Techirghiol.

M. dentatus (W.& K.) Pers. Strandstenkløver. VI-IX. Spredt.

M. officinalis (L.) Pallas Markstenkløver. VI-IX. Alm.

M. altissimus Thuill. Høj stenkløver. VI-IX. Spredt.

Trigonella. Bukkehorn.

1. Klasen med en 2-5cm lang stilk. Blomsterne blå (sj. hvide) ..... 2.
" m.m. siddende. Blomsterne gule eller gullige 3.
2. Klasen næppe forlænget i frugt. Næbbet brat afsat ..... caerulea
Frugtklasen forlænget. Bælgen jævnt tilsmalnet i næbbet procumbens
3. Bægeret klokkeformet, 2,5-3mm. Kronen 3-4mm, gul ..... monspeliaca
" rørformet, 6-8mm. Kronen 8-18mm 4.
4. Småbladene 2-5cm lange. Bælgen 6-11cm ..... foenum-graecum
" 5-12mm " . " 1,5-4cm gladiata

Trigonella monspeliaca L. Stjærnebukkehorn. 5-15cm. Stænglen tiltrykt dunet. Bælgene 7-17x1-1,5mm, hængende, skråårede, lidt krumme.IV-V.Spr.

T. caerulea (L.) Ser. Mølurt. 20-60cm. Opret. Stænglen hul. Småbladene 20-50x5-20mm. Klasen kugleformet. Bælgen rude-ægformet, 4-5mm, næbbet ca. 2mm. Kronen ca. 6mm. VI-VII. Dyrket og lidt forvildet.

T. procumbens (Besser) Rchb. Lav mølurt. 30-40cm. Som foregående, men stænglen marvfyldt. Småbladene 12-28x3-8mm. VI-VII. Spredt.

Trigonella gladiata Steven Sværdbukkehorn. 5-25cm. Blomsterne mest enlige, 8-10mm, bleggule, undertiden lillaanløbne. Bælgens næb 1-2cm. Sj.

T. foenum-graecum L. Bukkehorn. 10-50cm. 1-2 bleggule blomster med lilla grund på 12-18mm i bladhjørnerne. Næbbet 2-3cm. VI-VII.Dyrk.&forv

Medicago. Sneglebælg.

1. Bælgen nyreformet, højst 3mm lang ..... lupulina
   " forlænget, over 3mm, oftest skruesnoet 2.
2. Flerårig ..... 3.
   Enårig 6.
3. Bælgen m.m. seglkrummet ..... falcata
   " skruesnoet 4.
4. Kronen lilla ..... sativa
   " gul 5.
5. Hvidfiltet strandplante ..... marina
   Næsten glat indlandsplante prostrata
6. Bælgen linseformet, 10-17mm bred, uden torne ..... orbicularis
   " ikke linseformet, mest med torne 7.
7. Fodfligene helrandede eller med 1-2 svage tænder ..... minima
   " tandede til fligede 8.
8. Kølribben furet. Bladene næsten altid med en sort plet ... arabica
   " ikke furet. Bladene uden sort plet 9.
9. Bælgen i en åben skrue, rager ud af bægeret, når kronen falder af polymorpha
   Bælgen i en tæt skrue, indesluttet i bægeret, når kronen falder rigidula

M. prostrata Jacq. Udstrakt sneglebælg. 15-25cm. Småbladene smalt kileformede, 9x2mm. Kronen 4-5mm. Bælgen 3-4mm bred, hængende, uden torne, med 2-3 vindinger, uden midterhulrum. IV-VIII. Sj.

M. orbicularis (L.) Bartal. Skivesneglebælg. 20-90cm. Fligede fodfliger. Kronen 2-5mm. Bælgen med 4-6 vindinger, glat eller lidt kirtlet.Spr

M. marina L. Strandsneglebælg. 20-50cm. Liggende, forveddet forneden. Næsten hovedformede klaser med 5-12 blomster. Bælgen 5-7mm bred, kortornet. V-VI. Sj. langs kysten.

M. rigidula (L.) All. Krogsneglebælg. Bælgen tæt kirteldunet, tværårerne stærkt krummede. Småbladene 5-8mm. Tornene krumme. V-VI. Spredt.

M. arabica (L.) Hudson Pletsneglebælg. Bælgen 5-6mm. Kanten med 3 furer. Tornene dybt furede. IV-VI. Sj.

M. polymorpha L. (M. hispida) Foranderlig sneglebælg. Bælgen 4-8(10) mm, med tydelige randribber, så kanten bliver 3-kølet. Tværårerne fremtrædende og stærkt sammenløbende. V-VII. Sj.

M. minima (L.) Bartal. Liden sneglebælg. Planten spredt håret. Bælgen også håret og noget kirtlet. IV-VII. Alm.

Medicago lupulina L. Humlesneglebælg. V-IX. Alm.

M. sativa L. Lucerne. V-X. Alm. dyrket og forvildet.

M. falcata L. Seglsneglebælg. V-X. Alm.

Trifolium. Kløver.

1. Kronen gul ..... 2.
" rød, hvid eller gullighvid 8.
2. Øverste blade næsten omdsatte. Visne kroner kastanjebrune ..... 3.
Alle blade spredte. Visne kroner lysere brune 4.
3. Hovedet først æg-, senere valseformet. Stift opret ..... spadiceum
" " rundet, senere ægformet. Liggende/opstigende badium
4. Blomsten over 4mm. Mest over 20 blomster i hovedet. Fanen furet 5.
" 2-3,5mm. Hovedet med 1-5(25) blomster. Fanen næppe furet 7.
5. Midtersmåbladet meget længere stilket end sidesmåbladene campestre
" højst lidt længere stilket 6.
6. Hovedstilkene tynde, buede, meget længere end bladene ..... patens
" stift oprette, højst lidt længere end bladene aureum
7. 1-6 blomster. Deres stilke længere end bægerrøret ..... micranthum
3-15 " . " " kortere " " dubium
8. Hovederne 2-5-blomstrede ..... 9.
" flerblomstrede 10.
9. Planten glat ..... ornithopodioides
" håret subterraneum
10. Bladene 5-8-fingrede. Ellers Rødkløveragtig ..... lupinaster
" 3-koblede 11.
11. Bægeret opblæst efter blomstringen ..... 12.
" ikke opblæst i frugt 14.
12. Flerårig. M.m. håret ..... fragiferum
Enårig. Overvejende glat 13.
13. Frugtbægeret glat. Fanen vender opad som normalt .... vesiculosum
" dunet til filtet. Fanen vender nedad resupinatum
14. Planten og bægeret glat ..... 15.
Bægeret håret, oftest på tænderne 22.
15. Hovederne siddende ..... suffocatum
" stilkede 16.
16. Flerårig ..... 17.
Enårig 19.
17. Bægertænderne adskilte af butte bugter ..... hybridum
" " af smalle, spidse bugter 18.
18. Stænglerne krybende og rodslående ..... repens
" ikke rodslående pallescens
19. Småbladenes og fodfligenes ribber ender i kirteltænder strictum
" " " " " ikke i kirtler 20.
20. Frugtstilkene kortere end bægeret. Kronen 4-5mm ..... retusum
" længere " " . " 6-11mm 21.
21. Hovedet 20-25mm bredt. Kronen 8-11mm ..... michelianum
" 10-15mm " . " 6-8mm angulatum
22. Flerårig ..... 23.
Enårig 29.

23. Klasestilken mindst så lang som bladet. Kronen mest hvidlig 24.
" kortere end det tilhørende blad eller mangler 26.
24. Kronen 20-25mm. Nederste bægertand 2 x de andre ..... pannonicum
" 7-15mm. Bægertænderne ret ens 25.
25. Kronen 10-15mm. Stænglen svagt håret til halvglat ..... ambiguum
" 7-9mm. Stænglen m.m. uldhåret montanum
26. Hovedet (2,5)3 x så langt som bredt ..... rubens
" højst 2 x så " " " 27.
27. Bægerrøret glat ..... medium
" håret 28.
28. Småbladene lancetformede. Bægeret 20-ribbet ..... alpestre
Bægeret 10-ribbet 38.
29. Hovederne siddende langs stænglen ..... 30.
" stilkede 31.
30. Småbladenes sideribber rette. Kronen lyserød ..... striatum
" " krumme. " oftest hvid scabrum
31. Hovedet forlænget ..... 32.
" m.m. rundt 35.
32. Småbladene brede, omvendt æg-kileformede ..... incarnatum
" smalle, lancet- til linjeformede 33.
33. Hovederne talrige, 1-2cm ..... arvense
" få, 2-11cm 34.
34. Kronen 10-12mm, lyserød ..... angustifolium
" 16-25mm, rødlilla purpureum
35. Bægertænderne udstående i frugt ..... 36.
" ej " " " 37.
36. Bægertænderne højst 3-ribbede ved grunden ..... echinatum
" 3-ribbede mindst til midten squamosum
37. Kronen højst lidt længere end bægeret ..... diffusum
" 2 x bægeret pallidum
38. Mellemste fodflige brat tilsmalnede i en børsteformet spids.
Kronen mest rød ..... pratense
Mellemste fodflige jævnt tilsmalnede i en grøn spids. Kronen
mest gullighvid ochroleucon

Trifolium ornithopodioides L. Spædt bukkehorn. 5-10cm. Liggende toårig med hvide eller lyserøde blomster. Bælgen længere end bægeret, med en lille spids, 6-8mm. V-VI. Spredt.

T. lupinaster L. Lupinkløver. 15-50cm. Opret flerårig med lancetformede småblade og rødkløveragtige hoveder. Mest 5 småblade. VI-VII. Sj.

T. strictum L. Rank kløver. 3-15cm. Opret eller opstigende. Småbladene linje-lancetformede. Hovederne 7-10mm. Kronen 5-6mm, lyserød, lidt længere end bægeret. V-VI. Spredt.

T. montanum L. Bjærgkløver. 15-60cm. Småbladene mest 2-4cm, lancetformede, silkehårede nedenunder, med skarpt brodspidsede tænder. Kronen ofte svagt gullighvid, gulbrun efter blomstringen. V-VIII. Alm.

T. ambiguum Bieb. 8-60cm. Udstrakt til opstigende. Småbladene 1-5cm. Hovederne 2,5-4cm, på 5-10cm lange stilke. Kronen hvid, senere rødlig.

VI-VIII. Sj. Jud.Buzau: Dl.Istriţa. Jud.Mureş: Faragau ?

Trifolium repens L. Hvidkløver. V-X. Alm. 4 underarter:
ssp. ochranthum (Maly) Nyarady: Hovederne 25-30mm brede. Kronen lyse- eller grønliggul. Fanen 3-4 x bægeret. Alpin. Spredt.
ssp. orbelicum (Vel.) Pawł: Bægeret med 6-8 ribber, hvoraf kun 6 er tydelige. Lav plante. Småbladene 6-8mm. Kronen flødefarvet. Alpin.
ssp. alpinum (Schur) Rothm.: Lav plante. Bladstilken indtil 3cm. Småbladene 5-7(9)mm. Hovedet fåblomstret, dets stilk 1-4(6)cm. Alpin. Spredt.
ssp. repens: Bladstilken 2-20cm. Småbladene 1-2,5(4)cm. Hovederne mest med 40-80 blomster, dets stilk 5-30cm. Alm.

T. pallescens Schreber Gruskløver. 8-15cm. Ligner Hvidkløver. Fanen bredt ægformet eller elliptisk (æg-lancetf. hos Hv.). Kronen smudsighvid. Visne kroner mørkebrune (lysebrune hos Hv.). VII-VIII. Spredt.

T. hybridum L. Alsikekløver. VI-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. hybridum: Stænglen hul, lidet grenet. Hovederne 20-25mm brede. Kronen 7-8mm. Tørre blade med ca. 20 par ribber.
ssp. elegans (Savi) Asch.& Gr.: Smuk kløver. Stænglen fyldt, meget grenet. Hovedet 16-19mm bredt. Kronen ca.5mm. Tørre blade med ca.40 ribbepar.

T. michelianum Savi Knudekløver. 20-65cm. Opret. Kronen 8-11mm, lyserød, ca. 2 x bægeret. Bægertænderne 3-4 x røret. VI-VII. Sj.

T. angulatum W.& K. Ærtekløver. 10-40cm. Opret. Bægeret 3-3,5mm; tænderne ca. 2 x røret. Kronen 6-8mm, rødlig. V-VII. Spredt.

T. retusum L. Svinekløver. 5-30cm. Liggende til opstigende. Hovederne 8-11mm. Bægertænderne uens, de korte nedre til sidst udspærrede. Kronen 4-5mm, hvid eller blegrød, kortere end bægeret. V-VIII. Spredt.

T. suffocatum L. Sandkløver. 1-3(5)cm. Tueformet enårig. Stængelleddene når sjældent 5mm. Småbladene 3-8mm, stilkene 1-6cm. Hovederne 5-6mm, ofte sammenflydende. Kronen 3-4mm, hvid, ca. = bægeret. IV-VI. Sj.

T. vesiculosum Savi Blærekløver. 15-50cm. Bladene næsten læderagtige, de øvre smallere. Hovederne 2-6x2-3,5cm. Bægeret med tværribber. Kronen 1,5-2 x bægeret, hvid, senere lyserød. VI-VII. Sj.

T. fragiferum L. Jordbærkløver. VI-IX. Alm.

T. resupinatum L. Omvendt kløver. 10-30cm. Liggende til opret. Blomsten drejet 180°, så fanen vender nedad. Frugtbægeret pæreformet med 2 vigende tænder. IV-VI. Spredt.

T. badium Schreber Kastanjekløver. 10-25cm. Opstigende flerårig. Hovederne op til 25mm i frugt. Blomsterstilken af bægerrørets længde. Kronen 7-9mm, gyldengul. VII-VIII. Spredt.

T. spadiceum L. Brun kløver. 20-40cm. Opret 1-2-årig. Hovederne op til 2cm i frugt. Stilkene meget kortere end bægerrøret. Kronen ca. 6mm og gyldengul. VI-VIII. Spredt.

T. patens Schreber Guldkløver. 20-50cm. Enårig. Fodfligene ægformede,

, oftest kortere end bladstilken. Kronen næsten orangegul. Blomsterne næsten siddende. Endesmåbladets stilk 0-2mm. VI-VIII. Spredt.

Trifolium aureum Pollich Humlekløver. 15-30cm. Opret. Øvre blades fodflige uden udvidet grund. Midtersmåbladet næsten siddende. Blomsterne næsten siddende, gyldengule, 6-7mm. VII-VIII. Alm.

T. campestre Schreber Gul kløver. V-X. Alm.

T. dubium Sibth. Fin kløver. VI-VII. Alm.

T. micranthum Viv. Spæd kløver. V-VII. Spredt.

T. striatum L. Stribet kløver. V-VIII. Alm.

T. arvense L. Harekløver. V-VII. 2 underarter:
ssp. arvense: Planten tæt håret. Bægerrør og -tænder tæt hårede. Alm.
ssp. gracile (Thuill.) Rothm.: Planten halvglat. Bægerrøret svagt håret med randhårede tænder. Spredt.

T. scabrum L. Ru kløver. 5-25cm. Minder om Stribet kløver, men bægertænderne stikkende og tilbagebøjede. Kronen oftest kortere end bægeret.

T. incarnatum L. Blodkløver. V-VIII. 2 underarter:
ssp. incarnatum: Kronen blodrød (sj. hvid), ca. = bægeret. Dyrket.
ssp. molinerii (Balbis) Syme: Kronen gullighvid (sj. lyserød), tydeligt længere end bægeret.

T. pratense L. Rødkløver. V-IX. Alm.

T. pallidum W.& K. Bleg kløver. 15-40cm. Ligner en enårig udgave af foregående. Kronen 10-12mm, hvidlig eller blegrød. Fodfligene brat tilsmalnede i en trådformet stak. Udstående håret. V-VII. Spredt.

T. diffusum Ehrh. Fjerkløver. 10-30cm. Som foregående, men kronen rød, 8-14mm, og med lidt smallere blade. VI-VIII. Spredt.

T. medium L. Bugtet kløver. VI-VIII. 3 underarter:
ssp. sariosiense (Hazsl.) Sim.: Bægerrøret med 13-20 ribber. Øvre 4 bægertænder indtil 2 x bægerrøret.
ssp. banaticum (Heuffel) Hendrych: 10(14) bægerribber. Øvre 4 bægertænder længere end røret.
ssp. medium: Bægerrøret med 10 ribber. Øvre 4 tænder ikke længere end bægerrøret.

T. alpestre L. Skovkløver. VI-VIII. Alm.

T. rubens L. Purpurkløver. 20-60cm. Opret og ofte glat. Bladene 4-6,5 cm, aflangt lancetformede. Hovedet valseformet, 3-7cm, rødkløveragtigt. Bægerrøret med 20 ribber, mest glat. VI-VIII. Alm.

T. angustifolium L. Smalbladet kløver. 8-20cm. Opret, tiltrykt dunet stængel. Småbladene smalt linjeformede, 2-8cm x 2-4mm. Hovedet 2-8cm, æg- til kegle-valseformet. Bægertænderne med stikkende spids. Sj.

T. purpureum Loisel. Hvidtoppet kløver. 10-30cm. Oftest opret, noget udstående håret. Småbladene lancetformede, 2-4cm. Kronen meget længere end bægeret. VI-VII. Sj.

Trifolium ochroleucon Hudson Bleggul kløver. 20-50cm. Vækst som en Bugtet kløver, men med lidt bredere blade. Hovedet 2-4cm. Nedre bægertand 1,5-3 x de andre. Kronen 15-20mm. VI-VII. Alm.

T. pannonicum Jacq. Ungarsk kløver. 20-50cm. Opret. Hovederne op til 5(8)cm. Småbladene lancetformede. Kronen gullighvid. VI-VIII. Alm.

T. echinatum Bieb. Pindsvinekløver. 10-60cm. Hovederne 8-15mm. Nederste bægertand stiv og tornagtig. Kronen lyserød eller flødefarvet, mindst 2 x bægeret, 8-12mm. VI-VII. Spredt.

T. squamosum L. (T. maritimum) Pigget kløver. 10-40cm. Bægertænderne udstående og fortykkede i frugt, tornagtige. Kronen blegrød, 5-7mm, lidt længere end bægeret. Hovedet 10-20mm. Sj.

T. subterraneum L. Ankerkløver. 3-15cm. Liggende enårig. 2-5 hvidlige blomster på 8-14mm, omgives senere af flere golde bægre. Modne hoveder tiltrykte jorden eller underjordiske. IV-VI. Sj.

Dorycnium pentaphyllum Scop. Snerrehanefod. 20-65cm. De smalle og m.m. fingerstillede blade giver planten et snerrelignende præg. 5-25 små, hvide blomster på 3-5mm med mørk køl i små, langstilkede hoveder. 2ssp:
ssp. germanicum (Gremli) Gams: Hovederne med 5-15 blomster. Blomsterstilkene mest kortere end bægerrøret. VII-VIII. Sj.
ssp. herbaceum(Vill.) Rouy: Hovederne med 12-25 blomster. Blomsterstilkene mest af bægerets længde. VI-VIII. Alm.

Lotus. Kællingetand.

1. Enårig. Bælgen 1-1,5mm bred ..... angustissimus
   Flerårig. Bælgen oftest 2-3mm bred 2.
2. Øvre småblade smalle, 4-8 x så lange som brede ..... tenuis
   " " bredere, sj. over 3 x så lange som brede 3.
3. Stænglen hul. Hovederne med 5-12 blomster. 30-80cm høj uliginosus
   " fyldt. Hovederne med 2-7 blomster. 10-30cm corniculatus

Lotus corniculatus L. Alm. kællingetand. V-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. corniculatus: Småbladene kun hårede langs randen og på undersidens ribbe.
ssp. hirsutus (Koch) Rothm.: Småbladene kort hårede på begge sider.

L. tenuis W.& K. Smalbladet kællingetand. V-VIII. Alm.

L. uliginosus Schkuhr Sumpkællingetand. VI-VIII. Sj.

L. angustissimus L. Tveblomstret kællingetand. 10-50cm. Glat eller lådden. Blomsterne 2-3 sammen, 8-9mm. Småbladene 5-8x3-5mm. VI-VIII.

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth Kantbælg. V-VII. Spredt.

Anthyllis vulneraria L. Alm. rundbælg. V-IX. Alm. 3 underarter:
ssp. alpestris Asch.& Gr.: Alle blade med 1-7 m.m. glatte småblade.
ssp. polyphylla (DC.) Nyman: Bladene hårede, nedre med 3-7, øvre med 9-15 småblade. Bægeret samt stænglens nedre del noget udstående hårede.
ssp. kerneri (Sag.) Dom.: Bladene som hos foregående, men bægeret og stænglens nedre del tiltrykt hårede.

Ornithopus perpusillus L. Liden fugleklo. Kronen 3-5mm. Støttebladene længere end blomsterne. V-VII. Sj.

O. sativus Brot. Serradel. Kronen 6-9mm. Støttebladene kortere end blomsterne. Dyrket og forvildet.

Coronilla. Kronvikke.

1. Enårig. Bladene enkle eller trekoblede ..... scorpioides
   Flerårig eller busk. Bladene finnede 2.
2. Kronen hvid eller lyserød ..... 3.
   " gul 4.
3. 7-12 par småblade, der er 3-12mm brede ..... varia
   3-5(6) par småblade, der er 1-2cm brede elegans
4. Skærmene med 5-8 blomster på 15-20mm. Busk ..... emerus
   " " 4-20 " " 6-11mm. Urt eller dværghalvbusk 5.
5. Liggende til opstigende. Skærmene med 4-8 blomster ..... vaginalis
   Opret. Skærmene med 12-20 blomster coronata

Coronilla emerus L. ssp. emeroides (Boiss.& Spr.) Hayek Perlebælg. 1-2m. 2-4 par småblade på 1-2cm. Kronbladenes negl 2-3 x bægeret. Bælgene 5-11cm med 3-12 led på 8-10mm. IV-VI. Sj.

C. vaginalis Lam. Skedekronvikke. 5-20cm. Dværghalvbusk. Fodfligene sammenvoksede til en skede på størrelse med et småblad, med hindeagtig spids. 2-6 par småblade. (Ligner som ung Hippocrepis comosa, der har mindre og frie fodflige). V-VIII. Sj.

C. coronata L. Bjærgkronvikke. 30-60cm. Urteagtig, ikke forveddet, opret. 3-6 par småblade på 1,5-3cm. Fodfligene 3-5mm, hindeagtige og affaldende. Bælgen 1,5-3cm, but 4-kantet. VI. Sj: Timpa ved Brasov.

C. varia L. Giftvikke. 20-120cm. 10-20 blomster på 10-15mm.VI-VIII.Alm

C. elegans Pancic Bredbladet giftvikke. 20-150cm. Ligner foregående, men hovedet med 6-18 blomster på 8-10mm. Bladundersiden blådugget. Spr.

C. scorpioides (L.) Koch Skorpionsvikke. 5-20cm. Bladene elliptiske, enten enkle eller med 2 små, runde sidesmåblade forneden. Bælgen skorpionhaleagtig med m.m. rette enkeltled. IV-V. Sj. Østlig.

Hippocrepis comosa L. Almindelig hestesko. 5-30cm. Liggende til opstigende, svagt forveddet, flerårig urt, der minder om Coronilla vaginalis i væksten. Skærmene 5-12-blomstrede. Ledbælgen stærkt bugtet, idet de enkelt led er hesteskoformede. IV-VI. Sj.

Hedysarum. Hanekløver. Ledbælg med 2-5 skiveformede led.

H. hedysaroides (L.) Sch.& Th. Bjærghanekløver. 10-40cm. Med bladet stængel. 4-6 par småblade. Blomsterne røde, 13-25mm. VII-VIII. Spredt.

H. grandiflorum Pallas Gul hanekløver. 20-40cm. Kun med rosetblade. 2-5 par småblade. Blomsterne gule, 18-25mm. V-VII. Jud.Constanţa: Baltageşti på Dl.Alah-Bair.

Onobrychis. Fruespejl.

1. Kronen 5-7mm. Fanen tydeligt længere end kølen ..... gracilis
" (8)10-14mm. Fanen ikke meget længere end kølen 2.
2. Bælgens hår mindst 0,5mm. Kronen hvid, evt. med røde årer alba
" " under 0,5mm. Kronen lyserød med mørkere årer 3.
3. Fanen ca. 2mm kortere end kølen ..... montana
" omtrent lig kølen 4.
4. Bægeret låddent af 0,6-0,9mm lange, m.m. udstående hår viciifolia
" med 0,3-0,4mm lange randhår arenaria

Onobrychis gracilis Besser Spinkelt fruespejl. 25-75cm. 3-8 par småblade. Bægeret glat med dunet rand. Bælgen 2,5-5mm, kort tiltrykt dunet, med tandede sider. V-VI. Sj.

O. alba (W.& K.) Desv. Hvidt fruespejl. 30-60cm. 6-10 par småblade. Bægeret halvglat til hviddunet. Bælgen 5-7mm, lådden, med tandede sider; randen med 4-6 tænder. V-VI. Sj.

O. montana DC. Bjærgfruespejl. 15-40cm. 5-8 par småblade. Bægeret svagt dunet. Bælgen 6-8mm, randtænderne 0,5-2mm. VII-VIII. Spredt.

O. arenaria (Kit.) DC. Sandfruespejl. 15-60cm. Klasen slank og linjeformet, løs før blomstringen, 1-1,5cm bred under blomstringen. Frugten 4-6mm, randen med 4-6 tænder. VI-VII. Alm.

O. viciifolia Scop. Esparsette. 30-60cm. Klasen tyk og tætblomstret før blomstringen, 1,5-2,5cm bred under blosmtringen. Bælgen 5-8mm, oftest med 6-8 tænder på indtil 1mm. VI-VIII. Alm.

OXALIDACEAE

Oxalis. Surkløver.

1. Kronbladene hvide ..... acetosella
" gule 2.
2. Stænglerne liggende og rodslående. Fodfligene ørede corniculata
" opstigende til oprette. " uden øren 3.
3. Frugtstilkene nedbøjede. Fodfligene aflange ..... dillenii
" ikke nedbøjede. Fodfligene mangler fontana

Oxalis corniculata L. Nedliggende surkløver. 5-30cm. Alle blade spredte, ofte lilla. Kronbladene mest 4-7mm. VI-IX. Forvildet.

O. dillenii Jacq. (O. stricta) Stiv surkløver. 10-30cm. Bladene mest modsatte eller i krans, grønne. Kronbladene 10-13mm. VI-IX. Sj.

O. fontana Bunge Rank surkløver. 10-30cm. Som foregående. VI-IX. Spr.

O. acetosella L. Skovsyre. IV-VI. Alm.

GERANIACEAE

Geranium. Storkenæb.

1. 1-2-årige ..... 2.
Flerårige 11.

2. Bægeret opret under blomstringen ..... 3.
" m.m. udstående 5.
3. Bladets omrids rundt. Planten skinnende og m.m. glat .... lucidum
" " femkantet 4.
4. Støvknapperne rødbrune. Kronen længere end bægeret .. robertianum
" gule. Kronen ca. = bægeret purpureum
5. Bladene 95% delte med m.m. linjeformede afsnit ..... 6.
" ca. 75% delte med brede afsnit 7.
6. Blomsterstilken 5mm, i frugt 15mm. Bægerbladene 5-6mm dissectum
" 2-4cm. Bægerbladene 9-13mm columbinum
7. Bladets omrids femkantet ..... 8.
" " rundt 9.
8. Kronbladene lyserøde. Frugtstilkene nedbøjede ..... divaricatum
" blålilla. " rette bohemicum
9. Kronbladene hele ..... rotundifolium
" kløvede 10.
10. Stængler og bladstilke ensartet korthårede ..... pusillum
" " " med korte og lange hår molle
11. Bladene med rundt omrids og butlappede ..... pyrenaicum
" " kantet omrids, oftest spidslappede 12.
12. Kronbladene 5-7mm, ca. = bægeret ..... sibiricum
" større, længere end bægeret 13.
13. Kronbladene dybt udrandede. Blomsterne enlige ..... sanguineum
" hele eller svagt udrandede. Parvise blomster 14.
14. Bægeret opret ..... macrorhizum
" udstående 15.
15. Kronbladene udstående, ofte med bølget rand, tit brunlilla phaeum
" skålformet opadbøjede, ikke brunlilla 16.
16. Blomsterstanden tættere, noget halvskærmformet, ofte over 10-blomstret ..... 17.
Blomsterstanden mere åben, ikke halvskærmformet, ofte under 10-blomstret 19.
17. Bægeret 11-15mm. Modne blomsterstilke nedbøjede ..... pratense
" 6-12mm. " " oprette 18.
18. Bladafsnittene ikke meget delte. Kronen mest rødlilla silvaticum
" stærkt delte. Kronen blålilla caeruleatum
19. Kronbladene bleglilla og mørkårede ..... asphodeloides
" uden mørkere årer 20.
20. Bægerbladene tæt tiltrykt dunede på hele fladen ..... collinum
" kun hårede på ribberne palustre

Geranium macrorhizum L. Klippestorkenæb. 20-50cm. Bladene med mest 7 fjerlappede, butte og brodspidsede afsnit. Bægeret rødligt. Kronbladene 15-17mm, blodrøde. V-VII. Spredt.

G. sanguineum L. Blodrødt storkenæb. V-VIII. Spredt.

G. pratense L. Engstorkenæb. VI-VII. Alm.

G. silvaticum L. Skovstorkenæb. VI-VIII. Alm.

Geranium caeruleatum Schur Blåt skovstorkenæb. 10-30cm. Blomsterstilkene uden kirtelhår, kun med tiltrykte hår. Kronbladene 13-18mm. VII-VIII. Spredt. M.Bucegi, M.Fagaraş, M.Paring, M.Nemira, M.Penteleu.

G. phaeum L. Bølgekronet storkenæb. V-VI. Alm.

G. asphodeloides Burm.f. Tenstorkenæb. 30-75cm. Med tenformet fortykkede rødder. Bladene med 5-7 kileformede afsnit med trespidset forkant. Bægerbladenes brod 0,5-1,25mm. Dunet frugt. IV-V. Sj. Østlig.

G. palustre L. Kærstorkenæb. VI-IX. Alm.

G. collinum Stephan Mosestorkenæb. 20-60cm. Som foregående, men stængel og bladstilke tiltrykt hårede; bladfligene ofte mere spidse. Kronbladene lysere i det. VI-VII. Spredt.

G. divaricatum Ehrh. Udspærret storkenæb. 30-60cm. Stænglerne langt stivhårede, desuden kort kirtelhårede. 3-5 rude-lancetformede, tandede bladafsnit. Kronen 5-7mm, ca. = bægeret. V-VII. Alm.

G. bohemicum L. Klæbrigt storkenæb. 20-50cm. Stænglerne med udstående uldhår og kortere, klæbrieg kirtelhår. Bægerbladene 9-12mm, indbefattet en 1mm lang stak. Kronbladene 8-9mm, mørkårede. V-VIII. Spredt.

G. sibiricum L. Sibirisk storkenæb. 30-50cm. Bladene med ca. 5 smalt rudeformede afsnit med 3-5 par dybe tænder i forreste halvdel. Kronbladene blegrosa. Blomsterne hyppigst enlige. VII-VIII. Sj.

G. pyrenaicum Burm.f. Pyrenæisk storkenæb. VII-VIII. Spredt.

G. rotundifolium L. Rundbladet storkenæb. V-VI. Spredt.

G. molle L. Blødt storkenæb. V-VIII. Spredt.

G. pusillum L. Lidet storkenæb. V-X. Alm.

G. columbinum L. Storbægret storkenæb. VI-VII. Alm.

G. dissectum L. Kløftet storkenæb. V-X. Alm.

G. lucidum L. Skinnende storkenæb. VI-VIII. Spredt.

G. robertianum L. Stinkende storkenæb. Kronens plade 6-9mm. Støvkornene orange. Frugten med 1-2 tværrynker foroven. V-IX. Alm.

G. purpureum Vill. Purpurstorkenæb. 5-20cm. Kronens plade 3-5mm. Støvkornene gule. Frugten med 4 tværrynker foroven. Spredt.

Erodium hoefftianum C.A.Meyer Låddent hejrenæb. 20-40cm. Bladene op til 6cm, trekantet-ægformede og fjerfligede, ofte med 1 par frie lapper ved grunden. Frugten tæthåret, næbbet 5-7,5cm. V-VI. Spredt.

E. ciconium (L.) L'Hér. Mellembrudt hejrenæb. 10-70cm. Bladet fjersnitdelt med smålapper mellem afsnittene. Bægeret 10-12mm, heraf en stak på 4-6mm. Kronen blå eller lilla, 7-8mm. Frugtens næb 6-10cm. V-VI. Spredt.

E. cicutarium (L.) L'Hér. Almindeligt hejrenæb. V-XI. Alm.

ZYGOPHYLLACEAE

Bladene med fodflige. Tvekønnede, regelmæssige 4-5-talsblomster med diskus. Støvdragerne mest 2 x kronbladene. Frugtknuden oversædig.

1. Tornet busk med hele blade ..... Nitraria
   Bladene delte. Urter 2.
2. Bladene spredte, uregelmæssigt fjersnitdelte ..... Peganum
   " modsatte og ligefinnede 3.
3. Flerårig. 1 par småblade. Frugten en kapsel, utornet Zygophyllum
   Enårig. 5-8 " " . " en tornet spaltefrugt Tribulus

Peganum harmala L. Hermelrude. 30-60cm. Bladafsnittene linjeformede og lidt kødede. Enlige, endestillede blomster. Linjeformede bægerblade på 7-10mm. Kronbladene hvidgrønne, 10mm. 15 støvdragere. VI-VII. Indsl.

Zygophyllum fabago L. Dobbeltblad. 60-100cm. Glat og opret. Smabladene runde til elliptiske, usymmetriske, ret kødede. Kronen hvid foroven, orange i nedre halvdel. Kapslen 20-35mm, mindst 3 x så lang som bred. VI-VII. Jud.Constanţa: Constanţa. Jud.Tulcea: Casimcea, Istria, Mihail.

Tribulus terrester L. Korstorn. 10-30cm. Liggende og dunet. Kronbladene 4-5mm. Frugten stærkt tornet, ligner et 5-talligt malteserkors. VI-IX. Alm.

Nitraria schoberi L. Salpeterrod. 50-200cm. Stærktgrenet, glat busk. Bladene omvendt lancetformede, butte og kødede. Ca. 4mm brede blomster i kvaste. Kronen grønlighvid, hætteformet i spidsen. Kapslen kødet, 10-12mm, æg-kegleformet. VII-VIII. Sj. Saltholdig jord. Jud.Buzau: Policiori, Piclele Mari, Piclele Mici.

LINACEAE

Linum. Hør.

1. Kronen gul ..... 2.
   " blå, rød eller hvid 6.
2. Enårig ..... trigynum
   Flerårig 3.
3. Bladene hårede ..... pallasianum
   " glatte 4.
4. Kvasten med (20)25-40 blomster. Rodstokken svagt grenet ... flavum
   " mest med 10-20 " . " stærkt grenet 5.
5. Golde skuds blade butte. Kronbladene 20-25mm ..... uninerve
   " " " m.m. spidse. Kronbladene mest under 20mm tauricum
6. Planten dunet ..... hirsutum
   " glat 7.
7. Alle blade modsatte. Kronbladene hvide, under 7mm .... catharticum
   I det mindste de øvre blade spredte 8.
8. Griflerne sammenvoksede næsten til spidsen ..... hologynum
   " helt eller næsten frie 9.
9. Kronen lyserød til hvidlig ..... tenuifolium
   " blå 10.
10. Bladranden ru ..... nervosum
    " jævn 11.

11. Støvfangene linjeformede. Enårig ..... usitatissimum
" hovedformede. Flerårig 12.
12. Blomsterstilkene oprette og m.m. lige ..... perenne
" nedadbøjede austriacum

Linum flavum L. Gul hør. 20-60cm. 0-få golde rosetter. Bladene kirtlede ved grunden. Bægeret 6-8mm. Kronen ca. 20mm. VI-VII. Spredt.

L. tauricum Willd. 15-40cm. Med mange golde rosetter. Ellers som foregående. V-VIII. Sj. Østlig.

L. uninerve (Rochel) Jav. Krybende hør. 20-40cm. Med mange golde rosetter. Med krybende jordstængler. De nedre blade ca. 10mm brede. IV-VII. Spredt: Jud.Harghita: Mereşti. Jud.Caraş-Severin: M.Almajului, V.Dunarii, M.Domogled. Jud.Mehedinţi: Virciorova, Gura Vaii, M.Piatra Cloşanilor. Jud.Gorj: V.Ottetului. Jud.Vilcea: M.Capaţinii (V.Chela).

L. pallasianum Schultes 10-25cm. Stængelbladene linjeformede. Stænglen m.m. tæt grådunet. Blomsterstanden ofte med 2-4 blomster. Bægerranden fint kirteltandet. Kronen 15-20mm, bleggul. VI. Murfatlar.

L. nervosum W.& K. Ribbet hør. 30-60cm. Bladene 3-6mm brede, med 3-5 ribber. Bægerbladene 7-11mm, med børsteformet spids og hindekantet, randhåret rand. Kronen 2-2,5 x bægeret. VI-VII. Spredt.

L. hologynum Rchb. Engriflet hør. 20-40cm. Bægeret 6-9mm, smalt hindekantet, med gullig midterribbe. Kronen 8-13mm. Bladene 1/2-1,5mm brede, linje-/trådformede. VIII. Sj.

L. perenne L. Flerårigt hør. 10-60cm. Bladene 1-3mm brede. Bægerbladene uens, de ydre smallere. Kronen 3-4 x bægeret. VI-VIII. 2 underarter:
ssp. perenne: Øvre blade 1-ribbede. Indre bægerblade meget butte, under 2 x så lange som brede, 1/2-1mm længere end de ydre. Alm.
ssp. extraaxillare (Kit.) Nyman: Øvre blade 3-ribbede. Indre bægerblade spidse, så lange som de ydre og 2 x så lange som brede. Alm.

L. austriacum L. Østrigsk hør. VI-VII. Alm.

L. usitatissimum L. Alm. hør. Dyrket og forvildet.

L. hirsutum L. Håret hør. 20-50cm. Bladene 4-8mm brede, m.m. aflange. Mellemste blade mest 5-ribbede. Bægeret 8-12mm. Kronen blå, ca. 2,5 x bægeret. VI-VII. Spredt.

L. trigynum L. Fin hør. 10-30cm. Opret og grenet. Bladene 1-2mm brede. Bægeret 3-4mm. Kronen 4-6mm. V-VI. Sj. Sydvestlig.

L. tenuifolium L. Smalbladet hør. 20-40cm. Opstigende flerårig med forveddet grund. Bladene linjeformede, 1/2-1mm brede, tætsiddende på de golde skud. VI-VII. Alm.

L. catharticum L. Vild hør. VI-VII. Alm.

Radiola linoides Roth Tusindfrø. VI-IX. Sj.

EUPHORBIACEAE

Mercurialis annua L. Enårig bingelurt. 10-50cm. Glat eller svagt håret, oftest opret og grenet enårig. Bladene bredt lancetformede, afrundet savtakkede, modsatte, 1,5-5cm. Mest tvebo. Oprette hanaks i de øvre bladhjørner. Hunblomsterne i nøgler i bladhjørnerne. V-X. Spredt.

M. perennis L. Skovbingelurt. Mørkegrøn flerårig. Bladene samlede foroven, 2,2-4 x så lange som brede. IV-VI. Alm.

M. ovata Sternb.& Hoppe Kratbingelurt. 20-40cm. Flerarig. Gulgrøn som tør. Bladene jævnt fordelte langs stænglen, 1,3-2,2 x så lange som brede, med en stilk på 1-2mm. IV-V. Spredt.

Euphorbia. Vortemælk.

1. Bladene modsatte ..... 2.
" spredte 7.
2. Opret. Bladene 4-radede, uden akselblade, 3-12cm ..... lathyris
Liggende til opstigende. Bladene toradede, med fodflige. Enårige 3.
3. Stænglen mest opstigende. Bladene 10-30mm ..... nutans
" liggende. Bladene 3-11mm 4.
4. Bladstilken 2-3mm. Kapslen 4-5mm ..... peplis
" 1/2-1mm. Kapslen 1-2mm 5.
5. Frøene jævne. Kapslen næsten glat ..... humifusa
" rynkede eller med tværfurer. Kapslen håret 6.
6. Kapslen 2x2mm. Frøene 1-1,5mm, uregelmæssigt rynkede .. chamaesyce
" 1-1,3x1,2-1,5mm. Frøene 0,8mm, med 3-4 tværfurer maculata
7. Kirtlerne m.m. afrundede, med udadbuet yderkant ..... 8.
" med indadbuet eller ret yderkant 18.
8. Enårig ..... 9.
Flerårig 11.
9. Kapslen jævn ..... helioscopia
" vortet 10.
10. Kapslen 2-2,5mm. Bladundersiden helt glat ..... serrulata
" 3-3,5mm. " m.m. håret platyphyllos
11. Kapslen jævn, med affaldende hår ..... villosa
" vortet 12.
12. Skærmen med over 5 stråler ..... palustris
" " 3-5 " 13.
13. Højbladene ægformet-trekantede med næsten afskåret grund ..... 14.
" ægformede til elliptiske med afrundet grund 15.
14. Stænglen stribet og kantet foroven ..... angulata
" trind dulcis
15. Kapslens vorter halvkugleformede ..... carniolica
" " længere end tykke 16.
16. Stænglen furet forneden ..... carpatica
" ikke furet forneden 17.
17. Skærmstrålerne meget længere end støttebladene ..... lingulata
" nogenlunde lig støttebladene epithymoides
18. Enårig ..... 19.
Flerårig 23.

19. Bladene brede: bredt lancetformede til næsten runde ..... 20.
" smalt lancet- til linjeformede 21.
20. Kapslen med 2 vinger på hver klap ..... peplus
" uden vinger falcata
21. Støtte- og højblade linje- til lancetformede ..... exigua
Højbladene æg-rudeformede 22.
22. Højbladene spidse. Bladene 3,5-5mm brede ..... taurinensis
" butte. " 1-3mm brede segetalis
23. Højbladene indbyrdes sammenvoksede ved grunden .... amygdaloides
" " frie 24.
24. Kapslen 4,5-7mm bred. Noget kødede planter ..... 25.
" 2-4,5mm " 26.
25. Kirtlerne med udvidede horn. Bjærgplante ..... myrsinites
Kirtlernes horn ikke udvidede. Strandplante paralias
26. Bladene håndstrengede, læderagtige og blågrønne ..... 27.
" fjerstrengede, oftest tynde, ikke blågrønne 28.
27. Bladene oftest spidse og 10-35mm lange ..... seguierana
" " butte, (10)40-75mm lange nicaeensis
28. Bladene med bredt hjærteformet-øret, omfattende grund .. agraria
Bladgrunden tilsmalnet eller halvt stængelomfattende 29.
29. Planten håret ..... salicifolia
" glat 30.
30. Bladene bredest på eller over midten ..... 31.
" " under midten 32.
31. Mellemste stængelblade mest 10-30 x 1,5-3 mm ..... cyparissias
" " " 30-60 x 3-8 mm esula
32. Mellemste stængelblade mest 6-10 x 1-2,5 cm ..... lucida
" " " 4-6 cm x 4-8 mm virgata

Euphorbia nutans Lag. Nikkende vortemælk. 15-40cm. Stærkt gaffelgrenet fra grunden. Stænglen dunet foroven som ung, ofte rødlig. Bladene 6-8mm brede, finttandede, ofte med en rødlig plet. IV-IX. Sj.

E. peplis L. Sandvortemælk. 5-20cm. Bladene lidt kødede, blågrønne, meget usymmetriske. Kapslen næsten glat. Frøene jævne. V-X. Sj.

E. humifusa Willd. Lav vortemælk. 5-15cm. M.m. blågrøn. Bladene tynde med en skæv grund, finttandede i spidsen. VI-VII. Sj.

E. chamaesyce L. Skævbladet vortemælk. 5-30cm. Bladene usymmetriske, spidsen but eller udrandet. Frøene uregelmæssigt rynkede, 1-1,5mm.
ssp. chamaesyce: Glat eller dunet. Bladene runde, ægformede, ofte helrandede og udrandede. IV-IX. Spredt.
ssp. massiliensis (DC.) Thell.: Lådden. Bladene ægformet aflange, butte, finttandede.

E. maculata L. Pletvortemælk. 5-20cm. Stænglerne dunede. Bladene med skævt afskåret grund, finttandede nær spidsen, oftest med en lilla plet midtpå. Frøene 0,8mm, med 3-4 tværfurer på hver side. VI-IX. Spr.

E. villosa W.& K. Håret vortemælk. 50-100cm. Bladene m.m. lancetformede. Planten glat eller dunet. 5-flere skærmstråler, først 3- og så tvedelte. Højbladene gullige. V-VI. Alm.

Euphorbia carpatica Woł. Karpatisk vortemælk. 30-120cm. Nær foregående. Stænglen ca. 5mm tyk. Højbladene ægformede. VI-VII. Sj. Jud.Maremureş: Baia Mare på Dl. Rojali, Sapinţa, Runcu.

E. palustris L. Kærvortemælk (Strandvortemælk). 50-150cm. Kraftig, glat og blågrøn. Bladene 2-6cm, m.m. lancetformede. Kapslen 5-6mm.V-VI

E. epithymoides L. Flerfarvet vortemælk. 20-50cm. Ret tæt og blødt dunet. Bladene mest 30-50x11-26mm, 2-3 x så lange som brede. Kapslen med lange, slanke, ofte rødspidsede vorter. V-VI. Alm.

E. lingulata Heuffel 20-40cm. Som den foregående, men stængelbladene 3-4 x så lange som brede. Kapslen ca. 6mm.(3-4mm hos epith.) V-VI. Sj.

E. dulcis L. Knoldvortemælk. 20-50cm. Stænglen spredt håret foroven. Nedre støtteblade ægformet-elliptiske. Højbladene finttandede. Kirtlerne senere mørkt rødlilla. V-VI. Sj.

E. angulata Jacq. Kantet vortemælk. 20-50cm. Som den foregående, men bladene mindre, 2-3cm x 6-12mm. Kirtlerne gulligrøde efter blomstringen. V-VI. Spredt.

E. carniolica Jacq. Stilkvortemælk. 30-50cm. Stængelgrunden skællet. Stænglerne i små grupper. Bladene 3-5cm, med kileformet grund, helrandede. Blomsterkopperne på 5-10mm lange stilke. IV-VI. Alm.

E. platyphyllos L. Rottevortemælk. 15-80cm. Lancetformede blade med let hjærteformet grund og finttandet spids. Ofte noget lillaanløben. Mange ekstrastråler. VI-IX. Alm.

E. serrulata Thuill. (E. stricta) Hyldevortemælk. 30-50cm. Bladgrunden lidt mere hjærteformet end hos foregående. Med hyldeduft. Kapslens vorter længere end brede (halvkuglef. hos plat.). VI-VIII. Alm.

E. helioscopia L. Skærmvortemælk. IV-XI. Alm.

E. myrsinites L. Blågrøn vortemælk. 20-30cm. Liggende til opstigende. Bladene tykke og kødede. Svøbet med oprette, trekantede lapper mellem kirtlerne. Kapslen trekantet. Kirtlerne med udvidede horn. VI-VII. Sj.

E. lathyris L. Korsvortemælk. 20-100cm. Glat og blågrøn, opret toårig. Bladene lancetformede, de nedre smalt trekantede. 2-4 skærmstråler. Kirtlerne med kølleformede horn. V-VII. Dyrket og forvildet.

E. exigua L. Liden vortemælk. V-XI. Alm.

E. falcata L. Seglvortemælk. 8-30cm. Bladene bleggrønne, de nedre kileformede med afskåret spids, de øvre lancet- til omvendt ægformede. Frøene med 5-6 tværfurer. VI-X. Spredt.

E. peplus L. Gaffelvortemælk. VI-IX. Alm.

E. taurinensis All. Udrandet vortemælk. 10-30cm. Bladene ofte med udrandet spids. Mest 4 skærmstråler. Kirtlerne gule med lyserøde horn. Frøene gråhvide, ret dybt grubede. VI-VIII. Sj.

E. segetalis L. Markvortemælk. 10-35cm. Øvre højblade trekantet rudeformede til tværstillet ægformede. Nedre stængelblade linjeformede,

smallere end de øvre. VI-VII. Sj. indslæbt.

Euphorbia nicaeensis All. Fransk vortemælk. 20-50cm. Glat. Bladene 3-strengede, næsten helrandede. Mest 7-18 skærmstråler. Højbladene afrundet trekantede. Kirtlerne cocktailpølseformede. V-VIII. Spredt. 2 ssp.:
ssp. nicaeensis: (3-)9-18 skærmstråler. Kapslen 3,5-4,5mm.
ssp. glareosa (Pallas) A.R.Sm.: (3-)7-8 skærmstråler. Kapslen 3mm.

E. seguierana Necker Steppevortemælk. 20-50cm. Bladene lancetformede, brodspidsede. 6-15 skærmstråler; 0-få ekstrastråler. Kirtlerne cocktailpølseformede. Alm.

E. paralias L. Strandvortemælk. 30-60cm. Stængler og blade noget kødede. Bladene 4-25mm, de øvre tætstillede og noget taglagte. V-VII. Sj. på sandstrand.

E. agraria Bieb. Tungevortemælk. 30-90cm. Bladene 25-45x7-27mm. Højbladene trekantet-nyreformede. 8-14 skærmstråler. Kirtlerne udrandede eller med 2 korte horn. Kapslen dybt furet. VII-VIII. Alm.

E. lucida W.& K. Skinnende vortemælk. 60-130cm. Bladoversiden mørkegrøn og noget skinnende. 7-11 skærmstråler. V-VII. Spredt.

E. salicifolia Host Pilebladet vortemælk. 30-70cm. Bladene bredest under midten, mest 5-7x1-2,5cm. Skærmen mest med 8-10 stråler. Planten m.m. kirteldunet. V-VI. Alm.

E. esula L. Langbladet vortemælk. 30-120cm. 8-20 ekstraståler. Mest 8-17 skærmstråler. Bladene butte til svagt udrandede. VI-VIII. Alm.
ssp. esula: Bladene 5-10mm brede.
ssp. pinifolia (Lam.) Asch.& Gr.: Bladene 3-4mm brede. Sj.

E. virgata W.& K. Risvortemælk. 30-80cm. Ofte 2-12 ekstrastråler. Mest 5-9 skærmstråler. Bladene halvspidse til spidse. V-VII. Alm.

E. cyparissias L. Cypresvortemælk. IV-VII. Alm.

E. amygdaloides L. Skovvortemælk. 30-70cm. Opret og tæt dunet. Bladene stedsegrønne og læderagtige, 6-8cm, danner en slags roset midt på stænglen, bredest i øvre halvdel. Kapslen 5mm, glat. IV-VI. Alm.

RUTACEAE

Ruta graveolens L. Haverude. 40-60cm. Glat, blågrøn flerårig. Bladene 2-3 x fjersnitdelte med noget jordrøgsagtige afsnit, kirtelprikkede. Løs halvskærm af gule blomster med 4(5) hættespidsede, noget bølgede kronblade. 8 støvdragere, 1 griffel. VI-VIII. Dyrket og forvildet.

Haplophyllum. Skærmrude. Flerårige urter med spredte, lancetformede eller tredelte blade. Endestillede halvskærme af gule 5-talsblomster med diskus og femrummet kapsel.

H. ciliatum Griseb. (H. suaveolens) Vellugtende skærmrude. 15-30cm. Bladene hele (sj. 3-delte), 7-30x2-11mm, bliver ikke mindre opad; de øverste danner ofte et kransformet svøb. Kapslens klapper med et lille vedhæng i spidsen. VI-VII. Spredt.

Haplophyllum patavinum (L.) G.Don f. Trefliget skærmrude. 10-30cm. Nedre blade udelte, mellemste 3-delte til grunden, øvre linjeformede, hele eller delte. Kapselklapperne med et vedhæng lige under spidsen.VI-VII.Sj

Dictamnus albus L. Moses brændende busk. 50-80cm. Flerårig med askeagtige, fjersnitdelte blade. Endestillet, kort- og mørkkirtlet top med ret store, lyserøde, mørkårede 5-talsblomster. Kronbladene 2,5-4cm, spidse. 10 let opadkrummede, lange støvdragere. V-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp. albus: Kronbladene 2,5-3cm. Griflen kirtlet.
ssp. gymnostylis (Stev.): Kronbladene 3,5-4cm. Griflen glat.

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Miller) Swingle Skyrækker. Træ på 5-15m. Bladene spredte, fjerfinnede, 45-60cm, m.m. glatte. 13-25 småblade på 7-12cm, lancet- til ægformede, tilspidsede, randhårede med 2-4 tænder nær grunden med en stor kirtel under sig. V-VI. Hyppigt forvildet.

POLYGALACEAE

Polygala. Mælkurt.

1. I det mindste med nogle sidestillede klaser ..... 2.
   Alle klaser endestillede 3.
2. Vingerne tydeligt usymmetriske og opadkrummede ..... sibirica
   " m.m. symmetriske supina
3. Vingerne 9-13mm i blomst, kortere end kronrøret ..... major
   " 3-9mm " " , mindst så lange som kronrøret 4.
4. Grundbladene rosetdannende ..... 5.
   " ikke i roset 6.
5. Vingerne 3-5x1-2mm, højst så lange som frugten ..... amarella
   " 5-8,5x2-5,5mm, længere end frugten amara
6. Støttebladene ca. 2 x blomsterstilken i blomst ..... 7.
   " ca. lig eller kortere end blomsterstilken 8.
7. Støttebladene rager næppe op over blomsterknopperne .... nicaeensis
   " " op over blomsterknopperne comosa
8. Øvre blade tætstillede, større end de nedre ..... alpestris
   " " ej " , ikke større end de andre vulgaris

Polygala sibirica L. Krumvinget mælkurt. 10-20cm. Klaserne med 5-10 blomster. Vingerne 6-7x2-3mm, grønlige og fint randhårede. Kronen af vingernes længde, lyslilla eller blå. V-VIII. Sj.

P. supina Schreb. ssp. hospita (Heuffel) McNeill Stenmælkurt. 8-30cm. Mangestænglet. Klaserne med 1-3 blomster. Øvre bægerblad opblæst og længere end de 2 nedre. Blomsterne blå. IV-VI. Sj.

P. major Jacq. Stor mælkurt. 15-42cm. Bladene med krumme hår på rand og midterribbe. Kronen 3-4mm længere end vingerne, med opadbøjet kronrør. Kapselstilken 3-4mm i frugt. VII-VIII. Alm.

P. nicaeensis Risso ssp. carniolica (Kerner) Graebner Opstigende mælkurt. 10-30cm. Blomsterne mest blå. Vingerne 6-8x3,5-5mm. Ydre bægerblade 4-5mm. Øvre blade m.m. linjeformede. V-VI. Sj.

Polygala comosa Schkuhr Topmælkurt. 7-20(40)cm. Nedre blade bredere, ofte væk under blomstringen, øvre smallere. Klasen med 15-50, mest lyserøde blomster. Vingerne 4-6(8)mm. V-VIII. Alm.

P. vulgaris L. Almindelig mælkurt. V-VIII. Alm.

P. alpestris Rchb. Bjærgmælkurt. 7-15cm. Fåstænglet. Klaserne med 5-20 blå eller hvide blomster. Vingerne 4-6,5mm, kronen ca. lige så lang. Sj

P. amara L. Bredbladet mælkurt. Blomsterne mest stærkt blå. Stængelbladene bredest på midten, m.m. spidse. 5-20cm. På kalk. V-VI. Alm. 2 ssp.:
ssp. amara: Vingerne 6-8,5x3,5-5,5mm, bredt elliptiske. Kronen ca. af vingernes længde.
ssp. brachyptera (Chodat) Hay.: Vingerne 4,8-6,5x2-4,5mm. Kronen kortere end vingerne.

P. amarella Cr. Bitter-mælkurt. 5-20cm. Blomsterne mest blegblå. Stængelbladene bredest i forreste tredjedel, m.m. butte. IV-VI. Alm.

ANACARDIACEAE

Rhus typhina L. Hjortetakstræ. Dyrket og forvildet. VI-VII.

Cotinus coggygria Scop. Parykbusk. 1-5m. Glat busk med spredte, bredt elliptiske, 3-6cm lange, helrandede, lyskantede blade. Tætte endestillede, grønlighvide toppe, hvis grene bliver langhårede i frugt. Selve frugten 3-4mm, hjærteformet. V-VI. Spredt.

ACERACEAE

Acer. Løn.

1. Bladene fjersnitdelte med 3-5(7) småblade ..... negundo
" hele eller lappede 2.
2. Bladene ulappede (sj. svagt 3-lappede) ..... tataricum
" 3-7-lappede 3.
3. Bladene læderagtige, med 3 helrandede lapper ..... monspessulanum
" tynde med tandede bladlapper 4.
4. Bladene mest 4-7cm, randhårede ..... campestre
" 10-15cm, ikke randhårede 5.
5. Bladundersiden friskgrøn. Bladet tilspidset tandet ... platanoides
" blågrøn. Bladlapperne takkede pseudoplatanus

Acer platanoides L. Spidsløn. IV-V. Alm.

A. campestre L. Navr. V. 2 underarter:
ssp. campestre: Bladene med 5 tandede lapper. Alm.
ssp. marsicum (Guss.) Hay.: Bladene med 3 svagt tandede lapper. Spredt.

A. tataricum L. Sortløn. 3-10m. Bladene minder mest om Småbladet ælms eller Vortebirks, 6-9x2-4cm, glatte, randen uregelmæssigt indskåret - dobbelt savtakket; sjældnere svagt 3-lappede. V-VI. Alm.

A. pseudoplatanus L. Ær. IV-V. Alm.

A. monspessulanum L. Trelappet løn. 1-10m. Bladet 3-8cm, skinnende ovenpå, noget grågrønt nedenunder, langstilket. IV-V. Sj. Sydvestlig.

Acer negundo L. Askebladet løn. 3-20cm. Bladene fjersnitdelte med ægformede, langt tilspidsede, groft og lavt tandede småblade. Unge kviste noget blåduggede, grønne gennem flere år. IV-V. Dyrket og forvild.

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus hippocastanum L. Hestekastanje. IV-V. Dyrket og forvildet.

BALSAMINACEAE

Impatiens noli-tangere L. Alm. springfrø. VII-VIII. Alm.

I. parviflora DC. Småblomstret springfrø. Dyrket og forvildet.

I. glandulifera Royle Kæmpespringfrø. Dyrket og forvildet.

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L. Kristtorn. V-VI. Sj. Jud.Arad: Zimbru.

CELASTRACEAE

Euonymus. Benved.

1. Grenene udstrakte/opstigende. Bladene m.m. linjeformede ... nanus
" oprette. Bladene ægformede til elliptiske 2.
2. Kvistene halvtrinde, ru af mørkebrune korkvorter ..... verrucosus
" m.m. firkantede, uden korkvorter 3.
3. Bladene mest 3-8cm. Knopperne 2-4mm, ægformede, spidse europaeus
" " 8-16cm. " 7-12mm, tenformede latifolius

Euonymus europaeus L. Alm. benved. V. Alm.

E. latifolius (L.) Miller Bredbladet benved. 2-4m. Kvistene mindre tydeligt 4-kantede end hos europaeus. 5-tallige blomster. Frøkappen rød. V-VI. Spredt.

E. verrucosus Scop. Vortet benved. 1-3m. Bladene mest 3-5cm. 4-tallige blomster. Brunlig krone. Sorte frø, delvist frie af frøkappen.V-VI.

E. nanus Bieb. Dværgbenved. 20-200cm. Glat og m.m. stedsegrøn med 4-kantede kviste. Bladene indtil 35x7mm. Kvastene 1-blomstrede. 4-tallige blomster. V-VII. Spredt.

STAPHYLEACEAE

Staphylea pinnata L. Blærenød. 1-4m. Busk med hyldeagtige, fjersnitdelte blade med oftest 5 glatte, savtakkede og spidse småblade. Bladene modsatte. Kendelig på de 2,5-4cm lange, hængende, tohornede, opblæste, lysegrønne frugter. Klaser af 5-tallige blomster. V-VI. Spredt.

BUXACEAE

Buxus sempervirens L. Buksbom. IV-VI. Dyrket og lidt forvildet.

RHAMNACEAE

Paliurus spina-christi Miller Skjoldhat. 1-4m. Busk med tornformede fodflige. Kvistene fintdunede, zigzagbøjede. Bladene 2-4cm, ægformede og toradede. Topformet frugt på 7-8mm med en bred, bølget vinge, så

den bliver 18-30mm bred. V-VIII. Sj.

Ziziphus jujuba Miller Brystbær. 1-8m. Zigzagformede, glatte kviste med tornede fodflige og spredte, aflange, fint kirtelsavtakkede blade på 2-5,5cm. Frugten 1,5-3cm, aflang, mørkt rødlig eller næsten sort. IV-V.

Rhamnus catharticus L. Korsved. V-VII. Alm.

R. saxatilis Jacq. ssp. tinctorius (W.& K.) Nyman Klippevrietorn. -1,5m Mest opret. Unge kviste dunede. Bladene 2-5cm, tykke, spidse, 3-6 x stilken; denne ikke meget længere end fodfligene. IV-VI. Spredt.

Frangula alnus Miller Tørst. V-VII. Alm.

VITACEAE

Vitis vinifera L. Vinranke. V-VI. 2 underarter:
ssp. silvestris (Gmelin) Hegi: Tvebo. Druen ca. 6mm. Kærnerne m.m. runde. Den vilde form. Spredt.
ssp. vinifera: Blomsterne tvekønnede. Druen 6-22mm. Kærnerne pæreformede. Dyrket.

Parthenocissus inserta (A.Kerner) Fritsch Alm. vildvin. 10-30m. Bladene 5-7-fingrede. Slyngtrådene med 3-5 grene, uden hæfteskiver. Bladundersiden skinnende. VI-VIII. Dyrket og forvildet.

TILIACEAE

Tilia. Lind.

1. Bladundersiden hvidfiltet ..... tomentosa
" ikke filtet 2.
2. Bladtænderne brodspidsede ..... rubra
" ikke brodspidsede 3.
3. Årsskud og bladstilke hårede ..... platyphyllos
" " " glatte 4.
4. Bladundersiden med hvidligthårede ribbevinkler ..... vulgaris
" " rusthårede ribbevinkler 5.
5. Bladoversiden skinnende mørkegrøn ..... euchlora
" mat og friskgrøn cordata

Tilia tomentosa Moench Sølvlind. -30m. VI. Alm.

T. platyphyllos Scop. Storbladet lind. VI-VII. Spredt. 3 underarter:
ssp. cordifolia (Besser) Schneider: Bladene dunede på begge sider. Unge kviste dunede.
ssp. platyphyllos: Bladoversiden glat. Undersiden med dunet midterribbe, undertiden også på sideribberne.
ssp. pseudorubra Schneider: Bladoversiden glat. Undersiden glat, højst med ganske svagt dunet midterribbe.

T. rubra DC. Skævbladet lind. Unge kviste dunede. Bladene svagt dunede på undersidens ribber. Plantet.

T. cordata Miller Småbladet lind. VI-VII. Alm.

Tilia vulgaris Hayne Parklind. Spredt som vild, ellers plantet.

T. euchlora C.Koch Glansbladet lind. Plantet.

MALVACEAE

1. Intet yderbæger. Kronen gul ..... Abutilon
   Med yderbæger 2.
2. Frugten en kapsel. Kronen gul ..... 3.
   " " spaltefrugt. Kronen rød eller hvidlig 5.
3. Yderbægerbladene bredt ægformede til trekantede ..... Gossypium
   " linjeformede 4.
4. Kapslen forlænget. Bægeret rørformet og affaldende .. Abelmoschus
   " ikke forlænget. Bægeret ikke rørformet Hibiscus
5. 2-3 yderbægerblade ..... 6.
   5-flere yderbægerblade 7.
6. Yderbægerbladene sammenvoksede ved grunden ..... Lavatera
   " indbyrdes frie Malva
7. Støvdragerrøret trindt. Kronbladene 1,5-3cm ..... Althaea
   " 5-kantet. Kronbladene 3-5cm Alcea

Malva. Katost.

1. Stængelbladene dybt fligede ..... 2.
   " lappede 3.
2. Stænglen uden stjærnehår. Yderbægerbladene lancetformede moschata
   " med " " ægformede alcea
3. Kronen 3-4 x så lang som bægeret, rød ..... silvestris
   " 1-2 x " " " " 4.
4. Blomsterstilkene meget korte. Stift opret stængel .. verticillata
   " længere. Stænglen udstrakt eller opstigende 5.
5. Kronbladene 10mm, ca. 2 x bægeret, dybt udrandede ..... neglecta
   " 4-5mm, ca. = " , svagt " pusilla

Malva alcea L. Rosenkatost. V-IX. Dyrket og forvildet.

M. moschata L. Moskuskatost. VI-IX. Dyrket og forvildet.

M. silvestris L. Alm. katost. V-X. Alm.

M. pusilla Sm. Liden katost. VII-IX. Alm.

M. neglecta Wallr. Rundbladet katost. VI-IX. Alm.

M. verticillata L. Kranskatost. 1-2m. Toårig. Frugtstilken under 10 mm, højst 2 x bægeret. Frugtbægeret ofte stærkt fortykket. Frugtens yderflade svagt stribet. Kronen ca. = bægeret. VI-IX. Dyrket og forv.

Lavatera thuringiaca L. Poppelrose. 50-100cm. Planten stjærnehårsfiltet opadtil. De nedre blade svagt 5-7-lappede, de øvre 3-lappede med forlænget midterlap. Kronbladene 3-4,5cm, lyserøde. VII-X. Alm.

Althaea hirsuta L. Håret stokrose. 10-25cm. Opstigende eller liggende, håret og stjærnehåret enårig. Nedre blade runde, øvre smalt 3-5-fligede. Kronen 15mm, lyserød. Bægeret 13mm. V-VII. Spredt.

Althaea cannabina L. Hampestokrose. 80-180cm. Stjærnedunet flerårig. Bladene meget dybt hånddelte, med 3-5 savtakkede, lancet- eller linjeformede flige. Kronbladene 15-30mm, lyserøde. VII-IX. Alm.

A. officinalis L. Lægestokrose. 50-200cm. Tæt gråt stjærnedunet flerårig. Bladene trekantet-ægformede, m.m. lappede, 6-10cm. Kronbladene 15-20mm. Bægerbladene bøjede ind over frugten. VII-IX. Alm. 2 ssp.:
ssp. officinalis: Bladene hele eller indtil 1/2 lappede.
ssp. taurinensis (DC.) Backer: Bladene dybt 5-delte. Spredt.

Alcea rosea L. Havestokrose. 1-2,5m. Stænglen svagt stivhåret eller glat som moden. Kronbladene mest bredere end lange. Yderbægeret 1/2-2/3 x bægerbladene. VI-X. Dyrket og forvildet.

A. pallida (Willd.) W.& K. Bleg stokrose. 30-120cm. Stænglen vedvarende stjærnefiltet. Kronbladene længere end brede, lyserøde med gullig grund. Yderbægeret lig eller lidt kortere end bægeret. VII-IX. Alm.

Abutilon theophrasti Med. Kinajute. 50-100cm. Opret enårig med hjærteformede blade på 8-15cm. Blomsterne i kvaste i bladhjørnerne. Delfrugterne dunede, hver med to horn. Kronbladene 7-13mm. VI-IX. Spredt.

Gossypium herbaceum L. 1-1,5m. Kronen gul med lilla negl. Støvtrådene 1-2mm, m.m. ens. Kapslen 2-3,5cm, kugleformet. VII-IX. Indisk bomuld.

G. hirsutum L. Langhåret bomuld. 30-120cm. Kronen helt gul. Støvtrådene 4-6mm, uens. Kapslen 4-6cm, ægformet. VII-IX. Dyrket.

Hibiscus trionum L. Timeviser. 20-40cm. Opstigende enårig. Stænglerne ru af grove knuder. Bladene dybt delte med 3(5) fjerlappede afsnit. Kronbladene 15-20mm, lysegule med sortlilla grund. VI-IX. Alm.

Abelmoschus esculentus (L.) Moench Desmerkatost. 50-100cm. M.m. stivhåret enårig. Bladene m.m. runde, med 5-7 tandede lapper. Kronbladene klart gule med mørklilla grund. Kapslen 6-25cm. VI-VII. Dyrket & forv.

THYMELAEACEAE

Spredte, helrandede blade. 4-tallige blomster med enkelt farvet blomster med rørformet underdel og 4 lapper foroven.

Daphne. Kælderhals. Mindre buske.

1. Løvfældende og tynde blade ..... mezereum
   Stedsegrønne og læderagtige blade 2.
2. Blomsterne på korte sideskud. Bladene mest 8-13cm ..... laureola
   " endestillede. Bladene indtil 6cm lange 3.
3. Blomsterne flødefarvede, 10-15 sammen. Bladene 3-6cm .. blagayana
   " lyserøde, 6-10(20) " . " 10-18mm cneorum

Daphne mezereum L. Pebertræ. II-III. Alm.

D. laureola L. Skovlavrbær. 60-120cm. Bladene omvendt lancetformede, skinnende. Blomsterne gulgrønne og glatte. III-IV. Sj.

D. blagayana Freyer Kongepebertræ. 15-35cm. Grenene mørkt rødlilla. Bladene omvendt ægformede, skinnende mørkegrønne. Blomsterne vellugtende, røret 12-16mm, tænderne 4-6mm. IV-V. Sj.

Daphne cneorum L. Stenkælderhals. 10-30cm. Bladene 3-5mm brede. Blosteret mest håret. 10-16mm. IV-VIII. Spredt.

Thyemlaea passerina (L.) Cosson & Germ. Enårig spurvetunge. 10-40cm. Opret enårig urt med få grene og linjeformede blade på 8-12x1mm, der er jævnt fordelte. Blomsterne 1-3 sammen i bladhjørnerne, 2-3mm lange, dunede og af form som Dværgløvefods. VI-VII. Alm.

ELAEAGNACEAE

Hippophae rhamnoides L. Havtorn. IV-V. Spredt.

Elaeagnus angustifolia L. Smalbladet sølvblad. 2-7m. Grenene dækkede af sølvskæl, ofte noget tornede. Bladene 4-8x1-2,5cm, med grøn overs og sølvskællet underside. 1-3 gule, 8-10mm lange blomster i bladhjørnerne. Frugten 1-2cm, gul og sølvskællet. VI. Dyrket og forvildet.

GUTTIFERAE

Hypericum. Perikon.

1. Planten dunet ..... hirsutum
" glat 2.
2. Bægerbladenes rand uden sorte kirtler ..... 3.
" " med " " 6.
3. 15-20 støvdragere. Planten liggende til opstigende ..... humifusum
30-100 " . " m.m. opret 4.
4. Stænglen med 2 lister ..... perforatum
" 4-kantet til 4-vinget 5.
5. Bægerbladene butte. Stænglen ikke vinget ..... maculatum
" spidse. " vinget tetrapterum
6. Kronbladene 4-6mm. Planten liggende til opstigende ..... humifusum
" 10-17mm 7.
7. Bægerbladenes kirtelfrynser ca. 1/2 x bægerbladenes bredde ..... 8.
" " meget kortere 10.
8. Kronbladene uden sorte prikker eller striber ..... montanum
" med " " " " 9.
9. Kronbladene kun sortprikkede langs randen ..... rochelii
" sortprikkede overalt rumeliacum
10. Med golde grene fra bladhjørnerne ..... elegans
Uden grene fra bladhjørnerne 11.
11. Bladoverfladen med mange sorte eller klare kirtelprikker umbellatum
Bladene kun sortkirtlede langs randen richeri

Hypericum hirsutum L. Lådden perikon. VI-VIII. Alm.

H. montanum L. Bjærgperikon. VII-VIII. Spredt.

H. umbellatum A.Kerner Skærmperikon. 25-65cm. Bladene 15-40mm, tydeligt netårede. Bæger og krone med sorte prikker og streger over det hele. Kapslen uden sorte blærer. VII. Jud.Alba: Vidra, Abrud på M.Vulcan.

H. richeri Vill. Alpeperikon. 10-50cm. Bladene 10-55mm. Kapslen med mange sorte blærer. Ellers som foregående. VII-VIII. Alm. 2 underarter: ssp. grisebachii (Boiss.) Nyman: Kronbladene 1,5-2,5cm, kort frynsede.

ssp. transsilvanicum (Cel.): Kronbladene ca. 1,5cm, helrandede.

Hypericum rochelii Griseb. & Schenk Frynseperikon. 15-35cm. Bladene 2,5-5cm, trekantet-lancetformede til linjeformede. Kapslen med mange orange blærer. VII-VIII. Sj.

H. rumeliacum Boiss. Kalkperikon. 5-40cm. Bladene 6-35mm, siddende til kortstilkede, de øverste undertiden kirtelfrynsede. VI-VII. Jud.Dolj.

H. humifusum L. Dværgperikon. VII-IX. Spredt.

H. tetrapterum Fr. Vinget perikon. VII-VIII. Spredt.

H. maculatum Cr. Kantet perikon. VII-IX. Alm.

H. perforatum L. Prikbladet perikon. VI-IX. Alm.

H. elegans Stephan Lancetbladet perikon. 15-45cm. Bladene m.m. lancetformede, med lidt omrullet rand og flere klare kirtelprikker. Kronen kun med randprikker. Stænglen med 2 lister foroven. VI-VII. Spredt.

VIOLACEAE

Viola. Viol.

1. De to sidestillede kronblade opadrettede (Stedmoderblomster) ... 2.
   " " " " nedadrettede 10.
2. Alle blade nyreformede, bredere end lange. Kronen gul .... biflora
   " eller de øvre blade længere end brede 3.
3. Alle blade grundstillede ..... alpina
   Med bladet stængel 4.
4. Kronen 4-15mm høj. 1-2-årig ..... 5.
   " 15-35mm i højden. Mest flerårige 8.
5. Kronen af bægerets længde eller kortere ..... 6.
   " tydeligt længere end bægeret 7.
6. Kronen 10-15mm i højden ..... arvensis
   " 4-8mm i højden kitaibeliana
7. Planten stivhåret ..... hymettia
   " m.m. dunet tricolor
8. Ihvertfald de øvre blade linje- eller linje-lancetformede declinata
   Bladene elliptiske, aflange, æg- eller lancetformede 9.
9. Fodfligene fjerfligede ..... tricolor
   " højst 1/2 delte dacica
10. Med bladbærende stængler ..... 11.
    Uden " " 20.
11. Uden bladroset. Bladene ofte længere end brede ..... 12.
    Med " . " " så lange som brede 16.
12. Bladene m.m. ægformede med hjærteformet grund ..... 13.
    " æg-lancetformede, oftest uden hjærteformet grund 14.
13. Fodfligene mindst af bladstilkens længde ..... jordanii
    " oftest højst 1/2 x bladstilken canina
14. Planten glat ..... pumila
    Bladene kort dunede 15.
15. Fodfligene mindst af bladstilkens længde ..... elatior
    " kortere end bladstilken persicifolia

16. Stængler og bladstilke med en hårstribe ..... mirabilis
" " " uden " 17.
17. Bægervedhængene højst 1mm ..... 18.
" 2-3mm 19.
18. Fodfligene smalt lancetformede, langfrynsede .... reichenbachiana
" æg-lancetformede, helrandede eller tandede rupestris
19. Blomsterne blegblå eller hvidlige ..... sieheana
" blålilla med hvid eller lyslilla spore riviniana
20. Fodfligene halvt sammenvoksede med bladstilken ..... jooi
" frie 21.
21. Bægerbladene spidse ..... mirabilis
" butte 22.
22. Støvfanget skævt skiveformet .....23.
" hageformet bøjet og spidst 24.
23. Forbladene på blomsterstilkens øvre 1/3. 3-4 blade sammen epipsila
" midt på blomsterstilken. Bladene 2 sammen palustris
24. Med udløbere ..... 25.
Uden " 27.
25. Bladene rundagtige. Fodfligene bredt ægformede, kortfryns. odorata
" ægformede. Fodfligene lancetformede og langfrynsede 26.
26. Korte, tykke udløbere ..... suavis
Lange, tynde " alba
27. Kronen mørkviolet. Bladene med afstudset grund ..... ambigua
" violblå. Bladene med hjærteformet " 28.
28. Fodfligene kortfrynsede. Blomsterne lugtløse ..... hirta
" langfrynsede. " vellugtende collina

Viola odorata L. Martsviol. III-IV. Alm.

V. suavis Bieb. Sød viol. 5-10cm. Forbladene tydeligt under blomsterstilkens midte. Bladene overvintrer ikke. Udløberne underjordiske, højst ca.5cm. Kronens midte tydeligt hvid. III-IV. Alm.

V. alba Besser Hvid viol. 5-10cm. Forbladene på eller over blomsterstilkens midte. Sommerbladenes stilk med udstående hår på 0,5-1,2mm.
ssp. dehnhardtii (Ten.) Becker: Bladene glatte til svagt hårede, med oftest konveks rand. Blomsterne blålilla. Kapslen m.m. glat. Sj.
ssp. alba: Bladene mest hårede, med ret eller lidt indadbuet rand. Blomsterne mest hvide. Kapslen håret. Blade og kapsel lysegrønne. Gulgrøn spore. III-IV. Alm.
ssp. scotophylla (Jordan) Nyman: Som foregående, men blade og kapsel mørkegrønne. Lilla spore. Alm.

V. hirta L. Håret viol. Forbladene under blomsterstilkens midte. Sporen lilla. III-V. Alm.

V. collina Besser Bakkeviol. 5-15cm. Forbladene over blomsterstilkens midte. Sporen hvidlig. III-IV. Alm.

V. ambigua W.& K. Steppeviol. 5-10cm. Bladstilken vinget foroven. Blomsterne vellugtende. Kapslen håret. Bladene mest svagt hårede, senere glatte. Fodfligene mørkegrønne, kortfrynsede. III-IV. Alm.

Viola mirabilis L. Forskelligblomstret viol. IV-V. Alm.

V. rupestris F.W.Schmidt Sandviol. 3-8cm. Bladene helrandede eller svagt rundtakkede, butte, mest 1-2cm. Blade og stængler mest dunhårede. Frugtknuden altid, frugten oftest håret. V-VI. Spredt.

V. reichenbachiana Jordan Skovviol. IV-VI. Alm.

V. riviniana Rchb. Kratviol. V-VI. Alm.

V. sieheana W.Becker Bleg viol. 5-10cm. Fodfligene ca. 4mm brede, lidt frynsede eller kun tandede. Sporen meget tyk , hvidlig. III-V. Sj.

V. canina L. Hundeviol. V-VI. Alm. 3 underarter:
ssp. canina: Liggende/opstigende. Bladet 1,5-2 x så langt som bredt, m.m. hjærteformet. Sporen gullig.
ssp. montana (L.) Hartman: Bjærgviol. Opret, op til 40cm. Sporen hvid og ret. Bladet 2 x så langt som bredt. Alm.
ssp. schultzii (Billot) Kirschl.: Opret, op til 20cm. Sporen hvid og krum. Bladet 2 x så langt som bredt. Spredt.

V. persicifolia Schreber Rank viol. V-VI. Spredt.

V. pumila Chaix Dværgviol. 5-15cm. Bladet lancetformet, 2-3x1cm, ofte længere end stilken. Øvre fodflige længere end bladstilken. Kronen blegblå. V-VI. Spredt.

V. elatior Fr. Stor viol. 20-50cm. Opret, tætdunet foroven. Bladene lancetformede, 3-9x1-2cm. Fodfligene 2-5cm. Blomsterne blegblå, 2-2,5 cm. Sporen 2-4mm. V-VI. Alm.

V. jordanii Hanry Forskelligbladet viol. 20-40cm. Opret. Nedre blade så lange som brede, øvre trekantet-lancetformede, 2-3 x så lange som brede. Blomsterne blegblå eller hvide. III-V. Spredt.

V. palustris L. Engviol. IV-V. Sj.

V. epipsila Ledeb. Tørveviol. V-VI. Sj.

V. jooi Janka Purpurviol. 10-30cm. Bladene trekantet-ægformede med bred indskæring, glatte, 1/3-1/2 x stilken. Blomsterne 1-2,5cm, vellugtende, m.m. rødlilla. Sporen 4-6mm. IV-V. Spredt. Kalkklipper.

V. biflora L. Fjældviol. 8-20cm. Med roset- og stængelblade. Fodfligene udelte. Blomsten 1,5cm, gul med brune striber. VI-VII. Alm.

V. alpina Jacq. Østalpestedmoderblomst. 4-10cm. Bladene 1,5-3,5cm, runde til ægformede, rundtakkede og butte, glatte. Blomsterne 2-3cm, mørklilla. Sporen 3-4mm. VI-VIII. Spredt.

V. dacica Borbas Sæterstedmoderblomst. 15-35cm. Bladene 2-4cm, ægformede til elliptiske, rundtakkede. Fodfligene ca. 1/2 x bladene, skævt lancetformede. Blomsterne 2-3cm, mørklilla eller gullige. VII-VIII.Alm

V. declinata W.& K. Smalfliget stedmoderblomst. 15-40cm. Glat. Bladene 2-3cm, de nedre m.m. runde, de øvre m.m. lancetformede, kortstilkede. Fodfligene med 3-4 og 2-3 sideflige. VII-VIII. Alm. 800-2000m.

Viola tricolor L. Alm. stedmoderblomst. V-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. tricolor: Sporen 3-5mm, lidt længere end bægervedhængene. Kronen blå til lilla, sjældent helt gul.
ssp. subalpina Gaudin: Sporen 5-6mm, ca. 2 x bægervedhængene. Kronen gul eller de øvre kronblade lilla.

V. arvensis Murray Agerstedmoderblomst. IV-IX. Alm.

V. kitaibeliana Schultes Dværgstedmoderblomst. 2-10cm. De største blade med 1-2 par rundtakker. Fodfligene mest hånd formet fligede. Spredt.

V. hymettia Boiss.& Heldr. Stivhåret stedmoderblomst. 3-10cm. Bladene 1,5-2cm, rundtakkede. Fodfligene fjerfligede næsten til grunden med bladlignende endeafsnit. Blomsterne 1-1,5cm, gule/lilla. IV-V. Sj. SV.

CISTACEAE

Helianthemum. Soløje. Bladene modsatte. Alle støvdragere frugtbare.

1. Enårig ..... 2.
   Flerårig 3.
2. Blomsterstilkene udstående, længere end bægerbladene salicifolium
   " oprette, kortere end bægerbladene ledifolium
3. Bladene med fodflige ..... nummularium
   " uden " 4.
4. Bladundersiden grøn til filtet, men uden stjærnehår ... oelandicum
   " hvidt stjærnefiltet canum

Helianthemum nummularium (L.) Miller Alm. soløje. V-VII. Alm. 4ssp.:
ssp. nummularium: Bladundersiden grå/hvid-filtet. Bladene 2-5mm brede. Kronbladene 6-10(12)mm.
ssp. tomentosum (Scop.) Sch.& Th.: Bladundersiden grå/hvid-filtet. Bladene 5-15mm brede. Kronbladene (8)10-15mm.
ssp. obscurum (Celak.) Holub: Bladundersiden grøn. Bægerbladene dunede til filtede mellem ribberne. Kronbladene 8-12mm.
ssp. grandiflorum (Scop.) Sch.& Th.: Bladundersiden grøn. Bægerbladene glatte mellem ribberne. Kronbladene 10-18mm.

H. lasiocarpum Willk. (H. ledifolium p.p.) Låddenfrugtet soløje. 10-30 cm. Lådden-filtet plante. Bladundersiden grålig. Ydre bægerblade 7-8mm, indre 8-12x5mm. Kapslen 8-10mm, tæt dunet. IV-V. Sj. Sydøst.

H. salicifolium (L.) Miller Enårigt soløje. 5-25cm. Bladene omvendt lancetformede, svagt dunede. Blomsterstilkene opstigende. Kronbladene 4-9mm. Ydre bægerblade 3-4x½-1mm, indre 6-8x3-4½mm. IV-V. Sj. Sydøst..

H. oelandicum (L.) DC. Alpesoløje. 5-25cm. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. alpestre (Jacq.) Breistr.: Bladene m.m. aflange, butte. Kronbladene 7-10mm.
ssp. rupifragum (Kerner) Breistr.: Bladene lancetformede, oftest spidse. Kronbladene 5-9mm.

H. canum (L.) Baumg. Gråfiltet soløje. 10-20cm. Kronbladene 5-6mm. V-VI. Spredt.

Fumana procumbens (Dunal) Gr.& Go. Nedliggende hedesoløje. 5-30cm.

Bladene spredte, nåleformede med trekantet tværsnit, 10-18x0,5-2mm. Blomsterne enlige med krum stilk. Ydre støvdragere golde. V-VII. Sj.

TAMARICACEAE

Tamarix ramosissima Ledeb. 1-3m. Mindre træ med slanke grene, dækkede af ganske små, skælformede blade på 1,5-3,5mm. Hvide femtalsblomster i tætte, valseformede klaser på 1,5-7cm x 3-4mm. Barken rødbrun. Kronbladene 1-1,75mm. VI-VIII. Spredt.

Myricaria germanica (L.) Desv. Klåved. 60-200cm. Risformet busk. Bladene linje-lancetformede, 2-5mm, noget blågrønne, glatte, tætstillede på unge skud. Blomsterne i klaser på 4-12x1cm, 5-tallige med lyserøde kronblade på 5-6mm. Flodgrus. VI-VIII. Spredt.

FRANKENIACEAE

Frankenia. Nellikelyng. Liggende planter med hele, modsatte, oftest lyngagtige blade uden fodflige. Oftest lyserøde, noget nellikeagtige blomster med sambladet bæger.

F. pulverulenta L. Enårig nellikelyng. 5-25cm. Enårig. Bladene flade og spatelformede. Blomsterne i tætte, ensidige, korte aks. VII-VIII.Sj.

F. hirsuta L. Skærmnellikelyng. 10-30cm. Pudedannende flerårig. Bladene smalle med omrullet rand. Blomsterne i endestillede, halvskærmagtige knipper. VI-VII. Sj. På stranden. Jud.Constanța.

ELATINACEAE

Elatine. Bækarve.

1. Bladene i kranse på 3-flere blade ..... alsinastrum
" modsatte 2.
2. Blomsterne 4-tallige. Frøene ofte U- eller J-formede ..... 3.
" 3-tallige. " rette eller lidt krumme 4.
3. Bægerbladene ca. 3 x kronbladene under blomstringen .... hungarica
" lig eller kortere end kronbladene hydropiper
4. Blomsterstilken 1-10mm. 6 støvdragere ..... hexandra
" under 1,5mm. 3 støvdragere 4.
5. Blomsterne stort set siddende. Bladene 6-12x1-2mm ..... triandra
Blomsterstilken 0,5-1,5mm. Bladene 2,5-5x1-1,5mm ambigua

Elatine alsinastrum L. Kransbækarve. 2-80cm. 1-flerårig. Bladene i krans, i vand med op til 18 linjeformede blade sammen, på land med ned til 3 lancet-ægformede blade. Siddende 4-talsblomster i bladhjørnerne.

E. hydropiper L. Vandpeberbækarve. Bladene 4-8x1-3mm, stilken ofte længere end pladen. VI-IX. Sj.

E. hungarica Moesz Kortkronet bækarve. Blomsterne med en tydelig stilk på indtil 3mm. Kapslen nedtrykt firesidet. Sj.: Jud.Arad: Ineu på V. Crișului Alb, Varșand. Jud.Timiș: Timișoara la Ronaț.

E. triandra Schkuhr Trehannet bækarve. 2-15cm. VI-VII. Sj.

E. ambigua Wight Kortstilket bækarve. 1-10cm. VII-VIII. Sj. Jud.Covasna: Raci la Mestecaniș, Jud.Bihor: Oradea.

Elatine hexandra (Lapierre) DC. Sekshannet bækarve. Bladene 5-10x2-3,5 mm. VI-VII. Sj.

CUCURBITACEAE

1. Ingen slyngtråde ..... Ecballium
   Med " 2.
2. Slyngtrådene ugrenede ..... 3.
   " grenede 6.
3. Bladene hele og finttandede, bredt ægformede ..... Thladiantha
   " delte 4.
4. Blomsterne hvidgrønne. Bærret 6-10mm ..... Bryonia
   " mørkegule. Frugten mindst 2cm 5.
5. Bladene fligede ..... Citrullus
   " 3-5-lappede Cucumis
6. Blomsternes lapper ca. 5mm. 5 støvdragere. Stivhåret frugt ..... 7.
   Blomsterne store, 6-10cm brede. 3 støvdragere. Frugten jævn 8.
7. Kronen 6-fliget. Hunblomsterne i langstilkede hoveder Echinocystis
   " 5-fliget. " enlige (eller 2 sammen) Sicyos
8. Kronen hjulformet, hvid, delt til grunden ..... Lagenaria
   " klokkeformet, mørkegul, ca. 1/2 delt Cucurbita

Thladiantha dubia Bunge Burreagurk. 1-4m. Bladene 5-16cm, med dybt nyreformet grund, på undersiden med hagekrummede, burreagtigt ihængende hår. Tvebo. Blomsterne gule. VII-VIII. Dyrket og forvildet.

Ecballium elaterium (L.) Rich Æselagurk. 20-80cm. Kraftigt stivhåret flerårig med trekantet hjærteformede blade. Gule agurkeblomster på 18-20mm. Grøn, elliptisk, stivhåret frugt på 4-5cm. VII-VIII. Sj.

Bryonia alba L. Enbo galdebær. Sorte frugter. VII-VIII. Alm.

Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf. Vandmelon. 1-4m. Enårig. Bladene 8-20 x 5-15cm. Kronfligene ca. 15mm. Frugten ca. 25cm, grøn. Dyrket.

C. colocynthis (L.) Schrader Kolokvint. 30-50cm. Flerårig. Bladene 5-12x3-8cm. Kronfligene ca. 5mm. Frugten ca. 4cm, gul. Dyrket.

Cucumis sativus L. Agurk. Frugten valseformet. Dyrket.

C. melo L. Melon. Frugten kugle- eller ægformet. Dyrket.

Cucurbita ficifolia Bouché Anguriegræskar. Flerårig. Frøene sorte. Bladene med 3-5 meget afrundede lapper. Dyrket.

C. maxima Duchesne Markgræskar. 1-4m. Enårig. Frugtstilken trind, ikke udvidet opad. Blomsterne svagt duftende. VII-IX. Dyrket.

C. moschata Duchesne Moskusgræskar. 2-5m. Enårig. Frugtstilken kantet. Planten ret blødhåret. Bladene svagt lappede. Dyrket.

C. pepo L. Græskar. 2-10m. Enårig. Frugtstilken kantet. Planten stivbørstet. Bladene ofte dybt lappede. Dyrket.

Lagenaria siceraria (Molina) Standley Flaskegræskar. 1-4m. Bladene dunede, m.m. æg-hjærteformede, utydeligt 3-lappede. Dyrket.

Echinocystis lobata (Michx) Torrey & A.Gray Pigagurk. 5-8m. Næsten glat, enbo, klatrende enårig med stjærneformede blade på 7-12cm. Frugten 3-5, ægformet, med lange, bløde torne. VII-VIII. Dyrket og forvildet.

Sicyos angulatus L. Håragurk. 2-5m. Flerårig med klæbrigt dunet stængel og stjærneformet håndlappede blade. Frugten ægformet, 1,5cm, gullig, med lange, stive børster. VII-VIII. Dyrket og forvildet.

LYTHRACEAE

Lythrum. Kattehale

1. Kronbladene 5-11mm. Flerårige. Bladene mest modsatte ..... 2.
" 0-3mm. Enårige 3.
2. Stænglen helt glat. Bægertænderne af 2 længder ..... virgatum
" korthåret foroven. Bægertænderne ens salicaria
3. Bladene modsatte. Underbægeret ca. 1,5mm. Kronen 0-1mm ... portula
" spredte 4.
4. Bægertænderne m.m. ens ..... tribracteatum
" skiftevis korte og lange 5.
5. 6 støvdragere. Kronbladene 2-3mm ..... hyssopifolia
Mest 2 støvdragere. Kronbladene 1-2mm thymifolia

Lythrum salicaria L. Alm. kattehale. VI-IX. Alm.

L. virgatum L. Riskattehale. 30-100cm. Som den foregående, men helt glat. Bladene med kileformet grund, smalt lancetformede. Kronen 5-8mm. VI-IX. Spredt.

L. hyssopifolia L. Isopbladet kattehale. 5-30cm. M.m. glat. Grenene oprette eller opstigende. Mange blomster i bladhjørnerne. Kronen lyserød. Yderbægeret opret. VI-IX. Spredt.

L. thymifolia L. Lav kattehale. 5-12cm. Opret til liggende, ofte noget ru. Bladene 5-9x1-2mm. Blomsterne oprette og tiltrykte, underbægeret 3-4mm. Blomsterne mest 4-tallige. VI-IX. Sj. Østlig.

L. tribracteatum Salzm. Gaffelkattehale. 5-30cm. Opret eller liggende. Stænglen med 4 lister. Yderbægeret indadbøjet i frugt. Kronen 2-3mm. Sj.

L. portula (L.) Webb (Peplis p.) Vandportulak. IV-VI. Spredt.

Ammannia verticillata (Ard.) Lam. Dunbægret risurt. 5-20cm. Opret enårig med modsatte, siddende, omvendt lancetformede blade. Tætte nøgler i bladhjørnerne. 4-talsblomster med bredt underbæger og meget lille krone. VI-VIII. Sj. Jud.Caraş-Severin: Ostrovul Moldova Veche.

TRAPACEAE

Trapa natans L. Hornnød. Enårig vandplante med en flydebladsroset af 1-4,5cm store, rudeformede, poppelbladsagtige, stilkede blade. Stilkene ofte tenformet opsvulmede. VI-VII. Alm.

ONAGRACEAE

Circaea lutetiana L. Dunet steffensurt. Matte blade. Dunede blomsterstilke. VI-VIII. Alm.

Circaea intermedia Ehrh. Spidsbladet steffensurt. Skinnende blade på 4-8cm. Knoppernes frugtknuder med hagebørster. Blomsterne i klase.

C. alpina L. Liden steffensurt. Skinnende blade på 1,5-5,5cm. Knoppernes frugtknuder næsten glatte. Klasen halvskærmagtig under blomstringen

Oenothera erythrosepala Borbas Kæmpenatlys.

O. biennis L. Toårigt natlys. Kronen 13-30mm. Bladenes midterribbe næsten altid rød. Bægerbladsspidserne m.m. tiltrykte i knop. VI-IX. Alm.

O. parviflora L. Småblomstret natlys. 100-150cm. Kronbladene 6-12mm. Bægerbladsspidserne i knop adskilte af U-formede bugter. VI-IX. Spredt.

Ludwigia palustris (L.) Elliott Vandkryb. 3-50cm. Flerårig, krybende og rodslående sumpurt. Bladene modsatte, rudeformede, Parietaria-lignende, glatte. Blomsterne 4-tallige i bladhjørnerne, 4mm, bestående af underbæger og bæger, men uden krone. V-VIII. Spredt.

Epilobium. Dueurt.

1. Alle blade spredte ..... 2.
   I det mindste de nedre blade modsatte eller i kranse 3.
2. Bladene lancetformede, 10-25mm brede ..... angustifolium
   " linjeformede, højst 4mm " dodonaei
3. Støvfanget tydeligt 4-lappet ..... 4.
   " kølle- eller hovedformet, ikke lappet 8.
4. Stænglerne udstående dunede ..... 5.
   " tiltrykt " eller glatte 6.
5. Bladene halvt stængelomfattende. Kronen 10-16mm ..... hirsutum
   " ikke " . " 3-6mm parviflorum
6. Bladene med kileformet grund. Kronen først hvid ..... lanceolatum
   " " afrundet grund 7.
7. Bladene 3,5-8x1-4cm. Knopperne spidse. Kronen 7-12mm .... montanum
   " 1-5x0,5-1,5cm. Knopperne butte. " 6-9mm collinum
8. Bladene oftest kransstillede ..... alpestre
   " " modsatte 9.
9. Bladene helrandede eller utydeligt og fjærnt tandede ..... 10.
   " tydeligt og tæt tandede 12.
10. Bladene med omrullet rand. Udløberne bladløse ..... palustre
    " flade. Udløberne med blade på 11.
11. Frugt og frugtknude glat eller svagt kirtlet ... anagallidifolium
    " " " tæt tiltrykt, ukirtlet håret nutans
12. Blomsterstandsaksen m.m. kirtelhåret ..... 13.
    " ikke " 14.
13. Bladgrunden kileformet. Ofte med 3-10mm lang stilk ..... roseum
    " m.m. afrundet. Stilken 0,5-4mm adenocaulon
14. 10-25cm høj bjærgplante. Klasen mest 2-5-blomstret alsinifolium
    25-100cm høj. Klasen mest med over 6 blomster 15.
15. Øvre stængelblade helt uden hår, ofte lysegrønne ..... tetragonum
    " " med håret rand, mørke eller grågrønne 16.
16. Bægeret m.m. jævnt håret. Ofte med udløbere ..... obscurum
    " tættere håret forneden. Altid uden udløbere lamyi

Epilobium angustifolium L. Gederams. VI-VIII. Alm.

E. dodonaei Vill. Sandgederams. 50-100cm. Opret. Bladene 2-2,5cm x 1-3,5mm, grønne på begge sider, tæt tiltrykt hårede. Knopperne let nikkende før blomstringen. VII-IX. Alm.

E. hirsutum L. Lådden dueurt. VII-VIII. Alm.

E. parviflorum Schreber Dunet dueurt. VI-IX. Alm.

E. montanum L. Glat dueurt. Frugtens flader med udstående kirtelhår.

E. collinum Gmelin Bakkedueurt. 20-40cm. Frugtens flader tæt tiltrykt hårede, men uden kirtelhår. VI-IX. Alm.

E. lanceolatum Seb.& Mauri Lancetbladet dueurt. 20-50cm. Bladet 3-5cm x 8-15mm, stilken 3-10mm. Frugtens flader med udstående kirtelhår. Kronen først hvid, senere lyserød. V-IX. Spredt.

E. alpestre (Jacq.) Krocker Kransdueurt. 30-80cm. I det mindste de nedre blade i kranse på 3(4), oversiden tydeligt skinnende. Stænglen med 2 lister. VII-IX. Spredt.

E. tetragonum L. Kantet dueurt. VII-IX.

E. lamyi F.W.Schultz Rank dueurt. VII-IX.

E. obscurum Schreber Risdueurt. VI-IX. Spredt.

E. roseum Schreber Rosendueurt. VII-IX. Alm.

E. palustre L. Kærdueurt. VI-IX. Spredt.

E. nutans F.W.Schmidt Nikkende dueurt. 10-20cm. Stænglerne mest enlige. Bladene m.m. siddende. Stænglen foroven med få kirtelhår og krummede hår. Bjærgvæld; kalksky. VII-IX. Spredt.

E. anagallidifolium Lam. Dværgdueurt. 4-10cm. Ofte flere stængler sammen. Bladene kortstilkede, 1-2mm. Stænglen foroven højst med enkelte hår. VII-IX. Spredt.

E. alsinifolium Vill. Kildedueurt. 10-25cm. Med underjordiske, 4-10cm lange, hvide udløbere. Kronen 7-10mm. Frugten svagt kirtelhåret eller næsten glat. VII-IX. Spredt.

E. adenocaulon Hausskn. Kirteldueurt. VI-VIII. Spredt.

HALORAGACEAE

Myriophyllum verticillatum L. Kranstusindblad. Oftest 5 blade i kransene. Kamdelte støtteblade. VI-VIII. Alm.

M. spicatum L. Akstusindblad. 4 blade i krans. Hele støtteblade. Alm.

HIPPURIDACEAE

Hippuris vulgaris L. Hestehale. VI-VIII. Spredt.

CORNACEAE

Cornus sanguinea L. Rød kornel. V-VI. Alm.

Cornus mas L. Kirsebærkornel. 2-8m. Kvistene gulgrønne. Bladene 4-10cm med 3-5 ribbepar, oversiden lidt skinnende, undersiden mørkegrøn. Sidestillede skærme med gule blomster og mørkerøde frugter. III. Alm.

ARALIACEAE

Hedera helix L. Vedbend. IX-X. Alm.

UMBELLIFERAE

1. Bladene helrandede og ligestrengede. Gule blomster ..... Bupleurum
" rundtakkede, fligede eller snitdelte 2.
2. Bladene tornede. Blomsterne i hoveder ..... Eryngium
" ikke tornede 3.
3. Blomsterne gule ..... 4.
" hvide, lyserøde eller gullighvide 20.
4. Bladundersiden med stjærnehår. Frugten smalrandet ..... Opopanax
" uden " 5.
5. Frugtens randribber tydeligt vingede eller fortykkede ..... 6.
" " anderledes 14.
6. Frugtens randribber fortykkede ..... Malabaila
" " vingede 7.
7. Småsvøbbladene delvist sammenvoksede ..... Levisticum
" frie 8.
8. Frugtens rygribber lige så bredt vingede som randribberne Cachrys
" " u- eller smalvingede 9.
9. Bladene 1 x delte med ægformede afsnit ..... Pastinaca
" 2-4 x delte 10.
10. Mange storsvøbblade ..... 11.
0-3 " 12.
11. Frugten 3-4,5mm ..... Peucedanum alsaticum
" 6-10mm Ferulago
12. Med flere, blivende småsvøbblade ..... Peucedanum
Intet småsvøb (sj. 1-2 affaldende småsvøbblade) 13.
13. Flerårig ..... Ferula
Enårig. Anethum
14. Intet småsvøb ..... 15.
Med småsvøb 16.
15. Bladene 3-4 x delte med trådformede afsnit ..... Foeniculum
Nedre blade 1-2 x delte, øvre hele Smyrnium
16. Planten m.m. gråfiltet. Småsvøbbladene tornspidsede Echinophora
" stort set glat 17.
17. Strandplante med kødede blade ..... Crithmum
Bladene ikke kødede 18.
18. Bladfligene kileformet - omvendt-ægformede ..... Petroselinum
" linjeformede 19.
19. Frugten 7-25mm ..... Prangos
" 3-5mm Seseli
20. Frugtens randribber tydeligt vingede eller fortykkede ..... 21.
" " anderledes 33.

21. Frugtens rand fortykket ..... Tordylium
" " vinget 22.
22. Frugtens rygribber også vingede ..... 23.
" " uvingede 28.
23. Både ryg- og randribber bredvingede ..... Laserpitium
Rygribberne smalvingede 24.
24. Alle vingerne lige smalle ..... 25.
Randvingerne bredere end rygvingerne 26.
25. Bladene dunede på kanten og undersidens ribber .... Pleurospermum
" glatte Ligusticum
26. Skærmstrålerne glatte ..... Conioselinum
" dunede 27.
27. Bladfligene ca. 10mm lange ..... Selinum
" mindst 3cm lange, ægformede Angelica
28. Frugten ikke tydeligt sammentrykt ..... 29.
" stærkt sammentrykt 31.
29. Enårig. Småsvøbet nedhængende ..... Aethusa
2-flerårig. Småsvøbet ikke nedhængende 30.
30. Kronbladene med et gulligt skær ..... Silaum
" hvide Seseli
31. Frugten smalvinget med tydelig oljekanaler ..... Heracleum
" bredvinget 32.
32. Bladene 2-3 x fjersnitdelte med savtakkede, ægformede afsnit
på 5-8x3-5cm. 0-3 storsvøbblade ..... Angelica
Anderledes Peucedanum
33. Bladene håndelte ..... 34.
" ikke håndelte 35.
34. Frugten uden børster. Svøbbladene iøjnefaldende/farvede Astrantia
" med " . " små Sanicula
35. Frugten mindst 3 x så lang som bred ..... 36.
" under 3 x " " " " 40.
36. Frugtens næb mindst så langt som den frøbærende del ..... Scandix
" " meget kortere end " " " 37.
37. Frugten uden ribber bortset fra på det tydelige næb .. Anthriscus
" m.m. ribbet. Næbbet meget kort eller manglende 38.
38. Bladranden bruskagtig. 4-15 storsvøbblade ..... Falcaria
" ikke bruskagtig. 0-5 storsvøbblade 39.
39. 6-24 skærmstråler. Frugten glat ..... Chaerophyllum
1-3 " . " dunet Myrrhoides
40. Frugten tornet, stivhåret eller dunet ..... 41.
" glat 50.
41. Storsvøbbladene fjersnitdelte ..... Daucus
" hele 42.
42. Frugten tornet; tornene med udvidet grund, fordelte på ribberne 43.
" dunet til stivbørstet 46.
43. 2-5 iøjnefaldende storsvøbblade ..... 44.
0 storsvøbblade (eller -3 små og uiøjnefaldende) 45.
44. Storsvøbet mindst 1/2 x de glatte skærmstråler ..... Orlaya
" under 1/4 af de bebørstede skærmstråler Turgenia

45. 8-20 skærmstråler ..... Astrodaucus
    2-5 " Caucalis
46. Frugten med et tydeligt, glat næb ..... Anthriscus
    " uden et sådant næb 47.
47. Frugten med tydelige ribber ..... 48.
    " uden " " 49.
48. Frugten med et kort næb. Bladfligene linjeformede ... Athamantha
    " uden næb Seseli
49. Småsvøbet mangler (sj. 1-2 blade) ..... Pimpinella
    " veludviklet Torilis
50. Bladene 1-3 x trekoblede ..... 51.
    " fjersnitdelte 53.
51. Frugten bredest forneden. Smalle ydre afsnit ..... Physospermum
    " " midtpå. Brede, ydre afsnit 52.
52. Bladafsnittene savtakkede og spidse ..... Aegopodium
    " rundtakkede, bredt afrundede fortil Laser
53. Frugten næsten 2 x så bred som lang, som 2 kugler ..... Bifora
    " ikke meget bredere end lang 54.
54. Frugten med iøjnefaldende bægerspidser ..... 55.
    " uden eller med små " 57.
55. Frugten forlænget ..... Oenanthe
    " m.m. kugleformet 56.
56. Enårig. Bladfligene 1/2-1mm brede ..... Coriandrum
    Flerårig. Bladfligene 5-15mm brede Cicuta
57. Vand- eller sumpplanter. Bladene m.m. 1 x delte ..... 58.
    Tørbundsplanter 60.
58. Ingen (sj. 1-2) storsvøbblade. 4-12 skærmstråler ..... Apium
    Med storsvøbblade 59.
59. Over 20 skærmstråler. Bladene enkelt savtakkede ..... Sium
    Under 20 " . " dobbelt " Berula
60. Frugtens ribber bølgede. Toårig med blådugget stængel ... Conium
    " " ikke bølgede 61.
61. Ihvertfald de nedre blade 1 x delte med m.m. ægformede afsnit 62.
    Bladene flere x delte med smalle afsnit 63.
62. Mest med stor- og småsvøbblade. 3-6 skærmstråler ..... Sison
    M.m. uden svøbblade. 5-25 skærmstråler Pimpinella
63. Tvebo plante. Stængelgrunden stærkt trævlet ..... Trinia
    Med tvekønnede blomster 64.
64. Stængelbladenes skeder med frynsede flige ved grunden .... Carum
    " " uden flige ved grunden 65.
65. Bladfligene 0,3-0,5mm tykke. 3-5 storsvøbblade ..... Palimbia
    " mindst 0,5mm brede Seseli + Cnidium

Sanicula europaea L. Sanikel. V-VII. Alm.

Astrantia major L. Stor stjærneskærm. VI-VIII. Alm.

Eryngium maritimum L. Strandmandstro. VI-IX. Sj. langs kysten.

E. planum L. Havemandstro. 70-100cm. Bladene udelte, ægformet-aflange, savtakkede, 5-10x3-6cm. Planten stålblå foroven. Svøbbladene linje-lancetformede med 1-4 par torne. VII-VIII. Alm.

Eryngium campestre L. Bjærgmandstro. 20-60cm. Grundbladene bredt fjersnitdelte. Hovederne mest grågrønne, med ret lange, linjeformede svøbblade med 1(2) par torne. VII-VIII. Alm.

Echinophora tenuifolia L. ssp. sibthorpiana (Guss.) Tutin Gul pigskærm. 20-50cm. Flerårig. Bladene 2-3 x delte, noget kødede. 2-5 skærmstråler. 2-5 stor- og 5 småsvøbblade. VIII-IX. Sj. Østlig.

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon Knudeskærm. 30-100cm. Enårig. Stænglen stivhåret, ofte lillaanløben, m.m. opsvulmet under knæene, glat og m.m. blådugget foroven. Bladene tæt stivhårede, 2 x delte. V-VI. Sj.

Chaerophyllum. Hulsvøb.

1. Bladene 2-3 x trekoblede med ægformede afsnit ..... aromaticum
   " 2-3 x fjersnitdelte med smalle afsnit 2.
2. Kronen tydeligt randhåret. Griflerne næsten parallelle .. hirsutum
   " ikke randhåret. Griflerne vigende 3.
3. Flerårig. Frugten 8-12mm. Griflen mindst 2 x griffelfoden aureum
   1-2-årig. " 4-7mm. " ca. lig griffelfoden 4.
4. Stænglen håret foroven. Småsvøbet randhåret ..... temulentum
   " glat " . " glat bulbosum

Chaerophyllum aromaticum L. Krydderhulsvøb. 60-150cm. Bladene skvalderkålsagtige. Stænglen forneden m.m. tæt hvidt børstehåret og ofte rødplettet. Frugten 8-15mm. VI-VIII. Alm.

C. hirsutum L. Bjærghulsvøb. 50-120cm. Bladene kørvelagtige, med bredt trekantet omrids, ofte noget stivhårede og med noget skinnende underside. Blomsterne hvide eller lyserøde. VI-VIII. Alm.

C. bulbosum L. Knoldhulsvøb. 80-180cm. Stænglen stivhåret og rødplettet forneden, glat og ofte blådugget foroven. Bladene smalfligede. Alm.

C. aureum L. Lysfrugtet hulsvøb. 80-120cm. Stænglen kort dunet og ofte også langt stivhåret og rødplettet. Bladene gulgrønne med langspidsede endeafsnit, ellers kørvelagtige. VI-VIII. Spredt.

C. temulentum L. Alm. hulsvøb. V-VIII. Alm.

Anthriscus. Kørvel.

1. Enårig. 1-3 småsvøbblade. Frugten med veludviklet næb ..... 2.
   Flerårig. 5-8 småsvøbblade. Frugtens næb 1-2mm 3.
2. Frugten 4-5mm, tætbørstet, næbbet 2mm. Glatte skærmstråler caucalis
   " 7-10mm, næbbet 3-4mm. Tæt dunede skærmstråler cerefolium
3. Modne frugt grønlig til sortgrøn, oftest knudret ..... nemorosus
   " " sort eller mørkebrun, jævn 4.
4. Nederste hovedafsnit ca. så store som resten af bladet ... nitidus
   " " 1/2-2/3 x resten af bladet silvester

Anthriscus silvester (L.) Hoffm. Vild kørvel. Frugten 7-10mm. Alm.

A. nitidus (Wahl.) Garcke Skinnende kørvel. 40-80cm. Frugten 5-7mm. Bladet skinnende, især på undersiden. Stænglen grøn forneden, meget korthåret til næsten glat. V-VII. Alm.

Anthriscus nemorosus (Bieb.) Sprengel Lundkørvel. 40-150cm. Bladet mindre tilspidset end hos silvester. Frugtens knuder ender ofte i en krum børste. V-VII. Spredt.

A. cerefolium (L.) Hoffm. Havekørvel. IV-VI. 2 underarter:
ssp. cerefolium: Frugten glat og skinnende. Dyrket og forvildet.
ssp. trichosperma (Spreng.) Arc.: Frugten kortbørstet. Spredt.

A. caucalis Bieb. Gærdekørvel. V-VI. Spredt.

Scandix. Jomfrukam. Enårige. 1-3 skærmstråler. Kronbladene ulige store.

1. Småsvøbbladene tydeligt hindekantede. Kronbladene udrandede til butte. Midterfrugten m.m. siddende ..... australis
   Småsvøbet næppe hindekantet. Spidse kronblade 2.
2. Griflen 1-2,5mm. Næbbet 3-4 x selve frugten ..... pecten-veneris
   " 0,4-0,75mm. Næbbet 2-3 x selve frugten macrorhyncha

Scandix australis L. Udspærret jomfrukam. 10-30cm. IV-VII. Sj.

S. pecten-veneris L. Alm. jomfrukam. IV-VI. Spredt.

S. macrorhyncha C.A.Meyer IV-VI. Sydøst.

Coriandrum sativum L. Koriander. 15-50cm. Glat enårig med glinsende, smalfligede blade. Ydre kronblade forøgede. Frugten 3-5mm, m.m. kugleformet, spaltes ikke som moden. VI-VII. Dyrket og forvildet.

Bifora radians Bieb. Strålehulfrø. 15-60cm. Glat enårig med trådformede bladflige. 3-8 skærmstråler. Forstørrede ydre kronblade. Frugten 2,5-3,5x4,5-7mm, fint rynket. V-VII. Spredt.

Smyrnium perfoliatum L. Lundgylden. 30-120cm. Nedre blade 1-2 x trekoblede med ægformede afsnit; øvre æg-hjærteformede, rundtakkede og meget bredt stængelomfattende. Næsten glat toårig. IV-VI. Sj.

Pimpinella. Pimpinelle.

1. Frugt og frugtknude glatte ..... 2.
   " " " dunede 3.
2. Stænglen hul, oftest skarpkantet. Større bladafsnit 3-7cm .. major
   " oftest marvfyldt, mest trind. Afsnittene 1-2½cm saxifraga
3. Flerårig. Stængelgrunden med hvidlige, skællede bladrester tragium
   1-2-årig. Anderledes 4.
4. Frugten udstående håret. Mest over 15 skærmstråler ..... peregrina
   " tiltrykt " . 7-15 skærmstråler anisum

Pimpinella anisum L. Anis. 10-50cm. Enårig. Nederste blade nyreformede, de næste 1 x delte, de øvre 2-3 x fjersnitdelte med smalle flige. Dyrket

P. peregrina L. Hårfrugtet pimpinelle. 50-100cm. Fintdunet toårig. Nederste blade hjærteformede og takkede, de næste 1 x delte, de øvre 2 x fligede. 8-50 skærmstråler. VI-VIII. Dobrogei ?

P. tragium Vill. ssp. lithophila (Schischkin) Tutin Skællet pimpinel-

le. 10-50cm. Med tyk, skællet jordstængel. Bladene mest grundstillede, med 5-7 afsnit. 5-7 skærmstråler. VI-VIII. Sj. Østlig.

Pimpinella major (L.) Hudson Stor pimpinelle. VI-IX. Alm.

P. saxifraga L. Alm. pimpinelle. VII-IX. 2 underarter:
ssp. saxifraga: Nedre stængel- og bladstilkshår korte og rette, nedadvendte eller manglende. Grundbladenes småblade tandede, rundagtige til kort aflange. Alm.
ssp. alpestris (Sprengel) Vollm.: Planten næsten altid helt glat og skinnende. Grundbladenes småblade indtil 1/2 delte, aflange til ægformede.

Aegopodium podagraria L. Skvalderkål. V-VII. Alm.

Sium latifolium L. Bredbladet mærke. Stænglen stærkt furet. Bægerbladene tydelige. Frugten tykribbet. VI-VIII. Spredt.

S. sisarum L. (S. sisaroideum) Sukkerrod. 30-100cm. Stænglen stribet. Bægerbladene meget små. Frugten tyndribbet. Ingen undervandsblade. Spr.

Berula erecta (Hudson) Coville Sideskærm. VI-VIII. Alm.

Seseli og Cnidium. Fællesnøgle.

1.	Kronen gul	2.
	" hvid	3.
2.	5-12 storsvøbblade	S. peucedanoides
	0(-2) "	S. gracile
3.	8-mange storsvøbblade. Frugten mest dunet	S. libanotis
	0(-8) "	4.
4.	Skærmstrålerne glatte og jævne	5.
	" dunede eller ru	6.
5.	Grundbladsstilkene ikke furede. Frugttænderne 0,2-0,5mm	S. elatum
	" furede. Frugtens bægertænder ca.0mm	S. pallasii
6.	Småsvøbbladene forbundne ved grunden	S. rigidum
	" frie	7.
7.	Småsvøbbladene bredt hindekantede	8.
	" smalt "	9.
8.	4-11 skærmstråler	S. tortuosum
	15-30(12-40) skærmstråler	S. annuum
9.	7-15 skærmstråler	S. campestre
	20-45 "	10.
10.	Mellemste og øvre bladskeder tiltrykte. Frugten ca.2mm	C. dubium
	" " " " udstående. Frugt 4mm	C. silaifolium

Seseli libanotis (L.) Koch Hjorterod. VII-IX. Spredt. 2 underarter:
ssp. libanotis: Nedre blade 2-3 x delte med linje- til lancetformede flige, der er m.m. spidse og ofte krummede.
ssp. intermedium (Rupr.) Ball: Nedre blade 1(2) x delte med ægformede afsnit, der kan være groft tandede til fjerfligede.

S. peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol. Gul hjorterod. 40-100cm. Glat. Bladene 2-3 x delte, fligene 3-10x0,5-1mm. 10-20 skærmstråler. VI-VII.Spr.

S. elatum L. ssp. osseum (Cr.) Ball Benhjorterod. 15-120cm. Glat. 8-15

skærmstråler. Kronbladene 1/2mm lange. Bægeret sidder på toppen af frugten, denne glat eller svagt fintdunet. VII-IX. Spredt.

Seseli annuum L. Steppehjorterod. 20-60cm. Toårig. Stænglen ofte lillaanløben. Kronen hvid eller lyserød. Frugten 1,5-3mm, glat. VII-IX. Alm.

S. campestre Besser 50-100cm. Bladene 3-4 x delte; fligene 5-25x0,5-1,5 mm. Kronbladene hvide eller gullighvide, fintdunede udvendigt. Frugten 3-3,5mm, fintdunet. VII-VIII. Sj.

S. tortuosum L. Vreden hjorterod. 10-75cm. Glat toårig. Bladene 3-4 x delte. Kronbladene gullighvide, fintdunede udvendigt. Frugten fintdunet. VII-VIII. Sj.

S. pallasii Besser Broget hjorterod. 30-120cm. Glat 2-flerårig. Bladene 2-4 x delte; fligene 5-25x0,5-1mm. 7-25 skærmstråler. Kronbladene hvide og glatte. Frugten 2,5-3,5mm, glat eller svagt finvortet. VII-VIII. Spr.

S. rigidum W.& K. Stiv hjorterod. 40-100cm. Fintdunet ihvertfald foroven. Bladfligene langt tilspidsede og stive. Skærmstrålerne fintdunede hele vejen rundt. Frugten fintdunet eller filtet. VII-IX. Spredt. 2ssp.:
ssp. rigidum: 10-30 skærmstråler op til 4,5cm. Frugten 4-5mm.
ssp. peucedanifolium (Besser) Nyman:5-9 skærmstråler indtil 2,5cm. Frugten 2,5-3,5mm. Dobrogei.

S. gracile W.& K. Børstehjorterod. 30-90cm. Bladene 3 x delte; fligene 20-100x0,5mm, børsteformede. 5-16 skærmstråler på indtil 7cm. Frugten 2-3mm, glat. VII-IX. Spredt.

Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. Brændeskærm. 30-100cm. Næsten glat 2-flerårig. Stænglen trind forneden, furet foroven. Bladene med aflangt omrids, smalfligede og med lidt nedbøjet rand. VI-VIII. Sj.

C. silaifolium (Jacq.) Simonkai Klippebrændeskærm. 60-120cm. Stænglen stribet. Bladene med trekantet omrids, 2-4 x delte, med rukantede fliger. Skærmstrålerne rukantede. VI-VIII. Spredt. 2 underarter:
ssp. silaifolium: Bladene ret bløde; fligene 3-5 x så lange som brede, spidse eller tilsmalnede i en brod.
ssp. orientale (Boiss.) Tutin: Bladene ret stive; fligene 2 x så lange som brede, afrundede, brat brodspidsede.

Oenanthe. Klaseskærm.

1. Skærmene kortstilkede, sidder modsat stængelbladene ..... aquatica
" langstilkede og endestillede. Flerårige 2.
2. 2-4 skærmstråler. Frugterne siddende. Hul stængel ..... fistulosa
4-16 " . Nogle frugter stilkede 3.
3. Skærmstråler og blomsterstilke fortykkede i frugt ..... silaifolia
" " " tynde i frugt 4.
4. Øverste blades yderste flige indtil 1,5cm lange ..... banatica
" " " " 2,5-5cm lange stenoloba

Oenanthe fistulosa L. Vandklaseskærm. V-VIII. Spredt.

O. silaifolia Bieb. Knoldklaseskærm. 30-80cm. Bladene med smalle afsnit. 4-10 skærmstråler. Rodknoldene ægformede, smallest ind mod stæng-

len. Griflerne næsten lig frugten. V-VII. Alm.

Oenanthe stenoloba Schur (O. peucedanifolia p.p.) 50-90cm. Rodknoldene ægformede, bredest ind mod stænglen. Griflen sjældent over 1/2 x frugten. VI-VII. Spredt.

O. banatica Heuffel Furet klaseskærm. 50-100cm. Rodknoldene valseformede. 9-16 skærmstråler. Stænglen hul (marvfyldt hos de 2 foregående), dybt furet. Griflerne indtil 1/4 x frugten. V-VI. Alm.

O. aquatica (L.) Poiret Billeboklaseskærm. VI-VIII. Alm.

Aethusa cynapium L. Hundepersille. VI-VIII. Spredt. 3 underarter:
ssp. cynapioides (Bieb.) Nyman: Stænglen 1-2m, trind, fint furet, blådugget.
ssp. cynapium: Stænglen 30-80cm, grøn og furet. Småsvøbet længere end småskærmene, ydre stråler ca. 2 x så lange som frugten.
ssp. agrestis (Wallr.) Dostal: 5-20cm. Stænglen grøn og kantet. Småsvøbet højst af småskærmens længde. Ydre stråler mest kortere end frugten.

Athamantha hungarica Borbas (A. turbith ssp. h.) 10-50cm. Grundbladene 2-4 x delte med ca, 25x0,8mm store flige. 30-50 skærmstråler. 5-8 storsvøbblade. Frugten 5-6mm, ægformet, tæt dunet. V-VII. Sj.

Foeniculum vulgare Miller Fennikel. 40-150cm. Glat og blågrøn, mest 2-årig. Bladene 3-4 x delte med trådformede flige. 15-25 skærmstråler. Oftest uden svøbblade. Frugten 4-10,5mm. VII-IX. Dyrket og forvildet.

Anethum graveolens L. Dild. VII-VIII. Dyrket og hyppigt forvildet.

Silaum silaus (L.) Sch.& Th. Peberskærm. 30-100cm. Minder om Seline, men med gullighvide blomster. Stænglen stribet. Bladfligene ofte med rødlig spids. Småsvøbbladene hindekantede. VI-IX. Sj.

Physospermum cornubiense (L.) DC. Stjærnesvøb. 60-150cm. Næsten glat flerårig. Grundbladene 2 x trekoblede med lappet-fligede afsnit. Stængelbladene små. Frugten omvendt hjærteformet, 3-4mm. V-VII. Sj.

Conium maculatum L. Skarntyde. VI-VII. Alm.

Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. Stråleskærm. 60-150cm. Stænglen 1-1,5cm tyk, hul. Bladene skinnende, afsnittene med kileformet grund. En stor endeskærm og ofte adskillige sideskærme. VI-VII. Spredt.

Cachrys alpina Bieb. 60-100cm. Nedre blade 40-50x50-60cm, 4-7 x delte med trådformede afsnit på 2,5-6cm. 10-20 skærmstråler. Svøbbladene meget korte. Frugten 12-15mm. VI-VII. Jud.Tulcea: Ml. Macin og Greci på M.Suluc.

Prangos carinata Griseb. (Cachrys ferulacea ?) 60-180cm. Bladene indtil 80cm, 3-5 x delte med smalle flige på 1-4,5cm. 6-18 kraftige skærmstråler. Frugten rundagtig med kraftige riller. V-VI. Jud.Mehedinţi: ml. Virciorova og Gura Vaii langs Donaus bred.

Bupleurum. Hareøre.

1. Flerårig ..... 2.
   Enårig 5.
2. Bladene med fremtrædende midterribbe og mange sammenløbende sideribber ..... longifolium
   Bladene m.m. parallelstrengede; få og svage sideribber 3.
3. Småsvøbbladene ægformede til rundagtige ..... ranunculoides
   " linje- til lancetformede 4.
4. Midterste og øvre blade med udvidet grund ..... diversifolium
   " " " " " tilsmalnet grund falcatum
5. Bladene gennemvoksede. Intet storsvøb ..... rotundifolium
   " ej " . Med " 6.
6. Stor- og småsvøb æg-lancetformede, ofte overlappende, med brod 7.
   " " " smalle, under 1mm brede, ej overlappende 8.
7. Storsvøbbladene over 1/2 x den længste skærmstråle ..... baldense
   " under 1/2 x " " " apiculatum
8. De fleste skærme med 2-3 stråler ..... 9.
   " " " " mindst 4 stråler 11.
9. Mellemste stængelblade med 3 ribber ..... asperuloides
   " " " 5-9 ribber 10.
10. Frugten 1,5-2,25mm. Nedre bladundersider ikke kølede tenuissimum
    " 4-6mm. Nedre bladundersider kølede praealtum
11. Mange korte, ofte tiltrykte grene ..... affine
    Få, lange, sjældent tiltrykte grene commutatum

Bupleurum rotundifolium L. Rundbladet hareøre. 10-50cm. Blågrøn og ofte lillaanløben. Småsvøbbladene store og ægformede, gulgrønne.V-VII.Alm

B. longifolium L. Langbladet hareøre. 30-100cm. Opret, gult eller lillaanløben. Stængelbladene aflange til ægformede, stærkt stængelomfattende. 5-8 ægformede småsvøbblade med sammenvokset grund. VI-VIII. Spr.

B. apiculatum Friv. 30-60cm. 6-8 skærmstråler. Storsvøbbladene smalt hindekantede. Småsvøbbladene helt hindeagtige og hvidlige. Frugten 2,7-3mm med utydelige ribber. VI-VIII. Sj.

B. baldense Turra ssp. gussonei (Arc.) Tutin Stakhareøre. 30-75cm. Friskgrøn, ret stærkt grenet. 5-8 skærmstråler. Storsvøbet gulligt. Småsvøbbladene grønne, smalt hindekantede.

B. praealtum L. Sivhareøre. 50-150cm. Storsvøbet mest meget kortere end strålerne. Frugten med fremstående ribber. Friskgrøn om sommeren, lilla om efteråret. Kronen guldgul. VII-IX. Spredt.

B. commutatum Boiss.& Bal. ssp. glaucocarpum (Borbas) Hayek Græshareøre. 30-50cm. Nedre blade 9-11-strengede ved grunden, de øvre med 3-5. 4-5 skærmstråler. Planten blågrøn. VII-IX. Sj.

B. affine Sadler Kvasthareøre. 30-85cm. Lidt blågrøn. Bladene med 3-8 strenge. Storsvøbbladene med en ret bred grund, langt tilspidsede.Spr.

B. asperuloides Heldr. Mysikehareøre. 30-80cm. Lidt blågrøn, stærktgrenet, med kraftige, tiltrykte 2-ordens grene. Frugten 2,25mm. Sj.

Bupleurum tenuissimum L. Smalbladet hareøre. VIII-X. Spredt.

B. ranunculoides L. Smørblomsthareøre. 20-60cm. Stængelgrunden med mørkebrune bladrester. 5-7(3-15) skærmstråler. 2-4 gullige storsvøbblade af form som de øvre stængelblade. VII-VIII. Sj.

B. diversifolium Roch. (B. falcatum ssp. cernuum p.p.) 5-30cm. Spredt

B. falcatum L. Seglhareøre. 20-50cm. Stængelgrunden uden bladrester. 3-15 skærmstråler. 2-5 lancet- til sylformede storsvøbblade, 5 linjelancetformede småsvøbblade. VII-X. Alm. 2 underarter:
ssp. falcatum: Bladene elliptiske til aflange, tydeligt stilkede. Frugten ca. 3mm, ribberne mest uvingede.
ssp. cernnum (Ten.) Arc.: Bladene linjeformede og siddende. Frugten ca. 5mm, ribberne m.m. vingede.

Trinia. Trævlskærm.

1. Med småsvøb af 1-6 korte blade ..... 2.
   Uden " ..... 3.
2. 3-6 småsvøbblade ..... ramosissima
   1-3 " ..... glauca
3. Bladfligene mest 2-7cm lange ..... multicaulis
   " " under 1cm, nogle gange indtil 2cm ..... glauca

Trinia glauca (L.) Dumort Trævlskærm. 15-30cm. Glat og blågrøn flerårig. Stænglen kantet, bugtet og hyppigt grenet med talrige skærme. 4-8 skærmstråler. Frugten 2-3mm. IV-VI. Spredt. 2 underarter:
ssp. glauca: Ingen svøbblade. Bladfligene utydeligt ribbede. Blomsterstilken indtil 5 x den modne frugt.
ssp. carniolica (Kerner) Wolff: Mest med svøbblade. Bldfligene korte med tydelig midterribbe. Blomsterstilken ca. = den modne frugt.

T. multicaulis (Poiret) Schischkin 15-40cm. Stænglen opret (knippeformet) grenet, især i sin øvre del. Bladene 1-2 x delte. Frugten 3-4 mm. Hanplanternes skærme kransstillede. V-VI. Sj.

T. ramosissima (Fischer) Koch Ungarsk trævlskærm. 30-80cm. Stænglen rigt grenet i øvre halvdel, mest hos hunplanterne. Frugten 2-2,5mm. V-VI. Alm.

Apium graveolens L. Vild selleri. Ingen svøbblade. Bladene 1-2 x delte. VII-VIII. Sj.

A. nodiflorum (L.) Lag. Kortstilket sumpskærm. 15-60cm. Stænglen krybende og rodslående forneden. 7-13 småblade. Skærmene kortstilkede til siddende modsat bladene. 5-7 småsvøbblade. VI-VII. Sydøst.

Petroselinum crispum (Miller) Hill Havepersille. VI-VII. Dyrket.

Sison amomum L. Krydderskærm. 30-60cm. Toårig. Kvalmende duft ved knusning. Nedre blade 1-2 x delte med 5-9 æg-lancetformede, undertiden lappede småblade. De øvre smalfligede. 3-6 uens skærmstråler. 2-4 stor- og småsvøbblade. Talrige skærme. Frugten 1,5-3mm. VII-VIII. Sj.

Cicuta virosa L. Gifttyde. VII-IX. Spredt.

Falcaria vulgaris Bernh. Seglblad. VII-IX. Alm.

Carum carvi L. Kommen. V-VII. Alm.

Selinum carvifolia (L.) L. Seline. VII-VIII. Spredt.

Ligusticum mutellinoides (Cr.) Vill. Dværglostilk. 5-15cm. 5-10 blivende storsvøbblade. Stængelgrunden med brune bladrester. Stænglen mest bladløs med en enkelt skærm med 8-20 stråler. VII-VIII. Sj.

L. mutellina (L.) Cr. Alpelostilk. 10-40cm. 0(-2) storsvøbblade. Stængelgrunden tæt trævlet. Stænglen mest med 1-2 små blade og 2-3 oftest røde skærme med 7-10 stråler. VI-VIII. Alm.

Conioselinum tataricum Hoffm. Skedekørvel. 50-150cm. Glat flerårig. Øvre bladskeder stærkt opblæste. Bladene kørvelagtige. 0-få stor- og mange sylformede småsvøbblade. Frugten 3,5-6mm, 8-kantet. VII-VIII. Sj.

Angelica palustris (Besser) Hoffm. Sumpangelik. 50-125cm. Stænglen skarpkantet-furet med noget vingede kanter. Bladgrunden ofte hjærteformet; undersidens ribber rubørstede. VI-VIII. Sj.

A. silvestris L. Angelik. Stænglen trind. Bladstilken furet. Alm.2ssp:
ssp. silvestris: Frugten 4-5,5mm. Bladafsnittene lidet nedløbende.
ssp. montana (Brot.) Arc.: Frugten 6-8mm. Endestillede bladafsnit nedløbende, de sidestillede ofte sammensmeltede.

A. archangelica L. Kvan. Stænglen trind i sin nedre del. Bladstilken trind. VII-VIII. Spredt.

Levisticum officinale Koch Løvstikke. VI-VIII. Dyrket.

Palimbia rediviva (L.) Hal. 40-90cm. Trævlet stængelgrund. Grundbladene 3 x delte med linje-sylformede, stive flige. Stængelbladene reducerede til skællignende bladskeder. Mange gullighvide skærme i en top. Frugten 5-6,5mm. VI-VII. Jud.Vaslui: Todireni på V. Sarata.

Ferula sadlerana Ledeb. Rubladet ferle. 60-150cm. Fintdelte blade med stor, opblæst skede. Bladfligene indtil 30x3mm. Indtil 12 skærmstråler. Frugten 7-10mm. VI-VII. Sj.

F. heuffelii Griseb. Kalkferle. 50-150cm. Bladfligene 2-7(9)x1-1,5mm, først lidt dunede, sener glatte. 4-7 skærmstråler. Frugten 8-12mm. V-VI

Ferulago silvatica (Besser) Rchb. Smalbladet birkerod. 50-125cm. Glat flerårig. Bladene indtil 50cm, med aflangt til næsten linjeformet omrids, bredest omkring midten. Linjeformede flige. VI-VIII. Alm.

F. campestris (Besser) Grec. Alm. birkerod. 40-200cm. Bladene med ægformet-trekantet omrids, bredest nær grunden. Planten mørkegrøn med stærkt kantet og furet stængel. Frugten 10-12mm. VI-VIII. Spredt.

Opopanax chironium (L.) Koch Stor gummirod. 1-2,5m. Nedre blade 2 x delte med ægformede afsnit på 5-8x3-5cm. 5-10(25) skærmstråler. Frugten 7-12mm, meget smalvinget. VI-VII. Sj. 2 underarter:
ssp. chironium: Småbladene indbyrdes frie med skævt hjærteformet grund.

ssp. bulgaricum (Velen.): Småbladene ikke alle frie, med nedløbende grund og de yderste sammenflydende. Jud.Constanţa: Eforie S, Mangalia.

Peucedanum. Svovlrod.

1. Nedre blade 2-6 x trekoblede og smalfligede. Gule blomster ..... 2.
" " 1-4 x fjersnitdelte 6.
2. Frugtstilken (2)3-4 x frugten ..... officinale
" ca. lig " 3.
3. Bladfligene med 3 tydelige og 2 svagere ribber ..... rochelianum
" uden de 2 svagere ribber 4.
4. Bladfligene 0,5(-1)mm brede. Frugten 7-9mm ..... longifolium
" 1-3mm brede. Frugten 4-7,5mm 5.
5. Bladene 4-6 x delte, fligene 1-4,5cm. Frugten 4-5(6)mm .. tauricum
" 3(4) x " , " 2-9cm. Frugten 6-7,5mm ruthenicum
6. Yderste bladafsnit store og ægformede ..... 7.
" " små og smalle 8.
7. Bladene 2-3 x delte ..... cervaria
" 1 x " latifolium
8. 0-2 storsvøbblade ..... 9.
4-flere storsvøbblade 10.
9. Skærmstrålerne ru og fintdunede på indersiden ..... carvifolia
" glatte på indersiden arenarium
10. Storsvøbbladene udadrettede ..... alsaticum
" nedadrettede 11.
11. Bladskaftet med et nedadbøjet knæk for hvert småblad oreoselinum
" uden nedadbøjede knæk 12.
12. Stænglen marvfyldt. Modne frugts vinge 1,5-2,5mm ..... austriacum
" hul. Modne frugts vinge 0,5-0,75mm bred palustre

Peucedanum officinale L. Lægesvovlrod. 60-200cm. Stænglen m.m. trind. Bladene kostformede, 2-6 x delte, fligene 4-10cm x 1-3mm. Skærmene nikkende før blomstringen. 10-40 skærmstråler. VII-VIII. Spredt.

P. longifolium W.& K. Langbladet svovlrod. 60-200cm. Bladfligene køledе. VII-VIII. Spredt.

P. tauricum Bieb. 40-100cm. Bladene 5-6(4-7) x trekoblede, fligene 1-4,5cm x 1-2mm. 7-28 skærmstråler. Kronen bleggul. Sj.

P. ruthenicum Bieb. Kronen bleggul.

P. rochelianum Heuffel 40-100cm. Nedre blade (2)3 x trekoblede. Fligene 3-7cm x 1,5-2,5mm. Kronen bleggul. VII-VIII. Sj.

P. carvifolia Vill. Kommensvovlrod. 30-100cm. Stænglen med trævlet grund, furet, ihvertfald foroven. Bladene kommenagtige, skinnende på begge sider. 6-18 meget uens skærmstråler. Kronen bleggul eller grønlighvid. VII-VIII. Alm.

P. arenarium W.& K. Sandsvovlrod. 90-150cm. Bladene 3-4 x fligede, de øvre reducerede til en opblæst stilk. 2-14 ofte meget uens skærmstråler. Kronen gullig. Frugten 6-9mm. VII-VIII. Sj.

Peucedanum latifolium (Bieb.) DC. Bredbladet svovlrod. 40-100cm. Næsten glat. Bladafsnittene 3-6cm, elliptiske til ægformede. Kronen hvid. 4-6 storsvøbblade. 10-21 skærmstråler. Frugten 5-7mm. VII-VIII. Spredt.

P. alsaticum L. Gærdesvovlrod. 50-180cm. Ofte lilla med alderen. Med mindst 5 ekstraskærme under endeskærmen. 6-25 skærmstråler. Kronen matgul. Frugten 3-4,5mm. VII-IX. Alm.

P. austriacum (Jacq.) Koch Østrigsk svovlrod. 30-120cm. Stænglen furet. Stængelgrunden ikke trævlet. Nedre blade 20-40cm, 3-4 x delte, fligene indtil 1,2mm brede. Tørbundsart. VII-VIII. Alm.

P. oreoselinum (L.) Moench Bakkesvovlrod. 30-60cm. Nedre blade 2-3 x delte med vinkelret udstående sideafsnit, yderste flige trekantede med 3-4 brodspidsede lapper. 15-30 skærmstråler. VII-VIII. Alm.

P. palustre (L.) Moench Kærsvovlrod. VII-VIII. Spredt.

P. cervaria (L.) Lapeyr. Hjortesvovlrod. 30-100cm. Bladene næsten læderagtige med lysegrøn overside og bleggrøn, netåret underside, med uregelmæssige, brodspidsede tænder. VII-VIII. Alm.

Pastinaca sativa L. Pastinak. VII-VIII. Alm. 3 underarter:
ssp. sativa: Planten næsten glat. Dyrket og forvildet.
ssp. silvestris (Miller) Rouy & Camus: Planten m.m. stærkt gråhåret. Stænglen kantet.
ssp. urens (Req.) Celak.: Planten m.m. stærkt gråhåret. Stænglen trind.

Heracleum carpaticum Porc. Hjærtebladet bjørneklo. 20-30cm. Stænglen indtil 3mm tyk. Bladene med rundagtigt omrids, udelte til dybt håndformet 5-7-lappede. Skærmen 5-7cm bred med 5-15 stråler. VII-VIII. Sj.: M.Maramureş, M.Rodnei, M.Bucegi, M.Ciucaş ?

H. palmatum Baumg. Karpatisk bjørneklo (H. sphondylium ssp. transsilvanicum). 1-2,5m. Bladene store, indtil 50cm, ikke fjersnitdelte, med 7-9 lapper. Stængelbladskederne tydeligt opblæste, uldhårede især langs ribberne. VI-VII. Spredt.

H. sphondylium L. Bladene fjersnitdelte. VI-IX. Alm. 3 underarter:
ssp. sibiricum (L.) Simk.: Grønblomstret bjørneklo. Kronbladene grønlige eller gullige, nogenlunde lige store.
ssp. montanum (Schleicher) Briq.: Bjærgbjørneklo. Kronbladene hvide/lyserøde, uens. Større stængelblade trelappede.
ssp. sphondylium: Alm. bjørneklo. Kronbladene hvide/lyserøde, uens. Større stængelblade med 5 afsnit.

Malabaila graveolens (Sprengel) Hoffm. 40-100cm. Kortdunet toårig. Bladene 1 x delte, afsnittene ofte 5-7cm, tandede (lappede). 20-30 skærmstråler. 0-få svøbblade. Frugten næsten kredsrund. VII-VIII. Sj.

Tordylium maximum L. Stort skjoldfrø. 30-130cm. Stivhåret 1-2-årig. Stænglen med nedadrettede hår. Bladene oftest 1 x delte med tandede, m.m. lancetformede flige. Mange svøbblade. De ydre blomster med 2-3 store kronblade. Frugten m.m. kredsrund, stivhåret. VI-VII. Alm.

Laser trilobum (L.) Borkh. Hestekørvel. 30-120cm. Glat flerårig. Bladafsnittene akelejeagtige, ca. 5cm. Bladene 2-3 x trekoblede. Skærmene indtil 25cm brede. 11-20 skærmstråler. Frugten 5-10mm. V-VII. Spredt.

Laserpitium. Foldfrø.

1. 0-5 affaldende storsvøbblade ..... krapfii
   Med mange storsvøbblade 2.
2. Storsvøbbladene randhårede ..... 3.
   " ikke randhårede 4.
3. Yderste bladafsnit 2-6x1-5cm ..... archangelica
   " " 10-25x2-9mm prutenica
4. Bladafsnittene med tilsmalnet grund, m.m. helrandede ..... siler
   " " hjærteformet grund, tandede latifolium

Laserpitium siler L. Bjærgfoldfrø. 60-120cm. Stængelgrunden stærkt trævlet. Bladene 2-4 x delte, afsnittene lancetformede, 10-35x5-12mm, lidt blågrønne og læderagtige. 20-50 skærmstråler. VI-VIII. Sj.

L. latifolium L. Bredbladet foldfrø. VI-VIII. Alm.

L. krapfii Cr. Gult foldfrø. 60-120cm. Trævlet stængelgrund. Nedre blade 2-3 x delte, afsnittene 2-8cm, ægformede og tandede. Kronbladene mest grønliggule med rød rand. 7-15(5-24) skærmstråler. VI-VII. Alm.

L. archangelica Wulfen Kvanfoldfrø. 80-150cm. Stænglen kantet, ofte rødplettet, med tæthårede knæ. Øvre bladskeder meget stærkt opblæste. Bladafsnittene ægformede med afrundet grund. VII-IX. Sj.

L. prutenicum L. Toårigt foldfrø. 30-100cm. Stænglen glat eller stivhåret. Bladene m.m. stivhårede nedenunder. Kronen hvid eller gullig. Stængelgrunden ikke trævlet. Stænglen kantet-furet. VII-VIII. Spredt.

Torilis. Randfrø.

1. Skærmstrålerne meget korte. Skærmene hovedformede ..... nodosa
   Skærmene ikke hovedformede 2.
2. 0-1 storsvøbblade ..... arvensis
   4-12 " 3.
3. Modne frugt 3-4mm. Ydre kronblade lidt større end de indre japonica
   " " 2-3mm. " " tydeligt større ucranica

Torilis nodosa (L.) Gaertner Liggende randfrø. 20-50cm. Oftest liggende enårig. Skærmene siddende eller kortstilkede modsat bladene. Intet storsvøb. Delfrugterne uens: 1 med børster, 1 med vorter. IV-VI. Sj.

T. arvensis (Hudson) Link Markrandfrø. 20-60cm. Opret. Frugten 3-6mm.
ssp. arvensis: Ydre kronblade lidet forøgede. Griflerne 2-3 x griffelfoden.
ssp. neglecta (Schultes) Thell.: Ydre kronblade tydeligt forøgede. Griflerne 3-6 x griffelfoden.

T. japonica (Houtt.) DC. Hvast randfrø. Griflerne 2-3 x griffelfoden.

T. ucranica Sprengel Smalfliget randfrø. 30-120cm. Som den foregående, men bladfligene smallere og griflerne 5-6 x griffelfoden. VI-VII. Spr.

Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude 30-65cm. Opret enårig. Bladene 4-5 x delte med bredt trekantet omrids. 8-20 skærmstråler. Frugten 6-7 mm; tornene løber sammen forneden i vinger. VI-VII. Sj på sandstrand. Jud-Constanța: Constanța, Eforie, Agigea, Techirghiol, la Portița.

Caucalis platycarpos L. Fodangel. 5-30cm. Opret enårig. Bladene 2-3 x delte, fintfligede med trekantet omrids. Frugten 6-13mm med krogede torne. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. platycarpos: Frugternes modhager ca.3mm, ca. = frugtens bredde.
ssp. muricata (Bischoff) Soó: Frugternes torne ca. 1mm, tydeligt kortere end frugtens bredde.

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Burreskærm. 20-40(60)cm. Enårig. Bladene 1 x fjersnitdelte med tandede eller fjerfligede afsnit. Langstilkede skærme med 2-5 stråler og bredt hvidkantede svøbblade. V-VIII. Spredt.

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Storblomstret bredfrø. 10-80cm. Stivhåret enårig med 2-3 x delte blade. 5-12 skærmstråler. Ydre kronblade 8-12 mm lange, indtil 8 x de andre. Frugten ca. 8mm. V-VII. Spredt.

Daucus guttatus Sibth.& Sm. ssp. zahariadii Heywood Plettet gulerod. 30-100cm. Enårig. Storsvøbet længere end de 8-25 skærmstråler. Midterblomsten ofte sortlilla. Tornene 2 x frugtens bredde. V-VIII. Spredt.

D. carota L. ssp. carota Vild gulerod. Storsvøbet så langt som skærmstrålerne eller kortere. Tornene højst af frugtens bredde. VI-IX. Alm.

PYROLACEAE

Pyrola. Vintergrøn.

1. Griflen kortere end kronen og indesluttet i den ..... minor
   " rager ud af kronen 2.
2. Griflen ret ..... media
   " bøjet 3.
3. Bægerfligene mindst så brede som lange. Gulliggrøn krone chlorantha
   " længere end brede. Hvid krone 4.
4. Bladstilken længere end bladet. Griflen med en skive under støvfanget ..... rotundifolia
   Bladstilken kortere end bladet. Griflen uden skive under støvfanget carpatica

Pyrola minor L. Liden vintergrøn. VI-VIII. Spredt.

P. media Sw. Klokkevintergrøn. VI-VIII. Sj.

P. chlorantha Sw. Grønlig vintergrøn. VI-VII. Sj.

P. rotundifolia L. Mosevintergrøn. VI-VII. Spredt.

P. carpatica Holub & Krisa Karpatisk vintergrøn. 12-20cm. Stænglen svagt vinget foroven. Bladene 2-3x1,5-3cm. Blomsterne 10-15mm brede. Bægerfligene butte. VI-VII. M.Rodnei, M.Bucegi.

Orthilia secunda (L.) House Ensidig vintergrøn. VI-VII. Alm.

Moneses uniflora (L.) A.Gray Enblomstret vintergrøn. V-VIII. Spredt.

Chimaphila umbellata (L.) Barton Skærmblomstret vintergrøn. VI-VIII.

Monotropa hypopitys (L.) Snylterod. VI-X. Spredt. 2 underarter:
ssp. hypopitys: Klasen med 6-25(30) blomster. Kronen indvendigt samt støvdragere og griffel hårede. Kapsel og frugtknude længere end brede.
ssp. hypophegea (Wallr.) Holmboe: Klasen med 1-6(12) blomster. Planten helt glat. Kapsel og frugtknude m.m. kugleformede.

ERICACEAE

1. Frugtknuden undersædig ..... Vaccinium
" oversædig 2.
2. Blomsterne 4-tallige. Kronen bliver på frugten ..... 3.
" 5-tallige. " affaldende 4.
3. Bladene modsatte, skælformede, tæt taglagte, 2,5-3mm ..... Calluna
" i kranse på 4-5, nåleformede, 4-5mm lange Bruckenthalia
4. Kronen kugle- til krukkeformet, m.m. hængende ..... 5.
" tragt- til skålformet, ikke hængende 6.
5. Bladene omvendt æg-lancetformede; undersiden grøn Arctostaphylos
" linje-lancetformede; undersiden blålig-hvidlig Andromeda
6. Kronen 15-20mm bred. Bladene 1-2cm ..... Rhododendron
" 4-5 mm " . " 4-6mm Loiseleuria

Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb. Skær lyng. 10-15cm. Tætte, korte, endestillede klaser med blegrøde blomster på 3mm; lapperne lig røret. Støvknapperne indesluttede. VII-IX. Alm. Nedre alpine region.

Calluna vulgaris (L.) Hull Hedelyng. VII-IX. Spredt.

Rhododendron myrtifolium Schott & Kotschy (R. kotschyi) Lys alperose. 10-50cm. Bladundersiden rustskællet eller grøn. Kronen klart lyserød. VI-VII. Alm.

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. Kryblyng. 2-4cm. Fladt tæppedannende, krybende og rodslående dværgbusk. Bladene læderagtige, 4-6x1-2mm. Kronen rosa, dybt delt. VI-VII. Spredt.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel Hedemelbærris. V-VI. Sj.

Andromeda polifolia L. Rosmarinlyng. V-VI. Sj.

Vaccinium. Bølle.

1. Kronen delt næsten til grunden. Blomsterstilken trådformet, opret 2.
" krukkeformet. Blomsterstilken kort og kraftig, ikke opret 3.
2. Blomsterstilken fintdunet. Større blade 3-6mm brede .... oxycoccos
" glat. Større blade højst 2,5mm brede microcarpum
3. Bladene savtakkede. Kvistene skarpt trekantede ..... myrtillus
" helrandede. " trinde 4.
4. Bladene skinnende ovenpå, mørkprikkede nedenunder .... vitis-idaea
" matte og m.m. blågrønne, ikke mørkprikkede nedenunder 5.
5. Blomsterstilken = kronen, dennes flige tilbagebøjede .. uliginosum
" 1-3mm, kronfligene næppe " gaultherioides

Vaccinium oxycoccos L. Tranebær. V-VI. Spredt.

V. microcarpum (Turcz.) Hooker Dværgtranebær. V-VI.

V. vitis-idaea L. Tyttebær. V-VII. Alm.

V. uliginosum L. Mosebølle. 30-60cm. Mest m.m. opret. Største blade over 15mm, ofte bredest midtpå. Klaserne med (1)2-3 blomster. Blomsterstilken mest 3-10mm. V-VI. Spredt.

V. gaultherioides Bigelow (V. uliginosum ssp. microphyllum) Fjældbølle. 5-15cm. Liggende til opstigende. Bladene 6-15mm, oftest bredest over midten. Klaserne med 1(2) blomst. VI-VII. Spredt.

V. myrtillus L. Blåbær. V-VI. Alm.

EMPETRACEAE

Empetrum nigrum L. Rævling. Tvebo. Ingen støvdragere om de lige udviklede bær. Bladene 1-1,5mm brede, de fleste parallelle midtpå. Unge kviste rødlige. V-VI. Spredt.

E. hermaphroditum Hagerup. Fjældrævling. Blomsterne tvekønnede; oftest støvdragere om de lige udviklede bær. Bladene 1,5-2mm brede, ikke parallelrandede. Unge kviste grønne. V-VI. Sj. M.Rodnei, M.Vrancei.

PRIMULACEAE

Primula. Kodriver

1.	Blomsterne gule	2.
	" røde	5.
2.	Bladene jævne og kødede. Bægeret trindt	auricula
	" rynkede, ikke kødede. Bægeret kantet	3.
3.	Blomsterstilkene udgår lige fra rosetten	vulgaris
	Blomsterne i en stilket skærm	4.
4.	Bægertænderne tilspidsede, 2-3 x så lange som brede	elatior
	" spidse, ca. så lange som brede	veris
5.	Bladundersiden melet	6.
	" ikke melet	7.
6.	Kronrøret så langt som bægeret	farinosa
	" 2-3 x bægeret	halleri
7.	Bladene kileformede, med afskåret, flertandet spids	minima
	" æg-spatelformede og helrandede	wulfeniana

Primula vulgaris Hudson (P. acaulis) Storblomstret kodriver. Spredt.

P. elatior (L.) Hill Fladkravet kodriver. 3 underarter:
ssp. leucophylla (Pax) H.-Harr.: Bladundersiden gråfiltet. Bægeret 6-8(-11)mm. V-VI. Spredt.
ssp. elatior: Bladene brat tilsmalnede i stilken, dunede nedenunder. Kapslen mest længere end bægeret, dette ca. 10mm. III-VI. Alm.
ssp. intricata (G.& G.) Lüdi: Bladene jævnt tilsmalnede i stilken, dunede nedenunder. Kapslen ca. = bægeret, dette 10-12mm. VI-VII. Sj.

Primula veris L. Hulkravet kodriver. IV-V. Alm. 3 underarter:
ssp. veris: Kronen konkav. Bægeret 8-15mm. Bladundersiden svagt håret til halvglat; hårene 0,15-0,3mm og stive. Alm.
ssp. canescens (Opiz) Hayek: Kronen lidt konkav. Bægeret 16-20mm. Bladundersiden gråfiltet. Bladgrunden jævnt tilsmalnet i den vingede stilk.
ssp. columnae (Ten.) Lüdi: Kronen næsten flad. Bægeret 15-20mm. Bladundersiden tykt hvidhåret. Bladgrunden ofte hjærteformet. Uvinget stilk.

P. farinosa L. Melet kodriver. V-VI. Sj.

P. halleri Gmelin Langkronet kodriver. 12-18cm. Bægeret 9-11mm. Kronrøret 20-25mm. Bægeret 2/5 delt. VI-VIII. Spredt.

P. wulfeniana Schott (P. baumgarteniana) Stivbladet kodriver. 5-7cm. Bladene skinnende og læderagtige, tæt dækkede af højst 0,1mm store, blege kirtelhår. Mest 1-2-blomstret. V-VII. Sj. M.Birsei: Postavaru, Piatra Craiului ?, M.Fagaraş.

P. minima L. Liden kodriver. 2-5cm. Længste blade 5-30x3-10mm, siderne helrandede, fortil med 3-9 skarpe, bruskspidsede tænder. Skafterne 2-40 mm med 1-2 blomster med V-formede kronflige. VI-VIII. Alm.

P. auricula L. ssp. serratifolia (Roch.) Jav. 5-25cm. Bladene 5-12cm, oftest omvendt ægformede, smalt hindekantede, glatte og skinnende ovenpå, regelmæssigt tandede. IV-VI. Sj.

Androsace. Fjældarve. 1-flerårige, små rosetplanter. Blomsterne i skærme med svøbblade under, ofte hjulkronede.

1. Enårig ..... 2.
   Flerårig 4.
2. Bægertænderne kortere end kronen ..... septentrionalis
   " længere " " 3.
3. Blomsterstilkene meget længere end svøbet ..... elongata
   " højst lidt længere end svøbet maxima
4. Bladene m.m. tæt hårede eller randhårede af lange alm. hår ..... 5.
   " glatte eller dunede af korte stjærne- eller kroghår 6.
5. Unge blade tæt lådne i det mindste nær spidsen ..... villosa
   " " m.m. glatte, men tydeligt randhårede chamaejasme
6. Blomsterskaft, -stilke og bægre glatte ..... lactea
   " " " " dunede obtusifolia

Androsace maxima L. Storbægret fjældarve. 3-15cm. Stænglen med korte kirtelhår, ellers er planten glat eller spredt langhåret. Svøbbladene 6-12mm. IV. Spredt.

A. septentrionalis L. Fjældarve. 10-20cm. Noget dunet forneden med enkle og grenede hår. Svøbbladene 2-4mm. Blomsterstilkene mindst 3 x svøbet. IV-VI. ?

A. elongata L. Steppefjældarve. 2-10cm. Bladene fint randhårede. Stænglerne tætdunede med grenhår. Svøbbladene 3-8mm. Kronen hvid med gult svælg. IV-V. Spredt.

A. lactea L. Storkronet fjældarve. 3-15cm. Planten glat, kun med enkelte randhår i bladspidserne. Blomsterstilkene (1)2-4cm. Kronen hvid

med gul midte, 10-12mm bred. Bladene 12-25x0,5-1,5mm. VI-VII. Spredt.

Androsace obtusifolia All. Spatelfjældarve. 2-10cm. Bladene 7-14x2-3 mm, furede og randhårede. Stængler og blomsterstilke med 0,01-0,2mm lange, mest grenede, 1-8-strålede hår. VI-VIII. Sj.

A. chamaejasme Wulfen Dværgfjældarve. 3-7cm. Bladene 5-12x2-3mm; randhårene 0,5-1mm. Løsttuet med fladt udbredte rosetter. Kronen 7-9mm bred og hvid eller lyserød. VI-VII. Sj.

A. villosa L. ssp. arachnoidea (Schott & al.) Nyman Håret fjældarve. 2-3cm. Rosetbladene 4x1mm, lancetformede. Med udløbere. Skafterne 2-3cm med 1-5 hvide blomster med vinrød midte. VII-VIII. Spredt.

Cortusa matthioli L. Klokkekodriver. 20-40cm. Flerårig, håret roseplante. Bladene op til 12cm, runde, med 7-13 spidse lapper. 5-20 rødlilla blomster på ca.1cm, hængende, i skærm. Kronen 1/3 delt. V-VIII. Alm.

Soldanella. Alpeklokke. Bjærgplanter med runde til nyreformede, tykke, glatte og stedsegrønne rosetblade. Hængende, frynsede, lilla kroner.

S. pusilla Baumg. Liden alpeklokke. 3-8cm. Stænglen 1-blomstret. Kronen 1/4-1/5 frynset. Bladene ca. 10mm brede. V-VIII. Alm.

S. montana Willd. Åben alpeklokke. 5-25cm. Stænglen med 6(8) blomster. Kronen 3/5-3/4 frynset. Bladstilkene med stilkede kirtler på 0,4-0,8(1) mm; stilken 8-10 x længere end selve kirtlen. Bladene 2-6cm brede. V-VI.

S. hungarica Simonkai Stor alpeklokke. Stænglen med (1)2-8 blomster. Kronen mindst 1/3 frynset. Bladstilkskirtlerne 0,2-0,4(0,5)mm; stilken 2-5 x selve kirtlen. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. hungarica: 3-10cm høj. Mest med 2-4 blomster. Bladene 1-2cm brede. Kronen 1/3-1/2 frynset.
ssp. major (Neilr.) S.Paw.: -20(25)cm høj. Med 2-8 blomster. Bladene 3-6cm brede. Kronen 1/2-3/5 frynset.

Hottonia palustris L. Vandrøllike. V-VII. Spredt.

Cyclamen purpurascens Miller Ægte alpeviol. 5-15cm. Bladene afrundet hjærteformede, 2,5-8x2-6cm, m.m. helrandede, ofte med plettet overside. Blomsterne nikkende og rødlilla. VI-IX. Sj. Måske kun forvildet.

Lysimachia nemorum L. Lundfredløs. V-VII. Sj.

L. vulgaris L. Almindelig fredløs. VI-VII. Alm.

L. nummularia L. Pengebladet fredløs. V-VII. Alm.

L. punctata L. Prikbladet fredløs. VI-VIII. Alm.

L. thyrsiflora L. Duskfredløs. V-VII. Spredt.

Trientalis europaea L. Skovstjærne. V-VII. Sj.

Glaux maritima L. Sandkryb. V-VIII. Sj.

Centunculus minimus L. Knudearve. V-IX. Spredt.

Anagallis arvensis L. Rød arve. Blomsterstilkene 10-30mm. Kronbladene

5-7mm, med mange randhår, røde eller blå, ikke eller lidet savtakkede fortil. V-X. Alm.

Anagallis foemina Miller Blå arve. Blomsterstilkene 8-12mm. Kronbladene 4-5mm, med 0-få randhår, altid blå, mest utydeligt, uregelmæssigt savtakkede fortil. VI-IX. Alm.

Samolus valerandi L. Samel. VI-IX. Spredt.

PLUMBAGINACEAE

Plumbago europaea L. Blyrod. 30-100cm. Flerårig urt. Nedre blade langstilkede og ægformede, øvre siddende, øret omfattende, med melet underside. Bægeret 5-7mm, tæt stilkkirtlet på ribberne. Kronen blålilla med et rør på 1,5 x bægeret. VII-VIII. Jud.Constanţa: Mangalia, Hagieni.

Armeria. Fåreleger. De 4 arter regnes alle ind under A. maritima i Flora Europaea.

1. Ydre blade 1,5-3,5mm brede, indre 0,5-1mm brede ..... pocutica
   " og indre blade nogenlunde lige brede 2.
2. Hovederne 2-2,5(3)cm brede. Alpin plante på 5-25cm ..... alpina
   " 1-2(2,5)cm " . 15-60cm høj. Lavere forekomststeder 3.
3. 15-25cm. Bladene 0,8-1,2mm brede, tæt randhårede ..... maritima
   30-60cm. " 2-3(4)mm " , glatrandede barcensis

Armeria pocutica B.Pawł. 30-60cm. Ydre blade med 3(5) ribber; sideribberne dog kun synlige forneden. De indre svagt 3-ribbede. Alle blade kort randhårede. VI-VIII. Sj. Jud.Maramureş: Borşa ved V.Cizla, Polenile de sub Munte la Luhi og Straturi.

A. alpina (DC.) Willd. Alpefåreleger. Bladene 2-4(1,5-5)mm brede, mest glatte. VII-VIII. Spredt.

A. maritima (Miller) Willd. Engelskgræs. Hovedet 17-25mm bredt. Bægeret 5-5,5mm, rødbrunt. VI-VII. Jud.Bostriţa-Nasaud: Blajenii de Jos.

A. barcensis Simk. Hovedet 10-15mm bredt. Bægeret 6-7mm, grønt, hvidligt eller brungrønt. VI-VII. Jud.Brasov: Harman, Prejmer, Jud.Harghita: Lazareşti, Tuşnad, Borsec ? Moseplante.

Limonium. Hindebæger. Trådformet støvfang.

1. Bladene 2-6x0,5-2cm, oftest visne eller væk i blomst bellidifolium
   " 15-60x5-15cm, til stede under blomstringen 2.
2. Stængel og blade hårede ..... latifolium
   " " " glatte 3.
3. 1-blomstrede småaks. Tætknudrede dækblade ..... gmelinii
   2-blomstrede " . Dækbladene ikke knudrede serotinum

Limonium latifolium (Sm.) Kuntze Sølvhindebæger. 50-80cm. Bladene 25-60x8-15cm. Stænglens skæl 5-6mm. Ydre dækblad hindeagtigt, indre med en hindekant på 0,7-1mm. VII-IX. Sj.

L. gmelinii (Willd.) Kuntze 20-60cm. Bladene 2-11x2-3cm. Aksene 6-10mm og tætte. Indre dækblad udrandet, ydre hindeagtigt undtagen ribben.

Stænglens skæl indtil 25mm. VII-IX. Spredt.

Limonium serotinum (Rchb.) Pign. (L. vulgare ssp. s.) 30-50cm. Aksene 1-2cm lange. Ydre dækblad urteagtigt. Stænglens skæl 6-18mm. VII-VIII.

L. bellidifolium (Gouan) Dumort Gaffelhindebæger. 10-40cm. Toppens grene knudrede. Talrige golde topgrene. Ydre dækblad hindeagtigt med urteagtig ribbe. VII-VIII. Sj.

Goniolimon. Ligner Limonium, men har kantet stængel. Indre dækblad trekløvet. Hovedformet støvfang.

1. Aksene løse med 4-5 småaks pr. cm ..... besseranum
" tætte med ca. 8 småaks pr. cm 2.
2. Bægeret håret ..... tataricum
" glat collinum

Goniolimon tataricum (L.) Boiss. Hvidprikket hindebæger. 20-30cm. Bladene 2,5-15x0,5-3,5cm, tæt hvidprikkede ovenpå. Aksene 10-13mm. Dækbladene fintdunede. Indre dækblad 5,5mm. VI-VIII. Spredt.

G. collinum (Griseb.) Boiss. Randhåret hindebæger. 10-20cm. Bladene 3-12cm x 3-8mm, randhårede. Toppen svikkelagtigt halvskærmformet. Aksene 1cm, kugleformede. Indre dækblad 3,5-4mm. VI-VII. Sj. Østlig.

G. besseranum (Schultes) Kusn. 10-20cm. Bladene 3-8cm x 3-15mm, ikke randhårede, spredt hvidprikkede. Toppen pyramideformet. Aksene 1-2cm. Indre dækblad 3-4mm. VI-VIII. Spredt.

OLEACEAE

Jasminum fruticans L. Buskjasmin. 1/2-3m. Busk med spredte, trekoblede m.m. stedsegrønne blade med omvendt lancetformede småblade på 1-2cm. 4-kantede grene. Gule, lugtløse blomster på 1-2cm, 1-5 sammen, med smalt rør og skålformet, 12-15mm bred krave. V-VI. Sj. Jud.Constanţa.

Fraxinus. Ask.

1. Småbladene kortstilkede. Frugten med blivende bæger. 5-9 småblade 2.
" m.m. siddende. Frugten uden bæger 3.
2. Toppene ofte endestillede. Bladstilken mest m.m. glat ..... ornus
" kun akselstillede. " tæt dunet pennsylvanica
3. Knopperne sorte. Småbladene med flere takker end ribber ..... 4.
" brune. " " så mange takker som ribber 5.
4. Kviste og bladstilke tæt dunede ..... coriariifolia
" " " glatte excelsior
5. Kviste og bladstilke glatte ..... angustifolia
" " " tæt dunede pallisiae

Fraxinus ornus L. Bjærgask. 1-10m. Småbladene 2-3 x så lange som brede. Knopperne grålige eller brunlige, m.m. blåduggede. Kronblade forefindes, 5-6mm lange, linjeformede, hvide. Oprette klaser. IV-V. Spredt.

F. pennsylvanica Marshall Rødask. -20m. Barken brunligrød og lidt furet. Knopperne brune. Småbladene 8-15x2,5-5cm, svagt tandede til helrandede, m.m. dunede nedenunder. V-VI. Dyrket.

Fraxinus excelsior L. Ask. V. Alm.

F. coriariifolia Scheele -20m. V. Sj.

F. angustifolia Vahl ssp. oxycarpa (Bieb.) Franco Smalbladet ask. -40m 5-13 lancetformede småblade på 3-9x1-2,5cm. V. Alm.

F. pallisiae Wilmott Dunask. -25m. V. Spredt.

Syringa vulgaris L. Syren. IV-V. Spredt.

S. josikaea Jacq. Ungarsk syren. 1-4m. Bladene 6-12cm, m.m. elliptiske med spids eller bredt kileformet grund. Toppene 10-16cm, endestillede, mest enlige, med grundblade. Kronen mere rødlig i det. V-VI. Sj. Især M.Bihor og M.Gilau.

Ligustrum vulgare L. Almindelig liguster. VI-VII. Alm.

GENTIANACEAE

1. Blomsterne 6-8-tallige og gule. Blågrønne enårige .... Blackstonia
   " 4-5-tallige 2.
2. Kronen hjulformet med et meget kort kronrør ..... 3.
   " med veludviklet kronrør, kraven kan godt være hjulformet 4.
3. Enårig og grenet fra grunden ..... Lomatogonium
   Flerårig, " foroven Swertia
4. Enårige med lyserøde blomster ..... Centaurium
   Blomsterne ikke lyserøde 5.
5. Kronen ikke frynset, men med vedhæng mellem kronfligene Gentiana
   " frynset, men uden vedhæng mellem kronfligene Gentianella

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson Spydbitterling. 15-40cm. Vedludviklet bladroset. Øvre stængelblade sammenvoksede i hele deres bredde. Bægertænderne smalt linjeformede. VI-VIII. Stranden ved Constanţa.

B. serotina (Koch) Vollm. (B. acuminata) Høstbitterling. 10-30cm. Bladrosetten mangler eller dårligt udviklet. Øvre blade ikke helt sammenvoksede og derfor indsnørede midtpå. Bægertænderne lancetformede. Østlig.

Centaurium. Tusindgylden.

1. Blomsterne i en aksformet kvast ..... spicatum
   " " " halvskærmformet kvast 2.
2. 1-årede stængelblade. Grundbladene 1-3-årede, 3-5mm brede littorale
   3-årede " . " 3-7-årede, mest over 5mm brede 3.
3. Toårig. Bladrosetten veludviklet under blomstringen ..... erythraea
   Enårig. " væk under blomstringen pulchellum

Centaurium erythraea Rafn Marktusindgylden. 2 underarter:
ssp. erythraea: Stængel og bladrand jævne. Alm.
ssp. turcicum (Vel.) Melderis: Stængel og bladrand ru. Sj.

C. littorale (Turner) Gilmour ssp. uliginosum (W.& K.) Melderis. Strandtusindgylden. V-VIII. Sj.

C. pulchellum (Sw.) Druce Liden tusindgylden. VI-IX. Spredt.

Centaurium spicatum (L.) Fritsch Akstusindgylden. 10-55cm. Oftest med bladroset. Blomsterne 12-14mm. V-X. Sj.

Gentiana. Ensian.

1. Med blomster i et endestillet hovede ..... 2.
   Blomsterne aldrig i endestillede hoveder 5.
2. Kronen gul eller gullig, 5-8-tallig ..... 3.
   " blå og 4-tallig 4.
3. Kronen rent gul, fliget til grunden ..... lutea
   " smudsiggul, ofte mørkprikket, korttandet punctata
4. Bægertænderne bredt trekantede, mest meget under røret .. cruciata
   " m.m. linjeformede, ca. = røret phlogifolia
5. Enårig uden golde skud ..... 6.
   Flerårig med golde skud 7.
6. Bægeret med 2-3mm brede vinger. Kronen 12-20mm bred ... utriculosa
   " kantet. Kronen 8-12mm bred nivalis
7. Kronrøret valseformet, 1,5-2(3)cm langt ..... 8.
   " tragtformet, 2,5-4cm langt 9.
8. Bægerrøret med 1-2mm brede vinger. Grundbladene mest 10-30mm verna
   " højst 1/2mm bredt vinget. " 4-10mm orbicularis
9. 20-80cm høj. Ingen grundbladsroset. Stængelbladene 3-8cm ..... 10.
   5-12cm " . Med en " . " 1-2cm 11.
10. Bladene 2-4cm brede, med 3-5 ribber. Ensidige blomster asclepiadea
    " 4-6mm " , " 1 ribbe. Alsidige blomster pneumonanthe
11. Kronen gullighvid med blå striber ..... frigida
    " blå 12.
12. Tværtafskårne indskæringer mellem bægertænderne ..... acaulis
    Spidse indskæringer mellem bægertænderne clusii

Gentiana lutea L. Gul ensian. 50-120cm. Bladene mest ægformede til elliptiske, op til 25cm, buestrengede med 5-7 årer. Blomsterne i kranse, 2-3cm. VII-VIII. Spredt.

G. punctata L. Prikket ensian. 20-60cm. Kronen 25-35mm med korte, oprette kronflige. Oprette bægertænder. VII-VIII. Spredt.

G. asclepiadea L. Svalerodsensian. 15-60cm. Oftest flerstænglet. Bladene æg-lancetformede og langt tilspidsede, tydeligt netårede. Blomsterne 3,5-5cm, 1-3 sammen i de øvre bladhjørner. VII-IX. Alm.

G. pneumonanthe L. Klokkeensian. VII-X. Spredt.

G. frigida Haenke Hvid ensian. 5-10cm. Kronen 2-3,5cm, med blå striber og pletter (i svælget). Butte bægertænder. VII-IX. Sj.

G. cruciata L. Korsensian. 15-40cm. Oftest flerstænglet med grundroset Bladene 3-årede og omskedende. Kronen 2-2,5cm, blålig til grønlig udvendigt og rent blå indvendigt. Kronen ca. 3 x bægeret. VII-X. Spredt.

C. phlogifolia Schott & Kotschy 10-20cm. Som foregående, men kronen ca. 2 x bægeret. VII-IX. Sj. M.Rodnei, M.Giurgeu, Ceahlau, M.Ciucaş, M.Birsei, M.Bucegi, M.Leaota, M.Fagaraş.

Gentiana clusii Perr.& Song. Storblomstret ensian. 5-10cm. Bægerflige-ne bredest ved grunden. Kronrøret uden grønne prikker indvendigt. Sj.

G. acaulis L. Tragtensian. 8-15cm. Bægertænderne oftest lidt indsnøre-de forneden. Kronrøret med olivengrønne prikker indvendigt. VI-VII.Alm.

G. verna L. Vårensian. 3-12cm. Grundbladene lancetformede og spidse. Et lille tolappet vedhæng mellem kronfligene. IV-VII. Alm. 2 ssp.:
ssp. verna: Bægeret ca. 6mm bredt, vingerne ca. 1mm brede, lige brede i hele længden.
ssp. alata (Griseb.) Lemke: Bægeret 7-10mm bredt, vingerne indtil 2mm brede, tydeligt bredere midtpå eller i nedre halvdel.

G. orbicularis Schur (G. favratii) Rundbladet ensian. 3-6cm. Tæppedan-nende med mange golde skud. Nedre blade 6-8x5-7mm. Blomsten sidder højst 2mm over det øverste bladpar. VII-IX. Sj.

G. nivalis L. Sneensian. 3-12cm. Spinkel, ofte grenet fra grunden og med mange blomster. Bægerrøret 6-7x2-4mm. Kronrøret 10-18mm. Alm.

G. utriculosa L. Opblæst ensian. 8-15(25)cm. Ofte grenet og flerblom-stret. Kronrøret 15-20mm. Kronfligene 5-8mm, stærkt blå. V-VIII. Spredt

Gentianella. Ensian.

1. Kronfligene med delvist frynset rand ..... ciliata
" uden frynset rand 2.
2. Blomsterne mest 4-tallige ..... 3.
" " 5-tallige 4.
3. Kronen 15-30mm. 2 meget brede + 2 smalle bægertænder ..... baltica
" indtil 12mm. Bægertænderne ens tenella
4. Bægerrøret meget kortere end tænderne. Kronen 12-20mm .. bulgarica
" mindst 1/2 x tænderne 5.
5. Kronen 16-18mm. Kapsel og frugtknude m.m. siddende ..... amarella
" 18-45mm. " " " stilkede 6.
6. Kronen 24-45mm. Bægeret 3/5 delt ..... austriaca
" 18-25mm. " højst 1/2 delt lutescens

Gentianella tenella (Rottb.) Börner Spæd ensian. 2-10cm. Bladene 3-6 x så lange som brede, de nedre 10-12mm. Kronen mest himmelblå, røret 2-4 x så langt som bredt. Blomsterne langstilkede. VII-IX. Sj.

G. ciliata (L.) Borkh. Frynset ensian. 6-25cm. Toårig. Kronen 35-50mm og firtallig, blå, med udstående flige, der er frynsede i den indre halvdel langs randen. VIII-IX. Spredt.

G. baltica Murb. Baltisk ensian. VII-IX. 1 fund fra Cluj-Napoca.

G. amarella (L.) Börner Smalbægret ensian. ?

G. bulgarica (Velen.) Holub Bulgarsk ensian. 4-10cm. Grenet fra grun-den. Blomsterstilken længere end bægerrøret. Bægertænderne 2-3 x røret. Kronen 12-20mm, hvidlig eller bleglilla. VIII-IX. M.Girbova (Cumpatu, Gagu), M.Bucegi (alm.), M.Birsei (Piatra Mare, Piatra Craiului).

Gentianella austriaca (Kerner) Holub Østrigsk ensian. 5-25cm. Ofte grenet fra grunden. Blomsterstanden noget halvskærmformet. Kronen ofte noget rødligt lilla. VI-IX. Sj.

G. lutescens (Velen.) Holub (G. praecox) Gullig ensian. 5-30cm. Ugrenet eller grenet før oven. Blomsterstanden mest lidt kegleformet. Kronen mest rødligt lilla, ellers gullig. VI-IX. Alm.

Lomatogonium carinthiacum (Wulfen) Rchb. Lav furekapsel. 5-9cm. Stænglerne firkantede. Bladene æg- til lancetformede, 7-18x4-7mm. Kronen 12-18mm bred, blegblå til hvid. Langstilkede blomster. VI-IX. M.Bucegi

Swertia perennis L. Stjærneensian. 15-60cm. Nedre blade i en slags roset, 4-10x1-2cm. Blomsterne i en åben kvast. Kronen spidsfliget, mørkt skidenlilla; fligene 10-16mm, ca. 2 x bægeret. VII-IX. Spredt.

S. punctata Baumg. 10-35cm. Som foregående, men kronen grønliggul med lilla prikker, ikke meget længere end bægeret. VI-VII. Sj.

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata L. Bukkeblad. V-VI. Spredt.

Nymphoides peltata (Gmelin) Kuntze Søblad. VII-IX. Spredt.

APOCYNACEAE

Vinca minor L. Liden singrøn. Stængelgrunden forveddet. Bladenes sideribber udgår under en vinkel på 30-50°. III-VI. Alm.

V. herbacea W.& K. Smalbladet singrøn. 30-60cm. Stænglerne urteagtige, visner om vinteren ligesom bladene. Disse smallere end hos minor. Sideribberne næppe synlige eller udgår under en vinkel på 10-30°. V-VI. Alm.

ASCLEPIADACEAE

1. Forveddede slyngplanter ..... 2.
   Urter 3.
2. Bladgrunden dybt hjærteformet ..... Cynanchum
   " afrundet til kileformet Periploca
3. Kronen grumsetrosa ..... Asclepias
   " ikke rød Vincetoxicum

Periploca graeca L. Træranke. 2-10m. Bladene bredt elliptiske, 4-12 x 2-7cm, hindeagtige, stilkede. Mangeblomstrede, akselstillede kvaste. Blomsterne ca. 2cm brede, mørkt brunlilla med grønlig yderside.IV-VI.Sj

Asclepias syriaca L. Kæmpesilkeplante. 1-1,5m. Adskillige oprette stængler med 15-23cm lange, modsatte, omvendt lancetformede blade. Mangeblomstrede 6-12cm store, kugleformede skærme fra de øvre bladhjørner. VI-VIII. Indslæbt.

Cynanchum acutum L. Spids svalerod. 1-3m. Bladene spidst ægformede. Tætte skærme i bladhjørnerne på 1-6cm lange stilke. Kronen hvid eller blegrød, 8-12mm bred. VI-VII. Spredt.

Vincetoxicum. Svalerod.

1. Kronen mørk ..... 2.
" hvid eller hvidgul 3.
2. Kronfligene hårede indvendigt ..... scandens
" glatte fuscatum
3. Kronfligene dunede indvendigt ..... rehmannii
" glatte hirundinaria

Vincetoxicum scandens Somm.& Lev. Slyngende svalerod. 80-150(200)cm. Stænglen slyngende og fintdunet. Bladene 9-13x4-8cm. Kvaststilkene 1-5 cm. Kronen mørklilla, 8mm bred. V-VIII. Letea i Donau-deltaet.

V. fuscatum (Hornem.) Rchb.f. (V. minus) Brun svalerod. 20-40cm. Opret. Bladene 3-6,5x1,5-4cm. Kvaststilkene indtil 5mm. Kronen brun, 8-10 mm bred. V-VII. Jud.Constanţa: Murfatlar. Jud.Tulcea: Magurele.

V. rehmannii (Boiss.) 80-150cm. V-VIII. Jud.Tulcea: Babadag. - Måske en farvevariant af V. scandens.

V. hirundinaria Med. Svalerod. V-VIII. Alm.

POLEMONIACEAE

Polemonium coeruleum L. Jakobsstige. 30-90cm. Flerårig urt med uligefinnede blade med oftest 10-12 lancetformede bladpar. Lyseblå, 8-15mm brede, nærmest hjulformede blomster i svikler i en endestillet top. VI-VII. Spredt.

CONVOLVULACEAE

Cuscuta. Silke.

1. 1 griffel. Blomsterne i akslignende stande ..... 2.
2 grifler. " mest i hoveder 3.
2. Griflen i frugt 2-3 x støvfanget ..... lupuliformis
" " " ca. = " monogyna
3. Støvfangene hovedformede ..... 4.
" forlængede 8.
4. Blomsterne i løse nøgler. Kronfligene oprette ..... suaveolens
" i tætte " 5.
5. Kronfligene trekantede og spidse ..... 6.
" ægformede og butte 7.
6. Kronfligene længere end kronrøret ..... bassarabica
" højst lig kronrøret campestris
7. Blomsterne 5-tallige ..... cesatiana
" 4-tallige tinei
8. Bægerrøret gyldent, skinnende og netåret som tørt .... approximata
" anderledes 9.
9. Griflerne kortere end frugtknuden. Hovederne 10-15mm brede .... 10.
" mindst lig " . " 5-10mm " 11.
10. Stænglen næsten ugrenet. På Alm. hør ..... epilinum
" stærkt grenet. Mest på Nælde eller Humle europaea
11. Blomsterne 4-5mm. Kronrøret 1,6-2,7mm ..... trifolii
" 1,5-3mm. Kronrøret indtil 1,5mm 12.
12. Bægertænderne aflange, længere end røret ..... planiflora
" trekantet-ægformede, spidse, ca. = røret epithymum

C. tinei Insenga (C. australis ssp. t.) Firtallig pileurtssilke. Bægeret ca. = kronrøret. Kronskællene ofte meget små. VI-IX. Spredt.

C. cesatiana Bertol. (C. australis ssp. c.) Femtallig pileurtssilke. Bægeret ca. = kronrøret. Kronskællene når næsten støvdragerne. VI-IX.

C. campestris Yuncker Svinesilke. Bægeret ca. = kronrøret. Kronfligene ca. = kronrøret. Kronskællene lange og tætfrynsede. V-XI. 2 underarter: ssp. campestris: Blomsterne 2-4mm, ofte 10-25 i hovederne. ssp. pentagona (Engelm.): Blomsterne indtil 2(2,5)mm, mest 3-10 sammen.

C. bassarabica Buia V-X. Sj.

C. suaveolens Ser. Vellugtende silke. Hovederne 8-12mm brede. Bægeret 1/3-1/2 x kronrøret. Kronfligene 1/2 x kronrøret. Kronskællene når støvdragernes grund. Kapslen 3-4mm. Mest på dyrkede Kløver og Lucerne. Sj.

C. europaea L. Nældesilke. V-X. Alm.

C. epilinum Weihe Hørsilke. Gulgrøn. Bægeret = kronrøret. Kronfligene kortere end kronrøret, mest oprette. Kronskællene kortere end kronrøret. På Hør og Camelina sativa. VI-IX. Alm.

C. trifolii Bab. Kløversilke. VI-IX. Mest på Ærteblomster. Alm. 2ssp: ssp. trifolii: Bægeret kortere end kronen. Nøglerne 8-10mm brede. ssp. prodanii (Buia): Bægeret ca. = kronen. Nøglerne 10-15mm brede.

C. epithymum (L.) L. Lyngsilke. Kronrøret lidt længere end bægeret. Kronen mest lyserød. Stænglerne ofte rødlige eller rødlilla. Griflerne 2 x frugtknuden. V-X. Alm.

C. planiflora Ten. Hvidblomstret silke. Bægeret lig kronrøret, med fortykkede og halvt cylindriske tænder. Kronen hvid, dens flige = kronrøret.

C. approximata Bab. Fluevingesilke. Bægeret gulligt og fluevingeagtigt i tør tilstand, tænderne ender i en kort knude. Nøglerne 7-12mm brede.

C. lupuliformis Krocker Pilesilke. Stænglen ofte rødlig. Bægeret 1/3-1/2 x kronrøret. På Pil og andre træer. VI-IX. Alm.

C. monogyna Vahl Engriflet silke. Bægeret 2/3-1 x kronrøret. Mest på buske og træer. VI-IX. Spredt.

Calystegia sepium (L.) R.Br. Gærdesnerle. Forbladene dækker ikke bægeret helt, flade, 15-18x10-13mm. V-IX. Alm.

C. silvatica (W.& K.) Griseb. Skovsnerle. Ligner den foregående, men forbladene dækker bægeret helt, opblæste, 20-35x14-30mm. Kronen mest 5-9cm. VI-VII. Spredt.

Convolvulus. Snerle.

1. Stænglen m.m. slyngende. Bladgrunden hjærte- til pilformet ..... 2.
   " ikke " . " afrundet til tilsmalnet 3.
2. Bladene dybt fligede. Kronen katostrød ..... elegantissimus
   " m.m. helrandede. Kronen hvid til blegrød arvensis
3. Bladgrunden afrundet til bredt kileformet. Strandplante .. persicus
   " jævnt tilsmalnet i stilken 4.

4. Stænglen i det mindste forneden mest udstående behåret cantabrica
" tiltrykt silkehåret lineatus

Convolvulus persicus L. Sandsnerle. 20-40cm. Krybende, forveddet stængel med oprette grene. Bladene faste, elliptisk-aflange, afrundede fortil. Kronen 3-4,5cm, hvid. VI-VII. Sj. Jud-Constanţa: Constanţa la Mamaia, Agigea, Eforie. Jud-Tulcea: Sf.Gheorghe, Cardon, Sfiştofca.

C. lineatus L. Smalbladet snerle. 10-20cm. Flerårig. Bladene linjeformede til elliptiske, de nedre med udvidet, hindeagtig grund. Kvaststilkene meget kortere end støttebladene. Blegrød krone. VI-VII. Sj.

C. cantabrica L. Rank snerle. 15-40cm. Nedre blade uden hindeagtig grund; ellers linje- til omvendt lancetformede. Nedre kvaststilke længere end støttebladene. Lyserød krone. V-VII. Spredt.

C. arvensis L. Agersnerle. V-IX. Alm.

C. elegantissimus Miller Syvfliget snerle. 30-100cm. Bladene næsten helt delte i 7 smalle, helrandede flige. Kronen 2-3cm bred. V-VI. Sj.

Ipomoea purpurea (L.) Roth Rød tragtsnerle. 1-4m. Mest enårig. Kronen 4-6cm, blå, lilla eller lyserød. Bladene hjærteformede, 5-15cm. Støvfanget med hovedformede lapper (trådformede hos Convolvulus). Forvild.

BORAGINACEAE

1. Kronen hjulformet med ganske kort rør ..... 2.
" med veludviklet rør 3.
2. Kronen med spidslappede flige ..... Borago
" " butlappede flige Omphalodes
3. Blomsterne uden støtteblade ..... 4.
" med " 11.
4. Kronen uden kronskæl, hvid ..... 5.
" med " , ikke hvid 6.
5. Kronen tragtformet, 8mm bred. Nødderne kødede ..... Argusia
" skålformet. Nødderne tørre Heliotropium
6. Kronen valse- til kegleformet ..... 7.
" tragt- eller hjulformet 8.
7. Kronen 1/3 lappet, gul. Nødderne skiveformede, 14mm brede Rindera
" ganske kortlappet. Nødderne indtil 6mm, ægformede Symphytum
8. Nødderne åbentsiddende og piggede ..... Cynoglossum
" uden pigge, højst med tornet rand 9.
9. Nødden navleformet udhulet. Kronrøret kort ..... Omphalodes
" ikke udhulet. Kronrøret tydeligt 10.
10. 2-8cm høj flerårig. Bladhårene = bladbredden ..... Eritrichium
Bladhårene kortere end bladbredden Myosotis
11. Kronen valseformet, hængende, m.m. gule ..... 12.
" tragtformet eller med udbredt krave 13.
12. Planten glat, men ofte hvidknudret ..... Cerinthe
" stivbørstet Onosma
13. Frugtbægeret forstørret, fladtrykt og tandet ..... Asperugo
" ikke fladtrykt eller tandet 14.

14. Nødderne piggede og m.m. fritsiddende ..... 15.
" ikke piggede 16.
15. 2 nødder. Kronen 2-4mm, blå ..... Rochelia
4 " Lappula
16. Kronen med veludviklede svælgskæl ..... 17.
" uden svælgskæl eller blot med udbugtninger 18.
17. Svælgskællene glatte. Kronen lyseblå ..... Myosotis
" hårede eller kirteltandede Anchusa
18. Kronrøret krumt. Kronen lidt uregelmæssig ..... Echium
" ret. Kronen regelmæssig 19.
19. Bægeret delt næsten til grunden ..... 20.
" højst 2/3 delt 21.
20. Nødden med stilket grund Kronen mørkeblå hele tiden ..... Alkanna
" stilkløs. Kronen hvidlig eller først rødlilla Lithospermum
21. Bægeret trindt, oppustet som modent ..... Nonea
" 5-kantet Pulmonaria

Argusia sibirica (L.) Dandy 10-40cm. Krybende jordstængel. Opret. Bladene 1-4cm. Korte, fåblomstrede svikler. Kronrøret 6-7mm, ca. 2 x bægeret. Kronen håret udvendigt. Frugten 6-10mm. V-VIII. Sj. på sandstrand.

Heliotropium. Skorpionsurt.

1. Flerårig. Bladene m.m. aflange, indtil 4x1cm ..... curassavicum
Enårig. Bladene m.m. ægformede. Bispestavsformede svikler 2.
2. Bægeret under 1/4 delt, bliver pæreformet og tykt i frugt supinum
" delt næsten til grunden 3.
3. Kronen 4-6,5mm lang og 4,5-8mm bred ..... suaveolens
" 2-5mm lang og 2-4(5)mm bred 4.
4. Støvfanget kegleformet, mest finvortet eller håret ..... dolosum
" linje-sylformet, oftest glat europaeum

Heliotropium europaeum L. Alm. skorpionsurt. 5-40cm. Oftest opret. Grågrøn og tiltrykt dunet. Bladene mest 2-3x1-2cm, stilken 1-1,5cm. Bægerbladene 0,4-0,8mm brede. V-VII. Spredt.

H. dolosum De Not. Kystskorpionsurt. 5-40cm. Bægerbladene 0,8-1,1mm brede, ellers som foregående. V-VII. Sj. Jud.Tulcea

H. suaveolens Bieb. Vellugtende skoprionsurt. 5-40cm. Blomsterne vellugtende. Bægeret 4-6,5mm. Frugten mest håret. V-VIII. Sj.

H. curassavicum L. 20-50cm. Liggende, glat, ret blågrøn og kødet. Sviklerne ikke bispestavsformede, 2-6cm. Kronen 1-2,5mm. VI-X. Forvild.

H. supinum L. Lav skorpionsurt. 10-30cm. Ligner europaea, men hvidfiltet, med opret midtergren og udstrakte sidegrene. VI-VIII. Sj.

Lithospermum. Stenfrø.

1. Blomsterne mørkeblå. Flerårig ..... purpurocaeruleum
" hvidlige 2.
2. Planten stærkt kirtlet. Enårig ..... glandulosum
" ikke eller ganske svagt kirtlet 3.

3. Bladene med tydelige sideribber. Flerårig ..... officinale
" uden " " . Enårig arvense

Lithospermum officinale L. Lægestenfrø. V-VI. Alm.

L. purpurocaeruleum L. Blåt stenfrø. 15-60cm. M.m. oprette stængler i større bevoksninger. Bladene lancetformede, spidse, 3,5-8cm. Blomsterne først rødlilla, siden mørkeblå, 14-19mm, ca. 1cm brede. V-VI. Alm.

L. arvense L. Agerstenfrø. V-VII. Alm.

L. glandulosum Velen. Kirtelstenfrø. 10-30cm. Nær foregående, med mange, oprette stængler. V-VII. Spredt.

Onosma. Æselurt. Lysegule, kortlappede, hængende blomster.

1. Bladundersidens børster enkle ..... 2.
" " med stjærneformet grund 3.
2. Kronens yderside stort set glat ..... lypskyi
" " kort udstående håret macrochaetum
3. Begge bladsiders børster med stjærneformet grund. Kronen 20-24mm 4.
Oversidens børster med enkel grund. Kronen 13-16mm 5.
4. Nedre støtteblade mindst = bægeret. Glat krone ..... tauricum
" " kortere end bægeret. Dunet krone heterophyllum
5. Børsternes grund med 8-10 stråler. Korte hår mellem børsterne arenarium
Børsternes grund med 4-5 stråler. Ingen hår mellem børsterne pseudoarenarium

Onosma lypskyi Klokov 30-60cm. Støvknapperne frie, kun sammenvoksede ved grunden, med et 1mm langt endevedhæng. Støvtrådenes frie del 2,5-3 mm. Planten grenet fra omkring midten. V-VII. Jud.Tulcea: Caugagia, Visterna, Babadag.

O. macrochaetum Klokov & Dobrocz. (O. visianii p.p.) 30-60cm. Støvknapperne rørformet sammenvoksede og udragende, vedhænget ca.2mm. Støvtrådenes frie del 5,5-6mm. Planten grenet fra grunden. V-VII. Spredt.

O. tauricum Pallas 10-40cm. Bægeret mest med enkle børster. Kronen 2-3 x bægeret. V-VI. Sj. Jud.Constanţa.

O. heterophyllum Griseb. 15-40cm. Bægeret med enkle samt nogle stjærneborster med korte stråler. Kronen ca. 2 x bægeret, tilsmalnet fra spidsen mod grunden. VI-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp. heterophyllum: Kronen 20-24mm, 6-7mm bred foroven. Grenet foroven.
ssp. banaticum (Sandor): Kronen 25-30mm, 5-6mm bred foroven. Stænglen grenet fra midten.

O. arenarium W.& K. Sandæselurt. 30-60cm. Mangegrenet. Nedre blade 4,5-18cm x 4-13mm. VI-VII. Spredt.

O. pseudoarenarium Schur Stenæselurt. 30-80cm. Som den foregående. V-VI Spredt.

Cerinthe minor L. Fligkronet voksurt. 15-45cm. Blågrøn 1-2-årig. Øvre blade ægformede med omfattende grund. Kronen 10-12mm, 1/2 delt, med op-

rette, spidse flige, gul. VI-VII. Alm.

Cerinthe auriculata Ten. Purpurvoksurt. 20-40cm. Flerårig. Som foregående, men kronen lilla omkring midten og ofte også på tænderne. VI-VII. Sj. Jud.Ilfov: Comana. Jud-Tulcea: Babadag.

C. glabra Miller Alpevoksurt. 20-40cm. Flerårig. Som de foregående, men kronen 8-13mm, med små, udadbøjede, lapper foroven; gul, ofte med 5 mørkerøde pletter i svælget. V-VII. Spredt.

Alkanna tinctoria (L.) Tausch Farvestilkfrø. 15-30cm. Tæt stivhåret flerårig. Forneden med rester af visne blade. Nedre blade smalt spatelformede, øvre linjeformede. Kronen mørkeblå med tragtformet krave og et kronrør på 6-7mm. V-VII. Sj.

Echium vulgare L. Alm. slangehoved. VI-IX. Alm.

E. italicum L. Blegt slangehoved. 40-100cm. Opret toårig med en enkelt kraftig stængel og en m.m. stærktgrenet, stor, ret smal stand. Kronen 10-12mm, blegt gråbrun, meget smalt tragtformet. VI-VIII. Spredt.

E. russicum Gmelin Rødt slangehoved. 30-100cm. Kronen blodrød, m.m. tragtformet, 9-12mm, 4-6 x bægeret. VI-VII. Alm.

Pulmonaria. Lungeurt.

1. Kronen rød hele tiden ..... 2.
" højst rød i begyndelsen, ellers blå eller lilla 3.
2. Bladet jævnt tilsmalnet i stilken, blødt håret ..... filarszkyana
" brat " " " , ruhåret rubra
3. Grundbladene med hjærteformet eller afskåret grund ..... 4.
" " tilsmalnet grund 5.
4. Grundbladene hvidplettede, pladen længere end stilken officinalis
" uplettede, pladen kortere end stilken obscura
5. Stænglen foroven samt sviklerne tæt børstehårede og med kortere kirtelhår. Støvknapperne mest sortlilla ..... mollis
Stænglen foroven samt sviklerne tæt kirtelhårede og med få børster. Støvknapperne gule mollissima

Pulmonaria obscura Dum. Almindelig lungeurt. III-V.

P. officinalis L. Hvidplettet lungeurt. III-V.

P. rubra Schott Rød lungeurt. 15-30cm. Stængelbladene indtil 5mm nedløbende, de nederste tydeligt mindre end grundbladene. V-VII. Alm.

P. filarszkyana Jav. 15-30cm. Stængelbladene 1-2cm nedløbende, de nederste ikke meget mindre end grundbladene. V-VII. M.Maramureş, M.Rodeni, Obcinele Bucovinei.

P. mollis Wulfen Blød lungeurt. 15-35cm. Grundbladene uplettede med blødhåret overside. Stænglens øvre del samt blomsterstanden med kirtelhår. III-V.

P. mollissima A.Kerner Nær foregående.

Nonea atra Griseb. Sortrød kosakurt. 10-45cm. Planten uden kirtelhår.

Stængler og bladstilke tæt dunede med hår på 1,5-3mm med knudeformet grund. Kronen sortrød, 10-14mm. V-VI. Spredt.

Nonea pulla (L.) DC. Brun kosakurt. 20-50cm. Planten tæt og kort kirteldunet samt børstehåret. Bladene tæt tiltrykt blødhårede. Kronen 10-14mm, brunlilla. V-VII. Alm.

N. pallens Petrovic Bleg kosakurt. 15-35cm. Planten kirteldunet og spredt børstehåret. Kronen ca. 8mm, bleggul eller hvid. Bægeret 5-8 i blomst, 10-15 i frugt, 3/5 delt. V-VI. Jud.Mehedinţi.

Symphytum. Kulsukker.

1. Støvtråden ca. så bred som støvknappen. Kronen tit lilla officinale
" smallere end støvknappen. Kronen bleggul eller hvid 2.
2. Kronskællene udragende. Kronen 5-7mm ..... ottomanum
" indesluttede. Kronen 10-20mm 3.
3. Nedre blade tilsmalnede i bladstilken ..... tuberosum
" " med afrundet, afskåret eller hjærteformet grund 4.
4. Stænglen ugrenet. Grundbladene indtil 25cm x 10-17cm .... cordatum
" grenet. Nedre blade 6-7x3-4cm, kortstilkede tauricum

Symphytum officinale L. Lægekulsukker. V-VIII. Alm. 2 underarter: ssp. officinale: Stænglen tydeligt vinget. Bladene børstehårede. ssp. uliginosum (Kerner) Nyman: Stænglen næppe vinget. Bladene med spredte, meget korte børster.

S. tuberosum L. ssp. nodosum (Schur) Soó Knoldkulsukker. 12-50cm. Med rodknolde. Stænglen kantet, delvist vinget. De større blade 7-9x3-4 cm. Kronen 13-19, bleggul. IV-V. Alm.

S. cordatum W.& K. Hjærtebladet kulsukker. 15-35cm. 2-4 stængelblade, de nedre store og langstilkede, med hjærteformet grund. Kronen 13-18mm og bleggul. V-VI. Alm.

S. tauricum Willd. Orientalsk kulsukker. 20-60cm. Bladene med svagt hjærteformet til afrundet grund. Kronen 9-12mm, bleggul. IV-V. Sj. Jud.Tulcea, Jud.Vaslui.

S. ottomanum Friv. Småblomstret kulsukker. 40-60cm. Bladene m.m. ægformede med afrundet-kileformet grund, de øvre siddende og lidt nedløbende. IV-VII. Sj.

Anchusa. Oksetunge.

1. Kronrøret krumt. Kronen lidt uregelmæssig, lyseblå ..... 2.
" ret. Kronen regelmæssig 3.
2. Kronrøret krummet omtrent midtpå ..... arvensis
" " under midten orientalis
3. Kronen bleggul ..... ochroleuca
" ikke gul 4.
4. Kronrøret meget kortere end kraven ..... barrelieri
" mindst lig kraven 5.
5. Griflen 2-3 x frugtbægeret ..... stylosa
" kortere i frugt 6.

6. Bægertænderne butte ..... 7.
" spidse 9.
7. Planten halvglat eller med børsterne under 1mm ..... gmelinii
" med børster på over 1mm 8.
8. Planten m.m. grå. Kronen 6-8mm, rødlilla, senere blå leptophylla
" grøn. Kronen bredere, blegblå eller rødlilla velenovskyi
9. Kronen bleglilla til hvidlig, kraven 5-7mm bred ..... thessala
" mørklilla til mørkeblå, " 7-15mm " 10.
10. Nødderne 7-10x2-3mm. Kronen mørkeblå ..... azurea
" ca. 2x4mm. " mest mørklilla 11.
11. Støttebladene bredt og skævt trekantede ..... procera
" lancetformede officinalis

Anchusa leptophylla R.& Sch. Gråhåret oksetunge. 40-70cm. (2-)flerårig. Med tætte, korte, bløde hår uden knudret grund. Bladene 5-10cm. Ofte flere, korte, tætstillede svikler. V-VII. Spredt.

A. gmelinii Ledeb. Ru oksetunge. 30-80cm. Opret flerårig. Bladene 5-15 cm x 3-8mm. Sviklerne korte, få eller enlige. Bægeret højst 1/2 delt. Kronen lilla eller blegblå, 7-10mm bred. VI-VII. Jud-Galaţi.

A. ochroleuca Bieb. Gul oksetunge. 30-80cm. Hårene tætte, korte, bløde, tiltrykte, mest uden knudret grund. Flere, korte, tætstillede svikler. Bægeret højst 1/2 delt. V-VII. Spredt.

A. officinalis L. Lægeoksetunge. Frugtbægeret ca. 10mm. Griflen rager ud af bægeret. Nøddernes knuder m.m. adskilte. V-IX. Alm.

A. procera Besser 60-170cm. Nær foregående. Frugtbægeret 7-8mm. Griflen ikke udragende. Nøddernes knuder rører hinanden. VI-VII. Spredt.

A. velenovskyi (Gusuleac) Stoj. Nær de 2 foregående, men bægeret 3-5 mm. Kystområderne.

A. azurea Miller (A. italica) Blå oksetunge. 60-130cm. 2-flerårig. Kronen ganske stor, 10-15mm bred, med hvide, hårede svælgskæl. Bægeret dybt delt. Blomsterne 1-2cm adskilte i frugt. V-VII. Spredt.

A. thessala Boiss.& Spr. Bleg oksetunge. 10-40cm. Enårig. Børsterne med stærkt knudret grund. Sviklerne parvise og korte. Støttebladene ca. = kronen. Bægeret delt næsten til grunden. V-VI. Sydøst.

A. stylosa Bieb. Langgriflet oksetunge. 15-40cm. Enårig med spredte, kraftige hår med knudret grund. Bladene ofte finttandede. Sviklerne korte og parvise. Kronen blålilla, 7-10mm bred. V-VI. Spredt.

A. barrelieri (All.) Vitman Topoksetunge. 50-100cm. Mange kvaste i en topformet stand. Bægeret 2-3mm, op til 6mm i frugt, tænderne meget butte. Kronrøret 1-1,5mm. Kronen 7-10mm bred, blå til blålilla. V-VI. Alm.

A. arvensis (L.) Bieb. Krumhals. Bladene lancetformede, randen ofte bølget. Børsterne kraftige og stive. Svikkelaksens børster ca. 2mm, vandret udstående. Sviklen ret tæt. V-IX.

Anchusa orientalis (L.) Rchb.f. Bladene bredt lancetformede, næppe bølgede i randen, deres børster tynde og dunagtige. Svikkelaksens børster ca. 1mm, oprette til tiltrykte. Frugtsviklen meget åben.

Borago officinalis L. Hjulkrone.20-60cm. Stivhåret, opret enårig med 2-3mm lange børster. Kronen med et ganske kort hvidligt rør og vandret udstående kronflige på op til 15mm. Støvdragerne rørformet fremadrett..

Asperugo procumbens L. River IV-V. Spredt.

Rochelia disperma (L.f.) C.Koch Ringbæger. 5-20cm. Kronen 2-4mm, blå, med valseformet rør og lille, tragtformet krave. Bægeret helt delt, til sidst ringformet indadbøjet over frugterne. IV-V. Sj.

Myosotis. Forglemmigej.

1. Bægeret med 1 slags hår, alle tiltrykte og rette; højst 1/2 delt 2.
" " kroghår eller med udstående samt tiltrykte hår 4.
2. Bægertænderne længere end brede ..... laxa
" så lange som " 3.
3. Nedre bladundersider med tilbagerettede hår på 0,6-1mm .. nemorosa
" " " fremadrettede hår på 0,3mm scorpioides
4. Flerårig ..... 5.
Enårig 8.
5. Rosetbladene tydeligt stilkede. Nødden but ..... 6.
" jævnt tilsmalnede. " spids 7.
6. Stængelbladene spidse. Bægerhårene m.m. tiltrykte .... stenophylla
" ej " . " m.m. udstående alpestris
7. Kronrøret højst så langt som bægeret ..... silvatica
" længere end bægeret decumbens
8. Frugtstilkene 1,5-2 x bægeret ..... 9.
" lig eller kortere end bægeret 10.
9. Nedre blomster med støtteblade ..... sparsiflora
" " uden " arvensis
10. Frugtstilkene ca. = bægeret. Kronen indtil 3mm bred ramosissima
" kortere end bægeret. Kronen indtil 1,3mm bred 11.
11. Blomsterne først lysegule. Bladundersiden uden kroghår discolor
" lyseblå hele tiden. Bladundersiden med kroghår stricta

Myosotis arvensis (L.) Hill Markforglemmigej. V-VII. Alm.

M. ramosissima Rochel Bakkeforglemmigej. IV-VI. Alm.

M. discolor Pers. Forskelligfarvet forglemmigej. V-VI. Sj.

M. stricta Link Rank forglemmigej. IV-VI. Alm.

M. silvatica Hoffm. Skovforglemmigej. Bægergrunden afrundet. Bægeret m.m. spredt håret. Frugtstilken mindst 5mm. Bægerets længste kroghår højst 0,2mm. Frugterne ca. 1,6-1,7mm. IV-VIII. Alm.

M. decumbens Host ssp. variabilis (Angelis) Grau Fjældforglemmigej. 15-30cm. Bægergrunden afrundet. Bægeret m.m. tæt håret. Frugtstilken ca. 3mm. Bægerets længste kroghår 0,3-0,4mm. Frugterne ca. 2mm. VI-VIII. Sj.

M. alpestris F.W.Schmidt Alpeforglemmigej. 5-35cm. Bægergrunden til-

smalnet. Bægeret med eller uden kroghår. Stængelbladene æg- til lancetformede. Blomsterstanden tæt. VI-VII. Alm.

Myosotis stenophylla Knaf Smalbladet forglemmigej. 5-35cm. Bægergrunden tilsmalnet. Bægerhårene m.m. tiltrykte, 0-få kroghår. Grundbladene ca. 5mm brede. Stængelbladene lancet- til linjeformede. VI-VII.

M. laxa Lehm. ssp. caespitosa (Schulz) Hyl. Sumpforglemmigej. Spredt.

M. scorpioides L. Engforglemmigej. V-VII. Alm.

M. nemorosa Besser Lundforglemmigej. 10-40cm. Som den foregående, men mest toårig. Stænglen mest skarpkantet og skinnende. V-VII.

M. sparsiflora Mikan Fjærnblomstret forglemmigej. 20-30cm. Blomsterne langstilkede, de nedre med store støtteblade. Bægeret noget tragtformet indtil 1/2 delt. Frugtstilkene lidt nedbøjede. V-VI. Alm.

Eritrichium nanum (L.) Schrader Dværgforglemmigej. 1-8cm. Bladene 4-10 x 1,5-4,5mm, lådne af hvide hår. Stænglerne med 3-7(10) blomster. Bægeret helt delt. Kronen 7-9mm bred. Nødderne med tandet rand. VII-VIII. ssp. nanum: Stænglen 1-3cm. Bladene 1,5-3mm brede. Planten silkehåret. ssp. jankae (Sim.) Jav.: Stænglen 4-8cm. Bladene 3-4,5mm brede. Planten hvidlådden. M.Giurgeu: Haghimasu Mare og Mic, Piatra Singuratica. M.Bistriţei: Ceahlau. M.Ciucas: Zaganu. M.Bucegi: Lespezi.

Lappula. Pigfrø. Mest 1-2-årige.

1. Frugtstilkene nedbøjede ..... deflexa
" oprette eller opret-udstående 2.
2. Nødderne med 1 række krogbørster ..... marginata
" " 2-3 rækker krogbørster 3.
3. Planten grå, tæt tiltrykt håret. Kronen 6-8mm bred ..... barbata
" mest grøn, også med udstående hår. Kronen 3-4mm bred 4.
4. Nøddernes krogbørster 1-1,5mm, alle ca. lige lange ..... squarrosa
De ydre krogbørster meget korte, de indre 2-3mm lange heteracantha

Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke Fjældpigfrø. 20-90cm. Nødderne med 1 række krogbøster. VII-VIII. Spredt.

L. marginata (Bieb.) Gürke Storhaget pigfrø. 10-20cm. Kronen med tragtformet krave. Nøddernes krogbørster med udvidet grund, forbundne forneden. IV-VI. Sj.

L. squarrosa (Retz.) Dum. Småhaget pigfrø. 15-30cm. De indre pigbørster ikke forbundne ved grunden. Bladene ru på begge sider. VI-VII.Alm

L. heteracantha (Ledeb.) Gürke (L. semicincta) 15-30cm. De indre pigbørster forbundne ved grunden. Bladundersiden grålådden. V-VI. Sj.

Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank Spinkel kærminde. 10-30cm. 1-årig, forglemmigejlignende plante, der kendes på sine store frugtbægre på op til 5mm i frugt, med fritsiddende nødder. Kronrøret meget kort. IV-VI. Sj.

O. verna Moench Vårkærminde. 5-20cm. Flerårig med ret store, ægformede grundblade på 5-20cm. Kronen 8-12mm bred, mørkt himmelblå med gule

svælgskæl. Krybende og bestanddannende plante. IV-V. Sj. Vild ?

Cynoglossum. Hundetunge.

1. Kronen blegblå med mørkere årer ..... creticum
" ikke blå 2.
2. Bladoversiden m.m. glat og skinnende, undersiden håret germanicum
Bladene hårede på begge sider 3.
3. Nødderne med tydelig rand. Kronen brunrød ..... officinale
" uden " " . " matrød hungaricum

Cynoglossum officinale L. Almindelig hundetunge. V-VII. Alm.

C. germanicum Jacq. Grøn hundetunge. 30-80cm. Bladundersidens hår med knudret grund. Kronen mat rødlilla. Nødderne uden tydelig rand. V-VI.

C. creticum Miller Året hundetunge. 20-50cm. Grågrøn toårig. Frugtstilkene ofte nedbøjede. Bægertænderne 6-8mm. V-VI. Sj.

C. hungaricum Simonkai Rød hundetunge. 30-60cm. V-VII. Spredt.

Rindera umbellata (W.& K.) Bunge Skærmskivefrø. 30-50cm. Rosetblade 12-25x0,7-2cm. Blomsterstanden halvskærmformet. Bægeret 11-15mm. Kronen 11-15mm, lapperne gule (røret lillat?). V-VI. Sj.

VERBENACEAE

Verbena officinalis L. Jærnurt. 30-60cm. Lyslilla læbeblomster i lange smalle aks med spredtsiddende blomster. Opret flerårig med modsatte, rude-spatelformede, lappede til fligede blade. VI-IX. Alm.

V. supina L. Lav jærnurt. 10-40cm. Ofte liggende enårig. Tæthåret og med kortere aks op til 8cm. 1-2 x fjerfligede blade. VI-IX. Sj.

CALLITRICHACEAE

Callitriche. Vandstjærne.

1. Bladene bredest ved grunden og tilsmalnede udad .. hermaphroditica
" " midtpå eller i spidsen 2.
2. Frugten tydeligt længere end bred, smalvinget foroven .. palustris
" ikke længere end bred 3.
3. Frugten tydeligt vinget (0,05mm bredt) ..... platycarpa
" uvinget 4.
4. Støvfangene tiltrykte frugten ..... hamulata
" delvist oprette cophocarpa

Callitriche hermaphroditica L. Høstvandstjærne.

C. cophocarpa Sendtner Rosetvandstjærne. V-IX. Alm.

C. platycarpa Kütz. Fladfrugtet vandstjærne. ?

C. palustris L. Vårvandstjærne. Alm.

C. hamulata Kütz Smalbladet vandstjærne.

LABIATAE

1. Overlæben mangler eller meget kort ..... 2.
" veludviklet 3.
2. Underlæben 3-delt ..... Ajuga
" 5-delt Teucrium
3. Griffel og støvdragere indesluttede i kronrøret ..... 4.
" " " udragende af kronrøret 5.
4. Flerårig. Bægeret regelmæssigt. Kronen hvid ..... Marrubium
Enårig. Bægeret tolæbet. Kronen gul Sideritis
5. 2 støvdragere ..... 6.
4 " 8.
6. Kronens overlæbe hvælvet ..... Salvia
" " flad 9.
7. Enårig. Bladene helrandede. Kronen lyserød ..... Ziziphora
Flerårig. Bladene tandede til fligede. Kronen hvid Lycopus
8. 4 næsten ens kronflige ..... 9.
Kronen m.m. tolæbet 10.
9. Flerårig. Blomsterstanden alsidig ..... Mentha
Enårig. Blomsterstanden ensidig Elsholtzia
10. Støvdragerne udspærrede, m.m. udragende af kronen ..... 11.
" rager ikke ud af kronen 13.
11. Kransenes blomster samlede i stilkede småaks ..... Origanum
" " ikke samlede i småaks 12.
12. Bægeret m.m. regelmæssigt ..... Satureja
" m.m. tolæbet Thymus
13. Bægeret m.m. regelmæssigt ..... 14.
" m.m. tolæbet 25.
14. Underlæbens sideflige væk eller reducerede til 2 små tænder Lamium
" " tydelige 15.
15. Underlæben med 2 hule tænder ved grunden ..... Galeopsis
" uden sådanne tænder 16.
16. Kronen kraftigt gul. Overlæben 10-12mm. Med udløbere Lamiastrum
" højst lysegul. Overlæben højst 8mm 17.
17. Planten krybende og rodslående med blå blomster ..... Glechoma
" ikke krybende 18.
18. Griflens 2 grene tydeligt uens. Kronen 15-20mm, lyserød Phlomis
" " " m.m. ens 19.
19. Støvtrådene udspærrede forneden, tilnærmede foroven ..... 20.
" parallelle 21.
20. Bladene ægformede, svagt tandede ..... Micromeria
" helrandede, linje- til lancetformede Satureja
21. 15 bægerribber. Kronen med flad, udrandet overlæbe. Underlæben med bugtet midterlap. Indre støvdragere længst ... Nepeta
5-10 bægerribber 22.
22. Bladene håndformet 3-7-lappede ..... Leonurus cardiaca
" hele eller smalfligede 23.
23. Kronen 5-7mm. Bladgrunden kileformet ..... Leonurus marrubiastrum
Anderledes 24.
24. Bægeret udvidet i øvre 1/4 ..... Ballota
" ikke udvidet i øvre 1/4 Stachys

25. Bægeret med helrandede læber og en pukkel på ryggen Scutellaria
" uden pukkel på ryggen 26.
26. De 2 griffelgrene tydeligt uens ..... 27.
" " " m.m. ens 29.
27. Bægeret med buget grund og indsnævret fortil ..... Acinos
" ikke buget eller indsnævret fortil 28.
28. Mange blomster i tætte kranse ..... Clinopodium
Stilkede blomster i kvaste Calamintha
29. Kronens overlæbe tydeligt hvælvet ..... 30.
" " flad eller indadbuet 31.
30. Støttebladene helt ulig bladene ..... Prunella
" lig bladene Dracocephalum
31. Kronen 25-40mm, hvid, lyserød eller rødlilla ..... Melittis
" 8-15mm, bleggul til hvid Melissa

Ajuga. Læbeløs.

1. Kronen gul eller flødefarvet ..... 2.
" blå 5.
2. Bladene 3-fligede med linjeformede flige ..... 3.
" helrandede til groft takkede 4.
3. Kronen 7-12(5-15)mm. Underlæbens midterflig 4-6mm bred chamaepitys
" (15)20-21mm. " " 8-9mm " pseudochia
4. Stængelbladene siddende og halvt stængelomfattende ..... laxmannii
" meget kortstilkede, ikke omfattende salicifolia
5. Med udløbere. Stænglen glat eller tveskægget ..... reptans
Uden " . " mest jævnt håret 6.
6. Støttebladene mest 3-lappede, højst lidt længere end blomsterne genevensis
Støttebladene mest helrandede, mest mindst 2 x blomsterne pyramidalis

Ajuga genevensis L. Bakkelæbeløs. 10-40cm. Støttebladene ofte blå eller lillaanløbne. Kronen klart blå, 12-20mm. Grundbladene ofte væk under blomstringen. V-VII. Alm.

A. pyramidalis L. Pyramidelæbeløs. 5-30cm. Planten lidt gulgrøn. Bladene jævnt mindre opad. Grundbladene blivende. VI-VII. Sj.

A. reptans L. Krybende læbeløs. IV-VI. Alm.

A. salicifolia (L.) Schreber ssp. bassarabica (Savul.) Ball Pilebladet læbeløs. 20-30cm. Kronen 18-25(28)mm, røret lidt længere end bægeret. Overlæben med 2 korte lapper. Bægeret 6-10mm. V-VI. Sj.

A. laxmannii (L.) Bentham Brunåret læbeløs. 20-50cm. Kronen (20)25-35 mm, gul eller flødefarvet med brunlilla årer; røret kortere end bægeret; overlæben helrandet. Bægeret 9-15mm. V-VI. Spredt.

A. chamaepitys (L.) Schreber Gul læbeløs. 10-30cm. Enårig. V-VIII.Spr.

A. pseudochia Schost. 8-30cm. Flerårig. V-IX. Sj.

Teucrium. Kortlæbe.

1. Enårig. Bladene 1-2 x fjersnitdelte ..... botrys
   Flerårig. Bladene udelte til lappede 2.
2. Blomsterstanden hovedformet, oftest bredere end lang ..... 3.
   " længere end bred, ikke hovedformet 4.
3. Bladene helrandede. Blomsterne bleggule, 12-14mm ..... montanum
   " med 2-5 par rundtakker. Blomsterne 5mm, mest hvide polium
4. Stænglen forveddet forneden. Kronen 9-16mm ..... chamaedrys
   " urteagtig. Kronen 7-10mm scordium

Teucrium scordium L. Løgurt. VII-VIII. Spredt. 2 underarter:
ssp. scordium: Bladene med tilsmalnet grund, sidegrenenes kun tandede foroven. Udløberne mest med almindelige blade.
ssp. scordioides (Schreber) Maire & Pet.: Bladene med hjærteformet til afrundet grund, sidegrenenes tandede hele vejen. Udl. med skælblade.

T. botrys L. Druekortlæbe. 10-30cm. Lådden enårig. Blomsterne fordelte over en stor del af de grenede stængler, rødlilla til lyserøde, lådne, 15-20mm. Bladene ca. 2x1,5cm. VII-IX. Sj.

T. chamaedrys L. Ædelkortlæbe. 10-30cm. Bladene indtil 2x1cm, groft til indskåret tandede, med 5-8 par tænder. Kronen 12-15mm, oftest rødlilla. VI-IX. Alm.

T. montanum L. Bjærgkortlæbe. 10-25cm. Halvbusk med liggende eller opstigende, hvidfiltede grene. Bladene læderagtige, linjeformede med omrullet rand. VI-VIII. Spredt.

T. polium L. ssp. capitatum (L.) Arc. Hovedkortlæbe. 10-25cm. Dværgbusk med gråfiltet til hvidulden stængel og ret smalle, knippestillede blade på 10x1mm. VII-VIII. Spredt.

Scutellaria. Skjolddrager.

1. Støttebladene bladagtige ..... 2.
   " m.m. ulig bladene 3.
2. Bladgrunden ikke spydformet, bladene jævnt tandede .. galericulata
   " spydformet, bladene mest helrandede hastifolia
3. Blomsterne i korte, tætte, hovedformede, m.m. firkantede klaser 4.
   " i løse, ofte bladede klaser 6.
4. Bladundersiden gråfiltet. Bladene ofte dybt delte ..... orientalis
   " grøn. Bladene takkede 5.
5. Kronen rødligt lilla ..... alpina
   " gul supina
6. Kronen bleggul til hvid ..... 7.
   " blå til rødlilla 8.
7. Støttebladene 15-20mm. Stænglen med korte og lange hår velenovskyi
   " 10-12mm. Stænglen med korte, tiltrykte hår albida
8. Kronen 20-22(18-28)mm, rødligt lilla ..... columnae
   " 12-16(18)mm, blå altissima

Scutellaria orientalis L. ssp. pinnatifida Edm. (S. sosnovskyi) Gul skjolddrager. 4-20cm. Bladene trekantet ægformede og dybt fligede, mørkegrønne. Kronen 15-30mm, gul (sj. lyserød). Sj.

Scutellaria alpina L. Alpeskjolddrager. 15-45cm. Opstigende. Stænglen m.m. dunet. Bladene 1,5-3cm, mest ægformede, nedre stilkede, øvre m.m. siddende. Kronen 20-25mm. Blade og støtteblade m.m. dunede. VI-VIII. Sj.

S. supina L. Steppeskjolddrager. 10-45cm. Som alpina, men blade og støtteblade m.m. glatte. VI-VIII. Sj.

S. columnae All. Ensidig skjolddrager. 40-85cm. Opret. Bladene ægformede, 4-8x2-5cm, med hjærteformet grund. Støttebladene 5-16mm. Kronen stærkt krummet. VI-VII. Sj.: Jud.Caraş-Severin: Donaudalen.

S. altissima L. Høj skjolddrager. 30-100cm. Bladene ægformede og savtakkede, 5-15x2-5cm. Støttebladene 6-10mm. V-VII. Alm.

S. albida L. Hvid skjolddrager. 15-30cm. Bladene 2-3cm, rundtakkede, m.m. trekantede og butte. Kronen 12-16mm, hvid. ?

S. velenovskyi Rech.f. (S. pichleri) Bleggul skjolddrager. 20-40cm. Nær foregående. Stænglen udstående håret. Bladene 4-6(8)cm, ægformet-trekantede. VI-VIII. Sj.

S. galericulata L. Alm. skjolddrager. VI-IX. Alm.

S. hastifolia L. Spydbladet skjolddrager. VI-VIII. Alm.

Marrubium peregrinum L. Smalbladet kransburre. 30-60cm. Bægeret 5-tandet, røret 3-5mm. Stænglen med skråt udstående grene fra de fleste bladhjørner. Bladene smalt rudeformede, m.m. hvidfiltede. VI-VIII. Spredt.

M. vulgare L. Alm. kransburre. 20-45cm. 10 krogformede bægertænder. Bægeret lâddent-dunet. Grå- til hvidfiltet. Bladene m.m. rundagtige, uregelmæssigt rundtakkede. Kronen 6-7mm. VI-IX. Alm.

M. pestalozzae Boiss. Rettandet kransburre. 30-60cm. Som vulgare, men med 8-10 rette, lidt uens bægertænder. Bægeret stjærnefiltet. Bladene aflangt-ægformede. VI-VIII. Spredt.

Sideritis montana L. Kortkrone. 5-25cm. Bladene tandede, elliptiske til lancetformede, 1/2-3cm. Bægeret med 3 opad- og 2 nedadrettede tænder med stakke. Kronen m.m. sort som tør. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. montana: Støttebladene lancetformede, ikke meget længere end blomsterne.
ssp. comosa (Roch.) Soó: Støttebladene bredt ægformet-elliptiske, meget længere end blomsterne.

Melittis melissophyllum L. ssp. carpatica (Klokov) Ball Vild hjærtensfryd. 20-60cm. Ægformede blade på 7-15cm med 20-32 par tænder. Kransene m.m. ensidige, med 2-4 blomster i de øvre bladhjørner. V-VII. Spredt.

Phlomis tuberosa L. Knoldløvehale. 50-150cm. Med rodknolde. Bladene mest trekantet-hjærteformede. Kronens overlæbe randhåret med 1mm lange hår. Underlæbens sidelapper lidt mindre end midterlappen. VI-VII. Spr.

P. herba-venti L. Vindløvehale. 30-60cm. Uden rodknolde. Bladene mest m.m. lancetformede. Kronens overlæbe ikke randhåret. Underlæbens side-

lapper meget mindre end midterlappen. VI-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp. pungens (Willd.) Maire: Bladundersiden dunet til filtet. Kronen dunet.
ssp. moldavica (Ravarut): Bladene glatte. Kronen m.m. glat. Jud.Galaţi.

Galeopsis. Hanekro.

1. Stænglen udstående stivhåret og m.m. fortykket ved bladfæsterne 2.
" ikke stivhåret eller fortykket ved bladfæsterne 5.
2. Kronen gul, 25-35mm, ofte med stor lilla plet ..... speciosa
" lyserød eller hvid. 10-25mm 3.
3. Stænglen også m.m. tiltrykt dunet på alle sider ..... pubescens
" kun med børstehår 4.
4. Bægeret mørkkirtlet. Underlæben ikke udrandet ..... tetrahit
" lyskirtlet. Underlæbens midterlap udrandet bifida
5. Bægeret grønt med udstående klare hår ..... ladanum
" hvidt med tiltrykte, matte hår angustifolia

Galeopsis ladanum L. Sandhanekro. VI-VIII.

G. angustifolia Ehrh. Smalbladet hanekro. VI-VIII.

G. speciosa Miller Hamphanekro. VII-IX. Alm.

G. pubescens Besser Dunet hanekro. 20-50cm. Bladfæsterne kun lidt fortykkede. Kronen 2-3 x bægeret, mest lillarød med gult svælg. Alm.

G. tetrahit L. Alm. hanekro. VII-VIII.

G. bifida Boenn. Skovhanekro. VII-VIII.

Lamium. Tvetand.

1. Enårig ..... 2.
Flerårig 5.
2. Kronens overlæbe kløvet . Bægertænderne kortere end røret bifidum
" " hel 3.
3. Støttebladene m.m. siddende. Frugtbægertænderne sammenstødende amplexicaule
Støttebladene m.m. stilkede. Frugtbægerets tænder udstående 4.
4. Bladene rundtakkede. Kronrøret forneden opadkrummet .... purpureum
" uregelmæssigt indskåret-tandede. Kronrøret ret hybridum
5. Kronrøret ret. Kronen 25-40mm, lyserød ..... garganicum
" krumt 6.
6. Kronens sidelapper 1-tandede. Kronen mest rød ..... maculatum
" " 2-3-tandede. Kronen hvid album

Lamium garganicum L. ssp. laevigatum Arc. (L. bithynicum) Stribet tvetand. 20-40cm. Bægertænderne mest kortere end røret. Kronens underlæbe ofte rødstribet. VI-VIII. Sj.

L. maculatum L. Plettet tvetand. 20-50cm. Bladene ofte blegplettede. Kronen 20-30mm, med hvidligt rør og rød, ofte plettet underlæbe. IV-VI.

L. album L. Døvnælde. IV-VI. Alm.

Lamium bifidum Cyr. ssp. balcanicum Velen. Kløvet tvetand. 20-25cm. Bladene uregelmæssigt indskårne. Kronen 20-25mm. V-VI. Sj.

L. purpureum L. Rød tvetand. III-IX. Alm.

L. hybridum Vill. Fliget tvetand.

L. amplexicaule L. Liden tvetand. III-V. Alm.

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Pol. Guldnælde. Alm. 2 ssp.:
ssp. galeobdolon: Kransene med indtil 8 blomster. Øverste støtteblade 1-2 x så lange som brede, rund- til buttakkede.
ssp. montanum (Pers.) Ehr.& Pol.: Kransene med 9-15 blomster. Øverste støtteblade 1,5-3,5 x så lange som brede, med spidse/halvspidse tænder.

Leonurus cardiaca L. Alm. hjærtespand. VI-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. cardiaca: Stænglens flader m.m. glatte, kanterne kortdunede. Bægeret glat.
ssp. villosus (Desf.) Prod.: Stænglen og bægeret udstående hårede af 2 mm lange hår.

L. marrubiastrum L. Stortandet hjærtespand. 50-120cm. Grådunet toårig. Nedre blade 2-6cm, ægformede og groft takkede. Kransene fjærne og næsten kugleformede. Kronen ca. = bægeret, 5-7mm, blegrød. VI-VII. Alm.

Ballota nigra L. Tandbæger. VI-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. nigra: Bægertænderne (3)4-6,5mm, med en stak på 1,5-3mm.
ssp. foetida Hayek: Bægertænderne 2,5(1,5-3,5)mm, med en brod på 0,2-0,5mm.

Stachys. Galtetand.

1. Enårig. Kronen bleggul eller hvid, 10-16mm ..... annua
   Flerårig 2.
2. Kronen bleggul ..... 3.
   " rød 7.
3. Kransene 2-blomstrede ..... angustifolia
   " 4-10-blomstrede 4.
4. Forbladene mindst 3/4 x bægeret ..... obliqua
   " meget mindre end bægeret 5.
5. Stængel og blade tæt gråfiltede ..... maritima
   " " " glatte til hårede 6.
6. Bægertænderne under 1mm brede, ca. = røret ..... atherocalyx
   " over 1mm brede forneden, kortere end røret recta
7. Bladene mest i roset. 1-3 par stængelblade ..... officinalis
   " ikke mest i roset; flere par stængelblade 8.
8. Bladundersiden grå- yil hvidfiltet ..... 9.
   " dunet til håret 10.
9. Fleste blade med hjærteformet grund ..... germanica
   " " " kileformet grund byzantina
10. Kransene med 12-20(40) blomster ..... alpina
    " " 6-10 blomster 11.
11. Bladene æg-hjærteformede, alle stilkede ..... silvatica
    " aflange, de øvre siddende palustris

Stachys officinalis (L.) Trevisan Betonie. VI-VIII. Alm.

S. alpina L. Alpegaltetand. 40-100cm. Bladene 5-18cm, aflangt ægformede med hjærteformet grund, grønne eller grågrønne, tandede. Blomsterne rødbrune. VI-VIII. Spredt.

S. germanica L. Filtet galtetand. 30-60cm. Bladene 3-12x1-5cm, aflange til aflangt-ægformede, m.m. grønne ovenpå, gråfiltede nedenunder. Stænglen gråfiltet. VI-VIII. Alm.

S. byzantina Koch Lammeøre. 20-80cm. Hele planten hvidfiltet. Bladene 3-10x1,5-4cm, de nedre aflangt-spatelformede. VI-IX. Dyrket og forvild.

S. obliqua W.& K. 30-70cm. M.m. uldhåret. Bladene aflangt-lancetformede. Kronen ca. 15mm, tæthåret. Bægertænderne kortere end røret. Sj.

S. silvatica L. Skovgaltetand. VI-VIII. Alm.

S. palustris L. Kærgaltetand. VI-IX. Alm.

S. recta L. Bleggul galtetand. 20-40cm. Bladene 3-5cm, aflange til linjeformede. Kransene med 6-16 blomster og mindre, ægformede støtteblade på 11x5mm. Kronen 15-20mm. 3 underarter:
ssp. hirta (Ten.) Briq.: Stænglen uldhåret-lådden hele vejen.
ssp. nitens (Janka): Mellemste og øvre blade 1-4mm brede. Stænglen mest kun håret forneden, ellers glat og skinnende.
ssp. recta: Mellemste og øvre blade 5-20mm brede. Stænglen m.m. håret til halvglat.

S. atherocalyx C.Koch Nær foregående, men bladene 5-6cm x 7-10mm. Bægeret 10-13mm, tænderne mindst af rørets længde, med en stak på 2-3mm. V-VIII. Spredt.

S. angustifolia Bieb. 40-60cm. Glat og opret med forveddet grund. Øvre blade udelte og linjeformede, resten fjerfligede. Kronen 12-16mm, gul med lyserødt skær. VI-VII. Sj. Jud-Tulcea. Smalfliget galtetand.

S. maritima Gouan Strandgaltetand. 15-30cm. Bladene aflange til bredt ægformede, 2,5-4cm, de nedre i en blivende roset. Kransene 4-6-blomstrede. Kronen filtet, 12-14mm. Sand og klitter. VI-VII. Sj. Sydøstlig.

S. annua (L.) L. Enårig galtetand. 10-30cm. Bladene lancetformede og spidse, m.m. rundtakkede. Bægeret 5-8mm, håret til spidsen. Kronen undertiden rødprikket. V-VIII. Alm.

Nepeta. Katteurt.

1. Kronen lig eller kortere end bægeret ..... 2.
" længere end bægeret 3.
2. Bægeret 6-7,5mm. Bladundersiderne uldhårede ..... parviflora
" 9-12mm. " glatte til korthårede ucranica
3. Kronen hvid med små, røde prikker ..... cataria
" lyslilla nuda

Nepeta cataria L. Katteurt. 50-100cm. Stænglen tæt korthåret og grågrøn. Bladene æg-hjærteformede, 2-6x1,5-3cm, gradunede nedenunder; stilkene 1-3(4)cm. V-VII. Alm.

Nepeta nuda L. (N. pannonica) Glat katteurt. 50-100cm. Stænglen og bladene næsten glatte. Bladene siddende, kun de nedre med 1-5mm lange stilke. VI-VII. Alm.

N. ucranica L. Sylbægret katteurt. 15-50cm. Stænglen m.m. glat. Bægeret ofte blåligt, tænderne længere end røret. Kronen 7-8mm. blålilla. V-VI. Sj.

N. parviflora Bieb. Småblomstret katteurt. 20-70cm. Stænglen filtet til uldhåret, ihvertfald forneden. Kronen 5-6mm, blå. V-VII. Sj.

Glechoma hederacea L. Alm. korsknap. Bægertænderne trekantede, under 2mm, mest lidt uens. Blomsterstilkene ca. 1mm. Kronen 1-2cm. IV-VI.Alm

G. hirsuta W.& K. Håret korsknap. Bægertænderne sylformede, ovre 2mm, mest lige lange. Blomsterstilkene 2-4mm. Kronen 2-3cm. IV-VI. Alm.

Dracocephalum. Dragehovede.

1. Bladene fjerfligede. Kronen 3,5-5cm, blålilla ..... austriacum
   " hele 2.
2. Bladene helrandede, m.m. linjeformede. Kronen 20-28mm ruyschianum
   " tandede 3.
3. Kronen 7-9mm, blegblå ..... thymiflorum
   " 2-2,5cm, hvid eller lilla moldavicum

Dracocephalum thymiflorum L. Småbægret dragehovede. 10-30cm. Svagt dunet enårig. Nedre blade ægformede, glatte, savtakkede, 1-3,5cm. V-VII. Sj. Jud.Suceava: Pojorita (indslæbt?).

D. ruyschianum L. Smalbladet dragehovede. 10-30cm. Flerårig. Bladene glatte med indrullet rand, 2-7cm. Kransene danner et endestillet hovede. Kronen blålilla. VI-VII. Sj.

D. austriacum L. Storblomstret dragehovede. 20-40cm. Flerårig. Bladene 3-5(7)-fligede med smalle flige på 2-3cm x 1-2,5mm. 2-4-blomstrede kranse i et m.m. tæt hovede. VI-VII. Sj. Jud.Cluj: Cheile Turzii, M. Trascau. Jud.Brasov: Brasov ved Dl.Stejarişului.

D. moldavicum L. Vellugtende dragehovede. 20-60cm. Enårig. Bladene aflange til lancetformede, m.m. glatte, 1,5-7cm. Kransene 6(-10)-blomstrede, spredte forneden, tætte foroven. VII-VIII. Dyrket og forvildet.

Prunella laciniata (L.) L. Hvid brunelle. 15-25cm. Tætdunet flerårig. I det mindste de øvre blade fjerfligede til -lappede, 4-7cm. Kronen gullighvid, 15-17mm. VII-VIII. Alm.

P. vulgaris L. Alm. brunelle. VI-VIII. Alm.

P. grandiflora (L.) Scholler Storblomstret brunelle. 10-20cm. Blomsterne 24-26(18-30)mm. Akset uden blade under sig. Støttebladene 15-20x 15-20mm. VI-VIII. Alm.

Melissa officinalis L. Hjærtensfryd. 30-80cm. Med citronduft. Bladene 4-5x3-4cm, ægformede. Kransene 2-blomstrede. Bægeret 7-9mm, ovrelæben korttandet. Kronen mest bleggul, med krumt rør. VI-VII. Spredt.

Ziziphora capitata L. Hovedflaskebæger. 5-20cm. Enårig med m.m. lancetformede blade på 5-30mm. Halvskærmformede, endestillede hoveder med svagt tolæbede, lyserød blomster på 10-15mm. Bægeret 6-11mm, krumt og lidt buget, tolæbet. V-VIII. Sj.

Satureja kitaibelii Wiezb. Tveskægget bønneurt. 30-70cm. Stænglen tveskægget dunet eller glat. Bladene 15-30x4-7mm. Kransene mest adskilte, med ofte 2-5 blomster. Kronen 10-12mm, hvid eller lyserød. VII-IX. Sj.

S. coerulea Janka Blå bønneurt. 10-20cm. Stænglen kortdunet til halvglat. Bladene 8-20x1,5-2mm. Kransene m.m. adskilte, med 2-4 blålilla blomster på 6-10mm. VII-IX. Sj. Østlig.

Acinos. Voldtimian.

1. Flerårig med forveddet grund ..... 2.
   Enårig 3.
2. Bladene 1,2-1,5 x så lange som brede ..... alpinus
   " mest 2-3 x " " " " suaveolens
3. Bladene ca. 2 x så lange som brede ..... arvensis
   " 1,1-1,5 x så lange som brede rotundifolius

Acinos alpinus (L.) Moench Alpevoldtimian. 5-30cm. Ingen citronduft. Bladene 6-20mm, med afrundet til bredt kileformet grund. VI-VIII. 2ssp:
ssp. alpinus: Bladundersiden uden fremtrædende ribber nær randen. Alm.
ssp. majoranifolius (Miller) Ball: Bladundersiden med fremtrædende ribber, især langs randen. Spredt.

A. suaveolens (Sm.) Loudon Citronvoldtimian. 10-30cm. Citronduftende. Bladene 10-20mm, med smalt kileformet grund.

A. arvensis (Lam.) Dandy Voldtimian. V-VIII. Alm.

A. rotundifolius Pers. (A. exiguus) Rundbladet voldtimian. 10-20cm. Bladene 7-10mm, rundagtige. Kronen 7-10(12)mm. V-VII. Sj.

Calamintha grandiflora (L.) Moench Bøgemynte. 20-50cm. Stænglen liggende med oprette blomstrende grene. Bladene ægformede, 3-5x2-4cm. Kransene 1-5-blomstrede, m.m. ensidige. Kronen 25-35mm, lyserød.

C. silvatica Bromf. Alm. bjærgmynte. 30-80cm. Stænglerne opstigende. Bladene bredt ægformede til runde, takkede. Kvastene 3-9-blomstrede på en stilk op til 15mm. Bægeret 6-10mm, dets nedre tænder 2-4mm.
ssp. silvatica: Større blade 5-6x3-4cm. Kvaststilkene op til 15mm. Kronen 15-22mm. VI-IX. Spredt.
ssp. ascendens (Jordan) Ball: Større blade 1,5-3x1-2cm. Kvaststilkene 1-3(-10)mm. Kronen 10-16mm.

C. nepeta (L.) Savi Grå bjærgmynte. 20-40cm. Som foregående, men bladene helrandede til svagt tandede. Bægeret 3-7mm, med de nedre tænder 1-2mm. VII-IX. Spredt. 2 underarter:
ssp. nepeta: Bladene ægformede, 1,3-1,5 x så lange som brede, op til 35mm. Kvastene 10-20-blomstrede og længere end støttebladene.
ssp. glandulosa (Req.) Ball: Bladene æg-rudeformede, ca. så lange som brede, op til 22mm. Kvastene 5-11(-15)-blomstrede, sj. længere end

støttebladene.

Clinopodium vulgare L. Kransbørste. VI-X. Alm.

Micromeria pulegium (Rochel) Bentham Storbladet murtrad. 30-90cm. Opret flerårig. Bladene 1-3x0,5-2cm, tæt kirtelprikkede nedenunder. Kransene løse, med 10-70 hvide eller lyslilla blomster på 7-9mm. VI-VIII. Sj. Jud.Hunedoara: Petroşeni i Cheile Taia. Jud.Caraş-Severin: Mehadia på M.Arjana, Baile Herculane la Prolaz, V.Cernei. Jud.Mehedinţi: M.Mehedinţi (V.Ţeşnei), Cloşani på V.Motru Sec. Jud.Gorj: Tismana, Lainici, Runcu la Cleanţul Cucului. Jud.Argeş: Mrea Cozia.

Origanum vulgare L. Almindelig merian. VII-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. vulgare: Støttebladene glatte. Bægeret glat eller håret, m.m. kirtlet.
ssp. barcense (Simk.) Prod.: Støttebladene m.m. tæt dunede. Bægeret tæt håret og kirtlet.

Thymus. Timian.

1. Bladene med tyk randribbe hele vejen rundt ..... 2.
   Randribbe mangler eller kun oppe ved bladspidsen 5.
2. Blomstrende skud trinde/butkantede, m.m. trindt hårede ..... 3.
   " " tydeligt 4-kantede, kanthårede eller tvesidet hårede 4.
3. Med lange, krybende skud, der ender i et bladknippe ..... jankae
   Stænglerne ender alle i blomsterstande comosus
4. Med lange, krybende skud, der ender i et bladknippe pulcherrimus
   Stænglerne ender alle i blomsterstande bihoriensis
5. Blomstrende skud trinde/butkantede, trindt hårede foroven ..... 6.
   " " 4-kantede, kanthårede eller tvesidet hårede 17.
6. Bladene m.m. linjeformede, 1-2mm brede ..... 7.
   " lancet- til ægformede, 2-8mm brede, de bredest mindst 3mm 11.
7. Med lange, krybende skud, der ender i et bladknippe ..... 8.
   Stænglerne ender alle i blomsterstande 10.
8. Blomstrende skud med ofte udstående hår, ca. så lange som skuddets bredde ..... callieri
   Blomstrende skud kortdunede, hårene ofte nedadrettede 9.
9. Bladene kødede, med utydelige sideribber ..... zygioides
   " stive, ikke kødede, med tydelige sideribber serpyllum
10. Golde skud korte. Bladene blågrønne, bredest midtpå ..... comptus
    " " lange. " grønne, bredest i øvre 1/2 callieri
11. Bladribberne tykke, når randen og løber tæt på den ..... jankae
    " forsvinder mod randen 12.
12. Med lange, krybende skud, der ender i et bladknippe ... serpyllum
    Skuddene opstigende eller kort krybende, ender i blomsterstande 13.
13. Blomstrende skuds blade omtrent lige store oppe og nede ..... 14.
    " " " mindre nedad 16.
14. Begge bladsider tæt hårede ..... kosteleckyanus
    Bladsiderne glatte til svagt hårede 15.
15. Bladene tykke, læderagtige, med fremtrædende ribber ..... tosevii
    " tynde, ribberne ikke fremtrædende pannonicus

16. Bladene tæt hårede på begge sider ..... austriacus
" glatte, kun randhårede forneden glabrescens
17. Bladribberne tykke, når randen og løber tæt på den .... balcanus
" forsvinder mod randen 18.
18. Med lange, krybende skud, der ender i et bladknippe ... alpester
Skuddene ender i blomsterstande, opstigende eller kort kryben. 19.
19. Blomstrende skud kanthårede. Bladene 4-10mm brede .. pulegioides
" " tvesidet hårede. Bladene mest 1-3mm brede 20.
20. Bladene tæt hårede på begge sider ..... illyricus
" glatte, kun randhårede forneden 21.
21. Bladene 10-15mm ..... dacicus
" 5-8mm pinifolius

Thymus comosus Heuff. Hjærtetimian. Bladene indtil 17x9mm, bredt ægformede til rundagtige. Kronen 8-9mm. VI-VIII. Alm. Vest og midt.

T. pulcherrimus Schur Stilktimian. VI-IX. Alm.

T. bihoriensis Jalas Randtimian. V-IX. Spredt i Nord og Midtrumænien.

T. zygioides Griseb. V-VII. Sj.: Jud.Constanţa + Tulcea + Galaţi.

T. comptus Friv. Blågrøn timian. Bladene ofte randhårede til over midten med ca. 2mm lange hår. V-IX. Sj. Jud.Prahova + Tulcea + Constanţa.

T. callieri Borbas (T. glabrescens ssp. urumovii p.p.) V-VI. Sj.

T. jankae Cel. (T. praecox ssp. skorpilii) VI-VIII. Spredt.

T. serpyllum L. Smalbladet timian. V-IX. Sj.

T. kosteleckyanus Opiz (T. pannonicus p.p.) 10-25cm. V-VIII. Alm.

T. tosevii Vel. (T. sibthorpii p.p.) V-VII. Jud.Constanţa.

T. pannonicus All. Steppetimian. 10-30cm. V-VII. Alm.

T. glabrescens Willd. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. glabrescens: Bladene 2-6mm brede. Alm.
ssp. brachyphyllus (Opiz) Machule: Bladene 6-9mm brede. Sj.

T. austriacus Bernh. (T. glabrescens p.p.) V-VII. Spredt.

T. balcanus Borbas (T. praecox ssp. polytrichus) VI-VIII. Alm.

T. alpester Tausch. Alpetimian. VI-IX. Sj.

T. pulegioides L. Bredbladet timian. V-VII. Alm. 3 underarter:
ssp. pulegioides: Bladene mest tynde, 10-15mm, med svage ribber.
ssp. montanus (W.& K.) Ronn.: Bladene tykkere, 12-18mm, med fremtrædende ribber. Blomstrende skud indtil 30cm.
ssp. parviflorus (Opiz) Machule: Bladene tykkere, 6-10mm, med fremtrædende ribber. Blomstrende skud indtil 10cm.

T. illyricus Ronn. V-VI. Jud.Cluj: Cheia Turzii. (En krydsning?)

T. dacicus Borbas (T. pannonicus x pulegioides) V-VII. Spredt.

T. pinifolius (Heuffel) (T. longicaulis) Langstænglet timian.V-VII.Sj.

Lycopus europaeus L. Sværtevæld. VI-VIII. Alm.

L. exaltatus L.f. Høj sværtevæld. 90-160cm. Som europaeus, men kraftigere. Bladene fjerfligede bortset fra de nederste. Støttebladene 6-9 mm (3-5mm hos europaeus). VII-VIII. Spredt.

Mentha. Mynte.

1. Bægertænderne lidt uens. Bladet under 1cm bredt ..... pulegium
" ens. Bladene oftest over 1cm brede 2.
2. Støttebladene lig bladene. Blomsterstanden med blade eller meget små kranse i toppen ..... 3.
Støttebladene mest små og ulig bladene. Blomsterne i endestillede aks og hoveder 6.
3. Bægeret bredt klokkeformet, tænderne bredt trekantede ... arvensis
" smalt klokke- eller rørformet, tænderne smallere 4.
4. Bægeret smalt klokkeformet. Blomsterstilkene mest glatte gentilis
" rørformet 5.
5. Planten m.m. rød. Bægeret m.m. glat ..... smithiana
" grøn. Bægeret håret verticillata
6. Bladene siddende ..... 7.
" tydeligt stilkede 9.
7. Stængelbladene kun lidt længere end brede ..... suaveolens
" 2 x så lange som brede 8.
8. Stænglen og bladene m.m. glatte ..... spicata
" " bladundersiden hårede longifolia
9. Bladene og bægerrøret hårede ..... aquatica
" " " m.m. glatte piperita

Mentha pulegium L. Polejmynte. 10-30cm. Krybende til opstigende. Støttebladene lig løvbladene. Mange kranse i bladhjørnerne. Bladene oftest smalt elliptiske med 0-6 par tænder. Kronen 4,5-6mm. VII-IX. Alm.

M. arvensis L. Agermynte. VII-X. Alm. 4 underarter:
ssp. arvensis: Bladgrunden afrundet til afskåret. Bladene brede, m.m. tæt hårede på begge sider.
ssp. palustris (Moench) Neumann: Som foregående, men bladene m.m.glatte
ssp. austriaca (Jacq.) Briq.: Bladgrunden kileformet. Støttebladenes stilk højst lig blomsterkransen. Planten m.m. kraftigt håret.
ssp. parietariifolia (Becker) Briq.: Bladgrunden kileformet. Støttebladets stilk længere end blomsterne. Planten svagt håret.

M. verticillata L. Kransmynte. VII-X. Alm.

M. gentilis L. Engmynte.

M. smithiana Graham Rød mynte. 50-150cm. M.m. glat. Bladene ægformede 3-7x2-4cm. Støttebladene mindre opad, oftest længere end blomsterne.

M. aquatica L. Vandmynte. VI-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. aquatica: Bladene ægformede til ægformet-aflange med afrundet eller svagt hjærteformet grund.
ssp. ortmanniana (Opiz) Lemke: Bladene elliptiske eller aflange, med kileformet grund.

Mentha piperita L. Pebermynte. 30-90cm. Bladene 4-8x1,5-4cm, oftest savtakkede. Blomsterne mest i et aflangt, forneden mellembrudt aks.

M. suaveolens Ehrh. Rundbladet mynte. 40-100cm. Bladene 3-4,5x2-4cm, butte, bredest nær grunden, stærkt rynkede, oftest savtakkede, m.m. grå-hviduldne nedenunder. Kransene ofte sammentrængte til aks. VII-IX. Spr.

M. longifolia (L.) Hudson Grå mynte. 50-100cm. Bladene 5-9x2-4cm, grå- til hvidfiltede nedenunder, oftestudstående tandede, jævne til svagt rynkede ved grunden, bredest omkring midten. VI-X. Alm. 4 underarter:
ssp. mollissima (Borkh.) Dom.: Hele planten sølvhvid. Mellemste blade tykke, tæt hvidfiltede og rynkede nedenunder.
ssp. grisella Briq.: Planten grå. Bladene tynde. Mellemste blade grå ovenpå, grå eller hvidlige nedenunder.
ssp. longifolia: Planten grøn, kort tiltrykt håret. Mellemste blade grønne ovenpå, m.m. grå eller hvidlige nedenunder.
ssp. villosa (Hudson): Afviger fra de foregående ved også at have grenhår. Bladundersiden grå- eller hvidfiltet.
Disse underarter er meget foranderlige med mange overgangsformer.

M. spicata L. Grøn mynte. VII-IX. Dyrket og forvildet.

Salvia. Salvie.

1. Kronen 7-9mm. Kronrøret ca. lig bægeret. Enårig ..... reflexa
" 10-45mm, tydeligt længere end bægeret 2.
2. Kransene med 15-30 blomster ..... verticillata
" " 4-10(2-12) blomster 3.
3. Bladene fjersnitdelte med 2-3(4) par små småblade ..... ringens
" højst med 1 par småblade 4.
4. Bladgrunden spydformet. Kronen lysegul ..... glutinosa
" ikke spydformet 5.
5. Stænglen forveddet forneden ..... officinalis
" helt urteagtig 6.
6. Bægeret 10-13mm, overlæben tretandet med stakke på tænderne ..... 7.
" 4-10mm, " hel eller kort tretandet 8.
7. Støttebladene grønne, kortere end bægeret ..... aethiopis
" farvede, mindst af bægerets længde sclarea
8. Kronen hvidgul med mørkerøde kirtelhår ..... austriaca
" blå eller lilla 9.
9. Klasen nikkende i knop. 0-2 par meget små stængelbladpar ... nutans
" opret i knop 10.
10. Bladene siddende, næsten stængelomfattende ..... amplexicaulis
" tydeligt stilkede 11.
11. Støttebladene lig eller længere end bægeret, tit farvede nemorosa
" meget kortere end bægeret, mest grønne 12.
12. Bægeret med 1-1,5mm lange, hvide hår ..... verbenaca
" korthåret og m.m. kirtlet 13.
13. Bladranden regelmæssigt rundtakket ..... transsylvanica
" uregelmæssigt dobbelt rundtakket eller lidt lappet 14.
14. Tvekønnede blomster 20-30mm. Bladene ægformet-aflange .. pratensis
" " 10-20mm. " aflange dumetorum

Salvia reflexa Hornem. 30-60cm. Ofte stærkt grenet. Bladene m.m. lancetformede, bredest i nedre halvdel, svagt takkede. Kronen blå; underlæben 2 x overlæben. VI-VIII. Sj. indslæbt i Jud.Tulcea og Jud.Vaslui.

S. officinalis L. Lægesalvie. Bladene ca. 6cm, rynkede, lancetformede og butte, med hvidfiltet underside. Kransene 5-10-blomstrede, m.m. ensidige. Bægeret rustfarvet. Kronen 17-25mm. VI-VII. Dyrket og forvildet.

S. ringens Sm. 25-90cm. Stængelgrunden forveddet. Bladene rynkede med stort ægformet til elliptisk endeafsnit. Kransene med 2-4 blomster på indtil 40mm. Bægeret 10-17mm, tæt kirteldunet. V-VII. Hagieni.

S. sclarea L. Harpikssalvie. 50-110cm. Mest toårig. Bladene dunede, bredt ægformede med hjærteformet grund. Støttebladene hindeagtige, rødlilla eller hvidlige. Blomsterne 2-3cm, lyslilla eller lyserøde. VI-VII.

S. aethiopis L. Filtet salvie. 30-100cm. Stængel og unge blade hviduldne. Bladene m.m. ægformede, 9-16x3-8cm, uregelmæssigt og groft tandede. Kronen 10-15mm, hvid. VI-VIII. Spredt.

S. glutinosa L. Klæbrig salvie. 50-100cm. Bladene 10-13x6-8cm, trekantet-spydformede. Kransene mest 2-blomstrede. Kronen 3-4cm, lysegul med rødbrune tegninger. VI-VIII. Alm.

S. pratensis L. Engsalvie. 30-50cm. Bladene aflangt ægformede med hjærteformet grund, oversiden rynket, undersiden dunet. Kransene med 4-6 blomster. Kronen 15-30mm. Støttebladene under 1/2 x bægeret. V-VII. Alm.

S. dumetorum Andrz. Steppesalvie. Som foregående, men bladene smallere.

S. transsylvanica (Schur) Schur Hvidhåret salvie. 30-70cm. Stænglen kirteldunet foroven. Bladene ægformede eller aflangt-lancetformede, med hjærteformet grund. Kronen 16-21mm. VI-IX. Nord- og Midtrumænien.

S. nemorosa L. Småblomstret salvie. 30-60cm. Bladene lancetformede, 4-5 x 1-1,5cm, spidse. Støttebladene ofte lilla. V-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. nemorosa: Bægeret meget fint tiltrykt håret. Kronen 8-12mm.
ssp. tesquicola (Klokov & Pobed.) Soó: Bægeret langt, udstående håret. Kronen indtil 14mm.

S. amplexicaulis Lam. Låddenstænglet salvie. 60-120cm. Stænglen tæt udstående lådden. Bladene som hos foregående. Kransene med 6-8 lilla blomster på 8,5-12mm. VII-VIII. Sj.

S. verbenaca L. Jærnurtssalvie. 20-50cm. Nedre blade elliptiske, 6-10 x 3-4cm med 3-4 par m.m. dybe lapper, m.m. kirtlede ovenpå. Kransene med 6-10 blomster. Støttebladene lidt kortere end bægeret. V-VI. Sj.

S. nutans L. Nikkende salvie. 20-120cm. Stænglen bladløs foroven. Bægeret kort låddent og kirtelprikket, 5-8mm. Kronen 12-16mm. V-VII. Spr.

S. austriaca Jacq. Østrigsk salvie. 60-80cm. Bladrosetterne tæt tiltrykte jorden. Bladene uregelmæssigt tandede. 0-få siddende stængelblade. Kronen 12-17mm. Støvdragerne langt udragende. IV-VI. Alm.

S. verticillata L. Kranssalvie. VI-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. verticillata: Bladene korthårede med bred indskæring forneden. Bæ-

geret spredt kirtlet.
ssp. mollis (J.Donn) Penzer: Bladene tæt og fint filtede, med smal indskæring forneden. Bægeret tæt kirtlet.

Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. Kryddermynte. 30-70cm. Bladene elliptisk-rudeformede, let takkede. Kransene 2-blomstrede, ensidige. Støttebladene bredt ægformet-runde, spidse, overlappende. Kronen 3-4mm, lyserød. VI-VIII. Spredt. Indslæbt.

SOLANACEAE

1. Kronen hjulformet, røret kortere end fligene ..... 2.
   Kronrøret længere end kronfligene 4.
2. Støvknapperne ikke sammenstødende. Frugtbægeret opblæst Physalis
   " sammenstødende 3.
3. Bladene mellembrudt fjersnitdelte. Gul krone ..... Lycopersicum
   " hele til fligede Solanum
4. Busk med torne. Kronen med kronrør og hjulformet krave .... Lycium
   Urter. Højst forveddede forneden 5.
5. Blomsterne i toppe eller klaser ..... 6.
   " enlige, parvise eller i små nøgler 7.
6. Bladene helrandede. Blomsterne grønlige ..... Nicotiana
   " lappede. Blomsterne ikke grønlige Hyoscyamus
7. Kronen 5-10cm, tragtformet ..... Datura
   " mindre 8.
8. Kronen blå til lilla. Bægeret delt næsten til grunden ... Nicandra
   " af en anden farve. Bægeret mindre delt 9.
9. Blomsterne nikkende. Kronfligene højst 1-2mm. Med kapsel Scopolia
   Kronfligene mest 4-7mm. Frugten et sort bær Atropa

Nicandra physalodes (L.) Gaertner Kantbæger. VII-IX. Dyrket og forv.

Lycium barbarum L. Bukketorn. VI-IX. Dyrket og forvildet.

Atropa belladonna L. Galnebær. VI-VIII. Alm.

Scopolia carniolica Jacq. Galningeurt. 20-40cm. Nedre blade skælagtige, de øvre 10-15x5-6cm. Blomsterne enlige i bladhjørnerne. Bægerrøret 7-9mm, tænderne 4-5mm. Kronen tragtformet, 20-25mm lang. IV-VI. Spredt.

Hyoscyamus niger L. Bulmeurt. 30-80cm. Stængelbladene siddende. Kronen hvidgul med lilla årer. VI-VIII. Alm.

H. albus L. Hvid bulmeurt. 30-50cm. Stængelbladene stilkede. Kronen hvidgul uden lilla årer, med med grønligt eller lillat svælg. Sj.

Physalis alkekengi L. Jødekirsebær. VI-VIII. Alm.

Solanum. Natskygge.

1. Flerårig. Stænglen forveddet forneden. Kronen lilla .... dulcamara
   Urteagtige enårige 2.
2. Bladene dybt smalfligede ..... triflorum
   " hele til lappede 3.
3. Bægeret 4-5mm. Kronen lidt længere end bægeret ..... retroflexum
   " 1-2,5mm. Kronen (1,5)2-5 x bægeret 4.

4. Kvasten med 5-10 blomster, dens stilk mest 14-30mm ..... nigrum
" " 3-5 " , " " " 7-13mm luteum

Solanum nigrum L. Sort natskygge. VI-X. Alm.

S. luteum Miller Håret natskygge. 10-70cm. Som nigrum, men bærret gult eller rødt, ofte længere end bredt. VII-X. Spredt. 2 underarter:
ssp. luteum: Stænglen butkantet. Planten lådden med udstående og kirtlede hår. Bærret rødt til gult.
ssp. alatum (Moench) Dostal: Højrød natskygge. Stænglen skarpkantet. Planten glat til tiltrykt dunet, uden kirtelhår. Bærret rødt.

S. triflorum Nutt. Egebladet natskygge. 15-100cm. Stinkende. Bladene 2-3cm, nedløbende på stilken. Kvastene med 2-3-blomstrede. Hvid krone. Bærret 10mm, hvidt og grønt broget. VII-VIII. Indslæbt i Jud.Galaţi.

S. retroflexum Dun. 25-60cm. Kvastene med 2-3 blomster. Bærret grønt, undertiden hvidbroget. VII-VIII. Indslæbt i Jud.Galaţi: Bujoru.

S. dulcamara L. Bittersød natskygge. VI-VII. Alm.

Lycopersicon esculentum Miller Tomat. VII-VIII. Dyrket.

Datura stramonium L. Pigæble. VI-IX. Alm.

Nicotiana rustica L. Bondetobak. 60-120cm. Klæbrig enårig. Blomsterne i top, 12-17mm, rør-tragtformede. Bladene 10-15cm, stilken uvinget. VI-IX. Dyrket.

N. tabacum L. Virginsk tobak. 70-300cm. Klæbrig enårig. Blomsterne i top, 35-55mm, tragtformede. Bladene indtil 50cm eller mere, nedløbende siddende eller med en kort, vinget stilk. VI-IX. Dyrket.

N. alata Link & Otto Vingetobak. 80-150cm. Klæbrig fåårig. Blomsterne i klase, 5-10cm. Nedre blade 20-25cm, siddende eller med en kort, vinget stilk. VII-X. Dyrket og forvildet.

SCHROPHULARIACEAE

1. Kronen m.m. hjulformet, med kort kronrør, næsten regelmæssig .. 2.
" ikke " 3.
2. 2 støvdragere. Kronen 4-tallig, mest blå ..... Veronica
4-5 støvdragere. Kronen 5-tallig, mest gul Verbascum
3. Kronrøret med en spore eller pukkel ved grunden ..... 4.
" uden " " " " " " 9.
4. Kronrøret ikke lukket af en pukkel ..... Chaenorhinum
" lukket af en pukkel 5.
5. Kronen med en but pukkel ved grunden ..... 6.
" " " spids spore " " 7.
6. Enårig. Bægerfligene længere end kronrøret ..... Misopates
Flerårig. Bægerfligene kortere end kronrøret Antirrhinum
7. Bladene smalle og m.m. siddende ..... Linaria
" brede og stilkede 8.
8. Bladene lappede, stilken længere end pladen ..... Cymbalaria
" ej " , " kortere " " Kickxia

9. Bægeret med 4 tydelige og m.m. ens tænder ..... 10.
" 5-tandet eller tolæbet 17.
10. Lyserød snylteplante uden bladgrønt ..... Lathraea
Planten med grønne blade 11.
11. Kronen blå, ret regelmæssigt firdelt. 2 støvdragere Veronica
" tolæbet, ikke blå 12.
12. Bægerrøret sammentrykt, skiveformet opblæst. Enårige Rhinanthus
" ikke skiveformet opblæst 13.
13. Blomsterne i ensidige aks, røde eller gule ..... Odontites
" ikke i ensidige aks 14.
14. Flerårig. Kronen gul med flad overlæbe ..... Tozzia
Enårig 15.
15. Nedre blade helrandede ..... Melampyrum
Bladene tandede 16.
16. Kronens overlæbe med 2 skråt oprette tænder ..... Euphrasia
" " hel eller udrandet. Sortlilla krone Bartsia
17. Kronrøret kort og m.m. kugleformet ..... Scrophularia
" rør- til tragtformet 18.
18. Bladene fjersnitdelte ..... Pedicularis
" hele 19.
19. Alle blade grundstillede. Kronen 3mm, regelmæssig .... Limosella
Med stængelblade 20.
20. Stængelbladene spredte ..... Digitalis
" modsatte 21.
21. Kronen gul ..... 22.
" hvidlig til blegrød 23.
22. Bægeret 1,5-3mm ..... Tozzia
" 8-20mm Mimulus
23. Flerårig. Kronen 10-16mm ..... Gratiola
Enårig. Kronen 3-6mm Lindernia

Gratiola officinalis L. Nådesurt. 15-30cm. Glat, opret flerårig. Bladene lancetformede, spidse, 2-5cm, m.m. savtakkede, kirtelprikkede. Kronen rørformet med en noget tolæbet krave. VI-IX. Spredt.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox (L. pyxidaria) Slamurt. 5-15cm Glat, liggende til opstigende. Helrandede, elliptiske, 3-årede blade på 7-25x3-12mm. Blomsterne ofte parvise i bladhjørnerne på 5-15(20)mm lange stilke. V-VIII. Spredt.

Limosella aquatica L. Dyndurt. VI-IX. Spredt.

Mimulus moschatus Douglas Klæbrig abeblomst. 5-35cm. Hele planten klæbrig-dunet. Bægertænderne m.m. ens. Kronen 2cm. VI-VII. Forvildet.

M. guttatus DC. Gul abeblomst. 20-50cm. Glat med kirteldunet blomsterstand. Bægertænderne uens. Kronen 4cm. VII-VIII. Dyrket og forvildet.

Verbascum. Kongelys.

1. Hvert støtteblad med 1 blomst ..... 2.
" " " 2-7 blomster 5.

2. Støvtrådene kun med gule eller hvide hår ..... 3.
" med rødlilla hår (evt. også med nogle hvide hår) 4.
3. Blomsterne med 1-3mm lange stilke. Klasen kirtlet ..... purpureum
" siddende. Klasen uden kirtler ovalifolium
4. Bladene glatte på begge sider. Kronen gul ..... blattaria
Bladundersiden dunet. Kronen mest rødlilla (sj. gul) phoeniceum
5. Støvtrådene med rødlilla hår ..... 6.
" " hvide eller gule hår 9.
6. Bægeret gråt eller hvidt stjærnefiltet ..... 7.
" glat eller med ugrenede hår 8.
7. Grundbladene med hjærteformet grund ..... nigrum
" uden " " chaixii
8. Klasen ugrenet. Bægeret 4-9mm ..... lanatum
" grenet. Bægeret 2-3,5mm glabratum
9. Nedre støvknapper nedløbende eller skævt påsatte ..... 10.
" " nyreformede 13.
10. Øvre stængelblade ikke nedløbende ..... phlomoides
" " nedløbende 11.
11. Støvfanget hovedformet. Nedre støvtråde 3-4 x knapperne thapsus
" spatelformet. " " 2-3 x støvknapperne 12.
12. Støttebladene glatte og hindeagtige i frugt ..... vandasii
" vedvarende filtede densiflorum
13. Grundbladene med kort kileformet grund ..... banaticum
" " jævnt tilsmalnende grund 14.
14. Ældre blade vedvarende gråguIt filtede på begge sider speciosum
" " med m.m. grøn overside 15.
15. Blomsterstilkene 2-5mm. Bladoversiden grådunet .... pulverulentum
" 6-11mm. " næsten glat lychnitis

Verbascum ovalifolium Donn Lindebladet kongelys. 30-100cm. Blomsterne siddende, 2-4cm brede, både med et støtteblad samt 2 forblade. Kronen med gennemskinnelige kirtler. VI-VII. Spredt.

V. purpureum (Janka) Huber-Morath (V. glanduligerum) 40-100cm. Grundbladene 10-25x2-7cm, indskåret-tandede til snitdelte. Klasen grenet og åben. Med støtteblade samt forblade. VII-VIII. Jud-Constanţa: Mangalia.

V. blattaria L. Klasekongelys. 30-120cm. Kirtlet foroven. Grundbladene bugtede til fligede. Bægeret 5-8mm. De 3 øvre støvtråde med hvide og rødlilla hår. V-VII. Alm.

V. phoeniceum L. Purpurkongelys. 30-100cm. Oftest flerårig. Stænglen krushåret forneden, kirteldunet foroven. Få og små stængelblade. Blomsterstilkene 1-2,5cm. Kronen 2-3cm bred. V-VII. Alm.

V. phlomoides L. Hjærtebladet kongelys. 30-120cm. Grå-, hvid- eller gulfiltet toårig. Bægeret 5-12mm. Kronen 2-5,5cm bred. Nedre støvtråde glatte. Støttebladene æg-lancetformede, 9-15mm. VI-VIII. Alm.

V. densiflorum Bertol. Uldbladet kongelys. VII-VIII. Spredt.

V. vandasii (Rohlena) Rohlena Øret kongelys. 60-200cm. Tæt grahvidt filtet. Grundbladene 15-30x5-11cm, svagt rundtakkede, rynkede nedenunder. VI-VIII. Sj. Sydvestlig.

Verbascum thapsus L. Filtet kongelys. VI-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. thapsus: Nedre støvtråde glatte eller svagt hårede.
ssp. crassifolium (Lam.) Murb.: Bjærgkongelys. Nedre støvtråde tæt lådne.

V. speciosum Schrader Kandelaberkongelys. 1-2,5m. Øverste stængelblade runde, ørede og stængelomfattende. Bladene helrandede. Klasen grenet. VI-VIII. Spredt.

V. pulverulentum Vill. Hvidtottet kongelys. 50-120cm. Stænglen rund foroven. Bladundersidens filt afkradseligt. Bladene rundtakkede til næsten helrandede. Stængelbladene mest ikke nedløbende. VI-VII. Sj.

V. banaticum Schrader Butfliget kongelys. 50-100cm. Svagt filtet. Grundbladene dybt og uregelmæssigt rundtakkede, mest lappede mod grunden, 4-10cm stilkede. Øvre blade med hjærteformet grund. VI-VII. Spredt

V. lychnitis L. Blegt kongelys. 50-150cm. Grundbladene grønne ovenpå, hvidfiltede nedenunder, groft rundtakkede til næsten helrandede. Klasen oftest grenet. Kronen 12-20mm bred. VII-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. lychnitis: Bladundersiden hvidfiltet.
ssp. kanitzianum (Simk.& Walz) Soó: Bladene m.m. glatte.

V. chaixii Vill. Savbladet kongelys. 50-120cm. Flerårig. Grundbladene 12-25x6-9cm, m.m. glatte og mørkegrønne ovenpå; stilkene 5-12cm. Klasen oftest grenet. Støttebladene 2-5mm, linjeformede. VII-IX. Alm. 3ssp.:
ssp. orientale Hayek: Nedre støvtråde hårede hele vejen.
ssp. chaixii: Nedre støvtråde glatte foroven. Grundbladene gråfiltede nedenunder, ofte lidt lappede mod grunden.
ssp. austriacum (Schott) Hayek: Nedre støvtråde glatte foroven. Grundbladene grønne nedenunder, ikke lappede.

V. nigrum L. Mørkt kongelys. VI-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. nigrum: Grundbladene 15-30x5-15cm; stilken 5-15cm. Klasen ugrenet eller med få oprette grene.
ssp. abietinum (Borbas) Ferguson: Grundbladene 20-40x10-25cm; stilken 10-30cm. Klasen grenet med halvt oprette eller opstigende grene.

V. lanatum Schrader Uldkongelys. 40-120cm. Stænglen tæt uldhåret forneden. Grundbladene groft dobbelt eller enkelte tandede, svagt hårede ovenpå. Støttebladene 6-15mm, glatte, linjeformede. V-VII. Alm.

V. glabratum Friv. 40-120cm. Grundbladene 17-25x7-12cm, groft dobbelt tandede, indskåret-tandede mod grunden, svagt hårede ovenpa, m.m. tæt hvidfiltede nedenunder. Kronen 16-22mm bred. VI-VII. Alm. 2 ssp.:
ssp. glabratum: Blomsterne 2-7 sammen; hovedblomstens stilk 6-7mm.
ssp. brandzae (Franchet) Murb.: Blomsterne (1)2-3 sammen; hovedblomsternes stilke 8-18mm. Jud.Vilcea.

Scrophularia. Brunrod.

1. Kronen lysegul og regelmæssig ..... vernalis
" ikke gul, m.m. tolæbet 2.
2. Bladene indskåret-lappede til fligede ..... laciniata
" rund- til savtakkede 3.

3. Bladene i det mindste dunede på undersiden ..... scopolii
" glatte 4.
4. Stænglen med 4 brede (1/2-1mm) vingekanter ..... umbrosa
" ikke eller svagt vinget nodosa

Scrophularia vernalis L. Vårbrunrod. VI-VII.(Sic!). Sj.

S. scopolii Hoppe Alpebrunrod. 40-70cm. Stænglen kantet, men ikke vinget. Stænglen m.m. dunet. Bægerlapperne med mindst 1/2mm bred hindekant. Staminodiet m.m. nyreformet. V-VIII. Alm.

S. nodosa L. Knoldet brunrod. VI-VIII. Alm.

S. umbrosa Dum. Vandbrunrod. VII-IX. Alm.

S. laciniata W.& K. 30-60cm. Glat eller kirtlet, ofte blågrøn. Kvastene med 1-3(7) blomster forneden, 1 blomst foroven. Kronen 5-9mm, røret gulligt, øvre lapper brunlilla. V-VI. Spredt.

Antirrhinum majus L. Haveløvemund. VI-IX. Dyrket og forvildet.

Misopates orontium (L.) Rafin. Agerløvemund. VII-IX. Spredt.

Chaenorhinum minus (L.) Lange Liden torskemund. VII-IX. Spredt 2 ssp:
ssp. minus: Frugtstilkene 8-20mm. Kapslen aflangt-ægformet, = bægeret.
ssp. litorale (Willd.) Hayek: Frugtstilkene 3-9mm. Kapslen nærmest kugleformet, ofte kortere end bægeret. Jud-Mehedinţi: Donaudalen.

Linaria. Torskemund.

1. Kronen 4-7mm, bleglilla. Sporen 1,5-3mm, stærkt krummet arvensis
" 13-50mm 2.
2. Kronen lilla, ofte med orange svælgpukkel ..... alpina
" gul 3.
3. Bladene stive, ofte bredest i nedre halvdel. Frøene 1-1,2mm .... 4.
" ikke stive, ofte bredest nær spidsen. " 2-3mm 5.
4. Kronen 15-20mm. Bladene 4-12 x så lange som brede ... genistifolia
" 27-37mm. " 2-4 x " " " " dalmatica
5. Kronen 15-20mm. Sporen længere end underlæben ..... angustissima
" 25-33mm. " kortere " " vulgaris

Linaria genistifolia (L.) Miller Stivbladet torskemund. 30-100cm. Bladene lancetformede med omfattende grund, 3(5)-årede og blågrønne. Alm.

L. dalmatica (L.) Miller Musetornstorskemund. 30-100cm. Bladene indtil 30-35x15-20mm, tilspidset ægformede. VII-VIII.

L. vulgaris Miller Alm. torskemund. Klasen glat eller kirtelhåret. Sporen 10-13mm. Bægertænderne æg- til omvendt lancetformede, halvspidse. VI-IX. Alm.

L. angustissima (Loisel.) Borbas Akstorskemund. 30-70cm. Nær foregående, men altid glat. Sporen 7-10mm. Bægertænderne linje-lancetformede og tilspidsede. VI-VIII. Spredt.

L. alpina (L.) Miller Alpetorskemund. 2-8cm. Liggende til opstigende, glat og blågrå flerårig. Bladene mest i krans. Klasen kort og tæt.

Kronen 15-20mm. Sporen 8-10mm. VII-VIII. Sj. M.Birsei, M.Bucegi.

Linaria arvensis (L.) Desf. Agertorskemund. 10-40cm. Opret og blågrøn. Bladene i krans forneden, spredte foroven. Klasen kirteldunet. V-VII.Sj

Cymbalaria muralis Gaertner & al. Vedbendtorskemund. V-IX. Spredt.

Kickxia elatine (L.) Dum. Spydbladet torskemund. 10-30cm. Liggende, kirteldunet til -håret enårig. Bladene mest trekantet-spydformede. Kronen 7-10mm. Sporen ret. VII-IX. Spredt.

K. spuria (L.) Dum. Rundbladet torskemund. 20-40cm. Som den foregående, men bladene ægformede med afrundet eller hjærteformet grund. Kronen 10-15mm. Sporen krum. VII-IX. Spredt.

Digitalis grandiflora Miller Storblomstret fingerbøl. 60-100cm. Kronen 4-5cm, gul. Planten fintdunet. Nedre blade 15-25x4-5cm, spidse og fint-tandede. Kronens midterflig ikke særligt forlænget. VI-VIII. Alm.

D. ferruginea L. Rustfingerbøl. 30-120cm. Kronen 1,5-3,5cm, gul- til rødbrun med mørkere årer og forlænget midterflig. Stænglen glat. Bladene m.m. lancetformede, glatte eller svagt dunede nedenunder. VII-VIII. Spr.

D. lanata Ehrh. Tungefingerbøl. 30-100cm. Kronen 2-3cm, hvid eller gul-hvid med brune eller lilla årer og med forlænget midterflig. Stænglen ofte rødlilla. Klasens akse kirtellådden. VI-VIII. Alm.

Veronica. Ærenpris.

1. Blomsterne spredte i bladhjørnerne. Liggende planter ..... 2.
" i klaser 8.
2. Bladene 3-7-lappede ..... 3.
" sav- til rundtakkede 4.
3. Kronen blegblå. Frugtstilken 9-15(7-20)mm ..... hederifolia
" blå. Frugtstilken 2-7(9)mm triloba
4. Flerårig. Blomsterstilken 4-6 x bægeret. Griflen 3-4mm filiformis
Enårig. Blomsterstilken højst 3,5 x bægeret. Griflen højst 3mm 5.
5. Frugtbægertænderne æg-hjærteformede med overlappende grund polita
" æg-lancetformede, uden overlappende grund 6.
6. Kapseludrandingen stumpvinklet. Kronen 8-12mm bred ..... persica
" spidsvinklet. " 4-8mm " 7.
7. Kronen blå. Kapslen med korte krushår og lange kirtelhår ... opaca
" bleg. " kun med lange kirtelhår agrestis
8. Blomsterne i sidestillede klaser ..... 9.
" " endestillede " 27.
9. Planten m.m. glat. På frugtig bund ..... 10.
" håret. På tørrere bund 16.
10. Alle blade stilkede. Blomstrende skud krybende forneden ..... 11.
Øvre " siddende. " " m.m. oprette 12.
11. Bladene tykke. Kronen blå ..... beccabunga
" tynde. " bleglilla til næsten hvid scardica
12. Enårig med elliptisk kapsel ..... anagalloides
Flerårig. Kapslen ægformet til rund 13.
13. Øvre blade æg-rudeformede, ofte kortstilkede ..... scardica
" " æg-lancet- til linjeformede, siddende 14.

14. Klaserne ofte spredte. Bladene m.m. linjeformede ..... scutellata
" modsatte. Bladene m.m. lancetformede 15.
15. Alle blade siddende. Kronen 3-5mm bred, mest lyserød ... catenata
Nedre eller de golde skuds blade stilkede anagallis-aquatica
16. Klaserne med 2-7(-9) blomster ..... 17.
" " over 9 " 19.
17. Bladene glatte ..... baumgartenii
" hårede 18.
18. Korte skud med bladene samlede i en slags roset ..... aphylla
Lange " " jævnt fordelte blade montana
19. Stænglerne liggende med opstigende blomsterskud ..... 20.
" oprette eller hurtigt opstigende 21.
20. Bladene m.m. siddende. Klasen uden kirtelhår ..... prostrata
" tydeligt stilkede. Klasen med kirtelhår officinalis
21. Frugtstilken mindst 2 x støttebladet ..... urticifolia
" højst 2 x " 22.
22. Planten udstående håret. Stænglen tveskægget ..... 23.
" m.m. tiltrykt håret. Stænglen ikke tveskægget 24.
23. Bægeret tæthåret. Bladene mest gulgrønne og langtandede
vindobonensis
Bægeret spredt håret. Bladene mest mørkegrønne, korttandede
chamaedrys
24. Bladene fjerfligede, i det mindste de midterste ..... jacquinii
" savtakkede 25.
25. Kronen 9-12mm bred. De øvre blade mest linjeformede og helrandede ..... austriaca
Kronen 12-18mm bred. De øvre blade aflangt ægformede og tandede
teucrium
26. Enårige ..... 27.
Flerårige 33.
27. Øvre stængelblade hånd- eller fjerfligede ..... 28.
" " takkede 30.
28. Øvre stængelblade håndfligede. Frugtstilken ofte længere end støttebladet ..... triphyllos
Øvre stængelblade fjerfligede. Frugtstilken kortere end støttebladet 29.
29. Griflen ca. 0,5mm, så lang som kapselindbugtningen .....verna
" " 1,5mm, længere end " dillenii
30. Planten m.m. glat. Bladene aflange. Blomsterne hvidlige peregrina
" håret. Bladene ægformede. Blomsterne blå 31.
31. Frugtstilken højst 1/2 x bægeret ..... arvensis
" mindst af bægerets længde 32.
32. Kapslen bredere end lang. Frugtstilken 2-3 x bægeret acinifolia
" ca. så bred som lang. Frugtstilken ca. = bægeret praecox
33. Kronrøret længere end bredt ..... 34.
" meget bredere end langt 38.
34. Blomsterstilken længere end støttebladet ..... paniculata
" kortere " " 35.
35. Bladene rundtakkede, rund-savtakkede eller næsten helrandede 36.
" dobbelt savtakkede 37.

36. De 3 nedre kronflige linjeformede og snoede ..... orchidea
" " " " æg-lancetformede og flade spicata
37. Bladene trekantet-ægformede med m.m. hjærtef. grund .. bachofenii
" lancetformede med kileformet til afskåret grund longifolia
38. Stænglerne noget liggende og rodslående. M.m. glatte blade serpyllifolia
Stænglerne m.m. oprette 39.
39. De nedre blade i roset, større end de eventuelle øvre ..... 40.
" " " ikke i roset, mindre end de øvre 41.
40. Med ofte 2 par øvre stængelblade og 5-10 blomster .. bellidioides
Ingen blade over rosetten. 2-5 blomster aphylla
41. Stænglen helt urteagtig. Bladene tydeligt hårede ..... alpina
" forveddet forneden. Bladene halvglatte fruticans

Veronica bellidioides L. Rosetærenpris. 10-20cm. Grundbladene 2-3cm, omvendt ægformede, tæt og mest kirtlet hårede. Blomsterstilkene meget kortere end støttebladene. VII-VIII. Alm.

V. serpyllifolia L. Glat ærenpris. V-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. serpyllifolia: Klasen med 25-40(15-60) hvide til blegblå blomster.
ssp. humifusa (Dickson) Syme: Klasen med 5-15(-25) lyseblå til klart lillablå blomster. Alpin.

V. alpina L. Fjældærenpris. 5-15cm. Bladene spredt hårede til næsten glatte, uden kirtler. Kronen mørkeblå, 4-7mm bred. Kapslen elliptisk, 5-7mm lang, som ung ofte med turkisfarvet anstrøg. VI-VIII. Alm.

V. fruticans Jacq. Klippeærenpris. 5-15cm. Blomstrende skud med 3-6 par blade fra samme år, mest kortere til kun lidt længere end stængelleddene. Kronen mørkeblå med rødlig midte. VI-VIII. Spredt.

V. urticifolia Jacq. Nældeærenpris. 30-60cm. Opret.Bladene trekantet-ægformede, skarpt savtakkede, 4-8x2-4cm. Blomsterne lyseblå eller lyserøde, ca. 7mm brede. Kapslen 2 x bægeret. Griflen ca.5mm. VI-VIII. Alm.

V. teucrium L. Bredbladet ærenpris. 15-70cm. Ofte med 5 bægerblade. Bladgrunden afskåret til svagt hjærteformet. Bladene flade. V-VII. Alm.
ssp. teucrium: Bægertænderne bredere nedad, 0,5-1mm brede. Stænglen mest spredt krusdunet. Alm.
ssp. crinita (Kit.) Velen.: Bægertænderne parallelrandede, højst 0,5mm brede. Stænglen m.m. filtet. Spredt.

V. austriaca L. Savtakket ærenpris. 15-40cm. Ofte med 5 bægerblade. De øvre blade med tydeligt indrullet rand. (V. a. ssp. dentata).

V. jacquinii Baumg. (V. austriaca ssp. aus.) Fjerærenpris. 25-50cm.
ssp. bihariensis (Kerner): Bladene dybt indskåret-tandede, lappede eller uregelmæssigt kløvede, med korte flige.
ssp. jacquinii: Bladene oftest 1-2 x fjersnitdelte. Kapslen mindst så lang som bred.
ssp. multifida (L.): Bladene mest 2 x delte, ca. 1cm. Kapslen bredere end lang. Klaserne højst 5cm i frugt. Jud.Constanţa.

V. prostrata L. Stenærenpris. 10-40cm. Oftest 5 bægertænder. Blomster-

stilkene 1-3mm. Kronen 6-9mm bred, mest lyse- til himmelblå. IV-VI.Alm

Veronica aphylla L. Sneærenpris. 3-8cm. Klaserne med 2-5 blålilla, 6-8mm brede blomster. Stilkene længere end støttebladene. Bladene dunede, ofte bredt ægformede. VI-VIII. Spredt.

V. baumgartenii R.& Sch. Spidsbladet ærenpris. 4-12cm. Opstigende. 1-4 modsatte, korte, halvskærmformede klaser. Blomsterstilkene indtil 15mm. Kronen ca. 9mm bred, blå. VII-VIII. Spredt. Alpin.

V. officinalis L. Lægeærenpris. VI-VIII. Alm.

V. chamaedrys L. Tveskægget ærenpris. V-VIII. Alm.

V. vindobonensis (Fischer) 15-25cm. Stænglen altid helt glat uden for hårstriberne. Kronen lyseblå, ofte med hvidlig rand.

V. montana L. Bjærgærenpris. V-VI. Spredt.

V. scutellata L. Smalbladet ærenpris. VI-IX. Alm.

V. beccabunga L. Tykbladet ærenpris. V-VII. Alm.

V. scardica Griseb. Rudeærenpris. 5-20cm. Bladene mest 12-20x10-16mm, tilsmalnende mod stilken, lysegrønne eller lillaanløbne, ikke skinnende. Blomsterstilken 3-5 x støttebladet. V-VI. Sj.

V. anagalloides Guss. Dyndærenpris. 10-40cm. Ligner anag.-aqu., men stænglerne svampede (hule hos a.q.), ofte rødligt anløbne. Bladene smalt lancetformede. Blomsterstilken ca. = støttebladet. V-VI. Spredt.

V. anagallis-aquatica L. Lancetbladet ærenpris. V-VIII. Alm. 2 ssp.: ssp. anagallis-aquatica: Klasen glat. Frugtstilken skrát opret. ssp. anagallidiformis (Bor.) Soó: Klasen m.m. kirtlet. Frugtstilken nogle gange vandret udstående.

V. catenata Pennell Vandærenpris. VI-IX. Spredt.

V. acinifolia L. Stilkærenpris. 3-10cm. Bladene ægformede, ikke eller svagt tandede. Planten m.m. kirteldunet overalt. Kronen blå, 2-3mm bred. IV-V. Spredt.

V. praecox All. Tidlig ærenpris. 5-20cm. Kirteldunet. Frugtstilkene 2,5-8mm, bueformet opstigende. Kapslen bredt elliptisk. Griflen længere end indbugtningen. III-V. Spredt.

V. triphyllos L. Trefliget ærenpris. III-V. Spredt.

V. arvensis L. Markærenpris. IV-VI. Alm.

V. verna L. Vårærenpris. III-V. Spredt.

V. dillenii Cr. Hedeærenpris. 5-30cm. Som verna, men kraftigere. Kronen 4-5mm bred og mørkeblå. IV-V. Spredt.

V. peregrina L. Vandreærenpris. 5-20cm. Opret. Bladene 3-5 x så lange som brede, helrandede til svagt tandede. IV-VI. Sj.

V. agrestis L. Flerfarvet ærenpris. III-X. Spredt.

Veronica polita Fr. Blank ærenpris. III-X. Alm.

V. opaca Fr. Mat ærenpris. III-X. Alm.

V. persica Poiret Storkronet ærenpris. III-VI. Alm.

V. filiformis Sm. Trådærenpris. IV-V. Sj.

V. hederifolia L. Vedbendærenpris. III-VI. Alm.

V. triloba (Opiz) Wiesbaur Trelappet ærenpris. 5-20cm. Bladene kødede, trelappede, mørkegrønne. Bægerbladene dunede udvendigt, omslutter kapslen i frugt.

V. longifolia L. Langbladet ærenpris. 60-120cm. Stænglen foroven med 0,2-0,5mm lange hår. 0-3 kortere sidestillede klaser. Frugtstilken uden kirtler. VI-VIII. Alm.

V. paniculata L. Topærenpris. 60-120cm. Stænglens øvre hår 0,1-0,2mm. Med 5-10 sidestillede, ofte lige lange og ofte kransstillede ekstraklaser. Frugtstilken med kirtler. VI-VIII. Spredt. 2 underarter:
ssp. paniculata: Bladene smalt lancetformede, de midterste 5-6 x så lange som brede.
ssp. foliosa (W.& K.) Skalicky: Bladene æg-lancetformede, 3 x så lange som brede.

V. bachofenii Heuffel Saværenpris. 20-30cm. Bladene ikke i krans, de nedre 1-2cm langt stilkede. VI-VIII. Spredt.

V. spicata L. Aksærenpris. V-IX. Alm. 3 underarter:
ssp. incana (L.) Walters: Sølværenpris. Planten tæt grå-hvid-filtet.Sj.
ssp. crassifolia (Nyman) Hayek: Bladene glatte eller spredt randhårede nær grunden, de nedre 1-2cm stilkede. Sj.
ssp. spicata: Bladene m.m. hårede, de nedre højst 1cm stilkede.

V. orchidea Cr. Skrueærenpris. 30-50cm. Som spicata, men stænglen foroven med korte, opadkrummede hår. Blomsterne lugter af brændte hår. Kronens overlæbe sammenfoldet om støvdragere og griffel. De 3 nedre flige skruesnoede og parallelt nedadrettede. VII-X. Alm.

Melampyrum. Kohvede.

1. Klasen alsidig. Blomsterne vendte i 4 retninger ..... 2.
" ensidig. " " i 1-2 retninger 4.
2. Støttebladene hjærteformede og foldede langs midten ..... cristatum
" ikke hjærteformede, m.m. flade 3.
3. Øvre støtteblade rødlilla. Kronen rødlilla og lysegul ..... arvense
" " bleggule. " ensfarvet lysegul barbatum
4. Støttebladene lilla, i det mindste de øvre ..... 5.
" grønne 6.
5. Bægeret tæt og ensartet langhåret ..... nemorosum
" kun langhåret på ribber og rand bihariense
6. Kronens svælg m.m. lukket ..... pratense
" " åbent 7.
7. Støvknapperne 1,5-2,2mm. Kronen oftest gyldengul ..... silvaticum
" 2,5-4,4mm. " bleggul eller hvid 8.

8. Støttebladene højst 25x4mm. Kronen bleggul ..... herbichii
" indtil 40x7mm. Kronen hvid saxosum

Melampyrum cristatum L. Kantet kohvede. V-VIII. Alm.

M. arvense L. Agerkohvede. VI-VIII. Alm.

M. barbatum W.& K. Skjallerkohvede. 15-35cm. Skjalleragtig plante. Støttebladene dybt kamformet tandede med næsten børsteformede tænder. Bægeret tæt låddent. Kronen 2-3cm med åbent svælg. VI-VIII. Spredt.

M. nemorosum L. Blåtoppet kohvede. Bægertænderne trekantet-lancetformede, m.m. udstående, 4-5mm lange. VI-IX. Spredt.

M. bihariense A.Kerner Rumænsk kohvede. 20-50cm. Bægertænderne sylformede, fremadrettede, 8-10mm lange. VI-IX. Alm.

M. silvaticum L. Skovkohvede. VI-IX. Alm.

M. herbichii Woł. 12-30cm.

M. saxosum Baumg. Klippekohvede. 10-40cm.

M. pratense L. Almindelig kohvede. VI-IX. Spredt.

Tozzia alpina L. ssp. carpatica (Woł.) Dostal Guldsvælg. 20-40cm. Stænglerne firkantede og ofte kanthårede. Bladene ægformede, siddende, lidt kødede, ofte takkede. Kronen 4-7mm, bleggul, rødprikket indvendigt og tragtformet. Bjærgenge, Grønællekrat. VII-VIII. Spredt.

Euphrasia. Øjentrøst.

1. Bladtænderne med et stykke lige rand imellem sig ..... 2.
" rører hinanden 3.
2. Støttebladstænderne 1-2,5mm. Kapslen lig eller længere end det 4-6,5mm lange bæger ..... salisburgensis
Støttebladstænderne 2-4,5mm. Kapslen lig eller kortere end det 6-8mm lange bæger illyrica
3. Med lange kirtelhår: stilken 10-12 x kirtlen ..... rostkoviana
Uden eller med korte kirtelhår: stilken højst 6 x kirtlen 4.
4. Griflen udragende under blomstringen. Kronen vokser under blomstringen og er til sidst op til 10mm ..... picta
Griflen ikke udragende. Kronen vokser ikke under blomstringen 5.
5. Kronen mest længere end 7mm målt langs ryggen ..... 6.
" " kortere " " " " " 8.
6. Nedre støtteblades nederste tandpar udstående ..... arctica
" " " " fremadrettet 7.
7. Kapslen mest 4-5,5mm. Ofte 2-6(13) grenpar. Planten ofte lilla stricta
Kapslen mest 5-7mm. 0-3(6) grenpar. Planten ikke lilla pectinata
8. Støttebladenes spids spidsvinklet, under 90° ..... 9.
" " stumpvinklet, over 90° 10.
9. Nedre støtteblades nederste tandpar fremadrettet ..... liburnica
" " " " udadrettet micrantha
10. Øvre stængelblade elliptisk-ægformede til smalt omvendt ægformede ..... coerulea
Øvre stængelblade halvrunde til bredt ægformede minima

Euphrasia rostkoviana Hayne Kalkøjentrøst. 5-30cm. Kronen vokser under blomstringen til 8-12mm. VI-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. rostkoviana: Nederste blomst ved 6-10. bladfæste. Stængelleddene mest under 3 x bladenes længde.
ssp. montana (Jordan) Wettst.: Bjærgøjentrøst. Nederste blomst ved 2-6. bladfæste. Stængelleddene 2-6 x så lange som bladene.

E. picta Wimmer ssp. kerneri (Wettst.) Yeo Storblomstret øjentrøst. 8-40cm. Bladene glatte til korthårede. 7-12 par opstigende grene. Nederste blomst ved 8-12. bladfæste. VII-IX. Sj.

E. arctica Lange ssp. slovaca Yeo (E. vernalis) 5-25cm. 0-3 par oftest oprette grene. Nederste blomst ved 4-9. bladfæste. Leddene 1,5-5 x bladene, disse oftest med kirtelhår. Kronen 6,5-8,5mm. Med kirtelhår på 0,2-0,5mm. VI-IX. Sj.

E. coerulea Hoppe & Fürnrohr Blå øjentrøst. 5-20cm. 0-1(3) par korte grene. Bladene under 8mm, højst med 4 tandpar; støttebladene med indtil 5. Kronen mest lilla. V-VI. Sj. M.Maramureş, M.Rodnei, M.Bihor.

E. stricta D.Wolff Spids øjentrøst. VI-VIII. Alm. 2 underarter.

E. pectinata Ten. (E. tatarica) Kamøjentrøst. -35cm. 0-3 par grene. Nederste blomst ved 5-8. bladfæste. Kronen 6,5-9mm, oftest hvid, ellers lilla. VI-VIII.

E. liburnica Wettst. Lundøjentrøst. 5-15cm. Planten sjældent grenet. Blade og støtteblade meget ens, med 3-5 par spidse takker.

E. minima Jacq. Liden øjentrøst. 2-25cm. Nederste blomst ved 2-6. bladfæste. 0-3 par lange, oprette grene. Kronen 4-6mm, underlæben gul, hvid eller lilla, overlæben oftest lilla. VII-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. minima: Højst 12cm. Nederste blomst ved 2-5. led. Stængelbladenes øverste tand indadbøjet. Kapslen ca. 2 x så lang som bred.
ssp. tatrae (Wettst.) Hayek: Op til 25cm. Nederste blomst ofte ved 6. bladfæste. Stængelbladenes øverste tand sjældent indadbøjet. Kapslen op til 3 x så lang som bred.

E. micrantha Rchb. Lyngøjentrøst.

E. salisburgensis Funck Brun øjentrøst. 5-20cm. Stængelleddene indtil 3 x bladene, disse ofte stærkt lillaanløbne. Kronen hvid, underlæben tit ret lille. Nederste blomst ved 2-13. bladfæste. VI-IX. Alm.

E. illyrica Wettst. Krumtandet øjentrøst. 5-15cm. Nederste blomst ved 9-15. stængelled. Kronen lilla. Sj. M.Paring: V.Jieţului. M.Vilcan: Piatra Boroştenilor.

Odontites lutea (L.) Clairv. Dunet guldtop. 15-40cm. Enårig med ensidige akslignende klaser. Blomsterne æggegule med udragende støvdragere, 5-8mm. Bladene linjeformede, næsten helrandede. VII-VIII. Alm.

O. verna (Bell.) Dum. Rødtop. VI-IX. 2 underarter:
ssp. verna: Støttebladene længere end blomsterne. Tidlig rødtop.
ssp. serotina (Dum.) Corb.: Høstrødtop. Støttebladene ikke længere end blomsterne.

Bartsia alpina L. Sorttop. 8-30cm. Noget skjalleragtig plante med sortlilla blomster og mørke- til sortgrønne blade. Planten kirtelhåret. Bladene ægformede. Kronen 15-20mm. VII-VIII. Alm.

Pedicularis. Troldurt.

1. Kronen rød ..... 2.
" gul 4.
2. Bladene i krans ..... verticillata
" modsatte 3.
3. Bægeret tolæbet. Kronens overlæbe med 2 takker fortil ... palustris
" regelmæssigt. Kronens overlæbe uden takker limnogena
4. Kronens overlæbe løber ud i et langt næb ..... baumgartenii
" " uden noget langt næb 5.
5. Overlæben ender i et kort og bredt, tospidset næb ..... comosa
" but, uden næb eller takker 6.
6. Underlæben rødrandet og tiltrykt overlæben ..... sceptrum-carolinum
" ikke rødrandet og ikke tiltrykt overlæben 7.
7. Overlæben rødspidset ..... oederi
Kronen helt gul 8.
8. Bægeret dunet til låddent ..... hacquetii
" glat til næsten glat exaltata

Pedicularis sceptrum-carolinum L. Kongescepter. 15-80cm. Stænglen ofte rødlig. Med grundbladsroset. Kronen 28-35mm, svælget næsten lukket. Sj.

P. hacquetii Graf Kørveltroldurt. 30-90cm. Bladene 2-3 x delte, glatte ovenpå, hårede nedenunder, støttebladene ligeså. Bægeret læderagtigt, halvt kløvet på undersiden. Kronen indtil 25mm. VII-VIII. Spredt.

P. exaltata Besser Høj troldurt. 100-150(200)cm. Som hacquetii, men støttebladene glatte. Bægertænderne meget korte. VI-VIII. Spredt.

P. limnogena A.Kerner Kildetroldurt. 8-15cm. Stort set glat. Klasen mangeblomstret. Blomsterstilkene 2-4mm, fortykkede opad. Kronen 12-15mm med but overlæbe. VI-VII. Sj.

P. oederi Vahl Gylden troldurt. 4-15cm. Bladene 2-6x1/2-1cm, 1 x delte med tandede flige. Støttebladene kortere end blomsterne, disse ofte blodrøde indvendigt. VI-VIII. Spredt.

P. verticillata L. Kranstroldurt. 5-20cm. Bladene 3-4 sammen, 1 x delte med ægformede, tandede afsnit. Støttebladene ofte lilla. Bægeret med korte, helrandede tænder. Kronen rødlilla, uden næb. VI-VIII. Alm.

P. palustris L. Engtroldurt. V-VII. Spredt.

P. comosa L. Dusktroldurt. 20-85cm. Bladene lancetformede, 2 x delte, dunede. Citrongule eller hvidlige blomster i et tæt aks. Bægeret hindeagtigt og mørkåret. VI-VIII. Spredt. 2 underarter:
ssp. comosa: Stænglen indtil 50cm, kruset-dunet. Bægeret dunet på kanterne. Kronen med randhåret underlæbe.
ssp. campestris (Griseb.) Soó: Stænglen indtil 85cm. Bægeret og kronens underlæbe glatte.

Pedicularis baumgartenii Sim. Stentroldurt. 10-25cm. Bladene m.m. glatte, 1 x delte med tandede flige. Bægeret låddent med helrandede, trekantede tænder. VI-VII. Sj. M.Ceahlau, M.Birsei, M.Fagaraş,M.Retezat

Rhinanthus. Skjaller.

1. Bægeret kirtelhåret, i det mindste langs kanten ..... 2.
" uden eller stort set uden kirtelhår 3.
2. Stængel og øvre støtteblade kirteldunede ..... rumelicus
" " " " m.m. glatte wagneri
3. Bægeret låddent langhåret ..... alectorolophus
" glat eller dunet 4.
4. Overlæbens tænder højst 0,7mm, bredere end lange ..... minor
" " 0,8-2,5mm, tydeligt længere end brede 5.
5. Kronen med åbent svælg og stærkt krummet kronrør ..... alpinus
" " lukket " " svagt " " 6.
6. Bladene med spidse, udstående tænder ..... borbasii
" " tiltrykte tænder angustifolius

Rhinanthus minor L. Liden skjaller. V-VIII. Alm.

R. alpinus Baumg. Alpeskjaller. 15-50cm. Støttebladene bleggrønne, glatte, af bægerets længde. Bægeret glat. Kronrøret brat og stærkt krummet. VI-IX. Alm. (R. gracilis Schur er en overgangsform til angustifolius med mindre åbent svælg og mindre brat krummet kronrør.)

R. rumelicus Velen. Kirtlet skjaller. 15-60cm. Kronen op til 20mm med svagt krummet kronrør. Støttebladstænderne næppe kortere end spidsen.

R. wagneri Degen Bægeret m.m. glat bortset fra den kirtelhårede rand. Støttebladene som hos rumelicus. V-IX.

R. borbasii (Dörfler) Soó Krumtandet skjaller. 20-60cm. Støttebladene meget længere end bægeret, glatte, tænderne aftager jævnt mod spidsen.

R. angustifolius Gmelin Stor skjaller. V-IX. Alm.

R. alectorolophus (Scop.) Pollich Håret skjaller. 20-50cm. Støttebladene med lige store tænder uden stak. Stænglen håret, uden sorte streger. V-VI. Sj.

Lathraea squamaria L. Skælrod. IV-V. Alm.

GLOBULARIACEAE

Globularia punctata Lapeyr. Almindelig kugleblomst. 5-25cm. Flerårig rosetplante med bladet stængel. Små, lyseblå blomster i 1,5cm brede hoveder med svøbblade under. Grundbladene spatelformede, ofte udrandede. VI-VII. Spredt.

ACANTHACEAE

Acanthus balcanicus Heyw.& Rich. 30-60cm. Staude med fjerfligede blade, der mest er grundstillede. 4-5cm store, hvide, rødårede maskeblomster uden overlæbe i et tæt aks på 30x3cm med ægformede, 4cm store støtteblade. V-VII. Sj. Jud.Alba + Caraş-Severin + Mehedinţi + Dolj.

OROBANCHACEAE

Orobanche. Gyvelkvæler.

1. Hver blomst med 1 støtteblade, 2 forblade og 2 bægerflige. Kronen blå til lilla ..... 2.
   Hver blomst med 1 støtteblad og 2 bægerflige 7.
2. Støvknapperne hårede ..... 3.
   " glatte eller svagt hårede forneden 4.
3. Oftest grenet. Støttebladet kortere end bægeret ..... aegyptiaca
   " ugrenet. " mindst lig " arenaria
4. Kronen 10-13(17)mm. Stænglen ofte grenet ..... ramosa
   " 18-25(30)mm 5.
5. Bægertænderne og ofte stænglens overdel hviduldne ..... caesia
   Planten ikke hvidulden nogetsteds 6.
6. Oftest grenet. Stænglen 2-3mm tyk forneden ..... mutelii
   Ugrenet. Stænglen 4-7mm tyk forneden purpurea
7. Kronen blålilla, indsnævret midtpå ..... 8.
   " ikke rent blålilla, ikke indsnævret på midten 9.
8. Støtteblade, bæger og krone spindelvævshårede ..... coerulescens
   " " " " kirteldunede cernua
9. Kronens ryglinje brat bøjet over overlæben eller nær grunden ... 10.
   " " jævnt krummet 17.
10. Kronens overlæbe med mørke kirtelhår ..... 11.
    " " " lyse " 12.
11. Underlæben ikke kirtelrandhåret ..... reticulata
    " kirtelrandhåret alba
12. Kronen med hvid eller gullig grundfarve, 10-22mm ..... 13.
    " " brun " brunlilla grundfarve, mest 20-35mm 15.
13. Overlæbens flige lige fremadrettede. Kronen mest 10-15mm ... minor
    " " m.m. opadbøjede 14.
14. Bægerbladene næsten helt delte ..... loricata
    " kun halvt delte picridis
15. Støvfanget gult eller hvidligt. På Ærteblomstrede ..... lutea
    " rødlillat. Ikke på Ærteblomstrede 16.
16. Kronen ikke hvidlig ved grunden. På Snerre ..... caryophyllacea
    " hvidlig ved grunden. På Kortlæbe teucrii
17. Kronen skinnende mørkerød indvendigt ..... gracilis
    " ikke sådan 18.
18. Støvfanget mest lillat. Kronen 10-15(18)mm ..... minor
    " gult 19.
19. Underlæben kirtelrandhåret ..... 20.
    " ikke kirtelrandhåret 21.
20. Akset løstblomstret, ihvertfald forneden ..... lucorum
    " tætblomstret alsatica
21. Akset løstblomstret, ihvertfald forneden ..... flava
    " tætblomstret elatior

Orobanche ramosa L. Grenet gyvelkvæler. 15-25cm. Mange blomster. Bægertænderne mest kortere end røret. VI-X. Alm.

O. mutelii Schultz 7-20cm. Mange blomster. Kronen 18-22mm. Bægertænder-

ne ca. lig røret.

Orobanche aegyptiaca Pers. Bomuldsgyvelkvæler. 15-50cm. Kronen bleg-blå, 25-37mm. Nedre blomsterstilke ofte 1-2cm. Kronen ret eller lidt krummet. På Bomuld, Natskygge m.m. IV-IX. Jud Mehedinţi + Constanţa.

O. caesia Rchb. Uldhåret gyvelkvæler. 10-30cm. Kronen 20-25mm, lyst blålilla, kirteldunet. Støvfanget hvidt. Støvdragerne m.m. glatte, udgår 6-8mm fra grunden. På Bynke. V-VIII. Spredt.

O. arenaria Borkh. Sandgyvelkvæler. 30-50cm. Kronen 20-35mm, blålilla, kirteldunet. Støvfanget hvidt. Støvtrådene m.m. glatte, udgår 6-7mm fra grunden. På Bynke. V-VII. Spredt.

O. purpurea Jacq. Røllikegyvelkvælet. 15-60cm. Kronen 20-30mm, blålilla. kirteldunet. Ellers som foregående. På Røllike og andre Kurvblomster. VI-VII. Alm.

O. coerulescens Stephan Blålig gyvelkvæler. 10-40cm. Stænglen gullig. Kronen 14-23mm, blegt blålilla. Støvfanget bleggult. Underlæben ikke randhåret. På Bynke. V-VII. Spredt.

O. cernua Loefl. Krum gyvelkvæler. 20-40cm. Kronen 12-20mm, ofte meget krum, hvidligt hindeagtig forneden, blålilla. V-X. Spredt. (O. cumana).

O. alba Stephan Timiangyvelkvæler. 20-25cm. Kronen 15-25mm, hvidlig, lillaåret, rødlig mod spidsen. Støvtrådene udgår 1-3mm fra grunden, tæthårede forneden. Griflen stærkt mørkkirtlet. På Læbeblomster. Alm.

O. reticulata Wallr. Tidselgyvelkvæler. 30-80cm. Ligner alba, men støvtrådene m.m. glatte forneden. VII-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. reticulata: Kronen kun gul ved grunden, ellers lillaåret. Overlæben tæt kirtelhåret. På Tidsler og Dipsacaceae.
ssp. pallidiflora (Wimm.& Grab.) Hay.: Kronen hvidliggul, svagt lilla mod spidsen. På Tidsler.

O. loricata Rchb. 15-50cm. Længere bægertænder næsten af kronens længde. Støttebladet ca. så langt som underlæben. Griflen tæt kirteldunet. Mest på Bynke. IV-VII. Sj.

O. picridis F.W.Schultz Bittermælksgyvelkvæler. 10-50cm. Længere bægertænder tydeligt kortere end kronen. Støttebladet kortere end underlæben. Griflen svagt kirteldunet. Især på Bittermælk og Høgeskæg. V-VIII. Spr.

O. minor Sm. Kløvergyvelkvæler. 10-50cm. Kronen gullighvid med rødlige eller lilla årer eller anstrøg. Støvdragerne udgår 2-3mm fra grunden, hårede forneden, glatte foroven. V-VIII. Spredt.

O. caryophyllacea Sm. Snerregyvelkvæler. 20-50cm. Kronen 20-32mm, mest gulbrun til rødbrun, med nellikeduft. Støvdragerne udgår 1-3mm fra grunden, kirtelhårede foroven. På Snerre og Mysike. V-VIII. Alm.

O. teucrii Holandre Kortlæbegyvelkvæler. 15-40cm. Kronen brunliglilla, 20-30mm, med m.m. lige ryg, dog krummet fortil. Støvtrådene hårede, udgår 3-5mm fra grunden. V-VII. Spredt.

O. lutea Baumg. Gulbrun gyvelkvæler. 30-50cm. Kronen gullig eller

blegt rødbrun, ofte lillaanløben, med liljekonvalduft. Støvtrådene udgår 3-6mm fra grunden, hårede. V-VI. Alm. Mest på Medicago og Trifolium

Orobanche elatior Sutton Stor gyvelkvæler. 30-60cm. Kronen 18-25mm, først rosenrød, senere rødliggul; gul ved støvdragernes grund, der sidder 3-6mm fra kronens grund. På Knopurter m.m. VI-VIII. Alm.

O. alsatica Kirschleger Svovlrodsgyvelkvæler. 30-70cm. Kronen 12-22mm, gullig, brunlilla mod spidsen og på årerne. Støvtrådene udgår 3-5mm fra grunden, hårede. På Skærmplanter. V-VII. Spredt.

O. flava Mart. Hestehovsgyvelkvæler. 15-50cm. Kronen 15-22mm, gul eller blegt rødbrun, kirteldunet. Støvtrådene hårede, udgår 5-6mm fra grunden. Griflen ofte udragende. På Hestehov m.m. VI-VIII. Spredt.

O. lucorum A.Braun Berberisgyvelkvæler. 15-50cm. Kronen 15-20mm, gul og kirteldunet. Støvtrådene udgår 2-3mm over grunden. Griflen ikke udragende. På Berberis. VI-VII. Sj.

O. gracilis Sm. Blodrød gyvelkvæler. 20-50cm. Kronen 15-25mm, med krydderneilikeagtig lugt. Støvfanget gult med rødlilla rand. Støvtrådene udgår 0-2mm fra grunden, hårede forneden. På Ærteblomster. Alm.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula alpina L. Fjældvibefedt. Kronen hvid med gulplettet svælg, 10-14mm lang, med en kort, kegleformet spore. V-VII. Spredt.

P. vulgaris L. Alm. vibefedt. V-VII. Alm.

Utricularia. Blærerod.

1. Bladfligene uden børster. Sporen ca. så lang som bred ..... 2.
   " med " . " længere end bred 3.
2. Underlæben med nedbøjede sider, 6mm bred ..... minor
   " flad, 8-10mm bred bremii
3. Underlæben med stærkt nedadrettet rand. Sporen kirtlet fortil vulgaris
   Underlæben næsten flad. Sporen kirtlet fortil og bagtil australis

Utricularia minor L. Liden blærerod. Klasen 2-6-blomstret. VI-VIII.Spr

U. bremii Heer Klasen med 2-14 blomster. VII-VIII. Spredt.

U. vulgaris L. Almindelig blærerod. VI-VIII. Alm.

U. australis R.Br. Slank blærerod. VII-VIII. Spredt.

RUBIACEAE

1. Blomsterne i tætte aks med taglagte støtteblade ..... Crucianella
   " ikke i aks 2.
2. Blomsterne i hoveder med m.m. sammenvoksede svøbblade .. Sherardia
   " ikke i hoveder med " " 3.
3. Kronen 5-tallig, bleggul. Frugten en sort stenfrugt ..... Rubia
   " (3)4-tallig. Frugten tør 4.

4. Kronrøret ca. lig eller længere end kronfligene ..... Asperula
" meget kort 5.
5. Gule blomster i korte kvaste over de 4 blade ..... Cruciata
Anderledes Galium

Sherardia arvensis L. Blåstjærne. V-IX. Spredt.

Crucianella angustifolia L. Smalbladet korsaks. 6-30cm. Enårig. Bladene 6-8 sammen, 1/2-1mm brede. Akset 2-8cm x 4-6mm, firkantet. De taglagte støtteblade 3-6x1mm. Små, bleggule, langrørede blomster, der rager ud mellem støttebladene, 3-5mm. VI-IX. Sj.

Asperula. Mysike.

1. Bladene m.m. lancet- eller ægformede. Blomsterne hvide ..... 2.
Midterste og øvre blade linje- eller linje-lancetformede 4.
2. Kronen 11-15mm. Blomsterne i tætte hoveder ..... taurina
" 1-7mm. Blomsterne ikke i hoveder 3.
3. Stænglen ru af små torne. Frugten kornet ..... Galium rivale
" ikke ru. Frugten kroghåret Galium odoratum
4. Enårig. Bladene butte. Blå blomster ..... 5.
Flerårig. Bladene spidse, brodspidsede eller med stak 6.
5. Svøbbladene længere end kronrøret ..... arvensis
" kortere " " orientalis
6. Blomsterne lysegule. Stænglerne liggende ..... Galium humifusum
" mest hvide eller rød lige. Stænglerne oprette/opstig. 7.
7. Blomsterne i 1-5 stilkede hoveder. Bladene ofte 6 sammen capitata
" i løse stande 8.
8. Bladene i kranse på 6-10. Kronen 1,5-3,5mm ..... Galium punkt 31.
I det mindste de øvre blade 2-4 sammen 9.
9. Støttebladene ægformede eller rundagtige. Kronen ofte 3-tallig tinctoria
Støttebladene lancet- eller m.m. linjeformede. Kronen 4-tallig 10.
10. Kronrøret 2-3 x så langt som kronfligene ..... 11.
" 1-2 x " " " " 12.
11. Kronfligene butte. Stængelgrunden forveddet ..... tenella
" spidse. " urteagtig aristata
12. Frugten (2,5)3-4mm, tæt dækket af skælformede knuder .... setulosa
" 1,5-2mm, finvortet 13.
13. Løst tueformet, med golde skud. Kronen mest 2,5-3,5mm cynanchica
Ikke " , uden " " . " " 2-2,5mm rumelica

Asperula aristata L.f. ssp. scabra (Presl) Nyman (A. longiflora) Brodmysike. 10-60cm. M.m. opret og grøn. Delblomsterstandene m.m. aksformede. Kronen 5,5-8mm, grønliglilla, lyslilla eller gullig. VI-VIII. Sj.

A. tenella Heuffel Nålemysike. 35-45cm. M.m. opret. Mellemste stængelled mest 2-3 x bladene, disse 1/2-1mm brede. Delblomsterstandene halvskærmformede. Kronen 4-6mm, rødlig. VI-VII. Sj.

A. cynanchica L. Bakkemysike. 10-50cm. Liggende til opstigende, grøn (sj. blådugget). Bladene 0,8-1,5mm brede. Kronen bredt tragtformet, ofte m.m. ru udvendigt, bleglilla til hvidlig. VI-VII. Alm.

Asperula rumelica Boiss. 10-90cm. M.m. grågrøn. Bladene 0,5-1mm brede, med omrullet rand. Blomsterstilkene indtil 2mm. Kronen smalt tragtformet, tæt korthåret udvendigt.

A. setulosa Boiss. 26-65cm. Liggende til opstigende. Stængelleddene ca. 3 x bladene, disse 0,7mm brede, stive. Kronen 3,5-5mm ofte kort stivhåret; røret ca. = fligene. VI-VII. Sj.

A. capitata Kit. Hovedmysike. 10-20cm. Løst tueformet. Bladene 1-1,5 mm brede, med omrullet rand. Hovederne med et svøb af støtteblade. Kronen m.m. tragtformet, rødlig. VI-VII. Spredt.

A. taurina L. ssp. leucanthera (G.Beck) Hayek Treribbet mysike. 20-40 cm. Stængler og blade m.m. udstående hårede. Kronen hvid til bleggul. Blomsterne omgivne af støtteblade. Bladene 3-ribbede. V-VI. Spredt.

A. tinctoria L. Farvemysike. 30-60cm. Nedre kranse med 6 øvre med 4 blade, disse m.m. treribbede, 25-40x1,2-7mm. Kronen hvid, 3-4mm. V-VII. ssp. tinctoria: Støttebladene butte, mest glatte. Bladene 1-3mm brede. ssp. banatica (Holub): Støttebladene spidse eller tilspidsede, kort randhårede. Bladene 1-7mm brede, randhårede. Sydvest.

A. arvensis L. Blåmærke. 5-30cm. Minder noget om en Blåstjærne, men blomsterne mørkere blå, i hoveder omgivne af 10-20 langt randhårede svøbblade. Kronen 4-6mm. Frugten 2-2,5mm, knudret. V-VI. Spredt.

A. orientalis Boiss.& Hohen Prydmysike. 10-30cm. Nær foregående, men kronen 7-12mm og frugten 1-1,5mm, ikke knudret. V-VI. Dyrket & forvild.

A. purpurea (L.) Ehrend. Purpurmysike. 20-50cm. Stænglen firkantet. Bladene 7-10(6-11) sammen, 10-20x0,5-1mm, med omrullet rand. Planten snerre agtig med talrige, grunlilla, 1-1,5mm brede blomster. V-VII.Spr.

Galium. Snerre.

1. Enårig. Stænglerne m.m. ru ..... 2.
   Flerårig 8.
2. Bladranden med bagudrettede torne ..... 3.
   " " fremadrettede " 5.
3. Frugtstilkene nedbøjede. Frugten vortet ..... tricornutum
   " ej " . " med krogbørster eller glat 4.
4. Kronen hvid. Frugten 3-5mm ..... aparine
   " grønliggul. Frugten 2-3mm spurium
5. Kvastene kortere end de tilhørende blade ..... verticillatum
   " længere " " " " 6.
6. Blomsterstilkene trådformede, mange gange blomsten ... tenuissimum
   " under 3 x blomsten og frugten 7.
7. Kvaststilkene 1-3 x blomsterstilkene ..... parisiense
   " 3-5 x " divaricatum
8. Mellemste blade med 3 ribber, i kranse på 4 ..... 9.
   Bladene 1-ribbede. Kransene med 4-12 blade 12.
9. Mellemste blade bredt ægformede, 14-18x6-10mm ..... rotundifolium
   " " lancetformede, 15-80mm 10.
10. Yderste blomsterstandsgrene svikkelagtige ..... baillonii
    " " kvastagtige 11.

11. Bladene mest 40-80x9-20mm, med netåret underside ..... rubioides
" " 15-40x2-8mm, næppe netårede boreale
12. Delfrugterne kugleformede. Bladene butte. Stænglen ofte ru ... 13.
" ægformede. Bladene spidse 15.
13. Frugtstilkene ikke udspærrede. Bladene m.m. linjeformede debile
" udspærrede. Bladene omvendt lancetformede 14.
14. Kronen 4-4,5mm bred. Stænglen tydeligt hvidkantet ..... elongatum
" 2-3,5mm " . " ikke hvidkantet palustre
15. Stænglen finttornet ru ..... 16.
" ikke finttornet 17.
16. Kronen hjulformet ..... uliginosum
" tragtformet rivale
17. Blomsterne brunlilla ..... Asperula purpurea
" hvide eller gule 18.
18. Stænglerne med trådformet grund, her næppe over 1mm brede; op til 30cm høje ..... 19.
Stænglerne uden trådformet grund, her over 1mm brede 21.
19. Blomsterstanden lang, mest over 2 x så lang som bred .... pumilum
" kort, " under 2 x " " " " 20.
20. Stængelgrunden rød ..... austriacum
" ikke rød anisophyllon
21. Frugtknude og frugt med kroghår. Langt kronrør ..... odoratum
" " " uden " 22.
22. Bladundersiden klart mere håret end oversiden. M.m. gul krone 23.
" ikke meget mere håret end oversiden 24.
23. Stænglen m.m. firkantet forneden. Kronen hvidgul .... pomeranicum
" " trind forneden. Kronen gul verum
24. Bladundersiden blegere end oversiden, ofte blågrøn ..... 25.
" af samme farve som oversiden 30.
25. Kronen tragtformet. Bladene 10-22mm, skinnende ovenpå humifusum
" hjul- til skålformet. Bladene (20)25-70mm 26.
26. Stænglen m.m. trind forneden ..... 27.
" firkantet forneden 28.
27. Stænglen trind hele vejen. Kronfligene spidse ..... silvaticum
" firkantet foroven. " brodspidsede schultesii
28. Stænglerne rodslående forneden, med udløbere ..... abaujense
" ikke rodslående, uden udløbere 29.
29. Kronen m.m. skålformet, fligene spidse ..... pseudaristatum
" " hjulformet, " med kort brod kitaibelianum
30. Kronen tragt- eller kopformet ..... 31.
" m.m. hjulformet 34.
31. Enkeltkvastene pyramideformede. Med udløbere ..... 32.
" halvskærmformede 33.
32. Stænglen håret ved grunden, halvglat foroven ..... volhynicum
" glat " " , dunet foroven moldavicum
33. Kronen 4-6mm bred. Bladranden med 1-2 rækker torne ..... glaucum
" 2-3mm " . " " mange rækker torne octonarium
34. Kronen svagt skålformet med indadbøjede spidser ..... flavescens
" hjulformet med udstående spidser 35.
35. Bladene 1-2mm brede, noget omrullede, skinnende ..... lucidum
" 2-8mm " , lidet " 36.

36. Kronen 2-3mm bred, de længste stilke længere end kronbredden mollugo
Kronen 3-5mm bred, de længste stilke kortere end kronbredden 37.
37. Kronen gullig. Blomsterstanden aflang og smal ..... prusense
" hvid. Blomsterstanden ofte bredt ægformet 38.
38. Bladene jævnt tilspidsede. Planten mest glat, mere spinkel album
" ret brat tilspidsede. Planten mest håret, kraftig pycnotrichum

Galium rotundfolium L. Rundbladet snerre. 5-15cm. Blomsterne i fåblomstrede, åbne halvskærme. Kronen 3-3,5mm bred, hvid. VII-VIII. Spredt.

G. baillonii Brandza (G. valantoides) Svikkelsnerre. 15-30cm. Bladene rude-lancetformede, 15-40x5-16mm. Kronen 2-3mm bred. V-VII. Sj. Især i Jud.Vilcea - f.eks. V.Bistriţei, M.Capaţinii, Olaneşti, M.Lotrului.

G. boreale L. Trenervet snerre. VII-VIII. Spredt. 2 underarter:
ssp. boreale: Bladene 1-5mm brede.
ssp. pseudorubioides (Schur) Jav. Bladene 5-15mm brede. Frugten børstehåret. (Mellemform mellem boreale og rubioides).

G. rubioides L. Krapsnerre. 30-70cm. Stænglen svagt kantet forneden, tydeligt foroven. Frugten næsten altid glat. Kronen ca. 4,5(3,5-6)mm bred. V-VI. Alm. 2 underarter:
ssp. rubioides: Stænglen glat eller ru. Frugten (2)3mm bred.
ssp. dasypodum (Klokov): Stænglen korthåret forneden. Frugten 1,5-2mm bred. Nedre blades undersider kort hårede. Sj. Jud.Tulcea: Babadag.

G. odoratum (L.) Scop. Skovmærke. IV-VI. Alm.

G. rivale (S.& S.) Griseb. Flodsnerre. Bladene 3-4cm x 4-8mm, brat tilsmalnede mod den brodspidsede spids. Kronen 2-3mm. VI-VII. Spredt.

G. uliginosum L. Sumpsnerre. V-VII. Spredt.

G. debile Desv. Spinkel snerre. 20-60cm. Bladene 4-6 sammen, uden klar spids, 15-25x0,8-2mm, ofte omrullede. Frugten tydeligt knudret.

G. palustre L. Kærsnerre. V-VI. Alm.

G. elongatum Presl Vandsnerre.

G. humifusum Bieb. Liggende snerre. 40-100cm. Liggende eller opstigende. Bladene 1,5-4mm brede, 6-7 sammen. Kvastene med blade til spidsen. Kronen 1,5-2mm. VI-VIII. Spredt.

G. verum L. Gul snerre. V-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. verum: Kronen mørkegul. Bladene 15-30(35)x1/2-1(2)mm, omrullede indtil midterribben. Kvastene længere end stængelleddene.
ssp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborny: Kronen citrongul. Bladene 25-40x 1-3mm, kun lidt omrullede. Kvastene mest kortere end stængelleddene.

G. pomeranicum Retz G. verum x album. Kronens farve går fra klart gul til hvidlig.

G. mollugo L. Smalbladet snerre. V-IX. Alm.

Galium album Miller Hvid snerre.

G. pycnotrichum H.Braun Op til 150cm. Bladene 10-40x2-7mm.

G. prusense C.Koch Op til 80cm. Bladene 10-25x2-5mm, jævnt tilsmalnede mod spidsen, ofte læderagtige.

G. lucidum All. Sylsnerre. 30-70cm. Bladene 10-30x1-2mm, med klar brodspids. Randen ru. Blomsterstanden tæt, aflang eller ægformet. Kronen 3-5mm bred, mest hvid.

G. flavescens Borbas Gullig snerre (G. flavicans) 40-100cm. Stærkt grenet fra grunden. Bladene 25-40x1mm, randen stærkt omrullet, skarpt ru. Blomsterstanden bredt ægformet med mange, oprette grene.VI-VII.Spr

G. octonarium (Klokov) Pobed. 25-90cm. Stænglen m.m. firkantet hele vejen. Bladene 20-45x0,5-1mm, mest 7-8 sammen. Kronen tragtformet, røret ofte længere end fligene. V-VI.

G. glaucum L. Blågrøn snerre. 40-80cm. Stænglen mest trind, med 4 ribber. Bladene 20-40x0,5-2mm, mest 8-10 sammen. Kronen bredt skalformet, røret oftest meget kortere end fligene. V-VII. Alm.

G. volhynicum Pobed. (Asperula tyraica) 40-80cm. Bladene 20-40x0,5-1,5mm, 6-8 sammen; randen ru med 1-2(3) tandrækker. Kronen 3-4mm bred, skålformet med m.m. indadbøjede spidser. VI-VII. Spredt.

G. moldavicum (Dobr.) Franco Tyndbladet snerre. 20-70cm. Nær foregående. Bladene 20-30x0,4-0,5mm, 6-10 sammen; randen ru med 3(4) tandrækker. Kronen ca. 2mm bred. VI-VIII. Sj. Jud.Vaslui: Negreşti. Jud. Iaşi: Valea lui David.

G. kitaibelianum Sch.& Sch.f. Strålesnerre. 50-100cm. Bladene 25-70 x 0,5-3mm, lidt krummede, bredest midtpå, meget jævnt tilsmalnede, frisk grønne, med tydelige årer. VI-VII. Sj., med ret udbredt i SV og Midten

G. pseudaristatum Schur Egesnerre. 70-100cm. Bladene 30-50x2-4mm, ofte krummede, ofte bredest midtpå, jævnt tilsmalnede, friskgrønne. Blomsterne samlede mod grenspidserne. VI-VIII. Spredt.

G. abaujense Borbas -90cm. Udløberne stundom meget korte. Bladene 30-50x2-9mm, ofte brat tilsmalnede fortil, friskgrønne. Kronen mest 3-4mm og hjulformet, blomsterstilkene lige så lange.

G. schultesii Vest Lundsnerre. 30-120cm. Med udløbere (bestanddannende). Bladene 25-60x4-8mm, blågrønne, især nedenunder. Kronen 4-5mm bred, hjulformet. VII-IX. Alm.

G. silvaticum L. Skovsnerre. 80-100cm. Ingen udløbere. Bladene 20-40 x 3-10mm, blågrønne, især nedenunder. Kronen 2-3mm bred, skålformet. VII-VIII. ?

G. pumilum Murray Parksnerre. 15-30cm. Stængelgrunden ikke rød. Mellemste stængelled 2-4 x bladlængden. Bladene 1,2-1,6mm brede. VI-VIII

Galium austriacum Jacq. Fyrresnerre. 12-20cm. Mellemste stængelled 3-4cm, 1,5-2,5 x bladene, disse mest 0,5-1,2mm brede. ?

G. anisophyllon Vill. Alpesnerre. 7-15cm. Tæt tueformet med mange golde skud. Bladene 7-16x1-2mm, bredest 1/3-1/5 fra spidsen og her brat tilsmalnede. Stænglerne mest med 1-3 kvaste. VII-IX. Alm.

G. spurium L. Hørsnerre. 30-100cm. Kvastene med 1-7 blomster, længere end bladene, stilkene rette, men ofte skarpt bøjede lige ved frugten; denne glat eller med krogbørster. V-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp. spurium: Frugten glat.
ssp. infestum (W.& K.) Janch.: Frugten med krogbørster.

G. aparine L. Burresnerre. V-X. Alm.

G. tricornutum Dandy Vortesnerre. 15-40cm. Kvastene kortere end bladene. Frugten 3-5mm, fint spidsvortet. VII-IX. Spredt.

G. parisiense L. Marksnerre. 10-25cm. Toppen kegleformet til aflang. Vinklen mellem frugtstilkene 45-90°, disse mest 0,1-0,2mm tykke. VI-VII. Sj. 2 underarter:
ssp. parisiense: Frugten korthåret.
ssp. anglicum (Huds.) Arc.: Frugten glat.

G. divaricatum Pourret Udspærret snerre. 5-30cm. Toppen bredt omvendt ægformet til kugleformet. Vinklen mellem frugtstilkene 20-45°, disse mest 0,05-0,075mm tykke. VII-VIII. Spredt.

G. tenuissimum Beib. Trådsnerre. 10-45cm. Bladene 10-15x0,8-2mm, 8-10 sammen. Kvaststilkene 5-15mm, blomsterstilkene 3-15mm, alle trådfine. Kronen 1-1,7mm bred, grønliggul. VI-IX. Sj.

G. verticillatum Danth. Kranssnerre. 5-20cm. Opret, ikke særligt håret. Bladene 4-8x1-2mm. Blomsterne m.m. siddende. Kronen 1-1,5mm bred, gullig, grønlig eller med lillat skær.

Cruciata laevipes Opiz Alm. korsblad. 15-50cm. Flerårig. Stænglen med mange, 0,7-1,5mm lange, udstående hår. Blomsterstilkene mest hårede. Kvastene med to forblade. Bladene 3-ribbede. IV-V. Alm.

C. glabra (L.) Ehrend. Glat korsblad. 10-30cm. Flerårig. Stænglen glat eller med 0,2-0,5mm lange hår. Blomsterstilkene glatte. Kvastene uden forblade. Bladene 3-ribbede. V-VI. Alm. 2 underarter:
ssp. glabra: Mellemste blade højst så lange som stængelleddene.
ssp. alpina (Schur): Mellemste blade længere end stængelleddene.

C. pedemontana (All.) Ehrend. Enårigt korsblad. 10-35cm. Enårig. Bladene 1-ribbede, 4-10mm lange. Stænglen ru. Kvastene uden forblade. Kronen 0,5-1mm bred. V-VI. Spredt.

Rubia tinctorum L. Farvekrap. 30-100cm. En grov flerårig snerre, noget klatrende med modhager på blade og stængler. Bladene 2-10x0,5-2,5 cm. Kronen 5-6mm bred. VI-VII. Spredt. Levn fra tidligere dyrkning.

PLANTAGINACEAE

Plantago. Vejbred.

1. Bladede stængler med modsatte, linjeformede blade ..... arenaria
   Alle blade i roset 2.
2. Bladene fjersnitdelte eller tandede ..... coronopus
   " helrandede eller svagt tandede 3.
3. Bladene ægformede til elliptiske ..... 4.
   " lancet- til linjeformede 8.
4. Støvdragerne rager 8-13mm ud ..... 5.
   " " 2-5mm ud 6.
5. Bladstilken længere end bladpladen ..... maxima
   " kortere " " media
6. Akset mellembrudt forneden. Støttebladene under ½ x bægeret cornuti
   " ikke mellembrudt. Støttebladene over 1/2 x bægeret 7.
7. Bladene 2-6(10)x1-3,5cm. Gullige støvknapper; hvidlige støvtråde ..... gentianoides
   Bladene gennemgående større major
8. Bladene linjeformede ..... 9.
   " lancetformede 12.
9. Enårig ..... tenuiflora
   Flerårig 10.
10. Bladene stive og kølede, 1-1,5mm brede ..... holosteum
    " ikke kølede, ofte bredere 11.
11. Støttebladene meget kort randhårede. Bladene kødede .... maritima
    " tydeligt randhårede. Bladene næppe kødede serpentina
12. Støvdragerne rager 8-13mm ud. Hvide/lyslilla støvknapper .. media
    " " indtil 5mm ud 13.
13. Bladene m.m. tæt tiltrykt sølvhårede ..... argentea
    " glatte eller svagt dunede 14.
14. Skaftet trindt eller svagt furet foroven ..... 15.
    " med 5-12 skarpe furer 16.
15. Bladene med en stilk på 2/3-1 x bladet ..... schwarzenbergiana
    " uden stilk atrata
16. Skaftet mest 5-furet. Bladene hårede under blomstringen lanceolata
    " " 6-8-furet. Bladene glatte under blomstr. altissima

Plantago major L. Glat vejbred. VII-X. Alm. 2 underarter:
ssp. major: Kasplen med 6-10 frø. Bladgrunden m.m. hjærteformet.
ssp. intermedia (DC.) Arc.: Kapslen med 14-34 frø. Tilsmalnet bladgr.

P. tenuiflora W.& K. Dværgvejbred. 5-10cm. Bladene 1/2-2mm brede, med 1-3 utydelige ribber. Skaftet ofte kortere end bladene. Akset tyndt, valseformet, af skaftets længde. V-VI. Spredt.

P. cornuti Gouan Vortet vejbred. 30-50cm. Bladene 11-15x5-8cm, med kileformet grund og en stilk på 12-20cm. Bladene oprette. VI-X. Spredt.

P. coronopus L. Fliget vejbred. VI-IX. Sj.

P. maritima L. Strandvejbred. VII-X.

P. serpentina All. Slangevejbred. 8-35cm. Ligner foregående meget. Tørre bjærgenge og vejkanter.

P. schwarzenbergiana Schur Tungevejbred. 6-25cm. Bladene opretstående, 3-ribbede. Skafterne længere end bladene, svagt furede foroven. Akset

ofte 1/3 x skaftet, slankt. V-VI. Spredt.

Plantago media L. Dunet vejbred. V-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. media: Bladene højst 2,5 x så lange som brede. Modne aks 2-6(8)cm.
ssp. stepposa (Kupr.) Soó: Bladene 2,5-5 x så lange som brede, med 5-7 ribber. Det modne aks 8-12(6-20)cm.

P. holosteum Scop. Kølet vejbred. 10-30cm. Roden forveddet, ofte med flere rosetter. Nedre blade korte og nedbøjede, øvre m.m. oprette. Akset 3-8cm x 3-4mm. V-VII. Sj.

P. maxima Juss. Stor vejbred. Bladene 25-50x5-15cm med 9-11 ribber, svagt hårede. Skafterne noget længere end bladene, furede. Aksene 5-20 cm, ca. 1cm tykt. VI-VII. Sj. Jud.Sibiu: Turnişor, Şura Mica, Ocna Sibiului. Jud.Dolj: Coţofenii din Faţa.

P. atrata Hoppe Bjærgvejbred. 5-15cm. Bladene smalt lancetformede med 3-5 ribber, glatte eller svagt dunede. Skaftet mindst så langt som bladene, svagt håret. Akset aflangt ægformet, 1,5-3cm. V-VII. Alm.

P. gentianoides S.& S. Kærvejbred. 5-20cm. Bladene med 3-5 ribber, glatte eller spredt (sj. tæt) hårede; stilken ca. 1/2 x pladen. Akset tæt 1-3,5cm. Bægerbladene ofte brunlilla. VII-VIII. Sj. Alpin.

P. lanceolata L. Lancetvejbred. Støttebladene 4-5mm. V-IX. Alm. 2ssp.:
ssp. lanceolata: Støttebladene m.m. glatte. Akset mest valseformet.
ssp. sphaerostachya (Wimm.& Grab.) Hay.: Støttebladene lådne, bladene ligeså. Akset kort: kugle- eller ægformet.

P. altissima L. Høj vejbred. 40-100cm. Ligner den foregående, men jordstænglen lang og vandret. Bladene 12-20x2-3,5cm. Støttebladene 6-7 mm. Bladene ofte udtrukne i en 2-3mm lang spids. VI-VIII. Spredt.

P. argentea Chaix Sølvvejbred. 10-40cm. Bladene 10-30x0,5-1,5cm. Akset ægformet, 1-1,5x0,5cm. Hvide støvknapper. Lancetformede støtteblade.Spr.

P. arenaria W.& K. (P. indica) Grenet vejbred. VI-IX. Spredt.

Littorella uniflora (L.) Asch. Strandbo. V-VI. Sj.

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus ebulus L. Sommerhyld. En staude på 80-150cm. Fodflige til stede. Mørklilla støvknapper. VII-VIII. Alm.

S. nigra L. Almindelig hyld. VI-VII. Alm.

S. racemosa L. Druehyld. IV-V. Alm.

Viburnum opulus L. Kvalkved. V-VI. Alm.

V. lantana L. Pibekvalkved. 1-3m. Kviste og blade stjærnedunede af brunlige hår. Bladene m.m. ægformede, 4-14x3,5-9cm, spidse og med let hjærteformet grund, savtakkede, med rynket overside. Halvskærmen uden forstørrede blomster. V-VI. Alm.

Linnaea borealis L. Mosklokke. V-VI. Sj.: M.Caliman: Piatra Cuşmei.

Lonicera. Gedeblad.

1. Slyngplante ..... caprifolium
   Buske 2.
2. Bladene blødhårede på begge sider ..... xylosteum
   Bladoversiden glat 3.
3. Blomsterparrenes frugtknuder og bær helt sammenvoksede .. coerulea
   " " " " frie nigra

Lonicera coerulea L. Blåt gedeblad. 1/2-1,5m. Bladene mest 3-5x1,5-2cm blågrønne ovenpå, lysere nedenunder. Blomsterstilken kortere end blomsterne. Kronen gullighvid. Bærret blåsort. V-VI. Sj.

L. nigra L. Sort gedeblad. 0,5-1,5m. Bladene 4-7x1,5-3cm. Blomsterstilken 2-3(4) x blomsterne. Kronen hvid med blegrødt skær. Bærret sort.Spr.

L. xylosteum L. Dunet gedeblad. V-VI. Alm.

L. caprifolium L. Havevedvindel. 2-4m. Bladene mørkegrønne ovenpå, blågrønne nedenunder, de øverste par sammenvoksede. V-VI. Dyrket og forv.

ADOXACEAE

Adoxa moschatellina L. Desmerurt. IV-V. Alm.

VALERIANACEAE

Valerianella. Vårsalat.

1. Alle støtteblade bredt lancetformede, æg- eller hjærteformede, spidse, bredt hindekantede og oftest langt randhårede ..... 2.
   I det mindste de nedre støtteblade m.m. aflange og butte, svagt til ikke hindekantede og højst svagt randhårede 4.
2. Bægeret meget bredere end frugten og af dennes længde .... coronata
   " ikke " " " " kortere end den 3.
3. Frugten noget halvkugleformet, but 3-kantet i tværsnit ..... pumila
   " ikke " , " 4-kantet " " lasiocarpa
4. Frugten med en tydelig tand. Blomsterne hvide til lyserøde ..... 5.
   " uden " " . " blegblå 6.
5. Blomsterne lyserøde. Frugten vindruekærneformet ..... dentata
   " hvide. Frugten æg-kugleformet rimosa
6. Frugten med en tydelig længdefure ..... 7.
   " uden nogen længdefure 8.
7. Frugten med et rundt omrids ..... turgida
   " " " aflangt omrids carinata
8. Frugten jævn eller tværrynket ..... locusta
   " med klare småvorter costata

Valerianella coronata (L.) DC. Kronvårsalat. 10-30cm. Frugtbægeret halvt delt, med 6 krogformede tænder. Blomsterne lyst rødlilla. Frugten stivhåret med netåret bæger. V-VI. Sj.

V. lasiocarpa (Steven) Betcke 10-25cm. Frugtens bæger reduceret til en uregelmæssig, 3-5-tandet rand eller også med 6 sylformede tænder. IV-VI. Sj.

Valerianella pumila (L.) DC. Furet vårsalat. 10-40cm. Kronen lyserød. V-VI. Sj. 2 underarter:
ssp. pumila: Bægeret uregelmæssigt but trelappet, meget kort og tydeligt smallere end frugten.
ssp. brachystephana (Ten.) Dihoru: Bægeret klokkeformet, af frugtens bredde, med 5-6 sylformede lapper. Jud.Constanţa: Eforie N.

V. locusta (L.) Laterrade Tandfri vårsalat. IV-VI. Alm.

V. carinata Loisel. Kølet vårsalat. III-VI. Alm.

V. turgida (Steven) Betcke Bredfrugtet vårsalat. 10-30cm. Frugten ca. 3mm, 3-furet, med lidt trekantet tværsnit. IV-VI. Sj.

V. costata (Steven) Betcke Ribbet vårsalat. 10-20cm. V-VII. Sj.

V. dentata (L.) Pollich Tandet vårsalat. 10-30cm. Bægeret kort og skævt afskåret med uens tænder. VI-VIII. Alm.

V. rimosa Bast Opblæst vårsalat. 10-40cm. Frugten 2,5mm, med en kort, ganske svagt tandet spids. IV-V. Spredt.

Valeriana. Baldrian.

1. Alle blade fjersnitdelte ..... officinalis
   Nedre eller alle blade hele 2.
2. Stængelbladene mest 3-delte. Grundbladene groft takkede tripteris
   " hele. Alle blade helrandede eller svagt takkede 3.
3. Med bladede udløbere. Moseplante ..... simplicifolia
   Uden udløbere. Bjærgplante montana

Valeriana officinalis L. Lægebaldrian. 3 underarter:
ssp. sambucifolia (Mikan f.) Cel.: Mellemste blade med 3-4 par småblade. Med både over- og underjordiske udløbere. VI-VIII. Alm.
ssp. officinalis: Mellemste blade langstilkede, med 6-9 par småblade. Ingen udløbere. Stænglen glat.
ssp. collina (Wallr.) Nyman: Mellemste blade kortstilkede, med 8-12(14) par småblade. Uden eller med underjordiske udløbere. Stænglen tæt håret forneden.

V. simplicifolia (Rchb.) Kabath Rundbladet baldrian. 10-45cm. Stænglen 4-kantet og glat. Bladene ægformede. V-VI. Spredt.

V. tripteris L. Trebladet baldrian. 30-60cm. Grundbladene med hjærteformet grund, øvre stængelblade 3-delte, sjældent 5-delte eller udelte. IV-VII. Alm.

V. montana L. Bjærgbaldrian. 20-60cm. Stænglen ofte håret ved leddene. Grundbladene med tilsmalnet grund; alle blade spidse. V-VII. Spredt.

DIPSACACEAE

1. Stænglen tornet ..... Dipsacus
   " uden torne 2.
2. Kronen 5-delt ..... Scabiosa
   " 4-delt 3.
3. 8-16 bægerbørster. Blomstrende kurve svagt hvælvede ..... Knautia
   4-8 " . " " m.m. kugleformede 4.

4. Over 3 rækker svøbblade ..... Cephalaria
   1-3 rækker kurvsvøbblade 5.
5. 4-5 bægerbørster. Yderbægeret 4-kantet ..... Succisa
   Ingen " . " næsten trindt Succisella

Cephalaria. Skælhovede.

1. Frugtens yderbæger utandet eller finttandet ..... 2.
   " " med 4 eller 8 kraftige børster 3.
2. Stængel og blade glatte ..... laevigata
   " " " dunede radiata
3. Enårig. Svøbbladene lancetformede, spidse ..... transsilvanica
   Flerårig. Svøbbladene ægformede, butte uralensis

Cephalaria radiata Griseb.& Schenk Dunet skælhovede. 60-120cm. Bladene 12-40x4-10cm, m.m. lyreformede, med tandede afsnit. Svøbbladene ægformede og butte. Kronen gul. VII-IX. Spredt.

C. laevigata (W.& K.) Schrader Glat skælhovede. 60-90cm. Eneste glatte art. Bladfligene m.m. linjeformede, helrandede. Ellers som foregående. VII-IX. Sj.

C. uralensis (Murray) R.& Sch. Odskælhovede. 30-60cm. Nedre blade med 2-4 par aflange, helrandede eller meget svagt lappede afsnit. Kronen gul. Yderbægeret med 4 store og 4 meget små tænder. VII-IX. Spredt.
ssp. uralensis: Nedre blades afsnit aflange og helrandede.
ssp. multifida (Roman) Roman & Beldie: Nedre blades afsnit m.m. linjeformede, oftest med 5-6 lapper. Jud.Mehedinți.

C. transsilvanica (L.) R.& Sch. Tungeskælhovede. 30-100cm. Bladene 5-12x1-5cm. Kronen blå eller gul. Kurvbundens avner med en brod og en lilla åre i spidsen. 8 ens yderbægerbørster. VII-VIII. Spredt.

Dipsacus. Kartebolle.

1. Stængelbladene kortstilkede. Hovederne kugleformede ..... 2.
   " siddende 3.
2. Hovederne 1,5-2cm. Svøbblade og avner tæt hårede ..... pilosus
   " 2,5-4cm. " " " svagt hårede strigosus
3. Øvre stængelblade frie ved grunden ..... gmelinii
   " " parvist sammenvoksede 4.
4. Stængelbladene tandede til helrandede ..... fullonum
   " fligede laciniatus

Dipsacus gmelinii Bieb. 50-150cm. Grundbladene langstilkede, tandede; stængelbladene fligede. Svøbbladene med opadkrummet endetorn. Hovederne næsten kugleformede. VI-VIII. Sj. Jud.Tulcea: Jijila, Donaudeltaet.

D. fullonum L. Gærdekartebolle. VII-VIII. Alm.

D. laciniatus L. Fliget kartebolle. 50-120cm. Som den foregående, men stænglens torne spinklere. Bladene randhårede. VI-VIII. Alm.

D. pilosus L. Håret kartebolle. VII-VIII. Spredt.

D. strigosus Willd. Pindsvinekartebolle. VII-VIII. Indslæbt ?

Succisa pratensis Moench Djævelsbid. VII-IX. Spredt.

Succisella inflexa (Kluk) G.Beck Glat flaskefrø. 30-80cm. M.m. glat. Nedre blade omvendt ægformede, stængelbladene lancetformede, alle helrandede. Blomsterne blegblå. Frugten flaskeformet. VI-IX. Sj.

Knautia. Blåhat.

1. Alle stængelblade hele, ofte bredest på eller under midten ..... 2.
   Øvre stængelblade m.m. delte, eller hvis udelte, så bredest på eller over midten 4.
2. Nedre stængelblade 6-8 x så lange som brede, helrandede longifolia
   " " bredere, ofte noget tandede 3.
3. Flere sidestillede blomstrende stængler fra bladrosetten. Stængelbladene bredest i nedre 1/3 ..... drymeia
   1 endestillet blomstrende stængel fra bladrosetten. Stængelbladene bredest omkring midten dipsacifolia
4. Blomsterne hvidgule ..... kitaibelii
   " ikke hvidgule 5.
5. Blomsterne mest mørkerøde. Stængelbladene jævnt fordelte macedonica
   " ikke " 6.
6. Randkronerne ikke meget forøgede. Lyst rødlilla blomster ... rosea
   " forøgede. Blomsterne ikke rødlige arvensis

Knautia drymeia Heuffel ssp. drymeia Egeblåhat. Grundbladene elliptisk lancetformede, spidse, tandede. Stængelbladene siddende. Randkronerne lidet forøgede. V-IX. Sj. Sydvest.

K. dipsacifolia Kreutzer (K. silvatica) Skovblåhat. 30-100cm. Bladene matte, de nedre lancetformede til ægformet-elliptiske; de øvre 3-5(8) x så lange som brede, med omfattende grund. VII-VIII. Alm. 2 ssp.:
ssp. dipsacifolia: Blomsterne blålilla. Kurvstilkene ofte kirtlede.
ssp. lancifolia (Heuffel) Ehrend.: Blomsterne rødligt lilla. Kurvstilkene glatte. Mellemste stængelled oftest glatte.

K. longifolia (W.& K.) Koch Langbladet blåhat. 30-70cm. Kurvstilkene tæt korthårede, med få kirtelhår. Nedre blade 6-20x1-3cm, m.m. skinnende ovenpå. Kurvene lyst rødlilla. VII-VIII. Alm.

K. arvensis (L.) Coulter Almindelig blåhat. V-X. Alm. 2 underarter:
ssp. budensis (Simk.) Jav.: Planten grå- eller hvidfiltet. Kurvene ca. 2cm brede.
ssp. arvensis: Planten mest ruhåret. Kurvene 2-4cm brede.

K. rosea Baumg. Bladene mest udelte og grønlige.

K. kitaibelii (Schultes) Borbas Hvidgul blåhat. 20-50cm. Bladene ofte hele. Sj.

K. macedonica Griseb. 40-60cm. Grundbladene ofte visne under blomstringen, udelte. VI-VIII. Spredt.

Scabiosa. Skabiose.

1. Frugten med 8 gruber foroven ..... 2.
" længdefuret, uden gruber 3.
2. Flerårig. Blomsterne mest gullige, de ydre forøgede ..... argentea
Enårig. Blomsterne rødlige, de ydre kun lidt større micrantha
3. Kronen bleggul ..... ochroleuca
" blålilla 4.
4. Bladene m.m. glatte, noget skinnende. Bægerbørsterne 4-6mm lucida
" tydeligt hårede, matte. Bægerbørsterne 2,5-4mm 5.
5. Midterste stængelblades endeafsnit meget bredere end sideafsnittene ..... banatica
Midterste stængelblades endeafsnit lige så brede som sideafsnittene columbaria

Scabiosa argentea L. (S. ucrainica) Hvid skabiose. 30-70cm. Med korte krumme hår samt lange børster. Nedre og mellemste blade 1-2 x delte med smalle, m.m. helrandede afsnit. VI-VIII. Spredt.

S. micrantha Desf. 20-60cm. Korthåret med enkelte lange, oprette hår. Nedre blade hele, øvre lyreformet fjersnitdelte. VI-VIII. Hagieni.

S. lucida Vill. Skinnende skabiose. 10-25cm. Mest ugrenet. Kronen rødligtlilla. Sorte bægerbørster. VII-IX. Alm. som ssp. barbata Nyar.

S. columbaria L. Dueskabiose. VI-VIII. Spredt. 2 underarter:
ssp. columbaria: Svøbbladene kortere end blomsterne, korthårede.
ssp. pseudobanatica (Schur) Jav.: Svøbbladene mindst så lange som blomsterne, langhårede.

S. banatica W.& K. 40-100cm. Stænglen flere gange grenet. Grundbladene oftest tæt korthårede. Blomsterne rødlige. VII-IX. Spredt.

S. ochroleuca L. Gul skabiose. 20-80cm. Bægerbørsterne 2-3 x kraven. Nedre blade hele eller lyreformede, øvre 1 x delte. VI-VIII. Alm.

CAMPANULACEAE

1. Kronen delt næsten til grunden ..... 2.
" højst 3/4 delt 4.
2. Blomsterne i aks eller klaser ..... Asyneuma
" i hoveder 3.
3. Blomsterne siddende. Kronrøret mest krumt. 2-3 støvfang .. Phyteuma
" kortstilkede. Kronrøret ret. 1 støvfang Jasione
4. Frugtknude og kapsel smal og prismatisk ..... Legousia
" " " kugle-, æg- eller bredt kegleformet 5.
5. Støvknapperne rørformet sammenvoksede under blomstringen Symphyandra
" frie under blomstringen 6.
6. Griflen langt udragende af blomsten ..... Adenophora
" højst lidt udragende Campanula + Edraianthus

Campanula. Klokkeblomst.

1. Blomsterne siddende i hoveder eller aks ..... 2.
" stilkede 7.
2. Bægeret med vedhæng mellem tænderne ..... lingulata
" uden " " " 3.

3. Blomsterne 3-5 sammen, i mellembrudte aks ..... macrostachya
" i et endestillet hovede og evt. nogle nøgler 4.
4. Nedre blade med hjærteformet til brat tilsmalnet grund glomerata
" " " jævnt tilsmalnet grund 5.
5. Flerstænglet. 4-20cm høj ..... Edraianthus graminifolius
Enstænglet. 15-100cm " 6.
6. Planten stivhåret. Stænglen furet ..... cervicaria
" dunet. Stænglen m.m. trind transsilvanica
7. Bægeret med tilbagebøjede vedhæng mellem tænderne ..... 8.
" uden vedhæng mellem tænderne 10.
8. Bægervedhængene meget små, 0,5-1mm ..... alpina
" tydelige, 1,5-3mm 9.
9. Nedre blade med hjærteformet grund og langstilkede ..... grossekii
" " tilsmalnede i en noget vinget stilk sibirica
10. Nedre stængelblade med hjærteformet til brat indsnævret grund 11.
" " " jævnt tilsmalnet grund 15.
11. 1-fåblomstret. Kronen ofte bredere end lang ..... carpatica
Mangeblomstret. " længere end bred 12.
12. Stænglen trind, i det mindste i nedre halvdel ..... 13.
" tydeligt kantet 14.
13. Kronen 1-2cm ..... bononiensis
" 4-5cm latifolia
14. Bægertænderne tilbagebøjede. Blomsterne ensidige .. rapunculoides
" oprette. Blomsterne alsidige trachelium
15. Enårig. Smalt tragtformet krone. Bægertænderne -½mm brede sparsa
2-flerårig 16.
16. Kronen mindst 1/3 delt, tragtformet ..... 17.
" mindre delt, m.m. klokkeformet 18.
17. Blomsterstilkene med 2 forblade ved grunden ..... rapunculus
" " " " over midten patula
18. Bægertænderne mindst 1/2 x kronen, næsten retvinklet udstående eller tilbagebøjede ..... kladniana
Bægertænderne højst 1/2 x kronen, m.m. oprette 19.
19. Blomsterknopperne nikkende ..... 20.
" oprette 21.
20. Med grundblade under blomstringen. Tueformet .... cochleariifolia
Uden " " " serrata
21. Kronen 3-5cm. Stænglen rank, mest ugrenet ..... persicifolia
" mest under 3cm 22.
22. Jordstænglen 1-4cm tyk. Stænglerne hængende ..... crassipes
" tyndere. Stænglerne ikke hængende 23.
23. Stænglen tætbladet forneden, bladløs foroven ..... moravica
" anderledes bebladet 24.
24. Kronen 20-30mm. Grundbladene blivende ..... polymorpha
" 8-20mm 25.
25. Kronen 8-10mm. Kapslen forveddet ..... romanica
" 12-20mm 26.
26. Mellemste og øvre blade helrandede. Kronen nikkende rotundifolia
Alle stængelblade tandede. Kronen opret velebitica

Campanula carpatica Jacq. 15-50cm. Opret. Stængel og blade glatte.

Mellemste stængelblade ægformede, spidse, med hjærteformet grund. Kronen ca. 3cm, bredt tragt-hjulformet, blegblå. VI-IX. Alm.

Campanula sparsa Friv. ssp. sphaerothrix (Gris.) Hayek Børsteklokke. 40-80cm. Bladene aflangt-lancetformede, siddende, de øvre tilspidsede. Børsteformede bægertænder. Kronen 12-16mm. V-VII. Spredt.

C. patula L. Engklokke. Bægertænderne ofte lidt tandede. 2 underarter:
ssp. patula: Toårig uden udløbere. Stænglen m.m. dunet. V-VII. Alm.
ssp. abietina (Janka) Hayek: Flerårig med udløbere. Glat stængel. Alm.

C. rapunculus L. Rapunselklokke. V-VII. Alm.

C. persicifolia L. Smalbladet klokke. VI-VIII. Alm.

C. alpina Jacq. Uldhåret klokke. 10-20cm. Bladene lancetformede, m.m. uldhårede. Blomsterstanden begynder ofte lige over jorden. Kronen mest lyseblå, 15-20mm. VII-VIII. Alm. Alpin.

C. lingulata W.& K. Tungeklokke. 20-30cm. 1-flere udelte stængler. Stivhåret toårig. Grundbladene aflangt spatelformede. Blomsterne 20-25 mm, 1/5 delte, spidstandede. V-VI. Sj.

C. sibirica L. Steppeklokke. 15-60cm. Håret toårig. Alsidig, flerblomstret top. Blomsterne først oprette, siden nikkende, mest lyslilla.V-VII
ssp. sibirica: Kronen 17-25mm. Vedhængene kortere end frugtknuden.
ssp. divergentiformis (Jav.) Domin: Kronen 30-40mm. Vedhængene mindst lig frugtknuden. Ca. 60cm høj. Stænglen 3-5mm tyk.

C. grossekii Heuffel 60-100cm. Stænglen kantet, stivhåret. Grundbladene trekantede, groft dobbelt savtakkede. Blomsterne i en top. Kronen 2.3cm, lilla. VI-VIII. Spredt.

C. transsilvanica Schur 15-30cm. Uldhåret toårig. Stænglen med 1 endestillet hovede. Kronen lilla, 15-25mm. Øvre blade med hjærteformet grund. VII-VIII. Spredt. Alpin.

C. glomerata L. Nøgleklokke. V-VIII. Alm. 3 underarter:
ssp. glomerata: Med endestillet hovede samt mange ekstra nøgler. Alm.
ssp. farinosa (Rochel) Kirschl.: Blomsterne mest endestillede. Bladene gråfiltede nedenunder. Stænglen tæt håret foroven.
ssp. elliptica (Kit.) O.Schwarz: Blomsterne mest endestillede. Bladene hårede til glatte; stænglen dunet til glat. Alm.

C. cervicaria L. Hvas klokke. 30-70cm. Grundbladene stivhårede, aflange. Kronen 13-16mm, lyseblå. Bægertænderne ægformede og butte. Alm.

C. macrostachya W.& K. 40-70cm. Stivhåret toårig. Grundbladene visne i blomst. Øverste blade æg-lancetformede med hjærteformet grund. Blomsterstanden grenet, øverste blomster enlige, 15-20mm. VI-VII. Alm.

C. latifolia L. Bredbladet klokke. VII-VIII. Spredt.

C. trachelium L. Nældeklokke. VII-IX. Alm.

C. rapunculoides L. Ensidig klokke. VI-IX. Alm.

C. bononiensis L. Langklaset klokke. 40-100cm. Stænglen ru og dunet.

Bladene ægformede, grågrønt filtede nedenunder. Blomsterstilkene 2-5 mm, de nedre 2-3 sammen. Blomsterne alsidige. VII-IX. Alm.

Campanula kladniana (Schur) Witasek 20-35cm. Nedre stængelblade m.m. bredt rudeformede, groft og spidst afbidt tandede. Knopperne bøjede til nikkende. Frugtknuden finvortet. Kronen 22-26mm. Spredt.

C. crassipes Heuffel 30-50cm. Mange glatte stængler. Nedre blade nyre-hjærteformede, groft og skarpt tandede. Mangeblomstrede blomsterstande. Kronen 12-16(10-20)mm. VII-IX. Sj. Kalkklipper. Jud.Caraş-Severin: Pescari, Baile Herculane ved V.Cernei. Jud.Mehedinţi: Donaudalen - la Cazane, Plavişeviţa-Ogradena, M.Mehedinţi i V.Teşnei.

C. romanica Savul. 18-30cm. Jordstænglen kraftig, forveddet. Stænglen dunet forneden. Toppen med 2-15 blomster. Frugtknuden finvortet. Kronen smalt klokkeformet. Jud.Tulcea, Jud.Constanţa (Dobrogea).

C. moravica (Spitzner) Kovanda 25-45cm. Kraftig, forveddet jordstængel. Stængelbladene linje-lancetformede til børsteformede, helrandede. Kronen 16-22(14-25)mm. Finvortet frugtknude. Kapslen nikkende. VI-IX.

C. velebitica Borbas 15-25cm. Stænglerne hårede, med 1-5 blomster på ca. 15mm på lange og tynde stilke. Finvortet frugtknude. Kapslen nikkende, forveddet. Jud.Tulcea: Babadag, Macin.

C. serrata (Kit.) Hendrych Roeklokke. 20-40cm. Roden roeformet. Stænglen glat eller kanthåret, tæt bladet. Bladene fra æg- til smalt lancetformede, glatte med randhåret grund. Kronen 15-22mm. VII-IX. Alm.

C. cochleariifolia Lam. Lav klokke. 5-10cm. Grundbladene hjærte-rudeformede, let tandede. Få blomster. Kronen 13-16mm. VII-IX. Alm.

C. rotundifolia L. Blåklokke. V-IX. Alm.

C. polymorpha Witasek 1-5 blomster.

Symphyandra wanneri (Rochel) Heuffel Smalbladet søjleklokke. 10-40cm. Bladene 2-11cm, smalle og savtakkede. Blomsterne 20-35mm, lilla, i en grenet, ensidig stand. VI-VII. Spredt.

Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. Bægerklokke. 30-100cm. Glat, flerarig klokkeblomst med bredt til smalt lancetformede, savtakkede blade. Lyseblå, hængende blomster i top. Bægertænderne takkede. VII-VIII. Spr.

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Spejlblomst. 10-30cm. M.m. dunet enårig med næppe bølgede blade. Åben, bladet top. Blålilla blomster. Kronen mindst så lang som bægertænderne, disse ca. = frugtknuden. Spr.

L. hybrida (L.) Delarbre Liden spejlblomst. 10-35cm. Kort stivharet med tydeligt bølgede blade. Kronen ca. 1/2 x bægertænderne, disse ca. 1/2 x frugtknuden. V-VI. Spredt.

Asyneuma. Stråleklokke. Bladene m.m. lancetformede, ofte bølgede. Kronerne med udspærrede, linjeformede flige, blå; giver ofte planten et liljeblomstret udseende.

Asyneuma anthericoides (Janka) Bornm. 25-40cm. Stænglen glat, med få og små blade forneden. Rosetbladene 4-6cm. Blomsterstilkene 1-4mm. Kronfligene 10-12mm. VII-VIII. Østlig.

A. canescens (W.& K.) Griseb.& Schenk Græsstråleklokke. 40-70cm. Stænglen kortdunet foroven, med mange og jævnt fordelte blade. Blomsterstilkene 0(-1)mm. Kronfligene 7-9mm. VII-IX. Spredt. 2 underarter:
ssp. canescens: Nedre og mellemste blade ægformede, elliptiske eller aflange.
ssp. salicifolium (Janka) Bornm.: Nedre blade smalt lancetformede, mellemste og øvre linje-lancetformede eller linjeformede.

Phyteuma. Rapunsel.

1. Blomsterne 4-tallige ..... tetramerum
" 5-tallige 2.
2. Kronen hvidlig til blegt gulgrøn. Akset efterhanden valsef. spicatum
" blå til sortlilla 3.
3. Grundbladene trekantet-hjærteformede. Kronen sortlilla .... vagneri
" af en anden form. Kronen blå til mørkt blålilla 4.
4. Grundbladene bredest i nedre 1/2.Hovedet 15-30-blomstret orbiculare
" " mod spidsen. " 5-10(15)-blomstret confusum

Phyteuma spicatum L. Aksrapunsel. VI-VII. Sj.

P. vagneri A.Kerner Æggerapunsel. 10-50cm. Akset kort ægformet til næsten kugleformet. Nedre blade trekantet-hjærteformede og langstilkede. VI-VII. Spredt i Sydkarpaterne.

P. tetramerum Schur Firtalsrapunsel. 40-80cm. Grundbladene æg-hjærteformede, langstilkede. Akset æg-valseformet. Kronen blå. VI-VII. Spredt

P. orbiculare L. Kuglerapunsel. 10-50cm. Grundbladene tydeligt stilkede, fra æg- til lancetformede. Svøbbladene æg-lancetformede. Hovedet kugleformet. Blomsterne blå til blålilla. V-VII. Alm.

P. confusum A.Kerner (P. nanum) Tungerapunsel. 1-10cm. Grundbladene smalt kileformede, uden tydelig stilk. Svøbbladene rundagtige til bredt ægformede. Hovedet kugleformet. Blomsterne mørkt blålilla. Spredt.

Edraianthus graminifolius (L.) A.DC. 5-10(20)cm. Grundbladene 2-10cm x 1-2mm, m.m. krushårede. Endestillede hoveder af oftest 3-6 blåliglilla blomster på 12-20mm med ægformede svøbblade under sig. VI-VII. Spredt.

Jasione montana L. Almindelig blåmunke. Ydre svøbblade ægformede til trekantede. Planten toårig uden golde skud. VII-VIII. Sj.

J. laevis Lam. ssp. orbiculata (Griseb.) Tutin Flerårig blåmunke. 5-10 cm. Ydre svøbblade ægformede til trekantede. Flerårig med golde rosetter. Blomsterstilke 1-2mm. VII-VIII. M.Retezat.

J. heldreichii Boiss.& Orph. Brodtandet blåmunke. Mest 20-50cm. Ydre svøbblade lancetformede til linje-lancetformede. Toårig uden golde rosetter. Blomsterstilkene 2-4mm. VI-VII. Sj. Sydvest. (J. dentata).

COMPOSITAE

1. Skivekronerne rørformede ..... 2.
   Alle kroner tungeformede 75.
2. Hunblomsterne i 1-2-blomstrede kurve i bladhjørnerne ..... 3.
   Ingen sådanne kurve for hunblomster 4.
3. Hankurvene nikkende. Frugten uden torne ..... Ambrosia
   " oprette. Frugten stor, med 2 spidser fortil Xanthium
4. Bladene tornede eller småtornet tandede ..... 5.
   " ikke tornede 11.
5. 1-blomstrede kurve samlede i et stort, kugleformet hovede Echinops
   Flerblomstrede kurve 6.
6. Indre svøbblade skinnende og randkroneagtige, ydre tornfligede Carlina
   Svøbbladene anderledes 7.
7. Fnokken hårformet ..... 8.
   " fjerformet 9.
8. Kurvbunden uden børster ..... Onopordum
   " med " Carduus
9. Bladranden ikke finttornet mellem de store torne ..... Ptilostemon
   " finttornet mellem de store torne 10.
10. Svøbbladene med et krummet, fjerfliget vedhæng ..... Picnomon
    " uden " " " " Cirsium
11. Bladene overvejende modsatte ..... 12.
    " " spredte 18.
12. Fnokken hårformet ..... 13.
    " anderledes eller mangler 14.
13. Blomsterne lyserøde. Ingen tungeformede randkroner ... Eupatorium
    " gule, de ydre tungeformede Arnica
14. Fnokken dannet af 2-4 børster med modhager ..... Bidens
    " anderledes 15.
15. Flerårig ..... Helianthus
    Enårig 16.
16. Med hvide randkroner ..... Galinsoga
    Uden eller med gule randkroner 17.
17. Kurvsvøbbladene kirtelhårede, de ydre meget lange ... Sigesbeckia
    " ikke kirtelhårede, lige lange Iva
18. Med tydeligt synlige, tungeformede randkroner ..... 19.
    Tungekroner mangler eller af skivekronernes længde 42.
19. Kurvbunden med avner ..... 20.
    " uden avner 26.
20. Randkronerne hvide (eller rødlige) ..... 21.
    " gule 22.
21. Frugterne sammentrykte ..... Achillea
    " ikke eller kun lidt sammentrykte Anthemis
22. Bladene eller nogle af dem delte ..... 23.
    " hele 25.
23. Randkronerne 3-6cm. Kurve med randkroner 7-12cm brede Rudbeckia
    " højst 15mm 24.
24. 4-5 randkroner. Små kurve i tæt halvskærm ..... Achillea
    Flere randkroner Anthemis

25. Enårig. Kurvbunden m.m. flad ..... Helianthus annuus
Flerårig. Kurvbunden hvælvet Telekia
26. Frugterne med hårformet fnok ..... 27.
" uden " " 35.
27. 1 række egentlige svøbblade, ofte med små ekstrasvøbblade .... 28.
2-flere rækker svøbblade 30.
28. Blomsterstænglerne enblomstrede, kun med skælblade .... Tussilago
" ihvertfald bladede ved grunden 29.
29. Nedre stængelblade med omskedende stilk ..... Ligularia
Bladene uden omskedende stilk Senecio
30. Randkronerne ikke gule ..... 31.
" gule 32.
31. Randkronerne under 1mm brede, i flere rækker ..... Erigeron
" over " " , i 1 række Aster
32. 6-12 randkroner ..... Solidago
Mange " 33.
33. 2-3 rækker svøbblade. Kurvbunden hvælvet ..... Doronicum
Flere rækker taglagte svøbblade. Kurvbunden højst lidt hvælvet 34.
34. 1 række fnokhår samt en række små, ydre skæl ..... Pulicaria
1 " " Inula
35. Bladene med trådformede flige ..... 36.
Bladfligene flade 37.
36. Kurvbunden kegleformet og hul ..... Chamomilla
" halvkugleformet og fyldt Matricaria
37. Rosetplante med spatelformede, svagttandede blade ..... Bellis
Anderledes 38.
38. De ydre frugter store og krumme. Gule randkroner ..... Calendula
Frugterne korte, rette eller lidt krumme 39.
39. Få og små stængelblade. Grundbladene 1 x delte .. Leucanthemopsis
Mange veludviklede stængelblade 40.
40. Bladene 1-2 x fjersnitdelte med takkede afsnit ..... Tanacetum
" højst lappede 41.
41. Med udløbere. Bestanddannende ..... Leucanthemella
Uden " . Enlige planter Leucanthemum
42. 1 række egentlige svøbblade, ofte med små ekstrasvøbblade .... 43.
2-flere rækker svøbblade 47.
43. Bladene omtrent så brede som lange, med indbugtet grund ..... 44.
" længere end brede 46.
44. Stænglen 1-blomstret ..... Homogyne
" flerblomstret 45.
45. Stænglen kun med skælblade ..... Petasites
" med løvblade Adenostyles
46. Bladene lancetformede og skarpt savtakkede ..... Erechtites
" anderledes Senecio
47. Blomsterne rødlilla, lyserøde eller blå ..... 48.
" gule, brune eller hvidlige (sj. orangerøde) 57.
48. Svøbbladene med en lang, hagekrummet spids ..... Arctium
" uden en sådan spids 49.
49. Svøbbladene helt hindeagtige ..... Xeranthemum
" " eller delvist urteagtige eller læderagtige 50.

50. Hvidfiltede, helrandede blade. Små kurve i tæt halvskærm Antennaria
Anderledes 51.
51. Nogle kurvsvøbblade med et vedhæng ..... 52.
Kurvsvøbbladene uden vedhæng 54.
52. Øvre blade går jævnt over i kurvsvøbbladene Serratula bulgarica
Anderledes 53.
53. Kurvsvøbet kugleformet. Fnokken 2-3 x frugten ..... Leuzea
Anderledes Centaurea
54. Fnokken først gyldenbrun, senere sortagtig. Enårig ..... Crupina
" hvidlig 55.
55. 1-2 rækker fnokhår, den indre fjerformet ..... Saussurea
Flere rækker almindelige fnokhår 56.
56. Bladundersiden hvidt spindelvævshåret ..... Jurinea
" glat til ruhåret Serratula
57. Kronens tænder flere x længere end brede. Kronrøret brat ellipsoidisk udvidet et stykke under fligene (Tidselgruppen) .. 58.
Kronens tænder kortere og kronrøret mere jævnt udvidet 60.
58. Ydre kurvsvøbblade bladagtige og tornede. Enårig ..... Carthamus
" " ikke bladagtige 59.
59. Kronerne 4-tallige. Bladene hele ..... Chartolepis
" 5-tallige Centaurea
60. Bladene delte ..... 61.
" hele 63.
61. Mange kraftigt gule kurve i en tæt halvskærm ..... Tanacetum
Kurvene ikke i en tæt halvskærm 62.
62. Kortstilkede og små, ofte talrige kurve ..... Artemisia
Få, mellemstore, langstilkede kurve Anthemis
63. Planten filtet, i det mindste på bladundersiderne ..... 64.
" ikke filtet 70.
64. Kurvene omgivne af hvide, stjærneformet udbredte højblade Leontopodium
Ingen hvidfiltede, stjærneformede højblade 65.
65. Svøbbladene overvejende filtede ..... 66.
" " hindeagtige 68.
66. Flerårig ..... Aster
Enårig 67.
67. Svøbbladene helt skjulte af deres uldhår ..... Micropus
Svøbbladenes spidser skelnelige Filago
68. Svøbbladene helt hindeagtige og gule ..... Helichrysum
" noget urteagtige, ikke rengule 69.
69. Kurvene 7-10mm, næsten i en endestillet skærm ..... Antennaria
" i nøgler eller klase Gnaphalium
70. Ingen fnok ..... 71.
Med hårformet fnok 72.
71. Kurvsvøbbladene ikke bladagtige ..... Artemisia dracunculus
De ydre kurvsvøbblade " Carpesium
72. Blomsterne hvidgule ..... Conyza
" gule 73.

73. Tungeformede randkroner mangler helt ..... Aster
Med tungeformede randkroner af rørkronernes længde 74.
74. 1 række fnokhår + en ydre række små skæl på frugten ... Pulicaria
Frugten kun med 1 række fnokhår Inula
75. Stængler og blade kraftigt tidselagtigt tornede ..... Scolymus
Højst med blødtornede blade 76.
76. Frugterne helt uden fnok ..... 77.
" med fjer-, hår- børste- eller skælformet fnok 78.
77. Uden stængelblade ..... Aposeris
Med " Lapsana
78. Frugterne med fjerformet fnok ..... 79.
" " hår-, børste- eller skælformet fnok 84.
79. Kurvbunden med avner .....Hypochoeris
" uden " 80.
80. 1 række kurvsvøbblade ..... Tragopogon
Flere rækker kurvsvøbblade 81.
81. Bladene helrandede og ligestrengede ..... Scorzonera
" fjerstrengede 82.
82. Alle blade i roset ..... Leontodon
Med stængelblade 83.
83. Frugterne længdestribede. Planten blødhåret ..... Scorzonera
" tværrynkede. Planten stivhåret Picris
84. Frugten stærkt sammentrykt ..... 85.
" ikke " 89.
85. Frugten med næb ..... 86.
" uden næb 87.
86. Kurvene mest 5-blomstrede. 2 rækker svøbblade ..... Mycelis
" flerblomstrede. Flere " " Lactuca
87. Blomsterne gule ..... Sonchus
" rødlilla eller blå 88.
88. Kurvene med ca. 5 rødlilla blomster, 3-5mm brede ..... Prenanthes
" " " 10 blå blomster, 7-12mm brede Cicerbita
89. Blomsterne blå ..... Cichorium
" gule eller røde 90.
90. Stænglerne ugrenede og helt bladløse. Frugterne langnæbbede Taraxacum
Anderledes 91.
91. Frugten med en krone foroven omkring næbbet ..... Chondrilla
" uden nogen krone foroven 92.
92. Frugterne afskårne foroven, uden næb ..... 93.
" tilsmalnede foroven 94.
93. Kurvbunden med hår mindst af frugtens længde. Kurvsvøbet tæt stjærnefiltet og almindeligt håret ..... Andryala
Kurvbunden uden lange hår Hieracium
94. Flere rækker kurvsvøbblade ..... Cephalorhynchus
2 rækker kurvsvøbblade Crepis

Eupatorium cannabinum L. Hjortetrøst. VII-IX. Alm.

Solidago. Gyldenris.

1. Bladene linje-lancetformede, helrandede, kirtelprikkede graminifolia
" mest lancetformede, tandede, ikke " 2.
2. Kurvene alsidige på skrået oprette grene; svøbet 4,5-8mm virgaurea
" ensidige på udstående grene; svøbet 2-4(5)mm 3.
3. Stænglen tæt dunet, ihvertfald i øvre 1/3. Svøbet 2-2,8mm canadensis
" glat. Kurvsvøbet 3,2-5mm gigantea

Solidago virgaurea L. Alm. gyldenris. VII-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. virgaurea: 30-80cm. Mange kurve. 11-15 skivekroner.
ssp. alpestris (W.& K.) Rchb.: 5-20cm. Mest 3-10 kurve. 16-28 skivekroner. Alpin.

S. canadensis L. Kanadisk gyldenris. VIII-XI. Alm.

S. gigantea Aiton Sildigt gyldenris. VII-X. Spredt.

S. graminifolia (L.) Salisb. Græsbladet gyldenris. 30-150cm. Kurvstanden halvskærmformet. Sj.

Bellis perennis L. Tusindfryd. III-X. Alm.

Aster. Asters.

1. Ingen randkroner ..... 2.
Med randkroner 4.
2. Bladene tæt gråfiltede ..... oleifolius
" glatte til ru 3.
3. Indre kurvsvøbblade halvspidse til afrundede ..... sedifolius
" " tilspidsede linosyris
4. Bladene kødede og glatte ..... tripolium
" tynde, oftest m.m. dunede 5.
5. Mest med 1 kurv. 2 rækker næsten ens svøbblade ..... alpinus
Flerkurvet. 3-5 rækker ofte meget uens svøbblade 6.
6. Randkronerne uden griffel. Bladene kirtelprikkede (under hårene) sedifolius
Randkronerne med griffel 7.
7. 2-6 kurve. Svøbbladene m.m. butte og m.m. udstående ..... amellus
Flere kurve. Svøbbladene spidse 8.
8. Toppen kirtlet ..... novae-angliae
" uden kirtler 9.
9. Bladgrunden ikke omfattende. Svøbbladene 4-5,5mm ..... lanceolatus
" stængelomfattende. De større svøbblade 5-12mm 10.
10. Bladoversiden blågrøn ..... laevis
" ikke blågrøn 11.
11. Mellemste stængelblade 2,5-5 x så lange som brede .... versicolor
" " mest 4-10 x så lange som brede 12.
12. Ydre svøbblade først tilsmalnede foroven ..... novi-belgii
" " langt tilsmalnede salignus

Aster novae-angliae L. Stivhåret asters. 60-120cm. Stænglen stivhåret, kirtlet foroven. Blomsterne rødlilla, lyserøde eller blålilla. Forvild.

A. laevis L. Glat asters. 60-120cm. Helt glat og blågrøn. Svøbbladene bruskagtige og hvide med grøn spids. Svøbet derfor broget. Forvildet.

Aster novi-belgii L. Høstasters. 60-150cm. Stænglen ofte med 4 hårstriber foroven. Kronerne mest lyslilla. Forvildet.

A. salignus Willd. Pilebladet asters. 50-120cm. Svøbbladene næsten lige lange. Kronerne mest hvide, senere bleglilla. Forvildet.

A. versicolor Willd. Broget asters. 60-120cm. Bladundersiden noget blågrøn. Topgrenene ofte med en lang række lige store blade. Blålilla kroner. Forvildet.

A. lanceolatus Willd. Lancetbladet asters. 60-120cm. Randkronerne mest hvide, ca. 1mm brede. Stænglen altid med hårstriber foroven. Forvildet.

A. amellus L. Bjærgasters. 20-60cm. Bladene helrandede, mest randhårede. Kurvene i halvskærm. Ydre svøbblade ofte med udbredt spids. Kronerne blålilla. VII-X. Alm.

A. alpinus L. Alpeasters. 5-25cm. Bladene helrandede, blødhårede, de nedre spatelformede. Randkronerne blålilla. VI-VIII. Alm.

A. tripolium L. Strandasters. VI-IX. Spredt. 2 underarter:
ssp. tripolium: Stængelbladene lancet- eller elliptisk-lancetformede.
ssp. pannonica (Jacq.) Soó: Stængelbladene linje- eller smalt linje-lancetformede.

A. sedifolius L. (A. punctatus) Rustænglet asters. 20-50cm. Bladene linje-lancetformede med ru rand og ofte også overflade. Svøbet ofte med klæbrig glans. VII-IX. Spredt. 3 underarter:
ssp. sedifolius: Bladene ru. Kurvene mest med 15-30 blomster, 5-10 randkroner.
ssp. dracunculoides (Lam.) Merxm.: Bladene med eller uden kirtelprikker, glatte eller ru. Kurvene mest med 6-15 blomster, 0-6 randkroner.
ssp. canus (W.& K.) Merxm.: Grå asters. Bladene spindelvævsharede. Kurvene mest med 15-30 blomster og 5-10 randkroner.

A. linosyris (L.) Bernh. Guldasters. 10-70cm. Stænglerne tæt bladede. Kurvene i tætte halvskærme. Svøbbladene lange og smalle, udstående. Alm.

A. oleifolius (Lam.) Wagenitz Olivenbladet asters. 15-35cm. Stænglen hurtigt glat og bladløs forneden, med omvendt lancetformede, gråhvidt filtede blade foroven. Kurvene i tætte halvskærme. VII-IX. Spredt.

Erigeron. Bakkestjærne.

1. Randkronerne kun lidt længere end skivekronerne ..... acer
" tydeligt " " " 2.
2. Stænglerne tydeligt kirtelhårede foroven ..... atticus
" ikke kirtelhårede 3.
3. 1-2-årig. Mest over 40cm. Mange kurve. Ofte hvide randkroner annuus
Flerårig. " under " . Få kurve 4.
4. Grundbladene kort og tæt krushårede. 1-3 kurve ..... alpinus
" glatte, som ældre randhårede. 1 kurv 5.
5. Svøbbladene bredest omkring midten, m.m. parallelsidede uniflorus
" " forneden, gradvist tilsmalnede nanus

Erigeron annuus (L.) Pers. Smalstråle. VII-VIII. Alm. Forvildet. 2 ssp:

ssp. annuus: Øvre blade stærkt tandede. Stænglen udstående håret. ssp. strigosus (Mühl.) Wagen.: Øvre blade helrandede eller svagt tandede. Stænglen kort tiltrykt håret.

Erigeron acer L. Bitter bakkestjærne. V-IX. Alm. 3 underarter: ssp. podolicus (Bess.) Schmalh.: Randkronerne tydeligt længere end skivekronerne. Bladene glatte eller svagt hårede på rand og ribber. ssp. acer: Randkronerne korte. Bladene tæthårede, m.m. aflange. ssp. angulosus (Gaudin) Vacc.: Randkronerne korte. Bladene glatte eller randhårede, linje-lancetformede.

E. atticus Vill. Kirtelbakkestjærne. 20-60cm. Stænglen kraftig, kantet, tæt bladet. 3-10 kurve i halvskærm, 1,75-3cm brede. Randkronerne stærkt rødlilla. VII-IX. Sj.

E. alpinus L. Alpebakkestjærne. 5-20cm. Grundbladene noget spids. Med trådformede rørkroner lige inden for randkronerne. Svøbbladene bredest i nedre 1/3, ofte lillaspidsede. VII-VIII. Spredt.

E. nanus Schur Liden bakkestjærne. (E. neglectus). 2-15cm. Grundbladene butte. Med trådformede rørkroner lige inden for randkronerne.Spr.

E. uniflorus L. Snebakkestjærne. 2-10cm. Ingen trådformede rørkroner. Randkronerne hvide eller bleglilla. VII-IX. Spredt.

Conyza canadensis (L.) Cronq. Kanadisk bakkestjærne. VI-IX. Alm.

Filago. Museurt.

1. Kurvsvøbbladene med en stak	.....	2.
" butte, uden stak		3.
2. Bladene bredest i nedre halvdel. Stakken gul	.....	vulgaris
" " " øvre " . " rødlig i knop		lutescens
3. Stænglen klaseagtigt grenet	.....	arvensis
" gaffelgrenet		minima

Filago vulgaris Lam. (F. germanica) Kuglemuseurt. VII-IX. Alm.

F. lutescens Jordan Gulgrå museurt. (F. germanica ssp. apiculata).

F. arvensis L. Agermuseurt. VII-VIII. Alm.

F. minima (Sm.) Pers. Liden museurt. VII-VIII. Spredt.

Micropus erectus L. Fureblomst. 5-10cm. Rigt grenet, tæt uldhåret filtet, noget museurteagtig enårig. Kurvene omgivne af højblade, fremtræder som rene uldkugler. V-IX. Sj.

Gnaphalium. Evighedsblomst.

1. Enårig. Kurvene i endestillede nøgler	.....	2.
Flerårig		3.
2. Kurvene omgivne af højblade. Svøbbladene brunlige	....	uliginosum
" uden højblade. Svøbbladene strågule		luteoalbum
3. Under 10cm, med 1-6 kurve	.....	supinum
Over 10cm, med over 12 kurve		4.
4. Stængelbladene 1-strengede	.....	silvaticum
" 3-strengede		norvegicum

Gnaphalium silvaticum L. Rank evighedsblomst. VII-IX. Alm.

G. norvegicum Gunn. Sæterevighedsblomst. 10-30cm. Blomsterstandens støtteblade så lange som eller længere end blomsterstanden. Nøglerne mere sammentrængte mod spidsen. VII-IX. Spredt.

G. supinum L. Dværgevighedsblomst. 2-8cm. Svøbbladene lysebrune, i frugt stjærneformet udstående. Bladene 1-2mm brede. VI-IX. Alm.

G. luteoalbum L. Gulhvid evighedsblomst. 10-30cm. Stængelbladene 5-8 mm brede, tyndt, tiltrykt hvidgrât filtede. Blomsterne gullige, rødlige foroven. VI-IX. Spredt.

G. uliginosum L. Sumpevighedsblomst. VI-X. Alm.

Helichrysum arenarium (L.) Moench Gul evighedsblomst. VII-X. Spredt.

Antennaria dioica (L.) Gaertner Alm. kattefod. Svøbbladenes vedhæng hvidt eller lyserødt. Planten med udløbere. V-VIII. Alm.

Leontopodium alpinum Cass. Edelvejs. 5-20cm. Hele planten tæt hvidfiltet. 5-6 endestillede kurve, omgivne af 5-13 3-kantet-lancetformede højblade. VII-VIII. Spredt.

Inula. Alant.

1. Randkronerne højst lidt længere end skivekronerne ..... 2.
" tydeligt længere end skivekronerne 4.
2. Stængelbladene nedløbende ..... bifrons
" ikke nedløbende 3.
3. Mellemste og øvre blade med stængelomfattende grund ... germanica
" " " " " kileformet grund conyza
4. Stængelbladene æg-hjærteformede. Kurvene 8-10cm brede .. helenium
" smallere. Kurvene op til 5cm brede 5.
5. Bladene med 3-7 parallelle strenge ..... ensifolia
" fjerstrengede eller med utydelige ribber 6.
6. Bladoversiden tydeligt netåret ..... 7.
" ikke tydeligt netåret 8.
7. Bladoverside og kurvsvøb m.m. tæthårede ..... hirta
" " " glat eller svagt hårede salicina
8. Bladoversiden tæt silke- til uldhåret ..... oculus-christi
" svagt dunet britannica

Inula helenium L. Lægealant. VI-IX. Spredt.

I. germanica L. Duskalant. 30-60cm. Randkronerne 1-3mm længere end kurvsvøbet. Kurvene 1cm brede, i en tæt halvskærm. Bladundersiden langhåret og kirtlet. VII-VIII. Alm.

I. salicina L. Pilealant. VI-IX. Alm.

I. hirta L. Hvas alant. 15-45cm. Stænglen stivhåret og bladene stærkt ruhårede. Kurvsvøbet stivhåret. Kurvene mest enlige, svøbet tiltrykt.

I. ensifolia L. Sværdalant. 10-40cm. Bladene randhårede og glatte, de

midterste under 1cm brede, 4-8cm lange og mørkegrønne. 1(-3) endestillet kurv. Svøbbladene med udstående spids. VII-VIII. Alm.

Inula britannica L. Soløjealant. VII-IX. Alm.

I. oculus-christi L. Kristøjealant. 20-50cm. Stænglen løst hvidfiltet. Svøbbladene tæt og langt silkehårede. Randkronerne gyldent orangegule.

I. conyza DC. Trekløftalant. 50-120cm. Kurvene i en top, 1cm brede, valseformede, med taglagt og ofte rødspidset svøb. VII-IX. Alm.

I. bifrons L. Vinget alant. 30-80cm. Nær foregående, men klæbrigt kirtlet. Stængelbladene halvt omfattende og kort nedløbende. Spredt.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Strandloppeurt. Med randkroner. Alm.

P. vulgaris Gaertner Alm. loppeurt. Randkronerne = kurvsvøbet. Alm.

Carpesium cernuum L. Kraveblomst. 20-80cm. 1-2-årig. Bladene smalt rudeformede. Kurvene endestillede, omgivne af flere store højblade. Blomsterne blegt gulgrønne. VI-VIII. Spredt.

Telekia speciosa (Schreber) Baumg. Tusindstråle. VII-IX. Alm.

Bidens. Brøndsel.

1. Bladene hele. Kurvene nikkende ..... cernua
" delte. Kurvene ikke nikkende 2.
2. Småbladene ikke stilkede ..... tripartita
" kortstilkede 3.
3. 3(5) småblade. Kurven 8-12mm bred; 5-8 ydre svøbblade ... frondosa
(3)5 " . " 13-25mm " ; 10-16 ydre svøbblade vulgata

Bidens tripartita L. Fliget brøndsel. VII-IX. Alm.

B. cernua L. Nikkende brøndsel. VII-IX. Alm.

B. frondosa L. Sortfrugtet brøndsel. 30-120cm. Bladene ofte lillaanløbne; endesmåbladet lang-, sidesmåbladene kortstilkede. Frugterne sortagtige og kileformede, rynkede. VII-IX. Sj. Jud.Tulcea. Indslæbt.

B. vulgata Greene 50-100cm. Nær foregående. IX-X. Sj. Indslæbt.

Sigesbeckia orientalis L. 30-120cm. Klisterkurv. Opret, stivhåret, grenet. Bladene æg- til lancetformede, grofttandede, siddende. Kurvene 3 sammen i grenenderne. Ydre svøbblade bladagtige, klæbrige, de indre kølede. VII-IX. Spredt. Indslæbt.

Rudbeckia laciniata L. Fliget solhat. 50-250cm. Planten glat. Bladene dybt indskårne, de øvre med 3-5 lancetformede flige. Kurvbunden kegleformet. VII-IX. Spredt.

Helianthus annuus L. Solsikke. Enårig med brune skivekroner. VII-IX.

H. tuberosus L. Jordskok. 1-2m. Flerårig med gule skivekroner. Øvre blade spredte, nedre modsatte. Bladene 8-15x5-8cm. Dyrket og forvildet

Iva xanthifolia Nutt. 80-150cm. Opret enårig. Bladene bredt æg- til rudeformede, sj. 3-5-lappede, groft takkede. Mange 4-5mm store, hvid-

grønne kurve med 5 svøbblade i ende- og akselstillede aks og toppe.Spr.

Ambrosia artemisiifolia L. Bynkeambrosie. VIII-IX. Sj.

Xanthium. Brodfrø.

1. Stænglen med gule, tredelte torne ved bladgrunden ..... spinosum
" uden torne 2.
2. Frugten 10-16mm i alt; med glatte torne ..... strumarium
" 16-30mm " " . Tornene børstehårede mod grunden 3.
3. Frugten 3 x så lang som bred. De 2 torne danner næsten en ring orientale
Frugten 2 x så lang som bred. De 2 torne som korte kroge italicum

Xanthium spinosum L. Tornet brodsfrø. 20-80cm. Liggende til opstigende og ofte dunet. Bladene 3-5-kløvede, hen ad Hjærtespands. VII-X. Alm.

X. strumarium L. Skræppebrodfrø. 20-120cm. Bladene bredt trekantede og håndstrengede, grågrønne, 8-12x7-12cm. Frugtens 2 endetorne ofte rette. VII-IX. Alm.

X. orientale L. 30-100cm. Nær den følgende, men frugten længere i det, indtil 30mm. VII-IX. Sj.

X. italicum Moretti (X. riparium) Plettet brodfrø. 30-120cm. Stængler og blade ru. Stænglen ofte med mørke streger eller pletter. Frugten ca. 22x13mm med tornene. VII-IX. Spredt.

Galinsoga parviflora Cav. Håret kortstråle. V-X. Alm.

G. ciliata (Rafin.) Blake (G. quadriradiata) Kirtelkortstråle. Spredt.

Anthemis. Gåseurt.

1. 1-2-årig ..... 2.
Flerårig 5.
2. Kurvbunden let hvælvet. Bladene kamtandede ..... austriaca
" kegleformet. " noget uregelmæssigt tandede 3.
3. Avnerne linje-børsteformede. Planten stinkende ..... cotula
" lancetformede. Planten ikke " 4.
4. Kurvsvøbet noget frynset. Planten mest tiltrykt uldhåret ruthenica
" helrandet. Planten glat eller svagt håret arvensis
5. Frugterne med trindt eller kvadratisk tværsnit. Avnerne ofte tandede ..... 6.
Frugterne lidt sammentrykte, med rudeformet tværsnit. Avnerne ikke tandede 7.
6. Kurvsvøbbladenes rand stråfarvet til lysebrun ..... cretica
" " mørke- til sortbrun carpatica
7. Randkronerne gule eller væk ..... tinctoria
" hvide 8.
8. Kurvsvøbbladene med sortbrun rand ..... macrantha
" " lys rand triumfetti

Anthemis carpatica Willd. Karpatisk gåseurt. 2-30cm. Stænglerne mest med 1 kurv. Bladene lysegrønne, m.m. tiltrykt hårede, kirtelprikkede. Kurvene 3-4,5cm brede; svøbet spredt håret. VI-VIII. Spredt. Alpin.

ssp. carpatica: 10-30cm høj. Grundbladene 4-10cm, mest 2 x delte, med smalle, ikke kileformede afsnit, tit spredt hårede.
• ssp. pyrethriformis (Schur) Beldie: 2-10cm høj. Grundbladene 2-4cm, 1 x delte med kileformede, ofte tandede afsnit, tit tæt silkehårede. Alm. på M.Bucegi. Andetsteds ?

Anthemis cretica L. (A. montana) Bjærggåseurt. 12-30cm. Som carpatica, men kurvene 2-3(4)cm brede; svøbet ret tæt langhåret. Avnerne ikke med brun spids (ofte med brun spids hos carp.). VI-VIII. Sj.

A. arvensis L. Agergåseurt. VI-IX. Alm.

A. ruthenica Bieb. Russisk gåseurt. 25-50cm. Med stærk, aromatisk lugt. Avnerne kileformede, bredest under spidsen, ofte lidt tandede øverst. Randfrugterne skævt afskårne foroven. VI-IX. Alm.

A. cotula L. Stinkende gåseurt. VII-IX. Alm.

A. tinctoria L. Farvegåseurt. VII-IX. Alm. 3 underarter:
ssp. fussii (Griseb.) Beldie: Svøbbladene med mørkebrun eller sortagtig rand. Randkroerne højst = kuvrnes bredde.
ssp. tinctoria: Svøbbladene med lys rand. Bladundersiden grøn, oftest svagt uldhåret; tænderne tit flade.
ssp. subtinctoria (Dobr.) Soó: Svøbbladene lysrandede. Bladundersiden tæt grå- eller hvidulden, med krumrandede tænder.

A. triumfetti (L.) DC. Kamgåseurt. 30-80cm. Frugterne med en krave på 1/3-1/2 x frugten. Svøbbladene dunede eller lådne, med rustfarvet, randhåret spids. VII-VIII. Sj.

A. macrantha Heuffel Storblomstret gåseurt. 50-105cm. Bladene tynde og grønne, de nedre indtil 15x10cm. Kurvene 5-6,5cm brede. Randkronerne 2-3cm. Kurven indtil 2cm bred. VII-VIII. Spredt.

A. austriaca Jacq. Østrigsk gåseurt. 10-60cm. Bladene 2 x delte med regelmæssigt kamformet ordnede afsnit. Frugten tydeligt sammentrykt med rudeformet tværsnit. VI-VII. Spredt.

Achillea. Røllike.

1. Bladene hele ..... 2.
" delte 4.
2. Bladene spatelformede. Stænglen tæt brundunet foroven ... lingulata
" lancetformede. " ikke " 3.
3. Bladene tæt kirtelprikkede. 7-8 randkroner ..... cartilaginea
" ikke " . 8-13 " ptarmica
4. Bladene kamformet delte med helrandede afsnit ..... 5.
" stærkere fligede 6.
5. Golde skuds blade helrandede i nedre halvdel ..... ochroleuca
" " " ikke eller lidet helrandede depressa
6. Randkronerne tydeligt gule ..... 7.
" hvide, lyserøde eller bleggule 9.
7. Halvskærmen med 3-15 kurve ..... leptophylla
" " 15-mange kurve 8.

8. Bladene 1 x delte. Svøbbladene med glat spids ..... clypeolata
" 2-3 x delte. Svøbbladene helt lådne coarctata
9. Halvskærmen med 1-10 kurve ..... 10.
" " mest over 25 kurve 11.
10. Stænglen med 1(-3) kurve. Randkronerne 6-10mm, ægformede oxyloba
" " (1-)3-10 kurve. Randkronerne ca. 4mm impatiens
11. Svøbbladene glatte og skinnende ..... crithmifolia
" m.m. hårede og matte 12.
12. Bladene oftest flade, med under 10 par afsnit ..... nobilis
" med over 10 par afsnit 13.
13. Stængel, blade og kurvsvøb mest tæt langhårede ..... 14.
" " " " ikke " " 16.
14. Grundbladenes flige under 0,3mm brede, 3-dimensionelle .. setacea
" " over 0,3mm " , plant stillede 15.
15. Hovedskærmen 4-8cm bred ..... pannonica
" 2-3cm " collina
16. Stængelbladene ca. 3 x så lange som brede. Stænglen grov ..... 17.
" ca.10 x " " " " . " tynd 20.
17. Grundbladene lancetformede, bredest på midten ..... 18.
" bredest over midten 19.
18. Bladskaftet smalt vinget, højst 1-2mm bredt ..... stricta
" tydeligt vinget, mest 2-3mm bredt distans
19. Hovedskærmen 1-3cm bred. Planten vokser i grupper ..... pratensis
" 4-10cm " . " mest enlig millefolium
20. Hovedskærmen 1-3cm bred ..... 21.
" 4-10cm bred 22.
21. Nedre stængelblade mest tydeligt stilkede ..... aspleniifolia
" " næsten siddende collina
22. Bladskaftet ikke tandet ..... millefolium
" tandet stricta

Achillea oxyloba (DC.) Sch.Bip. ssp. schurii (Sch.Bip.) Heimerl Kamrøllike. 5-25cm. Bladene mest på stænglen, 2 x delte med lancetformede afsnit. Kurven 15-25mm bred. VII-VIII. Alm.

A. lingulata W.& K. Tungerøllike. 15-50cm. Bladene 2-5cm, kirtelprikkede, afrundede fortil. Kurvsvøbet 5-8mm bredt. VI-VIII. Spredt.

A. ptarmica L. Nyserøllike. VII-VIII. Spredt.

A. cartilaginea Ledeb. Pilebladet røllike. 40-120cm. Bladene 10-15mm brede, tiltrykt hårede, matgrønne, dobbelt savtakkede. VII-VIII. Sj.

A. impatiens L. Bregnerøllike. 40-100cm. 6-15 randkroner på 4-5mm. Kurvsvøbet ca. 4mm. Bladenes hovedflige ofte med en enkelt fremadrettet tand nær grunden. VI-VII. Sj. Jud.Cluj: Cluj-Napoca i V.Moril. Ju .Harghita: Joseni.

A. distans W.& K. Tandrøllike. Bladskaftet tydeligt tandet, oftest med indskudte småflige. VI-VIII.

A. stricta (Koch) Schleicher Rejnfansrøllike. Bladskaftet tydeligt tandet, 1-2mm bredt. VI-VIII.

Achillea millefolium L. Alm. røllike. VI-VIII. 2 underarter:
ssp. millefolium: Svøbbladenes rand mest brun. Kurven 3-4x2-3mm. Randkronerne oftest hvide. Alm.
ssp. sudetica (Opiz) Weiss: Svøbbladenes rand mørkebrun. Kurven 5x3mm. Randkronerne oftest lyserøde. Spredt.

A. pannonica Scheele Stenrøllike. VI-VIII. Alm.

A. setacea W.& K. Finbladet røllike. VI-VIII. Alm.

A. aspleniifolia Vent. Radeløvsrøllike. Bladene kirtelprikkede. Spr.

A. collina J.Becker Bakkerøllike. VI-VIII. Alm.

A. pratensis Saukel & Länger Engrøllike. Udpræget gruppevoksende art med 10-50 lige høje planter. Stænglen 1-2mm tyk.

A. crithmifolia W.& K. Kratrøllike. 20-60cm. Bladene flade, m.m. dunede, med utandet skaft. Golde skuds blade stærkt findelte. Randkronerne hvide til bleggule. VI-VII. Spredt. (A. getica Grec. har 6-12 par 1-ordens afsnit med smalle 2-ordens flige. Randkronerne 1/3-1/4 x kurvsvøbet. V-VI. Sj. Bukarest.).

A. nobilis L. ssp. neilreichii (Kerner) Velen. Ædelrøllike. 15-60cm. Bladene med ægformet omrids, 3-5x1,5-3cm, med tandet skaft og dunede. Randkronerne 1-1,5mm, bleggule. VII-VIII. Alm.

A. leptophylla Bieb. 10-25cm. Kurvstilkene 2-10mm. Kurvene 4-5mm brede. Svøbbladene ca. 2,5mm, blegt hindekantede. VI-VII. Sj.

A. ochroleuca Ehrh. Bleggul røllike. 20-40cm. Randkronerne gule eller hvidlige, 1-1,5mm. Kurvene ca. 2mm brede. Svøbbladene ca. 1,5mm. Sj.

A. depressa Janka 3-25cm. Randkronerne gullige. Kurvene 2-3mm brede. Svøbbladene ca. 2mm. VI-VII. Sj. Østlig.

A. clypeolata Sm. 10-45cm. Kort filtet. Bladene svagt kirtelprikkede, de nedre indtil 15cm. Kurvene ca. 3mm brede. VI-VIII. Sj.

A. coarctata Poiret Brunfiltet røllike. 20-90cm. Bladene kirtelprikkede, de nedre indtil 25x1,5cm. Kurvsvøbet 3-4mm bredt. VI-VII. Spredt.
ssp. coarctata: Planten uldhåret-filtet. Nedre blades 2-ordens flige tætstillede.
ssp. millefoliata (Grec.): Planten mindre håret, grågrøn. Nedre blades 2.ordens flige adskilte.

Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. (Tripleurospermum tenuifolium) Hårkamille. 50-100cm. Frugten afrundet foroven, uden nogen krone, rygsiden glat eller med en fin længderibbe. Stængel og blade ofte med talrige, hovedformede kirtler. VI-VII. Sj.

M. inodora L. Lugtløs kamille. Frugten foroven med en skarp og lidt bægerformet rand. VI-X. Alm.

Chamomilla recutita (L.) Rauschert Vellugtende kamille. V-VI. Alm.

C. suaveolens (Pursh) Rydb. Skivekamille. V-IX. Alm.

Tanacetum. Okseøje.

1. Uden randkroner ..... vulgare
   Med " 2.
2. Randkronerne gule ..... millefolium
   " hvide 3.
3. Talrige 6-8mm brede kurve i en tæt halvskærm ..... macrophyllum
   3-20 1,5-4cm " " i halvskærm 4.
4. Stængelbladene siddende med 7-12 par småblade ..... corymbosum
   " stilkede " 2-6 " " parthenium

Tanacetum vulgare L. Rejnfan. VII-IX. Alm.

T. millefolium (L.) Tzvelev 20-50cm. Bladene 2 x delte og stilkede. 2-10 7-10mm brede kurve i en åben halvskærm. Randkronerne 1,8-3mm. Spr.

T. corymbosum (L.) Sch.Bip. Lundokseøje. 40-80cm. Bladene nærmest rejnfansagtige, med aflange, takkede til snitdelte flige. Mest 3-10 kurve. VI-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. corymbosum: Bladoversiden mat. Svøbbladenes rand lysebrun.
ssp. clusii (Fischer) Heywood: Bladoversiden skinnende. Svøbbladenes rand sortebrun. Randkronerne 15-20mm (10-15mm hos cor.).

T. parthenium (L.) Sch.Bip. Matrem. VI-VIII. Dyrket og forvildet.

T. macrophyllum (W.& K.) Sch.Bip. Storbladet okseøje. 40-100cm. Bladene glatte ovenpå, tæthårede nedenunder, med 3-5 par lancetformede, indskåret takkede flige. 5-6 randkroner på 2-4mm. VI-VIII. Spredt.

Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev Sumpokseøje. 30-150cm. Bladene talrige, siddende, rude-lancetformede, skarpt og regelmæssigt savtakkede. Randkronerne 10-25mm. Flodbredder. VIII-X. Spredt.

Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw. Alpeokseøje. 5-15cm. Stænglen kun med få, helrandede småblade. Nedre blade 1 x delte. Kurvene enlige, 2-4 cm brede med sortbruntrandede svøbblade. VII-VIII. Spredt.

Leucanthemum vulgare Lam. Hvidt okseøje. V-X. Alm.

L. waldsteinii (Sch.Bip.) Pouzar (L. rotundifolium) Rundbladet okseøje. 30-80cm. Nedre blade runde til bredt ægformede. Stængelbladene ofte rudeformede, regelmæssigt finttandede. VII-IX. Alm.

Artemisia. Bynke.

1. 5-20cm høje planter. Kurvene i en (mest ugrenet) klase ..... 2.
   Mindst 20cm høje planter. Kurvene mest i top 3.
2. Bladfligene ca. 1/2mm brede. Grundbladene kortstilkede pedemontana
   " 1-2mm brede. Grundbladene langstilkede eriantha
3. Stængelblade helrandede og glatte ..... dracunculus
   " delte 4.
4. Bladene mørkegrønne ovenpå, gråfiltede nedenunder ..... vulgaris
   " af samme farve på begge sider 5.
5. Bladstilkene uden øret grund ..... 6.
   " med " " 7.

6. Bladoversiden tæt silkehåret; fligene 3-4mm brede .... absinthium
" glat; fligene 0,4mm brede abrotanum
7. 1-2-årige med glatte eller svagt hårede blade ..... 8.
Flerårige med i det mindste som unge filtede blade 9.
8. Blomsterne rødlige. Bladfligene 5-15mm lange ..... scoparia
" hvidlige. " 1-5mm " annua
9. Indre svøbblade glatte, ydre glatte eller svagt dunede ..... 10.
Alle svøbblade m.m. lådne 12.
10. Kurvsvøbet svagt hindekantet. Bladene noget kødede tscherneviana
Indre svøbblade bredt hindekantede. Bladene ikke kødede 11.
11. Nedre stængelblade friske under blomstringen ..... campestris
" " visne " " santonicum
12. Stængelbladene visner under blomstringen ..... lerchiana
" " ikke under blomstringen 13.
13. Kurvene kugleformede. Smal, kortgrenet top ..... 14.
" ægformede. Skrået udstående, ofte lange topgrene 15.
14. Bladene dunede. Kurvsvøbet dunet. Nedre blade stilkede .... alba
" silkehårede. Nedre blade siddende. Filtet svøb pontica
15. Kurvene m.m. nikkende. Korte bladflige (5-12mm) ..... austriaca
" m.m. oprette. Længere " , ofte over 1cm campestris

A. alba Turra Kamfermalurt. 30-80cm. Glat til hvidfiltet, men ikke sølvskinnende. Bladene 2-3 x delte, fligene knap 1mm brede. Ydre svøbblade med smal, indre med bred hindekant. VIII-IX. Sj. (A. lobelii).

A. lerchiana Weber 30-60cm. Bladene efterhånden m.m. glatte, de nedre 3-4 x delte, med ofte store, fligede øren ved grunden. Bladfligene 0,2-0,4mm brede. Sj. Jud.Tulcea: Jurilovca la Capul Dolojman, Baia.

A. santonicum L. Saltmalurt. 20-60cm. Ligner Markbynke, men randblomsterne tvekønnede (hunlige hos M.). Stængelgrunden forveddet. Alm.
ssp. santonicum (A. monogyna): Stænglen dunet under blomstringen foroven. Kurvene med 3-6 blomster. Nedre blade 2-3,5x1,5-2cm.
ssp. patens (Neilr.) Persson (A. salina): Stænglen m.m. glat under blomstringen. Kurvene med 2-4 blomster. Nedre blade 1-2cm x 7-15mm.

A. abrotanum L. Ambra. 60-100cm. Med citronlignende lugt. Bladundersiden gråhåret. Øvre blade 3-kløvede eller hele. Stænglerne glatte, meget grenede. VIII-IX. Dyrket og forvildet.

A. pontica L. Romersk bynke. 40-80cm. Bladene uden glans, fligene mest under 5mm, op til 1/2mm brede. Kurvene i ensidige klaser i en ret smal top. Bladene 1-2 x delte, tæt dunede på begge sider. VII-IX. Alm.

A. austriaca Jacq. Risbynke. 20-60cm. Bladene 2 x delte, silkehårede og skinnende på begge sider, fligene 5-12mm lange. Blomsterne rødliggule. VII-IX. Alm.

A. eriantha Ten. (A. petrosa) Hvidfingret bynke. Hvidfiltet med bitter lugt. Nedre blade 2 x tredelte med vifteformede flige; stilken meget længere end pladen. VII-VIII. Alm. Alpin.

Artemisia pedemontana Balbis (A. caucasica) Uldbynke. Hvidulden. Golde skud ofte rodslående. Nedre blade 2 x 3-delte til fjerfligede; stilken højst lig bladpladen. VII-VIII. Sj. Jud.Tulcea.

A. annua L. Enårig bynke. 50-150cm. Bladafsnittene 0,5-1mm brede. Planten altid helt glat, stærkt aromatisk. Kurvene 1,5-2mm brede. Svøbbladene bredt hindekantede. VII-IX. Alm.

A. dracunculus L. Esdragon. 50-120cm. Stærktgrenet, glat flerårig. Grundbladene med 3-kløvet spids, resten helrandede. VIII-IX. Dyrket.

A. tschernieviana Besser (A. arenaria) Sandbynke. 60-100cm. Halvbusk. Bladene 1-2 x delte, langfligede; de nedre visner efterhånden. Kronen rødlilla eller gullig. Klitter. VIII-IX. Constanta m.m.

A. campestris L. Markbynke. VII-X. Alm. 2 underarter:
ssp. campestris: Stængel og blade efterhånden glatte.
ssp. lednicensis (Roch.) Lemke & Rothm.: Planten vedvarende sølvsilkehåret. Kurvsvøbbladene ofte filtede.

A. scoparia W.& K. Kostbynke. 30-60cm. Minder om den foregående. Stængel og blade med spredte, udstående hår eller glatte. Kurvene 1-2mm. Stænglen rød. VIII-IX. Alm.

A. vulgaris L. Grå bynke. VII-IX. Alm.

A. absinthium L. Havemalurt. VII-IX. Alm.

Tussilago farfara L. Følfod. III-V. Alm.

Petasites. Hestehov.

1. Modne blades undersider grønne, glatte til svagt filtede ..... 2.
" " " grå- eller hvidfiltede 3.
2. Bladundersiden næsten glat bortset fra ribberne ..... kablikianus
" svagt filtet hybridus
3. Bladene trekantet-spydformede ..... spurius
" hjærte-nyreformede albus

Petasites albus (L.) Gaertner Hvid hestehov. III-IV. Alm.

P. hybridus (L.) Gaertner & al. Tordenskræppe. III-IV. Alm.

P. kablikianus Tausch Glat hestehov. Bladene runde til trekantet-hjærteformede med tænderne 2-6(10)mm fra hinanden. Blomsterne hvide eller bleggule. III-IV. Spredt.

P. spurius (Retz.) Rchb. Filtet hestehov. III-IV. Sj.

Homogyne alpina (L.) Cass. Alm. alpesalat. 10-30cm. Bladene mest grundstillede, 2-4cm, kredsformede med hjærteformet grund, let bugtet-tandede, med mørkegrøn over- og ofte lillaanløben underside. Stænglen med skælblade. Kurven 8-10mm, mat rødlilla. V-VII. Alm.

Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner Øret hovblad. 50-100cm. Nedre blade 20-50cm brede, trekantet-hjærteformede, øvre med tydeligt øret

grund. Kurvene lyslilla, i halvskærm, med 3-4(6) blomster; svøbet 4-6 mm. Bladundersiden spindelvævsfiltet til halvglat. VII-VIII. Alm.

Adenostyles orientalis Boiss. Trekantet hovblad. 50-100cm. Som alliariae, men kurvene med 12-15(10-18) blomster; svøbet 7-10mm. Bladundersiden halvglat. VII-VIII. Alm.

Arnica montana L. Guldblomme. VI-VIII. Spredt.

Doronicum. Gemserod.

1. Grundbladene væk under blomstringen. 5-12 kurve ..... austriacum
   Med grundblade under blomstringen. Stænglen med 1(-3) kurv 2.
2. Grundbladene med tilsmalnet grund ..... 3.
   " " hjærteformet grund 4.
3. Bladene tæt hårede med tandet til bugtet rand ..... clusii
   " glatte til spredt hårede, helrandede hungaricum
4. Jordstænglen tyk med spredte hårduske. Stænglen med 1-2 blade under midten. Lavlandsplante ..... orientale
   Jordstænglen tynd uden hårduske. Stænglen ofte bladet til over midten. Bjærgplanter 5.
5. Randblomsternes frugter uden fnok ..... columnae
   " " med " carpaticum

Doronicum austriacum Jacq. Høj gemserod. 30-150cm. Stænglen kantet, glat forneden. Nedre blade m.m. violinformede på grund af den bredvingede stilk. VII-VIII. Alm.

D. columnae Ten. Tuegemserod. 20-60cm. Grundbladene 3-8cm lange og brede med 19-25 spidse tænder. 3-4 lancetformede stængelblade med halvt omfattende grund. VI-VIII. Alm.

D. carpaticum (Gris.& Schenk) Nyman 10-50cm. VII-VIII. Alm.

D. orientale Hoffm. Rundtakket gemserod. 20-50cm. Grund- og stængelblade hjærteformede, helrandede eller uregelmæssigt rundtakkede. IV-V. Sj.

D. hungaricum Rchb.f. Kirtlet gemserod. 25-85cm. M.m. kirteldunet. Grundbladene 2-3,5(6)x0,5-1,5(2)cm, tilsmalnede til en ofte utydeligt stilk. Randkronerne uden fnok. IV-VI. Spredt.

D. clusii (All.) Tausch Filtet gemserod. 10-30cm. Grundbladene 3-5x2-3 cm, med en stilk på 2-5cm. Randkronerne med fnok. VII-VIII. Spredt.

Erechtites hieraciifolia (L.) Rafin. Mileurt. 50-120cm. Opret enårig. Bladene ca. 10cm, friskgrønne, uregelmæssigt spidstakkede. 12-20mm lange valseformede kurve i endestillet klase. 1 række svøbblade med få korte ekstrasvøbblade. VII-IX. Spredt.

Senecio. Brandbæger.

1. Bladene udelte; helrandede eller tandede ..... 2.
   I det mindste de midterste stængelblade delte 15.
2. Kurvene med 1 række svøbblade, men uden ekstrasvøbblade ..... 3.
   " " små ekstrasvøbblade 7.
3. Nedre blade med hjærteformet grund ..... rivularis
   " " " tilsmalnet grund 4.

4. Grundbladene ikke tiltrykte jorden, jævnt tilsmalnede ... papposus
" tiltrykte jorden, brat tilsmalnede i den korte stilk 5.
5. Randkronerne gule. Kurvsvøbet grønt ..... integrifolius
" mest orange, røde eller væk. Kurvsvøbet mest lillat 6.
6. Stænglen tæt uld- eller filthåret ..... capitatus
" glat eller noget uldhåret aurantiacus
7. I det mindste de nedre blade med hjærteformet grund ... subalpinus
Bladene ikke med hjærteformet grund 8.
8. 0(-3) randkroner. Gullighvide rørkroner ..... cacaliaster
5-20 " 9.
9. 5-8 randkroner ..... 10.
10-20 randkroner 14.
10. Stængelbladene jævnt mindre opad ..... doria
Nedre og øvre stængelblade lige store 11.
11. Ydre svøbblade oftest under 1/2 x svøbet .....fluviatilis
" " m.m. af svøbets længde 12.
12. Kurvstilke og svøbblade kirteldunede ..... hercynicus
" " " uden kirtelhår 13.
13. 7 kurvsvøbblade. Stænglen mest brunlilla og glat ..... ovatus
10-12 kurvsvøbblade. Stænglen mest grøn, ofte håret germanicus
14. Stænglen 10-50cm høj med 1 4-6(8)cm bred kurv ..... doronicum
" 50-120(200)cm høj med mange 2-4cm brede kurve paludosus
15. Ingen tungekroner ..... vulgaris
Med " 16.
16. Stængler og bladundersider hvidfiltede ..... incanus
" " " højst hvidfiltede som unge 17.
17. Tungekronerne tilbagerullede ..... 18.
" udstående 19.
18. Ydre svøbblade 1/10-1/4 x de indre ..... silvaticus
" " 1/2 x de indre viscosus
19. Bladene 2-3 x fligede ..... 20.
" 1 x delte 21.
20. 15-30cm høj med 1 kurv ..... abrotanifolius
50-80cm " " mange kurve borysthenicus
21. 6-14 ydre småsvøbblade. Bladskaftet tandet ..... 22.
1-6 " " " m.m. helrandet 23.
22. Unge skud oftest spindelvævsfiltede ..... vernalis
" " glatte til noget uldhårede rupester
23. 4-6 ydre svøbblade på 1/2 x kurvsvøbet ..... erucifolius
1-2 meget kortere ydersvøbblade 24.
24. Bladafsnittene nogenlunde lige store, mest 5-7 par ..... jacobaea
Bladene lyreformet delte med 1-4 par flige aquaticus

Senecio hercynicus Herborg. (S. nemorensis p.p.) Lundbrandbæger. 50-150cm. Øvre blade grund mest lidt udvidet og øret. Stænglen mest grøn og håret. 10-12 indre svøbblade med brunsort spids. VI-VIII.

S. ovatus (Gaertner & al.) Willd. (S. fuchsii) Pilebladet brandbæger.

60-150cm. Bladene ca. 5 x så lange som brede, glatte, lidet randhårede, de øvre mest kortstilkede. VI-VIII.

Senecio germanicus Wallr. (S. nemorensis p.p.) Randhåret brandbæger. 50-120cm. Bladene ca. 3 x så lange som brede, randhårede, krushårede nedenunder, de øvre mest kortstilkede. Med sødlig-aromatisk lugt. VI-VIII.

S. cacaliaster Lam. Kvastbrandbæger. 60-150cm. Bladene ca. 3 x så lange som brede, skarpt savtakkede. Kurvstilke og også ofte svøbet tæt kirtelhårede. VII-VIII. Jud.Caraş-Severin: Donaudalen: la Cazane, Pestera Pun.

S. doria L. Tykbladet brandbæger. Bladene mørkt blågrønne, kålagtige. Mange 1,5-2cm brede kurve i en åben, sammensat halvskærm. VII-IX. Spredt
ssp. umbrosus (W.& K.) Soó: Mest 8 randkroner. Stænglen spindelvævsharet
ssp. doria: Mest 5 randkroner. Stængel og blade glatte. 40-80cm høj. Bladene 2-5cm brede. ?
ssp. schvetzovii (Korsh.): Mest 5 randkroner. Stængel og blade glatte. Indtil 150cm høj. Bladene 6-12cm brede, de øvre ofte med m.m. hjærteformet grund. Alm.

S. paludosus L. Kærbrandbæger. 1/2-2m. Bladene smalt lancetformede, savtakkede med fremadbøjede tænder. Kurvene 3cm brede. Lysegule randkroner. Hul stængel. VII-VIII. Spredt.

S. doronicum (L.) L. Storblomstret brandbæger. 10-40cm. Bladene langstilkede, spidstakkede med udstående tænder. Stænglen kraftig. Blomsterne mørke- eller orangegule. VII-VIII. Spredt. (Planterne her er m.m. glatte og kaldes også S. glaberrimus (Rochel) Simonkai).

S. integrifolius (L.) Clairv. Bakkefnokurt. 15-60cm. Bladene spatelformede, spindelvævshårede, pladen lidt længere end stilken. V-VI. Spredt.

S. capitatus (Wahlenb.) Steudel Rød fnokurt. 15-30cm. Ligner den foregående, men randkronerne orange til ildrøde, sjældent gule, kan dog mangle. VII-VIII.

S. aurantiacus (Willd.) Less. Pomeransfnokurt. 20-50cm. Som de 2 foregående, men randkronerne orange eller brunrøde, sjældent manglende. 2-6 kurve. VII-VIII.

S. rivularis (W.& K.) DC. Bækfnokurt. 30-100cm. Nedre blade hjærte- til æg-hjærteformede med bredt vingede stilke. Bladranden mest krushåret, savtakket. Kurvene gule til orangerøde. V-VIII. Sj.

S. papposus (Rchb.) Less. Spatelfnokurt. 20-70cm. Grundbladene m.m. spatelformede, svagt bugtet-tandede, stilken oftest længere end pladen. 5-15 kurve. Planten m.m. spindelvævsfiltet. VII-VIII. Alm.

S. subalpinus Koch Ørebrandbæger. 30-70cm. Øvre bladstilke vingede, ofte med 1-få par små lapper, ved grunden med m.m. tandede øren, glatte eller svagt hårede, med groft tandet rand. VII-IX. Spredt.

S. jacobaea L. Engbrandbæger. VII-VIII. Alm.

S. borysthenicus (DC.) Stankov 50-80cm. Nær foregående, men bladene 2-3 x smalfligede, fligene 1(2)mm brede. VI-VIII. Sj. Jud.Tulcea.

Senecio aquaticus Hill Vandbrandbæger. VII-VIII. Spredt. 2 underarter:
ssp. aquaticus: Øvre stængelbladsflige fremadrettede. Få, 2,5-3cm brede kurve. Sj.
ssp.barbareaefolius (Wimm.& Grab.) Walters: Øvre stængelblades flige retvinklet udstående. Mange, 12-20mm brede kurve.

S. erucifolius L. Smalfliget brandbæger. 40-120cm. Bladenes midterbælte 2-3mm bredt; 5-7 par ofte kun 2mm brede og ensidigt tandede afsnit. Alle frugter korthårede. VII-IX. Alm.
(S. grandidentatus Ledeb. er tæt gråfiltet og har mindre dybt delte blade. Med lange udløbere. VII-VIII. Sj. Østlig.).

S. rupester W.& K. (S. squalidus) Stenbrandbæger. 20-60cm. 1-flerårig. Bladene med 3-4 par korte flige, hen ad Vårbrandbægers. Fnokken affaldende. Ydersvøbbladene hyppigt med penselhårede spidser. VI-VIII. Alm.

S. abrotanifolius L. ssp. carpaticus (Herb.) Nyman Finbladet brandbæger. 5-15cm. Stænglen næsten forveddet forneden, opstigende. Bladene glatte og skinnende. 1-få iøjnefaldende kurve i halvskærm. VII-VIII.Spr.

S. vernalis W.& K. Vårbrandbæger. V-VIII. Alm.

S. silvaticus L. Skovbrandbæger. VI-IX. Alm.

S. viscosus L. Klæbrigt brandbæger. VI-IX. Spredt.

S. vulgaris L. Almindeligt brandbæger. III-XI. Alm.

S. incanus L. ssp. carniolicus (Willd.) Br.Bl. Gråfiltet brandbæger. 5-15cm. Grundbladene 3-10cm, kile-spatelformede og lappede. Flere æggegule kurve i en tæt halvskærm, med 3-6 randkroner. VII-VIII. Sj.

S. fluviatilis Wallr. Kilebladet brandbæger. 60-200cm. Bladene lancetformede, 10-20x2-4cm, med fremadkrummede tænder med konveks yderside. Bestanddannende. Kurvsvøbet svagt flitet. VII-VIII. Spredt.

Ligularia sibirica (L.) Cass. Grøn nøkketunge. 50-150cm. Grøn, undertiden lillaanløben flerårig med nærmest følfodsagtige blade på 10-25x7-20 cm. Foroven med brunrøde skælblade. Brandbægeragtige kurve på 1,5-2cm i et smalt aks. VII-VIII. Spredt.

L. glauca (L.) Hoffm. Blågrøn nøkketunge. 50-150cm. Planten glat og blågrøn. Nedre blade 5-25x3-15cm, aflangt ægformede, tilsmalnede i stilken. Kurvene i et tæt aks. VI-VII. Sj. (L. carpatica (Schott & al.) Poj. har svagttandede blade og 6-10-årede randkroner, hvor glauca har helrandede blade og 4-6-årede randkroner - den almindeligste af de 2 former.)

Calendula arvensis L. Agermorgenfrue. 10-20cm. Stærkt grenet enårig. Bladene aflange, helrandede eller svagt tandede. Kurvene 1-2cm brede, gule eller orange med 1 række svøbblade. Randfrugterne 13-20mm, rynkede og stærkt krumme. V-IX. Spredt.

Carlina vulgaris L. Alm. bakketidsel. VII-IX. 3 underarter:
ssp. vulgaris: Bladene aftager hurtigt i størrelse opad. Alm.
ssp. intermedia (Schur) Hayek: Bladene aftager langsomt i størrelse opad. Ydre svøbblade 14-18mm. Oftest flere kurve. Spredt.

ssp. longifolia Nyman: Bladene aftager langsomt i størrelse opad. Ydre svøbblade 18-30mm. Oftest kun 1 kurv.

Carlina acaulis L. Sølvbakketidsel. 5-40cm. Kurvene 4-5cm brede. De indre svøbblade sølvhvide, 3-6cm lange. Dybt fligede blade. VII-IX. Alm.
ssp. acaulis: Stænglen 1-15cm høj. Bladafsnittenes grund bred. Bladskaftet bredt vinget.
ssp. simplex (W.& K.) Nyman: Stænglen 20-40cm. Bladafsnittenes grund smal. Bladskaftet næppe vinget.

C. acanthifolia All. (C. utzka) Gråfiltet bakketidsel. Stængelløs. Bladene ihvertfald filtede nedenunder. Kurven 3-7cm bred; indre svøbblade 3,5-5,5cm, gullige. Blomsterne bleglilla. VII-IX. Sj.

Xeranthemum. Papirsblomst. Enårige med helrandede blade. Inderste svøbblade farvede, kronbladslignende.

X. annuum L. Stor papirsblomst. 15-50cm. Kurvene 3-5cm brede som åbne, indre svøbblade lyserøde, ydre spidse og glatte. VI-VII. Alm.

X. cylindraceum S.& S. But papirsblomst. 15-60cm. Kurvene 8-15mm brede. Indre svøbblade lyserøde, de ydre butte og med en hvidlig plet af tiltrykte hår. VI-VIII. Spredt.

Echinops. Tidselkugle.

1. Kurvstanden 18-20(25)mm bred, blå ..... microcephalus
" 3-7cm bred 2.
2. Kurvstanden blå. De enkelte kurve 12-17mm ..... 3.
" hvidgrå. De enkelte kurve 18-30mm 4.
3. Større blades midterdel 3-8mm bred ..... ritro
" " " 1-3cm " banaticus
4. Stænglen foroven tæt, kort kirtelhåret ..... sphaerocephalus
" uden kirtelhår exaltatus

Echinops sphaerocephalus L. Kirtlet tidselkugle. 50-160cm. Bladoversiden tæt kirteldunet. Ydre svøbblade grå, kirtelhårede forneden. Bladundersiden gråfiltet. Kronen blålighvid. VII-VIII. Alm.

E. exaltatus Schrader Høj tidselkugle. 40-150cm. Bladoversiden sparsomt stivhåret. Kronen hvidgrå. VII-VIII. Spredt. (E. commutatus).

E. banaticus Rochel Blå tidselkugle. 50-120cm. Bladoversiden blødt kirtelhåret og svagt spindelvævsfiltet; undersiden hvidfiltet. Sj.

E. ritro L. ssp. ruthenicus (Bieb.) Nyman Glatbladet tidselkugle. 30-60cm. Bladene 2 x fligede; fligene ikke over 2mm brede. Spredt.

E. microcephalus S.& S. Småhovedet tidselkugle. 40-60cm. Bladene glatte ovenpå, hvidfiltede nedenunder. Kurvene forneden med 1-8 børster på 1-2mm (mindst 5mm hos de andre arter). VII-VIII. Sj. Jud.Constanța.

Arctium. Burre.

1. Kurvstandens hovedgrene halvskærmagtige ..... 2.
" " klaseagtige 3.
2. Kurvsvøbet tæt spindelvævshåret. Indre svøbblade ÷ krog tomentosum
" helt eller næsten glat. Indre svøbblade med krog lappa

3. Blomsterne kortere end svøbbladene. Modne kurve 15-18x15-25mm minus
" ca. lig svøbbladene. Modne kurve 20-25x30-35mm 4.
4. Kurvsvøbet stråfarvet. Kurvstilkene 1-4cm ..... pubens
" grønt eller med lillat skær. Kurvstilke 0-1cm nemorosum

Arctium lappa L. Glat burre. VII-VIII. Alm.

A. nemorosum Lej. Skovburre. VIII-IX. Spredt.

A. pubens Bab. Melet burre.

A. tomentosum Miller Filtet burre. VII-IX. Alm.

Saussurea porcei Degen. Vinget fjældskær. 30-80cm. Stænglen bredt vinget af nedløbende blade. Nedre blade linje-lancetformede, kortstilkede. Valseformede kurve i tæt halvskærm. VII-VIII. M.Rodnei: Corongiş.

S. discolor (Willd.) DC. Tvefarvet fjældskær. 5-35cm. Stænglen uvinget. Bladstilken uvinget. Nedre blade trekantet-lancetformede med afskåret til hjærteformet grund, tæt hvidfiltet underside. VII-IX. Sj.

S. alpina L. Almindelig fjældskær. 5-40cm. Stænglen uvinget. Bladstilken smalvinget. Nedre blade æg- til bredt lancetformede, glatte ovenpå, gråligt spindelvævsfiltede nedenunder. VII-IX. Spredt. 2 underarter:
ssp. alpina: Nedre blade med kileformet grund og jævnt tilsmalnede i stilken.
ssp. macrophylla (Sauter) Nyman: Nedre blade med afrundet eller utydeligt hjærteformet grund og brat tilsmalnede i stilken.

Jurinea. Bisamtidsel.

1. Stænglen med flere kurve, bladet hele vejen. Omv.keglef. kurve 2.
" " 1 kurv, bladet i nedre 1/2. (Halv)kuglef. kurve 3.
2. Kurvene 20-22x5-8mm. Svøbbladene tæt filtede ..... stoechadifolia
" 10-14xca.4mm. " halvglatte linearifolia
3. Svøbbladene ikke tilbagebøjede eller udstående ..... consanguinea
" tilbagebøjede eller udstående 4.
4. Stængelbladene langt nedløbende ..... ledebourii
" ikke " 5.
5. Kurven 4-6(7)cm bred. Ydre svøbblade 2,5-4,5mm brede forneden. Frugterne knudrede ..... glycacantha
Kurven 2-4(4,5)cm bred. Ydre svøbblade 1,5-2,5(3)mm brede forneden. Frugterne længderibbede og glatte mollis

Jurinea linearifolia DC. 10-40cm. Grundbladene 3-8cm x 2-6mm, ofte med omrullet rand, spindelvævsfiltede. VI-VII. Sj. Jud.Constanţa: Nistoreşti.

J. stoechadifolia (Bieb.) DC. 10-50cm. Grundbladene 5-6cm x 2-3mm, med omrullet rand, børstehårede og knudrede ovenpå, spindelvævshårede nedenunder. VII-IX. Sj. Jud.Tulcea: Caugagia.

J. mollis (L.) Rchb. Blød bisamtidsel. 30-70cm. Grundbladene fligede. V-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp. mollis: Kurvene tæt spindelvævsfiltede.

• ssp. transsilvanica (Sprengel) Hayek: Kurvsvøbet m.m. glat, højst lidt filtet til at begynde med.

Jurinea ledebourii Bunge 15-80cm. Bladene fligede, ofte med bølget eller omrullet rand. 1-3 kugleformede kurve på 2-3,5cm. Svøbbladene med krum spids. Nødderne knudrede.

J. consanguinea DC. ssp. arachnoidea (Bunge) Kozuh. 30-70cm. Bladene svagt fligede med lancetformede afsnit, langstilkede. Kurvene 2-4cm brede. Frugterne kirtelhårede og spidsvortede. V-VI. Spredt.

J. glycacantha (S.& S.) DC. Storhovedet bisamtidsel. 30-60cm. Grundbladene svagt fligede, fligene med bølget rand, spindelvævsfiltede ovenpå. Ydre svøbblade stærkt tilbagekrummede, lidt krogspidsede. V-VII.

Carduus. Tidsel.

1. Mellemste svøbblade m.m. indsnørede noget over grunden ..... 2.
" " ikke " 3.
2. Svøbbladene 1,5-2,5mm brede, svagt indsnørede ..... nutans
" 4-8mm brede, stærkt indsnørede thoermeri
3. Indre eller ydre svøbblade krogformet krummede ..... 4.
Svøbbladene rette eller S-formet krummede 5.
4. Stænglen svagt spindelvævsfiltet ..... hamulosus
" hvidfiltet uncinatus
5. Bladundersiden hvidfiltet ..... candicans
" højst spindelvævshåret 6.
6. Stænglen med torne op til kurvene ..... 7.
" uden torne et stykke fra kurven 9.
7. Bladundersiden næsten glat. Tornene kraftige ..... acanthoides
" spindelvævsfiltet. Tornene ret bløde 8.
8. Øvre blade næsten udelte, med afrundet grund ..... personata
Også de øvre blade delte, med tilsmalnet grund crispus
9. Alle blade helrandede, ikke stikkende, svagttornede ..... glaucus
Bladene m.m. delte 10.
10. Nedre blade indtil 1/3 lappede ..... viridis
" " dybt delte 11.
11. Stænglen spindelvævshåret ..... collinus
" m.m. glat 12.
12. Ydre svøbblade S-formet krummede ..... carduelis
" " ikke S-formet krummede kerneri

Carduus nutans L. Nikkende tidsel. Kurvene 4-5cm brede. VI-VIII. Alm.

C. thoermeri Weinm. Bredskællet tidsel. -150cm. Kurvene 6-8cm brede. Kurvene enlige på tornløse stilke. Bladundersiden glat til svagt håret.

C. acanthoides L. Tornet tidsel. VI-IX. Alm.

C. personata (L.) Jacq. Burretidsel. 50-160cm. Kurvene flere sammen. Svøbbladene smalle og lidt S-formet udstående. Stænglen smalvinget. VI-VIII. Alm. Bjærgenge, langs bjærgbække. Som ssp. albidus (Adam.)Kazmi

C. crispus L. Kruset tidsel. VI-VII. Alm.

Carduus hamulosus Ehrh. Krogtidsel. 30-70cm. Kurvene 2,5-4cm brede, enlige. Kurvsvøbbladene mest S-formet krummede, de indre med nedbøjet spids og lilla. VI-VII. Spredt.

C. uncinatus Bieb. Klotidsel. 25-100cm. Bladene tæthårede ovenpå, gråfiltede nedenunder. Kurvene 3-4cm brede, enlige; ydre og mellemste svøbblade m.m. krummede i spidsen. V-VI. Spredt.

C. glaucus Baumg. Blågrøn tidsel. 30-50cm. Kurvene enlige på lange, tornløse stængler. Bladundersiden helt glat, blågrøn; randen med 25-50 par op til 2mm lange hovedtorne. VI-IX. Spredt.

C. viridis A.Kerner 15-60cm. (C. glaucus x carduelis ?)Nær glaucus, men bladene med spredte hår. Ydre og mellemste svøbblade sylformede og tydeligt smallere end de indre. VII-VIII. Sj. 2 underarter:
ssp. viridis: Bladene 2-3cm brede.
ssp. lobulatiformis (Csürös & Nyar.): Mellemste blade 4,5-6,5cm brede. M. Godeanu. (Regnes under C. kerneri i Flora Europaea).

C. candicans W.& K. Rødspidset tidsel. 40-80cm. Kurvene 2-3x1,5-2cm; stilkene indtil 15cm. Kurvsvøbet m.m. spindelvævshåret. VI-VII. Spr.
ssp. candicans: Indre svøbblade ender i en stiv, hindeagtig spids på 4-10x0,2-0,3mm.
ssp. cylindricus (Borbas) Hayek: Indre svøbblade ender i en blød, hindeagtig spids på 2-4x0,5-1mm.

C. collinus W.& K. ssp. glabrescens (Sagorski) Kazmi Skrænttidsel. 50-90cm. Nedre blade indtil 30x9cm; stilken indtil 1/3 x pladen. Stængelbladene med 2-5 par ægformede lapper, tornene indtil 2mm.

C. carduelis (L.) Gren. Lappetidsel. 30-80cm. Stænglen m.m. glat. Bladene næsten uden torne, med 4-7 par ofte ret smalle flige med ru overflade. VII-VIII. Sj. M.Fagaraş.

C. kerneri Simk. Rølliketidsel. 30-70cm. Kurvene 20-25x20-40mm med tæt taglagte svøbblade, disse næsten glatte. Nedre blade indtil 14x3cm med ca. 14 par halvt spydformede lapper. VII-VIII. Alm.

Cirsium. Tidsel.

1. Bladoversiden ru af små torne ..... 2.
" jævn 11.
2. Stænglen vinget ..... vulgare
" uvinget 3.
3. Kurvsvøbbladenes smalle del med en m.m. jævn rand ..... 4.
" " " " 0,5-3mm lange randtorne 5.
4. Mellemste svøbblade smalle over midten, jævnt udvidede mod spidsen ..... ligulare
Mellemste svøbblade ikke eller brat udvidede yderst eriophorum
5. Svøbbladene jævnt tilspidsede udad ..... 6.
" med en bred inderdel og en smal og lang yderdel 7.
6. Svøbbladenes ydre randbørster mindst = svøbbladsbredden ukranicum
" " " kortere end svøbbladsbredden serrulatum

7. Mellemste svøbblade med en over 1,5mm bred spids ..... 8.
" " " " under " " " 9.
8. Svøbbladsspidsen 1,5-3,5mm bred, brun til sortlilla ... grecescui
" 1-2mm bred, rødlilla decussatum
9. Svøbbladenes indre overflade uden børster, randtornene 0,5-1,7mm decussatum
Svøbbladenes indre overflade med børster, randtornene 0,5-3mm 10.
10. Svøbbladenes randtorne 1-2 x svøbbladsbredden ..... boujartii
" " 3-5 x " furiens
11. Stænglen uden blade foroven ..... 12.
" med blade til spidsen 17.
12. De nedre blade m.m. nedløbende ..... 13.
Bladene ikke nedløbende 14.
13. Indre svøbblade med påsat, ægformet spids ..... canum
" " jævnt tilspidsede pannonicum
14. Bladundersiden snehvidt filtet ..... helenioides
" glat til uldhåret 15.
15. Kronerne gule ..... erisithales
" røde 16.
16. Bladene tandede eller lappede, over 10cm brede ..... waldsteinii
" fjerfligede rivulare
17. Stænglen 0-10cm høj ..... acaule
" veludviklet, mindst 10cm høj 18.
18. Alle eller de nedre stængelblade nedløbende ..... 19.
Bladene ikke eller næppe nedløbende 23.
19. Bladundersiden håret ..... 20.
" glat 21.
20. Bladenes torne 2-6mm. Svøbbladene med en længdevulst .. palustre
" " 5-15mm. " uden " creticum
21. Bladtornene 2-4mm. Kurvene 7-10x6-10mm ..... brachycephalum
" 4-9mm. " 12-17x9-13mm alatum
22. Kronen gullig eller hvid ..... 23.
" rød eller lilla 24.
23. Bladene blødtornede ..... oleraceum
Bladtornene kraftige, 10-15mm candelabrum
24. Svøbbladene med udstående spids. Rødlilla blomster waldsteinii
" m.m. tiltrykte. Bleglilla blomster arvense

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Uldtidsel. 60-150cm. Kurven kugleformet 4-7cm bred, stærkt indhyllet i spindelvævshår. Bladene som Horsetidsels. VII-IX.

C. ligulare Boiss. (C. sintenisii) 20-70cm. Mellemste svøbblade med et 1,5-5,5mm bredt ske- eller hjælmformet, m.m. frynset eller laset vedhæng i spidsen. VII-VIII. Sj.

C. grecescui Rouy (C. albidum) Brændetidsel. 50-100cm. Kurven kraftigt uldhåret. VII-VIII. Spredt.

C. decussatum Janka Nedløbende tidsel. 60-150cm. Svøbbladene med ret fjærntsiddende randtorne. Kurven 4-6cm bred, med 5-16 blade under sig. VII-IX.

Cirsium boujartii (Piller & al.) Sch.Bip. Frynsetidsel. 80-120cm. VII-VIII. Spredt.

C. furiens Griseb.& Schenk Rumænsk tidsel. 80-150cm. Kurvene 2,5-3,5 cm brede, i en ret tæt halvskærm. Svøbbladenes randtorne 1,5-3mm, de indre børster indtil 1,8mm. VII-VIII. Spredt.

C. ukranicum Besser 40-50cm. VII-VIII. Sj.

C. serrulatum (Bieb.) Fischer 60-120cm. Kurvene 2-3,5cm brede, i nøgler på korte grene, i halvskærm. Svøbbladenes randtorne 0,2-0,8mm, bløde. VII-VIII. Sj. Jud.Vaslui: Balteni, Fereşti. Jud.Iaşi: Iaşi.

C. vulgare (Savi) Ten. Horsetidsel. VII-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. vulgare: Bladundersiden grøn. Kurvsvøbet ægformet.
ssp. silvaticum (Tausch) Dostal: Bladundersiden grå- til hvidfiltet. Kurvsvøbet m.m. kugleformet.

C. rivulare (Jacq.) All. Engtidsel. 30-120cm. Kurvene mest 2-4 sammen. Stænglen uldhåret eller hvidfiltet foroven. Bladene smalfligede med stængelomfattende øren. Kurvene 15-20x15-20mm. V-VII. Alm.

C. erisithales (Jacq.) Scop. Gul tidsel. 50-150cm. Kurvene 1-3(5) sammen. Stænglen bladløs i øvre 1/3. Bladene blødtornede, dybt og ret smalt fligede. Stænglen foroven samt kurvsvøbet klæbrige. VI-VII. Alm.

C. waldsteinii Rouy Bredbladet tidsel. 50-150cm. Stænglen oftest bladet hele vejen. Bladene urteagtige, blødtornede, bredt ægformede, lappede eller dobbelt tandede. Kurvene 3-8 sammen, m.m. nikkende. Alm.

C. oleraceum (L.) Scop. Kåltidsel. VII-IX. Alm.

C. candelabrum Griseb. Juletræstidsel. 1,5-2m. Glat, stærktgrenet toårig. Bladene bølgede og læderagtige. Kurvene nikkende, 4-12 sammen, hvide eller hvidgule, 14-19mm. VII-VIII. Spredt.

C. acaule Scop. Lav tidsel. VII-IX. Sj.

C. helenioides (L.) Hill Forskelligbladet tidsel. VII-IX. Spredt.

C. pannonicum (L.f.) Link Lancettidsel. 50-80cm. Stænglen forneden smalt og helrandet vinget. Bladene lancetformede, næsten helrandede. Kurvene 1-2cm brede, enlige og langstilkede. VI-VIII. Alm.

C. canum (L.) All. Grå tidsel. 30-70cm. Bladene lancetformede, udelte eller fjerlappede. Kurvene 3-5cm brede, enlige og langstilkede. Indre fnokhår med fortykket spids. VII-IX. Alm.

C. alatum (Gmelin) Bobrov 30-100cm. Bladene læderagtige, groft tandede til fligede. Stænglen med kraftige torne til spidsen. 1-5 kurve, der er kortstilkede eller m.m. siddende. VII-VIII. Sj. Jud.Tulcea.

C. brachycephalum Juratzka Korthovedtidsel. 50-100cm. Bladene smalt lancetformede, udelte til lappede. Ofte mange sammenklumpede kurve. Svøbbladene med en 2-3mm lang, strågul tornspids. VI-VIII. Sj.

C. palustre (L.) Scop. Kærtidsel. VII-IX. Alm.

C. creticum (Lam.) D'Urv. Damtidsel. 50-100cm. Bladene stærkt bølgede

med indrullet rand og kraftige torne. Svøbbladene ægformede med lang spids. VI-VII. Sj.

Cirsium arvense (L.) Scop. Agertidsel. VI-VIII. Alm.

Picnomon acarna (L.) Cass. Tornsvøb. 20-70cm. Enårig med tornet-vinget stængel. Kurvene 1-flere sammen, valseformede, 2-3cm, overrages af de øvre højblade som en slags svøb. VII-VIII. Sj. Jud.Caraş-Severin.

Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter Skelettidsel. 50-100cm. Stænglen uvinget, ofte hvidfiltet. Bladene fligede, hvidribbede, kraftigt tornede. Kurven 3,5-4,5cm bred. Svøbbladene udstående, kraftigt tornspidsede, de ydre med 0-2 par 3-6mm lange torne forneden. VII-VIII. Sj.

Onopordum acanthium L. Æselfoder. Planten hvidfiltet overalt, uden kirtler. VII-VIII. Alm.

O. tauricum Willd. Klæbrig æselfoder. 50-200cm. Planten m.m. klæbrig, ikke filtet. Stænglen gulligbrun. Bladene mørkegrønne. Kurvene 5,5-7cm brede. Svøbbladene 4-7mm brede forneden. VI-VII. Sj.

Serratula. Skær.

1. Ydre svøbblade med et tydeligt, hindeagtigt vedhæng ... bulgarica
   Svøbbladene uden noget tydeligt vedhæng 2.
2. Stænglen med 5-mange kurve ..... 3.
   " " 1(-4) kurve 4.
3. Kurvene 25-30mm. Svøbbladene fløjlshårede ..... wolffii
   " 15-20mm. " med dunet rand tinctoria
4. Grundbladene dybt kamfligede ..... radiata
   " groft savtakkede lycopifolia

Serratula tinctoria L. Engskær. VII-VIII. Alm.

S. wolffii Andrae Stor engskær. 80-150cm. Kurvene klokkeformede. Bladene glatte, dog kort stivhårede på rand og ribber. VIII-IX. Sj.

S. lycopifolia (Vill.) A.Kerner Ethovedet engskær. 25-100cm. Grundbladene bredt lancetformede, undertiden med nogle få nedre flige. Stængelbladene dybt og smalt kamfligede. V-VI. Sj.

S. bulgarica Acht.& Stoj. 40-100cm. Bladene tandede, de nedre lancetægformede; de øverste går over i de tandede svøbblade. Ydre svøbblades vedhæng kølet, bredere end selve svøbbladet. VI. Sj.

S. radiata (W.& K.) Bieb. Kambladet engskær. 40-90cm. 1-4 kurve sammen på 25-30x10-20mm. Indre svøbblade med en noget knæbøjet tornspids. VII-VIII. Spredt.

Leuzea altaica (Fischer) Link (L. salina) Saltknopurt. 60-75cm. Grundbladene 30x15cm, hele eller med 1(-3) par flige ved grunden. Stængelbladene hele. Mellemste svøbblade med et brunt, svagt laset vedhæng med krum spids; indre med et smalt, spidst vedhæng. Rødlilla blomster. V-VI. Sj.

Centaurea. Knopurt.

1. Mellemste svøbblade uden vedhæng. Kronen gul ..... ruthenica
" " " med et vedhæng 2.
2. Svøbbladsvedhænget helrandet, finttandet eller laset ..... 3.
" tydeligt frynset eller med 1-flere torne 7.
3. Nedre og mellemste blade 1-2 x delte ..... 4.
" " " " hele 5.
4. Svøbbladsvedhænget helt klart ..... jankae
" med sort midte alba
5. Vedhænget kort brodspidset. Blomsterne med orange skær rocheliana
" uden brod. Blomsterne uden orange skær 6.
6. Stænglen kortgrenet. Stængelbladene lancetformede ..... jacea
" langgrenet. " linje-lancetformede pannonica
7. Svøbbladsvedhænget med flere torne ..... 8.
" højst med 1 torn 11.
8. Blomsterne gule ..... solstitialis
" røde 9.
9. Kurvene langstilkede. Vedhængets ydre torne indtil 15mm .. pontica
" m.m. siddende. " " " højst 5mm 10.
10. Unge blade grønne og ru. Kurvsvøbet 8-14mm bredt ..... iberica
" " uldhårede. " 6-8mm " calcitrapa
11. Vedhænget ikke nedløbende ad svøbbladet ..... 12.
" nedløbende 26.
12. Blomsterne gule. Vedhænget med en affaldende torn på 2-5mm thracica
Blomsterne røde 13.
13. Bladene linje-lancetformede og helrandede ..... trinervia
Nedre blade lancetformede eller bredere, ofte delte 14.
14. Hele planten grå- eller hvidfiltet ..... degeniana
Bladoversiderne ikke filtede 15.
15. Bladundersiden hvidfiltet. Grundbladene 1 x delte marschalliana
" ej " 16.
16. Vedhænget m.m. trekantet og kortfrynset. M.m. uden fnok ..... 17.
" udtrukket i en lang spids, langfrynset. Mest med fnok 18.
17. Vedhænget højst 2mm, med 6-8 par frynser ..... nigrescens
" over 2mm, med 10-15 par " subjacea
18. De 3 inderste rækker svøbblade med et helrandet, hindeagtigt vedhæng ..... 19.
Kun 1 række indre svøbblade med et sådant vedhæng 20.
19. Svøbbladenes grønne del helt dækket af vedhængene melanocalathia
" " " ikke helt dækket af vedhængene phrygia
20. Stænglen med 1-3 kurve ..... 21.
" oftest med mindst 4 kurve 22.
21. 10-25(40)cm høj. Øvre blade med øret grund. Mest 1 kurv nervosa
(40)60-120cm " . Alle " " tilsmalnet grund rarauensis
22. Vedhænget 1-1,5mm bredt forneden, jævnt tilsmalnet pugioniformis
" højst 1mm bredt forneden 23.
23. Mellemste svøbblades vedhæng 4-7(9)mm lange ..... indurata
" " " 10-30mm " 24.

24. Nedre blade smalt aflange. Vedhænget mest gult ..... simonkaiana
" " ægformede til elliptiske. Vedhænget mest mørkt 25.
25. Vedhænget med 8-12 par frynser, tilbagebøjet ..... stenolepis
" " 12-25 " " , m.m. opret pseudophrygia
26. Svøbbladene med en frynset, mørkebrun eller sortagtig rand
næsten ned til grunden ..... 27.
Svøbbladene uden en så langt nedløbende rand 33.
27. Svøbbladenes frynser kortere end kantens bredde ..... 28.
" " 1-3 x kantens bredde 29.
28. Bladet brat tilspidset, undersiden næsten glat .. maramarosiensis
" jævnt tilspidset, undersiden gråfiltet mollis
29. Svøbbladenes frynser af kantens bredde ..... 30.
" " 2-3 x kantens bredde 31.
30. Kurven 12-15mm bred. Nedre blade lancetformede ..... pinnatifida
" 30-35mm " . " " æg- til aflangt-spatelf. sooana
31. Enårig ..... cyanus
Flerårig 32.
32. Rødderne fortykkede. Ydre kroner røde eller hvide .... napulifera
" ikke fortykkede. Ydre kroner blå triumfetti
33. Mest fågrenede, storkurvede og flerårige. Svøbbladene mest
ikke eller utydeligt ribbede ..... 34.
1-flerårige. Ofte mangegrenede og småkurvede. Svøbbladene
ofte med tydelige ribber 43.
34. Vedhængene dækker stort set svøbbladene ..... 35.
" " ikke svøbbladene 38.
35. Vedhængene ægformede til rundagtige. Kronerne hvide til gule 36.
" m.m. trekantede. Kronerne mest mørkt rødlilla 37.
36. Grundbladene udelte. Kronerne flødefarvede ..... orientalis
" fligede. " gule neiceffii
37. Vedhængets frynser jævnt afsatte. Grundbladene udelte kotschyana
" " brat " . " delte atropurpurea
38. Vedhænget tydeligt og ofte bredt nedløbende. Mest røde kroner 39.
" utydeligt og smalt nedløbende. Gule blomster 42.
39. Indre svøbbladsvedhæng store, hvidlige, med sort midte sadlerana
" " brune eller gule, uden sort midte 40.
40. Kurven 7-10mm bred. Vedhængene 2-4mm ..... stereophylla
" 15-25mm bred. " 0,5-2mm 41.
41. Vedhængene bredt nedløbende, uden brod eller torn ..... scabiosa
" smalt " , med " " " apiculata
42. Nedre blade udelte. Blomsterne bleggule ..... rumelica
" " 1-2 x fligede. Blomsterne rengule salonitana
43. Vedhænget med en torn på 2-5mm ..... 44.
" " " " " 0-1,5mm 51.
44. Vedhængets nedre frynser sammensmeltede til et øre ..... 45.
" " " frie, danner ikke noget øre 47.
45. Bladfligene ca. 0,5mm brede ..... gracilenta
" ca. 1mm brede 46.
46. Kurvsvøbet 10-12x5-7mm. Vedhængets øren meget store .. codruensis
" 7-8x3-4mm tenuiflora

47. Nedre blade 1 x delte. Vedhænget lysebrunt ..... pallida
" " 2 x " 48.
48. Kurvene 8-10mm brede. Blomsterne lyserødt gule ..... triniifolia
" 4-7mm " . " ikke gullige 49.
49. Kurvene 2-3 sammen ..... varnensis
" enlige 50.
50. Bladene hvidfiltede ..... jurineifolia
" grønne diffusa
51. Vedhængets nedre frynser sammensmeltede til et øre ..... 52.
" " " frie, danner ikke noget øre 53.
52. Stængel og blade uldhårede. Vedhænget med brun midte .. arenaria
" " " svagt dunede. Vedhænget ensfarvet brunt ovina
53. Bladene hvidfiltede, de nedre 2 x delte ..... jurineifolia
" højst grågrønt filtede 54.
54. Fnokken ca. så lang som frugten ..... 55.
" kortere end frugten eller mangler 56.
55. Nedre blade 2 x delte. Blomsterne lyserødt gule .... triniifolia
" " 1 x " . " ikke gullige affinis
56. Fnokken 0-1mm. Nedre blade 1 x delte ..... 57.
" 1-3mm. " " mest 2 x delte 58.
57. Nedre blade spindelvævshårede med aflangt-lancetformede flige
Kurvene enlige ..... reichenbachii
Nedre blade glatte eller svagt filtede, med 1mm brede flige
Kurvene 2-3 sammen calvescens
58. Vedhænget med en brod på 0,3-0,5mm. Kurven ca. 13mm .... rhenana
" " " " " 0,5-1mm. Kurven 11mm biebersteinii

Centaurea ruthenica Lam. Kambladet knopurt. 100-150cm. Bladene 20-25 x 10-13cm, mørkegrønne, glatte, smalfligede. Kurven 1-2cm bred. Svøbbladene 1/2mm bredt hindekantede nær spidsen. Lysegule blomster. VI-VII. Sj. Jud.Cluj: Boju - Iuriu de Cimpie. Jud.Brasov: Barcuț.

C. jankae Brandza 30-100cm. Bladene 1 x delte. Kurvene 20-25x20mm. Svøbbladsvedhænget består af en bred hindekant, der er helrandet eller laset. Rødlilla blomster. Fnokken 2 x frugten. VI-VII. Sj. Jud.Constanța: Palazu Mic.Tariverde - Mihai Viteazu. Jud.Tulcea: Jurilovca la Capul Dolojman, Babadag - Caugagia.

C. salonitana Vis. Svovlknopurt. 20-100cm. Nedre blade 1-2 x delte med m.m. lancetformede flige. Kurven 15-20mm bred. Vedhænget med en torn på indtil 3mm, frynserne ca. 1mm. Fnokken 7-9mm, rødlig. VI-X. Sj.

C. rumelica Boiss. 30-50cm. Øvre blade lyreformede. Kurven 17-20mm bred. Vedhængene langt tilspidsede. Frugten 3 x fnokken.

C. orientalis L. Brodknopurt. 80-150cm. Bladene halvglatte, ru; nedre stængelblade fjersnitdelte. Vedhængene lysebrune med brun midte; frynserne 1-3mm. VI-IX. Alm.

C. neiceffii Degen & Wagner -100cm. Bladene halvglatte ru; stængelbladene fjersnitdelte med langt endeafsnit. Kurven 10-15(20)mm bred. Vedhænget mørkebrunt. Frynserne ca. 4mm.

Centaurea atropurpurea W.& K. Purpurknopurt. 80-200cm. Bladene 1(2) x delte, fligene 2-3(20)mm brede. Kurven 20-30mm bred. Vedhænget mørkebrunt med hvidlige frynser. Kronen sj. gul. VI-VII. Spredt.

C. kotschyana Heuffel Pelsknopurt. 25-80cm. Stænglen mest ugrenet. Stængelbladene lyreformede. Kurven 2-3cm bred. Vedhænget mørkebrunt eller sort med hvidspidsede frynser på 3-5mm. VIII-IX. Alm.

C. scabiosa L. Stor knopurt. VI-X. Alm.

C. sadlerana Janka Hvidkantet knopurt. 60-80cm. Kurven 16-18mm bred. Mellemste svøbbladsvedhæng brune med hvide frynser. VI-VIII. Sj.

C. apiculata Ledeb. Sylknopurt. 50-150cm. 2 underarter:
ssp. spinulosa (Rochel) Dostal: -150cm. Vedhænget med en torn på 3-5mm samt 8-12 par 1-2mm lange frynser. Rødlilla kroner, de ydre større.
ssp. adpressa (Ledeb.) Dostal: 50-80cm. Vedhænget med en torn på 0-2mm, frynserne 0-0,5mm. Lyserøde, ret ens kroner.

C. stereophylla Besser 50-100cm. Risformet grenet foroven. Vedhængene trekantet-lancetformede, brune, kort og smalt nedløbende, kort kamfrynsede, mest med en torn indtil 2mm. Blomsterne mest blegrøde. VI-VIII.

C. thracica (Janka) Hayek 50-100cm. Bladene læderagtige, nedløbende, de nedre høvlfliget lyreformede. Kurven ca. 2cm bred. Mellemste svøbblades vedhæng kort og lancetformet. VI-VIII. Sj. Østlig.

C. pallida Friv. 30-100cm. Bladene ru, tiltrykt hvidfiltede, undertiden senere glatte; nedre lyreformede. Kurvsvøbet 10-12x6-7mm. Vedhænget med 5-8 par frynser og en torn på ca. 2,5mm. VII-IX. Sj.

C. jurineifolia Boiss. 30-80cm. Kurvene 12-13x6-7mm. Vedhængene ret mørkebrune, små og trekantede med 3-6 par frynser. Fnokken meget kort eller manglende. VI-IX. Spredt.

C. varnensis Velen. 35-80cm. Bladene hvidt spindelvævsfiltede. Kurvene 8-10x4-5mm. Svøbbladene med fremtrædende ribber. Vedhænget med 4-7 par frynser. Lyserøde blomster. VII-IX. Jud.Tulcea: Nicolae Balcescu.

C. affinis Friv. Spættet knopurt. 20-80cm. Bladene grågrønne; stængelbladene lyreformede. Kurvene 12-15x8-12mm. Vedhænget sort, 2-3mm bredt og med 6-8 par frynser. Lyserøde blomster. VII-VIII. Sj.

C. arenaria Bieb. ssp. borysthenica (Gruner) Dostal Sandknopurt. 50-80 cm. Bladene ru og uldhårede. Kurven 9-12x5-6mm. Vedhænget gult eller lysebrunt med brunlig midte. Lyslilla blomster. VII-X. Spredt.

C. ovina Pallas ssp. besserana (DC.) Dostal Fåreknopurt. 25-50cm. Kurvene 10-12x5-6mm. Svøbbladene med 3 ribber. Østlig.

C. tenuiflora DC. 30-50cm. Bladene grønne, tiltrykt spindelvævsfiltede, de nedre 2 x delte med 1mm brede flige. Kurvene flere sammen. Vedhænget mørkebrunt med hvide frynser. Lyserøde blomster. VI-VIII.

C. codruensis Prodan 30-50cm. VI-VIII. Jud.Galaţi: Meria langs Prutului.

Centaurea gracilenta Velen. (C. kanitziana) 15-50cm. Stænglen med mange lange grene. Bladene ru, grågrønne. Kurvene 9-11x4-6mm. Vedhænget brunt med 4-6 par frynser og en torn på ca. 2mm. VI-VIII. Spredt.

C. rhenana Bor Mangegrenet knopurt. 40-100cm. Kurvene i halvskærm, ca. 13x8(-10)mm. Vedhænget med sort midte og en brod på ca. 0,5mm samt 6-8 par frynser. Fnokken ca. 1/2 x frugten. VI-IX. Alm.

C. triniifolia Heuffel Gulrød knopurt. 80-120cm. Stænglen stærktgrenet fra midten. Nedre blade 2 x delte, fligene ca. 1mm brede. Kurvene ca. 14x8-10mm. Vedhænget sort med 6-8 par frynser. VI-VII. Sj.

C. reichenbachii DC. (C. reichenbachioides) Rumænsk knopurt. 30-50cm. Kurvene ca. 13x10mm. Vedhænget sort med 4-6 par frynser på 1-2mm og en tornet spids på 0,5mm. VI-VII. Sj. Fnokken mangler.

C. calvescens Pancic Riddersporeknopurt. 60-150cm. Stærktgrenet. Kurvene 10-13x6-8mm. Vedhænget brunt med en torn på 1,5mm. Blegrøde blomster. Fnokken 0-1mm. VI-VIII. Sj.

C. biebersteinii DC. (C. micranthos) Småhovedet knopurt. 40-70cm. Kurven 5-7mm bred. Vedhænget med 4-6 par brune eller hvidlige frynser. Fnokken ca. 1/3 x frugten. VI-IX. Alm.

C. diffusa Lam. Udspærret knopurt. 30-60cm. Stærkt udspærret grenet. Kurvene 7-10x4-5mm. VI-VIII. Spredt.

C. iberica Trev. Grøn stjærnetidsel. 40-80cm. Toårig. Nedre blade høvlfligede til lyreformede. Vedhænget hindeagtigt med en endetorn på 15-30mm. Blomsterne mørkt rødlilla. Fnokken 2-2,5mm. VII-IX. Spredt.

C. calcitrapa L. Stjærnetidsel. 30-80cm. Nær foregående. Vedhængets endetorn 10-18mm. Blomsterne blegt rødlilla. Ingen fnok. VI-IX. Spredt.

C. pontica Prodan & Nyar. Stilket stjærnetidsel. Nær foregående. Kurvene 16-18x10-12mm. Vedhængets endetorn indtil 30mm. Ingen fnok. Sandstrand. Jud-Tulcea: Sulina.

C. solstitialis L. Tornet knopurt. 30-100cm. Oftest gråfiltet toårig. De nedre blade oftest lyreformede, de øvre smalle og nedløbende. Kurvene 7-12mm brede med 10-15mm lange endetorne. VI-X. Alm.

C. alba L. ssp. caliacrae (Prodan) Dostal (C. euxina) Rasleknopurt. 30-40cm. Stænglerne udstrakte. Kurvene 6-7mm brede. Vedhænget rundagtigt og hindeagtigt og med en brod. VI. Jud.Constanţa: Mangalia.

C. rocheliana (Heuffel) Dostal Sortåret knopurt. 60-100cm. Ligner jacea, men stængelbladene bredt lancetformede. Kurvene mere kugleformede. Vedhængene 5-6mm brede, dækker de tydeligt ribbede svøbblade. Alm.

C. pannonica (Heuffel) Simonkai Smalbladet knopurt. Alm.

C. jacea L. Almindelig knopurt. VI-XI. Alm.

C. subjacea (G.Beck) Hayek Alm.

C. nigrescens Willd. Sortspættet knopurt. 40-100cm. Kurvene 12-14 x 10-11mm. Vedhænget 1-1,5mm, trekantet, sortbrunt med lysebrune frynser.

Centaurea phrygia L. Engknopurt. 40-100cm. Kurvene 15-18x14-16mm. Vedhænget mørkebrunt til sortagtigt, ægformet og jævnt tilsmalnet i trådspidsen. Blomsterne rødlilla. VII-X. Alm.

C. melanocalathia Borbas 60-120cm. Nær foregående, men vedhænget helt sort. Blomsterne mørklilla. VII-IX. Spredt.

C. pseudophrygia C.A.Meyer Fjerknopurt. 25-80cm. VII-X. 2 underarter:
ssp. pseudophrygia: Kurvene 12-15mm brede. Vedhænget lysebrunt, lidt tilbagebøjet. Fnokken ca. 1mm. Alm.
• ssp. retezatensis (Prod.) Dostal: Kurvene 10mm brede. Vedhænget mørkebrunt og opret. Fnokken ca. 2mm. M.Retezat.

C. rarauensis Prodan (C. carpatica) 60-120cm. Med 1-3 kurve. Bladene bredt ægformede til elliptiske, spindelvævsfiltede. Vedhænget mørkebrunt, m.m. opret. VI-VIII. Spredt. M.Maramureş, M.Rodnei, M.Rarau, M. Calimani, M.Bistriţei, M.Giurgeu, M.Bodoc.

C. stenolepis A.Kerner Smalskællet knopurt. 30-100cm. Kurvene 12-14mm brede. Vedhænget blegt gult eller gulbrunt, kortfrynset. VII-IX. 2ssp:
ssp. stenolepis: M.m. grøn eller svagt spindelvævshåret. Bladene æglancetformede eller elliptiske. Kurvene ægformede. ?
ssp. bansagensis Wagn.: Tydeligt spindelvævsfiltet. Bladene lancetformede eller elliptiske. Kurvene æg-valseformede. Alm.

C. indurata Janka Ugleknopurt. 50-100cm. Bladene gråt spindelvævshårede. Kurven 15x8-10mm. Vedhængene dækker ikke kurven helt, mørkebrune med sort grund og 8-12 par frynser,med nedbøjet spids. VII-VIII. Spredt

C. nervosa Willd. Frynseknopurt. 10-25cm. Bladene tandede eller bugtet-tandede. Kurven 18-20mm bred. Vedhængene sortebrune med tilbagebøjet spids og 20-30 par frynser. Fnokken 0,5-1mm. VIII-IX. Alm. Alpin.

C. simonkaiana Hayek 50-70cm. Øvre blade lancet- eller æg-lancetformede, helrandede, nedre bugtet-tandede eller lappede, 1-2cm brede. Kurvene 10-12mm brede. Fnokken ca. 0,5mm. VII-VIII. Sj. Jud.Arad.: Covaşinţ, Pauliş, Miniş, M.Zarandului (V.Cladovci, Dl.Highiş), Gurahont,Chişindia

C. pugioniformis Nyar. 40-60cm. Bladene grønne, glatte eller rut dunede, højst svagt spindelvævshårede. VII-VIII. Alm.

C. degeniana H.Wagner 50-70cm. Bladene aflange til elliptiske. Kurven 15mm bred. Vedhængene smalt trekantede, brune, 1-1,5mm brede ved grunden, med mange frynser. VII-X. Sj.

C. marschalliana Sprengel 20-30cm. Stænglerne udstrakte. Kurvene 10-15 mm brede. Vedhænget aflangt, brunt, med 3-4 par frynser. Nedre og øvre stængelblade udelte, de midterste lyreformede. V. Sj.

C. trinervia Stephan Treåret knopurt. 30-50cm. Stænglerne bladløse foroven. Bladene tydeligt 3-strengede, helrandede og spidse. Kurvene 6-10x12-15mm. Vedhænget uregelmæssigt kamformet-frynset. VI-VII. Spr.

C. mollis W.& K. Blød knopurt. 40-80cm. Bestanddannende. Bladene lidt stive. Kurven 12-18mm bred, ægformet. Fnokken 1-1,5mm, hvid. VI-VIII.

Centaurea maramarosiensis (Jav.) Czerep. Som den foregående, men bladene tynde og bløde. Kurven 10-14mm bred, lidt valseformet. Fnokken 1,5-2 mm, rødlig.

C. pinnatifida Schur Lav knopurt. 10-20cm. Med krybende jordstængel. Bladene udstående, gråfiltede ovenpå, de nedre langt tilspidsede. Fnokken 1,5-2mm. Alm.

C. sooana (Borhidi) Soó Nær foregående. M.Ceahlau.

C. triumfetti All. Fløjlsknopurt. 5-40cm. Bladene gråfiltede, ihvertfald på undersiden. 4 underarter. VI-VIII. Alm.
ssp. aligera (Gugler) Dostal: Nedre blade aflange til bredt lancetformede, bugtede eller lyreformede. Kurven 15-20mm bred. Vedhængets rand 2mm bred. Frynserne mørkebrune med hvid spids.
ssp. stricta (W.& K.) Dostal: Bladene smalt lancetformede, mest helrandede. Kurven 18-25mm bred. Vedhængets rand 0,7mm. Frynserne som hos alig.
ssp. angelescui (G.Grinț.) Dostal: Nedre blade aflangt-lancetformede, helrandede eller fjærnt bugtet-tandede. Kurven 10-12mm bred. Vedhængets rand 1-2mm bred. Frynserne lyst gulbrune. Stænglen med 2-3 lange grene.
ssp. adscendens (Bartl.) Dostal: Bladene smalt lancetformede og helrandede. Kurven 10-12mm bred. Vedhængets rand 0,3mm bred. Frynserne lysebrune. Stænglen ugrenet.

C. napulifera Rochel Knoldknopurt. 1-10cm. Kurven 8-14mm bred. Vedhængets frynser sølvspidsede. IV-V. Sj. Østlig. 2 underarter:
ssp. napulifera: Bladene spindelvævshårede og kirtlede. Vedhængets rand 0,5mm bred. Ydre blomster rødlilla eller lyserøde.
ssp. thirkei: Bladene gråfiltede. Vedhængets rand 1-2mm bred. Ydre blomster hvidlige, sjældent rødlilla.

C. cyanus L. Kornblomst. VII-IX. Alm.

Crupina vulgaris Cass. Alm. krybefrø. 20-50cm. Slank enårig. Bladene 1 x delte smalfligede og fint skarpttandede. Tenformede kurve med 3-5 rødlilla blomster i en åben og langstilket stand. VI-VIII. Spredt.

Chartolepis glastifolia (L.) Cass. Vajdknopurt. 50-150cm. Flerårig med bredvinget stængel. Bladene indtil 30cm, aflangt-elliptiske, spindelvævsuldne med siddende, gule kirtler. Svøbbladene med et rundt, laset, klart vedhæng med brun grundplet. Gule blomster. VI-VIII. Jud.Buzau: Buzau - Pogoanele, Tinteşti, Pad.Frasinu, Gomoeşti, Lipia, Pietrosu, Stilpu.

Carthamus lanatus L. Gul svøbtidsel. 30-60cm. M.m. ulden-lådden enårig. Bladene tidselagtige, fjerfligede. Kurvene enlige med gule kroner og tornet fligede højblade omkring sig. VII-VIII. Spredt.

Scolymus hispanicus L. Almindelig gyldenrod. 20-80cm. 2-flerårig. Planten med stærkttornede stængler og blade ligesom en tidsel, men med gule, cikorielignende blomster. VI-IX. Sj.

Cichorium intybus L. Cikorie. VII-IX. Alm.

Aposeris foetida (L.) Less. Skovstinksalat. 5-25cm. Rosetplante med stinkende mælkesaft. Bladene fjersnitdelte med næsten rudeformede afsnit.

Kurvstilkene 1-blomstrede. 1 række svøbblade.

Hypochoeris. Kongepen.

1. Stænglen glat (evt. stivhåret forneden). 2 rækker fnokhår ..... 2.
" stivhåret. 1 række fnokhår 3.
2. Randkronerne længere end svøbet. Randfrugterne med næb .. radicata
" så lange som " . " uden " glabra
3. Stænglen ikke særligt (under 5mm) fortykket under kurven maculata
" stærkt (8-15mm) fortykket under kurven uniflora

Hypochoeris maculata L. Plettet kongepen. VI-VIII. Alm.

H. uniflora Vill. Enblomstret kongepen. 15-50cm. Stænglen 1-blomstret og tæt gråfiltet. Ydre og mellemste svøbblade sortuldne, med laset-frynset rand. Kurven stor, op til 6cm bred. VII-VIII. Spredt.

H. glabra L. Glat kongepen. VI-IX. Sj.

H. radicata L. Alm. kongepen. V-VII. Alm.

Leontodon. Borst.

1. Kurvsvøbbladene sortrandede. Ydre frugter med en fnok af små skæl ..... taraxacoides
Svøbbladene ikke sortrandede. Alle frugter med fjerformet fnok 2.
2. Griflen grønlig. Stænglerne grenede. 1 række fnokhår .. autumnalis
" gul. Stænglerne mest ugrenede. 2 rækker fnokhår 3.
3. Svøbbladene med lange sorte hår samt korte hvide ..... 4.
" uden " " " 5.
4. Ihvertfald de indre blade høvlfligede til lappede pseudotaraxaci
Bladene helrandede eller finttandede croceus
5. Bladene kun med alm. hår. Ydre kroner med sortspidsede tænder repens
Bladene med grenhår eller glatte. Kronerne uden sortspids. tænd. 6.
6. Roden skæv og afskåret. Randkronernes yderside mest rødlig hispidus
Lodret pælerod. Randkronernes yderside gul crispus

Leontodon croceus Haenke Orangegul borst. 5-25cm. Stænglen med 2-4 skæl. Kronerne orangegule og ensfarvede. VII-VIII. Spredt. 2 ssp.:
ssp. croceus: Bladene 2,5-17cm x 5-20mm, finttandede, med spredthåret underside.
ssp. rilaensis (Hayek) Finch & Sell: Bladene 2,5-7cm x 3-8mm, helrandede og glatte. M.Birsei, M.Bucegi, M.Iezer, M.Fagaraş, M.Capaţinii.

L. pseudotaraxaci Schur Karpatisk borst. 5-20cm. Med gullig fnok. Spr.

L. autumnalis L. Høstborst. VII-IX. Alm.

L. repens Schur 25-45cm. Bladene 9-23cm, mørkegrønne, næsten helrandede til bugtet-finttandede, næsten glatte ovenpå. Randkronerne med brunlig yderside.

L. hispidus L. Stivhåret borst. VI-X. Alm.

L. crispus Vill. (L. asper) Kruset borst. 20-40cm. Bladene med talrige

langstilkede 2-6-grenede hår. Svøbet med stive alm. hår eller lange tvekløvede hår. V-VII. Spredt.

Leontodon taraxacoides (Vill.) Merat Hundesalat. VI-VII. Sj.

Picris echioides L. Vingekurv. 40-60cm. Stærkt stivhåret enårig. 2 rækker svøbblade: de 5 ydre store og ægformede og dækker næsten de 8 indre. Børsterne ofte med hvidknudret grund. VII-IX. Sj.

P. hieracioides L. Ru bittermælk. VII-IX. Alm. 4 underarter:
ssp. grandiflora (Ten.) Arc.: Kurvsvøbet tæt sorthåret (eneste ssp.)Alm.
ssp. spinulosa (Bertol.) Arc.: Kurvene meget kort stilkede, de sidestillede m.m. siddende (eneste ssp.). Spredt.
ssp. hieracioides: Stænglen børstehåret hele vejen. Alm.
ssp. crepoides (Sauter) Simk.: Stænglen kun børstehåret forneden, ellers glat. Bladoversiden også glat. Bladene ofte helrandede. Alm.

Scorzonera. Svinerod.

1. Bladene fligede ..... 2.
" helrandede 3.
2. Flerårig med golde skud. Stænglen furet foroven ..... cana
1-2-årig uden " " . " ikke furet laciniata
3. Blomsterne lyslilla ..... 4.
" gule 5.
4. Bladene 3-7mm brede, flade, næppe kølede ..... rosea
" 1-3mm " , furede og kølede purpurea
5. Stængelgrunden trævlet ..... austriaca
" ikke trævlet 6.
6. Planten m.m. håret over det hele ..... 7.
" overvejende glat 8.
7. Kurvsvøbet 18-27mm i blomst. Fnokken smudsighvid ..... mollis
" 10-15mm " " . " blegt rødbrun lanata
8. Kurvene højst 2cm brede. Randkronerne af svøbets længde parviflora
" 3-4cm brede. Randkronerne 2 x svøbets længde 9.
9. Stænglen mangebladet med flere kurve ..... hispanica
" med 0-3 blade og 1(-3) kurv humilis

Scorzonera cana (Meyer) Hoffm. Flerårigt fodfrø. 10-40cm. Planten halvglat til løst filtet. Bladfligene linjeformede. Frugten med en bleg, rørformet grund på 1/3 af frugten. Kronerne 1,5-2 x svøbet. V-IX. Alm.

S. laciniata L. Enårigt fodfrø. 10-50cm. Som foregående, men kronerne lig kurvsvøbet. V-VII. Spredt.

S. purpurea L. Purpursvinerod. 20-30cm. Stængelgrunden tæt trævlet. Kurvsvøbet 15-25mm med 10-16 svøbblade. Kronerne bleglilla. Frugterne 10-12mm, jævne. V-VI. Spredt.

S. rosea W.& K. Rosensvinerod. 25-40cm. Stængelgrunden tæt trævlet. 15-20 kurvsvøbblade. Kronerne lyst rødlilla. Frugterne 10-15mm, ru mod spidsen. VII-VIII. Alm.

S. mollis Bieb. Blød skorsoner. 5-30cm. Med rodknold. Bladene 4-20cm x 2-8mm, græslignende, undertiden bølgede. Kurvsvøbet 18-30mm. Frugten

13-20mm, med en bleg, rørformet grund. VI-VII. Sj.

Scorzonera austriaca Willd. Trævlet svinerod. 10-35cm. Bladene blåliggrønne, ofte med bølget rand, glatte til uldhårede. Kurvsvøbet til sidst kantet; ydre svøbblade butte, hvidkantede hele vejen. V-VI. Spr.

S. humilis L. Lav svinerod. 10-40cm. Svøbbladene røde mod spidsen, de ydre som hos austriaca. Frugten 7-11mm, med jævne ribber. V-VII. Sj.

S. parviflora Jacq. Småblomstret svinerod. 20-40cm. Bladene linje-lancetformede, 5-15mm brede. Stængel og kurvsvøb glatte. Kronerne voksgule. Fugtige, salte enge. V-VII. Spredt.

S. hispanica L. Sortrod. 40-100cm. Nedre blade stilkede, mellemste og øvre omskedende. Frugten 10-15mm, de ydre med ru, de indre mest med jævne ribber. VII-VIII. Alm.

S. lanata (L.) Hoffm. Uldhåret svinerod. 3-22cm. Med rodknold. Bladene 3-10cm x 1-5mm. Kurvsvøbet 10-15mm. Randkronerne 1-1¼ x svøbet, rødlige udvendigt. Planten m.m. silke-uldhåret. V-VI. Jærnporten.

Tragopogon. Gedeskæg.

1. Kronerne lilla ..... 2.
" gule 4.
2. Kurvstilken ikke oblæst foroven. 4-5 kurvsvøbblade ... balcanicus
" opblæst foroven. Mest 8 " 3.
3. Kronerne ca. 1/2 x kurvsvøbet ..... sinuatus
" ca. lig kurvsvøbet porrifolius
4. Stænglen fortykket under kurvsvøbet ..... dubius
" ikke fortykket foroven 5.
5. Frugtens næb 0-3mm ..... 6.
" " højst lidt kortere end frugten 7.
6. Bladranden bølget. Kronen bleggul ..... floccosus
" mest flad. Kronen gul brevirostris
7. Frugtens næb ca. 1 x frugten ..... pratensis
" " 1,5-3 x " hayekii

Tragopogon porrifolius L. Havrerod. 30-125cm. Glat. Kronerne lilla. Næbbet brat udvidet i selve frugten. VI-VII. Dyrket og forvildet.

T. sinuatus Ave-Lall. (T. porrifolius ssp. australis) Kortkronet havrerod. 20-50cm. Ofte fintdunet. Kronerne mørklilla. Næbbet gradvist udvidet i frugten. VI-VII. Sj.

T. balcanicus Velen. 15-60cm. Kronerne ca. = svøbet. Næbbet tydeligt kølleformet, ca. = frugten. Fnokken ca. = frugten. VII-VIII. Sydvest.

T. dubius Scop. Storfrugtet gedeskæg. 25-50cm. Øvre stængelblade med opblæst grund. Kronerne meget kortere end de 8-12(5-18) svøbblade. Næbbet ca. = frugten, denne 25-35mm med næb. V-VII. Alm.

T. pratensis L. Enggedeskæg. 2 underarter:
ssp. pratensis: Kronerne bleggule. Kurven ca. 3cm bred. VI-VIII. Spr.
ssp. orientalis (L.) Celak.: Kronerne gyldengule. Kurven 4-6cm bred. V-IX. Alm.

Tragopogon hayekii (So6) Richardson Stænglen grenet. Kronerne gyldengule, længere end svøbbladene.

T. brevirostris DC. Sandgedeskæg. -60cm. Toårig. Ofte grenet forneden. 5-8(10) svøbblade. Frugten uden næb.

T. floccosus W.& K. Filtet gedeskæg. 20-50cm. Stænglerne grenede, m.m. uldhårede. 8 svøbblade af kronernes længde. Frugten 23-35cm, næbbet 1-3 mm. Fnokken 1-1,5cm. Flodsand. VI-VII. Sj.

Sonchus asper (L.) Hill Ru svinemælk. VII-IX. Alm.

S. oleraceus L. Alm. svinemælk. VI-VIII. Alm.

S. paluster L. Kærsvinemælk. VII-IX. Spredt.

S. arvensis L. Agersvinemælk. VI-IX. VII-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. arvensis: Kurvstilke og -svøb med store kirtelbørster.
ssp. uliginosus (Bieb.) Nyman: Kurvstilke og -svøb glatte.

Cephalorhynchus tuberosus (Steven) Schchian Knoldsalat. 30-50cm. Stænglen kirtelhåret. Bladene fligede med tandede lapper. Kurvsvøbet 10-13 mm, valseformet, glat eller med få kirtelhår. Frugterne sortbrune, 6-8 mm. Med rodknolde. VI-VII. Sj. Jud.Mehedinţi. (Lactuca glandulosa).

Lactuca. Salat.

1. Kronerne blå ..... 2.
" gule 3.
2. Bladafsnittene trekantede. Frugten grønligbrun ..... tatarica
" smalle. Frugten sort perennis
3. Stænglen kirtelhåret forneden ..... aurea
" glat eller med børster forneden 4.
4. Stænglen grøn eller rødligt anløben ..... quercina
" benhvid 5.
5. Kurvene mest 5-blomstrede ..... viminea
" med 10-16 blomster 6.
6. Bladgrunden hjærteformet omfattende ..... sativa
" pilformet omfattende 7.
7. Stængelbladene linjeformede og helrandede ..... saligna
" aflange til omvendt ægformede 8.
8. Frugten sort. Bladene vandret stillede ..... virosa
" brunliggrøn. Bladene ofte lodret stillede serriola

Lactuca viminea (L.) J.& C.Presl Rissalat. 30-60cm. Nedre blade dybt og smalt fjersnitdelte; alle med 2 linjeformede, 1-2cm lange, nedløbende øren. Kurvstanden ofte stærktgrenet. VII-VIII. Spredt.

L. tatarica (L.) C.A.Meyer Strandsalat. VI-IX. Sj.

L. quercina L. Lundsalat. 60-120cm. Planten minder om Skovsalat, men kan kendes på de mindst 8-blomstrede kurve. Kurvsvøbet lillaprikket.
ssp. quercina: Stængelbladene fligede med finttandede flige. VI-VIII.
ssp. chaixii (Vill.) Celak.: Stængelbladene hele og spidstandede.

L. aurea (Sch.Bip.) Stebbins (L. sonchifolia) 40-80cm. Kirtelsalat.

Halvglat eller m.m. tæt og langt kirtelhåret. Nedre blade indtil 30x15 cm med stort, trekantet endeafsnit og oftest 2 par sideflige. Kurvene 12-15mm. VI-VII. Sj. Jud.Caraș-Severin: Baile Herculane.

Lactuca serriola L. Tornet salat. VII-VIII. Alm.

L. sativa L. Havesalat. 30-100cm. Bladene bløde. Stængelbladene udelte. VII-VIII. Dyrket og sj. forvildet.

L. saligna L. Pilsalat. 30-60cm. Kun de nederste blade med smalle sideflige. Kurvene i en smal klase. VII-VIII. Alm.

L. virosa L. Giftsalat. 50-150cm. Bladene omvendt ægformede til aflange, mest udelte, sjældnere lappede, med finttandet rand. Kurvene i en lang, pyramideformet top. VII-IX. Sj.

L. perennis L. Blå salat. 30-60cm. Glat med smalfligede, blågrønne blade. Kurvene 3-4cm brede. Frugten 3 x så lang som bred. V-VI. Spredt.

Cicerbita alpina (L.) Wallr. Fjældsalat. 60-140cm. Planten stærkt kirtlet foroven med rødlige kirtelhår. Blomsterne blålilla. Bladene næsten glatte, de nedre med 2 par sidelapper. VII-IX. Spredt.

Prenanthes purpurea L. Rød nikkesalat. 50-150cm. Bladene glatte med blågrøn underside, elliptiske, fjærnt tandede, stængelomfattende. Mange fåblomstrede, m.m. nikkende kurve i en stor top. VII-IX. Spredt.

Mycelis muralis (L.) Dum. Skovsalat. VI-VIII. Alm.

Taraxacum. Mælkebøtte.

1. Fnokken grumsethvid. Kurvsvøbet tit brunt til rødligt ..... 2.
" renhvid 3.
2. Kurvene 15-20mm brede. Linje-lancetformede blade ..... bessarabicum
" 30-40mm " . Omvendt æg-lancetformede blade serotinum
3. Ydre svøbblade med meget bred hindekant. Smalbladet ..... palustre
" svøbblades hindekant højst 1/4 af svøbbladets bredde 4.
4. Frugterne rødlige ..... 5.
" uden rødligt anstrøg 6.
5. Ydre svøbblade med skarpt afsat hindekant ..... erythrospermum
" " uden " " " hoppeanum
6. Kronerne mørke- til orangegule. Subalpine og alpine planter ..... 7.
" gule 8.
7. Kurvsvøbet mørkt, ofte lillat og blådugget ..... nigricans
" grønt fontanum
8. Ydre svøbblade udstående til hængende ..... officinale
" " tiltrykte. Alpin plante apenninum

Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. Saltmælkebøtte. Bladene noget kødede, grå- eller rødliggrønne, glatte, lancetformede, groft tandede. Ydre svøbblade ofte med rødligt skær. VII-VIII. Spredt.

T. serotinum (W.& K.) Poiret Høstmælkebøtte. 5-20cm. Bladene læderagtige, brunligt grågrønne, først med gråfiltet underside. Kronerne guloran-ge. VII-X. Spredt.

Taraxacum palustre Smalbladet mælkebøtte. IV-VI. Spredt.

T. apenninum (T. alpinum) Alpemælkebøtte. Frugtens næb ca. 1-1,25 x frugten, 4-5mm langt. VII-IX. Alm.

T. nigricans Rank mælkebøtte. Ydre svøbblade små, m.m. trekantede. Bladene oprette. Frugterne stråfarvede (lysegrå til blegorange). Alm.

T. fontanum Kildemælkebøtte. Bladene mest udelte og tungeformede, stilken bredvinget. Ydre svøbblade tydeligt hindekantede. VII-IX. Spredt.

T. erythrospermum (T. laevigatum) Rødfrugtet mælkebøtte. IV-VI. Spredt

T. hoppeanum 5-15cm. Bladene tiltrykte jorden, bleggrønne, dybt indskårne eller savtakkede, med trekantede lapper. Ydre svøbblade med tydelige fortykkelser og tynd, hvid rand. IV-VI. Spredt.

T. officinale Fandens mælkebøtte. IV-VI. Alm.

Chondrilla juncea L. Riskurv. 50-100cm. Grågrøn 2-flerårig, stærkt risagtigt grenet plante med oprette grene, stivhåret forneden. Øvre blade lange og linjeformede. Talrige, smalt cylindriske kurve, 1-4 sammen, 9-12x2,5-5mm. VII-IX. Alm.

Lapsana communis L. Haremad. VI-VIII. 2 underarter:
ssp. communis: Randkronerne højst 1,5 x svøbet. Alm.
ssp. intermedia (Bieb.) Hayek: Randkronerne ca. 2 x svøbet. Bladenes sidelapper ofte næsten sa brede som endeafsnittet. Spredt.

Crepis. Høgeskæg.

1. I det mindste de indre frugter med et tydeligt, langt næb ..... 2.
   Frugterne uden eller med et utydeligt, kort næb 4.
2. Ydre svøbblade bredt hindekantede. Ydre frugter med 2 vinger sancta
   Frugterne uvingede. Ydre svøbblade ikke hindekantede 3.
3. Kurvene nikkende i knop. Griflen gul ..... foetida
   " oprette " " . " grønlig setosa
4. Planten med kirtelhår på blade, stængel og kurvsvøb .... viscidula
   " mindre kirtlet 5.
5. Fnokken smudsighvid til gullig ..... 6.
   " renhvid 8.
6. 12-20cm høj bjærgplante med smalfligede stængelblade ... jacquinii
   30-150cm høje. Stængelbladene ikke fligede 7.
7. Stænglen stivhåret ..... sibirica
   " glat paludosa
8. Stænglen bladløs ..... praemorsa
   " bladet 9.
9. Planten flerårig ..... 10.
   " 1-2-årig 11.
10. Griflen sortgrøn. Bladgrunden afrundet ..... mollis
    " gul. Bladgrunden pilformet conyzaefolia
11. Stænglen klæbrigt-kirtlet forneden. Kurvsvøbet helt glat pulchra
    " ikke kirtlet forneden. Kurvsvøbet ikke glat 12.
12. Griflen brunliggrøn til sortgrøn ..... 13.
    " gul 14.

13. Stængelbladenes rand indrullet, fåtandet ..... tectorum
" " flad, flertandet nicaeensis
14. Ydre svøbblade udstående ..... biennis
" " tiltrykte 15.
15. Bladene stive. Kurvsvøbet 10-15mm langt ..... pannonica
" ikke stive. Kurvsvøbet ca.5mm langt capillaris

Crepis sibirica L. Sibirisk høgeskæg. 50-120cm. Stængelbladene store, ægformede til aflange, bugtet-tandede, de øvre omfattende. 1-6 kurve. Svøbbladene med sorthåret ribbe. VII-VIII. Sj.

C. viscidula Froelich Klæbrigt høgeskæg. 30-80cm. Nedre blade mest hele og tandede, indtil 17x5cm. 1-5 kurve i halvskærm. Svøbbladene med lange, mørke hår, 11-13mm. VII-IX. Spredt. Subalpin og alpin. 1100-2300m.

C. paludosa (L.) Moench Kærhøgeskæg. VI-VIII. Alm.

C. jacquinii Tausch Klippehøgeskæg. Nedre blade mest fjærnt tandede, resten smalfligede. Kurvsvøbet 9-11mm, mest m.m. stjærnehåret. Sj.

C. mollis (Jacq.) Asch. ssp. succisaefolia (All.) Jav. Blødhåret høgeskæg. 30-80cm. Stængelbladene lancet- til linjelancetformede, helrandede eller svagt tandede. VII-VIII. Sj. M.Bucegi: V.Malaeşti 1600-1650m.

C. conyzaefolia (Gouan) A.Kerner Tykgrenet høgeskæg. 20-60cm. Bladene dunede, undertiden kirtlede, finttandede til lappede. Kurvene 16-20mm lange, kirtlede. VII-IX. Spredt.

C. biennis L. Toårigt høgeskæg. VI-VIII. Alm.

C. pannonica (Jacq.) C.KOch Kamtandet høgeskæg. 25-100cm. Nedre blade 15-30x4-6cm, bugtet-smaltandede, ret tykke. Kurvsvøbet kantet og grafiltet, 10-15x6-12mm. VII-VIII. Sj.

C. praemorsa (L.) Tausch Afbidt høgeskæg. V-VI. Spredt.

C. tectorum L. Taghøgeskæg. V-IX. Alm.

C. pulchra L. Glinsende høgeskæg. 30-80cm. Bladene klæbrigt-kirtlede eller dunede, aflange, helrandede til svagt tandede. Kurvstilke og -svøb glatte. Kurvsvøbet 8-11mm. V-VII. Spredt.

C. foetida L. Stinkende høgeskæg. 15-40cm. Bladene m.m. stivhårede. Stængelbladene kraftigt fligede. Mælkesaften gullig, stærkt lugtende. Kronerne gule med rødlilla yderside. VI-VIII. 2 underarter:
ssp. foetida: Ydre svøbblade indtil 0,75mm brede, ca. 1/2 x de indre, mest overvejende kirtelhårede. Spredt.
ssp. rhoeadifolia (Bieb.) Celak.: Ydre svøbblade 1-1,5mm brede, ca. 2/3 x de indre, helt eller overvejende med ukirtlede hår. Alm.

C. sancta (L.) Babc. (Lagoseris s.) Lysrandet høgeskæg. 5-20cm. Enårig rosetplante med få og små stængelblade. Grundbladene tandede til lyreformede, kort lyshårede. Kurvbunden stivhåret mellem blomsterne. IV-VI. Sj

C. nicaeensis Balbis Fransk høgeskæg. 25-100cm. Meget lig følgende, men frugterne 2,5-3,8mm (1,4-2,5mm hos capill.). Planten mere stivhåret i sin nedre del. Kurvbunden grubet og randhåret. V-VIII. Spredt

Crepis capillaris (L.) Wallr. Grønt høgeskæg. VI-VII. Spredt.

C. setosa Haller f. Børstehøgeskæg. 15-50cm. Stænglen blødbørstet. Kurvsvøb og stilke- rigeligt gulbørstede. Bladene lyshårede. Ydre svøbblade udstående. Griflen sortgrøn. Næbbet 1/2-1 x frugten. VI-VII. Alm.

Andryala levitomentosa (Nyar.) Sell (Hieracium l.) Klippefiltkurv. 15-20cm. Ret tæt stjærnefiltet flerårig. Stængelgrunden med blivende bladrester. Grundbladene rundagtige til bredt elliptiske, med 0-4 små tænder. Stængelen med 1(2) kurv og 1-4 linjeformede, småblade. VII-VIII. M.Bistriţei: Pietrosu Broştenilor. 1600-1700m.

Hieracium. Høgeurt.

Pilosella-gruppen: 1 række fnokhår. Ofte med udløbere. Frugten med en knudret ring foroven. Arterne nævnes kun i nøglen.

1. Stænglerne bladløse, med 1 kurv ..... 2.
" med flere kurve, ofte bladede 5.
2. Udløberne korte og tykke. Svøbbladene m.m. butte ..... 3.
" lange og tynde. " spidse 4.
3. Kurvsvøbbladene 2-4mm brede, sortagtige ..... hoppeanum
" 1,5-2mm brede, lysegrønne eller lysrandede macranthum
4. Svøbbladene m.m. skjulte af filt. Ingen kirtelhår pseudopilosella
" ikke helt skjulte af hårene. Kurvstilkene kirtelhårede pilosella
5. Kurvene orangerøde eller rødbrune ..... aurantiacum
" gule 6.
6. Stænglen mest under 20cm, med 0-1(2) blade og 1-5(7) kurve ..... 7.
" " 20-100cm, med 1-flere blade og mange kurve 8.
7. Grundbladene med kirtelhåret rand. Kurvsvøbet tæt uldhåret alpicola
" uden " " . " m.m. håret lactucella
8. Med over- eller underjordiske udløbere ..... 9.
Uden udløbere 11.
9. Grundbladene aflangt spatelformede til lancetformede, bløde, lysegrønne eller gulgrønne, ofte jævnt hårede caespitosum
Grundbladene lancet- til linjeformede, blå- eller grågrønne, stivere, ofte m.m. glatte ovenpå 10.
10. Kurvstilkene tæt stjærnefiltede ..... bauhinii
" svagt eller ikke stjærnefiltede magyaricum
11. Bladene lyse- til gulgrønne, ret bløde ..... 12.
" blågrønne, stivere 13.
12. Kurvsvøb og -stilke tæt hårede, svagt kirtlede ..... cymosum
" " " " kirtlede, uden alm. hår vaillantii
13. Øvre blade med udvidet eller halvt omfattende grund. Alle blade spredt og langt (-1cm) børstehårede. Kurvsvøbet 4-5mm pavichii
Øvre blade med tilsmalnet eller meget lidt udvidet grund. Alle blade mere tæt hårede. Kurvsvøbet 5-9mm 14.
14. 5-20 stængelblade. Grundbladene visne i blomst ..... echioides
1-4 " 15.
15. Kurvstilkene med 0-få stjærnehår ..... piloselloides
" gråt stjærnehårsfiltede 16.

16. Kurvstilkene uden kirtelhår. Kurvene m.m. i skærm ... subcymigerum
" m.m. tæt kirtelhårede. Kurvene i top 2.
17. Kurvsvøbbladene sorte med meget smal lys rand ..... obscurum
" med bred lys rand praealtum

Euhieracium-gruppen: 2 rækker fnokhår. Ingen udløbere. Frugten med en jævn ring foroven.
Jeg gengiver 2 nøgler her: den første Flora Europaeas og den anden fra Flora Romaniei. I tilknytning til den sidste har jeg medtaget lidt udbredelsesangivelser, men ellers er arterne kun nævnt i nøglerne.

Euhieracium i følge Flora Europaea:

1. Bladranden med kirtelhår ..... 2.
" uden " 16.
2. Grundbladene væk eller visne under blomstringen ..... 3.
" til stede under blomstringen 6.
3. Kronerne glatte i spidsen ..... insuetum
" korthårede i spidsen 4.
4. Svøbet med få stjærnehår ..... sudeticum
" " mange stjærnehår 5.
5. Svøbet 7-12mm ..... chlorocephalum
" 12-16mm nigritum
6. Kronerne glatte i spidsen ..... 7.
" horthårede i spidsen 9.
7. Kurvsvøbet uden stjærnehår ..... silesiacum
" med mange stjærnehår 8.
8. Kurvsvøbet sortagtigt med mørke eller mørkgrundede hår pietroszense
" grønligt med lyse alm. hår schmidtii
9. Øvre blade med stængelomfattende grund ..... chlorocephalum
Bladene uden " " 10.
10. Kurvsvøbet med 0-få stjærnehår ..... 11.
" " mange " 14.
11. Bladstilkene 5-12cm ..... krasanii
" under 5cm 12.
12. Mest 2-10 kurve. Stængelbladene lig grundbladene ..... atratum
1-2 kurve. Stængelbladene m.m. reducerede 13.
13. Bladene 5-15 mm brede. Oftest 1 kurv ..... alpinum
" 10-40mm " . " 2 kurve nigrescens
14. Kurvsvøbet med 0-få kirtelhår ..... rohacsense
" " mange " 15.
15. 3-5 stængelblade. Kurvstilken med få kirtelhår ..... fritzei
1-3 " . " " mange kirtelhår arolae
16. Kurven med få, højst 10 blomster, nikkende i knop ..... sparsum
" " flere blomster, opret i knop 17.
17. Grundbladene visne eller væk under blomstringen. Bladene kan dog danne en falsk roset lidt over grunden ..... 18.
Grundbladene til stede under blomstringen 34.
18. Bladranden med hår, hvis tænder er længere end hårtykkelsen.
Kurvsvøbet med spredte stjærnehår og 0-få alm. hår .... jankae
Bladrandens hår med kortere tænder 19.

19. Bladene ikke stængelomfattende ..... 20.
I det mindste de øvre blade med m.m. omfattende grund 23.
20. Svøbet med mange stjærnehår ..... ramosum
" " 0-få " 21.
21. Bladranden omrullet ..... umbellatum
" ikke omrullet 22.
22. Bladene grønne ..... laevigatum
" blågrønne. De ydre svøbblade m.m. udstående virgicaule
23. 2-6 stængelblade ..... epimedium
Over 6 stængelblade 24.
24. Kronerne korthårede i spidsen ..... 25.
" glatte 27.
25. Stængel og blade tæt blødhårede ..... pocuticum
" " " med få alm. hår 26.
26. 10-30 blade. Svøbet 8-12mm ..... prenanthoides
5-15 " . " 7-8,5mm juranum
27. Svøbbladene spidse ..... valdepilosum
" butte 28.
28. Bladene tydeligt netårede ..... 29.
" utydeligt " 32.
29. Kurvsvøbet med mange kirtelhår ..... inuloides
" " 0-få " 30.
30. Kurvsvøbet med mange stjærnehår ..... robustum
" " 0-få " 31.
31. Kurvsvøbet 8,5-10mm ..... virosum
" 10-13mm latifolium
32. Kurvstilken helt uden kirtelhår ..... sabaudum
" med få til mange, evt. små kirtelhår 33.
33. Frugterne blege ..... racemosum
" mørke insuetum
34. I det mindste de øvre blade m.m. stængelomfattende ..... 35.
Bladene ikke stængelomfattende 40.
35. Ydre svøbblade udspærrede ..... 36.
" " tiltrykte 37.
36. Kurvsvøbet 14-17(23)mm ..... villosum
" 9-12(8-14)mm silesiacum
37. Hele planten med lange alm. hår ..... 38.
De alm. hår ikke specielt lange 39.
38. 7-13(20) stængelblade ..... valdepilosum
(2)3-6 stængelblade pilosum
39. Svøbet med mange alm. hår ..... epimedium
" " 0-få " " umbrosum
40. 0-1 stængelblade ..... 41.
Mindst 2 store stængelblade 50.
41. Svøbet med 0-få alm. hår ..... 42.
" " mange " " 43.
42. Bladoversiden med mange stjærnehår ..... stelligerum
" uden stjærnehår murorum
43. Svøbet med 0-få kirtelhår ..... 44.
" " mange " 45.

44. Svøbbladene butte ..... caesium
" spidse piliferum
45. Svøbet med 0-få stjærnehår ..... 46.
" " mange " 47.
46. Bladene ikke plettede. Griflen mørk ..... atratum
" plettede. Griflen gul glaucinum
47. Griflerne ikke gule ..... 48.
" gule 49.
48. Kronerne korthårede i spidsen ..... rohacsense
" glatte bifidum
49. Bladene uden pletter ..... schmidtii
" med " hypochoeroides
50. Ydre svøbblade udspærrede. Svøbet uden stjærnehår ..... 36.
" " tiltrykte 51.
51. Kurvstilkene med mange kirtelhår ..... 52.
" " 0-få " 56.
52. Svøbet med mange alm. hår ..... 53.
" " 0-få " " 54.
53. Bladstilkene 5-12cm ..... krasanii
" under (5)3cm atratum
54. Svøbet med mange stjærnehår ..... argillaceum
" " 0-få " 55.
55. Kurvsvøbet 7-8mm ..... rotundatum
" 9-11mm diaphanum
56. Hele planten med lange alm. hår ..... 57.
De alm. hår ikke specielt lange 59.
57. Svøbet med mange stjærnehår ..... scorzonerifolium
" uden stjærnehår 58.
58. Nogle blade stærkt tandede ..... dentatum
Bladene helrandede eller fåtandede pilosum
59. Svøbet med få til mange kirtelhår ..... 60.
" " 0-få kirtelhår 61.
60. Bladene plettede ..... maculatum
" uplettede vulgatum
61. Svøbet med 0-få stjærnehår, hvidlåddent ..... glabratum
" " få-mange stjærnehår 62.
62. 2-4 stængelblade ..... caesium
4-15 " ramosum

Euhieracium i følge Flora Romaniei:

1. Med grundstillet bladroset ..... 2.
Grundbladene væk under blomstringen. Der kan dog sidde en falsk roset lidt over stængelgrunden 18.
2. Planten helt glat. Kurvsvøbet 5-6mm . 5-10 stængelbl. praebiharicum
Blade eller kurvsvøb m.m. hårede; i modsat fald kurvene mindst 9mm 3.
3. Knopperne næsten kugle- eller ægformede; hvis de er m.m. valseformede (H. transsilvanicum), så med 0-2 tæt silkeladne stængelbl.4.
Knopperne m.m. valseformede eller forlænget ellipsoidisk-valseformede. Svøbbladene m.m. i 2 rækker. Bladene blå/grågrønne 26.

4. Bladene med meget korte kirtelhår, især langs randen. Stænglen med 1 kurv. Svøbet tæt langhåret. Grundbladene mest under 1cm brede, m.m. helrandede. 10-20(5-25)cm høj ..... 5.
   Bladene uden kirtelhår; i modsat fald (H. pallidum) med 2-12 kurve og grundbladene tydeligt tandede eller kurvsvøbet svagt håret 6.
5. Øvre blade stjærnehårede på hele undersiden ..... pseudofritzei
   " " kun stjærnehårede på rand og undersidens ribbe alpinum
6. Svøbbladene m.m. regelmæssigt taglagte ..... 7.
   Ydre svøbblade meget kortere end de indre 9.
7. Ydre svøbblade tiltrykte de indre, m.m. linjeformede .. morisianum
   " " m.m. udstående, lancetformede til elliptiske 8.
8. Stængel og blade m.m. tæt lådne ..... villosum
   Stænglens nedre del samt de nedre blade glatte glabratum
9. Kronernes tænder kort randhårede. Bladene blågrønne, m.m. stive og m.m. stift børstehårede eller med småkirtlet rand pallidum
   Kronernes tænder glatte. Bladranden ikke kirtelhåret ..... 10.
10. Kurvstanden m.m. skærmformet. Kurvsvøbet 7-8mm. Bladene fløjlshårede, rusthårede på stilk og ribbe transsilvanicum
    Kurvstanden m.m. topformet. Svøbet 9-12mm. Bladene ikke tæt silkehårede 11.
11. Stænglen med 3-18 blade. Grundbladene jævnt tilsmalnede nedad 12.
    " " 0-2(3) blade. Grundbladene mest med brat tilsmalnet grund 18.
12. Nedre stængelblade af samme form og størrelse som grundbladene 13.
    Stængelbladene meget mindre end grundbladene 15.
13. Stænglen mangebladet ..... acuminatum
    " med 2-8 blade 14.
14. Bladene mest tydeligt tandede, langhårede nedenunder og på stilken ..... lachenalii
    Bladene svagt tandede til helrandede, mindre hårede irriguum
15. Kurvsvøbet sortagtigt, tæt kirtelhåret ..... murorum
    " ikke overvejende kirtelhåret 16.
16. Grundbladenes overside m.m. kort hvidhåret ..... psammogenes
    " " m.m. glatte 17.
17. Kurvsvøbet med 0-få kirtler, med mest lyse alm. hår ..... bifidum
    " m.m. tæt kirtlet, de alm. hår med sort grund subcaesium
18. Kurvsvøb og -stilke tydeligt kirtelhårede ..... 19.
    Kurvsvøbet højst med spredte kirtelhår 21.
19. Stængelbladene med tilsmalnet grund ..... 13.
    " " m.m. hjærteformet og øret grund 20.
20. Kurvsvøbet tæt kirtlet ..... prenanthoides
    " ret svagt kirtlet lanceolatum
21. Kurvstilkene uden stjærnehår. Bladgrunden bredt omfattende virosum
    " stjærnefiltede 22.
22. Ydre svøbblade med udbøjet spids ..... umbellatum
    " " tiltrykte 23.
23. Kurvbundens gruber langt randhårede. Stængelbladene m.m. jævnt fordelte og jævnt aftagende opad ..... 24.
    Kurvbundens gruber med korttandet rand 25.

24. Kurvsvøbet glat eller kun med korte kirtler ..... boreale
" kirtelhåret sabaudum
25. 30-80(20-100)cm. Bladene svagt tandede, m.m. jævnt fordelte og jævnt mindre opad eller undertiden tætteræ midtpå eller i stænglens nedre 1/3 ..... racemosum
10-35(50)cm. Nedre blade talrige, store, tydeligt tandede, rosetdannende nær grunden; de andre brat mindre pojoritense
26. Bladene tydeligt brunplettede, helt glatte ..... telekianum
" uplettede 27.
27. Kurvsvøb og -stilke glatte eller sj. med få stjærnehår ..... 28.
Kurvsvøbet med alm. og/eller kirtelhår 29.
28. Kurven med højst 10 blomster. 1-5 stængelblade ..... sparsum
" " flere blomster. 6-30 stængelblade magocsyanum
29. 4-10 m.m. jævnt fordelte og jævnt aftagende stængelblade .... 30.
(0)1-4 ret brat mindre stængelblade, mindre end grundbladene 31.
30. Kurvsvøbet 10-13mm. Ofte 7-30 kurve. 5-10 stængelbl. kotschyanum
" 8,5-10mm. Mest 2-7 " . 4-7 " fogaraschense
31. Kurvstilkene hårede. Grundbladene elliptiske til lancetformede borbasii
Kurvstilkene glatte eller sj. med få, spredte hår 32.
32. Stænglen tynd, 10-25cm høj, med 1-3(4) kurve ..... porphyriticum
" kraftigere, (25)30-60cm, med 7-50 kurve lubricicaule

Hieracium praebiharicum Boros VI-VII. Jud.Alba: Poşaga de Sus. 500m.

H. pseudofritzei Benz & Zahn (H. alpinum p.p.) VII-VIII. M.Retezat.

H. morisianum Rchb.f. (H. pilosum). VII-VIII. Sj.

H. pallidum Biv. (H. schmidtii p.p.) V-VII. Sj.

H. transsilvanicum Heuffel (H. rotundatum). VI-VIII. Alm.

H. lachenalii Gmelin (H. vulgatum m.m.) VI-VIII. Alm.

H. pojoritense Woł. (H. sabaudum/sparsum). Sj.

H. telekianum Boros & Lengyel VII-VIII. Jud.Harghita: Tuşnad pe Piatra Şoimului, Vf.Bicleu, VF.Cetaţii, Bicsad (?).

H. sparsum Friv. Toradet høgeurt. VII-VIII. Jud.Mehedinţi: Svinta på M.Trescovat.

H. magocsyanum Jav. (H. silesiacum p.p.). M.Retezat, M.Godeanu.

H. kotschyanum Heuffel (H. silesiacum p.p.). VII-VIII. Spredt.

H. fogaraschense Nyar.& Z. (H. silesiacum p.p.). M.Fagaraş: V.Bilea.

H. borbasii Uechtr. (H. silesiacum p.p.). VII-VIII. Spredt.

H. porphyriticum A.Kerner (H. silesiacum p.p.). M.Bihor, M.Muntele Mare. VII-VIII.

H. lubricicaule (Nyar.) Nyar. (H. silesiacum p.p.). M.Retezat, M.Godeanu. VII-VIII.

ALISMATACEAE

Sagittaria sagittifolia L. Pilblad. Støvknapperne mest rødlilla. Kronbladene ofte med mørk plet ved grunden. Frugten med kort, endestillet næb. Enbo. VI-VIII. Alm.

S. latifolia Willd. Bredbladet pilblad. 20-100cm. Bladene bredt til smalt pilformede. Støvknapperne gule. Kronbladene ensfarvet hvide. Frugten med m.m. forlænget, bugstillet næb. VIII-IX. Forv. i Jud.Ilfov.

Alisma plantago-aquatica L. Vejbredskeblad. VI-VIII. Alm.

A. lanceolatum With Lancetskeblad. 20-40cm. Bladene lancetformede, indtil 1,5cm brede, med kileformet grund. Griflen m.m. ret. VI-X. Spredt.

A. gramineum Lej. Kortskaftet skeblad. 10-40cm. Griflen spiralformet indrullet. Bladene båndformede eller med bladplade mod spidsen. Spredt.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Hjærteblad. 20-60cm. Blomsterstand som hos Alisma. Men hjærteformede blade op til 6x4cm. 5-10 nødder. VII-IX. Sj. Bl.a. i Donaudeltaet.

BUTOMACEAE

Butomus umbellatus L. Brudelys. VI-VIII. Alm.

HYDROCHARITACEAE

Hydrocharis morsus-ranae L. Frøbid. VI-IX. Alm.

Stratiotes aloides L. Krebseklo. VI-VIII. Alm.

Elodea canadensis Michx Vandpest. VI-IX. Spredt.

Vallisneria spiralis L. Vandskrue. Ålegræslignende ferskvandsplante med 8-12mm brede blade. Hunblomsterne på lange, skruesnoede stilke. Spr.

SCHEUCHZERIACEAE

Scheuchzeria palustris L. Blomstersiv. V-VII. Sj.

JUNCAGINACEAE

Triglochin maritimum L. Strandtrehage. 6 tenformede frugter. Spredt.

T. palustre L. Kærtrehage. 3 ægformede frugter. VI-VII. Alm.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton. Vandaks.

1. Alle eller nogle blade elliptiske, lancet- eller ægformede ..... 2.
   " blade bånd-, linje- eller trådformede 9.
2. Undervandsbladene uden bladplade ..... natans
   " med " 3.
3. Undervandsbladene kort- eller langstilkede ..... 4.
   " helt siddende 6.
4. Undervandsbladene kortstilkede. Ingen flydeblade ..... lucens
   " langstilkede. Ofte med flydeblade 5.

5. Flydebladene gennemskinnelige ..... coloratus
" uigennemskinnelige nodosus
6. Stænglen fladtrykt. Bladranden savtakket, ofte kruset .... crispus
" trind. Bladene helrandede 7.
7. Undervandsbladene med hjærteformet grund. ÷ flydeblade perfoliatus
" " kileformet grund 8.
8. Undervandsbladene spidse, oftest 5-6cm, finttandede .... gramineus
" butte, over 10cm, mest helrandede alpinus
9. Bladene børsteformede, uden skede, med skedehinde ..... pectinatus
" græsagtigt flade, med både skede og skedehinde 10.
10. Bladene mangestrengede med 3 stærkere strenge. Stænglen stærkt sammentrykt ..... 11.
Bladene 1-5-strengede. Stænglen trind eller noget sammentrykt 12.
11. Bladene langt tilspidsede, 2-3mm brede, lysegrønne .. acutifolius
" butte, med brod, 3-4mm brede, mørkegrønne compressus
12. Stænglen tydeligt sammentrykt, mindst dobbelt så bred som tyk obtusifolius
Stænglen trind eller svagt sammentrykt, med rundt eller ovalt tværsnit 13.
13. Bladene jævnt afsmalnende udad ..... trichoides
" lige brede i hele deres længde 14.
14. Bladene slappe, 3-5cm x 1-1,5mm. Skedehinden åben ... berchtoldii
" stive, 3-4cm x 0,5-1mm. " lukket pusillus

Potamogeton natans L. Svømmende vandaks. VI-VIII. Alm.

P. coloratus Vahl Vejbredvandaks. VI-IX. Sj.

P. nodosus Poiret Knudevandaks. Flydebladene store, elliptiske eller lancetformede, 9-14x3-6cm. Undervandsbladene lancetformede, op til 20x4 cm. Aksstilkene fortykkede foroven. Stængelleddene kortere forneden, hvor stænglen derfor bliver knudret. VII-VIII. Spredt.

P. lucens L. Glinsende vandaks. VI-VIII. Alm.

P. gramineus L. Græsbladet vandaks. VII-VIII. Alm.

P. alpinus Balbis Rustvandaks. VII-VIII. Sj.

P. perfoliatus L. Hjærtebladet vandaks. VI-VIII. Alm.

P. pusillus L. Spinkelt vandaks. VI-IX. Alm.

P. obtusifolius Mert.& Koch Butbladet vandaks. VI-VIII. Spredt.

P. berchtoldii Fieber Lidet vandaks.

P. trichoides Cham.& Schl. Hårfint vandaks. VI-VIII. Sj.

P. compressus L. (P. zosterifolius) Bændelvandaks. VII-VIII. Sj.

P. acutifolius Link Spidsbladet vandaks. VI-VIII. Sj.

P. crispus L. Kruset vandaks. V-IX. Alm.

P. pectinatus L. Børstebladet vandaks. VII-VIII. Spredt.

Groenlandia densa (L.) Fourr. Tæt vandaks. VII-VIII. Sj.

RUPPIACEAE

Ruppia maritima L. Almindeligt havgræs. VIII-IX. Sj.

ZOSTERACEAE

Zostera marina L. Ålegræs. Bladene 3-10mm brede med 5-9 strenge. VI-IX.

Z. noltii Hornem. (Z. nana) Dværgbændeltang. Bladene 5-20cm x 1mm, 1-strengede. VI-VIII. Sj.

ZANNICHELLIACEAE

Zannichellia palustris L. Vandkrans. Vandplante med trådformede blade, ofte 3 i krans. Grupper på 2-6 frugter i bladhjørnerne. VI-IX. Spredt.
ssp. palustris: Frugterne siddende, ofte 2-4,
ssp. pedicellata (Wahlenb. & Rosen) Hegi: Frugterne mindst 1mm stilkede.

NAJADACEAE

Najas. Najade. Enårige, gaffelgrenede vandplanter. Bladene 2-5 sammen, tydeligt takkede.

1. Bladene uden tænder 1-2mm brede. Tænderne m.m. tornagtige .. marina
" med tænder højst 1mm brede 2.
2. Bladskederne forlængede i 2 spidse flige på indtil 2mm ... graminea
" afrundede til afskårne fortil minor

Najas marina L. Stor najade. 10-70cm. Bladskederne ikke eller meget svagt ørede. Bladtænderne store og grove. VI-IX. Alm.

N. minor All. Skør najade. 5-25cm. Bladene op til 3cm lange, med 5-17 par tydelige og skarpe tænder. VI-IX. Alm.

N. graminea Delile Græsnajade. 10-40cm. Bladene indtil 4cm, med 30 eller flere par meget små tænder. VI-IX. Jud.Ilfov: Chirnogi i rismarker.

LILIACEAE

1. Blomsterne udgår næsten lige fra løget; stænglen meget kort ..... 2.
" sidder på en tydelig stængel 4.
2. 1 griffel, der er 3-delt nær spidsen ..... Bulbocodium
3 grifler 3.
3. Blosterbladene sammenvoksede forneden i et langt rør .... Colchicum
" frie til grunden Merendera
4. Blomsterne i bladhjørnerne ..... 5.
" i en endestillet blomsterstand 8.
5. Bladene nåleformede ..... Asparagus
" ikke nåleformede 6.
6. Bladene stive og stedsegrønne ..... Ruscus
" bløde og løvfældende 7.
7. Bladgrunden stærkt stængelomfattende ..... Streptopus
" ikke " Polygonatum
8. Blomsterne i en skærm, omgivne af svøbblade i knop ..... 9.
" sjældent i skærm, i så fald uden svøb 10.
9. Blosterbladene sammenvoksede ved grunden ..... Nectaroscordum
" indbyrdes frie Allium

10. Blosterbladene mindst 1/5 sammenvoksede ..... 11.
" under 1/5 " 15.
11. Blomsten 8-10cm, gul eller orangefarvet ..... Hemerocallis
" mindre, af anden farve 12.
12. Oftest 2 bredt lancetformede blade ..... Convallaria
Bladene m.m. linjeformede 13.
13. Blosterrøret m.m. indsnævret ved mundingen ..... Muscari
" ikke " fortil 14.
14. Kapslen trekantet. Blosteret 7-9mm, skidenlillat ..... Bellevalia
" kugleformet. Blosteret 4-5mm, lyseblåt Hyacinthella
15. 3-4 helt frie grifler ..... 16.
1 (0) griffel, undertiden med 3-delt spids 18.
16. 4 blade i krans ..... Paris
Bladene spredte eller grundstillede 17.
17. Bladene bredt ægformede til elliptiske ..... Veratrum
" sværdformede Tofieldia
18. Bladene grundstillede (1-2 kan dog omskede stænglen lidt) ..... 19.
Med stængelblade eller bladagtige støtteblade 21.
19. Blomsterne blå til lyslilla ..... Scilla
" hvide 20.
20. Blosterbladene med 3 ribber. Støvknapperne endefæstnede Anthericum
" " 1 grøn ribbe. Støvknapperne rygfæstnede Ornithogalum
21. 2 hjærteformede blade. Blomsten firtallig ..... Maianthemum
Bladene ikke hjærteformede. Blomsten 6-tallig 22.
22. Støvknapperne rygfæstnede og m.m. vippelige ..... 23.
" endefæstnede 24.
23. Bladene med en bred, hindeagtig, omskedende grund ..... Asphodeline
" ikke omskedende Lilium
24. Støvfanget siddende ..... Tulipa
" stilket, sidder på en griffel 25.
25. Blomsterne nikkende ..... 26.
" ikke nikkende 27.
26. 2 modsatte, spættede, bredt elliptiske stængelblade ... Erythronium
Flere, smallere, ikke spættede stængelblade Fritillaria
27. Blomsterne hvide ..... Lloydia
" gule Gagea

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Mosebjørnebrod. 15-30cm. Bladene overvejende grundstillede, 1,5-15cm. Blomsterne mest i en klase på 2-6cm, gullige. Blosterbladene 2-3,5mm. VI-VIII. Jud.Cluj, M.Fagaraş.

Veratrum nigrum L. Sort foldblad. 50-100cm. De nedre blade 10-25x4-10cm, m.m. foldede langs ribberne. Blomsterne rødbrune til sortlilla, 9-15mm brede, i en ofte stor top. VI-VIII. Spredt.

V. album L. Hvidt foldblad. 50-175cm. Som den foregående, men blomsterne hvidgrønne eller gullige. VI-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. album: Blosterbladene hvide ovenpå, grønne nedenunder.
ssp. lobelianum (Bernh.) Arc.: Blosterbladene gulgrønne og grønstribede ovenpå med en grøn, V-formet plet.

Asphodeline lutea (L.) Rchb. Kejserlys. 40-80cm. Blomsterne gule, 20-25mm lange. Stænglen bladet op til klasen. De nedre blade indtil 35cm x 1,5-3mm, seglkrummede. Klasen 10-20cm. IV-V. Østlig.

Anthericum ramosum L. Grenet edderkopurt. Blosterbladene 8-13mm. Blomsterstilken leddet nær grunden.VI-VII. Alm.

A. liliago L. Ugrenet edderkopurt. Blosterbladene 15-22mm. Blomsterstilken leddet lidt under midten. V-VI. Sj.

Hemerocallis lilioasphodelus L. Gul daglilje. 50-100cm. Bladene 12-18 mm brede. Blomsterne klart gule, lugtende, med flad rand. VI-VII. Forv.

H. fulva (L.) L. Rødgul daglilje. 50-100cm. Bladene 2-3cm brede. Blomsterne mat orange, ikke lugtende. Indre blosterblade med bølget rand. VI-VII. Dyrket og forvildet.

Colchicum. Tidløs.

1. Med blade under blomstringen ..... triphyllum
   Uden " " " 2.
2. Støvfangene 1,5-4mm nedløbende ..... autumnale
   " prikformede eller højst 0,5mm nedløbende 3.
3. Støvfanget kort nedløbende. Støvknapperne 2-3mm ..... fominii
   " prikformet. Støvknapperne 4-6mm arenarium

Colchicum triphyllum G.Kunze (C. biebersteinii) Trebladet tidløs. 3(4) blade på 3-4cm under blomstringen. 1-3 blomster. Blosterbladene 15-30x 6-12mm. Støvknapperne sortlilla til grønlilla. IV-V. Sj. Østlig.

C. arenarium W.& K. Sandtidløs. Løghinden kastanjebrun. Blosterbladene 25-40x3-10mm. Støvtrådene 4-10(16)mm. Griflerne rette. Gule støvknapper IX-X. Sj. Jud.Dolj. Jud.Caraş-Severin: Ostrovui Moldova Veche.

C. fominii Bordzil. Løghinden brunsort. IX-X. Sj. Østlig. Nær foreg.

C. autumnale L. Høsttidløs. Løghinden mørkebrun. Blosterbladene mest 40-60x10-15mm. Støvknapperne gule. Griflerne krumme i spidsen.IX-X.Alm.

Bulbocodium versicolor (Ker-Gawler) Sprengel Liden lysblomst. Lille lyslilla, krokusagtig plante. Med 3-4 blade, 5-8mm brede, til stede under blomstringen. 1(-3) blomster på 2,5-3cm. II-III. Jud.Cluj + Vaslui.

Merendera sobolifera C.A.Meyer Krybende tidløs. Med underjordiske udløbere. Bladene kommer frem sammen med blomsterne, furede. 1-2 blomster Blosterbladene 20-40x2,5-5mm, lyst rødlilla. Støvknapperne lilla. IV. Sj. Jud.Constanţa: Lacul Sinoe, Vadu, Istria, Navodari, Mamaia.

Lloyzdia serotina (L.) Rchb. Stribelilje. 5-15cm. Mest 2 trådformede, 7-20cm lange grundblade; 2-4 stængelblade. Blomsten 9-15mm, hvid med rødlilla midterribbe. VI-VIII. Spredt. Alpin.

Gagea. Guldstjærne.

1. Blomsterstilkene glatte ..... 2.
   " dunede 7.

2. Stængelbladene lidt adskilte til spredte ..... 3.
" modsatte 5.
3. Planten med 4-7 spredte, trådformede blade ..... bulbifera
Med 1-2 lancetformede stængelblade 4.
4. 1 grundblad. Blosterbladene tilspidsede ..... minima
2 grundblade. " med indbøjet spids spathacea
5. Grundbladet 7-10mm bredt, med hætteformet spids ..... lutea
" 1-6mm " , uden " " 6.
6. Grundbladet 1-3mm bredt, mest m.m. rendeformet ..... pusilla
" 3-6mm " , " fladt pratensis
7. De 2 stængelblade modsatte eller næsten modsatte ..... 8.
Stængelbladene spredte 10.
8. Grundbladene hule og trinde, 3-5mm brede som pressede .. fistulosa
" ikke hule 9.
9. Ydre blosterblade tæt hviddunede udvendigt ..... granatellii
" " glatte eller svagt dunede arvensis
10. Stængelbladene linje-trådformede ..... 11.
" lancetformede til smalt lancetformede 12.
11. Planten ofte i klynger. Løget med en krave på 1-3cm .. reticulata
" enlig. Løget uden krave taurica
12. Stænglen ca. 2cm. Blosteret 13-17mm ..... bohemica
" 3-10cm. " ca. 12mm szovitzii

Gagea pratensis (Pers.) Dum. Engguldstjærne. 8-20cm. Bladgrunden ofte rødlilla. Bladene ellers lidt blågrønne. III-IV. Alm.

G. pusilla (F.W.Schm.) Schultes Dværgguldstjærne. 3-10cm. Grundbladet ofte meget længere end stænglen. 1 løg. Blosterbladene 8-13mm, halvbutte. III-IV. Spredt.

G. lutea (L.) K-G. Alm. guldstjærne. III-IV. Alm.

G. minima (L.) K-G. Liden guldstjærne. III-IV. Alm.

G. reticulata (Pallas) Schultes Skedeguldstjærne. 10-15cm. Løget undertiden dækket af opadbøjede, trævlede rødder. Stænglen og grundbladet fintdunede. 1(-6) blomst på 14-20mm. Blosteret langt tilspidset.

G. taurica Steven Sylguldstjærne. 3-6(10)cm. Løget mest som hos foregående. Blosteret 12-14mm, langt tilspidset. III-IV. Sj.

G. bulbifera (Pallas) Schultes Vorteguldstjærne. 3-20cm. 1-3 blomster. De indre blosterblade med bølget rand, 7-12mm. III-IV. Sj. Østlig.

G. spathacea (Hayne) Salisb. Hylstergguldstjærne. III-IV. Sj.

G. fistulosa K-G. Alpeguldstjærne. 5-12cm. Mest 2 grundblade. Blosterbladene 11-18mm, butte til halvspidse. 3-5 blomster. IV. Sj.

G. arvensis (Pers.) Dum. (G. villosa) Agerguldstjærne. 8-20cm. Stængelbladene dunede. Blosteret ofte med udadbøjet spids. Blosterbladene 4,8-6 x så lange som brede. III-IV. Alm.

G. granatellii (Parl.) Parl. Dunet guldstjærne. 5-15cm. Stængelbladene dunede. Blosterets spids ikke udadbøjet. Blosterbladene 3-3,5(4) x så lange som brede. III-IV. Sj. Jud.Constanţa.

Gagea bohemica (Zauschner) Schultes Åben guldstjærne. 2 trådformede, mørkegrønne grundblade. Blosterbladene butte og hårede. Stængelbladene lancetformede. III-IV. Jud.Mehedinţi: Schela Cladovei.

G. szovitzii (A.F.Lang) Besser Stængelbladene smalt lancetformede. Sj.

Erythronium dens-canis L. Hundetandslilje. 10-20cm. Bladene 5-9x1,5-4 cm, rød- eller blegspættede. Den enlige blomst nikkende, lyserød med tilbagebøjede, 18-30mm lange blosterflige og fremadrettede støvdragere og griffel. III-IV. Alm.

Tulipa. Tulipan. Alle arter gulblomstrede.

1. Støvtrådene glatte. Støvfanget bredere end frugtknuden .. hungarica
" med håret grund. Støvfanget smallere 2.
2. Ydre blosterblade 20-35mm, med rødligt skær ..... australis
" " 36-63mm, evt. med grønligt skær silvestris

Tulipa silvestris L. Vild tulipan. 20-40cm. Stænglen mindst 2,5mm tyk (over det øverste blad). Nederste blad mindst 12mm bredt. Støvtråde 9-14 mm. Støvknapper 4-9mm. V-VI. Sjældent indslæbt.

T. australis Link (T. biebersteiniana) Sydlig tulipan. 15-30cm. Stænglen højst 2mm tyk. Nederste blade under 12mm bredt. Støvtrådene 5-8mm. Støvknapperne 2,5-4mm. IV-V. Sj.

T. hungarica Borbas Ungarsk tulipan. 40-50cm. Nedre blade indtil 37x8 cm. Blosterbladene 5-10,5cm. Støvfangets lapper lidt nedbøjede. Støvknapperne 10-16mm. IV-V. Sj. Donaudalen over Jærnporten.

Fritillaria meleagris L. Vibeæg. 12-30cm. Blosteret mest grumset brunlillat og spættet. Bladene spredte. IV-V. Spredt.

F. montana Hoppe (F. tenella, F. orientalis) Krogvibeæg. 16-40cm. Blosteret grønligt, spættet. Nederste blade 2-3 sammen, mellemste spredte, øverste tit 3 i krans, ofte med krog eller krummede. IV-V. Spredt.

Lilium martagon L. Kranslilje. 60-80cm. Bladene i kranse på 4-8, lancetformede. Blomsterne hængende, op til 3,5cm, vinrøde og ofte plettede, med tilbagekrummede blosterblade. V-VI. Alm.

L. bulbiferum L. Brandlilje. 60-80cm. Bladene spredte. De 1-3 blomster oprette, 5,5-8,5cm, udbredt tragtformede, rødgule til orangerøde. Øvre bladhjørner med yngleknopper. VI-VII. Sj.

L. jankae A.Kerner (L. carniolicum p.p.) 30-90cm. Bladene spredte, uden yngleknopper. Blomsterne svovlgule, 3-6,5cm, med stærkt tilbagebøjede blosterblade, hængende. VI-VII. Sj. Brasov (?), M.Cozia, M.Capaţinii, M.Retezat, M.Tarcu, M.Trascau, M.Bihor.

Ornithogalum. Fuglemælk.

1. Blomsterstilken ca. 1/2 x støttebladet, nikkende i frugt ..... 2.
" højst lidt kortere end støttebladet 3.
2. Frugtknuden ca. så lang som griflen ..... boucheanum
" noget kortere end griflen nutans

3. Klasen forlænget, med 20-80 blomster ..... 4.
" kort, m.m. halvskærmformet, med 2-15 blomster 6.
4. Blosteret mælkehvidt med grøn midterribbe ..... pyramidale
" klart eller grønlighvidt 5.
5. Blomsterne klare eller blegt grønlighvide ..... sphaerocarpum
" gullige til grønlige pyrenaicum
6. Bladene ikke hvidstribede ..... 7.
" i det mindste med hvidstribet underside 10.
7. Bladene randhårede eller med dunet underside ..... 8.
" glatte 9.
8. Bladene kun randhårede, med glatte flader ..... comosum
" med dunet underside fimbriatum
9. Bladene blågrønne, mest 4-8mm brede ..... oreoides
" højst lidt blågrønne, mest 8-20mm brede montanum
10. Frugtknuden smalt valseformet. Unge kapsel med 3 butte kanter amphibolum
Frugtknuden forlænget valseformet til omvendt kegleformet. Unge kapsel med 6 kanter 11.
11. Frugtstilken nedbøjet ..... 12.
" højst lidt nedadrettet 13.
12. Stænglens overjordiske del 0-2cm. Blågrønne blade .... sibthorpii
" " " mindst 5cm refractum
13. Løget omgivet af mange småløg ..... 14.
" med 0-få småløg omkring sig 15.
14. Småløgene inden for løghinden. Frugtstilkene udstående umbellatum
" uden " " . " lidt nedadrettede divergens
15. Frugtknude og kapsel med 6 parvist stillede ribber ..... kochii
" " " but 6-kantede psammophilum

Ornithogalum pyrenaicum L. Pyrenæisk fuglemælk. 30-60cm. Bladene ofte visne under blomstringen. Blosteret grønligt udvendigt, gulligt indvendigt, efterhånden med indrullede kanter. Frugtknuden afskåret foroven.

O. sphaerocarpum Kerner Rundfrugtet fuglemælk. 30-60cm. Som foregående, men frugtknuden rundagtig til ægformet. VI-VII. Sj.

O. pyramidale L. Pyramidefuglemælk. 30-100cm. Bladene grønne under blomstringen. Blosterbladene 11-15mm, lukker sig om frugtknuden efter blomstringen. Frugtknuden skinnende gul under blomstringen. VI-VII. Spr.

O. montanum Cyr. Udspærret fuglemælk. 9-20cm. 5-30 blomster. Frugtstilkene udstående til opstigende. Kapslen med 6 butte, jævnt fordelte ribber. Blosteret 12-20mm. V. Sj. Jud.Caraş-Severin: Reşiţa, Bozovici.

O. oreoides Zahar. 15-25cm. Stærkt blågrønne blade, vredne som unge. Blomsterstilkene 2-5,5cm. Blosterbladene 14-20mm. V. Sj.

O. fimbriatum Willd. Håret fuglemælk. 10-20cm. Klasen hviler på jorden. Frugtstilkene nedbøjede. Kapslen med 6 smalvingede kanter. IV. Sj.

O. amphibolum Zahar. 15-20cm. Klasen noget forlænget. Griflen 4-6mm, ca. = frugtknuden. V. Sj.

Ornithogalum sibthorpii W.Greuter (O. nanum) 5-15cm. Bladene længere end halvskærmen. Blomsterstilken lige efter blomstringen slap og furet i spidsen. Frugtknuden ægformet. III-VI. Sj. Østlig.

O. comosum L. Duskfuglemælk. 15-30cm. Bladene fladt rendeformede, grågrønne, ofte visne under blomstringen. 8-30 blomster. Kapslen med 6 butte, jævnt fordelte kanter. V. Sj.

O. umbellatum L. Kostfuglemælk. Kapslens kanter jævnt fordelte, butte og fortykkede. IV-V. Alm.

O. psammophilum Zahar. 10-25cm. Bladene furede, længere end halvskærmen Støttebladene mest kortere end de opstigende blomsterstilke. IV-V. Sj. Jud.Ialomiţa: Saveni, Platoneşti. Endemisk ?

O. kochii Parl. Smalbladet fuglemælk. 5-20cm. Frugtknuden gulliggrøn foroven. Kapslen stærkt fordybet i spidsen. Frugtstilkene opret-udstående. IV-V. Alm.

O. refractum Kit. Lav fuglemælk. 5-8cm. Løget omgivet af talrige småløg, der er bladløse i mindst 1 år. Stænglen 1/2-1cm. Kapslen omvendt ægformet med parvist stillede, butte ribber. III-IV. Spredt.

O. divergens Boreau Stribet fuglemælk. 10-30cm. Kapslens ribber spidse, m.m. jævnt fordelte.

O. nutans L. Nikkende fuglemælk. 20-60cm. Støvtrådene indvendigt med en tandløs liste. Bladene friske under blomstringen. Dyrket og forvildet.

O. boucheanum (Kunth) Asch. Havefuglemælk. 20-60cm. Støvtrådene med en tand tæt under støvknappen på indersidens længdeliste. Bladene visnende under blomstringen. Blosteret ofte med bølget rand. IV-V. Spredt.

Scilla. Vårstjærne.

1. Høstblomstrende. Bladene 1-2mm brede ..... autumnalis
   Vårblomstrende. " 3-20mm " 2.
2. Blosterbladene 12-15mm. Blomsterne nikkende ..... siberica
   " 5-12mm. " m.m. oprette 3.
3. Bladene knap så lange som klasen under blomstringen ..... bifolia
   " længere end klasen under blomstringen amoena

Scilla bifolia L. Tvebladet vårstjærne. 5-20cm. Glat og skinnende. Oftest 2 ca. 1cm brede blade med tit noget hætteformet spids. Klasen lidt ensidig. Blosteret 5-10mm. 1-5 blomster. III-IV. Alm.

S. siberica Haw. Koboltblå vårstjærne. 10-20cm. 2-4 1-2cm brede blade. Klasen med 1-2 dybblå blomster. Dyrket og forvildet.

S. amoena L. Himmelblå vår stjærne. 10-15cm. 4-7 1-1,5cm brede blade. Klasen med mest 3-6 klart blå blomster på 9-12mm. Dyrket og forvildet.

S. autumnalis L. Høstvårstjærne. 5-20cm. Bladene væk eller korte under blomstringen. 6-20 blomster i en forlænget klase. Blosteret 3-5mm, lillaagtigt med brungrøn midterribbe. VIII-X. Sj.

Bellevalia sarmatica (Pallas) Woronow Mangeblomstret rørhyacint. 3-7 blade. Klasen med 40-80 blomster. Nedre blomsterstilke 3-8cm, opret-udstående. Blosteret 7-9mm, først skidenlillat, siden gråligbrunt. IV-V.Sj

Hyacinthella leucophaea (C.Koch) Schur Ribbet dværghyacint. 7-25cm. 2(3) oprette blade. Klasen med 10-20(30) blomster på opret-udstående stilke. Blosteret 4-5mm, blegblåt, sjældent hvidt. III-IV. Sj.

Muscari. Perlehyacint.

1. Klasen løs, 10-25cm lang. Øvre blomster lyslilla og golde ..... 2.
   " tæt, 2-6cm lang. Alle blomster blå med hvid rand 3.
2. Nedre frugtbare blomsters tænder sorte ..... tenuiflorum
   " " " " grønne comosum
3. Frugtbare blomsters rør sortblåt ..... neglectum
   " " " blåt botryoides

Muscari comosum (L.) Miller Duskhyacint. 30-70cm. De golde topblomsters stilk 3-6 x blomsterne, oprette. De golde blomster kortere end de frugtbare. VI-VII. Spredt.

M. tenuiflorum Tausch Smal duskhyacint. 25-50cm. De golde topblomster omtrent så lange som de frugtbare, deres stilke 1(2) x blomsterne, mest udstående til nikkende. VI-VII.

M. botryoides (L.) Miller Perlehyacint. 10-20cm. 2-3 5-12mm brede, stift oprette blade omtrent af blomsterskuddets længde. Frugtbare blomster 2,5-4mm. IV-V. Alm.

M. neglectum Guss. (M. racemosum) Druehyacint. 15-30cm. 3-6 1,5-8mm brede, slappe blade, der er længere end blomsterskuddet. Frugtbare blomster 3,5-7,5mm, duftende. III-IV. Spredt.

Allium. Løg.

1. Bladene stilkede, lancetformede ..... 2.
   " ikke stilkede, parallelsidede 3.
2. Bladene omskeder 1/3-1/2 af stænglen. Stilkene 1-2cm victorialis
   " " ca. 1/5 " " . " 10-20cm ursinum
3. Blomsterstanden kun med yngleknopper ..... 4.
   " med blomster 6.
4. Svøbet mindst 3cm langt, længe blivende ..... oleraceum
   " affaldende, ofte kortere 5.
5. Bladene 5-20mm brede og flade ..... scorodoprasum
   " 0,2-4mm " og hule vineale
6. De 3 indre støvdragere tydeligt 3-spidsede ..... 7.
   " " " " højst svagt 3-tandede 12.
7. Støvdragerne helt indesluttede i blosteret ..... scorodoprasum
   " m.m. fremragende 8.
8. Svøbet blivende, oftest 2-delt ..... sphaerocephalon
   " affaldende, enkelt 9.
9. Bladene flade, 4-40mm brede ..... 10.
   " hule til trådformede, 1,5-4mm brede 11.
10. Løghinden nettrævlet. Blomsterne mest mørklilla ... atroviolaceum
    " hindeagtig. " " lysere ampeloprasum

11. Bladene hule. Skærmen med yngleknopper ..... vineale
" trådformede. Ingen " guttatum
12. Bladene hule, ikke furede ..... schoenoprasum
" flade eller " 13.
13. Svøbet kortere end skærmen ..... 14.
" længere " " 20.
14. Støvdragerne kortere end blosteret ..... 15.
" udragende 16.
15. Blosterbladene mørkt rødlilla, til sidst hængende atropurpureum
" lyse, oprette efter blomstringen moschatum
16. Bladene omskeder den halve stængel, 5-20mm brede ..... obliquum
" " højst 1/3 af stænglen, 0,3-6mm brede 17.
17. Blosteret hvidt eller gulligt ..... 18.
" rødt 19.
18. Blomsterstilkene svagt ru. Løghinden trævlet ..... albidum
" jævne. Løghinden hindeagtig ericetorum
19. Støvdragerne kun lidt udragende. Bladundersiden kølet angulosum
" tydeligt " . " hvælvet senescens
20. Støvdragerne tydeligt udragende ..... 21.
" højst lidt udragende 23.
21. Skærmen tæt. Blomsterstilkene højst 15mm, næsten ens .. saxatile
" åben. " indtil 30mm, uens 22.
22. Blomsterne lysende rødlilla ..... pulchellum
" m.m. gule flavum
23. Skærmen med yngleknopper, fåblomstret ..... oleraceum
" uden " , mangeblomstret 24.
24. Bladene 0,5-1mm brede, ikke furede ..... podolicum
" 2mm brede, furede paniculatum

Allium angulosum L. Engløg. 20-50cm. Bladene 1,5-6mm brede, skarpt kølede i frisk tilstand. Svøbet indtil 1cm, 2-5-lappet. Blomsterne lyst rødlilla. Støvknapperne først gule, senere mørkt rødlilla. Spr.

A. senescens L. (A. montanum) Kantet løg. 10-40cm. Stænglen kantet, 2-sidet foroven. Bladene næsten flade, svagt hvælvede nedenunder. Svøbet 5-8mm, 2-3-lappet. Blomsterne rødlilla. VII-VIII. Alm.

A. saxatile Bieb. Klippeløg. 10-70cm. Stænglen trind. Bladene 1-1,5mm brede, trådformede, furede. Det ene svøbblad indtil 3cm langt. Blomsterne lyserøde (sj. hvide). Griflen 4-6mm. VI-IX. Sj. Østlig.

A. albidum Fischer (A. flavescens) Hvidligt løg. 10-30cm. Stænglen lidt ribbet. Bladene trådformede. Skærmen 1,5-2,5cm bred. Blosteret 3-4mm, gullighvidt. VI-VIII. Spredt. 2 underarter:
ssp. flavescens (Besser): Bladene 1-2(2,5)mm brede, med furet overside. Frugtknuden 1,5mm bred, dybt indbugtet i toppen.
ssp. ammophilum (Heuffel): Bladene 2,5-4mm brede, med flad overside i det mindste i øvre 1/2. Frugtknuden 2-2,5mm bred, svagt indbugtet.

A. ericetorum Thore (A. ochroleucum) Hedeløg. 10-40cm. Stænglen trind. Bladene 1,5-6mm brede. Støvknapperne brunlige. VII-IX. 2 underarter:
ssp. ericetorum: Bladene 1,5-3mm brede, omskeder stænglen på 2-4(6)cm. Ydre blosterblade smalt trekantede. Alm.

ssp. pseudosuaveolens (Zahar.): 50-70cm. Bladene 3-6mm brede, omskeder stænglen på 6-25cm. Ydre blosterblade bredt elliptiske eller ægformede. Jud.Harghita: Mellem Vlahița og Pasul Vlahița. Endemisk ?

Allium obliquum L. Bladløg. 60-100cm. 6-10 blade på indtil 35x2cm. Skærmen 3,5-4cm bred. Blosteret 4-5mm, blegt gulliggrønt. V-VI. Sj. Jud.Cluj: Cheile Turzii.

A. schoenoprasum L. Purløg. VI-VIII. 2 underarter:
ssp. schoenoprasum: Blomsterne 8-10mm. Dyrket og forvildet.
ssp. sibiricum (L.) Hartm.: Blomsterne 10-12mm. Spredt. Alpin og subal.

A. victorialis L. Allemandsharnisk. 30-60cm. Bladpladerne 12-18x2-8cm. Skærmen tæt, 3-5cm bred. Blomsterne 4-5mm, hvide eller gullighvide. Løghinden brun og nettrævlet. VII-VIII. Spredt.

A. ursinum L. Ramsløg. V-VI. 2 underarter:
ssp. ursinum: Blomsterstilkene ru af fine vorter. M.sj.
ssp. ucrainicum Kleopow & Oxner: Blomsterstilkene jævne. Alm.

A. moschatum L. Moskusløg. 10-30cm. 3-6 1/2mm brede blade. Skærmen med 3-12 blomster på 6-7mm, der er lyserøde med mørkere ribbe eller hvide med brun ribbe. VIII-IX. Sj.

A. paniculatum L. Topløg. 50-80cm. Bladene karakteristisk indrullede som tørre. Skærmen halvcylindrisk, 3-4cm bred. VII-VIII. Alm. 2 ssp.:
ssp. paniculatum: Blosteret lyserødt til hvidt, 4,5-7mm.
ssp. fuscum (W.& K.) Arc.: Brunt løg. Blosteret grønligbrunt eller skidenhvidt, 5-6mm.

A. podolicum Blocki Fladstilket løg. 15-50cm. Begge svøbblade meget længere end skærmen, op til 20cm. Blomsterstilkene meget uens, let affladede eller vingede, de ydre nedbøjede. Klart lyserøde blomster.

A. oleraceum L. Vildt løg. VII-VIII. Alm.

A. flavum L. Gult løg. 8-50cm. 2-3 faste, blågrønne, -2mm brede blade. Længste svøbblade indtil 11cm. Blomsterstilkene næsten trådformede, 3-4 x blomsterne, de ydre ofte nedbøjede i blomst. VII-VIII. Spredt.
ssp. flavum: Blomsten citrongul. Støvtrådene gule.
ssp. tauricum (Besser) Stearn: Blomsten gullig eller næsten hvid, med grønt, lyserødt eller brunt skær. Støvtrådene ofte rødlilla foroven.

A. pulchellum G.Don Smukt løg. 20-50cm. Bladene 1-2,5mm brede, forneden med 3-5 fremtrædende ribber; omskeder 1/2-3/5 af stænglen. Stilkene 2-4 x blomsten. Rødlilla støvknapper. VII-VIII. Sj. (A. cirrhosum).

A. ampeloprasum L. Porreløg. 40-100cm. Kan have yngleknopper. Bladene (1/2)1-4cm brede, rurandede. Skærmen 5-9cm bred, kugleformet, mest tæt med 30-500 hvide til mørkerøde blomster. VI-VIII. Dyrket og forvildet.

A. atroviolaceum Boiss. Mørkt løg. 50-100cm. Bladene 4-12mm brede, med finttandet rand, omskeder 1/3-1/2 af stænglen. Skærmen 3-6cm bred, kugleformet. Ydre svøbblade spidse, indre butte. VI-VII. Sj.

A. scorodoprasum L. Skovløg. V-VII. 3 underarter:

ssp. scorodoprasum: Med rødlilla yngleknopper og 0-12 blomster. Alm. ssp. rotundum (L.) Stearn: Kugleløg. Ingen yngleknopper. Ydre blosterblade mørkt rødlilla, indre lysere med bred, hvidlig rand. Spredt. ssp. waldsteinii (G.Don) Stearn: Ingen yngleknopper. Ydre og indre blosterblade ensartet mørkt rødlilla.

Allium sphaerocephalon L. Hovedløg. 60-100cm. Mest uden yngleknopper. Bladene 1-4mm brede, hule, halvtrinde og furede. Skærmen 1-3(-6)cm bred med uens stilke. Blomsterne mørkt rødlilla eller hvide. VI-VII. Spredt.

A. vineale L. Sandløg. VI-VII. Spredt.

A. guttatum Steven Dråbepletsløg. 20-80cm. Skærmen 1,5-5cm bred. Indre blomsterstilke oprette, ydre nedbøjede. Blosteret 2,5-4,5mm, hvidt eller blegrødt med en rund, ofte rødlilla plet. VII-VIII. Sj. Østlig.

A. atropurpureum W.& K. Purpurløg. 50-80cm. Bladene grundstillede, 1-4 cm brede. Skærmen 3-7cm bred, knippeformet. Blosteret 7-9mm, stjerneformet udstående i blomst. V-VI. Spredt.

Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindley ssp. bulgaricum (Janka) Stearn Klokkeløg. 70-100cm. Bladene 1-3cm brede, kølede. Skærmen mangeblomstret. Stilkene hængende i blomst, oprette i frugt. Blosteret bredt klokkeformet, 14-16mm, mat grønlighvidt. V. Sj.

Convallaria majalis L. Liljekonval. V-VI. Alm.

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt Majblomst. V-VI. Alm.

Streptopus amplexifolius (L.) DC. Snoaks. 30-80cm. Minder om følgende slægt, men bladene mere tilspidsede og stænglen tydeligt zigzagbøjet. Blomsterne enlige på en knækket stilk, der er bøjet op under bladet. VII-VIII. Spredt.

Polygonatum. Konval.

1. Bladene smalt lancetformede, i kranse på 3-4(-8) ... verticillatum
" bredt elliptiske, spredte 2.
2. Stænglen trind. Blomsterne 2-4mm brede, smalle midtpå multiflorum
" kantet. " 4-9mm " , ikke indsnævrede midtpå 3.
3. Bladundersiden dunet. Bladene grønne. Lugtløse blomster latifolium
" glat. Bladene blågrønne. Duftende blomster odoratum

Polygonatum odoratum (Miller) Druce Kantet konval. V-VI. Alm.

P. latifolium (Jacq.) Desf. Bredbladet konval. 30-100cm. Bladene skinnende på begge sider. Blomsterne 1-5 sammen. Stænglen svagt dunet foroven. V-VI. Alm.

P. multiflorum (L.) All. Storkonval. V-VI. Alm.

P. verticillatum (L.) All. Kranskonval. V-VI. Alm.

Paris quadrifolia L. Firblad. V-VI. Alm.

Asparagus. Asparges.

1. Kladodierne stærkt trekantede i tværsnit, skinnende verticillatus
" ikke " " " , mest matte 2.
2. Stængler og grene finvortet-stribede ..... 3.
" " " jævne 4.
3. Kladodierne i knipper på 3-5(-10), krummede ..... brachyphyllus
" " " " 10-20 pseudoscaber
4. Kladodierne 3-8(-5) sammen, over 0,2mm brede ..... officinalis
" 10-30 sammen, 0,1-0,2mm brede tenuifolius

Asparagus verticillatus L. Trekantsasparges. 75-200m. Grenene stærkt furede. Kladodierne i knipper på 10-20, 2-5cm x 0,5-1,2mm, med 3 skarpe ribber. 2-10 blomster på 2-4mm mellem kladodierne. V-VI. Spredt.

A. brachyphyllus Turcz. (A. pallasii) Seglasparges. 25-50cm. Kladodierne 4,5-10mm. Blomsterne 2 sammen, ikke sammen med kladodierne, 4-6mm med stilke på 5-10mm. Rødt bær. VI. Jud.Constanţa.

A. officinalis L. Alm. asparges. V-VII. Alm.

A. pseudoscaber Grec. Flodasparges. -2m. Opret. Kladodierne 5-15 x 0,2-0,5mm. Blomsterstilkene 10-26mm. 1-2 blomster sammen mellem kladodierne, 4-6mm. Bærret 7-11mm, rødt. Spredt.

A. tenuifolius Lam. Stenasparges. 30-100cm. Opret. Kladodierne 1-2,5 cm. 1-2 blomster sammen mellem kladodierne på 6-8mm; stilkene 10-25mm. Bærret 10-16mm, rødt. V-VI. Alm.

Ruscus aculeatus L. Musetorn. 20-60cm. Halvbusk med mørkegrønne, stribede grene og mørkegrønne, æg-lancetformede, tornspidsede og stikkende kladodier på 20-30x8-14mm med blomster og frugter udgående fra midten af kladodiets overside. Blomsterne grønlige, 4mm. Rødt bær. II-V. Spr.

R. hypoglossum L. Tungeblad. 20-40cm. Som den foregående, men oftest ugrenet. Bladene 5-10cm, ikke stikkende. IV-V. Sj.

AMARYLLIDACEAE

Sternbergia colchiciflora W.& K. Stængelløs tordenurt. Ligner en gul, høstblomstrende krokus, dog med 6 støvdragere. Bladene dannes om foråret, 4-10cm x 2-5mm, væk under blomstringen. Stænglen mest underjordisk. Blosteret 3-4cm x 2-5mm. IX-X. Sj.

Leucojum. Hvidblomme. Nikkende blomster med 6 ens, hvide blosterblade med en grøn plet lige under den fortykkede spids.

L. vernum L. Vårhvidblomme. Dorothealilje. 12-35cm. Stænglen ofte længere end bladene. Blomsten mest enlig, 15-22mm. III-IV. Spredt.

L. aestivum L. Sommerhvidblomme. 35-60cm. Stænglen ofte kortere end bladene. En skærm på 2-5(1-7) blomster på 13-22mm. V-VI. Spredt.

Galanthus nivalis L. Vintergæk. Bladene flade. Indre blosterblade kun med grøn spids. II-III. Alm.

G. plicatus Bieb. Indrullet vintergæk. Bladene med noget omrullet rand i knop og selv som modne, med en svag, bleg stribe på oversiden. Indre blosterblades grønne spids undertiden ret stor. II-III. Jud.Tulcea.

Galanthus elwesii Hooker f. (G. graecus) 8-27cm. Bladene med hætteformet spids, indrullede i knop. Indre blosterblade med grøn plet både i spidsen og ved grunden. II-III. Sj.

Narcissus poeticus L. Pinselilje. Blosterbladene overlapper hinanden, 20-25mm, omvendt-ægformede til rundagtige. Bladene 6-10mm brede. Forv.

N. radiiflorus Salisb. (N. stellaris) Smalbladet pinselilje. 20-30cm. Blosterbladene næppe overlappende, 22-30mm, lancetformede. Bladene blågrønne, 5-8mm brede. V-VI. Spredt.

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L. Fedtblad. 1-4m. Slyngplante med spredte, ret store (5-10x3-8cm), hjærteformede, fedtglinsende blade med 3-9 buekrummede og grenede årer. Små, 6-fligede, grønne blomster i klaser fra bladhjørnerne. V-VI. Spredt.

IRIDACEAE

Sisyrinchium montanum Greene (S. angustifolium) Blåøje. 10-30cm. Bladene græsagtige, 2-3mm brede. Stænglen sammentrykt og vinget. 2-4 blå blomster sammen. Blosterbladene 10-18mm, med brodspids i et hak. V-VI. Sj. forvildet.

Iris. Sværdlilje.

1. Ydre blosterblade med en stribe gule hår ..... 2.
   " " uden hårstribe 11.
2. Blosterrøret (2)2,5-5 x frugtknuden. Lave planter ..... 3.
   " højst 2 x " 4.
3. Blomsterne gyldengule. Begge hylsterblade spidskølede .. suaveolens
   " ikke gyldengule. Hylsterbladene næppe kølede pumila
4. Stænglen lav, indtil 30cm, ugrenet, med 1-2 blomster af bleggul grundfarve. Bladene 1-10mm brede ..... 5.
   Ihvertfald de sene blade over 10mm brede 6.
5. Bladene 1-5(7)mm brede. Blomsterne m.m. lillabrogede ..... humilis
   " 5-10mm brede. Blomsterne bleggule reichenbachii
6. Stænglen grenet fra grunden eller midten. Bladene ofte mindst lig stænglen ..... 7.
   Stænglen kun grenet i øvre 1/2. Bladene ofte kortere end stænglen 8.
7. Stænglen 10-30(5-45)cm. Indre hylsterblad. 40-50x10-22mm hungarica
   " 40-60(30-75)cm. " " 5-6x3-4cm dacica
8. Indre blosterblade gule eller gulbrune, jævnt smallere nedadtil variegata
   Indre blosterblade lilla eller hvide, brat smallere nedadtil 9.
9. Hylsterbladene helt urteagtige ..... lepida
   " " eller delvist hindeagtige 10.
10. Hylsterbladene hindeagtige i øvre 1/3-1/2 ..... germanica
    " helt hindeagtige pallida
11. Blomsterne gule eller hvidgule ..... 12.
    " blå eller lilla 13.
12. Ydre blosterblade ca. 4cm brede. Bladene 15-20mm brede pseudacorus
    " " 13-18mm " . " 7-12mm " halophila

13. Stænglen stærkt sammentrykt, 2-vinget ..... graminea
" højst lidt sammentrykt, ikke vinget 14.
14. Frugtknuden med et smalt næb på 12-40mm ..... 15.
" uden næb 17.
15. Stænglen 40-80cm. Grundbladene 8-12mm brede ..... spuria
" højst 30cm. Grundbladene 1,5-5mm brede 16.
16. Hylsterbladene urteagtige. Ydre blosterblade 35-45mm sintenisii
" hindeagtige. " " 45-55mm pontica
17. Stænglen 3-10(20)cm. Hylsterbladene bleggrønne ..... ruthenica
" 50-120cm, hul. Hylsterbladene brune, hindeagtige sibirica

Iris sibirica L. Sibirisk sværdlilje. Stænglen lidt sammentrykt, ofte med 3 små blade. Grundbladene 4-10mm brede. 1-3 blå blomster med op til 10cm lange stilke og et 4-7mm langt blosterrør. V-VI. Spredt.

I. ruthenica K-G. Engsværdlilje. Stænglen med ofte 2 små blade. Blomsterne enlige, de ydre blosterblade hvide med lilla årer. Hylsterbladet hindeagtigt med lyserød rand. V-VII. Alm.

I. pseudacorus L. Gul sværdlilje. V-VII. Alm.

I. spuria L. Blå sværdlilje. 40-80cm. Ydre blosterblade blålilla med lilla årer og gul midterstribe. V-VI. Spredt.

I. halophila Pallas 40-90cm. Ydre blosterblade bleggule med mørkere årer. Hylsterbladene med hindeagtige kanter og spids. V-VI. Sj.

I. graminea L. Blommesværdlilje. 20-40cm. Bladene 5-15mm brede. Hylsterbladet helt grønt. 1-2 blomster med stærk frugtlugt. Ydre blosterblade noget tungeformede. V-VI. Alm. 2 underarter:
ssp graminea: Bladene kun tilsmalnede ved spidsen. Lilla blomster.
ssp. pseudocyperus (Schur) Soó: Bladene tilsmalnede fra midten. Blomsterne med gullilla grundfarve. Spredt.

I. sintenisii Janka Næbsværdlilje. 15-30cm. Hylsterbladene kølede. Blålilla blomster. Ydre blosterblade 8-12mm brede. Frugtknudens næb 12-22mm Planten ofte 2(3)-blomstret. V. 2 underarter:
ssp. sintenisii: Bladene 3-5(6)mm brede med 6-10 tydelige årer. Hylsterbladet ikke opblæst, utydeligt året. Sj. Jud.Tulcea.
ssp. brandzae (Prodan) Webb & Chater: Bladene 1,5-3,5mm brede, med 2-5 tydelige årer. Hylsterbladet ofte stærkt opblæst, tydeligt året. Spredt

I. pontica Zapał. (I. humilis Bieb.) Lav sværdlilje. Stænglen 1-4cm med 2-3 lange blade. Blomsten enlig, rødlilla, broget med hvidt, gult eller brunt. Ydre blosterblades negl så bred som pladen. V. Sj.

I. humilis Georgi (I. arenaria) Sandsværdlilje. Stænglen 5-12cm. Jordstænglen 2-5mm tyk. Ydre blosterblade gullighvide med lilla årer, indre rødlilla med mørkere årer. De ydre rundagtige. V-VI. Sj.

I. pumila L. Dværgsværdlilje. Stænglen højst 1cm. Bladene 4-17mm brede. Blomsterne enlige, gule, blå eller lilla. Hylsterbladene 5-10cm, hindeagtige foroven. Blosterrøret 4-9cm. IV-V. Alm.

Iris reichenbachii Heuffel Kølet sværdlilje. Stænglen 4-30cm. Bladene 5-10mm brede. 1-2 lilla til brunlilla eller grønliggule blomster, undertiden med lilla årer. Blosterrøret 15-25mm. V. Sj.

I. suaveolens Boiss.& Reuter Vellugtende sværdlilje. Stænglen 1-6(17) cm. Blosterrøret 35-50mm, ca. = blosteret. III-IV. Jud.Constanţa.

I. hungarica W.& K. (I.aphylla p.p.) 10-30cm. 3-5 lilla til rødlilla blomster. Hylsterbladet urteagtigt, ofte lillaspidset. V-VI. Spredt.

I. dacica Beldie (I. aphylla p.p.) Nær foregående. VI-VII. Sj.

I. variegata L. Broget sværdlilje. Stænglen 15-40cm. Bladene mørkegrønne, ofte krummede. Ydre blosterblade gullighvide med mørklilla til rødbrune årer. Hylsterbladet opblæst og urteagtigt. V-VI. Alm.

I. lepida Heuffel (I. variegata p.p.) 30-60cm. VI. Jud.Timiş: Liebling

I. germanica L. Havesværdlilje. 40-90cm. Bladene 2-4cm brede. Blomsterne blålilla, de ydre blosterblade med gullig grund. V-VI. Dyrk.& Forv

I. pallida Lam. Bleg sværdlilje. 15-120cm. Bladene 1-4cm brede, blågrønne. 3-6 lilla blomster. Hylsterbladene 2-3,5cm, sølvhvide. V-VI. Jud.Mehedinţi: Virciorova ved Jærnporten.

Crocus. Krokus.

1. Blomsterne gule ..... 2.
   " hvide eller lilla 3.
2. Støvfanget så langt som støvknapperne eller lidt længere chrysanthus
   Støvfanget kortere end støvknapperne flavus
3. Vårblomstrende: II-V. ..... 4.
   Høstblomstrende: VII-X 5.
4. Bladene ca. 1,2mm brede. Løghinden groft nettrævlet .. reticulatus
   " 4-8mm brede. Løghinden ikke " " vernus
5. Bladene 7-10mm brede. Løghinden kun nettrævlet øverst .. banaticus
   " 1-3mm " . " helt " pallasii

Crocus vernus (L.) Hill (C. heuffelianus) Vårkrokus. Løghinden med fine parallelle trævler eller svagt nettrævlet. Blosteret mest lillat. Griflen kort 3-grenet med udvidede og frynsede spidser. III-V. Alm.

C. reticulatus Steven Netkrokus. Ydre blosterblade med 3 mørklilla striber, spidse. Griflen dybt 3-grenet. II-III. Spredt.

C. flavus Weston Løghinden paralleltrævlet, ikke ringformet opsplittet forneden. Bladene 2,5-4mm brede. Griflen svagt delt i 3 korte grene. III-IV. Alm. (C. moesiacus).

C. chrysanthus (Herbert) Herbert Guldkrokus. Løghinden jævn, papirs- eller læderagtig, ringformet opsplittende forneden. Bladene 0,5-2,5mm brede. Griflen 3-grenet. III-IV. Sj.

C. pallasii Goldb. Malurtskrokus. Bladene mangler ofte under blomstringen. Griflen rød eller mørkorange, dybt 3-grenet. IX-X. Jud.Const.

Crocus banaticus Gay Spidsblomstret krokus. Løghinden paralleltrævlet forneden, nettrævlet øverst. Bladene mangler under blomstringen. Griflen lyslilla, mangegrenet. VII-IX. Alm.

Gladiolus. Jomfrufinger. Bladene sværdformede. Røde blomster med krummet ryg på 2,5-5cm med lidt uens blosterblade. Akset tit ensidigt.

1. Støvknapperne længere end støvtrådene ..... italicus
" lig eller kortere end støvtrådene 2.
2. Støvfangene ægformede med brat tilsmalnet grund ..... illyricus
" spatelformede med jævnt tilsmalnet grund 3.
3. Løghinden paralleltrævlet. Kapslen så lang som bred ... imbricatus
" nettrævlet. Kapslen 14-16x8-10mm paluster

Gladiolus italicus Miller Markjomfrufinger. 40-70cm. Nedre skeder ofte røde, tit lysplettede. Akset ofte svagt toradet. Øverste blosterblade længere end de 2 ved siden af.

G. illyricus Koch Illyrisk jomfrufinger. 30-60cm. Blosteret 3cm, røret lidet krumt. Kapslen ca. så lang som bred. Løghinden paralleltrævlet, dog smalt nettrævlet øverst. 3-10 blomster. V-VI. Jud.Mehedinţi.

G. imbricatus L. Kratjomfrufinger. 30-60cm. 4-12 blomster. Blosterbladene ret ens. Blosterrøret tydeligt krummet. V-VII. Alm.

G. paluster Gaudin Kærjomfrufinger. 30-50cm. Akset med 2-5 blomster. Ellers som foregående. Vekselvåde enge. V-VI. Sj. Jud.Bihor, Jud.Arad.

Juncus. Siv. JUNCACEAE

1. Alle blade grundstillede, trinde og stængelagtige ..... 2.
Bladene forskellige fra stænglerne 7.
2. Blomsterstanden længere end eller lig sit støtteblad ..... 3.
" trængt til side af det lange, stængellignende støtteblad 4.
3. Blosteret gulliggrønt, mindst af kapslens længde ..... maritimus
" brunt, kortere end kapslen littoralis
4. Med krybende jordstængel ..... filiformis
Tueformet 5.
5. Nedre bladskeder sortbrune og skinnende ..... inflexus
" " gulbrune og matte 6.
6. Nøglet kugleformet sammentrængt. Stænglen rillet ... conglomeratus
Blomsternøglet oftest åbent. Stænglen jævn effusus
7. Hver enkelt blomst med 2 forblade ved grunden ..... 8.
Den enkelte " uden " " " 13.
8. Enårig ..... 9.
Flerårig 10.
9. Kapslen 2-3mm. Støvknappen 1/4-1/3 x støvtråden ..... minutulus
" 3-5mm. " ca. 1/2 x " bufonius
10. Bladskederne med lange, dybtfligede øren ..... trifidus
" uden dybtfligede øren 11.
11. Stænglen uden midterstillede blade ..... tenuis
" med 1-2 midterstillede blade 12.

12. Blosteret 1/2-2/3 x den gule til kastanjebrune kapsel compressus
" ca. lig den rød- til sortbrune kapsel gerardii
13. Blomsterstanden med 1-3 nøgler ..... 14.
" " mange nøgler eller enkeltblomster 15.
14. Nederste støtteblade bladagtigt. Oftest 2 nøgler ..... castaneus
1 nøgle uden bladagtige støtteblade triglumis
15. Alle blosterblade butte og blege ..... subnodulosus
Ydre blosterblade spidse, alle mørkebrune 16.
16. Bladene 5-11-kantede som friske ..... 17.
" ikke kantede 18.
17. Kapslen længere end blosteret, langnæbbet ..... atratus
" ca. lig blosteret, med en kort brod thomasii
18. Indre blosterblade tydeligt længere end de ydre ..... acutiflorus
Blosterbladene lige lange 19.
19. Indre blosterblade noget butte. Bladets tværsnit rundt .. alpinus
Alle " spidse. Bladets tværsnit elliptisk articulatus

Juncus maritimus Lam. Strandsiv. VI-VII. Sj. Østlig.

J. littoralis C.A.Meyer Hindeblomstret siv. 50-100cm. Stænglerne noget stikkende. Blosterbladene 2,5-3mm, bredt hindekantede, de ydre butte, de indre ofte længere. Kapslen 2,5-4mm, butspidset, VI-VII. Sj. Østlig.

J. filiformis L. Trådsiv. VI-VIII. Alm.

J. inflexus L. Blågråt siv. VI-VIII. Alm.

J. effusus L. Lysesiv. VI-VIII. Alm.

J. conglomeratus L. V-VI. Alm.

J. trifidus L. Trekløftsiv. 5-40cm. Krybende jordstængel med meget tætstillede stængler. 1-4 blomster sammen. Stænglen mest med 3 blade, der rager langt op over blomsterne. VII-VIII. Alm. Alpin. 2 underarter:
ssp. trifidus: 5-25cm. Stængelbladene som støtteblade for blomsternøglerne, disse mest med 2-3 blomster.
ssp. monanthos (Jacq.) Asch.& Gr.: Enblomstret siv. 20-40cm. Kun det øverste stængelblad som støtteblad for den oftest enlige blomst.

J. compressus Jacq. Fladstrået siv. VI-VIII. Alm.

J. gerardii Loisel. Harril. VI-VIII. Alm.

J. tenuis Willd. Tuesiv. VI-IX. Alm.

J. bufonius L. Tudsesiv. V-IX. Alm.

J. minutulus Albert & Jah. Spædt siv.

J. subnodulosus Schrank Butblomstret siv. VI-VII. Spredt.

J. atratus Krocker Sort siv. 30-100cm. Grågrøn plante. De friske blade med længderiller. Blosterbladene skinnende sorte. Kapslen trekantet-ægformet, næbbet ofte noget skævt. VII-VIII. Alm.

J. thomasii Ten. Kantet siv. 25-60cm. Bladene med kantet tværsnit og fladere rygside. 5-30 hoveder med 10-20 sortbrune blomster. Blosteret

tilspidset til brodspidset. Kapslen but med kort brod. VI-VII. Alm.

Juncus acutiflorus Ehrh. Spidsblomstret siv. VI-VII. Spredt.

J. alpinus Vill. Sodsiv. VI-VIII. Alm. 3 underarter:
ssp. fuscoater (Schreber) Lindb.f.: 30-60cm. Mange nøgler med ofte 3-10 mørkt rødbrune eller sortagtige blomster.
ssp. alpinus: 10-25cm. Ofte få nøgler med 2-3 kastanjebrune blomster. Kapslen mest sort, længere end blosteret. M.Rodnei ?. M.Tarcu.
ssp. carpaticus (Simk.) Borza: Som foregående, men kapslen kastanjebrun og af blosterets længde. Alm.

J. articulatus L. Glanskapslet siv. VII-VIII. Alm.

J. triglumis L. Trillingsiv. 6-15cm. Oftest tueformet. Endestillede, 3-5-blomstrede nøgler med oftest bleggule blosterblade, der er kortere end kapslen. VII-VIII. Spredt.

J. castaneus Sm. Kastanjesiv. Krybende med oftest enlige skud. 1-3 nøgler på 3-10 blomster med sortbrune blosterblade og påfaldende store frugter på 7-8mm. VII-VIII. M.Rodnei.

Luzula. Frytle.

1.	Blomsterne enlige	2.
	" i fler- til mangeblomstrede nøgler	4.
2.	Bladene 5-10mm brede, uden nogen kort brodspids	pilosa
	" 1,5-3mm " , med en 0,1-0,2mm lang brodspids	3.
3.	Blosteret gulligt med bred, hvid hindekant	luzulina
	" brunt med smal hindekant	forsteri
4.	Blomsterne i 2-10-blomstrede nøgler i en åben top	5.
	" i mangeblomstrede hoveder i skærm eller aks	7.
5.	Bladene glatte	alpinopilosa
	" randhårede	6.
6.	Blosteret hvidligt eller rødligt anløbent	luzuloides
	" brunt	silvatica
7.	Blomsterstanden aksformet og nikkende	spicata
	" skærm- eller hovedformet	8.
8.	Ydre blosterblade tydeligt (1/2mm) længere end de indre	9.
	Alle " m.m. lige lange	10.
9.	Blosteret sortbrunt	sudetica
	" gulliggrønt til lysebrunt	pallescens
10.	Støvknappen 3-6 x støvtråden. Griflen 1-2,5mm	campestris
	" højst 2 x støvtråden. Griflen 0,3-0,7mm	multiflora

Luzula campestris (L.) DC. Markfrytle. III-V. Alm.

L. multiflora (Retz.) Lej. Mangeblomstret frytle. V-VI. Alm.

L. pallescens Sw. Lysblomstret frytle. 10-30cm. Planten lyst gulgrøn, tættuet, uden udløbere. 5-20 hoveder med 5-20 blomster; det midterste hovede m.m. siddende, resten stilkede. VI-VII. Spredt.

L. sudetica (Willd.) DC. Sort frytle. 15-30cm. Planten græsgrøn, løsttuet, med underjordiske udløbere. Bladene tæt savtandede, de nedre 2-4

mm brede. 3-6 hoveder med 5-10 blomster, alle stilkede. VI-VIII.Spr.

Luzula spicata (L.) DC. ssp. mutabilis Chrtek & Krisa Aksfrytle. Mest 7-15cm. Bladene mest rendeformede. Akset ægformet, dets støtteblade langt randhårede. Blosterbladene med brodspids. VI-VIII. Spredt.

L. silvatica (Hudson) Gaudin Stor frytle. VI-VII. Alm.

L. luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott (L. albida) Bleg frytle. VI-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. luzuloides: Toppen åben. Blosteret hvidligt.
ssp. cuprina (Rochel) Chrtek & Krisa: Toppen m.m. sammentrængt. Blosteret rødligt anløbent.

L. alpinopilosa (Chaix) Breistr. ssp. obscura Fröhner Fingrenet frytle. 10-30cm. Bladene 3-6mm brede. Blosteret mørkebrunt. Kapslen trekantet-ægformet. VII-VIII. Spredt.

L. pilosa (L.) Willd. Håret frytle. IV-V. Spredt.

L. forsteri (Sm.) DC. Smalbladet frytle. 15-30cm. Uden udløbere. Nedre bladskeder rødlilla til lilla. V-VI. Sj.

L. luzulina (Vill.) DT & Sarnth. Gullig frytle. 10-25cm. Med 3-10cm lange, tynde, underjordiske udløbere. Nedre bladskeder gullige til brune. VI-VII. Sj.

GRAMINEAE

Aksgræsser: Småaksstanden består af et enkelt eller flere aks, hvor de enkelte småaks sidder m.m. lige på aksets akse, eller hvor hvert andet kan være kortstilket.

Duskgræsser: Småaksstanden danner en sammentrængt top, hvor man ved ombøjning kan erkende, at småaksene sidder på korte, grenede stilke og derfor ikke lige på aksen.

Topgræsser: Småaksstanden en top (eller klase) med for det meste synlige stilke.

Aksgræsser

1. Strået med flere aks ..... 2.
" " 1 aks 8.
2. Aksene m.m. tydeligt fingerstillede ..... 3.
" klasestillede 5.
3. Småaksene med en 8-16mm lang, knæbøjet stak ..... Dichanthium
" uden stak 4.
4. Skedehinden hårformet. Flerårig ..... Cynodon
" hindeagtig. Enårig Digitaria
5. Skedehinden hårformet ..... 6.
" hindeagtig 7.
6. Småaksstanden tæt og duskformet ..... Aeluropus
" åben og topformet Cleistogenes
7. Yderavnerne uens. Med eller uden stak ..... Echinochloa
" ens. Ingen stak Beckmannia

8. 2-6 småaks ved hvert led ..... 9.
   1 " " " " 12.
9. Småaksene med 4-6 blomster ..... Leymus
   " " 1(2) " 10.
10. 2 småaks ved hvert led ..... Taeniatherum
    3 " " " " 11.
11. Alle småaks stilkede ..... Hordelymus
    Midtersmåakset siddende Hordeum
12. Småaksene 1-blomstrede ..... 13.
    " flerblomstrede 14.
13. Akset ensidigt ..... Nardus
    " toradet Psilurus
14. 1 yderavne. Småakset vender kanten mod aksen ..... Lolium
    2 yderavner 15.
15. Yderavnerne længere end det 2-blomstrede småaks ..... Pholiurus
    " kortere " småakset 16.
16. Yderavnerne sylformede, med 1 ribbe. 2-blomstrede småaks Secale
    " ikke sylformede, med (1-)3-flere ribber 17.
17. Flerårig ..... 18.
    Enårig 21.
18. Akset 5-15mm, ægformet. Småaksene 3-7mm, uden stak .... Oreochloa
    " længere og forlænget 19.
19. Småaksene sidder på en kort (ca. 2mm lang) stilk ... Brachypodium
    " siddende 20.
20. De enkelte aksled højst 1mm. Småaksene skrået udstående Agropyron
    " " " mindst 2mm. " tiltrykte Elymus
21. Yderavnerne med 2 børstehårede køle ..... Dasypyrum
    " anderledes 22.
22. Inderavnernes ribber løber sammen mod spidsen ..... Eremopyrum
    " " " ikke sammen mod spidsen 23.
23. Yderavnerne hvælvede, med 2-4 tænder eller stakke ..... Aegilops
    " kølede, med 1-2 tænder Triticum

Duskgræsser

1. Med kraftige børster mellem småaksene ..... Setaria
   Uden " " " " 2.
2. Dusken lådden af lange stakke ..... Polypogon
   " ikke lådden af stakke 3.
3. To slags helt forskellige småaks: golde og frugtbare ... Cynosurus
   Småaksene ens 4.
4. Yderavnen med 1/2-1mm lange krogbørster ..... Tragus
   " uden krogbørster 5.
5. Småakset med 1 frugtbar blomst ..... 6.
   " " 2-flere frugtbare blomster 13.
6. Yderavnerne med en knudeformet fortykkelse ved grunden Gastridium
   " uden knude ved grunden 7.
7. Inderavnen med stak ..... 8.
   " uden stak 9.
8. Yderavnerne lige lange ..... Alopecurus
   " uens Anthoxanthum

9. Skedehinden hårformet. Enårig ..... Crypsis
" hindeagtig 10.
10. Småakset 11-13mm. Dusken 10-25cm ..... Ammophila
" mindre 11.
11. Yderavnen med en vinget køl ..... Phalaris
" uden en " " 12.
12. Inderavnen langhåret ..... Melica
" glat eller korthåret Phleum
13. Dusken noget ensidig ..... 14.
" alsidig eller toradet 15.
14. Enårig. Hindeagtig skedehinde ..... Sclerochloa
Flerårig. Hårformet " Aeluropus
15. Inderavnen med 2-5 brodspidsede tænder ..... Sesleria
" but eller spids 16.
16. Dusken forlænget, 2-15cm lang, alsidig ..... Koeleria
" ægformet, 5-15mm, toradet Oreochloa

Topgræsser

1. To slags småaks, frugtbare og golde, ganske forskellige Cynosurus
Småaksene ens eller ret ens 2.
2. Småakset med 1 frugtbar blomst ..... 3.
" " 2-flere frugtbare blomster 22.
3. Småaksene i grupper på 1 siddende og 1-2 stilkede ..... 4.
" stilkede 5.
4. Bladene 3mm brede. 1 siddende + 2 stilkede småaks .... Chrysopogon
" 1-7cm brede. 1 siddende + 1 stilket " Sorghum
5. Yderavnerne mangler eller meget små ..... 6.
" mindst af inderavnens længde 7.
6. Opstigende flerårig ..... Leersia
Opret enårig Oryza
7. Toppen 10-80cm, dækket af lange, hvide hår ..... Erianthus
" ikke " " " " " 8.
8. Småakset med 1 frugtbar og 1-2 golde blomster ..... 9.
" uden golde blomster 13.
9. Med hårformet skedehinde ..... Panicum
" hindeagtig " 10.
10. En lang, knæbøjet stak på 10-20mm ..... Arrhenatherum
Højst med en 5mm lang stak 11.
11. Småaksene ikke brune ..... Holcus
" brune 12.
12. Skeden ender i en spids modsat bladpladen ..... Melica uniflora
" uden en sådan spids Hierochloe
13. Modne inderavne tykkere end yderavnerne og skinnende ..... 14.
" " ej " " " 18.
14. Inderavnen uden stak ..... 15.
" med " 16.
15. Inderavnen korthåret på ryggen. Enårig ..... Zingeria
" glat Milium
16. Inderavnen glat ..... Piptatherum
" håret 17.

17. Stakken højst 1cm. Inderavnen jævnt langhåret (3-6mm) Achnatherum
Stakken mindst 1,5cm Stipa
18. Med en stak på 3-5 x inderavnen. Enårig ..... Apera
Stakken højst 2 x inderavnen 19.
19. Blomsten med hår ved inderavnens grund ..... Calamagrostis
" uden " " " " 20.
20. Inderavnen 1-ribbet. Skedehinden hårformet ..... Sporobolus
" 3-5-ribbet. Skedehinden hindeagtig 21.
21. Bladene 8-16mm brede ..... Phalaris arundinacea
" 1-3(-6)mm brede Agrostis
22. Inderavnerne omgivne af m.m. lange, hvide hår. Over 1m Phragmites
" ej " " lange hvide hår 23.
23. Skedehinden hårformet ..... 24.
" hindeagtig 27.
24. Enårig. Aflange småaks med små, taglagte avner ..... Eragrostis
Flerårig 25.
25. Inderavnen med 3 tænder eller spidser fortil ..... Danthonia
" " en enkelt spids 26.
26. Stænglen med 1 knæ. Yderavnerne ret ens ..... Molinia
" " flere knæ. Yderavnerne uens Cleistogenes
27. Inderavnen med en ryg- eller grundstillet, oftest knæbøjet stak, der kan være skjult bag yderavnerne ..... 28.
Inderavnen uden eller med en endestillet stak 35.
28. Enårige ..... 29.
Flerårige 31.
29. Småaksene 1,5-3,5mm ..... Aira
" 10-30mm 30.
30. Småaksene m.m. oprette ..... Ventenata
" hængende Avena
31. Småaksene 3-9mm. Stakkene 2-8mm ..... 32.
" 10-25mm. Stakkene 10-25mm 34.
32. Stakken kølleformet fortykket. Stærkt blågrøn ..... Corynephorus
" ikke kølleformet fortykket 33.
33. Stakken udgår fra inderavnens underste 1/3. 2 blomster Deschampsia
" " " " øverste 1/2. 2-4 " Trisetum
34. Nye skuds blade med indrullet, U-formet tværsnit Helictotrichon
" " " " fladt eller V-formet " Avenula
35. Den ene yderavne af småaksets længde ..... Melica
Begge yderavner kortere end småakset 36.
36. Småakset med 2 frugtbare blomster ..... Catabrosa
" " flere frugtbare blomster 37.
37. Inderavnen med hjærteformet grund. Hængende småaks ..... Briza
" uden " " 38.
38. Inderavnen kløvet, oftest med en stak fra kløftens grund Bromus
" ikke kløvet 39.
39. Enårig ..... 40.
Flerårig 41.
40. Inderavnen langstakket ..... Vulpia
" uden stak Poa

41. Inderavnerne hvælvede ..... 42.
" kølede 44.
42. Inderavnerne med en stak eller skarp spids fortil ..... Festuca
" butte eller afskårne fortil 43.
43. Øvre yderavne 3-ribbet. Inderavnen utydeligt 5-ribbet Puccinellia
" " 1-ribbet. " 7-11-ribbet Glyceria
44. Småaksene duskformet samlede i grenenderne. Nedre topgrene enlige ..... Dactylis
Småaksene ikke duskformet samlede. Topgrenene sj. enlige 45.
45. Inderavnen svagt kølet, spids eller med kort stak Bellardiochloa
" tydeligt kølet, uden stak Poa

Festuca. Svingel. Den nøjagtige bestemmelse af de smalbladede arter kræver et mikroskopisk bladtværsnit, og nøgle og beskrivelser bør derfor kun ses som vejledende.

1. Stængelgrunden med et 8-10cm langt og 1-2cm tykt hylster af bladskeder ..... paniculata
Intet sådant hylster af bladskeder 2.
2. Bredere blade mindst 5mm brede, flade eller furede ..... 3.
Alle blade under 5mm brede, ofte foldede 7.
3. Skedehinden tydelig, 1-3mm lang ..... 4.
" uskelnelig eller yderst kort 5.
4. Ingen udløbere. Bladskederne glatte ..... altissima
Med udløbere. Bladskederne randhårede drymeja
5. Inderavnen med en 10-15mm lang, snoet stak ..... gigantea
" uden stak eller denne højst 2,5mm og ret 6.
6. De nederste 2 topgrene med 1-3 og 4-6 småaks ..... pratensis
" " " " hver med 5-15 småaks arundinacea
7. Grundbladene gennemgående flade som friske ..... 8.
" børsteformede 9.
8. Uden stak ..... carpatica
Med " diffusa
9. Skedehinden 1/2-7mm lang, tydeligt synlig ..... 10.
" under 1/2mm 14.
10. Bladene meget stive og stikkende, blågrønne ..... eskia
" ikke stikkende 11.
11. Skedehinden spids og lang, 3-7mm ..... Bellardiochloa violacea
" højst 2-3mm 12.
12. Bladene ru mod spidsen. Toppen 2-4cm, opret ..... quadriflora
" jævne. Toppen 3-10cm, lidt nikkende 13.
13. Småaksene med 3-4 blomster, med gulgrøn grundfarve ..... xanthina
" " 4-9 " versicolor
14. Visne bladskeder optrævlede ..... 15.
" " ikke optrævlede 21.
15. Bladene friskgrønne og skinnende. Småaksene skinnende ..... 16.
" grågrønne og matte. Småaksene matte 17.
16. Inderavnen kun med enkelte randhår i spidsen ..... nitida
" randhåret hele vejen picta

17. Inderavnens stak højst 1mm ..... trichophylla
" " over 1mm 18.
18. Toppen 1-2,5cm. Stænglen 6-12(20)cm ..... bucegiensis
" 4-15cm 19.
19. Tæt tueformet, udløbere højst 2-5mm ..... nigrescens
Løst tæppedannende med udløbere 20.
20. Toppen 9-15cm, åben. Småakset mindst 8-blomstret ..... diffusa
" 6,5-14cm. Småakset med 6(-8) blomster rubra
21. Stængelbladene flade .....38.
" smalle 22.
22. Stakken gennemgående over 1/2 x inderavnen ..... 23.
" " under 1/2 x " 25.
23. Småakset med 3 blomster ..... panciciana
" " 4-6 blomster 24.
24. Toppen 5-12cm. Øvre yderavne 4,6-4,9mm ..... dalmatica
" 3-5,5cm. " " 4-4,5mm callieri
25. Bladene jævne, højst svagt ru mod spidsen ..... 26.
" ru, i det mindste mod spidsen 29.
26. Stakken højst 1mm ..... 27.
" over 1mm 28.
27. Løvskuddenes bladskeder helt åbne ..... vaginata
" " 1/2(-4/5) lukkede amethystina
28. Småaksene blågrønne med lillat anstrøg ..... pachyphylla
" " og stærkt blåduggede pallens
29. Bladene tydeligt langhårede på begge sider ..... wagneri
" højst filtede nær grunden 30.
30. Bladene mest under 0,5mm tykke ..... 31.
" " over 0,5mm " 34.
31. Stakken 0-0,4mm ..... tenuifolia
" 1/4-1/2 x inderavnen 32.
32. Stakken 1/3-1/2 x inderavnen. Topgrenene svagt ru ..... valesiaca
" 1/4-1/3 x " . " ru 33.
33. Strået mest rut foroven. Inderavnen 3,5-4,5mm ..... ovina
" næsten helt jævnt. " 2,6-3,4mm pseudovina
34. Småaksene bleggrønne. Strandplante ..... arenicola
" grønne, blågrønne eller lilla 35.
35. Toppen tæt. Småaksene ofte lilla ..... 36.
" m.m. åben. Småaksene ikke lilla 37.
36. Løvskudsbladskederne 1/4-1/3 lukkede. Alpin plante ..... airoides
" kun lukkede ved grunden stricta
37. Toppen (6)8-15cm. Inderavnen langt tilspidset ... pseudodalmatica
" 4,5-8(9,5)cm. Inderavnen ikke sådan rupicola
38. Inderavnen med en stak på 2-3,5(-6)mm ..... heterophylla
" uden stak porcii

Festuca altissima All. Skovsvingel. VI-VII. Alm.

F. drymeja Mert.& Koch Bjærgsvingel. 70-110cm. De golde skud med 2-3 pladeløse bladskeder, der hurtigt bliver trævlede og forsvinder. Toppen

10-30cm, åben og nikkende. Småaksene 7-8mm. VI-VII. Alm.

Festuca gigantea (L.) Vill. Kæmpesvingel. VII-VIII. Alm.

F. pratensis Hudson Engsvingel. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. pratensis: Ingen stak. Bladene 3-5mm brede og grønne.
ssp. apennina (De Not.) Hegi: En stak på 1/2 x inderavnen. Bladene 5-8 mm brede, lidt blågrønne på oversiden. Spredt.

F. arundinacea Schreber Strandsvingel. 3 underarter:
ssp. arundinacea: Inderavnen m.m. uden stak (under 1mm). Alm.
ssp. orientalis (Hackel) Tzvelev: Inderavnen med en stak på ca2mm. Bladene ret stive. Toppen kun nikkende foroven. Inderavnen ca. 6mm. Alm.
ssp. subalpina (Hackel): Inderavnen med en stak på 2-3mm. Bladene bløde. Hele toppen nikkende. Inderavnen 8-9mm. Spredt.

F. carpatica F.G.Dietr. 40-70cm. Tæt tueformet med udløbere. Bladene blågrønne. Ydre skeder på de kraftige løvskud er uden plade og skælliglignende. Toppen nikkende. Småaksene blegt gråguleagtige. VII-VIII. Spredt.

F. eskia Ramond Stikkende svingel. 30-35cm. Bladene 0,7-1,6mm tykke, ofte lidt krumme, jævne. Toppen 5-9,5cm, nikkende. Småaksene m.m. brogede. Stakken 0-1,5mm. ? (Pyrenæisk art).

F. quadriflora Honckeny (F. pumila) Lav svingel. 10-20cm. Bladene hårde, men ikke stikkende, ru i øvre halvdel; de golde skuds 1cm lange, de øvre 4-6cm. Småaksene rødt, brunt og gult brogede. Stakken 0,2-1mm. Sj.

F. versicolor Tausch Forskelligfarvet svingel. 15-50cm. Bladene 0,4-1,2mm tykke, de nedre 1/5-1/2 x de øvre. Løvskuddenes skeder 1/2 lukkede. Yderavnerne bredt hindekantede. Toppen nikkende. VII-VIII. Alm.2ssp
ssp. versicolor: Toppen 3-6cm med jævne grene. Småaksene med 4-6 blomster.
ssp. dominii Krajina: Toppen 6-8cm med ru grene. Småaksene med 6-9 blomster. M.Rodnei.

F. xanthina R.& Sch. 25-58cm. Bladene 0,3-0,7mm brede, bløde, halvbutte. Skederne ofte nedadvendt ru. Toppen 4-9,5cm, lidt nikkende, grenene m.m. tæt korthårede. Inderavnen bredt hindekantet.

F. paniculata (L.) Sch.& Th. Guldsvingel. 50-90cm. Bladene 2,2-4mm brede, ofte foldede, blågrønne ovenpå. Toppen åben. Småaksene 9-11mm, gyldentgule, uden stak.

F. porcii Hackel Syvribbet svingel. -90cm. Bladene 7-1,2mm brede. Skederne 2/3 lukkede. Toppen 13-18cm, åben, grenene ret langbørstede. Inderavnen ca. 6,2mm. Alpin.

F. amethystina L. ssp. orientalis Krajina Ametystsvingel. 30-60cm. Bladene 0,3-0,75mm tykke, ikke stive. Toppen 4-15cm, ret åben. Bladskederne ofte lilla. VI-VII. Spredt.

F. heterophylla Lam. Forskelligbladet svingel. 60-120cm. Stængelbladene flade og 1,5-2mm brede. Grundbladene 0,4-0,6mm tykke, med påfaldende rudeformet tværsnit. Grønne småaks. VI-IX. Alm.

Festuca nitida Kit. ssp. flaccida (Schur) MD. Skinnende svinegl. 20-40 cm. Bladene 0,3-0,6mm tykke. Strået tæt uldhåret foroven. Småaksene gulliggrønne. Stakken indtil 1/2 x inderavnen. VII-VIII. Alm.

F. picta Kit. Broget svingel. 25-40cm. Strået kortfiltet foroven. Bladene 0,4-0,6mm tykke, lidt stive. Småaksene grønne og lillabrogede. Stakken 1,2-2mm. VIII-IX. Spredt.

F. nigrescens Lam. (F. commutata) Vejsvingel. Bladene 0,4-0,7mm tykke, mørkegrønne; skederne fløjlshårede. Toppen smal, ofte ensidig. Alm.

F. rubra L. Rød svingel. VI-IX. Alm.

F. trichophylla (Ducros) Richter Grågrøn svingel. 30-60cm. Bladene 0,3-0,5mm tykke, stift oprette, ofte noget blågrønne. Toppen 6-10cm, smal, med påfaldende tynde grene.

F. diffusa Dum. Åben svingel. 50-100cm. Bladene ofte kun svagt foldede. Alm.

F. bucegiensis MD. 6-12cm. Bladene 0,3-0,65 mm tykke. Bladskederne rødbrune. Småaksene bleglilla med 3 blomster. Stakken 1,6-2,1mm. VI-VII. Spredt. 2100-2500m. M.Bucegi, M.Fagaraş, M.Paring.

F. tenuifolia Sibth. Finbladet svingel. 20-30cm. Stråene ofte stærkt ru foroven. Toppen 2-4cm. VI-VII. Spredt.

F. ovina L. Fåresvingel. V-VII. Alm.

F. airoides Lam. (F. sudetica) Violet fåresvingel. 10-30cm. Planten mørkegrøn, bladene stive, ofte længere end stråene. Toppen 2-5,5cm, tæt og kortgrenet, med stærkt ru topgrene. Alm. VI-VII.

F. vaginata W.& K. Violetskedet svingel. 25-60cm. Bladene 0,6-1,2mm tykke. Bladskederne stærkt blåduggede, med lillat skær, ofte tæt hårede. Toppen 9-15cm, med m.m. glatte grene, stærkt blådugget. VI-VII. Sj.

F. arenicola (Prodan) Soó 21-36cm. Bladene 0,4-0,7mm tykke, affaldende, blågrønne, m.m. stikkende og blåduggede. Toppen 3-12cm, smal med oprette grene. Småaksene med 3-4(6) blomster. V-VII. Jud.Constanţa: Constanţa. Jud.Tulcea: Letea, Cardon. Jud.Galaţi: Hanu Conachi.

F. pallens Host Stivbladet svingel. 30-40cm. Bladene 0,6-1mm brede, stive og blågrønne, stærkt blåduggede. Alm.

F. panciciana (Hackel) K.Richter Øret svingel. 15-35cm. Bladene 0,3-0,6mm brede, ru eller jævne. Toppen 3-6cm, tæt. Småaksene blågrønne eller grumsetlilla. Inderavnen 5,2-6,2mm. V-VI. Sj.

F. pachyphylla Degen 27-53cm. Stænglen jævn eller lidt ru foroven. Bladene 0,9-1mm brede, blågrønne, stærkt kølede. Toppen 5,5-8cm og tæt. Småaksene med 4-5 blomster. 1400-2000m. Spredt.

F. pseudovina Hackel Tyndbladet svingel. 20-30cm. Planten ikke blådugget. Småaksene blågrønne med svagt lillat skær. V-VIII. Alm.

F. wagneri (Degen & al.) Krajina 30-42cm. Strået dunet. Bladene 0,4-0,6mm brede, blågrønne og ru. Toppen 4-7,5cm, blågrøn. Sj. Jud.Timiş:

Timişoara. Jud.Mehedinţi: Hinova pe Dl. Stirmina.

Festuca valesiaca Schleicher Furet svingel. 20-30cm. Planten stærkt blådugget. Stænglen svagt ru foroven. Bladskederne glatte. Toppen smal, 3-7cm. Stakken 1,5-2,5cm. V-VII. Alm.

F. rupicola Heuffel Kantsvingel. Bladene sjældent blåduggede. Småaksene grønne, med 3-5 blomster. 2 underarter:
ssp. rupicola: 23-52cm. Strået rut foroven. Bladene ru hele vejen. Inderavnen 4,2-4,8mm.
ssp. saxatilis (Schur) Rauschert: 38-75cm. Strået jævnt. Bladene jævne, men oftest med ru spids. Inderavnen 6mm.

F. dalmatica (Hackel) K.Richter 30-58cm. Bladene meget ru, 0,5-0,8mm brede, ofte blåduggede. Toppen 5-12cm, ret tæt. Smaaksene blåduggede, med 4-6 blomster. Stakken 3-4,5mm.

F. pseudodalmatica Krajina 30-50cm. Bladene lange, ofte slapt overhængende. Skederne ofte med lillat skær, glatte. Bladene 0,4-0,7mm brede. Ofte kun lidt blomstrende. V-VI.

F. callieri (Hackel) Markg. 12-35cm. Strået rut foroven. Bladene 0,4-0,6mm tykke, stive, stærkt ru, blåduggede, korthårede ved grunden. Toppen ret tæt. Småaksene blågrønne og blåduggede. V-VI. Sj. Østlig.

F. stricta Host Stivtoppet svingel. 25-40cm. Bladene 0,5-1,0mm tykke, stive og blågrønne, stærkt ru ihvertfald foroven. Toppen 4,5-6cm, tæt sammentrængt og kortgrenet. V-VI. Sj.

Lolium. Rajgræs.

1. Yderavnen 1/3-3/4 x småakset. Med golde skud ..... 2.
" over 3/4 x " . Ingen golde skud 3.
2. Inderavnen mest med stak. Yderavnen højst ½ x småakset multiflorum
" uden stak. Yderavnen 3/4 x småakset perenne
3. Småakset 7-11mm. Yderavnen 7-10mm med 5 ribber ..... remotum
" 15-25mm. " 15-30mm med 7-9 ribber temulentum

Lolium perenne L. Almindeligt rajgræs. V-IX. Alm.

L. multiflorum Lam. Italiensk rajgræs. VI-VII. Spredt.

L. temulentum L. Giftigt rajgræs. 30-80cm. Enårig. Yderavnen mest 1-1½ x småakset. Inderavnen mest med en stak på 5-7mm. VI-VIII. Spredt.

L. remotum Schrank Hørrajgræs. 30-80cm. Enårig. Yderavnen mest lidt kortere end småakset. Inderavnen mest uden stak. VI-VII. I hørmarker.

Vulpia. Væselhale.

1. Inderavnen langt randhåret ..... ciliata
" glat 2.
2. Toppen 10-20cm, ofte buet, omsluttet af den øvre bladskede myuros
" 2-8cm, ret, fri af den øverste bladskede bromoides

Vulpia ciliata Dum. Randhåret væselhale. 20-40cm. Strået ofte med blade til toppen, denne 5-15cm. Nedre yderavne 0,1-1 . øvre 1,5-4mm. Sj.

Vulpia myuros (L.) Gmelin Stor væselhale. 10-50cm. Nedre yderavne 0,4-2,5mm, øvre 2,5-6,5mm. Stakkene 1-2 x inderavnen. V-VII. Alm.

V. bromoides (L.) S.F.Gray Langstakket væselhale. 10-50cm. Nedre yderavne 2,5-5mm, øvre 4,5-9mm. Stakkene ca. = inderavnen. V-VII. Sj.

Poa. Rapgræs.

1. Bladene 6-12mm brede. Bladskederne sammentrykte ..... 2.
   " 1-5mm " 4.
2. Øvre bladskeder jævne. Bladet jævnt tilsmalnet i en flad spids hybrida
   Øvre bladskeder ru. Bladene brat tilsmalnede i en hætteformet spids 3.
3. Øvre skedehinder 2,5-4mm og glatte. Planten gulgrøn ..... remota
   " " 0,5-1,5mm, randhårede. Planten blågrøn chaixii
4. Golde skuds blade toradede og udstående ..... cenisia
   " " " ikke toradede 5.
5. Nedre topgrene 1-2 sammen ..... 6.
   " " mest 3-10 sammen 15.
6. Nedre yderavne med 1, øvre med 3 ribber. Lave planter med mest liggende stængelgrund ..... 7.
   Begge yderavner med 3 ribber 8.
7. Støvknapperne 0,5-1mm. Skedehinden 1-3mm. Enårig. I-XII .... annua
   " 1,5-2,5mm. Skedehinden 1/2mm. Flerårig. V-VI supina
8. Stængelgrunden løgagtigt fortykket. Mest topspirende ..... bulbosa
   " ikke løgagtigt fortykket 9.
9. Stængelgrunden omgivet af fortykkede bladskeder ..... 10.
   " ikke omgivet af fortykkede bladskeder 14.
10. Bladene 2-5mm brede ..... 11.
    " 1/2-2mm brede 12.
11. Bladene grønne til lidt grågrønne, med næppe synlig bruskrand alpina
    Bladene stærkt blågrønne, med bred , lys bruskrand badensis
12. Bladene med smal, lys bruskrand. Inderavnen håret mellem ribberne molinerii
    Bladene uden bruskrand. Inderavnen glat mellem ribberne 13.
13. Grundbladenes skedehinde afrundet. Strået 20-30(15-40)cm .. media
    " " afskåret. " 6-15(30)cm pumila
14. Øverste knæ dækket af en bladskede. 2-3-blomstrede småaks .. laxa
    " " frit. 4-6-blomstrede småaks minor
15. Stænglen sammentrykt ..... 16.
    " trind 17.
16. Bladene 4-5mm brede og rurandede ..... rehmannii
    " 2-4mm " , med jævn rand compressa
17. Med underjordiske udløbere ..... 18.
    Uden " " 21.
18. Stænglen bladet ca. halvt op. Skedehinden 2-5mm ..... granitica
    " " 3/4 op eller mere. Skedehinden 0-1(-2)mm 19.
19. Bladene indrullede, 0,2-0,3mm brede, trådformede ..... stiriaca
    " flade eller foldede, over 1/2mm brede 20.

20. Bladene 0,75-1,5mm brede, de nedre stærkt foldede ... angustifolia
" 2-3mm brede, flade eller furede pratensis
21. Øverste skedehinde 3-10mm og spids ..... 22.
" " 0-3mm 24.
22. Grundbladene indrullet-børsteformede ..... Bellardiochloa violacea
" flade 23.
23. Nedre topgrene 4-8 sammen. Udløberne tynde og trinde ... trivialis
" " 3-4 " . " kødede og knudrede silvicola
24. Skedehinden 0-1/2mm ..... 25.
" mindst 1mm 26.
25. Stråbladskederne sammentrykte og kølede ..... rehmannii
" trinde, uden køl nemoralis
26. Strå og blade jævne. Løsttuet. Toppen 12-20(8-30)cm .... palustris
" " " ru. Tættuet 27.
27. Øverste knæ dækket af skeden. Toppen 6-17cm ..... versicolor
" " frit. Toppen 3-6(10)cm pannonica

Poa annua L. Enårigt rapgræs. Alm.

P. supina Schrader Lavt rapgræs. Alpin.

P. trivialis L. Almindeligt rapgræs. V-VI. Alm.

P. silvicola Guss. Knuderapgræs. 30-60cm. Som foregående, men med korte, overjordiske, perlesnorsformede, 2-3mm tykke udløbere. Skedehinden 5-10mm. V-VII. Spredt.

P. pratensis L. Engrapgræs. V-VI. Alm.

P. angustifolia L. Smalbladet rapgræs. V-VI.

P. granitica Br.Bl. ssp. disparilis (Nyar.) Nyar. Båndet rapgræs. 30-50cm. Bladene 2-3mm brede, friskgrønne. Toppen 5-7(9)cm, mest med gyldenbrunt eller bronzefarvet skær. VI-VII. Spredt. Alpin.

P. cenisia All. ssp. contracta (Nyar.) Nyar. (P. psychrophila) Toradet rapgræs. 25-45cm. Krybende jordstængel med over 10cm lange udløbere. Toppen 4-7cm, smal. Øverste skedehinde 2-3mm og afrundet. VII-VIII. Sj.

P. chaixii Vill. Sudetisk rapgræs. VI-VII. Alm.

P. hybrida Gaudin Bjærgrapgræs. 50-150cm. Bladene 6-8mm brede. Skedehinden afrundet og glat, 3-5mm. Inderavnens grund spredt uldhåret. Toppen 15-20cm. VII-VIII. Spredt.

P. remota Forselles Kæmperapgræs. VI-VII. Sj.

P. stiriaca Fritsch & Hayek Tyndbladet rapgræs. 50-80cm. Planten svagt blålig. Skedehinden 1-2mm, afrundet. Topgrenene oprette, meget ru. Toppen 7-11(4-18)cm. V-VI. Sj.

P. laxa Haenke Slapt rapgræs. 10-20cm. Planten søgrøn. Småaksene ægformede, 2-3-blomstrede. Topgrenene 0,2-0,3mm tykke, kantede og tydeligt længdefurede. VI-VIII. Spredt. Alpin.

P. minor Gaudin Lidet rapgræs. 5-30cm. Planten græsgrøn. Småaksene aflangt-ægformede. Topgrenene 0,1mm tykke, trinde, ikke furede. VII-VIII.

Poa compressa L. Fladstrået rapgræs. VI-VII. Alm.

P. palustris L. Stortoppet rapgræs. IV-VII. Alm.

P. nemoralis L. Lundrapgræs. V-VII. Alm.

P. rehmannii (Asch.& Gr.) Wo⁄. 30-40cm. Bladene 4-5mm brede, skederne ikke tiltrykte stråret og dækker knæet ovenover. Toppen 10-12cm, ofte med nikkende spids. V-VII. Fra M.Maramureş til M.Namira.

P. pannonica A.Kerner Rut rapgræs. 25-45cm. Bladene let foldede eller furede. Øvre blad sidder 7,5-13(17)cm fra toppen. Topgrenene stive og meget ru. Øvre yderavne 3,5-3,7mm. VI-VII. Sj. 2 underarter?:
ssp. pannonica: 35-45cm. Toppen ret bred, m.m. pyramideformet med lidt udstående, forlængede grene. ?
ssp. scabra (Asch.& Gr.) Soó: 25-30(35)cm. Toppen smal, aks- til ægformet, med korte, m.m. oprette grene.

P. versicolor Besser Broget rapgræs. 25-40cm. Bladene 1-2mm brede. Øvre blad sidder 2-6cm fra toppen, denne med lillat og gyldent skær. Øvre yderavne 4,5-5mm. IV-VII. Sj.

P. bulbosa L. Løgrodet rapgræs. V-VIII. Alm.

P. media Schur Tæt rapgræs. 20-40cm. Bladene 1-1,5mm brede, flade eller foldede. Skedehinden 1,5-2mm. Toppen tæt, 3-5cm, lillaanløben. Nedre grene mest enlige. Småaksene 4-7mm, 3-5-blomstrede. VI-VII. Spredt.

P. pumila Host 6-18cm. Bladene 2-5cm x 0,5-1,5mm, foldede eller flade. Planten grøn. Toppen 2,5-5cm, ægformet, grønlig til lillaanløben. Sj.

P. molinerii Balbis Furet rapgræs. 10-35cm. Planten blågrøn. Bladene ofte furede til stærkt foldede. Nedre skedehinder 0,5-2mm, ofte lasede, øvre 1-3,5mm, spidse. Småaksene ofte med lillat skær. VI-VII. Alm.2ssp:
ssp. molinerii: Stråret 7-35cm. Toppen løs og blød, 1-5cm. Småaksene med 3-10 blomster.
ssp. glacialis Beldie: Stråret 3-12cm. Toppen tæt, 0,8-2cm, med meget korte, stive grene. Småaksene ofte 2-3-blomstrede. M.Bucegi.

P. badensis Haenke Sandrapgræs. 15-40cm. Bladene flade til svagt foldede. Nedre skedehinder 1-2mm, øvre 3-6mm. Småaksene mest grønlige, ofte med lillat skær. Toppen 4-7cm, tæt og ægformet. V-VI. Sj.

P. alpina L. Fjældrapgræs. 5-30cm. Bladene mest 4-10cm, flade; knækker i selve pladen, når man hiver i dem. Øvre skedehinder 3-5mm, nedre 1-2 mm. Småaksene lillaanløbne, tætstillede i grenenderne. VII-VIII. Alm.

Bellardiochloa violacea (Bell.) Chiov. Violet rapgræs. 20-50cm. Svingelagtigt udseende. Bladene blågrønne, børsteformede, indtil 0,8mm tykke. Toppen sammentrængt, 6-12cm, grøn/lillabroget. VII-VIII. Alm.

Puccinellia. Annelgræs.

1. Yderavnerne m.m. spidse, den øvre 1,5-2,5mm ..... 2.
" butte, den øvre 2,8-3,5mm 3.

2. Bladene mest flade. Småaksene med 3-6 blomster ..... distans
" foldede. Småaksene med 4-8 blomster limosa
3. Strået næsten løgagtigt fortykket forneden. Ensidig top convoluta
" uden fortykket grund. Alsidig top transsilvanica

Puccinellia distans (L.) Parl. Udspærret annelgræs. V-VII. Alm.

P. limosa (Schur) Holmberg Sumpannelgræs. 10-40cm. Toppen tæt. Planten blågrøn. Småaksene ofte mørklillat anløbne. VII-VIII. Spredt.

P. convoluta (Hornem.) Hayek 20-70cm. Bladene blågrønne, børsteformet sammenfoldede. Toppen lang og smal med stive, oprette grene eller udspærret under blomstringen. VI-VII. Spredt.

P. transsilvanica (Schur) Jav. 30-60cm. Bladene grønne, foldede eller næsten flade. Toppen under blomstringen pyramideformet, åben, med tynde vandrette eller nedbøjede grene. VII-VIII. Spredt.

Sclerochloa dura (L.) Beauv. Stivaks. 5-15cm. Grågrøn enårig med kølede bladskeder. Aksene lidt ensidige. Yderavnerne bredt hvidt hindekantede. Inderavnerne kølede, senere hårde. V-VII. Alm.

Dactylis glomerata L. Almindeligt hundegræs. Blå- eller grågrøn. Begge yderavner stift randhårede på kølen. VI-VII. Alm.

D. polygama Horvat. Skovhundegræs. Lyse- til gulgrøn. Yderavnernes køle blot ru. VI-VII. Spredt.

Beckmannia eruciformis (L.) Host Radegræs. 30-150cm. Opret flerårig. Bladene 4-10mm brede, flade og ru. Skedehinden 5-8mm. Aksstanden 18-25 cm med 1-3cm lange, siddende aks. Småaksene 2,5-3cm, bugede. VI-VIII.

Cynosurus cristatus L. Almindeligt kamgræs. VI-VII. Alm.

C. echinatus L. Pindsvinekamgræs. 20-60cm. Enårig. Dusken ægformet, 1-4cm. Inderavnerne med 6-15mm lange stakke. Bladene 3-9mm brede. V-VII.

Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Tæppegræs. VI-VIII. Spredt.

Apera spica-venti (L.) Beauv. Vindaks. VI-VII. Alm.

A. interrupta (L.) Beauv. Børstevindaks. 20-50cm. Toppen mest under 10 cm lange, smal, med oprette grene, uregelmæssigt mellembrudt forneden. Stakkene 4-10mm. Småaksene 2-2,5mm. VI-VII. ?

Psilurus incurvus (Gouan) Sch.& Th. (P. aristatus) Slangehalegræs. 10-30cm. Stængler, blade og aks trådformede. Akset meget skørt og til sidst m.m. indrullet. Yderavnen et skæl på højst 1mm. IV-V. Sj.

Briza media L. Hjærtegræs. V-VIII. Alm.

Sesleria. Hovedgræs.

1. Inderavnen mest glat mellem ribberne; mellemste stak højst 1mm 2.
" håret mellem ribberne; mellemste stak (1-)2-4mm 3.
2. Dusken 15-20mm, grålig eller hvidlig. Øverste blad ½-1(2)cm rigida
" 10-14mm, blålig. Øverste blad 1-2cm caerulea

3. Bladene ru ovenpå og langs randen, især mod spidsen heuffleriana
" jævne 4.
4. Bladskederne tæt lådne ..... coerulans
" glatte bielzii

Sesleria heuffleriana Schur Hviddugget hovedaks. 25-80cm. Bladene stærkt blåduggede ovenpå som unge. Yderavnen 3,5-4,5mm, dens stak 0,5-2,5mm. IV-VI. Spredt. 2 underarter:
ssp. heuffleriana: Inderavnens mellemste stak 1,5-2mm. Spredt.
ssp. transsilvanica (Schur) Jav.: Inderavnens mellemste stak længere, ca. = inderavnen; de sidestillede tilsvarende længere. Jud.Cluj+Brasov.

S. bielzii Schur Trestakket hovedgræs. 15-40cm. Dusken 16(11-30)mm; støttebladene ved grunden æg- til lancetformede. Yderavnerne 4-10mm, deres stak indtil 4mm. Inderavnens mellemstak 2-3mm. VII-VIII. Alm.

S. coerulans Friv. 15-25cm. Dusken 15-20mm; støttebladene ved grunden store og afrundede. Yderavnerne 4-7mm, stakken 2(1-3)mm. Inderavnens mellemstak 3-4mm. VII-VIII. Alpin.

S. caerulea (L.) Ard. (S. uliginosa) Sumpblåaks. 10-50cm. Bladene blåduggede ovenpå. Yderavnerne randhårede. IV-VI. Sj. Moseplante.

S. rigida Heuffel (S. filifolia, S. haynaldiana) Smalbladet hovedaks. 10-50cm. Bladene blåduggede ovenpå. Tørbundsplante. IV-VII. Alm.

Oreochloa disticha (Wulfen) Link Radeaks. 10-15cm. Stråene med grålige skeder forneden. Planten tueformet. Bladene 0,6mm brede, foldede, stive og med 7 ribber. Akset 9-14x7-9mm, ægformet. VII-IX. Spredt. Alpin.

Melica. Flitteraks.

1. Inderavnen langhåret. Småaksene i en dusk ..... 2.
" glat 3.
2. Nedre skeder glatte. Dusken m.m. åben og ensidig ..... ciliata
" " langhårede. Dusken tæt, ikke ensidig transsilvanica
3. Småaksene i en valseformet dusk. Bladet 5-15mm bredt ... altissima
" i en åben klase eller top. Bladet 1-6mm bredt 4.
4. Småaksene oprette, med 1 frugtbar blomst ..... uniflora
" ofte nikkende, med 2 frugtbare blomster 5.
5. Skedehinden højst 1/2mm. Løsttuet og græsgrøn ..... nutans
" 1-2,5mm. Tættuet og grågrøn picta

Melica nutans L. Nikkende flitteraks. V-VI. Alm.

M. picta C.Koch Broget flitteraks. 30-60cm. Som den foregående, men uden udløbere. Inderavnerne grønne, hvidt hindeagtige og rødplettede i spidsen. Varme egeskove, kalksky. V-VI. Alm.

M. uniflora Retz. Enblomstret flitteraks. V-VI. Alm.

M. altissima L. Højt flitteraks. 60-150cm. Dusken 10-20cm, med korte, oprette grene, ofte mellembrudt forneden, med over 20 småaks. Småaksene 7-10mm, til sidst nikkende. V-VI. Spredt.

M. ciliata L. Skægflitteraks. 20-70cm. Planten grågrøn. Småaksene ble-

ge. Nedre yderavne 3/4-1 x så lang som den øvre. V-VI. Alm.

Melica transsilvanica Schur Duskflitteraks. 30-120cm. Planten grøn. Aksen dækket af de ofte brunligt anløbne småaks. Nedre yderavne 1/3-2/3 x den øvre. V-VI.

Glyceria. Sødgræs.

1. Stråene rette. Småaksene 4-10mm ..... 2.
" knæbøjede. Småaksene 8-30mm 3.
2. Yderavnerne 2-3 og 3-4mm. Topgrenene skrået oprette ..... maxima
" 1-1,5mm og 1,5-2,5mm. Topgrenene udstående til hængende arundinacea
3. Inderavnen med mørke ribbespidser og tydelige tænder declinata
" uden " " 4.
4. Inderavnen 5,5-7,5mm, spids. Toppen m.m. ensidig ..... fluitans
" 3-4,5mm, but. Toppen ikke ensidig 5.
5. Planten mørke- til blåliggrøn. Småaksene 10-20mm ..... plicata
" bleggrøn. Småaksene 8-14mm nemoralis

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Højt sødgræs. VI-VIII. Alm.

G. arundinacea Kunth Slapt sødgræs. 80-140cm. Bladene 5-10mm brede, ru ovenpå, gråliggrønne, glatte nedenunder, med to brunlilla pletter nederst på undersiden. Toppen 15-30cm, meget åben.

G. nemoralis (Uechtr.) Uechtr. Lundsødgræs. 40-100cm. Inderavnen med 3 kraftige og 4 svagere og kortere ribber, bredt afrundet. Småaksene mest 7-blomstrede. Øvre skedehinder med frynset rand. VI-VII. Spredt.

G. declinata Breb. Tandet sødgræs.

G. fluitans (L.) R.Br. Mannasødgræs. V-VIII. Alm.

G. plicata (Fr.) Fr. Butblomstret sødgræs. VI-VII. Alm.

Bromus. Hejre.

1. Nedre yderavne med 1 ribbe, den øvre med 3 ..... 2.
" " " 3-7 ribber, den øvre med 5-9. Enårige 10.
2. Enårig ..... 3.
Flerårig 5.
3. Toppen tæt, stift opret. Stakken 3-5cm ..... rigidus
" åben og udbredt. Stakken 1-3cm 4.
4. Toppen noget ensidig med dunhårede grene ..... tectorum
" alsidig med ru grene sterilis
5. Inderavnen uden eller med en højst 1,5mm lang stak ..... inermis
" med en over 3mm lang stak 6.
6. Topgrenene m.m. oprette ..... 7.
" udstående eller hængende 9.
7. Stængelgrunden omgiven af trævlede bladskeder ..... riparius
" ikke trævlet 8.
8. Med udløbere ..... pannonicus
Tueformet erectus
9. Alle bladskeder stift langhårede. Nedre topgrene 2 sammen ramosus
Øvre " tæt korthårede. 3-5 nedre topgrene benekenii

10. Stakken trind, udgår højst 1,5mm fra inderavnens spids ..... 11.
" flad forneden, udgår over 1,5mm fra spidsen 14.
11. Nedre bladskeder helt eller næsten helt glatte ..... secalinus
" " hårede 12.
12. Småaksene mest rødlillat spraglede. Støvknapperne 3,5-5mm lange før støvafgivningen ..... arvensis
Småaksene grønne. Støvknapperne højst 3mm lange 13.
13. Topgrenene mest kortere end småaksene. Inderavnens forhjørne afrundet ..... hordeaceus
Topgrenene mest længere end småaksene. Inderavnens forhjørne stumpkantet commutatus
14. Toppen tæt, stilkene meget kortere end småaksene ..... scoparius
" åben, nogle stilke lig eller længere end småaksene 15.
15. Toppen mest ensidig, med få, lidt sammentrykte småaks squarrosus
" alsidig, med mange, trinde småaks japonicus

Bromus rigidus Roth Stivtoppet hejre. 20-40cm. Bladene 4-6mm brede, tæt korthårede. Toppen 15-20cm, grenene kortere end småaksene; disse 2,5-3,5cm. Inderavnen 22-25mm. ?

B. sterilis L. Gold hejre. V-VI. Alm.

B. tectorum L. Taghejre. V-VII. Alm.

B. inermis Leyssner Stakløs hejre. VI-VII. Alm.

B. ramosus Hudson Sildig skovhejre. VI-VII.

B. benekenii (Lange) Trimen Tidlig skovhejre. VI-VII.

B. erectus Hudson Opret hejre. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. erectus: 40-90cm. Yderavnerne næsten ens. Toppen tæt. Alm.
ssp. transsilvanicus (Steudel) Asch.& Gr.: 30-40cm. Yderavnerne tydeligt uens. Toppen åben, grenene ofte med kun 1 småaks. Spredt.

B. pannonicus Kummer & Sendtner Ungarsk hejre. 30-70cm. Nær foregående. Blade og skeder med talrige, lange, grålige hår. Toppen 8-12cm. Yderavner 6-7mm. Stakken 7-8mm. V-VII. Spredt.

P. riparius Rehmann Trævlhejre. 30-90cm. Tættuet. Småaksene 2-3cm, mest bleggrønne, lancetformede, stakken 5-8mm. Inderavnen 11-13mm. Toppen 10-20x3-7cm. VI-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp. riparius: Inderavnen glat eller meget kort ruhåret.
ssp. barcensis (Simk.) Soó: Inderavnen silkedunet til tæt blødhåret.

B. secalinus L. Rughejre. VI-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp.secalinus: Småakset indtil 2cm, mest med 5-7(10) blomster. Inderavnen indtil 8mm. Stakken 0-7mm.
ssp. multiflorus (Sm.) Hegi: Småakset indtil 2,5cm, mest med indtil 15 blomster. Inderavnen indtil 11mm, stakken mest over 1cm.

B. commutatus Schrader Mangeblomstret hejre. V-VI. Alm.

B. hordeaceus L. (B. mollis) Blød hejre. V-VI. Alm.

B. scoparius L. Kosthejre. 10-30cm. Knæene ofte mørke. Toppen ægformet

og 3-5cm. Stakken 7-9mm, udstående og knæbøjet. V-VI. Sj.

Bromus japonicus Thunb. Stortoppet hejre. 20-80cm. Toppen åben, mest ret bred. Inderavnen 8-9mm, stakken 6-10mm. V-VII. Alm.

B. squarrosus L. Udspærret hejre. 20-60cm. Inderavnen 8-11x6-9mm, med stumpvinklet rand. Stakken ca. 10mm, stærkt udstående. Toppen meget åben. V-VI. Alm.

B. arvensis L. Agerhejre. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. arvensis: Inderavnen højst 7mm.
ssp. hyalinus (Schur) Dom.: De længste inderavner 8-10mm.

Brachypodium silvaticum (Hudson) Beauv. Skovstilkaks. VII-X. Alm.

B. pinnatum (L.) Beauv. Bakkestilkaks. 50-60cm. Med udløbere. Bladene mørkegrønne, undersiden ikke skinnende, altid flade. Småaksene 18-40mm og oftest rette. Akset med 6-8 småaks. VI-VIII. Spredt.

B. rupestre (Host) R.& Sch. Seglstilkaks. 50-100cm. Med udløbere. Bladene lysegrønne, med iøjnefaldende, delvist skinnende underside, undertiden indrullede. Akset med 8-10 oftest krumme 30-50mm lange småaks.

Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev ssp. sabulosus (Bieb.) Tzvelev (Elymus giganteus) Hestemarehalm. 60-100cm. Strået næsten altid kortháret under akset, dette 15-35cm. Småaksene 3-5 sammen ved hvert led. Bladene indtil 15mm brede. Yderavnerne 15-25mm. VI-IX. Alm. på sandstrand.

Elymus. Kvik.

1. Yderavnerne med ru ribber. Stakken oftest længere end inderavnen 2.
" " jævne ribber, højst med ru køl. Stakken mangler eller kortere end inderavnen 3.
2. Yderavnen længere end den nederste blomst, 15-20mm .. panormitanus
" kortere " " " " , 6-10mm caninus
3. Nedre småaks kortere end aksens led eller lig dem ..... 4.
Småaksene længere end aksens led. Med lange udløbere 5.
4. Ingen udløbere. Aksen med småtornede kanter ..... elongatus
Korte " . " " jævne kanter farctus
5. Yderavnen but eller afskåret ..... hispidus
" spids 6.
6. Bladene tynde, mest flade. Bladskederne ikke randhårede ... repens
" stive. Bladskedernes frie rand randhåret pycnanthus

Elymus panormitanus (Parl.) Tzvelev Storakset kvik. 80-100cm. Tueformet. Akset 10-20cm, ret løst. Yderavnen med 7-9 ribber. Inderavnen 12-15mm, med en stak på 20-30mm. V-VI. Sydvest.

E. caninus (L.) L. Hundekvik. VI-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. caninus: Inderavnens stak indtil 25mm.
ssp. biflorus (Brign.): Stakken indtil 1/3 x inderavnen, mest 2-4mm.

E. elongatus (Host) Runemark Langakset kvik. 60-90cm. Tueformet. Blågrøn. Bladene ru, indrullede i frugt, læderagtige. Akset 10-35cm, dets akse flad ud for småaksene. VI-VII. Sj. 2 underarter ?:

ssp. elongatus: Småaksene mest 10-17mm, ca. = aksens led. Inderavnen 9-10mm. Strandplante.
ssp. ponticus (Podp.) Melderis (E. ruthenicus): Småaksene mest 17-25mm, ofte meget kortere end aksens led. Inderavnen 10-13mm.

Elymus pycnanthus (Godron) Melderis Stiv kvik. 30-60cm. Bladene noget blågrønne, oftest indrullede. Akset meget tæt, 6-12cm. Småaksene ofte 3-4 x aksleddene. Oftest stakløs. VI-VII. Constanța la Mamaia. Sj.

E. repens (L.) Gould Almindelig kvik. VI-VII. Alm.

E. hispidus (Opiz) Meld. (E. intermedius) Grågrøn kvik. 30-80cm. Bladene grågrønne, ofte noget indrullede. Akset 10-20cm. De nedre småaks kun lidt længere end aksleddene. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. hispidus: Småaksene glatte. Alm.
ssp. barbatulus (Schur) Meld. (ssp. trichophorus): Småaksene hårede.

E. farctus (Viv.) Runem. ssp. bessarabicus (Savul.& Rayss) Meld. Strandkvik. V-VII. Sandstrand. Sj. Jud.Constanța.

Agropyron cristatum (L.) Gaertner Kamkvik. 30-60cm. Flerårig. Akset 3-5cm, kamformet toradet. Yder- og inderavner med korte stakke. Yderavnerne med 1 ribbe. Stængelgrunden ikke opsvulmet. Øvre blade mindst så lange som deres skede. V-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp. dunensis (G.Grinț.) Dihoru & Negrean: Straet glat under akset. Stængelbladene kun med korte hår. Planten blågrøn. Jud.Galați: Hanu Conachi, Torcești.
ssp. pectinatum (Bieb.) Tzvelev: Strået håret under akset. Stængelbladene med korte og lange hår. Grøn eller blågrøn. Spredt.

A. brandzae Pantu & Solacolu Nær foregående, men stængelgrunden opsvulmet. Øvre bladplader kortere end skederne. Bladene indrullede, børsteformede, stive og stikkende. VI-VII. Sj. 2 underarter:
ssp. brandzae: Strået glat eller rut under aks og knæ, marvfyldt under akset. Planten blågrøn. Jud.Constanța: Baltagești på Dl.Alah.Bair.
ssp. ciliatum (G.Grinț.) Dihoru & Negrean: Strået håret under aks og knæ, hult under akset. Planten grøn.

Eremopyrum. Steppekvik. Yderavnerne meget hårde som modne. Inderavnen læderagtig. Bladene flade.

E. triticeum (Gaertner) Nevski Dværghvede. 10-20cm. Bladene indtil 4cm x 1-2mm. Akset 10-17x6-10mm, meget tæt. Småaksene udspærrede. Yderavnerne med 1 ribbe, furede langs kølen. IV-VI. Sj.

E. orientale (L.) Jaub.& Spach Vreden steppekvik. 5-30cm. Bladene 3-6 cm x 2-3mm. Akset 15-25x9-15mm, tæt. Yderavnerne med 2-3 tydelige randribber, stærkt krummede, stivhårede på siderne. IV-VI. Jud.Vaslui.

Aegilops. Bukkekorn.

1. Akset (÷ stakkene) over 10 x så langt som bredt ..... cylindrica
" kort og m.m. ægformet 2.
2. Inderavnens stakke ca. = yderavnernes 4-5 lange stakke geniculata
" " kortere end nedre yderavnes 2-3 lange stakke 3.

3. De øvre 1-2 småaks golde. Akset brat tilsmalnet foroven neglecta
   Alle småaks frugtbare. Akset jævnt tilsmalnet opad lorentii

Aegilops cylindrica Host Smalakset bukkekorn. 20-40cm. Akset valseformet, 6-11cm uden stakkene. 1-2 grundstillede golde småaks. Endesmåaksets stakke 4-6cm. V-VII. Spredt.

A. lorentii Hochst. (A. biuncialis) Langstakket bukkekorn. 15-30cm. Yderavnernes stakke 2-3cm, inderavnen med 1-3 stakke på 5cm. Sj.

A. geniculata Roth (A. ovata) Alm. bukkekorn. 10-30cm. Akset 1-2cm med 1 goldt småaks forneden og 2-5 frugtbare med 3-6 blomster. Stakkene ru forneden. V-VII. Sj.

A. neglecta Req. (A. triaristata) Goldt bukkekorn. 10-30cm. Akset 3cm med 2 frugtbare småaks. Stakkene jævne. Sj.

Triticum. Hvede. Kun dyrkede arter.

1. Yderavnen 25-35mm, hindeagtig, skjuler ofte inderavnen polonicum
   " højst 15mm, ikke hindeagtig, skjuler ikke inderavnen 2.
2. Aksets akse skør, går i stykker som moden ..... 3.
   " " fast, går ikke i stykker som moden 5.
3. Småaksene med 2 blomster, heraf 1 frugtbar og med stak monococcum
   " " 3-5 blomster; oftest 2 frugtbare og med stak 4.
4. Akset løst, med kvadratisk tværsnit ..... spelta
   " tæt, med rektangulært " dicoccon
5. Aksets akse uden hårduske ved småaksgrunden ..... aestivum
   " " med " " " 6.
6. Akset 4-6cm, ægformet-elliptisk, sammentrykt fra siden ..... durum
   " 7-12cm, linjeformet, med næsten kvadratisk tværsnit turgidum

Dasypyrum villosum (L.) Cand. Børsterug. 20-60cm. Enårig. Akset 6-10 cm. Yderavnen med en stak på 25-32mm og to fremtrædende køle med bundter af korte børster. Inderavnens stak 35-41mm. V-VII. Spredt.

Secale. Rug.

1. Yderavnen med en stak på mindst 2 x selve avnen ..... silvestre
   " uden eller med en kort stak 2.
2. Flerårig. Aksets akse meget skør ..... montanum
   Enårig. Aksets akse fast cereale

Secale silvestre Host Sandrug. 20-50cm. Bladene 2-3mm brede. Akset mest 4-8cm, ofte bredere foroven. Aksen skør med langhårede kanter. Yderavnernes med en stak på 1,5-3(5)cm. V-VI. Sj.

S. montanum Guss. Bjærgrug. 30-80cm. Grågrøn, tueformet. Akset 4-8(11) cm, med randhårede kanter. Yderavnerne 8-10mm, rukølede. Inderavnen 8-13mm,med en stak på indtil 2,5cm. VI-VII. Sj.

S. cereale L. Almindelig rug. Dyrket.

Hordeum. Byg. Kun de vilde arter omtales.

1. Flerårig ..... 2.
   Enårig 3.

2. Strået med løgformet grund. Akset 5-15cm ..... bulbosum
" uden " " . " 2-5(6)cm secalinum
3. Midtersmåaksets yderavner randhårede ..... murinum
" " uden randhår 4.
4. Sidesmåaksenes yderavner uens, en bred og en smal ..... marinum
" " ens hystrix

Hordeum murinum L. Gold byg. VI-X. Alm. 2 underarter:
ssp. murinum: De sidestillede småakses indre inderavne randhåret på 1 side. Alm.
ssp. leporinum (Link) Arc.: De sidestillede småakses indre inderavne tvesidet randhåret. Jud.Constanţa: Agigea.

H. marinum Hudson Strandbyg. 5-30cm. Stænglen ofte med blade til akset. Øvre bladskede lidt opblæst, de nedre glatte eller med indtil 1/4 mm lange hår. V-VII. Spredt.

H. hystrix Roth Vejbyg. 10-30cm. Nedre bladskeder med 0,5-1mm lange hår. Akset som hos foregående.

H. bulbosum L. Løgrodet byg. 60-150cm. Grøn og tættuet. Nedre blade lådne. Akset linjeformet. V-VI. Sj.

H. secalinum Schreber (H. nodosum) Engbyg. Stænglen bladløs mindst i øvre 1/3. Alle yderavner reducerede til 12-15mm lange børster. V-VI.Sj.

Hordelymus europaeus (L.) C.O.Harz Skovbyg. VI-VIII. Alm.

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski (Hordelymus asper) Medusahovedbyg. 10-40cm. Enårig med trådformede, 0,2-0,6mm brede blade. Akset ca. 4cm med stakke på 5-12cm. Yderavnerne sylformede, sammenvoksede ved grunden. V-VII. Sj.

Avena. Havre.

1. Inderavnen glat. Småakset med 0-1 stak ..... sativa
" håret forneden. Småakset mest med 2 stakke 2.
2. Inderavnen ender i 2 stakformede børster på 4-6mm ..... barbata
" " i 2 tænder på 0,2-1,5mm 3.
3. Inderavnens hår 2-4mm. Småakset 16-25mm. Toppen mest alsidig fatua
" " 4-8mm. " 25-45mm. " mest ensidig sterilis

Avena barbata Pott Skæghavre. 30-100cm. Småakset 18-30mm. Inderavnen oftest hvidgult lådden, 12-18mm. Stakkene 3-6cm. V-VII. Sj. indslæbt.

A. fatua L. Flyvehavre. VII-VIII. Alm.

A. sterilis L. Gold havre. Inderavnens 2 tænder 1-1,5mm (0,2-0,5mm hos fatua). VII-VIII. Alm.

A. sativa L. Almindelig havre. Dyrket.

Helictotrichon decorum (Janka) Henrard Tvefarvet havre. 50-90cm. Grundbladene 2,5-4mm brede som flade, skinnende mørkegrønne nedenunder. Toppen 10-15cm. Småaksene 10-14mm med 2-3 blomster. V-VI. Spredt. M. Bistriţei, M.Giurgeu, M.Vilcan, M.Paring, Jud.Brasov: Brasov m.m.

Avenula. Havre.

1. Småaksene med 2-3(4) blomster. Stakken trind forneden .. pubescens
" " 4-8 blomster. Stakken fladtrykt " 2.
2. Inderavnen rødbrun i nedre halvdel ..... 3.
" ikke rødbrun i nedre halvdel 4.
3. Inderavnen længdefuret i nedre halvdel ..... compressa
" ikke længdefuret versicolor
4. Grundbladenes skeder meget stærkt sammentrykte ..... planiculmis
" " trinde eller svagt sammentrykte 5.
5. Bladene flade, 3-5mm brede, med sammentrykte skeder .... praeusta
" foldede, 1-1,5mm brede, med halvtrinde skeder pratensis

Avenula pubescens (Hudson) Dum. Dunet havre. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. pubescens: Småaksene 10-17mm, mest med 2-3 blomster. Nedre yderavne 7-13mm, den øvre 10-18mm og ca. så lang som blomsterne.
ssp. laevigata (Schur) Holub: Småaksene 15-20(26)mm, med 3-4 blomster. Yderavnerne 10-17(20)mm og 14-21(26)mm, den øvre længere end blomsterne

A. versicolor (Vill.) Lainz Broget havre. 20-50cm. Med underjordiske udløbere. Bladene 2-4mm brede, jævne, med påfaldende ru, hvid rand. Småaksene 10-13mm, brogede med brunt og lillat. VII-VIII. Spredt. Alpin

A. compressa (Heuffel) Sauer & Chm. Lundhavre. 30-70cm. Stænglen let sammentrykt forneden, grundbladenes skeder ligeså. Smaaksene 14-21mm, ensfarvet brunlige. VI-VIII. Spredt.

A. pratensis (L.) Dum. Enghavre. ?

A. praeusta (Rchb.) Holub Alpehavre. 25-70cm. Strået sammentrykt forneden. Grundbladene med hætteformet spids, blågrønne, ru foroven. Smaaksene grønne, kun lidt lillaanløbne. V-VII. Spredt. (H. prat. ssp. alp)

A. planiculmis (Schrader) Sauer & Chm. Fladstrået havre. 60-100cm. Grundbladene flade eller svagt foldede, langt randhårede mod grunden. Øvre skedehinder 3-10mm. Småaksene ofte brun-, lilla- og hvidbrogede.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. Draphavre. VI-VII. Alm.

Ventenata dubia (Leers) Cosson Bunkehavre. 30-60cm. Skedehinden 4-9mm, tungeformet og tilspidset. Småaksene 10-15mm, med 2-3 blomster, den nedre med en op til 4mm lang, lige stak, de andre med en 10-15mm lang, knæbøjet stak. VI-VII. Spredt.

Koeleria. Kambunke.

1. Yder- og inderavner m.m. butte ..... glauca
" " " spidse eller tilspidsede 2.
2. Inderavnen med en stak på ca. 1mm. Dusken 2-2,5cm ..... lobata
" højst med en brod på 0,5mm 3.
3. Småaksene 3,5-5mm ..... macrantha
" 6-8mm 4.
4. Tættuet. Stængelgrunden lidt løgformet. Blågrønne blade splendens
Løsttuet. " slank. Bladene sjældent blågrønne 5.
5. Småaksene dunede ..... eriostachya
" glatte pyramidata

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes Spinkel kambunke. 20-50cm. Grundbladene indtil 15cm, 1-2mm brede, flade eller foldede. Dusken 2-8x1cm, m.m. lappet, især forneden. V-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. macrantha: Bladene m.m. hårede. Dusken 4-8(10)cm, bleggrøn eller hvidlig.
ssp. transsilvanica (Schur): Bladene glatte. Dusken 2,5-4(6)cm, rødlig.

K. glauca (Schrader) DC. Klitkambunke. VI-VII. Spredt. 2 underarter:
ssp. glauca: Inderavnen 3-3,5mm. Dusken svagt lappet. Strået indtil 40cm
ssp. rochelii (Schur) Nyman: Inderavnen 4-4,5mm. Dusken tydeligt lappet. Strået indtil 60(100)cm.

K. lobata (Bieb.) R.& Sch. Løgrodet kambunke. 20-35cm. Bladene blågrønne og foldede. Småaksene bleggrønne eller lilla. V-VII. Sj. Østlig.

K. splendens Presl Skinnende kambunke. 20-45cm. Grundbladene 3-5(12)cm x ca.1mm, med hvidlige ribber og rand. Dusken 3-8cm, tæt, undertiden lappet forneden, glat til dunet. VI-VIII. Spredt.

K. eriostachya Pancic Uldhovedet kambunke. 30-50cm. Grundbladene 5-10 cm x 2-3mm, indrullede eller foldede. Dusken 2-8x1-1,5cm.

K. pyramidata (Lam.) Beauv. Dansk kambunke. 45-90cm. Grundbladene flade, 0,5-1,5mm langt, udstående randhårede forneden. Dusken 10-22cm. Spr.

Trisetum. Guldhavre.

1. Nedre blade toradede, ofte blågrønne ..... macrotrichum
   Bladene ikke " , grønne eller grågrønne 2.
2. Stænglen med 2 dækkede knæ ..... alpestre
   " " 3-5 frie knæ 3.
3. Småaksene gylden- til grønliggule ..... flavescens
   " brunlige til rødlilla 4.
4. Bladene 5-10mm brede. Inderavnen med glat køl ..... flavescens
   " 3-5mm " . " " randhåret køl fuscum

Trisetum macrotrichum Hackel Tophavre. 40-50cm. Bladene indtil 10mm brede, randhårede. Toppen 6-10x2-3cm, gullig, ret åben. Hårene ved blomstens grund 2,5-4mm lange. VII-VIII. Spredt.

T. flavescens (L.) Beauv. Guldhavre. V-VIII. Alm. 2 underarter:
ssp. flavescens: Småaksene gyldent- til grønliggule.
ssp. purpurascens (DC.) Arc.: Småaksene rødlilla. Toppen meget lang og bred, tæt.

T. alpestre (Host) Beauv. Alpeguldhavre. 15-30cm. Bladene ofte indrullede, 1-2mm brede. Topgrenene glatte. Småaksene ofte brunlige. VII-IX.

T. fuscum (Kit.) Schultes Mørk havre. 25-70cm. Bladene randhårede og noget dunede. Nedre skeder med ret tætte, nedadvendte hår. Stakken stærkt krummet og med 0,1-0,3mm lange hår forneden. VII-IX. Spredt.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. Mosebunke. VI-VII. Alm. 2 underarter
ssp. caespitosa: Småaksene 3-5mm, med 2(3) blomster.
ssp. parviflora (Thuill.) Rohlena: Småaksene 1,5-2,5mm, ofte 1-blomstrede.

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Bølget bunke. VI-VII. Alm.

Aira caryophyllea L. Udspærret dværgbunke. 10-30cm. Stilkene 1-2 x småaksene, disse 2,5-3mm med 2 stakke. V-VIII. Sj.

A. elegantissima Schur (A. elegans) Hårdværgbunke. 10-20cm. Stilkene 4-5(3-6) x småaksene, disse 1,5-2,5mm med 1 stak. V-VIII. Spredt.

Hierochloe australis (Schrader) R.& Sch. Løvengsfestgræs. 20-60cm. Tættuet, uden udløbere. Øvreste bladskede uden plade. Topgrenene med et bundt 0,1-0,3mm lange hår øverst. Stakken 1-4mm. III-IV. Spredt.

H. repens (Host) Simk. Duskfestgræs. 40-80cm. Med udløbere. Bladene blågrønne. Stænglen kun med knæ i nederste 1/4. Øverste bladskede med en 1-4cm lang plade. Stakken 0,2-0,5mm. IV-V. Spredt (H. "odorata").

Anthoxanthum odoratum L. Vellugtende gulaks. Alm.

Holcus lanatus L. Fløjlsgræs. VI-VIII. Alm.

H. mollis L. Krybende hestegræs. VI-VII. Spredt.

Corynephorus canescens (L.) Beauv. Sandskæg. VI-VII. Jud.Tulcea. ?

Agrostis. Hvene.

1. Inderavnen med en stak på 2-3mm. Grundbladene børsteformede ..... 2.
   " " " " på 0(-1)mm. Grundbladene mest flade 5.
2. 5-10(25)cm høj. Topgrenene helt glatte ..... rupestris
   10-70cm høj. Topgrenene ru 3.
3. Nedre topgrene 1-3 sammen. 1500-3000m ..... alpina
   " " 3-8 " . 0-1300m 4.
4. Sumpplante uden underjordiske, med overjordiske udløbere .... canina
   Sandplante med " , uden " " vinealis
5. Med overjordiske udløbere. Toppen sammenkneben efter blomstringen stolonifera
   Uden overjordiske udløbere. Toppen udspærret hele tiden 6.
6. Småakset 1,2-1,5mm. Yderavnerne ru over det hele ..... moldavica
   " 2-3,5mm. Yderavnerne kun ru yderst på kølen 7.
7. Skedehinden længere end bred ..... gigantea
   " bredere " lang capillaris

Agrostis canina L. Hundehvene. VI-VIII. Alm.

A. vinealis Schreber (A. coarctata) Sandhvene. VII-VIII. Spredt.

A. alpina Scop. Alpehvene. 10-30cm. Stængelbladene mest m.m. flade. Småakset 3-5mm. Inderavnen altid med stak, der udgår fra nær grunden.Sj.

A. rupestris All. Klippehvene. 5-10cm. Stængelbladene flade. Toppen rødbrun. Småaksene 2,5-3mm. Stakken ca. 3mm, udgår fra inderavnens midte. VII-VIII. Alm.

A. capillaris L. (A. tenuis) Alm. hvene. VI-VII. Alm.

A. gigantea Roth Stortoppet hvene. VI-VIII.

A. stolonifera L. Krybhvene. VI-VIII. Alm.

Agrostis moldavica Dobrescu & Beldie 70-120cm. Bladene 5-7mm brede. VII-VIII. Sj. Jud.Buzau: Piclele. Jud.Vaslui: Tacuta i V.Larga.

Gastridium ventricosum (Gouan) Sch.& Th. Gniddergræs. 10-40cm. Enårig. Tæt og lappet dusk. Let kendelig ved yderavnernes hvidlige knude forneden. Småaksene 3-4mm. V-VII. Sj. Jud.Constanţa: Murfatlar.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Skægaks. 10-40cm. Enårig. Toppen tæt og duskformet, halvt valseformet til svagt lappet, silkeagtigt gulgrøn. Småaksene 2mm. Yderavnerne med en stak på 5-7mm. IV-VIII. Sj.

Ammophila arenaria (L.) Link ssp. arundinacea H.Lindb.f. Sandhjælme. VI-VII. Sj. Sandstrand.

Calamagrostis. Rørhvene.

1. Småakset med tydeligt udragende stak ..... 2.
" " næppe udragende stak 3.
2. Bladene skinnende. Hårene 1/4 x inderavnen ..... arundinacea
" matte. Hårene 1/2-1 x inderavnen varia
3. Bladgrunden randhåret. Skedehinden 3-5mm ..... villosa
" glat 4.
4. Skedehinden 1-4mm lang ..... 5.
" 4-12mm " 6.
5. Toppen smal og tæt ..... stricta
" åben canescens
6. Toppen stift opret. Planten grågrøn ..... epigejos
" slap og lidt nikkende. Planten blågrøn pseudophragmites

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Bjærgrørhvene. VI-VII. Alm.

C. pseudophragmites (Haller f.) Koeler Flodrørhvene. 50-150cm. Inderavnens stak endestillet. Yderavnerne tydeligt ulige lange. VI-VII. Alm.

C. villosa (Chaix) Gmelin Håret rørhvene. 50-120cm. Stænglen opstigende, med lange udløbere. Stråbladsskederne 2-5mm, afrundede. Toppen løs.

C. canescens (Weber) Roth Engrørhvene. VII-VIII. Spredt.

C. stricta (Timm) Koeler (C. neglecta) Stivtoppet rørhvene. VI-VII.Sj.

C. arundinacea (L.) Roth Skovrørhvene. VI-VIII. Alm.

C. varia (Schrader) Host Pigrørhvene. 30-120cm. Stakken rager 1-2mm ud af småakset. Bladet 3-8mm bredt, blågrågrønt, undertiden med hårkrans ved grunden. VII-IX. Spredt.

Phleum. Rottehale.

1. Yderavnerne jævnt tilspidsede ..... 2.
" brat afskårne fortil 3.
2. Flerårig ..... hirsutum
Enårig subulatum
3. Enårig ..... paniculatum
Flerårig 4.
4. Dusken lappet ved ombøjning ..... 5.
" ikke lappet ved ombøjning 6.

5. Yderavnens køl jævn, ru eller kort randhåret ..... phleoides
" " langt randhåret montanum
6. Dusken bredt valse- til ægformet. Stakken ofte over 2mm .. alpinum
" valseformet. Stakken højst 2mm 7.
7. Skedehinden håret. Småakset 2,5-3,5mm ..... bertolonii
" glat. " 4,5-5,5mm pratense

Phleum pratense L. Engrottehale. VI-VIII. Alm.

P. bertolonii DC. Knoldrottehale. VI-VIII. Spredt.

P. alpinum L. ssp. alpinum (P. commutatum) Fjældrottehale. 20-50cm. Dusken 12-30x6-9mm, tæt, ofte grålilla. Yderavnerne med langt randhåret grøn køl og bred hindekant. VII-VIII. Alm.

P. montanum C.Koch Bjærgrottehale. 15-50cm. Stængelgrunden omgiven af blivende bladskeder. Bladene hvidt rukantede. Dusken 3-8cm x 4-7mm. VII-VIII. Spredt.

P. phleoides (L.) Karsten Glat rottehale. VI-VII. Alm.

P. hirsutum Honckeny Sæterrottehale. 30-60cm. Dusken indtil 10cm lang og 1cm bred. Yderavnerne lancetformede, 4,5-6mm, kølhårede, med kort stak. VII-VIII. Spredt.

P. paniculatum Hudson Stenrottehale. 10-30cm. Dusken 5-10cm x 4-7mm, smalt valseformet. Yderavnerne bredt kileformede, med en stak på 0,3-0,6mm, mest rukølede. V-VI. Spredt.

P. subulatum (Savi) Asch.& Gr. Tynd rottehale. 10-40cm. Dusken bleggrøn, 3-6cm x 4-6mm. Yderavnerne bådformede. V-VII. Sj. Jud.Constanţa.

Alopecurus. Rævehale.

1. Dusken ægformet, 1,5-4cm. Flerårig ..... laguriformis
" valseformet 2.
2. Stænglen knæbøjet opstigende. Yderavnerne butte ..... 3.
" opret. Yderavnerne spidse 4.
3. Stakken knæbøjet, 2 x inderavnen, udragende ..... geniculatus
" ret, indesluttet eller lidet udragende aequalis
4. Yderavnerne glatte, med smalvinget køl. Enårig ..... myosuroides
" hårede, uvingede. Flerårig 5.
5. Yderavnernes spidser parallelle eller indadbøjede ..... pratensis
" " lidt udadbøjede arundinaceus

Alopecurus pratensis L. Engrævehale. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. pratensis: Udløberne 3-4cm. Dusken grøn, indtil 10cm lang.
ssp. pseudonigricans O.Schwarz: Udløberne indtil 10cm lange. Dusken med sortagtigt skær, 4-5cm lang.

A. laguriformis Schur 30-50cm. Når foregående. Yderavnernes randhår 2-3mm. Alpin. VII-VIII. Spredt. M.Rodnei, M.Rarau, M.Fagaraş, M.Cozia, M.Paring, M.Retezat.

A. arundinaceus Poiret Sort rævehale. V-VII. Sj.

Alopecurus geniculatus L. Knæbøjet rævehale. V-IX. Alm.

A. aequalis Sobol. Gul rævehale. V-IX. Alm.

A. myosuroides Hudson Agerrævehale. V-VIII. Spredt.

Pholiurus pannonicus (Host) Trin. Skedespidshale. 5-15cm. Enårig. Akset 5-9cm, ret eller svagt krummet. Småaksene 4-5mm med 2 ens, stærkt ribbede yderavner med hindekant. V-VI. Spredt.

Phalaris arundinacea L. (Typhoides a.) Rørgræs. VI-VII. Alm.

P. canariensis L. Kanariegræs. 30-50cm. Enårig med ægformet dusk på 2-5cm. Bløde, indtil 9mm brede blade. Yderavnerne 7-9mm, vingede, blege, med en grøn stribe midtpå, hvorved dusken får et spættet udseende.

Milium effusum L. Miliegræs. V-VII. Alm.

M. vernale Bieb. Vårmiliegræs. 10-50cm. Opret enårig. Bladene ru og glatte. Skederne ru, ofte lilla og bredt hindekantede. Toppen 1,5-8cm med opret-udstående grene. Småaksene 2,5-3,5mm. V-VI. Sj.

Zingeria pisidica (Boiss.) Tutin (Agrostis p.) Fladbladet gaffelhvene. 20-35cm. Enårig. Bladene 1-3mm brede og flade. Toppen åben, blomsterstilkene 1,5-6mm. Småaksene 1,8-2mm. Yderavnerne med 1 og 3 ribber. Inderavnen pergamentagtig i frugt. V-VII. Spredt.

Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. (Oryzopsis v.) Grøn rishirse. 40-120cm. Opret flerårig med dunede skeder og glatte blade. Skedehinden højst 1/2mm. Toppen åben med m.m. oprette, hårtynde, bugtede grene på 1-2cm. Småaksene 3-4mm med en stak på 8-12mm. V-VII. Spredt.

P. holciforme (Bieb.) R.& Sch. (Oryzopsis h.) Storblomstret rishirse. -100cm. Skedehinden indtil 10mm. Toppen indtil 30cm, grenene opret-udstående. Småaksene 8-9mm, stakken ca. 10mm. V-VI. Sj.

Stipa. Stakgræs.

1. Stakken 1,5-2,5cm ..... bromoides
   " 12-45cm ..... 2.
2. Stakken ru, uden hår ..... capillata
   " med 2-7mm lange hår, fjerformet ..... 3.
3. Inderavnens hår danner ikke tydelige striber ..... lessingiana
   Inderavnen med (5)7 hårstriber ..... 4.
4. Bladet ca. 1/2mm bredt, med en lang, trådformet spids ..... tirsa
   " uden en trådformet spids ..... 5.
5. Bladundersiden håret ..... 6.
   " glat ..... 7.
6. Bladundersiden med mange, bløde, m.m. udstående hår ... dasyphylla
   " " få, m.m. tiltrykte hår samt småtornet ucrainica
7. Inderavnens randhår ender 3-4mm under stakken ..... 8.
   " " når stakken (eller ender 1mm under den) 10.
8. Stakkens nedre, snoede del håret ..... danubialis
   " " " " glat ..... 9.
9. Øvre bladskeder glatte eller dunede ..... joannis
   " " ru borysthenica

10. Strået foroven filtet, topgrenene m.m. også ..... epilosa
" glat til håret foroven 11.
11. Strået 25-40cm, ret tæt håret under toppen ..... eriocaulis
" 30-100cm, kun lidt håret under toppen pulcherrima

Stipa eriocaulis Borbas Klippefjergræs. Stakken 20-28cm. Inderavnen 15-18mm, dens ryghårstribe kortere end sidehårstriberne eller manglende. Bladskederne ofte fint og kort hårede foroven. V-VI. Sj.

S. pulcherrima Koch Langstakket fjergræs. Stakken 30-45cm. Inderavnen mest 20-23mm, dens ryghårstribe mindst så lang som sidehårstriberne. Bladskederne mest glatte. Bladet 2-3mm bredt, mest fladt. V-VI. Alm.

S. epilosa Martinovsky 40-80cm. Bladene 0,5-1mm tykke, oversiden glat. Inderavnen 18-21mm. Stakken 28-31cm.

S. dasyphylla (Lindem.) Trautv. Blødt fjergræs. 30-80cm. Bladene ca. 3mm brede som flade, 1mm som indrullede, grålige, med ca.1mm lange hår på begge sider. Yderavnerne bleglilla. V-VI. Sj. Stakken 30-45cm.

S. ucrainica P.Smirnov Blegt fjergræs. Nær foregående, men bladene altid indrullede, ca.0,5mm tykke. Nedre bladskeder ikke lilla. Inderavnen 17-19mm. IV-V. Spredt.

S. joannis Celak. Gråskedet fjergræs. 30-100cm. Bladene 1,5-2,5mm brede som flade, 0,5-1mm som indrullede, grønne, med op til 3mm lange hår i spidsen. Stakken 25-33cm. V-VI. Spredt.

S. borysthenica Klokov (S. sabulosa) Ruskedet fjergræs. 30-100cm. Bladene grå, spidsen glat eller svagt håret. Stakken 30-40cm. V-VI. Sj.

S. danubialis Dihoru & Roman 80-90cm. Bladene glatte på begge sider, ru på oversiden. Nedre bladskeder nedadvendt ru, øvre jævne. Inderavnen 23-25mm. Stakken 28-36,5cm. Sj. Jud.Mehedinti: Donaudalen mellem Gura Vaii og Dudaşu Schelei.

S. tirsa Steven Hestehalefjergræs. 30-70cm. Nyskuddenes blade påfaldende lange, indtil 90cm. Bladskederne m.m. glatte, gråbrune. Stakken indtil 40cm, hårene 5-6mm. VI-VII. Spredt.

S. lessingiana Trin.& Rupr. Smalfanet fjergræs. 40-80cm. Bladene indrullede, 0,4-0,5mm tykke. Skederne glatte og jævne. Stakken 12-20(25) cm. Inderavnen 8-11mm. Yderavnerne 20-30mm. V-VI. Spredt.

S. capillata L. Hårstakgræs. 30-100cm. Stakken 10-25cm, ru, men uden hår. Bladene grågrønne og børsteformede. Skedehinden 5-10mm, spids. Inderavnen 10-12mm. Yderavnerne 25-35mm. VII-VIII. Alm.

S. bromoides (L.) Dörfler Rank stakgræs. 60-100cm. Bladene indrullede, glatte, under 1mm brede. Skedehinden meget kort. Toppen 15-30cm, smal og fåakset. Yderavnerne ca. 10mm. Inderavnen 6-7mm. V-VIII. Sj.

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv. Rugræs. 60-120cm. Tueformet flerårig. Unge strå med skællignende bladskeder forneden. Reduceret skedehinde. Toppen 15-30cm, ret åben. Småaksene 8-9mm, med 3-6mm lange og hvide hår på den 3-4mm lange inderavne. VI-IX. Alm.

Phragmites australis (Cav.) Trin. Tagrør. VII-IX. Alm.

Danthonia decumbens (L.) DC. (Sieglingia d.) Tandbælg. VI-VII. Alm.

D. alpina Vest (D. provincialis) Klasehavre. 30-60cm. Blade og skeder glatte, 2mm brede. Småaksene 18-22mm, på ret oprette stilke, ca. 5 i alt. Inderavnen med en midterstak på 10-15mm og to sidestakke på 2-3mm. V-VI. Spredt.

Molinia caerulea (L.) Moench Blåtop. VI-IX. Alm. 2 underarter:
ssp. caerulea: Bladet 2-8mm bredt. Toppen smal med oprette grene. Nederste inderavne 3-4mm, m.m. afrundet foroven.
ssp. arundinacea (Schrank) H.Paul: Høj blåtop. 100-250cm. Bladet 6-12 mm bredt. Toppen med lange, noget udstående grene. Nederste inderavne 5-7mm, spids.

Nardus stricta L. Katteskæg. V-VI. Alm.

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. Kattefodsgræs. 10-25cm. Lange, nedliggende stængler med stive, udstående, ret korte blade. Dusken en tvesidet klase af m.m. siddende aks med toradet stillede småaks, 2,5-5cm lang, smalt ægformet og lappet. V-VII. Sj.

Cleistogenes serotina (L.) Keng Stivstrå. 30-60cm. Skuddene rette, de golde med toradede, udstående blade. Toppen med udspærrede, aksligne nende grene, 4-10cm. Småaksene 1-5-blomstrede. VII-IX. Alm. 2 ssp.:
ssp. serotina: Strået opret eller opstigende. Bladene flade, de nedre 4-7mm brede, udstående eller nedbøjede. Stakken højst 1mm.
ssp. bulgarica (Bornm.) Tutin: Strået mest liggende. Modne blade m.m. indrullede, de nedre indtil 3mm brede. Stakken 2-3mm.

Eragrostis. Kærlighedsgræs. Enårige med smalle og langagtige småaks. Yderavnerne så store som de taglagte inderavner.

E. pilosa (L.) Beauv. Slørkærlighedsgræs. 10-30cm. Nedre topgrene 3-6 sammen, bøjelige, med 3-4mm lange hår ved grunden. Småaksene 1-1,5mm brede, op til 5mm lange. Bladranden ukirtlet. VII-IX. Spredt.

E. cilianensis (All.) Hubbard Stort kærlighedsgræs. 20-30cm. Nedre topgrene 1(2) sammen, stive. Bladranden kirtlet. Småaksene 4-25x2-3,5 mm. Bladskederne glatte og kort randhårede. VI-X. Spredt.

E. minor Host Lidet kærlighedsgræs. 5-40cm. Som foregående, men småaksene 4-11x1,5-2mm. Bladskederne tæt udstående hårede med 1-2mm lange hår. VII-IX. Alm.

Sporobolus pungens (Schreber) Kunth Ribbensgræs. 20-50cm. Jordstænglen langt krybende i sandet. Golde skud med faste, indrullede, toradede blade. Toppen grålilla, stærktgrenet, tæt og sammentrængt. VII-X.Sj.

Crypsis aculeata (L.) Aiton Hovedsumpaks. 3-15cm. Enårig med m.m. opblæste skeder og blågrønne blade. Dusken pudeformet, bredere end lang, 1,5cm bred, med et svøb af 2(-4) udstående, stive blade med en noget tornagtig spids. VII-IX. Alm.

Crypsis schoenoides (L.) Lam. Ægformet sumpaks. 5-25cm. Som foregående, men dusken 2-4 x så lang som bred, ægformet og meget tæt, med svøbblade. VII-IX. Alm. (Heleochloa s.).

C. alopecuroides (Pill.& M.) Schrader (Heleochloa a.) Langakset sumpaks. 10-40cm. Enårig. Bladskederne ikke oppustede. Dusken uden svøbblade, valseformet, 4-10 x så lang som bred, ofte mørk. VII-IX. Alm.

Cynodon dactylon (L.) Pers. Hundetandsgræs. 10-40cm. Ligner Digitaria, Fingeraks, men let kendelig ved sine blågrønne, toradede blade. Småaksene 1-blomstrede med lancetformede yderavner og bådformede inderavner. Flerårig. VI-VIII. Alm.

Tragus racemosus (L.) All. Burreaks. 10-30cm. Liggende eller opstigende enårig. Bladene stift randhårede. Dusken 2-6cm, ofte mellembrudt forneden, valseformet, lilla, med 1-blomstrede småaks. VI-IX. Spredt.

Oryza sativa L. Ris. 70-150cm. Opret enårig. Skedehinden op til 20mm. Småaksene 7-9mm, med en lang stak eller uden stak. VII-VIII. Dyrket.

Leersia oryzoides (L.) Sw. Risgræs. 50-150cm. Opret flerårig. Bladene stærkt ru med hvidlig midterribbe. Toppen åben med bølgede grene, dog ofte m.m. indesluttet i den øverste bladskede. Inderavner 4-5mm. Spr.

Panicum miliaceum L. Alm. hirse. 30-100cm. Enårig med langhårede skeder og blade. Toppen stor, 10-30cm, tæt og noget vifteformet, lidt nikkende, med oprette grene. Småaksene 4-5,5mm. VI-IX. Dyrket og forv.

P. capillare L. Hårfin hirse. 30-50cm. Som den foregående, men småaksene 2-3mm, toppen mere åben, med hårfine grene. Skederne stivhårede.

Echinochloa. Hanespore.

1. Bladet langhåret ved overgangen mellem skede og plade phyllopogon
" anderledes 2.
2. Nedre yderavne 2/3 x den øvre og inderavnen ..... oryzoides
" " 1/4-1/3 x den øvre og inderavnen crus-galli

Echinochloa phyllopogon (Stapf.) Carv. Skægget hanespore. 50-150cm. Skederne kølede. Bladene 5-12mm brede. Aksstanden med hårduske ved leddene. Golde inderavne 4mm. VII-IX. Spredt.

E. crus-galli (L.) Beauv. Alm. hanespore. 30-150cm. Skederne sammentrykte. Bladene 5-15mm brede. Golde inderavne 3-3,5mm, mest med stak.

E. oryzoides (Ard.) Fritsch (E. hostii) Rishanespore. 80-150cm. Nedre yderavne 3,5mm. Golde inderavne 4,5-5mm. VII-IX. I rismarker.

Digitaria ischaemum (Schreber) Muhl. Lidet fingeraks. 10-40cm. Bladene glatte eller svagt hårede ved grunden , 5-6mm brede, ofte lilla. Øvre yderavne 2mm og lig den frugtbare inderavne. VII-X. Spredt.

D. sanguinalis (L.) Scop. Blodhirse. 20-50cm. Bladene ofte med udstående hår på 1-1,5mm, 8-12mm brede. 4-6 aks på 3-8cm. Øvre yderavne 1,5 mm og højst 3/4 x den frugtbare inderavne. VII-X. Alm. 2 underarter:
ssp. pectiniformis Henrard: Inderavnen med lange, stive randhår.
ssp. sanguinalis: Inderavnen uden lange, stive randhår.

Setaria. Skærmaks.

1. Børsterne med nedadrettede modhager, så de hænger i verticillata
" " opadrettede " , hænger ikke i 2.
2. Øverste inderavne stærkt tværrynket. Småaksene enlige ..... glauca
" " glat eller svagt rynket. Småaksene i grupper 3.
3. Dusken 2-3cm bred ..... italica
" under 1cm bred viridis

Setaria glauca (L.) Beauv. (S. pumila) Blågrønt skærmaks. 15-60cm. Planten grågrøn. Under hvert småaks 4-12 børster, der først er gule, senere ræverøde. Unge blade med lange hår ved grunden. VII-X. Alm.

S. viridis (L.) Beauv. Grønt skærmaks. 20-60cm. Dusken ikke mellembrudt, dens akse helt dækket. Alle børster 5-10mm, tynde og bøjelige.

S. verticillata (L.) Beauv. Kransskærmaks. 20-60cm. Skederne hårede på fladerne eller kun langs randen; bladene næsten glatte. Dusken mellembrudt forneden, aksen uden længere hår. VII-IX. Spredt.

S. italica (L.) Beauv. Kolbehirse. 60-120cm. Stænglen op til 1cm tyk. Småaksene 3-3,5mm, falder ikke af som en helhed, idet yderavnerne bliver siddende. VII-IX. Dyrket og forvildet.

Erianthus ravennae (L.) Beauv. (Saccharum r.) Sølvrør. 1-4m. Bladene indtil 1cm brede, men ofte indrullede, til sidst tit rødlige med hvide ribber. Toppen 30-50cm, hvidulden og lappet. Skedehinden 1/2mm med hår på 3-4mm. Småaksene omgivne af hår på 7-8mm. VIII-X. Sj. Østlig.

E. hostii Griseb. (E. appressus, Saccharum strictum) Rankt sølvrør. 1-1,5m. Bladene tyndere end hos foregående. Toppen 15-30cm, smallere. Skedehinden 2-3mm med hår på 1mm. Småaksene omgivne af hår på 2-3mm. VI-VII. Sj. Våde enge og flodlejer.

Sorghum halepense (L.) Pers. Vild durra. 50-150cm. Flerårig. Bladene 1-2cm brede med lys midterribbe. Toppen 10-30cm med brunlilla småaks på 4,5-6mm, uden eller med en stak på 5-15mm. VI-VII. Spredt.

S. bicolor (L.) Moench Negerhirse, Durra. 1-3m. Enårig. Bladene 2-7cm brede. Toppen 20-40cm, kraftig. Småaksene 4-6mm. VIII-X. Dyrket.

Chrysopogon gryllus (L.) Trin. Gyldent skæggræs. 30-100cm. Flerårig. Hårformet skedehinde. Toppen åben med udstående grene og gyldent/lillabrogede småaks i grupper på 3; 5-8mm, det midterste med en stak på 3-4 cm. VI-VII. Alm.

Dichanthium ischaemum (L.) Roberty (Botriochloa i.) Alm. skæggræs. 15-60cm. Tættuet flerårig. 4-6 fingerformede aks på 3-5cm med tiltrykte småaks i grupper på 1 siddende og 1 stilket. Stakken 10-15mm. Alm.

ARACEAE

Acorus calamus L. Kalmus. V-VII. Spredt.

Calla palustris L. Kærmysse. V-VIII. Spredt.

Arum maculatum L. Plettet lygtemand. 15-30cm. Hylsterblad 12-25(30)cm.

Kolben ca. 1/2 x hylsterbladet. Knolden vandret. IV-V. Alm.

Arum alpinum Schott & Kotschy 10-30cm. Hylsterbladet 8-13cm. Kolben ca. 2/3 x hylsterbladet. Knolden lodret. Bladene ikke plettede. Kolbevedhænget tenformet, 0,7-2cm, jævnt indsnævret i stilken, denne længere end den fortykkede del. IV-V. Spredt.

A. orientale Bieb. 15-40cm. Som foregående, men kolbevedhænget valseformet, ret tykt, 2-4,5cm langt, brat indsnævret i stilken, denne oftest kortere end den fortykkede del. III-IV. Spredt.

LEMNACEAE

Wolffia arrhiza (L.) Horkel Dværgandemad. Mindste europæiske blomsterplante. Bladene 0,5-1mm store, svagt hvælvede på oversiden, halvkugleformede på undersiden. Uden rødder eller ribber. Sj.

Lemna trisulca L. Korsandemad. Alm.

L. gibba L. Tyk andemad. Spredt.

L. minor L. Liden andemad. Alm.

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden Stor andemad. V-VI.

SPARGANIACEAE

Sparganium erectum L. Grenet pindsvineknop. VI-VIII. Alm. 4ssp.:
ssp. erectum: Frugten mørkebrun med kantet tværsnit, 5-8mm. Alm.
ssp. microcarpum (Neuman) Domin.: Frugten med trindt tværsnit, gulbrun og indsnøret midtpå, 5-8mm. Spredt.
ssp. neglectum (Beeby) Sch.& Th.: Frugten med trindt tværsnit, grågul, ikke indsnøret midtpå. Alm.
ssp. oocarpum (Celak.) Domin.: Frugten æg- til kugleformet, 5-8x4-7mm, ensfarvet lysebrun. Spredt.

S. emersum Rehm. Enkelt pindsvineknop. VI-VII. Alm.

S. minimum Wallr. Spæd pindsvineknop. VII-VIII. Spredt.

TYPHACEAE

Typha. Dunhammer.

1.	Bladene 1-2(3)mm brede. Hankolben 1,5-5cm	minima
	" 2-20mm brede. Hankolben 10-30cm	2.
2.	Han- og hunkolben skilte fra hinanden	3.
	Hankolben sidder lige over hunkolben	4.
3.	Bladene 2-4(7)mm brede. Hunkolben 3,5-9cm	laxmannii
	" 3-10mm brede. Hunkolben 10-35cm	angustifolia
4.	Bladene blågrønne. Den modne hunkolbe mørkebrun	latifolia
	" lyse- til gulgrønne. Den modne hunkolbe sølvgrå	shuttleworthii

Typha angustifolia L. Smalbladet dunhammer. VI-VIII. Alm.

T. minima Hoppe Liden dunhammer. 30-70cm. Hankolben 1,5-5cm, hunkolben lige så lang, mørkebrun, aflang eller ægformet. V-VI. Alm.

Typha laxmannii Lepechin Lys dunhammer. 80-120cm. Hankolben meget smallere end og 2-3(1,5-4) x så lang som hunkolben. Hankolben 9-15cm x 6mm. Hunkolben 3,5-9x2cm, lysebrun. VI-VIII. Spredt.

T. latifolia L. Bredbladet dunhammer. VI-VIII. Alm.

T. shuttleworthii Koch & Sonder Grå dunhammer. 1-1,5m. Hankolben mest 1/3-1/2 x hunkolben. Bladene 5-10(15)mm brede. VI-VIII.

CYPERACEAE

Scirpus. Kogleaks.

1. Aksene samlede i kugleformede hoveder ..... holoschoenus
" ikke " " " 2.
2. Blomsterstanden endestillet ..... 3.
" sidestillet 5.
3. Aksene 1-3cm lange. Stænglen trekantet ..... maritimus
" 3-8mm " 4.
4. Aksene mest enlige. Stænglen skarpt trekantet ..... radicans
" " 3-7 sammen. Stænglen but trekantet silvaticus
5. Tueformet ..... 6.
Med udløbere 8.
6. 40-100cm. Flerårig. Stænglen mindst 2mm tyk ..... mucronatus
3-30cm. Oftest enårige. Stænglen tynd 7.
7. Støttebladet 1/2-1 x stænglens længde ..... supinus
" under 1/2 x stænglens længde setaceus
8. Stænglen trind ..... 9.
" trekantet 10.
9. 2 støvfang. Dækskællene fint rødvortede ..... tabernaemontani
3 " . " jævne lacuster
10. Aksene 2-5 eller flere sammen ..... triqueter
" enlige, sjældent 2 sammen litoralis

Scirpus silvaticus L. Skovkogleaks. VI-VII. Alm.

S. radicans Schkuhr Buekogleaks. 40-100cm. Med lange, bueformede, golde, rodslående skud. Dækskællene uden køl og brod, brungrønne med grøn midterstribe. VI-VII. Sj.

S. maritimus L. Strandkogleaks. VI-VII. Alm.

S. lacuster L. Søkogleaks. VI-VII. Alm.

S. tabernaemontani Gmelin Blågrønt kogleaks. VI-VII. Alm.

S. mucronatus L. Sylkogleaks. 30-100cm. Stænglen trekantet, med bladløse skeder og forlænget støtteblad. Aksene 4-12mm, 2-20 sammen, med hvidlige dækskæl med grøn køl og rød rand. VII-VIII. Spredt.

S. litoralis Schrader Fjerkogleaks. 30-200cm. Stænglen med højst eet blad på 2-6cm. Aksene 5-15mm lange, mest stilkede. Dækskællene brune og hindekantede. Blosterbørsterne spatelformede. VII-VIII. Sj.

S. triqueter L. Trekantet kogleaks. 50-100cm. Stænglen med højst eet blad på 2-6cm. Aksene 5-15mm lange, mest stilkede. Dækskællene med butte lapper på hver side af udrandingen. Blosterbørsterne ikke spatelfor-

mede i spidsen. VII-VIII. Sj.

Scirpus supinus L. Knippekogleaks. 5-15cm. Stænglen trind. Skederne brune, de øvre med kort, furet plade. Blomsterstanden består af 3-10 5-7mm lange aks i et nøgle. VI-VIII. Spredt.

S. holoschoenus L. Kuglekogleaks. 30-100cm. Stænglen trind. Blomsterstanden tilsyneladende sidestillet, bestående af 1-10 kugleformede, stilkede hoveder på op til 12mm. VII-VIII. Spredt.

S. setaceus L. Børstekogleaks. VI-VIII. Spredt.

Blysmus compressus (L.) Panzer Fladtrykt kogleaks. VI-VII. Alm.

Eriophorum. Kæruld.

1. Et enkelt aks i toppen af strået ..... 2.
   2-12 aks i en skærm, med støtteblade 3.
2. Tæt tueformet. Stænglerne trekantede foroven ..... vaginatum
   Med udløbere. " trinde i toppen scheuchzeri
3. Aksstilkene flade og glatte ..... angustifolium
   " trekantede eller trinde, hårede eller ru 4.
4. Bladene flade, 3-8mm brede, kun trekantede yderst ..... latifolium
   " smalle, 1-2mm " , trekantede hele vejen gracile

Eriophorum angustifolium Honckeny Smalbladet kæruld. V-VI. Alm.

E. latifolium Hoppe Bredbladet kæruld. V-VI. Alm.

E. gracile Koch Fin kæruld. VI-VII. Spredt.

E. vaginatum L. Tuekæruld. VI-VII. Alm.

E. scheuchzeri Hoppe Snekæruld. 10-30cm. Nedre skeder gulbrune. Stråene stive, 2-3mm tykke, med nogle lidt opblæste bladskeder. Akset kugleRundt. VI-VII. Spredt.

Eleocharis. Sumpstrå.

1. Akset med 2-8 blomster. 3 støvfang ..... 2.
   " " 10-30 blomster 4.
2. Strået 0,5-1mm tykt. Akset 4-10mm ..... quinqueflora
   " 0,3-0,5mm tykt. Akset 2-4mm 3.
3. Strået firkantet. Udløberne uden knolde i spidsen ..... acicularis
   " trindt. Udløberne med knolde i spidsen parvula
4. Strået 0,3-0,5mm tykt. Tueformet flerårig ..... carniolica
   " 0,5-4mm tykt 5.
5. Tæt tueformet enårig ..... ovata
   Flerårige med udløbere 6.
6. Akset med 1 grundstillet dækskæl ..... uniglumis
   " " 2 grundstillede " 7.
7. Strået stift, mat til grågrønt ..... palustris
   " blødt, lyst grønt, noget gennemskinneligt 8.
8. Griffelgrunden højere end bred, forneden 1/3-1/2 x frugtens bredde ..... austriaca
   Griffelgrunden bredere end høj, forneden 1/2-2/3 x frugtens bredde mamillata

Eleocharis quinqueflora (Hartm.) Schwarz Fåblomstret kogleaks. Sj.

E. parvula (R.& Sch.) Link Lavt kogleaks. VII-IX. Sj.

E. acicularis (L.) R.& Sch. Nålesumpstrå. VI-IX. Spredt.

E. ovata (Roth) R.& Sch. Ægsumpstrå. 3-40cm. Akset ægformet, 2-8mm. Frugten ca. 1mm lang, med skarp rand. Planten gulgrøn. VI-VIII. Spredt

E. palustris (L.) R.& Sch. Almindeligt sumpstrå. VI-VIII. Alm.

E. austriaca Hayek Skørt sumpstrå. VI-VIII.

E. mamillata Lindb.f. Blødt sumpstrå. 10-50cm. VI-VIII.

E. uniglumis (Link) Schultes Enskællet sumpstrå. VI-VIII. Spredt.

E. carniolica Koch Pudesumpstrå. 5-30cm. Ingen udløbere. Skederne blegbrune. Akset 3-13mm, blegbrunt, ofte topspirende. VII-VIII. Spredt

Fimbristylis bisumbellata (Forsskål) Bubani (F. dichotoma) Gaffelfrynseaks. Nærmest fladakslignende enårig på 3-15(30)cm med m.m. trekantet stængel med blade forneden. Aksene trinde. 2 støvfang. Griflen med udstående hår. Indtil 10-12 aks på 3-5mm i en grenet skærm, lyst rødbrune. VII-X. Sj.

Cyperus. Fladaks.

1. 2-8 siddende, tilsyneladende sidestillede aks ..... pannonicus
   Aksstanden endestillet 2.
2. Aksstanden består af 1-flere kugleformede hoveder ..... 3.
   " " ikke af " " 7.
3. Dækskællene med en krum stak på 1mm ..... hamulosus
   " uden nogen krum stak 4.
4. Dækskællene i 3 rækker, hvidlige ..... michelianus
   " i 2 " , rød- brun- eller gullige 5.
5. Dækskællene linje-lancetformede. Mest flerårig ..... glomeratus
   " æg-lancetformede. Enårig 6.
6. Aksene 2-8mm, med uvinget akse. Avnerne 0,5-0,7mm ..... difformis
   " 6-15mm, med smalvinget akse. Avnerne 2-2,5mm glaber
7. Flerårig ..... 8.
   Enårig 9.
8. 3 støvfang. Nødden trekantet ..... longus
   2 " . " linseformet serotinus
9. Stænglen butkantet. Aksene gullige. 2 støvfang ..... flavescens
   " skarpkantet. Aksene sortbrune. 3 støvfang fuscus

Cyperus longus L. Langt fladaks. 50-120cm. Med tykke, underjordiske udløbere. Stænglen sammentrykt. 2-10 aksgrene. Aksene 4-25mm. Dækskællene mørke- eller rødbrune med grønlig køl og lys rand. VII-VIII. Spr.

C. glomeratus L. Nøglefladaks. 30-70cm. 2-6 lange støtteblade, op til 9 aksgrene. Aksene 5-12x1-1,5mm. Dækskællene smalle, 1/2mm brede. Spr.

C. glaber L. Glat fladaks. 8-50cm. Aksene 6-15x2mm. Dækskællene 1,5mm brede. En ofte sammentrængt skærm af 2-7 tætte hoveder. Skederne mørke eller lilla. Bladene 3-4(2-6)mm brede. VII-VIII. Sj.

Cyperus fuscus L. Brunt fladaks. 2-35cm. Stænglen trekantet med indadbuede sider. Bladene 2-3mm brede, kølede. VII-VIII. Alm.

C. difformis L. Kuglefladaks. 20-75cm. Stænglerne uregelmæssigt trekantede. 3-8 korte skærmgrene. Avnerne rødlige eller brunlige med lysere midte. Strået 3-5mm tykt. VII-X. Spredt.

C. michelianus (L.) Link Treradet fladaks. 1-28cm. Enårig. 3-8 lange støtteblade. Aksstanden et tæt, siddende, æg- til kugleformet hovede. Avnerne hvidlige med grøn, fremspringende køl, tilspidsede. Spredt.

C. serotinus Rottb. Sildigt fladaks. 30-100cm. Dækskællene butte, rødbrune med grønlig midte og bred hindekant. Aksene 5-20x2-3,5mm. Spredt.

C. pannonicus Jacq. Ungarsk fladaks. 1-30cm. 2-3 støtteblade med mærkbart udvidet grund, det nederste opret i stænglens forlængelse. Oftest bladløs. Aksene 5-15x2-4mm. VIII-IX. Sj.

C. flavescens L. Gult fladaks. 3-30cm. Stænglerne trekantede med meget uens sider. Bladene 0,5-3mm brede, uden køl. Aksene 10x2,5mm.VII-X.Alm.

C. hamulosus Bieb. Krogfladaks. 2-15cm. Enårig. Bladene 1/2-1mm brede. 2-4 støtteblade. 1-flere brunlilla hoveder, det midterste siddende. Aksene 3- eller uregelmæssigt 2-radede. VII-VIII. Sj.

Cladium mariscus (L.) Pohl Avneknippe. VII-VIII. Spredt.

Rhynchospora alba (L.) Vahl Hvidt næbfrø. VII-VIII. Sj.

Schoenus nigricans L. Sortskæne. 10-60cm. Bladene 1/2-2/3 x stænglen. Støttebladet 2-5 x hovedet. 5-10 sortbrune småaks. Tæt tueformet flerårig med sortagtige nedre bladskeder. V-VII. Spredt.

S. ferrugineus L. Rustskæne. 15-30cm. Bladene højst 1/3 x stænglen. Støttebladet ca. = hovedet. 2-3 rødbrune småaks. V-VI. Sj.

Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori Børstesivstar. 5-20cm. Staragtig plante med et enkelt, linjeformet, brunt aks bestående af 2-blomstrede småaks med 1 han- og 1 hunblomst. Tættuet med trådformede, furede blade. VI-VIII. Spredt. (Elyna m.).

K. simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. Mosesivstar. 3-20cm. Ligner en lav star af fleraksgruppen. 3-10 aks med hanblomster øverst. Tættuet. Nedre skeder lyst orangebrune. Bladene 0,5-1,5mm brede, m.m. furede, ca. 1/2 x stænglens længde. Strået næsten trindt eller svagt kantet. Sj.

Carex. Star. Oversigt over grupperne.

1. Et enkelt aks i spidsen af stænglen ..... Gruppe I
   2-mange aks i et hovede, et aks eller en klase 2.
2. Alle aksene ens med både han- og hunblomster ..... Gruppe II
   Aksene forskellige 3.
3. Topakset hunligt øverst, hanligt nederst ..... Gruppe IV
   " hanligt i spidsen 4.
4. 2 støvfang ..... Gruppe III
   3 " 5.
5. 2-6 hanaks (se på flere planter) ..... Gruppe V
   1 " (sjældent 2) 6.

6. Frugterne dunede eller filtede ..... Gruppe VI
" glatte eller højst hårede langs kanterne Gruppe VII

Gruppe I: Et enkelt aks.

1. Planten tvebo med han- og huntuer ..... 2.
" enbo 3.
2. Tættuet, uden udløbere. Strået ofte rut foroven ..... davalliana
Løsttuet, med " . " " jævnt dioica
3. Tættuet ..... 4.
Med udløbere 5.
4. Nedre bladskeder skinnende. Bladene furede Kobresia myosuroides
" " matte. Bladene flade pyrenaica
5. Frugterne med meget kort næb, m.m. oprette ..... rupestris
" " tydeligt næb, udstående eller nedbøjede pauciflora

Gruppe II: Flere ens aks. Mest med 2 støvfang.

1. Aksene samlede i et hovede med 2-4 lange støtteblade ... bohemica
Aksstanden m.m. forlænget 2.
2. Med udløbere ..... 3.
Tueformet 12.
3. Få aks i en kort, nærmest ægformet stand ..... 4.
Flere aks i en forlænget stand 6.
4. Med overjordiske, krybende jordstængler. Strået jævnt chordorrhiza
" underjordiske jordstængler. Strået mest rut foroven 5.
5. Bladet furet-børsteformet, 1/2-1mm bredt ..... stenophylla
" fladt, 1-3mm bredt divisa
6. Frugten u- eller smalvinget ..... 7.
" tydeligt vinget 8.
7. 3-8 aks. Dækskællene ofte med brod ..... divisa
15-30 aks. Dækskællene uden brod disticha
8. Frugtens vinger bredest foroven ..... ligerica
" " næsten lige brede hele vejen 9.
9. Aksene lige ..... 10.
" m.m. krumme som modne 11.
10. Aksstanden 1,5-2cm lang, med 3-5 aks. Frugten 3mm ..... praecox
" 3-5cm lang, med over 6 ams. " 5mm repens
11. Dækskællene hvidlige. Bladene mest længere end stænglen brizoides
" grumsetbrune. Bladene ca. = stænglen curvata
12. Hunblomsterne sidder nederst i akset ..... 13.
" " øverst " " 24.
13. 3 støvfang. Frugten trekantet ..... 14.
2 " . " bikonveks 15.
14. Frugterne 2-3mm ..... Kobresia simpliciuscula
" 5-8mm curvula
15. Stænglen m.m. vinget, tværsnittet med indadbuede sider ..... 16.
" ikke " , " uden " " 18.
16. Frugterne 2-2,5mm. Støttebladene lange og piskeformede
vulpinoidea
Frugterne 4-6mm 17.

17. Støttebladene med mørkebrun, øreformet omfattende grund .. vulpina
" " bleggrøn grund otrubae
18. Aksene mørkebrune under blomstringen ..... 19.
" grønlige under blomstringen 21.
19. Aksstanden 1,5-3cm. Løsttuet ..... diandra
" 3-10cm. Tættuet 20.
20. Stænglens lavblade hestehårsagtigt optrævlede ..... appropinquata
" " hele paniculata
21. Frugten med en tydelig tværfure og svampet underdel ..... spicata
" uden tværfure 22.
22. Aksene tætsiddende; nederste aksmellemrum under 1cm ..... pairaei
De nedre aks med afstande på 1-4cm 23.
23. Frugten 3,5-4mm, blegbrun. Nedre aksmellemrum længere end aksene divulsa
Frugten 4,5-5mm, mørkebrun. Nedre aksmellemrum ikke længere end aksene polyphylla
24. Nedre støtteblade 10-20cm lange, bladlignende ..... remota
" " meget kortere 25.
25. Frugten med en bred vingekant ..... leporina
" uden vingekant 26.
26. 3-4(6) tætsiddende aks ..... 27.
Flere aks på række 28.
27. Stænglen meget ru foroven. Moseart .....heleonastes
" jævn, højst lidt ru foroven. Bjærgart lachenalii
28. Frugten uden næb. Akset med 2-5 hunblomster ..... loliacea
" med næb 29.
29. Frugterne udstående ..... 30.
" tiltrykte 31.
30. 3-5 runde aks med stjærneformet udstående frugter ..... echinata
7-12 aflange aks elongata
31. Aksene æg-kugleformede, 3-5mm lange. Akset 1,5-3cm ... brunnescens
" aflange, 5-10mm lange. Akset 3-6cm canescens

Gruppe III: Aksene forskellige. 2 støvfang.

1. Tættuet uden udløbere ..... 2.
Med udløbere 4.
2. Nedre bladskeder ikke netformet optrævlede ..... nigra
" " netformet optrævlede 3.
3. Nederste støtteblad op til 2cm. Hunaksene 1-2cm ..... caespitosa
" " 5-10cm. Hunaksene 3-6cm elata
4. Nederste skeder uden plade, stærkt optrævlede, rødbrune .... buekii
" " med bladplade, sjældent optrævlede 5.
5. Strået rut næsten helt til grunden ..... acuta
" jævnt eller kun rut foroven 6.
6. Nederste støtteblad så langt som sit aks ..... bigelowii
" " " " " aksstanden nigra

Gruppe IV: Flere hunaks. Tvekønnet topaks.

1. 2 støvfang ..... bicolor
3 " 2.

2. Øvre dækskæl brodspidsede. Aksene spredte ..... hartmannii
   Dækskællene ikke brodspidsede. Aksene mere tætsiddende 3.
3. Frugten jævnt tilsmalnet i et tokløvet næb ..... fuliginosa
   " brat " " " meget kort næb 4.
4. Nedre aks siddende eller højst 2-3mm stilkede ..... parviflora
   " " tydeligt stilkede 5.
5. Stænglen mest 15-30cm, jævn. Bladene 3-5(7)mm brede ..... atrata
   " " 30-60cm, ru foroven. Bladene 5-11mm brede aterrima

Gruppe V: Flere hanaks.

1. Frugterne uden tydeligt næb, ruprikkede eller hårede ..... flacca
   " med " " 2.
2. Uden udløbere. Nederste støtteblade længere end aksene ..... 3.
   Med " 4.
3. Frugten 9-10mm. Akset regelmæssigt 4-5-radet ..... hordeistichos
   " 5-7mm. Frugterne uregelmæssigt stillede secalina
4. Frugten håret ..... 5.
   " glat 6.
5. Bladene m.m. hårede, 2-5mm brede og flade ..... hirta
   " glatte, 1-2mm brede, furede lasiocarpa
6. Frugten lyst gulgrøn, opblæst, meget længere end dækskællet ..... 7.
   " grønbrun, næppe længere end dækskællet 8.
7. Stænglen jævn, bit trekantet ..... rostrata
   " ru foroven, skarpt trekantet vesicaria
8. Strået jævnt. Bladene 2-3mm brede ..... melanostachya
   " rut foroven. Bladene 5-15mm brede 9.
9. 2(3) hanaks. Frugten 3-4,5mm. Aksene 6-7(5-8)mm brede .. acutiformis
   3-4 " . " 5-7mm. Aksene 8-12mm brede riparia

Gruppe VI: Dunede frugter. 1 hanaks.

1. Planten med 1-2 grundstillede, mest langstilkede hunaks ..... 2.
   " uden " aks 3.
2. Frugten 2,5-3mm, kun randribberne tydelige ..... transsilvanica
   " 4-5mm, med tydelige længderibber hallerana
3. Frugten med et tydeligt, tvetandet eller tvekløvet næb ..... 4.
   " uden eller med et ganske kort næb 7.
4. Bladranden håret ..... pilosa
   " glat 5.
5. Hunaksenes dækskæl sort- eller rødbrune ..... sempervirens
   " " bleg- til orangebrune 6.
6. Tueformet. Bladene 3-5mm brede ..... brevicollis
   Ikke tueformet. Bladene 2-3mm brede michelii
7. Aksene fordelte langs hele stænglen, 2-4-blomstrede ..... humilis
   Hunaksene i stænglens øvre halvdel 8.
8. Hunaksene løse, rager ofte op over hanakset ..... 9.
   " tætte, " ikke " " " 11.
9. Strået endestillet, oftest bladet forneden ..... pediformis
   Stråene sidestillede fra bladrosetten, uden blade 10.
10. Hunaksene lidt adskilte, 4-10-blomstrede ..... digitata
    " fingerformet tilnærmede, 2-5-blomstrede ornithopoda

11. Nederste støtteblad bladlignende ..... 12.
" " hindeagtigt 13.
12. Tættuet, uden udløbere ..... pilulifera
Løsttuet, med udløbere tomentosa
13. Løsttuet, med udløbere ..... 14.
Tættuet, uden " 15.
14. Nederste støtteblads skede 0-1(2)mm ..... ericetorum
" " " 2-5mm caryophyllea
15. Nederste støtteblads skede 4-10mm ..... umbrosa
" " " 0-1(2)mm montana

Gruppe VII: 1 hanaks. Glatte frugter.

1. Hunaksene hængende ..... 2.
" oprette 10.
2. Hunaksene løse, med 5-8 blomster ..... capillaris
" med flere blomster 3.
3. Hunaksenes dækskæl grønlige ..... 4.
" " rødbrune til sortbrune 5.
4. Hunaksene tætte, 8-12mm brede ..... pseudocyperus
" løse, 3-5mm brede silvatica
5. Hunaksene 5-26cm lange. Bladene 1-2cm brede ..... pendula
" højst 2,5cm lange. Bladene 1/2-4mm brede 6.
6. Frugten kortnæbbet ..... 7.
" med tydeligt tokløvet næb 8.
7. Bladet 1-1,5mm bredt. Dækskællene kortspidsede, brune ..... limosa
" 2-4mm " . " langspidsede, sortbrune magellanica
8. Hunaksene 7-10mm brede ..... atrofusca
" 2,5-5mm " 9.
9. Frugtens næb glat. Bladene 1/2-1mm brede ..... brachystachys
" " rut. " 1-3mm brede sempervirens
10. Hunaksene med 2-6(10) blomster ..... 11.
" flerblomstrede 13.
11. Støttebladene uden plade, kun med skede. Hvidlige dækskæl .. alba
" med en kort eller lang bladplade 12.
12. Hunaksene fjærntsiddende. Frugterne 7-9mm ..... depauperata
" tætsiddende. Frugterne 2-2,5mm ornithopodioides
13. Bladene randhårede ..... pilosa
" ikke randhårede 14.
14. Hunaksene 4-8cm lange og 2-3mm tykke, løse ..... strigosa
" 1,5-4cm lange og 3-12mm tykke 15.
15. Bladundersiden korthåret. Frugten uden næb ..... pallescens
" glat 16.
16. Frugterne sortbrune eller skinnende brune ..... 17.
" lysere 19.
17. Frugterne sortbrune, 4-6,5(3,5-7,5)mm ..... sempervirens
" skinnende brune, 2,5-4mm 18.
18. Nederste støtteblad med en 5-10mm lang skede ..... liparocarpos
" " uden skede supina
19. Øvre hunaks oftest tætsiddende, kugle- til ægformede ..... 20.
" " langt adskilte, aflangt æg- til valseformede 23.

20. Frugten 2,3-4mm; næbbet 0,5-1mm, ret ..... 21.
" 4-7mm; næbbet 1,5-3mm, bøjet 22.
21. Lange, oprette støtteblade. Hundækskællene brodspidsede .. extensa
Støttebladene til sidst nedbøjede oederi
22. 3-4 hunaks. Nederste støtteblad 10-15cm langt ..... flava
1-2 " . " " indtil 5cm langt lepidocarpa
23. Hunaksene brogede med mørke dækskæl og grønne frugter .... panicea
" mere ensfarvede 24.
24. Frugten 5-7mm. Støttebladet ikke meget længere end akset michelii
" 3-4,5mm. Støttebladet en del længere end akset 25.
25. Hunlige dækskæl med tydelig hindekant, uden brod ..... hostiana
" " uden " " , med " distans

Carex dioica L. Tvebo star. Hunakset tætfrugtet. Frugterne 2,5-3,5mm, som modne opadrettede til udstående. IV-V. Spredt.

C. davalliana Sm. Rubladet star. 10-25cm. Hunakset løsfrugtet. Frugterne 3,5-4,5mm, som modne udstående til lidt nedadrettede. IV-V. Spredt.

C. pyrenaica Wahlenb. Udspærret star. 5-20cm. Bladene mest kortere end stråene, 1-2mm brede. Akset med 10-30 hunblomster. Frugterne 3-4mm, tenformede, skinnende rødbrune, ofte vandret udstående. VII-VIII. Spredt. M.Fagaraş, M.Cindrei, M.Paring, M.Retezat, M.Godeanu, M.Ţarcu.

C. rupestris All. Klippestar. 5-15cm. Bladene 1-2mm brede. Dækskællene mørkebrune, falder senere af end frugterne. Frugten omvendt ægformet, 2,5-3,5mm, grønligbrun. 3-6 hunblomster. VI-VII. Sj.

C. pauciflora Lightf. Fåblomstret star. 5-20cm. Bladene ca. 1/2mm brede. 2-5 frugter, 4-6mm lange, tenformede. VI-VII. Alm.

C. bohemica Schreber Fladaksstar. VI-IX. Sj.

C. chordorrhiza L.f. Grenstar. V-VI. Sj.

C. stenophylla Wahlneb. Smalbladet star. 7-25cm. Frugten rundagtigt ægformet, ret brat tilsmalnet i det tokløvede næb, tydeligt ribbet, kastanjebrun og skinnende. Dækskællene ca. = frugten. IV-VII. Spredt.

C. divisa Hudson Skænestar. 10-40cm. Løsttuet og grågrøn. Frugterne 3-4mm, ribbede og plankonvekse. Dækskællene ofte med brod, smalt hindekantede. Aksstanden 1,5-2,5cm. Hanblomsterne øverst. V-VI. Spredt.

C. disticha Hudson Toradet star. V-VI. Spredt.

C. ligerica Gay Skræntstar. IV-VI. Sj.

C. praecox Schreber Tidlig star. 10-30cm. Bladene mest længere end stråene. Frugten først vinget over midten, brat tilsmalnet i et dybt tvetandet næb. Kastanjebrune dækskæl. IV-VI.

C. repens Bell. Krybende star. 25-50cm. Vidtkrybende jordstængel. Lavblade og nedre skeder mørkebrune. Bladene meget rukantede. Frugten tydeligt vinget fra grunden, lysegrøn. V-VI. Sj. Jud.Alba, Jud.Sibiu.

C. brizoides L. Bævrestar. 30-60cm. Aksene bøjede under selve blomstringen. Frugten mest 3,5-4,5mm. Modne strå bøjede. V-VI. Alm.

Carex curvata Knaf 30-60cm. Aksene først bøjede efter blomstringen. Frugten mest 3-3,5mm. Dækskællet = frugten. IV-VI.

Carex curvula All. Klippestar. 5-20cm. Nedre bladskeder lysebrune. Aksstanden 1-2(3)cm, med 4-6 aks. Nederste støtteblad mest hindeagtigt. Stængler og blade krumme. Hunlige dækskæl rødbrune. VII-VIII. Spredt.

C. vulpinoidea Michx Piskestar. 30-100cm. Ligner de 2 følgende. Støttebladene brat tilsmalnede i en meget lang spids. Modne frugt strågul, uden ribber indvendigt, 3-ribbet udvendigt. VI-VIII. Jud-Salaj: Cehu Silvaniei. Indslæbt.

C. vulpina L. Rævestar. V-VII. Spredt.

C. otrubae Podp. Syltstar. V-VI. Alm.

C. diandra Schrank Trindstænglet star. V-VI. Spredt.

C. appropinquata Schum. Langakset star. V-VI. Spredt.

C. paniculata L. Topstar. V-VII. Spredt.

C. spicata Hudson Spidskapslet star. V-VI. Alm.

C. pairaei F.W.Schultz Pigget star. V-VII. Alm.

C. polyphylla Kar.& Kir. (C. leersii) Mellembrudt star. Frugterne 4,5-5 mm. Bladet 3-4mm bredt. V-VI. Alm.

C. divulsa Stokes Sydlig mellembrudt star. Frugterne 3,5-4mm. Bladet 2-3mm bredt. V-VII. Alm.

C. remota L. Akselblomstret star. V-VII. Alm.

C. leporina L. Harestar. VI-VII. Alm.

C. heleonastes L.f. Tørvestar. 15-40cm. Bladene 1-2mm brede, blaligt grønne. Aksstanden 1-2cm lang. Dækskællene bleg- til rødligbrune med brede hindekanter. V-VI. ?

C. lachenalii Schkuhr Rypestar. 10-20cm. Bladene 1-2mm brede, grønne, stive. Aksstanden 1-2cm. Dækskællene mørkt rødbrune. Strået butkantet, mest jævnt. VI-VII. M.Rodnei: Lacul Lala.

C. loliacea L. Nøglestar. 20-40cm. Bladene kortere end den opadtil svagt ru stængel. Aksene små, næsten kugleformede. Dækskællene hvidligbrune. VI-VII. Sj. Jud.Maramureş, Jud.Suceava.

C. echinata Murray (C. stellulata) Stjærnestar. V-VI. Alm.

C. elongata L. Forlænget star. V-VI. Alm.

C. brunnescens (Pers.) Poiret Sæterstar. 20-50cm. Som den følgende, men frugtens næb kløvet på ydersiden (ikke kløvet hos canescens). Bladene 1,5-2mm brede. VII. Sj.

C. canescens L. Grå star. V-VIII. Alm.

C. nigra (L.) Reichard Almindelig star. V-VII. Alm. 4 underarter:

ssp. alpina (Gaud.) Lemke: Med lange udløbere. Bladene ca. 1mm brede og bløde.
ssp. juncella Fries: Kortere udløbere og bredere blade, disse foldede eller indrullede som friske. Skedehinden 2-3x1,4-2,2mm. Spredt.
ssp. dacica (Heuffel) Soó: Uden lange udløbere. Flade blade. Nedre bladskeder sortlilla og skinnende. Alm.
ssp. nigra: Uden lange udløbere. Flade blade. Nedre bladskeder matte, grå- eller lysebrune. Skedehinderne 1-2x3-3,5mm. Alm.

Carex caespitosa L. Tuestar. IV-VI. Spredt.

C. elata All. Stiv star. IV-V. Spredt.

C. buekii Wimmer Damstar. 40-120cm. Bladet 4-7mm bredt. 1-3 hanaks. 3-5 hunaks, de nederste 4-10cm, senere ofte nikkende. Nederste støtteblade tydeligt længere end akset. V-VI. Spredt.

C. acuta L. (C. gracilis) Nikkende star. V-VI. Alm. 2 underarter:
ssp. acuta: Strået nikkende som modent. Mest 3-5 hunaks, nikkende eller hængende, det nedre langstilket. Avnen mindst lig frugten.
ssp. intermedia (Cel.): Strået rankt. Mest 2-3 korte, oprette hunaks, det nederste kortstilket. Avnerne kortere end frugterne.

C. bigelowii Torrey Rank star. 10-25cm. Bladet 4-6mm bredt. Strået påfaldende stift, 1,5-2mm tykt. ? (Drejer sig nok om C. nigra ssp. dacica)

C. bicolor All. Tofarvet star. 5-20cm. 1-2mm brede, lysegrønne blade. 2-4 ægformede, brogede aks på 1/2-1cm, det neder stilket. Lyst blågrønne frugter på 1,5-2,5mm uden næb. Mørke dækskæl. VII. M.Rodnei.

C. hartmannii Cajander Valsestar. IV-V. Spredt.

C. fuliginosa Schkuhr Buestar. 10-30cm. Tueformet. 3-4 1-2cm lange, mest 1-5cm langt stilkede og nikkende aks. Dækskællene rødlig- til sortbrune. Frugten 4-6mm, m.m. sortbrun. VII-VIII. Spredt.

C. atrata L. Sortstar. 3-5 m.m. oprette aks på 1-2cm. Frugten 3-4mm. VI-VIII. Alm.

C. aterrima Hoppe Høj sortstar. 3-5 m.m. nikkende aks på 1,5-3,5cm. Frugten 4-5mm. VI-VIII. Spredt.

C. flacca Schreber Blågrøn star. V-VI. Alm.

C. hordeistichos Vill. Bygstar. 10-30cm. Bladene 3-5mm brede, meget stive. Nederste hanstøtteblad længere end hanaksene. Hunaksene 2-3cm x 8-10mm. Nederste støtteblads skede 10-25mm. IV-V. Spredt.

C. secalina Willd. Rugstar. 10-30cm. Bladene 2-3mm brede, grågrønne. Nederste hanstøtteblade ikke længere end aksene. Kraftigere planter ofte med grenet aksstand. Nederste støtteblads skede indtil 40mm. V-VI.Sj.

C. hirta L. Håret star. IV-VI. Alm.

C. lasiocarpa Ehrh. Trådstar. V-VI. Spredt.

C. rostrata Stokes Næbstar. V-VI. Alm.

C. vesicaria L. Blærestar. V-VI. Alm.

Carex parviflora Host Lav sortstar. 10-20cm. Aksene kugle- til ægformede, 5-8mm lange, altid oprette, 2-4 i alt. VII-VIII. Sj.

C. melanostachya Bieb. Sumpstar. 30-50cm. Nedre bladskeder stærkt optrævlede,purpuranløbne. Frugten 3,5-5mm, med indsænkede ribber. Hunaksene næsten siddende til kortstilkede. V-VI. Alm.

C. acutiformis Ehrh. Kærstar. V-VI. Alm.

C. riparia Curtis Tykakset star. V-VI. Alm.

C. transsilvanica Schur (C. depressa ssp. t.) Langstilket star. 20-30 cm. Grundstillede aks 3-10cm langt stilket . Dækskællene bleg- til rødbrune. Hunaskene 10-20x4-7mm. IV-VII. Alm.

C. pilosa Scop. Randhåret star. 30-40cm. Bladene 5-10mm brede. Lavbladene rødlilla til rødbrune. Aksene løse, 2-4cm. IV-V. Alm.

C. hallerana Asso Stilkstar. 10-30cm. Det grundstillede aks mest 7-20 cm langt stilket. Dækskællene brune med grøn køl. Hunaksene mest 8-10 x 5mm. III-IV. Sj.

C. sempervirens Vill. Trævlstar. 20-40cm. Stængelgrunden tæt omgiven af optrævlede bladskeder. Nederste hunaks 2-8cm langt stilket. Frugten 4-5,5mm, gullig til mørkebrun, langnæbbet. VI-VIII. Alm.

C. brevicollis DC. Giftstar. 20-60cm. 1-3 hunaks på 15-25x7-10mm. Dækskællene orangebrune. Frugterne 5-7mm, brunliggrønne, svagt dunede, med et rut, tokløvet næb på 1-1,5mm. VI-VII. Spredt.

C. michelii Host Tvetandet star. 20-35cm. Hanakset 10-20x5-7mm. 1-2 hunaks på 10-20mm. Dækskællene lysebrune. Frugterne med et næb på 2-3 mm. Ikke tueformet, med lange udløbere. IV-VI. Alm.

C. humilis Leysser Jordstar. 2-10cm. Bladene 1-1,5mm brede, grågrønne, meget længere end stråene, furede. Hunaksenes støtteblade dækskælsagtige med store skeder. 2-4 hunaks. Frugterne 2,5-3mm. III-V. Spredt.

C. pediformis C.A.Meyer (C. rhizina) Tykrodsstar. 20-50cm. 2-3 løse, velskilte hunaks på 1,5-3cm x 2-4mm, det nedre med en stilk på 2-5cm. Rødbrune dækskæl. Frugterne 3-4mm, gullig- eller brunliggrønne. Sj.

C. digitata L. Fingerstar. IV-V. Alm.

C. ornithopoda Willd. Fuglestar. 5-10cm. Stænglen opret, senere lidt krum. Bladranden ru. 2-4 hunaks på 6-10mm med 2-5 blomster. Frugterne 2,5-3mm. IV-V. Spredt. (ssp. piroskana (Nyar.) er 20-25cm høj, har 1,5-2(2,5)mm brede blade og hunaks på 8-12mm. Jud.Cluj: Cheia Turzii, Remetea pe Colţii Trascaului).

C. pilulifera L. Pillestar. IV-V. Spredt.

C. tomentosa L. Filtstar. 20-50cm. Nedre skeder rødlilla til rødbrune. Bladene grå- til svagt blågrønne. 1-2 m.m. aflange hunaks på 5-15x4-5 mm. Nederste støtteblade til sidst vandret udstående. IV-VI. Alm.

C. ericetorum Pollich Lyngstar. III-V. Sj.

Carex caryophyllea Latourr. Vårstar. III-V. Alm.

C. umbrosa Host Skyggestar. 30-50cm. Nedre skeder stærkt optrævlede. Bladene stive, 1,5-3mm brede, ofte rurandede. 1-3 hunaks på 7-15mm, det nederstes stilk 5-10mm. Frugten 2-3mm. IV-VI. Spredt.

C. montana L. Bakkestar. III-V. Alm.

C. capillaris L. Hårstar. 5-25cm. Tueformet. Hunaksene 5-15mm, mest fingerformet stillede, med 1-2cm lange stilke og affaldende dækskæl. Frugterne 2-4mm, gråbrune og skinnende. VI-VII. Sj.

C. pseudocyperus L. Knippestar. V-VI. Alm.

C. silvatica Hudson Skovstar. V-VI. Alm.

C. pendula Hudson Kæmpestar. V-VI. Alm.

C. limosa L. Dyndstar. V-VI. Spredt.

C. magellanica Lam. Frynsestar. 10-30cm. Bladene 2-4mm brede, bleggrønne, ofte af stråets længde. Dækskællene tydeligt længere end de 2,5-3mm lange frugter. V-VI. Spredt.

C. atrofusca Schkuhr Sodstar. 10-30cm. Bladene højst 1/2 x strået. 2-4 hunaks på 8-15mm, det nederste 15-40mm langt stilket. Dækskællene sortlilla, frugten ligeledes. ? (Måske er der tale om C. atrata).

C. brachystachys Schrank Kortakset star. 10-30cm. Bladene 1/2-1mm brede, med V-formet tværsnit. 2-3 1-2cm lange, adskilte hunaks med rød- til sortbrune dækskæl. Frugten næsten 2 x dækskællet. V-VI. Sj.

C. alba Scop. Hvid star. 10-25cm. Med udløbere. Bladene 1-1,5mm brede, bløde. 1-3 5-10mm lange, 3-7-frugtede, mest 1-3cm langt stilkede hunaks. Dækskællene korte, hvidlige med grøn køl. IV-V. Spredt.

C. depauperata Good. Strofrugtet star. 30-60cm. Nedre skeder rustbrune og bladløse. 2-4 hunaks med 2-6 blomster. Dækskællene bredt hindekantede. Frugterne langnæbbede, grønlige og skinnende. V-VI. Sj.

C. ornithopodioides Hausm. Krum fuglestar. 5-10cm. Nedre skeder mest brune. Stråene mest stærkt krummede. Oftest 2 hunaks på 3-5mm med brun- til sortlilla dækskæl. IV-V.

C. strigosa Hudson Tyndakset star. V-VI. Sj.

C. pallescens L. Bleg star. V-VII. Alm.

C. liparocarpos Gaudin Glansstar. 10-30cm. Bladene 1-2mm brede. 2-3 mest overlappende, 5-15x5-6mm store aks med 5-12 blomster. Dækskællene rødbrune, bredt hindekantede. Frugten 3-4mm. IV-V. Spredt.

C. supina Willd. Lav star. 5-20cm. Lavblade og nedre skeder rødlilla. 1-2 ca.5mm lange, 3-5-blomstrede hunaks. Dækskællene rødbrune, bredt hindekantede. Frugten 2,5-3mm. IV-V. Sj.

C. extensa Good. Udspilet star. V-VI. Sj.

C. oederi Retz. Dværgstar. V-VIII.

Carex flava L. Gul star. V-VI. Alm.

C. lepidocarpa Tausch Krognæbstar. VI-VIII. Alm.

C. panicea L. Hirsestar. V-VI. Alm.

C. hostiana DC. Skedestar. V-VII. Spredt.

C. distans L. Fjærnakset star. V-VI. Alm.

ORCHIDACEAE

1. Planten uden grønne blade, kun med farvede skælblade ..... 2.
" med " " 5.
2. Stænglen mørklilla, blomsterne lilla ..... Limodorum
" ikke lilla 3.
3. Stænglen brun. Læben kløvet ..... Neottia
" ikke brun 4.
4. Stænglen hvidlig. Blomsten hvid med kort spore ..... Epipogium
" og blomsterne gulgrønne Corallorhiza
5. Læben uden eller med utydelig spore ..... 6.
" med tydelig spore 17.
6. Læben tøffelformet og gul ..... Cypripedium
" ikke tøffelformet 7.
7. Stænglen kun med 1 blad ..... Malaxis
" med flere blade 8.
8. Stænglen med 2 næsten midterstillede blade ..... Listera
" flerbladet eller med 2 grundblade 9.
9. Læben delt på tværs i en inder- og yderlæbe ..... 10.
" ikke tværdelt 11.
10. Frugtknuden stilket ..... Epipactis
" m.m. siddende Cephalanthera
11. Læben med et tydeligt farvet og formet midterfelt (spejl) Ophrys
" m.m. ensfarvet 12.
12. Blomsterne hvide ..... 13.
" m.m. grønlige 14.
13. Blomsterne tydeligt spiralstillede ..... Spiranthes
" uregelmæssigt stillede Goodyera
14. Bladene græsagtige, parallelsidede ..... Chamorchis
" bredere, ikke græsagtige 15.
15. Læben med to tydelige lapper ..... Herminium
" udelt 16.
16. Læben but, 4-5mm lang. Bladene 3-10cm ..... Liparis
" spids, 1-2mm lang. Bladene 0,5-2cm Hammarbya
17. Læben med en 3-6cm lang, båndformet midterflig ... Himantoglossum
" mindre og af en anden form 18.
18. Læben sidder øverst i blomsten. Sporen højst 2mm ..... Nigritella
" " underst " " 19.
19. Ydre blosterblade ender i en kølleformet spids .... Traunsteinera
" " uden nogen " " 20.
20. Læben udelt, smalt tungeformet. Blomsten hvid ..... Platanthera
" anderledes, mest 3-tandet eller 3-lappet 21.

21. Læbens midterlap kortere end de parallelle sidelapper Coeloglossum
" " ikke kortere end sidelapperne 22.
22. De sidestillede blosterblade vandret udspærrede. Sporen tråd-formet ..... 23.
De sidestillede blosterblade ikke vandret udspærrede. Sporen sæk-, kegle- eller valseformet 24.
23. Blomsterstanden pyramide- til ægformet ..... Anacamptis
" klaseformet Gymnadenia
24. Ydre blosterblade 2-3,5mm. Blomsterne m.m. ensfarvede Leucorchis
" " længere eller blomsterne flerfarvede 25.
25. Støttebladene urteagtige ..... Dactylorhiza
" hindeagtige Orchis

Cypripedium calceolus L. Fruesko. V-VI. Spredt.

Epipactis. Hullæbe.

1. Læben hvidlig, med rødåret inderdel ..... palustris
" grønlig eller rødlig, inderdelen ustribet 2.
2. Bladene mest kortere end stængelleddene ..... microphylla
" lig eller længere end stængelleddene 3.
3. Blosteret brunrødt eller mørkt rødlillat ..... atrorubens
" ihvertfald delvist grønligt eller bleglillat 4.
4. Bladundersiden med lillat skær. Blomsten silkeglinsende purpurata
" uden " " . " ikke glinsende helleborine

Epipactis palustris (L.) Cr. Sumphullæbe. VI-VIII. Spredt.

E. purpurata Sm. Tætblomstret hullæbe. VII-IX. Spredt.

E. helleborine (L.) Cr. Skovhullæbe. VI-VIII. Alm.

E. microphylla (Ehrh.) Sw. Småbladet hullæbe. 15-50cm. Støttebladene kortere end frugtknuden. Klasen m.m. ensidig. Blomsterne mest nikkende. Yderlæben med vortet grund. VI-VIII. Spredt.

E. atrorubens (Hoffm.) Besser Rød hullæbe. V-VII. Spredt.

Cephalanthera rubra (L.) Rich Rød skovlilje. Blomsten rødlilla. Spredt

C. longifolia (Hudson) Fritsch Sværdskovlilje. 20-45cm. Blomsterne renhvide. 6-10 blade, der er mindst 6 x så lange som brede. V-VI. Spr.

C. damasonium (Miller) Druce Hvidgul skovlilje. Blomsterne hvidligt-gule. 3-5 blade, der er 2-3 x så lange som brede. V-VI. Spredt.

Limodorum abortivum (L.) Sw. Fuglestok. 20-80cm. Stænglen opret og med skælblade. 6-20 lilla blomster med en spore på 15-25mm og en indsnøret underlæbe, der er 7-12mm bred på det bredeste sted. V-VII. Sj.

Epipogium aphyllum Swartz Knælæbe. VII-VIII. Spredt.

Neottia nidus-avis (L.) Richard Rederod. V-VII. Alm.

Listera ovata (L.) R.Br. Ægbladet fliglæbe. V-VII. Alm.

L. cordata (L.) R.Br. Hjærtebladet fliglæbe. V-VIII. Spredt.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Skrueaks. 6-20cm. Bladene ægformet

elliptiske, grundstillede. Blomsterne små og med udelt underlæbe. Spr.

Goodyera repens (L.) R.Br. Knærod. VII-VIII. Spredt.

Herminium monorchis (L.) R.Br. Pukkellæbe. V-VII. Spredt.

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Skovgøgelilje. Støvknapperne vigende. V-VII. Spredt.

P. bifolia (L.) Rich. Bakkegøgelilje. Støvknapperne parallelle. Alm.

Chamorchis alpina (L.) Richard Dværggøgeurt. 5-15cm. 4-10 rosetblade, der når eller overrager blomsterne. Disse 4-6mm, gulgrønne og hjælmdannende med tungeformet læbe. VII-VIII. Sj.

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Poselæbe. VI-VII. Alm.

Leucorchis albida (L.) E.H.F.Meyer (Pseudorchis a.) Sækspore. 12-30cm. 4-6 blade. Støttebladene 3-årede. Sporen but. Blomsterne grønlighvide til bleggule. V-VII. Spredt.

L. frivaldii (Hampe) Schlechter (Pseudorchis f., Gymnadenia f.) Rødlig sækspore. 10-30cm. 3-4 blade. Støttebladene 1-årede. Sporen spids. Blomsterne hvide, undertiden blegrøde. VI-VII. M.Retezat, M.Ţarcu.

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Langakset trådspore. 30-80cm. Sporen 10-20mm, længere end frugtknuden, nedadbøjet. VI-VIII. Alm.

G. odoratissima (L.) Richard Vellugtende trådspore. 15-30cm. Sporen 4-6mm, kortere end frugtknuden, vandret eller svagt nedbøjet. Spredt.

Nigritella. Akset kort kegleformet til næsten kugleformet. Læben udelt og spids. Blomsterne med vaniljeduft. 5-30cm.

N. nigra (L.) Rchb.f. Brunkulle. Læben ikke saddelformet indsnøret i nedre 1/3. Blomsterne brune, skarlagenrøde eller gule. De to par sidestillede blosterblade ulige store. VI-IX. Spredt.

N. rubra (Wettst.) K.Richter Rødkulle. Læben saddelformet indsnøret i nedre 1/3. Blomsterne rubinrøde. De sidestillede blosterblade ret ens. VI-VIII. Spredt.

Dactylorhiza. Gøgeurt.

1. Blomsterne gule ..... 2.
" røde 3.
2. Den udbredte læbe 11-17mm bred. Sporen 10-15mm ..... sambucina
" " " 5-9mm bred. Sporen 6,5-10mm ochroleuca
3. Læben gullig ved grunden. Blomsten uden rødlillat i sig sambucina
" uden gult. Blomsterne m.m. rødlilla 4.
4. Sidestillede ydre blosterblade udstående. Stænglen mest fyldt .. 5.
" " " halvt oprette. Stænglen mest hul 7.
5. Læbens midterflig meget smallere end sidefligene ..... maculata
" ca. så bred som sidefligene 6.
6. Sporen m.m. kegle- eller sækformet, 7-13mm ..... saccifera
" valseformet, 6-9mm fuchsii
7. Bladene bredest godt under midten, 4-8 x så lange som br. incarnata
" omkring eller over midten 8.

8. Nedre blade bredest på eller lidt under midten ..... majalis
" " tydeligt bredest over midten cordigera

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó Hyldegøgeurt. VI-VII. Spredt.

D. cordigera (Fr.) Soó Hjærtegøgeurt. 15-40cm. Nedre blade 5-18x1,5-5 cm, mest med groftplettet overside. Blomsterne mørkt rødlilla. Læben oftest tydeligt bredere end lang. V-VII. Alm. 2 underarter:
ssp. cordigera: Sporen 6-8mm, sækformet, indtil 1/2 x frugtknuden.Alm.
ssp. siculorum (Soó) Soó: Sporen 8-11mm, kegle-valseformet, indtil 3/4 x frugtknuden.

D. majalis (Rchb.) Hnut & Summerh. Majgøgeurt. VI-VII. Sj.

D. incarnata (L.) Soó Kødfarvet gøgeurt. V-VI. Spredt.

D. ochroleuca (Boll) Averyanov Hvidgul gøgeurt. V-VI.

D. saccifera (Brongn.) Soó Tragtgøgeurt. 25-90cm. Flere ikke omskedende stængelblade. Læben dybt 3-lappet med tandede sidelapper. Alm.

D. maculata (L.) Soó Plettet gøgeurt. V-VI. Alm.

D. fuchsii (Druce) Soó Skovgøgeurt. V-VI. Spredt.

Traunsteinera globosa (L.) Rchb. Kuglegøgeurt. 20-60cm. Akset meget tæt, kugle- til ægformet. Blomsterne lyst rødlilla. Læben tredelt. Blosterbladene først hjælmdannende, siden udstående. VII-VIII. Alm.

Orchis. Gøgeurt.

1. Blomsterne gule ..... pallens
" røde 2.
2. Læben m.m. udelt ..... papilionacea
" delt 3.
3. I det mindste nogle blosterblade udstående ..... 4.
Alle 5 blosterblade hjælmdannende 5.
4. Bladene linje-lancetformede, ingen egentlig roset ..... palustris
" bredere, med roset mascula
5. Hjælmen tydeligt grønåret, især indvendigt ..... morio
" ikke eller lidet grønåret 6.
6. Læbens midterflig udelt ..... coriophora
" " delt 7.
7. Støttebladene noget kortere end til lig frugtknuden ..... 8.
" meget " " frugtknuden 9.
8. Ydre blosterblade 3-3,5mm. Sporen 1-2mm ..... ustulata
" " 6-8(10)mm. Sporen 5-10(13)mm tridentata
9. Blosterbladene brunrøde udvendigt ..... purpurea
" bleglilla til lyserøde 10.
10. Læbens midterfligslapper aflange, 2-3mm brede ..... militaris
" " linjeformede, 1mm brede italica

Orchis coriophora L. Tægegøgeurt. 15-60cm. Hjælmens blosterblade tilspidsede. Blomsterne brune, røde, lyserøde eller grønlige. V-VII. Alm.
ssp. coriophora: Læben 6-8mm, midterlappen næppe længere end sidelapperne. Sporen 1/2 x læben. Blomsterne stinkende.

ssp. fragrans (Pollini) Sudre: Læben 8-10mm, midterlappen tydeligt længere end sidelapperne. Sporen ca = læben eller længere.

Orchis palustris Jacq. Kærgøgeurt. 15-100cm. Bladene jævnt fordelte langs stænglen, bredest forneden. Blomsterne rosenrøde til mørkt rødlilla. Læbens midterflig noget foldet, med hvidt midterfelt.V-VI.Alm.

O. mascula (L.) L. ssp. signifera (Vest) Soó Tyndakset gøgeurt. Underarten har de sidestillede blosterblade langt og noget krummet tilspidsede. IV-VI. Alm.

O. pallens L. Bleg gøgeurt. 15-40cm. Bladene skinnende. Blomsterne lysegule med hyldeagtig duft. Sidestillede blosterblade opaddrejede. Sporen opadbøjet. IV-V. Sj.

O. papilionacea L. Sommerfuglegøgeurt. 15-40cm. Blosterbladene ikke helt hjælmdannende, vinrøde og stribede. Læben ofte rudeformet, ofte lys og med brudt stregmønster. IV-V. Sj.

O. morio L. Salepgøgeurt. IV-V. Alm. 2 underarter:
ssp. morio: Sporen mest kortere end frugtknuden. Ydre blosterblade 8-10 mm. Alm.
ssp. picta (Loisel.) Arc.: Sporen mest så lang som frugtknuden. Ydre blosterblade 6-8mm.

O. tridentata Scop. Tretandet gøgeurt. 15-45cm. Hjælmbladene langspidsede, blegt rødlilla med mørkere striber. Læben rigeligt rødlillat prikket. V-VI. Spredt. 2 underarter:
ssp. tridentata: Akset tæt. Blosterbladene 6-8(10)mm. Læbens midterflig med helrandet spids. Stænglen stiv.
ssp. commutata (Tod.) Nyman: Akset løst. Blosterbladene 8-10(12)mm. Læbens midterflig undertiden med finttandet spids. Stænglen noget blød.

O. purpurea Hudson Stor gøgeurt. V-VI. Spredt.

O. militaris L. Riddergøgeurt. 25-45cm. Hjælmen purpuråret indvendigt. Læbens midterflige 2 x så brede som sidefligene ved grunden. Læben rosen- til purpurrød, prikket. V-VI. Alm.

O. italica Poiret Flammegøgeurt. 20-40cm. Hjælmbladene langt tilspidsede, blegt rødlilla med mørkere årer. Underlæben med 4 smalle og lange, spidse flige. Bladranden bølget.

O. ustulata L. Bakkegøgeurt. 10-30cm. Blosterbladene rød- til sortbrune. Læben 5-8mm, hvid med røde prikker. V-VI. Alm.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich Horndrager. VI-VII. Spredt.

Himantoglossum caprinum (Bieb.) Sprengel Gedeøgletunge. 30-90cm. Blomsten m.m. lilla. Blosterbladene hjælmdannende. Læben 4,5-8,5cm lang, kruset foroven, med en 1-5cm dyb kløft i spidsen. V-VI. Sj.

Ophrys. Flueblomst.

1. Indre blosterblade glatte. Læben m.m. hel ..... sphegodes
" " korthårede 2.

2. Læben hel eller svagt lappet, mest trapezformet ..... holoserica
" tredelt 3.
3. Ydre blosterblade grønlige. Læben uden vedhæng ..... insectifera
" " lyserøde til rødlilla. Læben med vedhæng 4.
4. Læbens sidelapper med 6-12mm lange horn ..... scolopax
" " " korte horn apifera

Ophrys insectifera L. Flueblomst. V-VI. Sj.

O. apifera Hudson Snabelflueblomst. 20-35cm. Læben ofte brun, med et skjoldformet, brunt, blåt- og gulkantet spejl. Griffelstøtten af læbens længde og med bølget spids. V-VI. Sj.

O. holoserica (Burm.f.) Greuter (O. fuciflora) Dødningeflueblomst. 10-30cm. Ydre blosterblade røde. Læbens grundfarve brun. Mærket H-formet, hvidrandet, ofte med øjer ved siden af. V-VII. Sj.

O. scolopax Cav. ssp. cornuta (Steven) Camus Sneppeflueblomst. 10-65 cm. Læben med et opadbøjet, gult vedhæng i spidsen og med et blåt eller brunt mærke, der ofte breder sig stærkt. V-VI. Spredt.

S. sphegodes Miller Edderkopflueblomst. 10-30cm. Ydre blosterblade grønlige, de sidestillede mest med bølget rand. Læben lyse- til mørkebrun. Mærket brunt og lysrandet. V-VI. Sj.

Corallorhiza trifida Chatel. Koralrod. V-VII. Spredt.

Liparis loeselii (L.) Richard Mygblomst. V-VII. Sj.

Malaxis monophyllos (L.) Lindley Etbladet hjærtelæbe. 10-30cm. Stængelgrunden løgagtig, herfra udgår det ægformede eller elliptiske ene blad også. 20-100 blomster på 2-2,75mm i en åben klase. V-VII. Spredt.

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze Hjærtelæbe. VII-VIII. Sj.

SLÆGTSOVERSIGT

Abelmoschus 143
Abies 7
Abutilon 143
Acacia 107
Acanthus 218
Acer 139
Achillea 249
Achnatherum 332
Acinos 198
Aconitum 50
Acorus 335
Actaea 50
Adenophora 237
Adenostyles 254
Adonis 53
Adoxa 230
Aegilops 323
Aegopodium 159
Aeluropus 333
Aesculus 140
Aethionema 78
Aethusa 161
Agrimonia 95
Agropyron 323
Agrostemma 37
Agrostis 328 + (331)
Ailanthus 138
Aira 328
Ajuga 191
Alcea 143
Alchemilla 100
Aldrovanda 82
Alisma 286
Alkanna 184
Alliaria 65
Allium 295
Alnus 11
Alopecurus 330
Althaea 142
Alyssoides 72
Alyssum 72
Amaranthus 26
Ambrosia 248
Amelanchier 103
Ammannia 151
Ammophila 329
Amorpha 115
Anacamptis 354
Anagallis 172
Anchusa 185
Andromeda 169
Androsace 171
Andryala 280
Anemone 50
Anethum 161
Angelica 164
Antennaria 246
Anthemis 248
Anthericum 290
Anthoxanthum 328
Anthriscus 157
Anthyllis 127
Antirrhinum 209
Apera 318
Aphanes 101
Apium 163
Aposeris 272
Aquilegia 57
Arabidopsis 65
Arabis 71
Arctium 259
Arctostaphylos 169
Aremonia 96
Arenaria 29
Argusia 182
Aristolochia 15
Armeria 173
Armoracia 68
Arnica 255
Arrhenatherum 326
Artemisia 252
Arum 335
Aruncus 89
Asarum 15
Asclepias 178
Asparagus 298
Asperugo 187
Asperula 222
Asphodeline 290
Asplenium 3
Aster 243
Astragalus 111
Astrantia 156
Astrodaucus 168
Asyneuma 237
Athamantha 161
Athyrium 4
Atriplex 24
Atropa 204
Aubrieta 72
Aurinia 73
Avena 325
Avenula 326
Azolla 7

Ballota 195
Barbarea 68
Bartsia 217
Bassia 25
Beckmannia 318
Bellardiochloa 317
Bellevalia 295
Bellis 243
Berteroa 75
Berula 159
Beta 22
Betula 10
Bidens 247
Bifora 158
Biscutella 78
Blackstonia 175
Blechnum 7
Blysmus 338
Borago 187
Botrychium 3
Brachypodium 322
Brassica 80
Briza 318
Bromus 320
Broussonetia 13
Bruckenthalia 169
Bryonia 150
Bufonia 33
Bulbocodium 290
Bunias 65
Bupleurum 161
Butomus 286
Buxus 140

Cachrys 161
Cakile 81
Calamagrostis 329
Calamintha 198
Caldesia 286
Calendula 258

Calepina 81
Calla 335
Callianthemum 49
Callitriche 189
Calluna 169
Caltha 50
Calystegia 180
Camelina 77
Campanula 234
Camphrosoma 25
Cannabis 13
Capsella 77
Caragana 111
Cardamine 69
Cardaminopsis 70
Cardaria 79
Carduus 261
Carex 340
Carlina 258
Carpesium 247
Carpinus 11
Carthamus 272
Carum 164
Castanea 11
Catabrosa 318
Caucalis 168
Celtis 13
Centaurea 266
Centaurium 175
Centunculus 172
Cephalanthera 351
Cephalaria 232
Cephalorhynchus 276
Ceratocarpus 24
Ceratocephalus 57
Ceratophyllum 48
Cerinthe 183
Ceterach 4
Chaenorhinum 209
Chaerophyllum 157
Chamaecytisus 108
Chamaespartium 110
Chamomilla 251
Chamorchis 352
Chartolepis 272
Cheiranthus 65
Chelidonium 60
Chenopodium 22
Chimaphila 169
Chondrilla 278
Chorispora 67
Chrysopogon 335
Chrysosplenium 87
Cicerbita 277
Cichorium 272
Cicuta 163
Cimicifuga 50
Circaea 151
Cirsium 262
Citrullus 150
Cladium 340
Cleistogenes 333
Clematis 53
Clinopodium 199
Clypeola 75
Cnidium 160
Cochlearia 76
Coeloglossum 352
Colchicum 290
Colutea 111
Comandra 14
Conioselinum 164
Conium 161
Conringia 79
Consolida 50
Convallaria 298
Convolvulus 180
Conyza 245
Corallorhiza 355
Coriandrum 158
Corispermum 25
Cornus 153
Coronilla 128
Coronopus 79
Cortusa 172
Corydalis 60
Corylus 11
Corynephorus 328
Cotinus 139
Cotoneaster 103
Crambe 81
Crataegus 103
Crepis 278
Crocus 302
Crucianella 222
Cruciata 227
Crupina 272
Crypsis 333
Cucubalus 41
Cucumis 150
Cucurbita 150
Cuscuta 179
Cyclamen 172
Cydonia 101
Cymbalaria 210
Cynanchum 178
Cynodon 334
Cynoglossum 189
Cynosurus 318
Cyperus 339
Cypripedium 351
Cystopteris 5
Cytisus 107

Dactylis 318
Dactylorhiza 352
Danthonia 333
Daphne 143
Dasypyrum 324
Datura 205
Daucus 168
Delphinium 50
Deschampsia 327
Descurainia 55
Dianthus 43
Dichanthium 335
Dictamnus 138
Digitalis 210
Digitaria 334
Diphasium 1
Diplotaxis 80
Dipsacus 232
Doronicum 255
Dorycnium 127
Draba 75
Dracocephalum 197
Drosera 82
Dryas 96
Dryopteris 6

Ecballium 150
Echinochloa 334
Echinocystis 151
Echinophora 157
Echinops 259
Echium 184
Elaeagnus 144
Elatine 149

Eleocharis 338
Elodea 286
Elsholtzia 204
Elymus 322
Empetrum 170
Ephedra 8
Epilobium 152
Epipactis 351
Epipogium 351
Equisetum 1
Eragrostis 333
Eranthis 49
Erechtites 255
Erianthus 335
Erigeron 244
Eriophorum 338
Eritrichium 188
Erodium 131
Erophila 76
Eruca 80
Erucastrum 81
Eryngium 156
Erysimum 65
Erythronium 292
Euclidium 67
Euonymus 140
Eupatorium 242
Euphorbia 134
Euphrasia 215

Fagopyrum 17
Fagus 11
Falcaria 164
Ferula 164
Ferulago 164
Festuca 310
Filago 245
Filipendula 89
Fimbristylis 339
Foeniculum 161
Fragaria 100
Frangula 141
Frankenia 149
Fraxinus 174
Fritillaria 292
Fumana 148
Fumaria 60

Gagea 290
Galanthus 299
Galega 110
Galeopsis 194
Galinsoga 248
Galium 223
Gastridium 329
Genista 109
Gentiana 176
Gentianella 177
Geranium 129
Geum 96
Gladiolus 303
Glaucium 60
Glaux 172
Glechoma 197
Gleditsia 107
Glinus 28
Globularia 218
Glyceria 320
Glycyrrhiza 115
Gnaphalium 245
Goniolimon 174
Goodyera 352
Gossypium 143
Gratiola 206
Groenlandia 287
Gymnadenia 352
Gymnocarpium 6
Gymnospermium 59
Gypsophila 42

Hablitzia 22
Halimione 24
Halocnemum 25
Hammarbya 355
Haplophyllum 137
Hedera 154
Hedysarum 128
Heleochloa 334
Helianthemum 148
Helianthus 247
Helichrysum 246
Helictotrichon 325
Heliotropium 182
Helleborus 49
Hemerocallis 290
Hepatica 52
Heracleum 166
Herminium 352
Herniaria 36
Hesperis 67
Hibiscus 143
Hieracium 280
Hierochloe 328
Himantoglossum 354
Hippocrepis 128
Hippophae 144
Hippuris 153
Holcus 328
Holosteum 33
Homogyne 254
Hordelymus 324
Hordeum 324
Hornungia 77
Hottonia 172
Humulus 13
Huperzia 1
Hutchinsia 77
Hyacinthella 295
Hydrocharis 286
Hymenolobus 77
Hyoscyamus 204
Hypericum 144
Hypochoeris 273

Iberis 78
Ilex 140
Impatiens 140
Inula 246
Ipomoea 181
Iris 300
Isatis 65
Isopyrum 50
Iva 247

Jasione 238
Jasminum 174
Jovibarba 82
Juglans 10
Juncus 303
Juniperus 8
Jurinea 260

Kernera 76
Kickxia 210
Knautia 233
Kobresia 340
Kochia 25
Koeleria 326
Krascheninnikovia 24

Laburnum 107
Lactuca 276
Lagenaria 150
Lamiastrum 195

Lamium 194
Lappula 188
Lapsana 278
Larix 7
Laser 167
Laserpitium 167
Lathraea 218
Lathyrus 118
Lavatera 142
Leersia 334
Legousia 237
Lembotropis 107
Lemna 236
Lens 118
Leontodon 273
Leontopodium 246
Leonurus 195
Lepidium 79
Lepidotis 1
Leucanthemella 252
Leucanthemopsis 252
Leucanthemum 252
Leucojum 299
Leucorchis 352
Leuzea 265
Levisticum 164
Leymus 322
Ligularia 258
Ligusticum 164
Ligustrum 175
Lilium 292
Limodorum 351
Limonium 173
Limosella 206
Linaria 209
Lindernia 206
Linnaea 229
Linum 132
Liparis 355
Listera 351
Lithospermum 182
Littorella 229
Lloydia 290
Loiseleuria 169
Lolium 314
Lomatogonium 178
Lonicera 230
Loranthus 15
Lotus 127
Ludwigia 152
Lunaria 72
Lupinus 110
Luzula 305
Lychnis 37
Lycium 204
Lycopersicon 205
Lycopodium 1
Lycopus 201
Lysimachia 172
Lythrum 151

Maclura 13
Maianthemum 298
Malabaila 166
Malaxis 355
Malus 102
Malva 142
Marrubium 193
Marsilea 7
Matricaria 251
Matteuccia 5
Medicago 122
Melampyrum 214
Melica 319
Melilotus 121
Melissa 197
Melittis 193
Mentha 201
Menyanthes 178
Mercurialis 134
Merendera 290
Mespilus 103
Micromeria 199
Micropus 245
Milium 331
Mimulus 206
Minuartia 31
Misopates 209
Moehringia 30
Moenchia 35
Molinia 333
Mollugo 28
Moneses 168
Monotropa 169
Montia 28
Morus 13
Muscari 295
Myagrum 65
Mycelis 277
Myosotis 187
Myosoton 35
Myosurus 57
Myricaria 149
Myriophyllum 153
Myrrhoides 157

Najas 288
Narcissus 300
Nardus 333
Nasturtium 69
Nectaroscordum 298
Nelumbo 48
Neottia 351
Nepeta 196
Neslia 77
Nicandra 204
Nicotiana 205
Nigella 49
Nigritella 352
Nitraria 132
Nonea 184
Notholaena 3
Nuphar 48
Nymphaea 47
Nymphoides 178

Odontites 216
Oenanthe 160
Oenothera 152
Omphalodes 188
Onobrychis 128
Ononis 120
Onopordum 265
Onosma 183
Ophioglossum 3
Ophrys 354
Opopanax 164
Orchis 353
Oreochloa 319
Origanum 199
Orlaya 168
Ornithogalum 292
Ornithopus 128
Orobanche 219
Orthilia 168
Oryza 334
Oryzopsis 331
Oxalis 129
Oxybaphus 27
Oxyria 18
Oxytropis 115

Paeonia 59

Palimbia 164
Paliurus 140
Panicum 334
Papaver 59
Parietaria 13
Paris 298
Parnassia 87
Paronychia 36
Parthenocissus 141
Pastinaca 166
Pedicularis 217
Peganum 132
Peltaria 72
Periploca 178
Petasites 254
Petrorhagia 43
Petroselinum 163
Petrosimonia 26
Peucedanum 165
Phalaris 331
Philadelphus 87
Phleum 329
Phlomis 193
Pholiurus 331
Phragmites 333
Phyllitis 4
Physalis 204
Physospermum 161
Phyteuma 238
Phytolacca 27
Picea 7
Picnomon 265
Picris 274
Pimpinella 158
Pinguicula 221
Pinus 7
Piptatherum 331
Pisum 120
Plantago 227
Platanthera 352
Platanus 88
Pleurospermum 161
Plumbago 173
Poa 315
Polemonium 179
Polycarpon 37
Polycnemum 21
Polygala 138
Polygonatum 298
Polygonum 15
Polypodium 7
Polypogon 329
Polystichum 5
Populus 10
Portulaca 28
Potamogeton 286
Potentilla 96
Prangos 161
Prenanthes 277
Primula 170
Prunella 197
Prunus 104
Pseudorchis 352
Pseudotsuga 7
Psilurus 318
Psoralea 115
Pteridium 3
Ptilostemon 265
Puccinellia 317
Pulicaria 247
Pulmonaria 184
Pulsatilla 52
Pyrola 168
Pyrus 101

Quercus 11

Radiola 133
Ranunculus 53
Raphanus 81
Rapistrum 81
Reseda 81
Rhamnus 141
Rhinanthus 218
Rhodiola 84
Rhododendron 169
Rhus 139
Rhynchospora 340
Ribes 88
Rindera 189
Robinia 110
Rochelia 187
Rorippa 68
Rosa 93
Rubia 227
Rubus 89
Rudbeckia 247
Rumex 18
Ruppia 288
Ruscus 299
Ruta 137

Saccharum 335
Sagina 35
Sagittaria 286
Salicornia 26
Salix 8
Salsola 26
Salvia 202
Salvinia 7
Sambucus 229
Samolus 173
Sanguisorba 96
Sanicula 156
Saponaria 42
Satureja 198
Saussurea 260
Saxifraga 84
Scabiosa 233
Scandix 158
Scheuchzeria 286
Schivereckia 75
Schoenus 340
Scilla 294
Scirpus 337
Scleranthus 36
Sclerochloa 318
Scolymus 272
Scopolia 204
Scorzonera 274
Scrophularia 208
Scutellaria 192
Secale 324
Sedum 83
Selaginella 1
Selinum 164
Sempervivum 82
Senecio 255
Serratula 265
Seseli 159
Sesleria 318
Setaria 335
Sherardia 222
Sicyos 151
Sideritis 193
Sieglingia 333
Sigesbeckia 247
Silaum 161

Silene 37
Sinapis 80
Sison 163
Sisymbrium 64
Sisyrinchium 300
Sium 163
Smyrnium 158
Solanum 204
Soldanella 172
Solidago 242
Sonchus 276
Sophora 107
Sorbus 102
Sorghum 335
Sparganium 336
Spartium 110
Spergula 37
Spergularia 37
Spiraea 88
Spiranthes 351
Spirodela 336
Sporobolus 333
Stachys 195
Staphylea 140
Stellaria 83
Sternbergia 299
Stipa 331
Stratiotes 286
Streptopus 298
Succisa 233
Succisella 233
Suaeda 26
Swertia 178
Symphyandra 237
Symphytum 185
Syrenia 67
Syringa 175

Taeniatherum 235
Tamarix 149
Tamus 300
Tanacetum 252
Taraxacum 277
Teesdalia 77
Telekia 247
Tetragonolobus 127
Teucrium 191
Thalictrum 58
Thelypteris 3
Thesium 14
Thladiantha 150
Thlaspi 77
Thymelaea 144
Thymus 199
Tilia 141
Tofieldia 289
Tordylium 166
Torilis 167
Tozzia 215
Tragopogon 275
Tragus 334
Trapa 151
Tribulus 132
Trientalis 172
Trifolium 123
Triglochin 286
Trigonella 121
Trinia 163
Tripleurospermum 251
Trisetum 327
Triticum 324
Trollius 49
Tulipa 292
Turgenia 168
Tussilago 254
Typha 336
Typhoides 331

Ulmus 12
Urtica 13
Utricularia 221

Vaccinium 169
Valeriana 231
Valerianella 230
Vallisneria 286
Ventenata 326
Veratrum 289
Verbascum 206
Verbena 189
Veronica 210
Viburnum 229
Vicia 115
Vinca 178
Vincetoxicum 178
Viola 145
Viscum 15
Vitis 141
Vulpia 314

Waldsteinia 96
Wolffia 336
Woodsia 5

Xanthium 248
Xeranthemum 259

Zannichellia 288
Zingeria 331
Ziziphora 198
Ziziphus 141
Zostera 288
Zygophyllum 132