REJSEFLORA

FOR

SYDITALIEN

Denne rejseflora er lavet på grundlag af Pignattis Flora d'Italia fra 1982 og dækker de følgende 4 regioner:

A: Apulien = Puglia
B: Basilicata
C: Kalabrien
K: Kampanien

For hver art har jeg angivet udbredelsen efter regioner og som regel også blomstringstiden. Den sidste gælder for hele Italien, og det vil sige, at for arter, der også er udbredte i Norditalien, er det den første del af blomstringstiden, der har gyldighed i Syditalien.

Pignattis flora indeholder desværre en del sjuskefejl, og nogle af dem kan godt være gledet med over i rejsefloraen til trods for nogen jævnføring med Flora Europaea.

December 2000

Mogens Thornberg

SELAGINELLACEAE

Selaginella denticulata (L.) Link Tandet dværgulvefod. 3-10cm. Spinkle, krybende, flade, gaffelgrenede, toradede skud med 4 rækker blade, hvoraf de 2 er større og udbredte og de 2 små og rygstillede. Sporeaksene uskarpt afgrænsede. IV-VII. A B C K

ISOETACEAE

Isoetes histrix Bory Sandbrasenføde. 5-10cm. Landplante med tyk knold med forhornede og blivende bladgrunde i form af skinnende, sorte skæl med en kort, bred midtertak og to lange sidetænder. De friske blade hvidliggrønne. III-V. A

I. durieui Bory Krumbladet brasenføde. 5-10cm. Som foregående, men de blivende bladgrunde med 3 korte tænder. De friske blade mørkegrønne, ofte krumme. III-V. K

EQUISETACEAE

Equisetum. Padderokke. Nøgle til grønne skud.

1. Stænglen ikke eller lidet forgrenet ..... 2.
   " stærkt grenet 3.
2. Stænglen uden fremtrædende ribber ..... fluviatile
   " med tydelige ribber hiemale
3. Stænglen ca. 10mm tyk, med 20-40 fine ribber ..... telmateia
   " sjældent over 7mm tyk, med under 20 ribber 4.
4. Stænglens hulrum over 2/3 x stængeltykkelsen .... fluviatile
   " " under 2/3 x " 5.
5. Grenenes nedre led meget længere end stængelskederne arvense
   " " " " kortere " " 6.
6. Stængelskedernes tænder højst 1/3 x røret ..... ramosissimum
   " " 1/3-2/3 x røret palustre

Equisetum hiemale L. Skavgræs. A B C K

E. ramosissimum Desf. Grenpadderokke. 10-100cm. Stænglerne ru og hårde, mørkegrønne, uregelmæssigt grenede. Grenenes skeder ofte let oppustede, med trådformede tandspidser. Akset 6-12mm, brodspidset. V-IX. A B C K

E. fluviatile L. Dyndpadderokke. A B K

E. palustre L. Kærpadderokke. A B C K

E. arvense L. Agerpadderokke. A B C K

E. telmateia Ehrh. Elfenbenspadderokke. A B C K

FILICES

1. Fritflydende vandplanter ..... 2.
   Rodfæstede landplanter 3.
2. Bladene 10-14x6-9mm, modsatte og helrandede ..... Salvinia
   " små, toradede og taglagte Azolla
3. Kugleformede til ellipsoidiske sporefrugter ..... 4.
   Sporerne i sporehobe på bladundersiden eller på omdannede bladafsnit 5.
4. Bladene firkløveragtige ..... Marsilea
   " trådformede Pilularia
5. Sporehusene samlede på en omdannet, endestillet bladdel .. 6.
   " i sporehobe på bladets underside eller rand 8.
6. Den grønne del af bladet udelt og helrandet ... Ophioglossum
   " " " " " 1-2 x delt 7.
7. Den sporebærende bladdel for enden af det 2 x delte blad Osmunda
   Den sporebærende bladdel adskilt fra den grønne bladdel Botrychium
8. Bladene hele ..... Phyllitis
   " 1-4 x delte (evt. gaffeldelte) 9.

9. Sporehobene helt dækkede af tætsiddende skæl ..... 10.
" synlige eller dækkede af bladranden 11.
10. Bladet 1 x delt ..... Ceterach
" 2 x " Notholaena
11. Sporehobene m.m. dækkede af den omrullede bladrand ..... 12.
" ligger frit på bladundersiden 16.
12. Bladene 1 x delte ..... 13.
" 2-3 x delte 14.
13. Bladafsnittene sammenhængende ved grunden ..... Blechnum
" indbyrdes frie Pteris
14. Bladafsnittene vifteformede, ca. så lange som brede Adiantum
" længere end brede 15.
15. Bladene spredte, 30-200cm ..... Pteridium
" i tuer, 3-25cm Cheilanthes
16. Sporehobene aflange til linjeformede ..... 17.
" m.m. runde 19.
17. Bladafsnittene lancetformede, næsten helrandede Woodwardia
" tandede 18.
18. Uden slør. Enårig ..... Anogramma
Med " . Flerårig 19.
19. Sløret helrandet. Mindre bregner (-40cm) ..... Asplenium
" fintfrynset. Større bregne Athyrium
20. Sporehobene uden slør. Bladene 1 x delte ..... Polypodium
" med " 21.
21. Sløret skjoldformet og midtfæstnet ..... Polystichum
" ikke skjoldformet 22.
22. Sløret hætteformet, fæstnet på den ene side ... Cystopteris
" nyreformet Dryopteris

Ophioglossum lusitancium L. Netåret slangetunge. 1-3 blade sammen på 12-40x2-6mm, m.m. lancetformede. Akset med 5-10 par sporehuse. VIII-XII. 0-1000m. A C K

Botrychium lunaria (L.) Swartz Alm. månerude. B C K

Osmunda regalis L. Kongebregne. 30-150cm. Bladfligene indbyrdes adskilte, næsten altid helrandede. VI-VII. 0-600m. C K

Cheilanthes. Skælbregne. Små, stivløvede, mørkegrønne, 2-3 x delte bregner. Rødbrun bladstilk med skæl. I klippesprækker.

C. acrostica (Balbis) Tod. Frynset skælbregne. 3-15cm. Den ombøjede, sporedækkende bladrand frynset (lup). Bladundersiden uden kirtler. Bladstilken ca. = pladen. III-IX. 0-1000m. A C K

C. tinaei Tod. (C. corsica) Kirtlet skælbregne. 3-25cm. Den ombøjede bladrand ikke frynset. Bladundersiden med spredte, ½mm lange kirtelhår. Bladstilken mest 1-1,8 x pladen. IV-IX. C

Notholaena vellea (Aiton) Desv. (Cheilanthes catanensis) Filtet skælbregne. 8-25cm. Stilken 1/4-1/2 x pladen, gulbrun og tætskællet. Bladet lancetformet, tæt gulskællet på begge sider. A B

Adiantum capillus-veneris L. Venushår. 10-40cm. Sort, skinnende bladstilk. Bladet 2-3 x delt med ofte helt adskilte afsnit på 1-3cm. VII-IX. 0-1500m. A B C K

Pteris cretica L. Kantbregne. Stilken indtil 30cm. Bladet op til 40cm med 2-9 linjeformede afsnit på 10-15x1cm, hvoraf de nederste kan være tvedelte ved grunden. VII-IX. 100-800m. C K

P. vittata L. Kamvingebregne. Stilken op til 10cm, bladet op til 60cm med 19-23 afsnit på 6-8x1½-2cm med bølget og finttandet rand og mørk overside og lysere underside. VII-X. 0-300m. C K

Anogramma leptophylla (L.) Link Nøgenbregne. 5-15cm. Lille tyndbladet bregne. De golde og sporebærende blade lidt forskellige, 2-3 x delte. Sporehobene til sidst sammenflydende. III-IV. ABCK

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Ørnebregne. V-IX. A B C K

Asplenium. Radeløv.

1. Bladene 1-3 x gaffelgrenede ..... septentrionale
   " 1-4 x fjersnitdelte 2.
2. Bladene 1 x delte ..... 3.
   " 2-4 x delte 5.
3. Stilk og blad tæt kirtelhårede ..... petrarchae
   " " " ikke " 4.
4. Bladstilken næsten helt grøn ..... viride
   " sortbrun trichomanes
5. Bladstilken grøn undtagen helt nederst ..... 6.
   " rødbrun til sortbrun 7.
6. Bladpladen tynd, m.m. kirtelhåret ..... lepidum
   " ret kraftig, oftest glat ruta-muraria
7. De yderste bladflige linjeformede ..... fissum
   De yderste flige bredere 8.
8. Bladpladen m.m. trekantet, de nedre flige 3-8cm, ca. 1/3 længere end de midterste ..... 9.
   Bladpladen elliptisk eller lancetformet. De nedre flige ½-4cm, lig eller kortere end de midterste 10.
9. Bladene stærkt skinnende. De yderste flige udtrukne onopteris
   " skinnende. Fligene ikke udtrukne adiantum-nigrum
10. Bladtænderne butte og brodspidsede ..... obovatum
    " spidse billotii

Asplenium petrarchae (Guérin) DC. Håret radeløv. 5-14cm. Stilk og skaft rødligsorte med grøn spids. Bladafsnittene ½-1cm, ægformede. III-X. 0-400m. B

A. trichomanes L. ssp. quadrivalens D.E.Meyer Rundfinnet radeløv. III-IX. A B C K

A. viride Hudson Grønt radeløv. 5-15cm. Planten lysegrøn. Bladafsnittene ca. 5mm. V-IX. B C K

A. obovatum Viv. Ægbladet radeløv. 15-30cm. Omridset ægformet-trekantet. De nedre flige kun lidt kortere end de midterste. De større flige med 5-7 par sideflige. III-X. B C K

A. billotii F.W.Schultz Spydradeløv. 10-20cm. Nær foregående. De større flige med 6-9 par sideflige. III-X. K

A. adiantum-nigrum L. Sort radeløv. VII-VIII. A B C K

A. onopteris L. Fjerradeløv. 10-40cm. De yderste bladflige noget haleformet udtrukne. De nedre flige med krumme sideribber. V-VIII. A B C K

A. septentrionale (L.) Hoffm. Nordisk radeløv. VII-X. B

A. ruta-muraria L. Murrude. 5-15cm. VI-X. A B C K

A. lepidum C.Presl Kirtelradeløv. 3-10cm. Ligner meget foregående, men bladene oftest med mange, kortstilkede kirtler. B K

A. fissum Kit. Finbladet radeløv. 15-22cm. Bladstilken 1-2 x pladen; denne ofte reduceret. 2.ordens afsnit håndfligede; yderste flige ca. 1mm brede, parallelsidede. VII-IX. B C K

Ceterach officinarum DC. Miltbregne. 5-15cm. Tæt roset. Bladene læderagtige og mørkegrønne ovenpå, rustfiltede nedenunder, 1 x delte med butte flige, der kun er lidt længere end brede. Sporerne 41-48μ. V-VIII. A B C K

C. javorkeanum Vida 10-22cm. Som den foregående, men sporerne 32-39μ. Fligene smallere og med større afstand. V-VIII. A K

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Hjortetunge. I-XII. A B C K

Athyrium filix-femina (L.) Roth Fjerbregne. VII-IX. A B C K

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Bægerbregne. V-IX. A B C K

Polystichum. Skjoldbregne. De yderste afsnit m.m. seglformede.

1. Bladet 1 x delt ..... lonchitis
   " 2(-3) x delt 2.
2. 2. ordens fligene tydeligt stilkede ..... setiferum
   " " " nedløbende aculeatum

Polystichum lonchitis (L.) Roth Krumfinnet skjoldbregne. 15-60 cm. Bladet stift, overvintrende, med 15-50 par seglformede flige. VI-VIII. A B C

P. aculeatum (L.) Roth Alm. skjoldbregne. 30-90cm. Minder om en Mangeløv, men med m.m. seglformede flige. De nederste flige 1/2-1/3 x kortere end de midterste. VI-VIII. B C K

P. setiferum (Forsskål) Woynar Blød skjoldbregne. 30-120cm. Ligner aculeatum, men de nederste flige kun lidt kortere end de midterste. VI-VIII. A B C K

Dryopteris. Mangeløv.

1. Bladtænderne brodspidsede ..... 2.
   " ikke brodspidsede 3.
2. Bladstilkens skæl med mørk ribbe eller grund ..... dilatata
   " " ensfarvet lyse carthusiana
3. Inderste 2. ordens afsnit siddende ..... filix-mas
   " " " " stilkede 4.
4. Bladet smalt lancetformet, bredest lige under midten villarii
   " bredere, bredest ved grunden pallida

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Alm. mangeløv. VII-IX. A B C K

D. villarii (Bell.) Woynar Klippemangeløv. 15-40cm. Bladstilken ofte højst 1/3 x pladen, tæt kirtlet og skællet. Bladpladen mørkegrøn, tæt dækket af citronduftende kirtler. VII-IX.

D. pallida (Bory) C.Chr. Blegt mangeløv. 15-60cm. Bladstilken ofte mindst 2/3 x pladen, svagt kirtlet og tæt skællet. Bladpladen lysegrøn, svagt kirtlet. VII-IX.

D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs Smalbladet Mangeløv. B C

D. dilatata (Hoffm.) A.Gray Bredbladet mangeløv. VII-IX. K

Blechnum spicant (L.) Roth Kambregne. VI-IX. C

Woodwardia radicans (L.) Sm. Kæmpebregne. 30-300cm. Bladene 2 x delte med ufuldstændigt adskilte, ganske finttandede sideafsnit. Sporehobene linjeformede, langs hovedribberne. II-IX. C K

Polypodium interjectum Shivas Storbladet engelsød. 20-30cm. Bladene mest 2-4 x så lange som brede, fligene oftest m.m. helrandede. Jordstænglens skæl 3-6mm. III-IX. B C K

P. australe Fée (P. cambricum) Sydlig engelsød. 20-30cm. Bladene 0,8-2 x så lange som brede, trekantede. Jordstænglens skæl 5-11mm. Fligene ofte tydeligt tandede. II-VI. A B C K

Marsilea. Kløverbregne. En krybende jordstængel som hos Pilularia med grupper af langstilkede, firkløverlignende blade. Med runde sporefrugter fra jordstænglen på 3-5mm.

M. quadrifolia L. Kløverbregne. 10-30cm. Sporefrugterne på 1-2 cm lange, ofte grenede stilke. Bladene glatte. VII-IX. K

M. strigosa Willd. Dunet kløverbregne. 10-20cm. Sporefrugterne m.m. siddende. Bladene dunede. III-VI. A: Nær Taranto.

Pilularia globulifera L. Pilledrager. VII-IX. A: Lago di Salpi.

Salvinia natans (L.) All. Svømmeblad. Enårig vandplante. Stænglen 5-10cm lang med modsatte, elliptiske til ægformede, finvortede blade på 10-14mm. Sporehobe ved bladenes grund. VII-IX. C K

Azolla filiculoides Lam. Stor andemadsbregne. 1-10cm. Grenet, levermoslignende flydeplante med rødder. De øvre bladlapper butte med bred hindekant. VII-IX. Forvildet i K

A. caroliniana Willd. Liden andemadsbregne. 7-25mm. De øvre bladlapper halvspidse med meget smal hindekant. VII-IX. Forvildet i K

PINACEAE

Abies alba Miller Alm. ædelgran. A B C K

Pinus. Fyr.

1. Knopperne stærkt klæbrige af harpiks ..... mugo
   " ikke eller lidt klæbrige 2.
2. Nålene 0,7-1,0mm tykke. Koglen 4-20mm langt stilket ..... 3.
   " 1,0-1,9mm " . Koglerne m.m. siddende 4.
3. 1.års kviste grålige. Koglestilken 1-2cm, ofte krum halepensis
   1.års kviste brunlige. Koglestilken 4-10mm, ret brutia
4. Kvistene hvidgrå i 3 år. Arrene efter nålene ikke særligt fremtrædende ..... leucodermis
   Kvistene brunlige fra 1. eller 2. år. Nålenes ar tydeligt udragende 5.
5. Stammens bark rødbrun. 1.års kviste grågrønne ..... pinea
   " " grålilla til mørk. 1.års kviste brunlige nigra

Pinus nigra Arnold Østrigsk fyr. Knopperne lidt klæbrige (ikke klæbrige hos de andre arter + mugo). Koglerne 3½-8cm. 3 ssp.:
ssp. nigra: Nålene 8-12cm, m.m. stive. K: Cervialto.
ssp. laricio (Poiret) Maire: Nålene 8-13cm, m.m. bøjelige. C
ssp. dalmatica (Vis.) Franco: Nålene 4-7cm, ganske stive. Plant.

P. mugo Turra Bjærgfyr. K: Tre Confini og Zaffiretto.

P. leucodermis Antoine Hvidbarket fyr. -30m. Barken askegrå, gulligt afskallende. Nålene 7-9cm, stive og stikkende. B C K

P. halepensis Miller Gråfyr. 5-20m. Barken sølvgrå, efterhånden rødligbrun og stærkt furet. Nålene 6-12cm, bøjelige. Koglerne 6-12cm, bliver siddende i mange år. A B C K

P. brutia Ten. 5-20m. Barken som hos foregående. Nålene 8-12cm, bøjelige. Koglerne 5-11cm, mangeårige. Undertiden dyrket.

P. pinea L. Pinje. 8-25m. Parasolformet krone. Stammen orangerødt afskallende. Nålene 10-20cm. Koglen 8-14x10cm, skinnende brun. A B C K

CUPRESSACEAE

Cupressus sempervirens L. Ægte cypres. 5-20m. Ofte søjleformet vækst. Trinde, mørkegrønne kviste med skælformede blade. Koglerne kuglerunde, 2-4cm, bestående af 8-14 skjoldformede skæl. A B C K

Juniperus. Ene. Frugten bæragtig.

1. Bladene skælformede ..... phoenicea
   " nåleformede 2.
2. Nålene med 2 lyse striber på oversiden ..... oxycedrus
   " " 1 lys stribe på oversiden communis

Juniperus communis L. Almindelig ene. 2 underarter:
ssp. communis: Nålene 10-20x1-1,5mm, ikke så tætstillede. Opret busk eller lille træ. Nåleafstanden indtil 5mm. A B C K
ssp. hemisphaerica (K.Presl) Nyman: Nålene 10-15x1,3-2mm, tætstillede; deres afstand indtil 2mm. Lav busk indtil 2,5m. C K

Juniperus oxycedrus L. Stikkende ene. 1-5m. Nålene 15-25mm.2ssp:
ssp. oxycedrus: Nålene højst 2mm brede. Bærret rødbrunt og skinnende, 7-11mm, lidet blådugget.
ssp. macrocarpa (S.& S.) Ball: Nålene indtil 2½mm brede. Bærret brunligt-blådugget. 8-15mm.

J. phoenicea L. Skælene. 1-4(8)m. Skælbladene i 6 rækker på trinde kviste, butte eller svagt spidse, tydeligt hindekantede. Bærret 7-13mm, mørkerødt som modent. A K

TAXACEAE

Taxus baccata L. Taks. A B C K

EPHEDRACEAE

Ephedra. Ledris. Udpræget padderokkelignende buske med små akselstillede blomsterstande i nøgler. Bladene stærkt reducerede til korte skeder på få mm.

1. Kvistene tynde, under 1mm tykke. Bladskederne 1,0-1,5mm lange og 0,6-0,8mm tykke ..... major
   Kvistene 1-3mm tykke med bladskeder på 1,5-3,5x1-2mm 2.
2. Bladskederne sortbrune i hele deres længde ..... fragilis
   " kun med sortagtig grund, ellers gråhvide distachya

Ephedra fragilis Desf. Skørt ledris. 50-150cm. Kvistene skøre som tørre, knækker let i leddene. Mest på sandstrand. 0-300m. C

E. distachya L. Grønt ledris. 50-100cm. Kvistene ikke skøre. På sandstrand. A

E. major Host Tyndt ledris. 20-50cm. Kvistene skøre som tørre. De gamle grene med rødbrun, afskallende bark. Bladskederne brune. Kalkklipper. 200-1300m. A (M.S.Angelo på Gargano) B (Abriola)

SALICACEAE

Salix. Pil.

1. Ihvertfald nogle af de større blades stilke med 1-4 kirtler. Bladene 3-11 x så lange som brede ..... 2.
   Bladstilkene uden kirtler 4.
2. Knopper og bladundersider silkehårede ..... alba
   " " " ej silkehårede, til sidst glatte 3.
3. Barken m.m. dybt furet- Fodfligene mest affaldende fragilis
   " jævn. Fodfligene blivende triandra
4. Grenene udstrakte langs jordoverfladen ..... retusa
   Stammer og grene oprette 5.
5. Bladundersiden blågrøn med grøn spids ..... apennina
   " ensfarvet 6.
6. Bladene helt glatte ..... 7.
   Bladundersiden dunet til filtet 8.
7. Bladgrunden afskåret til øret ..... amplexicaulis
   " kileformet eller svagt afrundet purpurea
8. Bladene 6-16 x så lange som brede ..... elaeagnos
   " 1-4 x " " " " 9.
9. Sidste års kviste tæthårede ..... 10.
   " " " glatte eller næsten glatte 11.
10. 10-15 par sideribber ..... pedicellata
    7-9 " " cinerea
11. Bladene bredest på eller under midten ..... caprea
    " " over midten appendiculata

Salix fragilis L. Skørpil. II-IV. A B C K

S. alba L. Hvidpil. II-IV. A? B C K

S. triandra L. Mandelpil. III-V. A B C K. 2 underarter:

ssp. triandra: Bladundersiden bleggrøn.
ssp. discolor (Koch) Arc.: Bladundersiden blågrøn eller hvidlig.

Salix retusa L. Stumpbladet pil. Bladene 8-20x5-8mm, glatte, ofte afskårne eller udrandede fortil, med kileformet grund. V-VIII. B: M.Arioso.

S. apennina Skvortsov (S. nigricans p.p.) 2-4m. 1.års-kvistene dunede. Bladene 3-9x1-5cm, finttandede, oftest spredt dunede nedenunder, sorte som tørre. IV-V. 300-1800m. B

S. pedicellata Desf. Stilkpil. 1-10m. 2-4-års kviste med vedstriber. Bladene 5-10x2-4cm, tyndt dunede nedenunder. Fodfligene store og affaldende. III-IV. Langs vandløb. B C

S. appendiculata Vill. Bjærgpil. 1-6m. Bladundersiden blågrøn, tæt til spredt rubørstet; ribbenettet tætmasket. Bladene 7-15cm, ujævnt tandede. Fodfligene 5-10mm, blivende. IV-VI. B K

S. cinerea L. Gråpil. III-IV. A B C K

S. caprea L. Seljepil. III-V. A B C K

S. elaeagnos Scop. Lavendelpil. 3-6m. Bladene smalt linjeformede med indrullet rand, som unge tæt hvidfiltede på begge sider. Tynde, ofte hængende, gule eller rødbrune grene. III-IV. B C K

S. purpurea L. Purpurpil. III-IV. A B C K. 2 underarter:
ssp. purpurea: Bladene spredte, højst de nederste på grenene modsatte. Bladet indtil 12 x stilken og 5-10 x så langt som bredt.
ssp. lambertiana (Sm.) Neumann: Ihvertfald nogle grene med alle blade modsatte. Bladet 15-20 x stilken og 4-8 x så langt som bredt

S. amplexicaulis Bory -3m. Næsten alle blade modsatte. De større blade 3-5cm, 3-4 x så lange som brede. IV-V. C

Populus. Poppel.

1. Bladundersiden filtet ..... 2.
   " glat som moden 3.
2. Bladene håndformet 3-5-lappede; undersiden hvidfiltet alba
   " groft bugtet-tandede; undersiden gråfiltet canescens
3. Bladet næsten kredsrundt, uden gennemskinnelig rand tremula
   " æg-rudeformet til ægformet-trekantet, med gennemskinnelig rand 4.
4. Bladgrunden mest med 1-2 kirtler. Unge kviste m.m. kantede canadensis
   Bladgrunden uden kirtler. Unge kviste trinde nigra

Populus alba L. Sølvpoppel. A B C K

P. canescens (Aiton) Sm. Gråpoppel. K

P. tremula L. Bævreasp. A B C K

P. nigra L. Sortpoppel. A B C K

P. canadensis Moench Landevejspoppel. Plantet. A B C K

JUGLANDACEAE

Juglans regia L. Valnød. Plantet og forvildet.

BETULACEAE

Betula pendula Roth Vortebirk. K: Salernitano.

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Rødæl. A? B C K

A. cordata (Loisel.) Loisel. Hjærtebladet æl. 4-8m. Unge kviste klæbrige. Bladene hjærteformede og finttandede; bladgrunden kan dog være afskåret. B C K. 0-1500m.

CORYLACEAE

Carpinus betulus L. Avnbøg. Bladoversiden med indsænkede ribber.

Bladene 6-8cm. Hunblomsternes svøb trelappet. V-VI. A B C K

Carpinus orientalis Miller Småbladet avnbøg. 1-5(20)m. Bladene som hos foregående, men mindre, 2½-4cm lange. Hunblomsternes svøb trekantet-ægformet. IV-V. A B C K

Ostrya carpinifolia Scop. Humlebøg. 5-10m. Bladene som Avnbøgs, men oversidens ribber ikke indsænkede; med 13-19 par sideribber (10-14 hos Avnbøg); 5-8cm lange. Hunraklerne ligner forlængede humlekopper. IV-V. A B C K

Corylus avellana L. Hassel. III-IV. A B C K

CUPULIFERAE

Fagus silvatica L. Bøg. A B C K

Castanea sativa Miller Ægte kastanje. 5-25m. Bladene 18-22cm, lancetformede, skarpt savtakkede med brodspidsede tænder. A B C K

Quercus. Eg.

1. Bladene helrandede til tandede, læderagtige ..... 2.
   " lappede til fligede, tyndere 5.
2. Bladene regelmæssigt savtakkede med 8-13 par tænder trojana
   " ikke regelmæssigt savtakkede 3.
3. Bladundersiden hurtigt glat. Bladene 1½-4cm ..... coccifera
   " tæt stjærnefiltet. Bladene 3-8cm 4.
4. Knopperne 1-2mm. Barken meget tyk og korkagtig ..... suber
   " 3-5mm. " anderledes ilex
5. Bladlapperne brodspidsede ..... macrolepis
   " ikke brodspidsede 6.
6. Unge kviste glatte ..... 7.
   " " dunede til filtede 9.
7. Bladstilken mest 2-12mm. Bladgrunden oftest øret ..... robur
   " 15-30mm. Bladgrunden uden øren 8.
8. Modne bladundersider med dunede ribbehjørner ..... petraea
   " " helt glatte dalechampii
9. Akselbladene bliver siddende i mindst 2 år ..... cerris
   " hurtigt affaldende 10.
10. 8-9 par bladlapper. Filten brunlig ..... frainetto
    5-6 " " . " gråhvid eller gulgrå 11.
11. Bladstilken 2-5mm. bladgrunden oftest øret. Agernet med en stilk på 2-5cm ..... robur
    Bladstilken oftest 5-25mm. Agernet m.m. siddende 12.
12. Bladstilken 15-25mm. Sidestillede vinterknopper 5-8mm virgiliana
    Bladstilken oftest 5-12mm. Sidestillede vinterknopper under 5mm pubescens

Q. ilex L. Steneg. 1-20m. Kvistene gråfiltede. Bladene 3-7cm, helrandede eller tornet-savtakkede, skinnende ove npå, gråfiltede nedenunder. 7-14 par sideribber. IV-VI. A B C K

Q. suber L. Korkeg. 5-15m. Bladene bølget-tandede, blødere end hos foregående; midterribben ofte noget bølget. 5-7 par sideribber. Bladstilken 6-20mm. IV-V. A K

Q. trojana Webb Glanseg. 5-15m. Kvistene gul- til gråbrunt filtede. Bladene 5-10cm, m.m. skinnende mørkegrønne ovenpå, gul- til grågrønne nedenunder. V-VI. A B

Q. macrolepis Kotschy Brodeg. 10-15m. Bladene 6-10cm med 3-7 par trekantede lapper, der ender i en brod. Undersiden filtet. A B

Q. cerris L. Frynseeg. 2-25m. Let kendelig på de blivende, linjeformede, 7-11mm lange fodflige. Eneste løvfældende art med agerne siddende under bladduskene. IV-V. A B C K

Quercus petraea L. Vintereg. IV-V. A B C K

Q. dalechampii Ten. Fligeg. 2-20m. Bladet 7-12cm, noget læderagtigt. Agernskålen grå. Barken ofte med dybe og brede længderevner. Bladene ofte uregelmæssigt lappede. IV-V. A B C K

Q. robur L. Stilkeg. IV-V. A K. 2 underarter:
ssp. robur: Bladene tynde. Blade og kviste glatte.
ssp. brutia (Ten.) O.Schwarz: Bladene noget læderagtige. Kviste og bladundersider dunede som unge. Napoli, Ischia, Kalabrien.

Q. virgiliana (Ten.) Ten. Langstilket duneg. Agernskålens skæl løst tiltrykte. Unge kviste påfaldende kraftige. Bladet 6-14x4-11 cm, ofte glat og blågråt dugget langs randen. IV-V. A B C K

Q. pubescens Willd. Duneg. Agernskålens skæl fast tiltrykte. Unge kviste slanke. Bladet 4-8x3-6cm, vedvarende dunet langs randen. Ofte buskformet. IV-V. A B C K

Q. frainetto Ten. Kameg. 3-20m. Unge kviste klæbrige med talrige punktformede korkporer. Bladene 2/3-4/5 fligede. Fligene parallelsidede med 1-3 par sidetænder. IV. A B C K

Q. coccifera L. ssp. calliprinos (Webb) Holmboe Kermeseg. 2-8m. Stedsegrøn busk. Bladene m.m. ægformede, skinnende mørkegrønne, tornet-tandede. Underarten har de unge kviste tæt gulligt stjærnefiltede. IV-V. A B(Senise)

ULMACEAE

Ulmus. Ælm.

1. Bladets længste side danner en afrundet lap ved grunden, der m.m. overlapper bladstilken ..... glabra
   Bladgrunden overlapper ikke bladstilken 2.
2. Kvistene tæt dunede. 12-16 par bladribber ..... canescens
   " glatte til svagt dunede. 7-12 par bladribber minor

Ulmus glabra Hudson Skovælm. III-IV. A(Gargano) K

U. minor Miller Småbladet ælm. II-III. A B C K

U. canescens Melville Gråælm. III-IV. A(Taranto) ?

Celtis australis L. Nældetræ. 10-25m. Bladene minder om de smalle blade hos Stor nælde, langt tilspidsede, mørkegrønne med ru overside. En 8-10mm stor, sortebrun stenfrugt. IV-V. A B C K

MORACEAE

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Papirmorbærtræ. 6-10m. Kvistene tæt låddent-filtede. Bladene 7-20x6-12cm, æg-rudeformede og tilspidsede eller trefligede, savtakkede,ru og mørkegrønne ovenpå og grågrønt filtede nedenunder. Plantet og forvildet i A B C K

Morus nigra L. Sort morbær. Træ med kraftige, ru grene. Bredt æg-hjærteformede blade med dunet under- og mat overside. Mørkpurpur, brombærlignende frugt. Dyrket og sjældent forvildet. IV-V.

M. alba L. Hvidt morbærtræ. Som forrige, men med glatte, slanke kviste, glat bladunderside og m.m. skinnende overside. Rødlig til hvid frugt. Dyrket og sj. forvildet. IV-V.

Ficus carica L. Figen. A B C K

CANNABACEAE

Humulus lupulus L. Humle. V-VIII. A B C K

Cannabis sativa L. Hamp. Dyrket og forvildet. VI-IX.

URTICACEAE

Urtica. Nælde.

1. Bladstilken lig eller længere end bladpladen. Enårige .... 2.
   " kortere end bladpladen. 1-flerårige 3.
2. Hunblomsterne i stilkede, kugleformede hoveder .. pilulifera
   " i lange, udstående klaser dubia
3. Enårig. Han- og hunblomster i samme klase ..... urens
   Flerårig. Tvebo dioica

Urtica dioica L. Stor nælde. V-XI. A B C K

U. dubia Forsskål (U. membranacea) Udspærret nælde. 20-30cm. Bladet ægformet med 8-15 par tænder og 2 fodflige. I-XII. ABCK

U. urens L. Liden nælde. X-IV. A B C K

U. pilulifera L. Kuglenælde. 20-50cm. Bladene oftest dybt savtakkede. 4 fodflige. IV-VI. A B C K

Parietaria. Springknap.

1. Støttebladene mindst lig frugtblosteret. Enårig lusitanica
   " kortere end " . Flerårige 2.
2. Liggende eller opstigende, stærkt grenet ..... diffusa
   Opret og lidet grenet officinalis

Parietaria officinalis L. Alm. springknap. 30-100cm. Bladene smalt rudeformede, med gennemskinnelige årer. Støttebladene helt frie. Blosteret 2mm hele tiden. V-X. A B C K

P. diffusa Mert.& Koch (P. judaica) Grenet springknap. 20-40cm. Bladene højst 5cm, årerne ikke gennemskinnelige. Støttebladene sammenvoksede ved grunden. Blosteret forlænges til 3-4mm i frugt. I-XII. A B C K

P. lusitanica L. Enårig springknap. 5-20cm. Bladene 1-2cm x 8-12mm. Frugtblosteret 1½mm, med indbøjede spidser. I-III. ABCK

SANTALACEAE

Urter eller småbuske med spredte, oftest smalle blade uden fodflige. Små blomster med enkelt bloster og kegleformet underdel.

Osyris alba L. Kratris. Rislignende busk op til 120cm med noget kantede grene og ca. 1cm lange, linjeformede blade. Små gulgrønne, 3-4-tallige blomster i små kvaste. III-VI. A B C K

Thesium. Nålebæger. Urter. Blomsterne (4)5-tallige.

1. Enårig. Nødden netåret ..... humile
   Flerårig. Nødden længderibbet 2.
2. Blosteret omtrent af nøddens længde ..... pyrenaicum
   " meget kortere end nødden 3.
3. Bladene 3-5-årede, oftest mørkegrønne ..... bavarum
   " 1-årede 4.
4. Med flere mangeblomstrede topgrene ..... divaricatum
   Topgrenene 1-4-blomstrede 5.
5. Længste klasegrene over 5mm. Mest over 15cm .... linophyllon
   " " under 5mm. Mest 5-10cm høj parnassi

Thesium pyrenaicum Pourret Engnålebæger. 10-20cm. Blomsterne i klase eller top. Blosteret næsten så bredt som den ellipsoidiske frugt. VI-VII. K (Montevergine)

T. parnassi DC. Dværgnålebæger. Med udløbere. Bladene 8-12mm. Klasen kort og fåblomstret, 1-4cm. 1500-2000m. V-VIII. C

T. bavarum Schrank Stort nålebæger. 25-60cm. Ingen udløbere. Stænglen forveddet ved grunden, 2-4mm tyk her og med tæt taglagte skæl. Med flere, mangeblomstrede topgrene. V-VII. B C K

T. linophyllon L. Risnålebæger. 10-30cm. Nær foregående. Med udløbere. Stænglen tynd, ikke forveddet, uden skæl forneden. Bladene 2-3mm brede (4-8mm hos bavarum). V-VII. A B C K

Thesium divaricatum Jan Topnålebæger. 20-30cm. Ingen udløbere. Bladene 20-25xlmm, ofte ensidigt rettede, furede. Toppen åben. 0-1200m. V-VI. A B C K

T. humile Vahl Netåret nålebæger. 5-20cm. Liggende til opret. Bladene 10-20xl-2mm. Blomsterne kortstilkede. Støttebladet 2-5 x blomsten. 0-500m. IV-V. A B C K

LORANTHACEAE

Loranthus europaeus Jacq. Egemistelten. Sommergrøn. Grenene grå og forveddede. Blomsterne i klaser. Bærrene gule. Kun på Eg og Ægte kastanje. 0-800m. IV-V. A B C K

Viscum album L. Mistelten. Stedsegrøn. Grenene urteagtige og grønne. Næsten aldrig på Eg. 0-1200m. III-V. A B C K. 2 ssp.:
ssp. album: På løvtræer. Bærret mest hvidt.
ssp. austriacum (Wiesb.) Vollmann: Fyrremistelten. På Fyr og Lærk. Bærret mest gult. C

ARISTOLOCHIACEAE

Asarum europaeum L. Hasselurt. III-V. B (Lago di Sirino)

Aristolochia. Slangerod.

1. 2-5m høj, stedsegrøn slyngplante ..... sempervirens
   Højst 1m høje, løvfældende urter 2.
2. 2-8 lysegule blomster sammen i bladhjørnerne .... clematitis
   Blomsterne enlige i bladhjørnerne 3.
3. Bladstilken kortere end blomsterstilken, 1-2mm ..... rotunda
   " mindst lig blomsterstilken 4.
4. Bladstilken ca. = blomsterstilken ..... clusii
   " 2 x " 5.
5. Blosterets krave oftest længere og bredere end røret pallida
   " " " kortere og smallere " " lutea

Aristolochia sempervirens L. Pibeblomst. Bladene -10x6cm, læderagtige og skinnende ovenpå. Blomsterne 2-5cm, gule med lilla striber og mørk krave. 0-500m. VI-VII. A(Otranto) K(ved Napoli)

A. clematitis L. Alm. slangerod. IV-V. A (Gargano)

A. rotunda L. Rund slangerod. 20-40cm. Bladene ægformede til runde. Blomsterne gråliggrønne eller -gule, kraven brunlilla. Blomsterstilken 6-8mm. 0-800m. IV-VI. A B C K

A. pallida Willd. Bleg slangerod. 15-40cm. Bladene æg-nyreformede, stilken 8-20mm. Blomsten 3-5cm, grøngule med lilla striber.

A. lutea Desf. Gul slangerod. Nær foregående. IV-V. A B C K

A. clusii Lojac. (A. longa p.p.) 20-90cm. Bladene dunede på begge sider, ægformet-trekantede. Blomsterne brun- til gulgrønne med brunlilla krave, 3-5cm. 0-800m. IV-V. A B C K

RAFFLESIACEAE

Cytinus hypocistis (L.) L. Alm. elveræg. 3-8cm høj snylteplante på hvidblomstrede Cistus-arter. Planten kødfuld, dækket af gule, orange eller skarlagenrøde, kødede skælblade. 5-10 kraftigt gule blomster omgivne af kødede højblade af skælbladenes farve.IV-V.AK

C. ruber (Fourr.) Komarov Karminrødt elveræg. Som den foregående men skælbladene kraftigt karminrøde og blomsterne hvidgullige eller orangerøde. På lyserøde Cistus-arter. IV-V. A

POLYGONACEAE

Polygonum. Pileurt.

1. Bladene hjærte- eller pilformede. Slyngende stængel ..... 2.
   " æg- til linjeformede. Ikke slyngende 3.

2. Frugtblosteret bredvinget. Nødden blank ..... dumetorum
" smalrandet. " mat convolvulus
3. Blomsterne i nøgler på 1-4 i bladhjørnerne ..... 4.
" i endestillede aks 12.
4. Flerårig ..... 5.
Enårig 8.
5. Blomsterstandens skeder kortere end dens led equisetiforme
" " længere " " " 6.
6. Skederne med 8-12 kraftige, grenede, brune årer .. maritimum
" " 4-6 svage årer 7.
7. Bladene spidse, undersidens sideribber tydelige .... romanum
" butte, undersiden uden sideribber gussonii
8. De øvre støtteblade hindeagtige og kortere end blomsterne 9.
Alle støtteblade bladagtige og længere end blomsterne 10.
9. Stænglerne liggende. Alle støtteblade korte ..... arenarium
" oprette. Nedre " bladagtige patulum
10. Bladene nogenlunde lige store ..... arenastrum
Sidegrenenes blade tydeligt mindre end hovedgrenenes 11.
11. Større blade 1-4mm brede ..... rurivagum
" " 5-8mm " aviculare
12. Det endestillede aks tyndt med bøjet akse ..... 13.
" " " tæt med lige akse 15.
13. Flerårig. Større blade ofte over 10cm ..... salicifolium
Enårig. Bladene sjældent over 8cm 14.
14. Bladene skarptsmagende. Skederne langt randhårede hydropiper
" mildtsmagende. " kort " mite
15. Flerårig ..... 16.
Enårig 17.
16. Grundbladene med oventil vinget stilk ..... bistorta
Bladstilkene uvingede amphibium
17. Skedernes randhår under 1,5mm. Blosteret gulkirtlet
lapathifolium
Skedernes randhår 2-4mm. Blosteret m.m. ukirtlet persicaria

Polygonum equisetiforme Sm. Padderokkepileurt. 30-80cm. Bladene smalt lancetformede, 1,5-3cm x 2-4mm, tit affaldende. Stænglerne 3-5mm tykke. Skederne stærkt lasede foroven. VII-X. A

P. maritimum L. Året pileurt. Bladene blå- og stedsegrønne. Nødden 3,5-5mm, skinnende, ca. = blosteret. På strande. V-VIII. A K

P. romanum Jacq. Slangepileurt. 40-100cm. Liggende. Tæt bladet foroven, ofte bladløs forneden. Bladene linje-lancetformede, 10-25x2-5mm. Frøene matte, 2-3mm. 0-600m. VII-X. A B C K

P. gussonii Tod. Spatelpileurt. 10-30cm. Bladene spatelformede. Ligner P. arenastrum, men flerårig. IX-X. K (Gl. fund)

P. patulum Bieb. (P. bellardii) Russisk pileurt. 20-50cm. Frugtblosteret grålighvidt, fortykket og med fortykkede ribber, 2,5-3 mm. Bladene 25-45mm, ofte affaldende. 0-1600m. IV-X. A B C K

P. arenarium W:& K. Spinkel pileurt. 20-50cm. Blosteret fortykket i frugt, men ikke lukket om nødden, 1,8-2,5(3,0)mm. Spidse, linje-lancetformede, ofte affaldende blade. V-X. A B

P. aviculare L. Hønsegræs. 0-1850m. VI-X. A B C K

P. rurivagum Jordan Spidsbladet pileurt. 0-1000m. VI-IX. A B C K

P. arenastrum Boreau Almindelig pileurt. 0-1000m. VI-IX. A B C K

P. mite Schrank Fjærnblomstret pileurt. 10-60cm. Bladene mest 1-2cm brede, med utydelige sideribber. Nødden 1,8-2,5mm. Randhårede blade. VII-X. C

P. hydropiper L. Bidende pileurt. VII-X. B K

Polygonum salicifolium Brouss. Pilebladet pileurt. 30-70cm. Bladene finttandet randhårede. Lyserøde blomster i lange, slanke aks. Med udløbere eller rodslående grene. VII-IX. A C K

P. lapathifolium L. Bleg pileurt. 0-1300m. VII-X. A B C K

P. persicaria L. Ferskenpileurt. 0-1300m. VII-X. A B C K

P. amphibium L. Vandpileurt. 0-1400m. VI-VIII. A B C K

P. bistorta L. Slangeurt. 20-100cm. Opret. Nedre blade 5-15cm, aflangt ægformede med afstudset grund. Et tæt, valseformet, lyserødt aks. 900-2000m. VII-IX. B C K

P. convolvulus L. Snerlepileurt. 0-1200m. V-VIII. A B C K

P. dumetorum L. Vingepileurt. 0-1000m. V-VIII. A B C K

Rumex. Skræppe.

1. Indre blosterblade tandede ..... 2.
   " " helrandede 6.
2. Bladgrunden tilspidset ..... 3.
   " afrundet eller hjærteformet 4.
3. Nedre blade 1-3cm ..... bucephalophorus
   " " mindst 5cm paluster
4. Blomsterstilkene tykke, leddede nær midten ..... pulcher
   " tynde, " under midten 5.
5. Bladstilk og midterribbe dunede ..... nepalensis
   " " " glatte obtusifolius
6. Indre blosterblade udrandede foroven ..... 7.
   " " ikke udrandede 8.
7. 2-3m høj halvbusk med æg-rudeformede blade ..... lunaria
   Urt med pilformede blade thyrsoides
8. Bladpladen ca. så lang som bred ..... 9.
   " tydeligt længere end bred 10.
9. Bladet 15-30x12-25cm ..... alpinus
   " 2-4cm scutatus
10. Bladet med hjærteformet, afrundet eller kileformet grund 11.
    " " pil- eller spydformet grund 14.
11. Indre blosterblade 3-4mm, tungeformede ..... 12.
    " " 5-8mm, ægformet-trekantede 13.
12. Alle 3 blosterblade med aflange bruskkorn ... conglomeratus
    1 blosterblade med et stort, rundt bruskkorn sanguineus
13. Grundbladene 50-100cm. Vandplante ..... hydrolapathum
    " 10-20cm. Landplante crispus
14. Frugtblosteret under 2mm. Bladgrunden spydformet ..... 15.
    " over 2mm. " pilformet 16.
15. Nødden 0,9-1,3mm. Grundbladene indtil 10 x så lange som brede ..... tenuifolius
    Nødden 1,3-1,5mm. Grundbladene 4-6(8) x så lange som brede acetosella
16. Blomsterstanden dobbeltgrenet ..... 17.
    " enkeltgrenet 18.
17. Stængelbladene 2-3 x så lange som brede, -8cm amplexicaulis
    " mindst 4 x så lange som brede intermedius
18. Skederne helrandede. Nedre blade 3-7cm brede .... arifolius
    " frynsede. Nedre blade smallere 19.
19. Stængelbladene ca. 10 x så lange som brede ..... nebroides
    " 3-5 x så lange som brede 20.
20. Ydre blosterblade ca. 2mm. Med rodknolde ..... tuberosus
    " " 1-1,5mm. Uden " acetosa

Rumex tenuifolius (Wallr.) Löve Smalbladet rødknæ. V-VIII. C

R. acetosella L. Rødknæ. 0-2200m. V-VIII. A B C K

R. lunaria L. Busksyre. Grenene vredne med blågrøn-lilla bark.

Bladene 5-7cm. Indre blosterblade 5x7mm. V-VI. Dyrket og forvildet i C (Reggio)

Rumex scutatus L. Skjoldsyre. 20-40cm. Bladene noget vorterodsagtige. Indre blosterblade 4-5mm, rund, uden bruskvorter. Toppen grenet. 500-2600m. VI-VIII. A B C K

R. tuberosus L. Knoldsyre. 10-60cm. Bladene som hos Syre, men rødderne fortykkede. Blosterbladene 4x4-5mm, næsten runde i det, med tydelige bruskkorn. 100-1500m. V-VI. A B

R. arifolius All. (R. alpester) Bjærgsyre. 30-100cm. Bladene tynde, de nedre ca. 2 x så lange som brede, nærmest ægformede med hjærteformet grund. 1200-2200m. VII-VIII. A B C

R. amplexicaulis Lapeyr. Bredbladet syre. 50-120cm. Nedre blade elliptiske, indtil 15x9cm. Stængelbladene med omfattende flige. Toppen åben; kun de nedre grene atter grenede. 300-700m. V-VI. K (Napolit. på Castellamare-bjærgene indtil Piedimonte d,Alife, Montevergine og Cerreto)

R. nebroides Campd. (R. gussonei) Smalbladet syre. 20-50cm. Nedre blade smalt spidsfligede; øvre blade få og smalle, 5-20 x så lange som brede. 1000-2200m. V-VII. B C K

R. acetosa L. Alm. syre. 0-2000m. V-VIII. A B C K

R. intermedius DC. Nyreblomstret syre. 30-60cm. Ligner acetosa, men grundbladene ofte smallere med udstående, ofte tvedelte flige. Stængelbladene linjeformede, pilformede. 0-700m. IV-VI. A B

R. thyrsoides Desf. Sommerfuglesyre. 30-50cm. En pilbladet syre med blosteret næsten dobbelt så bredt som langt, ca. 4x8mm og indsnøret midtpå. 0-1200m. IV-V. A B C K

R. alpinus L. Sæterskræppe. 50-100cm. Grundbladene meget store, indtil 50cm. Toppen tæt. Indre blosterblade 4,5-3,5-5mm, uden bruskkorn. 1600-2300m. VII-VIII. B C K

R. hydrolapathum Hudson Vandskræppe. V-VII. A B K

R. crispus L. Kruset skræppe. V-VII. A B C K

R. conglomeratus Murray Nøgleskræppe. VI-VIII. A B C K

R. sanguineus L. Skovskræppe. VI-VII. A B C K

R. nepalensis Sprengel Hageskræppe. 20-100cm. Nedre blade 5-10 x 2-7cm, butte. Toppen lidet grenet, ofte langgrenet, med adskilte kranse. Blosteret med krogbøjede tænder indtil 5mm. VI-VII. B

R. pulcher L. Violinskræppe. 20-60cm. Nedre blade ofte violinformede. Toppen med udstående grene, zigzagbøjet foroven. Nøglerne bladede, ofte adskilte forneden. 0-1750m. V-VI. A B C K. 2ssp: ssp. pulcher: Blosteret med mest 4 par 1-2mm lange tænder. ssp. divaricatus (L.) Murb. (ssp. woodsii): Blosteret med indtil 8 par korte og ofte uregelmæssige tænder.

R. obtusifolius L. Butbladet skræppe. 0-2000m. VI-VIII. A K

R. paluster Sm. Sumpskræppe. 0-600m. VII-IX. A (Gargano)

R. bucephalophorus L. Oksehovedskræppe. 6-30cm. Lille enårig. Blomsterne i klaser, hængende med 2 slags stilke, nogle tynde og andre lange, brede og flade. 0-1700m. II-V. A B C K

Emex spinosa (L.) Campd. Tornspinat. 30-60cm. Spinatlignende enårig, der kendes på sine frugter, der sidder i nøgler i bladhjørnerne og udmærker sig ved hver 3 kraftige, udadrettede torne. Æg-spydformede blade. 0-500m. I-V. A C

CHENOPODIACEAE

1. Kødede, leddede stængler med modsatte grene uden blade ... 2.
   Anderledes 3.
2. Flerårig. Nogle grene golde ..... Arthrocnemum
   Enårig. Alle grene frugtbare Salicornia
3. Bladene små, halvkugleformede, tiltrykte stænglen Halopeplis
   " flade eller trinde 4.
4. Bladene flade ..... 5.
   " trinde eller sylformede 10.
5. Hunblomsterne omgivne af 2 forblade, der forøges i frugt 6.
   " uden sådanne forblade 7.
6. Forbladene sammenvoksede næsten til spidsen ..... Halimium
   " højst 1/2 sammenvoksede Atriplex
7. Bladene linje-lancetformede og helrandede ..... 8.
   " anderledes 9.
8. Blomsterne skjulte af deres støtteblade ..... Corispermum
   " synlige Bassia hyssopifolia
9. Frugtblosteret fortykket, sammenvokset med frugten .... Beta
   " ej " , ikke sammenvokset .... Chenopodium
10. Bladene sylformede, ikke kødede, ofte knippestillede ... 11.
    " trinde eller halvtrinde 12.
11. Flerårig halvbusk med forveddet grund ..... Camphorosma
    Enårig urt Polycnemum
12. Dværgbuske ..... 13.
    Enårige 14.
13. Frugtblosteret vinget. Barken grågrøn ..... Kochia
    " uden vinge. Barken hvidlig Suaeda fruticosa
14. Frugtblosteret vinget. Bladgrunden ikke indsnævret Salsola
    " uvinget eller tornet. Indsnævret bladgrund 15.
15. Frugtblosteret med en torn. Planten m.m. håret ..... Bassia
    " uden " . " glat Suaeda

Polycnemum arvense L. Agerbruskurt. 5-30cm. Stive, sylformede blade på 3-10mm. Blomsterne enlige i hjørnerne af bladlignende støtteblade, med 2 små forblade. VII-X. B

Beta vulgaris L. Bede. VI-VIII. 2 underarter:
ssp. vulgaris: Foderbede. -2m. Opret. Nøglerne 2-8-blomstrede.
ssp. maritima (L.) Arc.: Strandbede. -80cm. Liggende til opret. Nøglerne 1-3-blomstrede. A B C K

B. macrocarpa Guss. Storfrugtet bede. -40cm. Enårig. Bladene m.m. rudeformede, 3-5cm. Blomsterstanden med støtteblade hele vejen. Frugtblosteret op til 5mm. Nær stranden. V-VI. B K

Chenopodium. Gåsefod.

1. Planten klæbrigt dunet, med aromatisk duft ..... 2.
   " glat eller melet, ikke aromatisk 5.
2. Bladene fjerlappede eller fjerdelte ..... 3.
   " hele, kun de større tandede eller lappede 4.
3. Flerårig med udstrakte grene ..... multifidum
   Opret enårig botrys
4. Halvbusk. Bladoversiden håret ..... suffruticosum
   Enårig. Bladoversiden glat ambrosioides
5. Bladet helrandet, undertiden med spydformet grund ..... 6.
   I det mindste de nedre blade lappede eller tandede 8.
6. Flerårig med trekantet-spydformede blade .... bonus-henricus
   Enårige 7.
7. Bladene m.m. rudeformede, melede ..... vulvaria
   " ægformede, ikke melede polyspermum
8. Bladgrunden hjærteformet ..... hybridum
   " ikke hjærteformet 9.
9. Blomsterstanden og bægerets yderside glatte ..... 10.
   " " " " m.m. melede 12.
10. Frøene lodretstillede. Planten ofte m.m. rødlig ..... 11.
    " vandretstillede. " grøn urbicum

11. Nedre stængelblade æg-rudeformede, bugtede til bugtet-tandede ..... rubrum
    Nedre stængelblade (rudeformet) trekantede, helrandet-tandede botryodes
12. Bladoversiden mørkegrøn og lidt skinnende ..... murale
    " ikke skinnende 13.
13. Bladene omtrent så lange som brede ..... opulifolium
    " tydeligt længere end " 14.
14. Bladene med 1 par store lapper, så de virker trelappede ficifolium
    Bladene ikke trelappede 15.
15. Unge dele kraftigt rødlilla. Bladene indtil 11cm giganteum
    " " ej kraftigt rødlilla. Bladene sj. over 6cm album

Chenopodium botrys L. Klæbrig gåsefod. 20-40cm. Planten tydeligt klæbrig. Med kvastagtigt grenede stande fra bladhjørnerne. Bladene bredlappede, ofte kødede. VI-IX. A B C K

C. ambrosioides L. Vellugtende gåsefod. 20-80cm. Med kamferlugt. Bladene lancetformede med bugtet-tandet rand, 4-12cm. Blomsterne i nøgler. VIII-X. A B C K

C. suffrutidosum Willd. Buskgåsefod. 30-80cm. Bladene lidt bredere og lidt dybere bugtet-tandede end hos foregående. VIII-X. A

C. multifidum L. Fliget gåsefod. 20-60cm. Bladene smalt og ofte dybt fligede. Blomsterne i små nøgler. VII-XII. K (Napoli)

C. bonus-henricus L. Stolthenriks gåsefod. VIII-IX. A B C K

C. rubrum L. Rød gåsefod. IX-X. B (Pomarico)

C. botryodes Sm. Druegåsefod. VIII-X. K (Ischia)

C. hybridum L. Hjærtebladet gåsefod. VIII-X. A B C K

C. polyspermum L. Mangefrøet gåsefod. VIII-X. A B C K

C. vulvaria L. Stinkende gåsefod. 10-60cm. Stærktgrenet og grålmelet, med stærk lugt af rådden fisk. Bladgrunden ofte med en stor, spydformet tand. V-IX. A B C K

C. urbicum L. Rank gåsefod. 50-100cm. Planten rank med meget oprette grene. Nedre blade ofte trekantede. VIII-IX. A B C K

C. murale L. Murgåsefod. 10-50cm. Bladene oftest skævt rudeformede, mørkegrønne med skarpt småtandet rand, men aldrig lappede. VI-IX. A B C K

C. ficifolium Sm. Sildig gåsefod. 20-90cm. Stænglen ofte med en kraftig rød plet ved grenenes grund. VII-IX. A K

C. opulifolium Schrader Kortbladet gåsefod. 30-80cm. Bladene æg-rudeformede med en kort og bred lap på hver side. VIII-IX. ABCK

C. album L. Hvidmelet gåsefod. VI-IX. A B C K

C. giganteum D.Don Kæmpegåsefod. ½-3m. Som foregående, men med store, rudeformet-trekantede blade. VIII-X. K (Ischia)

1. Flerårig busk ..... halimus
   Enårige urter 2.
2. Forbladene runde og butte, netårede ..... hortensis
   " spidse, ikke netårede 3.
3. Forbladene sammenvoksede i hele nedre halvdel ..... 4.
   " kun sammenvoksede forneden 5.
4. Toppen endestillet, bladløs eller fåbladet ..... tornabenei
   Både ende- og sidestillede, bladede blomsterstande rosea
5. Nedre blade med afskåret grund ..... latifolia
   " " " kileformet grund patula

Atriplex halimus L. Sømælde. Busk op til 2m med sølvhvide, næsten læderagtige, ægformede, som regel utandede blade. A B C K

Atriplex hortensisL. Havemælde. 30-150cm. Nedre blade bredt ægformet-trekantede, svagt tandede til helrandede, mat grønne eller rødligt anløbne, op til 10cm lange. VII-VIII. B

A. rosea L. Rosenmælde. 25-80cm. Bladene trekantet-rudeformede eller æg-rudeformede, tæt spidstandede. Planten m.m. hvidskællet. Forbladene ofte stærkt vortede. VII-IX. A B C K

A. tornabenei Tineo (A. tatarica p.p.) Hvid enårig med uregelmæssigt bugtede, lancet- eller rudeformede blade. Strandplante. VII-IX. A B C K

A. patula L. Svinemælde. IX-X. A B C K

A. latifolia Wahlenb. (A. prostrata) Spydmælde. VII-IX. A B C K

Halimione portulacoides (L.) Aellen Ustilket kilebæger. 20-50cm. Liggende halvbusk med m.m. aflange, sølvhvide, helrandede blade. Frugtens forblade omvendt trekantede. VI-VII. A B C K

Camphorosma monspeliaca L. Kamferurt. 10-60cm. Kamferlugtende dværgbusk. Bladene 2-10mm. Blomsterne i endestillede aks. 4 uens store blosterblade. 0-300m. VI-IX. A B

Bassia hyssopifolia (Pallas) Volk. Isopbladet tangurt. 10-100cm. Opret enårig. Bladene flade, 30-35x1-3mm, m.m. hårede. Blosteret med torne på 1-1,5mm. V-VI. K (Gl. fund ved Napoli)

B. hirsuta (L.) Asch. Tangurt. Bladene halvtrinde og kødede. Blosterets vorter højst 1mm. Modne stængler ofte spiralsnoede. Ligner en Strandgåsefod. VII-IX. A K

Kochia saxicola Guss. Klippeblomstermælde. 15-30cm. Hængende dværgbusk. Bladene 6-12(25)x1mm. Frugtblosteret 5-6mm bredt med kronbladsagtige vinger. VIII-X. K (Ischia og Capri, m.sj.)

Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin Alm. lusefrø. 10-60cm. Enårig med blomsterne i løse, akslignende stande. Frugten 3-4x2mm, vinget næsten hele vejen rundt. VII-IX. A (Gargano)

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.St. Akskveller. 5-20cm. Blågrøn enårig med spredte grene. Bladene meget små, 2-4mm, kødede. Kvellerlignende blomster i tætte, kogleformede aks på 5-15mm. Strandenge. VII-VIII. A (Taranto, Metaponto)

Arthrocnemum. Buskkveller.

1. Med forveddet grund og underjordiske krybende skud perenne
   Grenene forveddede. Ingen udløbere 2.
2. Den udfaldende blomst efterlader et tredelt hul og sidder et stykke fra leddets overkant ..... fruticosum
   Den udfaldende blomst efterlader et enkelt hul og når næsten leddets overkant glaucum

Arthrocnemum perenne (Miller) Moss Tæppekveller. 5-15cm. Ofte tæppedannende. Skuddene grønne, siden ofte røde eller brune. De udfaldende blomster efterlader et tredelt hul. VII-VIII. A

A. fruticosum (L.) Moq. Alm. buskkveller. 50-150cm. Planten blågrøn. VII-VIII. A B C K

A. glaucum (Del.) Ung.St. Blågrøn buskkveller. 30-80cm. Planten blågrøn, senere gulliggrøn eller rødlig. VIII-IX. A B C K

Salicornia europaea L. Alm. kveller. VIII-IX. A B C K

Suaeda fruticosa (L.) Forsskål Buskgåsefod. -120cm. Lille, stærktgrenet busk. Grenene stribede. Bladene 8-15x1mm, blågrønne, ofte rødlige. VI-VII. A B C

S. maritima (L.) Dum. Strandgåsefod. VII-VIII. A B C K

S. splendens (Pourret) G.& G. Børstegåsefod. Ligner foregående,

men bladene ofte brodspidsede eller med en 1mm lang stak, lyst hvidgrønne, hindekantede, ofte gennemskinnelige. V-VIII. A K

Salsola soda L. Blød sodaurt. 20-70cm. Bladene ikke stikkende, 2-4mm tykke, de nedre og ofte mellemste modsatte, med udvidet og noget stængelomfattende grund. VII-VIII. A B C K

S. kali L. Sodaurt. Bladene stikkende, 1-2mm tykke. A B C K

AMARANTHACEAE

Amaranthus. Amarant.

1. Kapslen uopspringende ..... 2.
   " åbnes på tværs 4.
2. Mest 5 blosterblade. Bladene med kruset rand ..... crispus
   (2)3 blosterblade. Bladene flade 3.
3. Stænglen tætdunet foroven. Bladene spidse. Flerårig deflexus
   " mest glat. Bladene m.m. udrandede. Enårig lividus
4. Med en kraftigt udviklet, endestillet dusk ..... 5.
   Blomsterne i nøgler i bladhjørnerne (evt. med kort dusk) 8.
5. Dusken stærkt rød, sjældent gul ..... hypochondriacus
   " højst rødlig 6.
6. Blosterbladene spatelformede, bredest foroven .. retroflexus
   " m.m. lancetformede 7.
7. Forbladene ca. 2 x blosteret, 4-6mm ..... powellii
   " 1-1½ x " , 2-4mm hybridus
8. Forbladene 2 x blosteret, sylspidsede ..... albus
   " ca. 1 x blosteret graecizans

Amaranthus hybridus L. (A. chlorostachys) Topamarant. 20-100cm. Opret. Stænglen korthåret foroven. Dusken grøn og smal, mest med mange, korte, tætstillede sideduske. VII-IX. A B C K

A. powellii S.Watson Nåleamarant. Nær foregående. VII-IX. A B K

A. hypochondriacus L. Rød amarant. Dusken meget stor. Ellers som foregående. Dyrket og forvildet. VII-IX. B

A. retroflexus L. Opret amarant. 15-100cm. Stænglen tæt krushåret foroven. Aksene blegt hvidliggrønne. VI-X. A B C K

A. crispus (Lesp.& Thev.) Terr. Kruset amarant. 10-40cm. Liggende til opstigende. Blomsterne i nøgler. Bladene små, mest ½-1½cm, æg- til lancetformede. VII-IX. K

A. albus L. Hvid amarant. 10-60cm. Mest opret. Stænglen hvidliggrøn. Blomsterne i nøgler. Bladene aflange eller spatelformede med svagt bølget rand. VII-IX. A B C K

A. graecizans L. Vild amarant. 10-70cm. Mest opret. Stænglen grøn eller rødlig. Bladene elliptisk-rudeformede. VIII-IX. ABCK

A. deflexus L. Brodspidset amarant. 10-90cm. Med krybende stængel. Kapslen 2½-3mm, opblæst og større end frøet. Butte, æg-rudeformede blade. VII-IX. A B C K

A. lividus L: (A. blitum) Pletamarant. 10-80cm. Frugten 1½-2½mm. Bladene ofte med en lys eller mørk plet. VII-X. A B C K

Achyranthes sicula L. Hvid avneblomst. 30-70cm. Flerårig med modsatte blade. Blosterbladene smalt lancetformede, spidse og til sidst hårde og tornagtige. Blomsterne i et langt aks, helt nedadrettede, sammenknebne efter blomstringen. 0-300m. III-V. C

NYCTAGINACEAE

Mirabilis jalapa L. Vidunderblomst. 40-100cm. Urt med modsatte, trekantet-ægformede blade med afskåret eller hjærteformet grund, spidse, 6-10cm. Blomsterne røde, gule eller hvide, trompetformede med et rør på 2½-3½cm og en krave på 2½cm, i endestillede nøg-

ler, hver med 5 bægerbladslignende højblade. VI-IX. Forvildet.

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca americana L. Kermesbær. VII-X. A B C K

AIZOACEAE

Urter eller halvbuske med kødede, ofte modsatte blade. Bægertænderne ofte kødede. Ofte talrige, smalle kronblade. 5-mange støvdragere.

1. Ingen kronblade, men med 5 gule/hvide bægerblade .... Aizoon
   Mange " 2.
2. 4 bægerblade. Bladene stilkede ..... Aptenia
   5 " . " siddende 3.
3. Flerårig. Bladene 4-13cm, med trekantet tværsnit Carpobrotus
   Enårig. Bladene trinde eller flade, 1-2½cm Mesembryanthemum

Aizoon hispanicum L. Kronløs isblomst. 5-15cm. Tæt finvortet enårig. Bladene m.m. lancetformede, indtil 1cm. Siddende blomster i forgreningspunkterne. III-VI. C (Capo dell'Armi - C.Spartivento)

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Hottentotfigen. Op til flere meter. Bladene mørkegrønne, ikke tykkere på midten, jævnt tilsmalnende. 8-10cm brede, gule eller rødlilla blomster. Forv. IV-V.

C. acinaciformis (L.) L. Kølblad. -2m. Bladene blågrønne, tykkest på eller over midten. Blomsterne store, rødlilla. A B C K

Mesembryanthemum nodiflorum L. Trind middagsblomst. 5-15cm. M.m. liggende med små, krystallinske, sandskornsagtige vorter over det hele. Bladene halvtrinde, med få krystalvorter. Blomsterne 1cm brede. Langskysten. III-VI. A B C K

M. crystallinum L. Isblomst. Som den foregående, men bladene spatel- til bredt ægformede med lidt bølget rand og mange krystalvorter. Blomsterne 2-3cm brede. IV-VI. A (Vieste)

Aptenia cordifolia (L.f.) N.E.Br. Hjærtebladet middagsblomst. 30-50cm. Liggende, krystalvortet flerårig. Bladene æg-hjærteformede. Blomsterne rødlilla, 12-15mm brede. IV-XI. Forvildet.

MOLLUGINACEAE

Glinus lotoides L. Filtet tæppeurt. 10-60cm. Liggende, gråt stjærnefiltet enårig. Bladene kransstillede, ulige store, 2-3½ x 1-1½cm, bredt ægformede til næsten runde. Blomsterne i bladhjørnerne i nøgler, 4-8mm, uden kronblade, men med en del hvide, ofte 3-kløvede staminodier. VII-X. C (Anoja, Mammola)

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L. Portulak. 5-50cm. Ofte liggende neårig. Bladene kødede, mørkegrønne, skinnende, spredte forneden, tætstillede foroven under blomsterne, spatelformede. Blomsterne 6-8mm, få sammen mellem de øvre blade, med gul krone. VI-VIII. A B C K

Montia fontana L. ssp. chondrosperma (Fenzl) Walters (M. verna) Liden vandarve. IV-VIII. 0-1000m. A B C K

CARYOPHYLLACEAE

1. Fodflige til stede ..... 2.
   " mangler 7.
2. Alle blade spredte ..... Corrigiola
   I det mindste de nedre blade modsatte eller i krans 3.
3. Bladene linjeformede ..... 4.
   " flade og brede 5.
4. 3 grifler. Fodfligene sammenvoksede ..... Spergularia
   5 " . " frie Spergula
5. Blomsterne i stilkede, endestillede kvaste ..... Polycarpon
   " i siddende nøgler 6.

6. Blomsterne med tydelige, hindeagtige støtteblade Paronychia
   Blomsternes støtteblade uanselige Herniaria
7. 2 grifler ..... 8.
   3-5 grifler 10.
8. Ingen kronblade. 5-tallige blomster ..... Scleranthus
   Med kronblade. 4-tallige blomster 9.
9. Flerårig. Kronen ca. 1½ x bægeret ..... Moehringia muscosa
   Enårig. Kronen ca. ½ x bægeret Bufonia
10. Kronbladene kløvede eller tandede ..... 11.
    " hele, svagt udrandede eller manglende 13.
11. Blomsterne i skærm. Enårig. Tandede kronblade ... Holosteum
    " i kvast eller enlige 12.
12. Kronbladene mindst ½ kløvede. 3 grifler ..... Stellaria
    " under ½ " . Mest 5 grifler Cerastium
13. Bladene syl- til linjeformede ..... 14.
    " brede 16.
14. 3 grifler ..... 31.
    4-5 grifler 15.
15. Bægeret bredt hindekantet ..... Moenchia
    " næppe " Sagina
16. Stænglen med en hårstribe ..... Stellaria
    " anderledes håret 17.
17. Bægerbladene butte, uden tydelig ribbe ..... 18.
    " spidse, med tydelige ribber 19.
18. Kronen ca. = bægeret, lyserød (sj. hvid) ..... Minuartia
    " 2-3 x " , hvid Arenaria
19. Nedre blade 3-5-årede og langstilkede ..... Moehringia
    " " ikke langstilkede Arenaria
20. 3-5 grifler. Bægeret med 10(-flere) ribber ..... 21.
    2 " . " " 5 ribber 25.
21. Blade og støtteblade stive og tornspidsede ..... Drypis
    " " " ikke " 22.
22. Frugten et sort bær. Bægeret bredt klokkeformet Cucubalus
    " en kapsel. Bægeret ej " " 23.
23. Bægertænderne mindst af rørets længde ..... Agrostemma
    " ikke forlængede 24.
24. 5 kapseltænder og 5 grifler ..... Lychnis
    6-10 kapseltænder. Mest 3, sjældnere 5 grifler Silene
25. Bægeret krukkeformet med 5 brede vinger ..... Vaccaria
    " uvinget 26.
26. Bægerets ribbemellemrum hindeagtige ..... 27.
    " " urteagtige 29.
27. Enårig ..... Petrorhagia
    Flerårig 28.
28. Med yderbægerblade ..... Petrorhagia
    Uden " Gypsophila
29. Med yderbægerblade ..... Dianthus
    Uden " 30.
30. Bægeret rørformet, 10 x så langt som bredt. Enårig Velezia
    " m.m. valseformet Saponaria
31. Bladene randhårede ved grunden ..... Arenaria grandiflora
    " anderledes Minuartia

Arenaria. Sandvåner.

1. Flerårige med golde skud ..... 2.
   Enårige uden " " 3.
2. Bladene linje-sylformede og brodspidsede ..... grandiflora
   " ægformede bertolonii
3. Kapslen ægformet, tydeligt udvidet forneden .. serpyllifolia
   " valseformet, lidet " " leptoclados

Arenaria grandiflora L. Storblomstret sandvåner. 3-15cm. 1-3-blomstrede, kirteldunede skud. Bladene læderagtige med brod. Kronen 6-12 mm, 1½-2½ x bægeret. 1000-1900m. VI-VII. B C K

Arenaria bertolonii Fiori Udrandet sandvåner. 2-15cm. Bladene 5-13mm, fintdunede, de øvre siddende. Kronen 10-15mm, 2-3 x bægeret, ofte udrandet. 1000-2300m. VI-VIII. A B C K

A. serpyllifolia L. Alm. markarve. III-X. A B C K

A. leptoclados (Rchb.) Guss. Spæd markarve. III-X. A B C K

Moehringia trinervia (L.) Clairv. Skovarve. Enårig. Bægeret 4-5mm. Kronen 1/2-2/3 x bægeret. 10 støvdragere. IV-VII. A B C K

M. pentandra Gay Kronløs skovarve. 4-20cm. Nær foregående. Bægeret 2½-3½mm. Kronen meget lille eller væk. 4-5 støvdragere. IV-VI

M. muscosa L. Mosskovarve. 5-20cm. Flerårig. Glat og tyndstænglet. Bladene 2-3cm x 0,5-1mm. Kronen 1,5 x bægeret. Blomsterne mest 4-tallige. 0-2400m. V-VIII. A B C K

Minuartia. Norel. Bladene sylformede (undtagen geniculata).

1. Enårig ..... 2.
   Flerårig 3.
2. Øvre blomsterstilke kortere end bægeret ..... mediterranea
   Alle " længere " " hybrida
3. Bægerbladene butte. Kronen lyserød (sj. hvid) ... geniculata
   " spidse. " hvid 4.
4. Bladene 18-40mm. Tættuet ..... graminifolia
   " mest 4-12mm 5.
5. Bægeret 5-7-ribbet. Blade ofte ensidigt krummede ... recurva
   " 3-ribbet. Bladene ikke ensidige eller krumme verna

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. Tyndbladet norel. 5-15cm. Opret og grenet fra grunden. Bladene 6-10mm. Kronen ca. ½ x bægeret. Kapslen 1-1½ x bægeret. 0-1500m. III-VIII. A B C K

M. mediterranea (Link) Maly Dusknorel. 3-10(15)cm. Nær foregående. Ingen krone. Kapslen mest kortere end bægeret. V-VI. A C K

M. recurva (All.) Sch.& Th. ssp. juressi (Willd.) Mattf. Krumbladet norel. 5-15cm. Tættuet. Ofte forveddet og sort forneden. Kvastene 3-8-blomstrede. Kronen lidt kortere end bægeret. B C

M. graminifolia (Ardoino) Jav. Græsbladet norel. 12-20cm. Kirteldunet. Nedre blade tætstillede, stive, græsagtige. Kronen 1,25 x bægeret, ca.11mm. 1600-2200m. VI-VII. B (Volturion)

M. verna (L.) Hiern. Vårnorel. 3-15cm. Stænglen mest kirteldunet foroven. Kronen 1-1,5 x bægeret. 2 underarter: A B C K
ssp. attica (Boiss.& Spr.) Hayek: Kronbladene mest spidse. Blomstrende stængler med bladknipper. Kvastene med mest 6-19 blomster. 100-1200m. V-VI. A B C K
ssp. verna: Kronbladene butte. 1-7(12) blomster i kvastene. Ingen bladknipper. 2000-2800m. VII-VIII.

M. geniculata (Poiret) Thell. Rosennorel. 5-15cm. Liggende-opstigende, kirteldunet flerårig med hønsetarmslignende blade på 10-15mm. Blomsterne ligner Markhindeknæs. IV-VII. A K

Bufonia tenuifolia L. Liden sivblomst. 5-20cm. Vækst som de enårige Minuartiae, men de sylformede blade mere oprette. Blomsterne 4-tallige. Bægerbladene uens, stærkt tilspidsede. V-VI. A

Stellaria. Fladstjærne.

1. Bladene brede, alle eller de nedre stilkede ..... 2.
   " smalle, gennemgående siddende 6.
2. Kronen 2 x bægeret. Nedre blade med hjærtef. grund nemorum
   " højst 1,5 x bægeret. Nedre blade med afrundet grund 3.
3. Stænglen trindt kirtelhåret foroven ..... cupaniana
   " ensidigt håret foroven 4.
4. Kronen 1-1½ x bægeret, dette 5-7mm. Mest 10 støvdrag.neglecta
   " 0-1 x " , " 2-5mm. " 1-5 støvdragere 5.

5. Mest med krone. Frøene 0,9-1,3mm, mørkt rødbrune ..... media
" kronløs. Frøene 0,6-0,9mm, lysebrune pallida
6. Øvre støtteblade uden hindekant. Kronen ca. ½ kløvet holostea
" " med " . " næsten helt kløvet 7.
7. Kronbladene ca. 3/4 x bægeret, dette 2½-3½mm ..... alsine
" 1-1½ x bægeret, dette 4-7mm graminea

Stellaria nemorum L. ssp. glochidisperma Murb. Lundfladstjærne. V-VIII. B C K

S. media (L.) Vill. Almindeligt fuglegræs. I-XII.

S. cupaniana (Jordan & Fourr.) Béguinot Kirtelfuglegræs. ABCK

S. neglecta Weihe Skovfuglegræs. III-VIII. A B C K

S. pallida (Dumort) Piré Blegt fuglegræs. III-VI. A B C K

S. holostea L. Stor fladstjærne. IV-VI. A B C K

S. alsine Grimm Sumpfladstjærne. V-VII. B C

S. graminea L. Græsbladet fladstjærne. V-VIII. C (Sila)

Holosteum umbellatum L. Skærmarve. 0-1200m. IV-V. A B C K

Cerastium. Hønsetarm.

1. Flerårig ..... 2.
Enårig 6.
2. Planten hvidfiltet ..... tomentosum
" ikke filtet 3.
3. Kronen 0,9-1,3 x bægeret. Støvknapperne 0,3-0,7mm fontanum
" 1,4-2,5 x " . " 0,7-1,2mm 4.
4. Bladene mest 3-5cm, de nedre stilkede ..... silvaticum
" " under 3cm, siddende 5.
5. Frugtstilken bøjet lige under bægeret. Kapslen krum arvense
" og kapslen rette scaranii
6. Bægerbladets spids med fremadrettede, ukirtlede hår ..... 7.
" " uden " hår 8.
7. Frugtstilken 1/3-1 x bægeret ..... glomeratum
" 2-3 x bægeret brachypetalum
8. Stængelhårene meget kortere end stængelbredden ..... dubium
" omtrent lig stængelbredden 9.
9. Kronen 1,3-2 x bægeret ..... ligusticum
" højst lig bægeret 10.
10. Blomsterstilkene kortere end bægeret ..... siculum
Ihvertfald den lavestsiddende stilk længere end bægeret 11.
11. Støttebladene mindst 1/3 hindekantede ..... semidecandrum
" under 1/3 " 12.
12. Blomsterne mest 4-tallige ..... diffusum
" " 5-tallige 13.
13. Støttebladene med glat overside, hindeagtig spids glutinosum
" " håret " , uden hindeagtig spids 14.
14. Kronbladene 1/3 delte i 2 helrandede flige ..... pumilum
" 1/6 " , den ene flig svagt tandet gussonei

Cerastium dubium (Bast.) O.Schwarz Gaffelhønsetarm. 5-15cm. Kort klæbrigt-kirtlet stængel. Urteagtige støtteblade. Kronen ca. 1½ x bægeret. 3 grifler (eneste art). V-VI. B

C. tomentosum L. Filtet hønsetarm. 20-40cm. Bladene 10-30x2-5mm. Nedre støtteblade kølede. Bægeret 7-9mm, hindekantet. B C K

C. arvense L. ssp. strictum (Haenke) Gaudin Storblomstret hønsetarm. 5-15cm. Bladene glatte ovenpå. 1500-2900m. K

C. scaranii Ten. Dunet hønsetarm. 10-25cm. Bladene mest 15-30 x 4-7mm, oftest tæt dunede på begge sider, ofte med akselbladknipper. Bredt hindekantede støtteblade. 600-1450m. IV-VII. B C K

Cerastium silvaticum W.& K. Skovhønsetarm. 15-70cm. De større blade 40-50x13-18mm. Kvasten kirtlet. Bægeret 3-6mm. Kronen 1,4-2 x bægeret. 0-900m. V-VIII. K A? B? C?

C. fontanum Baumg. ssp. triviale (Link) Jalas Alm. hønsetarm. IV-X. A B C K

C. brachypetalum Pers. Stivhåret hønsetarm. 3 underarter:
ssp. tenoreanum (Ser.) Sóo: Blomsterstilkene med tiltrykte, ukirtlede hår. 0-1300m. IV-V. A B C K
ssp. tauricum (Sprengel) Murb.: Blomsterstilkene med ca. lige mange ukirtlede og kirtlede hår. III-V. A B C K
ssp. roeseri (Boiss.& Heldr.) Nyman: Blomsterstilkene med mange kirtelhår og færre alm. hår. IV-VIII. A B C K

C. glomeratum Thuill. Opret hønsetarm. I-XII. A B C K

C. ligusticum Viv. Klokkehønsetarm. Nedre blade spatelformede, stængelbladene elliptiske. Støttebladene urteagtige. 2 ssp.:
ssp. ligusticum: 5-15cm. Bægerbladene 4-6mm. Bladene indtil 2cm. 0-1400m. I-VI. A B C K
ssp. granulatum (Huter & al.) Chiov.: 25-40cm. Bægerbladene 7-8 mm. Bladene indtil 3cm. 100-800m. IV-V. B C K

C. pumilum Curtis Liden hønsetarm. 5-25cm. Tætkirtlet og klæbrig. 0-1400m. IV-V. A B C K

C. glutinosum Fr. Klærbig hønsetarm. 5-25cm. Planten gulgrøn. Kronbladene indtil 1/4 delte. III-V. A B C K

C. gussonei Tod.& Lojac. Kronen ofte mindre end bægeret. B K

C. diffusum Pers. Firehannet hønsetarm. III-VII. B

C. siculum Guss. Kortstilket hønsetarm. IV-V. A B C K

C. semidecandrum L. Femhannet hønsetarm. III-VI. A B C K

Moenchia erecta (L.) Gaertn. Firtalsbrodbæger. 5-10cm. Vækst som en enårig Hønsetarm, men helt glat og med firtalsblomst. Bladene 6-12x2-3mm. 0-800m. V-VI. B C K

Sagina. Firling.

1. Enårig ..... 2.
   Flerårig 4.
2. Bladene uden brod. Bægeret mest glat ..... maritima
   " med lang brod 3.
3. Bladene spredt randhårede til over midten ..... apetala
   " kun randhårede ved grunden micropetala
4. Blomsterne 4-tallige ..... procumbens
   " 5-tallige 5.
5. Stængelbladene med en brod på 3/4-1½ x bladbredden subulata
   " " " " " 0-3/4 x " 6.
6. Kronen 0,8-1,5 x bægeret, dette mest kirtlet .... saginoides
   " 1,5-2 x bægeret, dette mest ukirtlet glabra

Sagina glabra (Willd.) Fenzl Glat firling. 1-2cm. Med rodslående stængler. Bladene så lange som stængelleddene. Blomsterne 6-10 mm brede. 1000-2000m. V-VII. B K

S. subulata (Swartz) Presl Sylfirling. 2-6cm. Grundbladene 5-15 mm, uden brod, stængelbladene med. Kronen lidt kortere end bægeret. 1000-2200m. V-VII. A B C K

S. saginoides (L.) Karsten Sæterfirling. 2-5cm. Stænglerne glatte, 1(2)-blomstrede. Kapslen 1½-2 x bægeret. C (Aspromonte)

S. procumbens L. Alm. firling. IV-VII. A B C K

S. apetala Ard. Markfirling. Frugtbægeret tiltrykt kapslen. Ydre bægerblade aldrig rødrandede. II-VI. A B C K

Sagina micropetala Rausch Kronløs firling. 3-10cm. Frugtbægeret oftest udstående efter frøspredning. Ydre bægerblade ofte rødrandede. II-VII.

S. maritima G.Don Strandfirling. 0 m. II-VI. A B C K

Scleranthus. Knavel.

1. Bægeret bredt hindekantet. Flerårig ..... 2.
   " smalt " . Enårig 3.
2. Frugten 4½-6½mm. Liggende stængler ..... marginatus
   " 3½-4½mm. Opstigende til oprette stængler perennis
3. Frugtblosteret opret eller indadbøjet. Fr. 1,2-3mm polycarpos
   " udstående. Frugten 3-4½mm annuus

Scleranthus perennis L. Flerårig knavel. V-IX. A B C K

S. marginatus Guss. Stængelleddene 5-10mm. Bladene 5-9mm, butte, randhårede. 1000-1700m. VI-VII. B C

S. annuus L. Enårig knavel. 800-2500m. III-X. A B C K

S. polycarpos L. Bakkeknavel. 500-2000m. IV-VI. A B C K

Corrigiola litoralis L. Skorem. -25cm. Liggende, mangestænglet enårig. Glatte, blågrønne blade på 10-15mm, spatelformede. Blomsterne små, ca.1mm, i nøgler i grenenderne. Bæger og en hvid krone. Sandede steder. 0-1300m. VI-IX. C K

Paronychia. Negleurt. Blomsternøgler med iøjnefaldende støttebl.

1. Støttebladene kortere end blomsterne. Enårig .... echinulata
   " længere " " . Flerårig 2.
2. Bægerbladene med brod og hætteformet spids ..... argentea
   " uden " eller hætteformet spids kapela

Paronychia echinulata Chater Grøn negleurt. 5-15cm. Bladene finttandede, ofte rødlige. Blomsterne i 3-8mm brede nøgler. Bægerbladene med brod og hætteformet spids. På sand. 0-800m. IV-V. C

P. argentea Lam. Sølvnegleurt. 5-25cm. Bladene 4-8mm. Blomsternøglerne ofte 10-15mm brede, sølvhvide af støttebladene, ende- og akselstillede. III-V. C

P. kapela (Hacq.) Kerner ssp. kapela Nedliggende negleurt. 3-8 cm. Bladene 3-5mm. Blomsternøglerne 8-15mm, sølvhvide, endestillede. 1300-2400m. V-VII. B C K

Herniaria glabra L. Alm. brudurt. Bladene randhårede, ellers glatte. Bægeret glat. V-VIII. A B C K

H. hirsuta L. Håret brudurt. Bladene gråhårede på begge sider. Bægeret håret. V-VIII. A B C K

Polycarpon. Mangefrø. Små, oprette eller opstigende, oftest ret grenede planter. Bladene ofte i kranse på 4. Små blomster i ret tætte kvaste. Kronen klar, kortere end bægeret.

1. Flerårig, forveddet ved grunden ..... polycarpoides
   Oftest enårig, aldrig forveddet 2.
2. Bladene kødede, mest modsatte ..... alsinifolium
   " ikke kødede, mest i kranse på 4 3.
3. Planten oftest lilla forneden. Blomsterne 2½mm ... diphyllum
   " grøn. Blomsterne 1½-2mm tetraphyllum

Polycarpon polycarpoides (Biv.) Zodda Flerårigt mangefrø. 5-20cm. Bladene mest modsatte, de midterste dog ofte 4 i krans. K (Palmi)

P. alsinifolium (Biv.) DC. Glatfrøet mangefrø. 3-10cm. Ligner en Paronychia. Kvastene tætte. Mest kystnær. IV-VI. A C K

P. diphyllum Cav. Rødt mangefrø. 5-15cm. Nedre blade modsatte. 1-3 støvdragere. V-VII. A B C K

Polycarpon tetraphyllum L. Alm. mangefrø. 5-15cm. Alle blade i kranse. (1)3-5 støvdragere. 0-600m. III-VIII. A B C K

Spergula arvensis L. Alm. spergel. Bladundersiden furet. B C K

S. pentandra L. Femhannet spergel. 5-20cm. Bladundersiden ikke furet. Kronbladene spidse. Frøene med en skinnende, hvid vinge omtrent så bred som selve frøet. 0-800m. IV-V. K (Nap.)

Spergularia. Hindeknæ.

1. Kraftig flerårig med tyk rod. Bægeret 4-6mm ..... media
   1(-fler)årige med spinkel rod. Bægeret 1½-4mm 2.
2. Unge skuds fodflige halvt sammenvoksede ..... marina
   " " " mindre " 3.
3. Kvastene uden støtteblade, med hårfine grene ..... diandra
   " med " 4.
4. Frøene sorte. Bægerbladene spidse/brodspidsede heldreichii
   " brune. " butte 5.
5. Øvre støtteblade ca. så lange som bladene ..... rubra
   " " meget kortere end " 6.
6. Mørkebrune frø. Kapslen lidt længere end bægeret nicaeensis
   Lysebrune " . " højst lig bægeret bocconii

Spergularia media (L.) Presl Vingefrøet hindeknæ. I-XII. A

S. marina (L.) Griseb. Kødet hindeknæ. IV-VI. A K

S. diandra (Guss.) Boiss. Trådhindeknæ. 3-30cm. Tynde, glatte stængler. Bladene ½-1mm tykke. Stærktgrenet kvast. Krone og bæger 2-3mm. 0-300m. III-V. C

S. heldreichii Fouc. Hjærtehindeknæ. 8-35cm. Fodfligene hjærteformede med kort, ofte kløvet spids. Kronen med lysere grund. Frøene ofte med stærk metalglans. V-VI. A B C K

S. rubra (L.) Presl Markhindeknæ. 0-1500m. III-VII. A B C K

S. nicaeensis Sarato Trekantet hindeknæ. IV-VI. A (Gargano)

S. bocconii (Scheele) A.& Gr. Hvidt hindeknæ. 5-25cm. Kvast og bæger kirteldunede. Kronen hvid inderst, lyserød eller hvid yderst. 0-800m. V-VI. A B

Lychnis coronaria (L.) Desr. Fiksernellike. Hvidfiltet flerårig på 30-100cm. En åben, fåblomstret kvast med enlige, mørkt rødlilla blomster. Bægeret 15-20mm. 0-1200m. V-VIII. A B C K

L. flos-cuculi L. Trævlekrone. V-VIII. A B C K

L. viscaria L. Tjærenellike. 1000-1600m. VI-VII. B C (Pollino)

Agrostemma githago L. Klinte. V-VI. A B C K

Silene. Limurt.

1. 5 grifler ..... 2.
   3 " 6.
2. Enårige med tvekønnede blomster. Bladene 2-3mm brede ..... 3.
   Tvebo. Bladene bredere 4.
3. Blomsterne 2½cm brede. Bægeret 15-28mm i blomst coeli-rosa
   " 1cm " . " 6-10mm i " laeta
4. Blomsterne lyserøde. Bægeret 10-15mm, rødligt ..... dioica
   " hvide. Bægeret 18-25mm, grønt 5
5. Bægertænderne næsten butte. Kapseltænderne m.m. rette alba
   " tydeligt tilspidsede. Kapseltænderne
   m.m. udadrettede latifolia
6. Flerårige ..... 7.
   Enårige 18.
7. Kronen firtandet, ret lille. Bægeret 4-5mm ..... pusilla
   Kronbladene hele eller kløvede 8.

8. Bægeret håret ..... 9.
" glat 13.
9. Ingen bikronskæl (eller de er meget små) ..... 10.
Med bikronskæl 11.
10. Kronbladene lyserøde ovenpå ..... sicula
" hvide ovenpå italica
11. Bægeret 25-30mm. Kapselstilken 7-10mm ..... paradoxa
" 9-20mm. " ca. 2mm 12.
12. Bægeret 9-12mm, med afskåret grund ..... nutans
" 15-20mm, med tilsmalnet grund viridiflora
13. Bægeret 20-ribbet ..... vulgaris
" 10-ribbet 14.
14. Pudeplante med få cm høj stængel. Lyserød krone ... acaulis
Med veludviklet stængel 15.
15. Kronbladene hele. Bægeret 4-6mm ..... otites
" kløvede 16.
16. Stænglen med mange blomster i top. Bægeret 5-8mm catholica
" " 1-få blomster i kvast 17.
17. Kronens negl til sidst 2-3mm længere end bægeret parnassica
" " kun lidt udragende multicaulis
18. Bægeret glat ..... 19.
" dunet eller håret 22.
19. Blomsterne i en m.m. ensidig svikkel ..... giraldii
" i en kvast 20.
20. Planten blågrøn. Øvre blade stængelomfattende ..... armeria
" grøn. Bladene ikke " 21.
21. Bægerribberne ugrenede. Planten dunet forneden .... cretica
" grenede. " glat 35.
22. 30 bægerribber ..... conica
10 " 23.
23. Bægeret tydeligt kirtlet, ihvertfald på ribberne ..... 24.
" højst kirtelhåret i ribbemellemrummene 28.
24. Frugtstilkene udstående til nedadrettede ..... 25.
" oprette 26.
25. Bægeret 6-9mm. Kronens plade 2-3mm ..... sedoides
" 13-17mm. Kronens plade 6-9mm pendula
26. Kronens plade kløvet. Strandplante ..... nicaeensis
" " hel eller udrandet 27.
27. Bægerribberne med sammenløbende sideribber ..... neglecta
" uden sideribber fuscata
28. Kronens plade hel. Bægerribberne stivbørstede ..... gallica
" " dybt udrandet til kløvet (eller mangler) 29.
29. Stænglen kirteldunet foroven. Kapselstilk 0,4-1,5mm nocturna
" uden kirtelhår 30.
30. Kapselstilken 1-3,5mm ..... 31.
" 4-8mm 33.
31. Bægeret fintdunet ..... rubella
" håret på ribberne 32.
32. Kronens plade 5-8mm. Bægeret 11-13mm ..... dichotoma
" " 0-4mm. " 6½-10mm apetala
33. Bægeret 10-15mm. Sviklerne ret åbne ..... colorata
" 14-18mm. " mere tætte 34.
34. Enkeltblomsterstandene uregelmæssige kvaste ..... echinata
" regelmæssige svikler bellidifolia
35. Planten klæbrig øverst. Kapselstilken ½ x kapslen muscipula
" ikke klæbrig. Næsten ingen kapselstilk behen

S. sicula Ucria Siciliansk limurt. 15-20cm. Nær S. italica, men mindre klæbrig. Toppen ofte 3-5-blomstret. Kapselstilken 2/3 x kapslen. 1000-1800m. V-VI. C (Pollino, Sila)

S. paradoxa L. Langbægret limurt. 20-50cm. Stærkt klæbrig. Bægeret med tilsmalnet grund. Kronbladene hvide med gullig underside. Ligner ellers nutans og italica. 0-1300m. VI-VIII. A B C K

Silene nutans L. Nikkende limurt. V-VIII. B C K

S. viridiflora L. Grønblomstret limurt. Vækst som nutans, med grønlighvide kronblade. Kun toppen kirtlet. Støvdragerne ofte længere end kronen. 0-1500m. VI-VII. A B K

S. catholica (L.) Ait.f. Skærmlimurt. 40-80cm. Meget klæbrig foroven. Topgrenene meget lange. Kronbladene små og hvide, rager 1-2 mm ud af bægeret. IV-VIII. B (Pollino, Vulture, Muro, Balvano m.m)

S. otites (L.) Wibel. Klitlimurt. 30-50cm. Stænglen klæbrig foroven. Planten mest tvebo. Kronbladene gulgrønne. V-VIII. A B C K

S. vulgaris (Moench) Garcke Blæresmælde. A B C K. 3 underarter:
ssp. angustifolia (Miller) Hayek: Stængelgrunden forveddet. Bladene 3-10mm brede, lidt kødede. Kystplante.
ssp. vulgaris: Ikke forveddet. Bladene 1-4cm brede og tynde. Griflerne fortykkede i spidsen. Kapslen kugleformet.
ssp. commutata (Guss.) Hayek: Som foregående, men griflerne ikke fortykkede og kapslen ægformet. 600-1350m. A? B C

S. parnassica Boiss.& Spruner 10-30cm. Stænglerne mest 2-3-blomstrede. Nedre blade 10-15x3-4mm, de øvre linjeformede og mest oprette. Kapslen 6-7mm, kapselstilken 5-10mm. V-VII. B C K

S. multicaulis Guss. Mangestænglet limurt. 10-20cm. Stænglerne mest 3-4-blomstrede. Kapslen 7-9½mm, kapselstilken 7-11mm. B K

S. acaulis (L.) Jacq. Tuelimurt. 1-5cm. Bladene randhårede og linjeformede, 3-15x2mm. Bægeret 7-9mm. Kronbladene udrandede til svagt kløvede. 1600-2800m. VII-VIII. K

S. pusilla W.& K. (S. quadridentata) Strålefrø. 8-15cm. Spinkle stængler og smalle blade. Åben blomsterstand med 2-4cm lange stilke. Bægeret mest glat. Hvide blomster. VI-VIII. A B C K

S. armeria L. Knippelimurt. 15-60cm. Blomsterne i en halvskærm med stilke på 2-15mm. Bægeret smalt tragtformet, 12-15x3mm, buttandet. Kronbladene lyserøde, udrandede. V-VI. B C K

S. alba (Miller) Krause Aftenpragtstjærne. V-IX. A (Gargano)

S. latifolia Poiret (S. alba ssp. divaricata) Sydlig aftenpragtstjærne. V-IX. A B C K

S. dioica (L.) Clairv. Dagpragtstjærne. VI-VIII. B C K

S. fuscata Link Rødhåret limurt. 15-30cm. Stænglen stribet eller kantet. Planten tæt kirteldunet og rødhåret. Blomsterne i en ret tæt kvast. Bægeret ofte rødligt. IV-VI. A C (Gerace)

S. rubella L. ssp. rubella Tofarvet limurt. 10-50cm. Ukirtlet. Blomsterne i kvaste. Bægeret 9-12mm. Kapslen 7-8½mm, dens stilk 2-3½mm. Kronens plade lyserød, 1½-3mm. III-V. A

S. sedoides Poiret Stenurtslimurt. 5-20cm. Oftest rigtgrenet, rødlig og stærkt klæbrig. Bladene kødede. Bægeret 6-8mm. Kronen 1-2mm udragende. Sand og klipper langs kysten. IV-VI. A?

S. cretica L. Stilklimurt. 30-60cm. Grøn. 1-7 blomster på 3-7cm lange stilke. Bægeret tenformet i blomst, 10-12mm. Kronen rødlilla, pladen 1/3-1/2 delt. 0-800m. V-VI. A B C K

S. muscipula L. Fluefangerlimurt. 15-40cm. Glat, stærkt klæbrig foroven. Blomsterne i kvast med oprette grene. Bægeret 13-17mm, aflangt-kølleformet. Lyserød krone. V-VI. A C K

S. behen L. Klokkelimurt. 20-40cm. Helt glat og blågrøn. Bægeret hvidligt, rødligribbet øverst, med hvidrandede tænder, 11-17mm, ægformet i frugt. Kronen hvidlig til blegrød. IV-VI. B C

S. echinata Otth Pindsvinelimurt. 20-60cm. Kavsten bred, halvskærmagtig, stilkene 2-7mm. Bægeret 16-18mm, spidstandet, med 1mm lange børster i øvre 1/2. 500-1200m. V-VII. B C (Vulture, Pignola,

Pollino, Monasterace, Spartivento, Aspromonte, S.Giov.in Fiore)

Silene laeta (Ait.) Godron Bredbægret limurt. 20-30cm. Langstilkede, lyserøde blomster i en løs kvast. Planten glat (evt. finvortet). Frugtbægeret klokkeformet. IV-V. A (Taranto)

S. coeli-rosa (L.) Godron Himmelrose. 20-50cm. Helt glat. Få og langstilkede, lyst rødlilla blomster i åben kvast. Bægertænderne 3-6mm, smalle og spidse. IV-VI. A K (Capri)

S. pendula L. Rød limurt. 20-40cm. Stænglen dunet. Sviklen ensidig. Frugtbægeret opblæst og indsnævret foroven. Kronen lyserød. 0-1200m. IV-VII. A B C K

S. dichotoma Ehrh. Gaffellimurt. 30-40cm. Blomsterstanden 2-4 x gaffelgrenet med 2-4 svikler. Blomsterne siddende. Bægeret 7-15 x 3mm, stivhåret på ribberne. Kronen mest hvid. VII-VIII. B C

S. nicaeensis All. Sandlimurt. 15-25cm. Hele planten klæbrigtlådden, m.m. sanddækket. Kronen hvid eller blegrød, pladen 5-6mm. Bægeret 11-13mm. På sandstrand. V-VI. A K

S. nocturna L. Akslimurt. 10-50cm. Dunet, undertiden klæbrig foroven. Tiltrykte, kortstilkede blomster. Kronen blegrød, undertiden indesluttet. Bægeret 8-11mm. 0-600m. IV-V. A B C K

S. neglecta Ten. 10-50cm. Nær foregående. Ofte tæt håret forneden. Nedre blomster ofte udstående eller nedbøjede. Bægertænderne linjeformede. 0-600m. IV-V. B K

S. gallica L. Fransk limurt. 10-50cm. Sviklen altid ugrenet. Bægeret 6-10mm, opret i blomst, indsnævret foroven. med langt stivhårede ribber. Kronen hvid eller rød. IV-VII. A B C K

S. giraldii Guss. Glat limurt. 10-50cm. Nær foregående, men helt glat, ikke klæbrig. Kapselstilken 1-2mm. 0-500m. IV-V. K (Ischia, Napoletano)

S. colorata Poiret Vingefrøet limurt. 10-40cm. Stænglen dunet af nedadrettede hår. Kronen iøjnefaldende lyserød. Frøene med 2 bølgede vinger langs randen. Mest på sandstrand. IV-VI. 2 ssp.:
ssp. colorata: Bægeret 12-14(17)mm. Kapsel og kapselstilk 6-7mm.
ssp. canescens (Ten.) Cif.& Giac.: Bægeret 10mm. Kapsel og kapselstilk 4-5mm. K

S. bellidifolia Juss. Ensidig limurt. 30-60cm. Stænglen stivhåret. Enkeltklaserne ensidige, med 6-8 blomster. Bægeret tæthåret. Kronen 3-5mm, lyserød. 0-600m. II-VI. A B C K

S. apetala Willd. Kronløs limurt. 5-30cm. Stænglen nedadvendt dunet. Bægeret med hårede ribber, klokkeformet i frugt. Kronen ofte væk eller indesluttet. 0-600m. III-IV. A

S. conica L. Keglelimurt. IV-VI. 2 underarter: A B C K
ssp. conica: 0-få kirtler. Bægeret 10-15mm. Kapselstilken 0-1mm.
ssp. subconica (Friv.) Gavioli: Tætkirtlet. Bægeret 13-18mm. Kapselstilken 1-4mm. B

S. italica (L.) Pers. Italiensk limurt. 30-60cm. Toppen bred og ret åben. Kronens underside rødlig eller grønlig. IV-VII. A B C K

Cucubalus baccifer L. Bærsmælde. 30-150cm. Stærktgrenet, tyndstænglet, dunet flerårig. Kronbladene smalle, kløvede og grønlighvide. Bægeret bredt klokke- til skålformet. VII-IX. K

Drypis spinosa L. Tornnellike. 6-25cm. Tornpudeplante. Firkantet stængel. Spidse, linjeformede blade. Støtteblade med 5-9 torne. Kronen hvid eller blegrød. 800-2500m. VI-VIII. B K

Gypsophila arrostii Guss. Langstilket gipsurt. 50-100cm. Flerårig. Ligner Brudeslør. Stænglen kirteldunet. Bladene 20-50x3-6mm. Blomsterstilkene 5-10 x bægeret, dette 2-2½mm. V-VI. A B C

Saponaria calabrica Guss. Enårig sæbeurt. 10-30cm. M.m. tæt kirteldunet. Kvasten løst topformet med opret-udstående grene. Bægeret 6-10mm. Kronen lyserød. 600-1500m. VI-VII. B C

S. officinalis L. Alm. sæbeurt. VI-VIII. A B C K

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert Konellike. 30-60cm. Glat enårig. Stærkt grenet kvast. Bægeret 12-15mm, pæreformet. Kronen lyserød, afstudset eller tolappet. IV-V. A B C K

Petrorhagia. Knopnellike.

1. Flerårig. Stilkede blomster i en åben kvast ..... 2.
   Enårig. Blomsterne i hovede, omgivne af tørre højblade 3.
2. Bægeret med 4 yderbægerblade ..... saxifraga
   " uden yderbæger illyrica
3. Bladskederne 2-3 x så lange som brede ..... velutina
   " ca. xå lange som brede prolifera

Petrorhagia illyrica (L.) Ball & Heyw. ssp. haynaldiana (Janka) Ball & Heyw. Rødhannet knopnellike. 10-40cm. Stænglen kirteldunet foroven. Bægeret 5-7mm. Kronen 10mm, hvidlig med 3 røde prikker ved grunden. Støvdragerne rødlilla. VI-VIII. C

P. saxifraga (L.) Link ssp. gasparrinii (Guss.) Pign. Fjældknopnellike. 5-45cm. Bladene m.m. linjeformede. Langstilkede blomster. Bægeret 3-6mm, buttandet. Hvid/lyserød krone. VI-IX. A B CK

P. prolifera (L.) Ball & Heyw. Knopnellike. 2-5 blomster i et svøb af hindeagtige højblade. Bladene finttandede. V-IX. A B C K

P. velutina (Guss.) Ball & Heyw. Skedeknopnellike. Som prolifera men stænglen tæt kirtelhåret under blomsterne. Bladet med bruskagtig rand, uden tænder. 0-600m. IV-VII. A B C K

Dianthus. Nellike

1. Busk. 12-16 yderbægerskæl ..... rupicola
   Urter. 2-8(12) yderbægerskæl 2.
2. 1-2-årig ..... 3.
   Flerårig 4.
3. Blomsterne i knipper. Bægeret dunet ..... armeria
   " enlige. Bægeret glat tripunctatus
4. Kronbladene 1/3-1/2 fligede ..... monspessulanus
   " helrandede til tandede 5.
5. Blomsterne enlige eller parvise ..... 6.
   " knippestillede 8.
6. Oftest 2 yderbægerskæl. Kronbladene prikkede ..... deltoides
   4-8(12) " . " ensfarvede 7.
7. Yderbægeret 1/5-1/3 x bægeret ..... siculus
   " 1/2 x bægeret ciliatus
8. Bladene lancetformede, 5-18mm brede, de nedre butte barbatus
   Alle blade spidse 9.
9. Bægerrøret rødlillat, ihvertfald i sin øvre ½ carthusianorum
   " højst rødlillat nær tænderne 10.
10. Kronen gullig ..... ferrugineus
    " rød 11.
11. Bladene 1½-2½mm brede, ofte indrullede ..... vulturius
    " ca. 5mm brede med 5-9 ribber liburnicus

Dianthus rupicola Biv. Skælnellike. 30-60cm. Busk med urteagtige blomstrende skud. Bladene 3-5mm brede, ret tykke. Blomsterne i knipper. Lyserød krone. V-IX. A B C K (C.Palinuro, Maratea, Otranto, S.Emiliano, Scilla, Catanzaro). Kalkklipper, mure. 0-800m.

D. liburnicus Bartl. 20-50cm. Blomsterne 2-6 sammen; støtteblade og de 4 yderbægerblade af bægerets længde, dette 14-16mm. Kronens plade 5-6mm. 0-1400m. VI-IX. A B K

D. vulturius Guss. Nær foregående. Bægeret 15-17mm. Kronen lilla og dens plade 8mm. 500-1200m. VI-VIII. A B C K

Dianthus ferrugineus Miller Rustnellike. 20-60cm. Nær de 2 foregående. Kronbladene hårede. 500-1200m. VI-VIII. K (Eboli, Sacco, Teggiano) C?

D. carthusianorum L. ssp. tenorei (Lacaita) Pign. Kartøjsernellike. 60-70cm. Bladskederne 3-8 x så lange som brede. Stængelbladene 4mm brede. Yderbægerskællene med stak. V-VIII. A B C K

D. barbatus L. Studenternellike. 30-40cm. Bladfæsterne fortykkede. Knippet mangeblomstret. Yderbægerbladene af bægerets længde. Kronbladene hårede. 800-2200m. IV-VII. B K

D. armeria L. Kostnellike. 0-1200m. V-VIII. A B K

D. deltoides L. Bakkenellike. 500-2000m. V-VIII. B C K

D. siculus C.Presl (D. silvester ssp. garganicus) 15-60cm. Blågrøn. Bægeret 24-28mm med 4-8 yderbægerskæl og tænder på 5-6mm. Kronens plade 7-9mm. V-VIII. A B C K

D. ciliatus Guss. Ensiannellike. 40-60cm. Bladene 1-2mm brede, flade. Blomsterne ofte parvise. Bægeret 15-23mm, tilsmalnet fra under midten. Kronen m.m. helrandet. V-X. A (Gargano)

D. tripunctatus Sm. Treplettet nellike. 15-40cm. Grundbladene mest visne i blomst. Bægeret 15-18mm. Yderbægeret ca. 3/4 x bægeret. Kronbladene med 3 striber nær svælget. 0-600m. V-VI. C

D. monspessulanus L. Isopnellike. 30-60cm. Bladskederne så lange som stængelbredden. 2-5(1-7) kortstilkede blomster. Kronen lyserød eller hvid. 0-2200m. V-VIII. A (Gargano) K

Velezia rigida L. Dueurtsnellike. 10-30cm. Enårig. Planten ligner en Dueurt rigtigt meget. Bladene linjeformede, 10-20x1-2mm. Bægeret linjeformet, 10-14mm, uden yderbæger. Kort, lyserød, 5-tallig krone. 0-1200m. V-VI. A B C

NYMPHAEACEAE

Nymphaea alba L. Hvid åkande. VI-IX. A B K

Nuphar luteum (L.) S.& S. Gul åkande. VI-IX. K (Salerno)

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum demersum L. Tornfrøet hornblad. VI-IX. K

RANUNCULACEAE

Helleborus. Nyserod. Urter med store, hånd- eller fodsnitdelte blade. Store blomster med dobbelt bloster og flere bælgkapsler.

H. foetidus L. Stinkende nyserod. 20-60cm. Kun med stængelblade. Disse med 7-9 smalt lancetformede, savtakkede flige på 6-17x1-1½ cm. 3-15 gulgrønne blomster på 2-3½cm. I-IV. B C K

H. bocconei Ten. Fingret nyserod. 20-40cm. Med grundblade; disse med 5-7 afsnit, der igen er smalfliget delte omtrent til midten og savtakkede. Gulgrønne blomster. 0-1700m. II-IV. 2 ssp.:
ssp. bocconei: Bladundersiden m.m. dunet. Grundbladene 20-30cm brede. K
ssp. siculus (Schiffner) Merxm.& Podl.: Bladundersiden glat. Grundbladene ca. 10cm brede. B C

H. niger L. Julerose, Hvid nyserod. 15-30cm. Med fodfligede grundblade med 7-9 lidet tandede afsnit. Blomsterne hvide. K

Eranthis hiemalis (L.) Salisb. Vinterblomme. II-III. A B C K

Nigella. Sortkommen. Enårige med 2-3 x linjeformet fjersnitdelte blade. 5 lyseblå blosterblade samt 5 små honningblade. Frugterne består af 5 mindst ½ sammenvoksede, langgriflede bælgkapsler.

N. arvensis L. Agersortkommen. 10-40cm. Intet svøb af blade under blomsten. Støvknapperne med brod. Kornmarker. V-VI. A B C K

Nigella damascena L. Jomfruen i det grønne. 15-45cm. Blomsten omgiven af et svøb af 5 bladlignende højblade. Støvknapperne uden brod. 0-800m. V-VII. A B C K

Actaea spicata L. Druemunke. V-VII. A B C K

Caltha palustris L. Engkabbeleje. III-VI. C (Sila)

Aconitum lamarckii Rchb. Pyrenæisk stormhat.50-120cm. Bleggule blomster med hjælmen 2-3 x så høj som bred. Bladene dybt smalfligede. 100-2100m. VII-VIII. B C K

Delphinium. Ridderspore. Riddersporer med 3 bælgkapsler.

D. fissum W.& K. Kløvet ridderspore. 50-150cm. Flerårig. Bladene smalfligede med 1-2mm brede flige. Klasen 15-25cm, m.m. ensidig. Blomsterne 24-27mm, heraf sporen 12-14mm. VI-VIII. B C K

D. staphisagria L. Steffensridderspore. 30-100cm. 1(2)-årig. Udstående håret. Bladene med 5-7 brede flige med 1-2 par tænder. Kronbladene glatte. Sporen kort og sækformet. IV-V. A B K

D. halteratum S.& S. Langstilket ridderspore. 30-60cm. Enårig. Bladene med 2-3mm brede flige. Klasen 8-15cm, ikke ensidig. Sporen 13-15mm. 0-1200m. IV-VII. A B C K

Consolida. Ridderspore. Enårige med 1 bælgkapsel.

C. ajacis (L.) Schur (C. ambigua) Haveridderspore. 30-60cm. Blomsterne mest i en ret tæt klase, der kan være grenet forneden. Bælgkapslen 15-20mm, dunet. V-VII. A B K

C. regalis S.F.Gray ssp. regalis Kornridderspore. Blomsterne i en åben top, mørkt blålilla. Bælgkapslen 8-15mm, glat. A B C K

C. pubescens (DC.) Soó Dunet ridderspore. 15-50cm. Blomsterne i en åben top, lyseblå eller hvidlige. Bælgkapslen 10-15mm, svagt dunet. I kornmarker. 0-800m. V-VI. A B C

Anemone. Simmer.

1. Blomsterne gule ..... ranunculoides
   " hvide, røde eller blå 2.
2. Stængelbladene siddende ..... 3.
   " stilkede 4.
3. Stængelbladene 2 x fjersnitdelte ..... coronaria
   " hele eller tredelte hortensis
4. Mest 16-23 kronblade, der er 3-6 x så lange som br. apennina
   " 6-9 kronblade, ca. 2 x så lange som brede 5.
5. Bladene delte i 3-5 uregelmæssigt lappede afsnit .. nemorosa
   " " 1 3 regelmæssigt takkede afsnit trifolia

Anemone nemorosa L. Hvidsimmer. II-IV. A B C K

A. trifolia L. Trebladet simmer. 10-30cm. Jordstænglen hvidlig. Støvknapperne blålighvide. V-VI. K (M. Cairo)

A. ranunculoides L. Gul simmer. II-V. B C (Pollino)

A. apennina L. Blegblå simmer. 10-35cm. Blomsterne mest blå, med dunet underside. Bladundersiden dunet. 0-1500m. III-V. B C K

A. hortensis L. Bredbladet simmer. 12-15 røde, sjældnere blå eller hvide blosterblade. 0-1200m. III-V. A B C K

A. coronaria L. Fransk anemone. 5-8 røde, blå eller hvide blosterblade. I kornmarker. 0-800m. I-III. A B C K

Hepatica nobilis Miller Blåsimmer. III-V. A B C K

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre ssp. alpina Alpekobjælde. 20-50 cm. Stængelbladene stilkede, af grundbladenes type, alle 3 x delte. 1 hvid, 4-6cm bred blomst. VI-VII. K

Clematis. Skovranke.

1. Blomsterne nikkende, 1-3 i bladhjørnerne, 4-7cm brede .... 2.
   " oprette og i toppe, mindre 3.
2. Bladene 2 x delte. Blomsterne 4cm brede, blå ..... viticella
   " hele. Blomsterne 4-7cm brede, gulhvide cirrhosa
3. 1-1½m høj staude ..... recta
   Slyngplanter, m.m. forveddede 4.
4. Bladene 1 x delte. Kronbladene filtede på begge sider vitalba
   " 2 x " . " glatte ovenpå flammula

Clematis flammula L. Korsskovranke. 0-600m. V-VIII. A B C K

C. vitalba L. Alm. skovranke. 0-1300m. V-VII. A B C K

C. recta L. Opret skovranke. Stænglerne trinde, næppe slyngende. Bladene 1 x delte. Blosterbladene glatte med filtet rand. A B C

C. cirrhosa L. Nikkende skovranke. 2-5m. Stedsegrøn slyngplante. Bladene 2½-5cm, ægformede, tandede eller trelappede. X-XII. A C

C. viticella L. Italiensk skovranke. 1-4m. Løvfældende slyngplante. Småbladene helrandede, 2-7cm. 0-600m. VI-IX. A B C

Adonis. Adonis. Enårige med stærkt smal- og fjerfligede blade. 5-8 stærkt røde eller gule kronblade og grønt bæger. Mange nødder i et forlænget hovede.

1. Nøddens overside næsten lige, uden fremspring ..... annua
   " " med et hak opad 2.
2. Bægerbladene glatte ..... microcarpa
   " hårede 3.
3. Oversidens hak nær spidsen af nødden ..... flammea
   " " " midten " " aestivalis

Adonis annua L. Høstadnois. 15-35cm. Kronbladene skarlagenrøde med sort grund. 0-1300m. I kornmarker. III-VI. A B C K. 2 ssp.:
ssp. annua: Bægerbladene glatte. Nødden 4-5½mm. Planten spredt håret, især forneden.
ssp. cupaniana (Guss.) Steinberg: Bægerbladene hårede. Nødderne 3-4½mm. Stængel og blade glatte.

A. flammea Jacq. Skarlagenadonis. 5-50cm. Kronen mest skarlagenrød, sjældent gul. Bægeret højst ½ x kronen. Nødderne ofte sortspidsede. V-VIII. A

A. aestivalis L. ssp. provincialis (DC.) Steinberg 20-60cm. Bægeret 2/3-3/4 x kronen, denne skarlagenrød. Frugten 3½-5½mm. Stænglen uldhåret ved de øvre bladfæster. V-VIII. K (Pesto)

A. microcarpa DC. Småfrugtet adonis. 20-60cm. Kronen mest gul. Bægeret 2/3-3/4 x kronen. Frugten 3-4mm, ofte mørkspidset. ABCK

Ranunculus. Smørblomst.

1. Kronen hvid. Vandplanter ..... 2.
   " gul, rød eller manglende 9.
2. Undervandsbladene fligede i 1 plan, ikke sammenfaldende
   uden for vandet ..... circinatus
   Undervansbladene sammenfaldende uden for vandet 3.
3. Kun med flydeblade, disse indtil ½ delte ..... omiophyllus
   Hvis kun flydeblade, så er disse dybere delte 4.
4. Kronbladene 3-5½mm med måneformet honningkirtel trichophyllus
   " gennemgående større 5.
5. Bladene ofte over 8cm, lig eller længere end stængelleddene
   fluitans
   Bladene under 8cm, kortere end stængelleddene 6.
6. Nødden glat, vinget hele vejen rundt ..... baudotii
   " ikke vinget 7.
7. Blomsterstilken oftest over 5cm, længere end den tilhørende bladstilk ..... peltatus
   Blomsterst. oftest under 5cm, kortere end bladstilken 8.

8. Honningkirtlen halvmåneformet ..... saniculifolius
" rund aquatilis
9. 3 bægerblade og 8-13 kronblade ..... ficaria
5 " 10.
10. Alle blade udelte ..... 11.
De øvre eller alle blade delte 15.
11. Alle blade i roset ..... bullatus
Med stængelblade 12.
12. Enårig ..... 13.
Flerårig 14.
13. Nødderne knudrede. Opret-opstigende ..... ophioglossifolius
" jævne. Planten liggende og rodslående fontanus
14. Med 1 stort, nyreformet stængelblad. 10-25cm høj .... thora
Mange, smalt lancetformede stængelblade lingua
15. Røde kronblade ..... asiaticus
Gule (eller ingen) kronblade 16.
16. Enårige ..... 17.
Flerårige 23.
17. Mange nødder i et forlænget hovede ..... sceleratus
4-30 " " " rundt hovede 18.
18. Frugten 6-8mm ..... 19.
" 2-4mm 20.
19. Bladene svagt lappede ..... muricatus
" smalfligede arvensis
20. Kronen 2 x bægeret. Nødderne fintprikkede/glatte .. sardous
" 1-1,3 x bægeret. Nødderne knudrede eller tornede 21.
21. Blomsterbunden dunet. Bladet stærkt delt ..... trilobus
" glat. Bladet lappet til noget fliget 22.
22. Frugtstilkene spinkle. Næbbet 1/4-1/3 x nødden parviflorus
" fortykkede. Næbbet 1/2 x " chius
23. Nødderne i et ægformet-aflangt hovede ..... 24.
" " " rundt hovede 29.
24. Bægerbladene nedbøjede ..... 25.
" udstående 26.
25. Grundbladene med helrandede, linje-lancetformede afsnit
illyricus
Grundbladene med tandede til 3-delte afsnit monspeliacus
26. Stængelgrunden stærkt trævlet. Grundbladene uens paludosus
" ikke " . 1 slags grundblade 27.
27. Grundbladene 1/3-2/3 delte i 3 brede afsnit ..... rupester
" findelte 28.
28. Bægerbladene glatte. Frugten med krumt næb .. millefoliatus
" dunede. " " ret næb garganicus
29. Kronbladene væk eller reducerede. Nødderne dunede silanus
" veludviklede 30.
30. Bægerbladene nedadrettede ..... 31.
" udstående 33.
31. Blomsterstilken trind ..... velutinus
" furet 32.
32. Øvre og nedre blade af forskellig type ..... neapolitanus
" " " " " samme type bulbosus
33. Blomsterstilken furet ..... 34.
" trind 36.
34. Bladenes midterafsnit stilket. Krybende og rodslående repens
" " siddende. Opret, ikke " 35.
35. 10-30cm. Fåblomstret. Bægerbladene 8-9mm ..... thomasii
30-80cm. Flerblomstret. Bægerbladene 6mm nemorosus
36. Stænglen 1(3)-blomstret, 8-25cm, med trævlet grund ..... 37.
" flerblomstret, 30-100cm 38.
37. Næbbet 1/5-1/3 af nødden ..... pollinensis
" 1/10-1/5 af " apenninus
38. Stænglen forneden med 2-3mm lange, udstående hår lanuginosus
" " højst med 1mm lange hår 39.

39. Nødden mindst 4 x næbbet. Bladafsnittene siddende .... acer
" højst 2 x " . " m.m. siddende 40.
40. Nødden ca. 2,75mm, næbbet 1-1,5mm, svagt krummet serbicus
" ca. 4,25mm, " ca. 2,5mm, krummet brutius

Ranunculus acer L. Bidende smørblomst. V-VIII. A B C K

R. serbicus Vis. Serbisk smørblomst. 40-120cm. Grundbladene 8-20 cm brede, silkehårede nedenunder, spredt tiltrykt dunede ovenpå, med kileformede afsnit. 800-1300m. V-VIII. C (Sila m.m.)

R. brutius Ten. Krognæbbet smørblomst. 30-50cm. Grundbladene 6-12cm brede, halvglatte. Blomsterbunden dunet (glat hos de 2 foregående).1200-1800m. V-VI. B C K

R. lanuginosus L. Uldhåret smørblomst. V-VIII. A B C K

R. velutinus Ten. Fløjlssmørblomst. 30-60cm. Nødden 3mm, meget kortnæbbet. Bladstilke og stænglens nedre del udstående dunede; ellers silkehåret. Bladene bredlappede. IV-VI. A B C K

R. repens L. Lav smørblomst. 0-2000m. III-VIII. A B C K

R. nemorosus DC. Lundsmørblomst. 30-80cm. Grundbladene 3-delte med brede afsnit; stængelbladene smalfligede. V-VIII. B C

R. thomasii Ten. Grundbladene helt delte i (3)5 afsnit; det midterste 1/2-4/5 delt. Kronbladene 12-15mm. 600-1800m. V-VIII. A (Gargano) B (Pollino) C (Sila)

R. pollinensis (Terr.) Chiov. Grundbladene hårede, de unge først med opret plade; delte til grunden i 3 afsnit. Stængelbladene med linjeformede flige. Blomsterne ret store. 1800-2400m.VII-VIII. C

R. apenninus Chiov. Grundbladene tiltrykt hårede, delte næsten til grunden i 3 afsnit. Det ene stængelblad med 3 lancetformede flige. 1800-2500m. V-VII. B C K

R. bulbosus L. Knoldsmørblomst. III-X. A B C K. 2 underarter:
ssp. bulbosus: Stængelgrunden løgformet.
ssp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc.: Stængelgrunden ikke løgformet.

R. neapolitanus Ten. Sølvstænglet smørblomst. 20-50cm. Udstående dunet. Bægeret gulbrunt, kølet, uldhåret. Nødden meget kortnæbbet. Nødderne 3½-4mm. 0-1200m. IV-VI. A B C K

R. sardous Cr. Stivhåret smørblomst. II-IX. A B C K

R. trilobus Desf. Trelappet smørblomst. 5-50cm. Glat eller håret. Blomsterne 5-14mm brede, bleggule. Bægeret nedadrettet. Nødderne vortede, kortnæbbede. 0-600m. IV-V. B C

R. muricatus L. Pigsmørblomst. 5-35cm. Opret, hul stængel. Bladene groft takkede til 3-5-lappede. Nødderne kortpiggede og med et næb på 2-3mm. Kronbladene 5mm. III-IV. A C K

R. arvensis L. Agersmørblomst. 5-30cm. Opret og grenet foroven. 3-7 oftest langtornede nødder med et næb på 3-4mm. IV-VI. ABCK

R. parviflorus L. Småblomstret smørblomst. 15-30cm. M.m. liggende og dunet. Bladene runde til femkantede, 3-5-lappede til fligede. Blomsterne 2½-5½mm brede. III-V. A K

R. chius DC. Tykstilket smørblomst. 8-15cm. Grundbladene hen ad Vedbendærenprises. Nødden 2½-4mm, med rynkede sider. Blomsterne 6-8mm brede. III-V. A C K

R. monspeliacus L. Næbsmørblomst. 10-50cm. Bladene tredelte. Opret. Kronbladene 10-20mm. Planten hvidulden eller hvidt silkehåret. Næbbet ca. ½ x nødden, krumt. IV-VI. A B C K. 2 ssp.:
ssp. monspeliacus: Grundbladenes midterflig under 1/10 sammenvokset med sidefligene; deres flige 3-6 x så lange som brede.
ssp. saxatilis (Balbis) Rouy: Grundbladenes midterflig 1/3-1/6

sammenvokset med sidefligene; fligene 1,2-2,5 x så lange som brede. C (Sila til Savelli)

Ranunculus illyricus L. Steppesmørblomst. 10-25cm. Tiltrykt hvidt silkehåret. Opret. Grundbladene 1-2 x delte med 2-3mm brede, helrandede flige. 1100-1900m. V-VII. A C K

R. paludosus Poiret (R. flabellatus) Forskelligbladet smørblomst. Kendelig på de 2 slags grundblade: de ydre svagt 3-lappede til hele; de indre 3 x smalfliget delte. 0-800m. IV-V. A B C K

R. millefoliatus Vahl Fjerfliget smørblomst. 10-30cm. Grundbladene stærkt smalfligede, 2-3 x fjersnitdelte; fligene 3/4-1mm brede, de endestillede 2-5 x så lange som brede. IV-V. A B C K

R. garganicus Ten. Kørvelbladet smørblomst. 10-30cm. Nær foregående, men bladfligene bredere og butte, 1½mm brede, de endestillede højst 2 x så lange som brede. IV-V. 0-1200m. A B

R. rupester Guss. Klippesmørblomst. 15-30cm. Tæthåret. Grundbladene ca. ½ delte i 3 brede lapper. Bægeret uldhåret. Frugtstanden 2cm. Blomsterne 3-4cm brede. V. C (Aspromonte, Sila(Mezzocampo))

R. asiaticus L. Havesmørblomst. 15-40cm. Dunet flerårig. Ydre blade 3-lappede og tandede, indre fjersnitdelte. Blomsterne 4-5 cm brede. Forlænget frugtstand. IV-V. A (forv. ved Otranto)

R. ficaria L. Vorterod. 2 underarter:
ssp. ficaria: Bægeret grønt og smalt hindekantet. I-V. A B C K
ssp. ficariiformis Rouy & Fouc.: Bægeret gullighvidt. II-V. ABCK

R. bullatus L. Rosetsmørblomst. 8-20cm. Flerårig. Bladene ægformede, rundtakkede, hårede nedenunder. Blomsterstilkene ugrenede, hårede. Blomsterne 2-3cm brede. Nødderne 2mm. X-II. A B C

R. silanus Pign. (R. auricomus p.p.) Grundbladene delte i 3(5) flige. C (Sila omkring Ciricilla)

R. sceleratus L. Tiggersmørblomst. V-VI. A B C K

R. thora L. Giftsmørblomst. 10-30cm. Ingen grundblade i blomst. Nederste stængelblad 3-7x4-8cm, nyreformet og takket, de øvre små og lancetformede eller tredelte. 1000-2200m. VI-VII. K

R. lingua L. Langbladet smørblomst. VI-VII. B K

R. ophioglossifolius Vill. Tungesmørblomst. 10-40cm. Bladene lancet- til bredt ægformede. Stænglen slap, opstigende, hul. Blomsterne 8mm brede. 0-600m. III-VII. A B C K

R. fontanus Presl Liden tungesmørblomst. 5-25cm. Nær foregående, men mindre, med smallere blade og mindre blomster. Glatte blomsterstilke (tiltrykt dunede hos oph.). 600-1400m. V-VII. B C K

R. omiophyllus Ten. Hedefrøpeber. Kronbladene 5-6mm med måneformede honningkirtler. Frugtstilken ikke længere end det tilhørende blad. Nødderne glatte. 0-1000m. IV-V. B C K

R. baudotii Godron Strandfrøpeber. III-V. A

R. saniculifolius Viv. Sanikelfrøpeber. Frugtstilken længere end bladet. Frugtbunden håret. Måneformet honningkirtel. IV-VI. A

R. peltatus Schrank Storblomstret frøpeber. IV-VI. A

R. aquatilis L. Alm. frøpeber. V-VI. A B C K

R. trichophyllus Chaix Hårfliget frøpeber. IV-VI. A B C K

R. circinatus Sibth. Kredsbladet frøpeber. V-VI. A

R. fluitans Lam. Flodfrøpeber. Ingen flydeblade. Udvoksede blade 10-30cm, afsnittene m.m. parallelle. V-VI. B (Muro)

Ceratocephalus falcatus (L.) Pers. Krumt kartefrø. 2-10cm. Lille enårig rosetplante med smalt håndfligede blade. Små gule blomster

med bæger. Ret stor, ægformet frugtstand. Frugten 9-10mm med et langt, seglkrummet næb. I kornmarker. 0-1500m. II-III. A

Myosurus minimus L. Musehale. V-VI. A

Aquilegia viscosa Gouan Klæbrig akeleje. 30-120cm. Stænglen stærkt klæbrigt håret foroven. Støvdragerne rager 5-10mm ud over kronbladene. 600-1400m. V-VI. A B C K (Gargano, Alburno, Sila)

A. vulgaris L. Alm. akeleje. Kronen blålilla, støvdragerne næppe udragende. VI-VIII. A B C K

A. atrata Koch Sort akeleje. 30-120cm. Blomsten mørkt brunlilla. Støvdragerne rager 5-10mm ud. 400-2000m. VI-VII. C (Pollino) K

Thalictrum. Frøstjærne.

1. Støvtrådene udvidede foroven, mest lyserøde/lyslilla ..... 2.
   " trådformede, gule eller grønlige 3.
2. Frugterne hængende, vingede, 7-10mm ..... aquilegifolium
   " oprette, uvingede, 4-7mm calabricum
3. Bladafsnittene ca. så lange som brede ..... minus
   " 2-10 x så lange som brede 4.
4. Støvdragerne hængende. Støvknapperne brodspidsede .. simplex
   " oprette. " næppe brodspidsede 5.
5. Stænglen ikke skinnende. Bladene glatte ..... flavum
   " skinnende. Bladundersiden kirteldunet morisonii

Thalictrum aquilegifolium L. Akelejefrøstjærne. 40-100cm. Småbladene højst 1½ x så lange som brede. Bladene med fodflige. En tæt top. Frugten med 3 vingede kanter. V-VII. A B C K

T. calabricum Sprengel Egeskovsfrøstjærne. 40-80cm. Nær foregående, men bladene uden fodflige. Toppen fåblomstret. Frugten med 7-8 ribber. 500-1400m. IV-VI. C (Pollino, Is.di Dino, Monteleone, Staiti) K (M. Bulgheria)

T. minus L. Liden frøstjærne. V-VII. A B C K

T. flavum L. Gul frøstjærne. VI-VIII. A B C K

T. simplex L. Rank frøstjærne. V-VII. B C

T. morisonii Gmelin ssp. mediterraneum (Jordan) P.W.Ball Høj frøstjærne. 50-150cm. Nedre blades småblade 4-5x1-1½cm; de øvres linjeformede. Blomsterne i nøgler. VI-VII. A B

PAEONIACEAE

Paeonia mascula (L.) Miller Storbladet bonderose. 50-80cm. Bladene med 9-16 småblade, ofte 2 x trekoblede; småbladene 8-12x4-5 cm, helrandede. Blomsterne 8-12cm brede, røde. IV-V. A B C K
ssp. mascula: Bladundersiden glat og blågrøn. 500-1900m.
ssp. russii (Biv.) Cullen & Heyw.: Bladundersiden spredt dunet og mørk. M.sj. i C

BERBERIDACEAE

Berberis vulgaris L. Almindelig surtorn. ½-2½m. Klaserne 3-5cm med mest 15-30 blomster. Bladene 25-55mm. V-VI. B K

B. aetnensis Presl Vreden surtorn. 30-60cm. Klaserne 2-3cm med 3-15 blomster. Bladene 15-40mm. 1400-2300m. V-VI. B C K

LAURACEAE

Laurus nobilis L. Lavrbær. 1-5m. Busk til træ. Unge kviste grønne med langstrakte korkporer. Bladene stedsegrønne, læderagtige, mørkegrønne og skinnende ovenpå, spredte, ofte lidt bølgede i randen. Tvebo. 4 blosterblade. 8-12 støvdragere. III-IV. A B C K

PAPAVERACEAE

Papaver. Valmue.

1. Bladene blågrønne, de øvre stængelomfattende .... somniferum
   " grønne, ikke stængelomfattende 2.
2. Kapslen stivhåret til håret ..... 3.
   " glat 4.
3. Blomsterknoppen m.m. kugleformet, tydeligt håret .. hybridum
   " bredt ægformet, m.m. glat apulum
4. Kapslen 1-1½ x så lang som bred ..... rhoeas
   " 2-5 x " " " " 5.
5. Støvknapperne gullige ..... pinnatifidum
   " lilla dubium

Papaver somniferum L. Opiumsvalmue. 2 underarter:
ssp. somniferum: M.m. glat. Bladtænderne uden brod. Dyrket.
ssp. setigerum (DC.) Corb.: Udstående stivhåret. Bladtænderne brodspidsede. V-VI. C K

P. rhoeas L. Kornvalmue. IV-VI (VIII-IX). A B C K. 2 underarter:
ssp. rhoeas: Stænglen udstående håret, især foroven.
ssp. strigosum (Boenn.) Pign.: Blomsterstilken tiltrykt håret.

P. dubium L. Gærdevalmue. IV-VI. A B C K

P. pinnatifidum Moris Skarptandet valmue. 20-50cm. De øvre blade ikke fjerdelte, men skarpt trekantet tandede eller lappede. B

P. apulum Ten. Kortkapslet valmue. Kapslen forneden med tiltrykte børster. Det modne støvfang stærkt hvælvet mellem arstrålerne. Kronen uden sort plet ved grunden. IV-V. A B C K

P. hybridum L. Vinvalmue. 20-50cm. Kapslen kun med udstående børster. Det modne støvfang ikke hvælvet mellem arstrålerne. Kronen vinrød med en lille sort plet ved grunden. V-VI. A B C K

Glaucium flavum Cr. Hornskulpe. 40-70cm. Stærkt blågrøn 2-flerårig med store, gule valmueblomster. Kapslen linjeformet, 15-20cm, glat. Mest langs kysten. V-X. A B C K

G. corniculatum (L.) Rudolph Rød hornskulpe. 30-50cm. Dunet enårig med indtil 3cm lange, røde blomster. Kapslen indtil 20cm, med tiltrykte børster. V-VI. A C

Chelidonium majus L. Svaleurt. V-X. A B C K

Hypecoum. Seglskulpe. Glatte, blågrønne, enårige urter med mælkesaft. Bladene 2-3 x fjerdelte. Blomsterne ret små, gule, 4-tallide, de to par kronblade lidt forskellige. Kapslen linjeformet, m.m. seglkrummet, noget leddet.

H. procumbens L. Liggende seglskulpe. 12-25cm. Ydre kronblade 3-9mm med sidelapperne klart mindre end hovedlappen. II-V. A K

H. imberbe S.& S. Storblomstret seglskulpe. 5-40cm. Opstigende til opret. Ydre kronblade 10-12mm med sidelapperne så store som midterlappen. II-IV. A C

Corydalis ochroleuca Koch Bleggul lærkespore. 10-25cm. Opret flerårig. Blågrønne blade. Ret tætte klaser af flødefarvede, gulspidsede blomster på ca. 15mm; sporen 3mm. V-VII. B K

C. cava (L.) Schweigg. Hulrodet lærkespore. Støttebladene hele. Klasen med 10-20 blomster på 18-30mm. III-V. A B C K

C. intermedia (L.) Mérat Liden lærkespore. Hele støtteblade. Klasen med 2-8 blomster på 10-15mm. IV-VI. B

C. solida (L.) Swartz Langstilket lærkespore. Støttebladene lappede. IV-V. A B C K

Fumaria. Jordrøg.

1. Kronen mindst 9mm lang ..... 2.
   " højst 9mm " 6.

2. Frugtstilken tilbagekrummet ..... 3.
" ret, udstående eller opret 4.
3. Modne frugt jævn. Stilken lidt længere end klasen capreolata
" " rynket. Stilken lidt kortere end klas. flabellata
4. Bægerbladene 3½-5mm. Kronen hvidlig ..... agraria
" 2-3mm 5.
5. Kronen hvid (evt. med lyserødt skær). Frugten 3x3mm judaica
" blegrød. Frugten 2-2½x2-2½mm bastardii
6. Kronen hvidlig, 5-6mm ..... parviflora
" lyserød 7.
7. Klasestilken meget kort ..... densiflora
" tydelig 8.
8. Kronen rødlilla ..... officinalis
" blegt lyserød vaillantii

Fumaria agraria Lag. Markjordrøg. Klaserne længere end stilken, med 15-22 blomster. Støttebladet ca. 2/3 x den udstående frugtstilk. Kronen 12-14mm. Frugten 2½-3mm. IV. A K

F. judaica Boiss. Hjælmjordrøg. Klasen med 10-20 blomster på 9-13mm, ofte lidt længere end stilken. Støttebladet 1/3-1/2 x den halvt oprette frugtstilk. IV-V. A (Gargano)

F. capreolata L. Hvid jordrøg. Kronen 10-14mm, mest hvid. Klasen kortere end sin stilk. Bægeret 4-6x2-3mm. XII-V. A B C K

F. flabellata Gasparr. Viftejordrøg. Blågrøn. Kronen blegrød, 9-12mm. Klasen først lig, senere længere end sin stilk. Bægerbladene 3-5x1½-2½mm. II-IV. A B C K

F. bastardii Boreau Klasen mest med 15-25 blomster, længere end klasestilken. Støttebladet 1/3-1/2 x frugtstilken. Bægerbladene m.m. savtakkede. III-V. A B C K

F. densiflora DC. Tætblomstret jordrøg. Støttebladene oftest længere end frugtstilkene. Kronen 6-7mm, lyserød med mørk spids. III-IV. A B C K

F. officinalis L. Lægejordrøg. V-VIII. A B C K. 2 underarter: ssp. officinalis: Klasen oftest 20-30-blomstret. Bægeret 2-3mm. ssp. wirtgenii (Koch) Arc.: Klasen 10-20-blomstret. Bægerbladene 1½-2mm lange.

F. vaillantii Loisel. Bleg jordrøg. Klasen 6-15-blomstret, kortstilket. Støttebladene ca. 3/4 x frugtstilken. VI-X. A B

F. parviflora Lam. Småblomstret jordrøg. Som foregående, men støttebladene lig eller længere end frugtstilken. III-IV. A B C K

Platycapnos spicata (L.) Bernh. Aksjordrøg. 8-35cm. Bladene 2 x delte, ganske finfligede. Lyserøde, 5-6mm store, ganske kortstilkede jordrøgsblomster i et meget tæt, 1-2cm langt og langstilket aks. IV-V. K (Salerno)

CAPPARIDACEAE

Capparis. Kapers. 40-80cm lange buske med liggende eller udstående grene med spredte, grågrønne blade, der ofte har akseltorne. Store, enlige, hvide 4-talsblomster i bladhjørnerne med mange støvdragere og en langstilket frugtknude. Kystklipper og mure.

C. spinosa L. Rundbladet kapers. Bladene 2½-6cm, runde eller ægformet-runde, butte eller med en ganske lille brod, glatte. V-VI. A B C K

C. ovata Desf. Ægbladet kapers. Bladene 3½-4cm, ægformede eller elliptiske, med en tydelig brod i spidsen, gråfiltede som unge. V-VI. A B C

CRUCIFERAE

1. Langskulpet: Skulpen over 3 x så lang som bred ..... 2.
   Kortskulpet: " højst 3 x " " " " 31.
2. Bægeret opret og lukket ..... 3.
   Bægerbladene m.m. udstående 15.
3. Griflen tvelappet med en udvækst under hver lap .. Matthiola
   " uden sidestillede knuder eller horn 4.
4. Kronbladene rødlilla til lilla ..... 5.
   " hvide eller gule 9.
5. Skulpen tværdelt. Bladene glatte og kødede ..... Cakile
   " ikke tværdelt 6.
6. Øvre stængelblade med omfattende eller afrundet grund .... 7.
   " " " tilsmalnet grund 8.
7. Bladene helrandede med stærkt omfattende grund .. Moricandia
   " tandede, næppe stængelomfattende Hesperis
8. Støvfanget hovedformet eller svagt udrandet ..... Maresia
   " dybt tvelappet Malcolmia
9. Skulpen leddelt eller uopspringende, flerribbet ... Raphanus
   " med opspringende klapper 10.
10. Skulpen med et knopformet næb. Bægeret 3-4mm Hirschfeldia
    " uden " " 11.
11. Skulpen med et sværdformet sammentrykt næb ..... Eruca
    " uden et sådant næb 12.
12. Bladene helrandede, stængelomfattende og blågrønne Conringia
    " anderledes 13.
13. Planten udelukkende med tiltrykte 2-3-grenede hår Erysimum
    " uden sådanne hår 14.
14. Med grenhår. Støvfanget dybt tvelappet ..... Hesperis
    Uden " . " hovedformet Brassica
15. Kronbladene hvide til hvidgule eller lilla ..... 16.
    " gule 22.
16. Skulpeklapperne med 3 ribber ..... Alliaria
    " " 0-1 ribbe 17.
17. Skulpens klapper flade. Skulpen stærkt sammentrykt ..... 18.
    " " hvælvede. Skulpen ej stærkt sammentrykt 19.
18. Med fjersnitdelte stængelblade ..... Cardamine
    Stængelbladene hele Arabis
19. Skulpen med utydelig ribbe. Bladene tydeligt fligede ... 20.
    " " tydelig ribbe 21.
20. Enårig. Skulpen kortstilket ..... Sisymbrella
    Flerårig. Skulpen tydeligt stilket Nasturtium
21. Frøene 2-radede ..... Diplotaxis
    " 1-radede Arabidopsis
22. Skulpen fladtrykt, m.m. dråbeformet og hængende .... Isatis
    " ikke hængende 23.
23. Skulpeklapperne 3-ribbede ..... 24.
    " med 0-1 ribbe 25.
24. Skulpen med et kantet næb på mindst 10mm ..... Sinapis
    " uden næb Sisymbrium
25. Skulpeklapperne flade. Alle blade i roset ..... Draba
    " hvælvede eller kølede 26.
26. Skulpeklapperne uden tydelig ribbe ..... Rorippa
    " med " " 27.
27. Bladene fint 2-3 x fjersnitdelte. Bleggul krone Descurainia
    " ikke så fintdelte 28.
28. Skulpens klapper kølede ..... 29.
    " " hvælvede 30.
29. Skulpens klapper knudrede ..... Erucastrum
    " " ikke knudrede Barbarea
30. Frøene 2-radede ..... Diplotaxis
    " 1-radede Brassica
31. Kronen gul eller bleggul ..... 32.
    " hvid eller rødlilla 43.
32. Flerårig med bladløs stængel ..... Draba
    Stænglen bladet 33.

33. Skulpen hængende, kredsrund og flad ..... Clypeola
" opret eller udstående 34.
34. Skulpen tornet og med et langt næb ..... Succowia
" ikke tornet 35.
35. Skulpen brilleformet ..... Biscutella
" ikke brilleformet 36.
36. Skulpen med 4 uregelmæssige, grofttakkede vinger ... Bunias
" uvinget 37.
37. Frugten omvendt pæreformet med en fremadrettet pig Myagrum
" uden pig, men kan have en påsiddende griffel 38.
38. Stængelbladene med pilformet grund og m.m. helrandede .. 39.
" anderledes 40.
39. Skulpen netrynket, ikke opspringende ..... Neslia
" ikke netrynket, " Camelina
40. Skulpen tværdelt med et smallere underled ..... Rapistrum
" ikke tværdelt 41.
41. M.m. glat. Uden grenhår ..... Rorippa
Ret tæt stjærne- eller grenhåret 42.
42. Indre bægerblade med sækformet grund ..... Alyssoides
Bægerbladene uden sækformet grund Alyssum
43. Skulpen tydeligt smalvægget ..... 44.
" bredvægget, trind eller kugleformet 56.
44. Klaserne sidestillede. Skulpen rynket ..... Coronopus
" endestillede. " jævn 45.
45. Stængelbladene med omfattende grund ..... 46.
" uden " " 49.
46. Skulpen omvendt hjærteformet, uvinget ..... Cardaria
" anderledes 47.
47. Skulpens sider rette med en spids vinkel nederst Capsella
" " krumme 48.
48. Planten m.m. håret ..... Lepidium
" overvejende glat Thlaspi
49. Flerårig ..... 50.
Enårig 52.
50. 2 store og 2 små kronblade ..... Iberis
Kronbladene ens 51.
51. Skulpens vinger bredere end skulperummet ..... Aethionema
" " højst brede foroven Lepidium
52. Klasen med blade til toppen ..... Ionopsidium
" højst med blade forneden 53.
53. Skulpen vinget eller stærkt kølet .....54.
" hverken vinget eller stærkt kølet 55.
54. Lav rosetplante på 4-15cm med fåbladet stængel .. Teesdalia
Stænglen højere og mangebladet Lepidium
55. Skulpestilkene opret-udstående. Klaserne åbne Hymenolobus
" udstående. Klaserne tætte Hornungia
56. Kronbladene rød- eller blålilla ..... 57.
" hvide 58.
57. Skulperne 2-9cm, med glatte flader ..... Lunaria
" 5-12mm, med stjærnehårede flader Aubrieta
58. Skulpeklapperne flade ..... 59.
" hvælvede eller skulpen kugleformet 62.
59. Kronbladene dybt 2-lappede ..... 60.
" hele eller udrandede 61.
60. Rosetplante uden stængelblade ..... Erophila
Med stængelblade Berteroa
61. Flerårig. Bladene helrandede ..... Lobularia
Enårig. Stængelbladene tandede Draba muralis
62. Nedre blade 30-50cm lange, bredt lancetformede .. Armoracia
" " langt mindre 63.
63. Stængelbladene uden pilformet grund ..... Crambe
" med " " 64.
64. Skulpen Calepina
" jævn, opspringende Cochlearia

Sisymbrium. Vejsennep.

1. Blomsterne 2-3 sammen i bladhjørnerne ..... polyceratium
   " i en bladløs klase 2.
2. Skulperne tiltrykte aksen, 7-20mm ..... officinale
   " m.m. udstående 3.
3. Skulpestilken så tyk som skulpen, 1/25-1/10 x skulpen .... 4.
   " tyndere end " , 1/5-1/2 x skulpen 5.
4. Øvre stængelblade hele eller med 1 par grundflige orientale
   " " med 2-4 par smalle flige altissimum
5. Øverste skulper rager op over de små, bleggule blomster irio
   " " kortere end blomsterne austriacum

Sisymbrium irio L. Glat vejsennep. 10-50cm. Glat eller med lange, krumme hår. Kronbladene 3-4mm, bægeret 2-2½mm. Skulpen knudret, mest 3-4cm. II-VI. A B C K

S. austriacum Jacq. ssp. austriacum Østrigsk vejsennep. 30-60cm. Bladene glatte og skinnende, spidsfligede. Kronen gyldengul, 5mm. Skulpen 2½-6cm, noget vreden. V-VII. K

S. altissimum L. Ungarsk vejsennep. VI-VII. C K

S. orientale L. Blød vejsennep. 30-70cm. Øvre blade ofte linjeformede. Stænglen blødt dunet. Kronbladene 6-9mm. Skulpen 4-10 (20)cm, opret til udstående. VI-VII. A

S. polyceratium L. Hornet vejsennep. 20-60cm. Nedre blade bugtet-fligede, øvre lancet-spydformede. Blomsterne små, 1½-2mm. Skulperne 1-2½cm, knudrede; stilken ½-1mm. IV-VI. A B C K

S. officinale (L.) Scop. Rank vejsennep. V-VII. A B C K

Myagrum perfoliatum L. Pigskulpe. 15-100cm. Glat, blågrøn og stinkende 1-2-årig. Stængelbladene trekantet-lancetformede med pilformet grund. Omvendt pæreformet skulpe på 5-8mm. IV-V. A B

Isatis tinctoria L. Farvevajd. V-VII. A B C K

Bunias erucago L. Agertakkeklap. 30-60cm. 1-2-årig. Nedre blade med trekantede flige, øvre helrandede til tandede. Skulpens 4 vinger hver med 2 store, trekantede takker. II-VII. A B C K

Erysimum. Hjørneklap.

1. Bægeret mørkkirtlet. Kronen mørkegul til orangebrun cheiri
   " ukirtlet. Kronen gul til lysegul 2.
2. Kronbladene glatte udvendigt ..... pseudorhaeticum
   " hårede " 3.
3. Bægeret 8-13mm. Kronbladene 15-21x5-9mm ..... majellense
   " 4½-8mm. " 11-13x3-4mm crassistylum

Erysimum cheiri (L.) Cr. (Cheiranthus c.) Gyldenlak. 25-80cm. Stænglen forveddet forneden, med tydelige bladar. Kronbladene 12-20mm. Skulpen lidt sammentrykt, 2½-3mm bred. Forv. i A B C K

E. crassistylum C.Presl 20-35cm i blomst, 30-70cm i frugt. Skulperne 3-8cm x ca.1mm, 60-70° udstående, griflen ca. 1mm. 50-800m. IV-VI. A B C (fra Gargano til Reggio; især på østsiden)

E. majellense Pol. 8-22cm i blomst, 22-26cm i frugt. Skulperne 4-9cm x 1-1,3mm, ca 50° udstående, griflen 1½-3mm. 1100-2400m. VI-VIII. B (Alpe Latronico) C (Pollino, Sila)

E. pseudorhaeticum Pol. 20-50cm i blomst, 25-70cm i frugt. Bægeret 7-12mm. Kronen 13-18½x3-6mm. Skulperne 3½-10cm x 0,7-1mm, ca. 50° udstående, griflen ½-1½mm. 100-900m. IV-VI. K

Hesperis laciniata All. Fliget aftenstjærne. 15-30cm. Bladene med børster på 1-2mm. Blomsterstilken 1/3-1/2 x bægeret. Kronen ofte gul eller brun. 400-1400m. IV-V. A B C K

Hesperis matronalis L. Aftenstjærne. Bladene glatte eller spredtbørstede. Blomsterstilkene ca. = bægeret eller længere. Rødlilla kronblade. V-VII. A B C K (i A kun som forvildet)

Malcolmia. Levkøj. Enårige.

1. Bægerbladene uden sækformet grund ..... ramosissima
   " med tydelig, sækformet grund 2.
2. Skulpestilken tydeligt tyndere end skulpen ..... maritima
   " ca. så bred som skulpen flexuosa

Malcolmia ramosissima (Desf.) Thell. Grenlevkøj. 5-20cm. Hvidligt til grågrønt filtet. Kronbladene 4-8mm. Skulpen 1½-3½cm, knudret, m.m. udstående, griflen 1-2mm. Klitter. III-V. A C K

M. maritima (L.) R.Br. Strandlevkøj. 10-30cm. Skulpestilken ½-1 mm ved grunden. Kronbladene mest rødlilla med mørkere årer. Skulpen med 3-4-grenede stjærnehår. Strande. IV-V. A (Monopoli)

M. flexuosa (S.& S.) S.& S. Krum levkøj. 20-40cm. Skulpestilken 1-2½mm tyk ved grunden. Kronbladene mest blegrøde. Skulpen med T-grenede hår og under 30% stjærnehår. V-VI. A (Isole Tremiti)

Maresia nana (DC.) Batt. Dværglevkøj. 5-20cm. Kort grådunet. Bladene linje- til let spatelformede. Bægeret 2-2½mm. Kronen 4-5½ mm. Skulpen 2-3cm x 0,75mm, trind og knudret. Klitter. IV-V. A C

Matthiola. Levkøj.

1. Skulpen med 3 m.m. ens, horn på 2-8mm i spidsen tricuspidata
   " uden horn 2.
2. Skulpen trind, skulpestilkene 0-3(8)mm ..... fruticulosa
   " affladet, skulpestilkene 5-25mm 3.
3. Skulpen med store kirtler. Nedre blade indskårne ... sinuata
   " uden " " . Bladene helrandede incana

Matthiola incana (L.) R.Br. Sommerlevkøj. 30-60cm. Kraftig flerårig. Kronbladene 17-24mm. Skulpen 6-10cm x 3mm. III-V. 2 ssp.:
ssp. incana: Planten gråfiltet. Nedre blade indtil 22mm brede. A B C K På kystklipper og gamle mure.
ssp. rupestris (Rafin.) Nyman: Planten grøn, lidet dunet eller næsten glat. Nedre blade indtil 25-40mm brede. K (Ischia) m.m.?

M. sinuata (L.) R.Br. Klitlevkøj. 30-50cm. Gråfiltet. Kronbladene 19-22mm. Skulpen 5-12cm x 3-5mm, med store, 0,3-0,4mm brede, gule og brune kirtler. Klitter. III-VII. A C K

M. fruticulosa (L.) Maire Mørk levkøj. 30-50cm. Forveddet ved grunden, oftest tæt gråfiltet. Bladene smalle, 4-5cm x 2-4mm, de nedre med 1-3 par smalle sideflige. 300-1500m. III-VI. A B C

M. tricuspidata (L.) R.Br. Trehornet levkøj. 10-30cm. Gråfiltet enårig med lappede blade. Kronen 14-17mm. Skulpen 4-7cm med 3 oftest 3-4mm lange horn. Mest på sandstrand. IV-VII. A C K

Barbarea. Vinterkarse.

1. Klasen med støtteblade i sin nedre halvdel ..... bracteosa
   " højst med støtteblade forneden 2.
2. Øvre blade hele, tandede eller lappede ..... vulgaris
   " " dybt delte, endeafsnittet aflangt eller lancetf. 3.
3. Skulperne 1½-2½cm x 1-1½mm ..... sicula
   " 3-7cm x 1½-2mm verna

Barbarea sicula Presl Rundbladet vinterkarse. 30-60cm. Skulpestilken ca. 45° udstående, men skulpen parallel med aksen. Kronen 6-7mm. Nedre blade med 1-4 par sideflige. 1000-1700m. V-VI. C (Aspromonte, Sila)

B. bracteosa Guss. Højbladet vinterkarse. 30-50cm. Øvre blade med 1-2 par smalle flige. Skulpen ret opret, undertiden ensidigt krummet. 500-2200m. IV-VI. B C K

Barbarea vulgaris R.Br. Alm. vinterkarse. IV-VII. A B C K

B. verna (Miller) Asch. Langskulpet vinterkarse. 20-75cm. Grundbladene med 6-10 par sideafsnit og et ikke så stort endeafsnit. IV-VII. B K

Sisymbrella dentata (L.) O.E.Schulz Hvid slimkarse. 10-40cm. Bladene smalt og but fjerfligede til lyreformede. Klasen bladløs. Bægeret 3mm, kronen 5mm. Skulpen 5-6cm, på en fortykket, 2-4mm lang stilk. Dynd, væld, bække. 0-800m. IV-V. C (Madia)

Rorippa. Guldkarse.

1. Kronbladene højst af bægerets længde ..... palustris
   " længere end bægeret 2.
2. Skulpen 8-20mm, længere end stilken, en langskulpe silvestris
   " en kortskulpe, 2-6mm, lig eller kortere end stilken 3.
3. Skulpen kugleformet. Bladene helrandede til savtak. austriaca
   " 1½-3 x så lang som bred. Nedre blade delte amphibia

Rorippa austriaca (Cr.) Besser Østrigsk guldkarse. 30-90cm. M.m. glat flerårig med udløbere. Nedre blade kortstilkede, øvre med pilformet grund. Bægeret 1-2mm. Kronen 2-3mm. V-VII. B (Potenza)

R. amphibia (L.) Besser Vandpeberrod. V-VII. B K

R. silvestris (L.) Besser Vejguldkarse. V-IX. A B C K

R. palustris (L.) Besser Kærguldkarse. V-VII. B C

Armoracia rusticana Gaertner & al. Peberrod. V-VII. B

Nasturtium officinale R.Br. Tykskulpet brøndkarse. V-VII. ABCK

Cardamine. Springklap og Tandrod.

1. Kronbladene højst 3mm lange ..... 2.
   " mindst 3½mm lange 5.
2. Bladstilkene med små, stængelomfattende øren ..... impatiens
   " uden øren 3.
3. Planten helt glat. Småbladene med kileformet grund parviflora
   " svagt håret. Småbladene med afrundet grund 4.
4. Med tydelig bladroset. Stænglen med 2-4 blade ..... hirsuta
   Uden " " . " " 4-10 " flexuosa
5. Bladene danner en krans under klasen ..... 6.
   " spredte 7.
6. Bladene trekoblede ..... enneaphyllos
   " fjersnitdelte kitaibelii
7. Med yngleknopper i de øvre bladhjørner ..... bulbifera
   Uden " 8.
8. Bladafsnittene 6-12x1-3cm ..... heptaphylla
   " mindre 9.
9. Bladstilken med pilformet omfattende grund ..... 10.
   " uden " " " 11.
10. Kronbladene lyserøde ..... chelidonia
    " hvide graeca
11. Endesmåbladet meget større end sidesmåbladene raphanifolia
    Småbladene ret ens glauca

Cardamine bulbifera (L.) Cr. Tandrod. IV-VI. A B C K

C. heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz Fjertandrod. 30-70cm. 3(4) stængelblade med 7-9 småblade, de øvre med sammenflydende grund. Kronbladene 15-18mm, hvide/lyserøde. IV-VI. B C K

C. kitaibelii Becherer Gul tandrod. 20-30cm. De 3 stængelblade m.m. i krans, med 2-6 par lancetformede småblade. Kronbladene 15-22mm, bleggule. 400-1600m. IV-VI. B C K

C. enneaphyllos (L.) Cr. Nikkende tandrod. 20-40cm. Småbladene æg-lancetformede, ca.5cm, uregelmæssigt dobbelt savtakkede. Klasen nikkende. Kronen 12-16mm, lysegul. IV-VI. K

Cardamine raphanifolia Pourret Storbladet karse. 30-60cm. Flerårig. Nedre blades endesmåblad 10-35mm nyreformet til rundagtigt. Kronbladene oftest lyst rødlilla, 8-12mm. 0-1500m. IV-VI. B C K

C. glauca Sprengel Blågrøn karse. 12-25cm. Glat, blågrøn 1-flerårig. Kronen gullighvid, dybt udrandet, ca. 3 x bægeret, 6mm. Skulperne 12-18mm, ofte ensidige. VI-VII. 1500-2500m. B C (M.Papa, Sila, Aspromonte)

C. graeca L. Kildekarse. 10-30cm. Nedre blade med ca. 9 afsnit. Skulperne noget ensidige, ret oprette, vingede. II-V. A B C K

C. chelidonia L. Rød karse. 20-40cm. Bladene med 1-3 par elliptiske til ægformede afsnit på 10-20x7-14mm. Klasen med få lyserøde eller rødlilla blomster på 5-8mm. VI-VII. 0-1500m. A B C K

C. parviflora L. Damkarse. 7-30cm. Glat enårig. Øvre blade med 5-8 par aflangt-linjeformede, helrandede småblade. Grundbladene visne ved frugtmodningen. Kronbladene 2-2½mm. V-VII. K

C. impatiens L. Kronløs karse. IV-VII. A B K

C. flexuosa With. Skovkarse. IV-VI. B C K

C. hirsuta L. Rosetkarse. I-XII. A B C K

Arabis. Kalkkarse.

1. Blåblomstret enårig ..... verna
   Ikke blåblomstret 2.
2. Modne skulper over 9cm, vandret stillede ..... turrita
   Skulperne højst 9cm, ikke vandrette 3.
3. Stængelbladene glatte eller højst fåhårede ..... 4.
   " hårede 6.
4. Stængelbladene med tilsmalnet grund. 3-20cm høj .... nivalis
   " " øret grund. 25-130cm høj 5.
5. Kronbladene renhvide. Planten glat ..... pauciflora
   " hvidgule. " håret forneden pseudoturritis
6. Enårig. Grundbladene væk under blomstringen ..... auriculata
   2-flerårig med grundblade under " 7.
7. Planten med krybende stængler og golde rosetter .. caucasica
   " uden " " " " " 8.
8. Kronbladene linje-kileformede, 0,6-2mm brede, altid hvide 9.
   " bredt omvendt ægformede, 1,8-4mm brede 10.
9. Stænglen stivhåret hele vejen ..... hirsuta
   " glat foroven sagittata
10. Stængelbladene tætfiltede, de øvre næppe bredere end stænglen ..... muralis
    Stængelbladene spredthårede, alle meget bredere end stænglen rosea

Arabis pseudoturritis Boiss.& Heldr. Sydlig tårnurt. 40-130cm. Stænglen håret forneden, ellers glat. Grundbladene bugtet-tandede, hårede. Stængelbladene blågrønne. 300-1800m. IV-V. A B C K

A. pauciflora (Grimm) Garcke (A. brassica) Fåblomstret kalkkarse. 30-100cm. Grundbladene glatte, ægformede til rundagtige, langstilkede, m.m. helrandede. Klasen fåblomstret. V-VIII. B C

A. sagittata (Bertol.) DC. Rank kalkkarse. 25-80cm. 12-50 stængelblade med pilformet grund. Kronbladene 4-6½mm. Skulperne stift oprette, ofte over 5cm lange. IV-VI. A B C K

A. hirsuta (L.) Scop. Stivhåret kalkkarse. IV-VII. A B

A. nivalis Guss. (A. surculosa) 3-20cm. Løsttuet flerårig. Glat eller med spredte enkle eller tvegrenede hår. Nedre blade ofte langstilkede. Skulperne 1½-2½cm. Kronen 3-5mm. B (Pollino)VI-VII.

A. muralis Bertol. Murkalkkarse. 10-20cm. Flerårig. Kronen hvid eller lyserød. Større skulper 4-7cm, oprette, stilkene under 10mm.

Arabis rosea DC. Rosenkalkkarse. (A. collina Ten.) 15-30cm. Flerårig. Kronen lyserød, rødlilla eller hvid. Større skulper 5½-9cm, med stilke på 10-16mm. 100-1600m. II-V. B C K

A. turrita L. Ensidig kalkkarse. 10-70cm. Klasen bladet forneden. Blomsterne gullighvide. Skulperne noget krumme, 8-15cm. M.m. aflange blade med hjærteformet grund. III-VII. A B C K

A. auriculata Lam. (A. recta) Øret kalkkarse. 10-40cm. Stænglen u- eller svagt grenet, med 2-5-grenede hår forneden og 5-12 ørede blade. Bægeret 1½-2mm. Kronen 2-4mm. Skulpen 1-3½cm. III-V. B C K

A. verna (L.) R.Br. Violet kalkkarse. 5-40cm. Ofte flerstænglet med få stængelblade. Få blålilla blomster med gul negl og kronblade på 5-10mm. Skulperne 3-6cm. 0-1700m. II-V. A B C K

A. caucasica Schlecht. Hvid kalkkarse. 15-35cm. Bladene ægformede, groft tandede, stængelbladene med pilformet grund. Kronbladene 9-18mm. Skulperne 4-7cm. III-VIII. A B C K

Aubrieta columnae Guss. Netskulpet blåpude. 5-20cm. Stjærnehåret gråfiltet flerårig. Bægeret opret. Kronbladene 11-18mm. 2 ssp.:
ssp. columnae: Bladene omvendt lancet-spatelformede, mest helrandede. Skulpen 5-12x2-4½mm, griflen 7-10mm. V-VI. B C K
ssp. italica (Boiss.) Mattf.: Bladene omvendt æg-kileformede, med 1-2 par tænder. Skulpen 8-11x3-4mm, griflen 4-6mm. V-VI. A B?

Lunaria rediviva L. Vedvarende måneskulpe. Flerårig. Skulpen 3½-9cm, spids i begge ender. V-VI. K

L. annua L. Judaspenge. Skulpen elliptisk. IV-VI. B C K

Alyssoides utriculata (L.) Med. Stilket blæreskulpe. 20-40cm. Flerårig. Grundbladene aflange, 2-5cm, stjærnehårede; stængelbladene ofte glatte. Kronen 18-20mm. Skulpen m.m. kugleformet, 10-12 mm, med en griffel på 7-10mm. 300-1500m. IV-V. B (Vulture, Muro)

A. sinuata (L.) Med. Bølget blæreskulpe. 30-50cm. Gråfiltet flerårig. Nedre blade ofte bugtet-tandede. Kronbladene 5-8mm. Skulpen 7-12mm med en griffel på 3-4mm. Kalkklipper. 0-600m. IV-V. A (Gargano, Murge)

Alyssum. Krognål.

1. Enårige ..... 2.
   Flerårige 5.
2. Skulpen glat. Klasen kort og halvskærmagtig ..... minutum
   " håret. " forlænget 3.
3. Bægeret vedvarende. Skulpens griffel 0,3-0,6mm .. alyssoides
   " affaldende. " " 0,7-1,6mm 4.
4. Skulpen kun med tiltrykte stjærnehår ..... minus
   " også med udstående hår strigosum
5. Blomstrende skud sidestillede. Nedre blade 4-12cm ..... 6.
   " " endestillede. Bladene under 2cm 7.
6. Bægeret 2-3mm. Frøene 4 i hvert skulperum, 4mm brede saxatile
   " 4mm. Frøene 2 i hvert skulperum, 2-2,7mm leucadeum
7. Griflen 3mm, ca. = skulpen. Nedre blade 6-7mm ..... diffusum
   " ½-2mm, ca. ½ x skulpen. Nedre blade 10-20mm montanum

Alyssum leucadeum Guss. Storfrøet guldslør. 20-40cm. Med stor bladroset af gråfiltede blade på 5-12x1-1½cm. Klaserne 3-6cm, samlede i en halvskærm. Skulperne 7-10mm, ikke afstudsede foroven. Kalkklipper ved havet. 20-150cm. II-VI. A (M.Spaccato ved Gallipoli, M.d'Oro ved Otranto, Castro, S.Nicola i Is.Tremiti)

A. saxatile L. Guldslør. 10-50cm. Nær foregående, men skulperne 4-8mm, ofte afstudsede foroven. III-V. A B C K

A. alyssoides (L.) L. Grådodder. III-VIII. A B C K

A. minutum Schlecht. Glatskulpet grådodder. 3-12cm. Grågrøn. Bægeret vedvarende. Skulpen kredsrund, udrandet. III-VI. B C

Alyssum minus (L.) Rothm. Markkrognål. 8-15cm. Grågrøn. Bladene m.m. aflange. Frugtklaserne lange. De korte støvtråde med et vedhæng fra grunden på støvtrådens halve længde. II-V. A B C K

A. strigosum Banks & Sol. Hårskulpet krognål. 8-15cm. Skulpen 3½-6mm, rundagtig med stjærnehår samt udstående, tvedelte hår. De korte støvtrådes vedhæng 3/4 x støvtråden. III-V. A (Gargano)

A. montanum L. Bjærgkrognål. 7-25cm. Halvbusk. Bladene linje-spatelformede, kortere opad. Klaserne korte, forlængede til 5-15 cm i frugt. Skulperne 3-3½mm. IV-VI. A B C K

A. diffusum Ten. Skjoldkrognål. 5-15cm. Halvbusk. Bladene lancet-spatelformede, mindre opad. Klaserne kortere, 2-3cm i frugt. Skulperne lidt længere end brede, 4x3½mm. V-VII. A B C K

Berteroa incana (L.) DC. Kløvplade. Skulpen 4½-8mm med dunede, hvælvede klapper. Griflen 1½-4mm. Frøene uvingede. VI-VIII. K

B. mutabilis (Vent.) DC. Glatskulpet kløvplade. 10-50cm. Skulpen 6-12mm, m.m. glat, med hvælvede klapper. Griflen 1-2mm. Frøene vingede. V-X. B C

B. obliqua (Sm.) DC. Rødlig kløvplade. 10-50cm. Skulpen 8-12mm, dunet, med flade klapper. Griflen 1½-4mm. Frøene bredt vingede. Kronbladene efterhånden rødlige. 0-800m. V-X. A (Otranto)

Lobularia maritima (L.) Desv. Biblomme. 10-40cm. Stærktgrenet flerårig. Bladene 6-30mm, linje-lancetformede, spidse, gråfiltede som unge af midtfæstnede hår. Bægeret 1mm. Kronen 3mm, hvid. Skulpen 2½-3½x2-3mm, m.m. sølvdunet. IV-X. A B C K

Clypeola jonthlaspi L. Hængeskulpe. 2-15cm. Opstigende, grådunet, gulblomstret enårig med blade på 6-10mm. Let kendelig på de hængende, kredsrunde, vingede skulper på 2-5mm. III-IV. A B C

Draba aizoides L. Solgæslingeblomst. 2-8cm. Flerårig rosetplante. Bladene med 10-15 par børster. Blomsterne gule. Skulpen flad med en griffel på 1½-4mm. Stænglen glat. 700-2500m. V-VII. K

D. aspera Bertol. Ru gæslingeblomst. 2-4cm. Som foregående, men bladene med 8-10 par børster. Stænglen dunet. Skulpen hvælvet med en griffel på 3-3½(6)mm. 1800-2700m. VI-VII. B C K

D. muralis L. Murgæslingeblomst. 10-30cm. Oftest enstænglet enårig med grundroset. Nedre blade m.m. helrandede, øvre med 4-6 par tænder. 2mm store, hvide blomster i forlænget klase. IV-VI. ABCK

Erophila verna (L.) Chevall. Vårgæslingeblomst. I-V. A B C K

Cochlearia glastifolia L. Stor skørbugsurt. 30-200cm. Stængelbladene 3-6 x så lange som brede, helrandede og pilformede. Skulperne m.m. kugleformede, 4-5mm. Dyrket og forvildet i K. V-VI.

Camelina sativa (L.) Cr. Hundehør. 30-80cm. Enårig. Kronen gul. Skulpen omvendt ægformet. Bladene helrandede eller svagt tandede. V-VI. B

Neslia paniculata (L.) Desv. ssp thracica (Velen.) Bornm. Spids rundskulpe. 15-60cm. 2mm lange kronblade. Skulpen rund med firkantet tværsnit, et lille næb og netåret. IV-V. A B C K

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Hyrdetaske. Kronen 2-3mm, ca. 2 x bægeret, hvid. Griflen ca. 0,25mm. I-XII. A B C K

C. rubella Reuter Rødlig hyrdetaske. 10-30cm. Kronen næppe længere end bægeret, ofte rødlig, i det mindste langs kanten. Bægeret tit rødspidset. Begge 1½-2mm. III-VIII. A B C K

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. Hindeskulpe. 5-15cm. Enårig med spredte, ugrenede hår. Nedre blade oftest 1 x fjersnitdelte. Kronen lidt længere end bægeret, 1½-3mm. Skulpen 2-5mm med gennemskinnelige klapper. Mest kystnær. III-V. A B

Hymenolobus pauciflorus (Koch) Sch.& Th. Liden hindeskulpe. 2-5 cm. Som foregående, men mindre i alle dele. Stængelbladene mest hele. Kronen ca. = bægeret, 1mm. Skulpen rund til elliptisk. 500-2400m. VI-VIII. C (Pollino)

Hornungia petraea (L.) Rchb. Stenkarse. 3-15cm. Bladene fjersnitdelte. Bægeret 0,5-0,8mm. Kronen 0,7-1mm. Skulpen 2-2½x1½-2mm med tydelig ribbe på klapperne. Grenet stængel. II-V. A B C K

Ionopsidium albiflorum Durieu Bladet honningkarse. 5-15cm. Enårig med helrandede til let bugtede blade. Klaserne med store støtteblade, korte i blomst. Kronen 2mm. Skulpen 5x3mm, kølet, fint netåret ved gennemlysning. III-IV A (M.Crispignano, Ruvo)

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. Flipkrave. 8-15cm. Bladene butfligede. Ydre kronblade ca. 1½ x de indre. Skulpen 3-4mm, med synlig griffel. II-V. C?

T. coronopifolia (Bergeret) Thell. Glat flipkrave. 4-10cm. Stænglen glat med 0-3 helrandede blade. Grundbladene spidsfligede eller helrandede. Ydre kronblade ca. = de indre. Skulpen 3mm, m.m. uden griffel. II-IV. C

Thlaspi. Pengeurt.

1. Enårig ..... 2.
   Flerårig 4.
2. Stænglen trind, dens blade med hjærteformet grund perfoliatum
   " kantet, " " " pilformet grund 3.
3. Stænglen håret forneden. Skulpen smalvinget foroven alliaceum
   " helt glat. Skulpen bredvinget arvense
4. Kronbladene rødlilla ..... stylosum
   " hvide 5.
5. Griflen ikke længere end skulpehakket. Kronen ca.2½mm rivale
   " rager ud af skulpehakket. Kronen 7mm torreanum

Thlaspi arvense L. Alm. pengeurt. V-VIII. A B C K

T. alliaceum L. Løgpengeurt. 10-30cm. Med løglugt. Skulpen 6-8 mm, kun vinget foroven, omvendt ægformet. III-V. A B C K

T. perfoliatum L. Hjærtebladet pengeurt. 5-20cm. Glat og blågrøn. Spidst ægformede stængelblade. IV-VI. A B C K

T. rivale Presl Udstrakt pengeurt. 2-20cm. Den oprette hovedstængel ofte med lange, liggende eller opstigende sidegrene. Skulpen kun vinget foroven, 8x4mm. V-VI. C (Pollino)

T. torreanum Ten. (T. praecox p.p.) 5-15cm. Kan have korte udløbere. Stængelgrunden trævlet. Klasen sj. over 5cm i frugt. Skulpen bredere end lang, 4½x5mm. 800-1900m. V-VI. A B C K

T. stylosum (Ten.) Mutel Langgriflet pengeurt. 2-6cm. Lille tueplante. Bladene 8-12mm. Klasen skærmformet. Skulpen 7mm, med en griffel på 3½-4½mm. 1800-2450m. V-VI. K

Aethionema saxatile (L.) R.Br. Tandtråd. 10-20cm. Glat og blågrøn, oftest grenet flerårig med m.m. spatelformede blade. Kronen rødlighvid. Skulpen bredvinget, rundagtig, med et spidst hak foroven. 0-2200m. IV-VI. A B C K

Iberis. Sløjfeblomst.

1. Skulpen bredere end lang, uden takker ..... semperflorens
   " ikke bredere end lang, med takker foroven 2.
2. Blomster og skulper i klase. Halvbusk ..... sempervirens
   " " " " halvskærm 3.
3. Nedre stængelblade mindst 3mm brede ..... pruitii
   Bladene 1-2mm brede umbellata

Iberis semperflorens L. Vintersnepude. 30-60cm. Stedsegrøn dværg-

busk. Nedre blade 35-45x11-12mm, meget større end stængelbladene. Skulpen 6-7x11-14mm, lidt brilleformet. X-V. K (Capo Palinuro)

Iberis sempervirens L. Snepude. 8-25cm. Lille, stedsegrøn, krybende busk med urteagtige sideskud på 10-25cm. Skulpen 6-7mm, rundagtig-ægformet med et lille hak. VI-VIII. B (Pollino)

I. pruitii Tineo Køllebladet sløjfeblomst. 7-25cm. (1-)flerårig. Øvre og nedre blade først 1-2cm; de nedre siden forlængede til 30-50x4-6mm. Kronen bleglilla. 500-1900m. V-VI. A B C K

I. umbellata L. Alm. sløjfeblomst. 30-50cm. Enårig. Kronbladene mest vinrøde. Skulpen 5-10mm, dens to takker forlængede, af skulperummenes længde. 0-1300m. V-VI. C (Malaspera) K

Descurainia sophia (L.) Webb Barberforstand. VI-VII. A B K

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande Løgkarse. A B C K

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Gåsemad. III-IV. A B C K

Biscutella. Brilleskulpe.

1. Grundbladene lyreformet delte ..... 2.
   " regelmæssigt tandede til helrandede 3.
2. Enårig ..... lyrata
   Flerårig radicata
3. Enårig ..... didyma
   Flerårig 4.
4. Grundbladene mest 6-10x2-3cm, tæt lådne ..... incana
   " 2-20mm brede, dunede til stivhårede 5.
5. Grundbladene 0-1/3 delte ..... laevigata
   " 1/3-3/4 delte nicaeensis

Biscutella laevigata L. ssp. laevigata Alm. brilleskulpe. 10-45 cm. Skulpen 4-8x8-14mm. Bladene m.m. tætdunede. IV-VIII. A B C K

B. nicaeensis Jirdan Savtandet brilleskulpe. 40-50cm. Grundbladene stivhårede med 4-6 par trekantede lapper. Skulpen 6-7x11-12 mm. IV-VI. K

B. lyrata L. Lyrebladet brilleskulpe. 10-30cm. Stænglen lilla. Grundbladene med 3-5 par sideflige. Stængelbladene små og linjeformede. Skulpen 3½-5x7-10mm. 0-1500m. I-IV. A B C K

B. didyma L. Enårig brilleskulpe. 15-30cm. Stængler og skulper ofte lillaanløbne. Stænglen stivhåret forneden. Skulpen 4½-7 x 9-12½mm. 0-1500m. I-IV. A B C K

B. radicata Cosson (B. raphanifolia) Høj brilleskulpe. 40-60 (100)cm. Grundbladene med 1-3 par små sidelapper. Kronen hvidgul eller svovlgul. Skulpen 6-7x11-13mm. IV-VI. C (Reggio)

B. incana Ten. 20-60cm. Grundbladene med 4-8 par dybe tænder, de største 20x6-8cm. Nedre stængelblade 5-9cm. Skulpen 7-8x12-14 mm, ofte med lilla rand. 200-1000m. V-VI. A (væk?) C (Morano)

Lepidium. Karse.

1. Stængelbladene med øret grund ..... 2.
   " " tilsmalnet grund 3.
2. 1-2-årig. Skulpen tæt dækket af små skæl ..... campestre
   Flerårig. " håret i det mindste som ung hirtum
3. Enårig ..... 4.
   Flerårig 5.
4. Frugtstilken 1/2-3/4 x den 5-6mm lange skulpe ..... sativum
   " 1-3 x den 2-2½mm lange skulpe ruderale
5. Stængelbladene m.m. linjeformede ..... graminifolium
   " æg- til lancetformede latifolium

Lepidium campestre (L.) R.Br. Salomons lysestage. V-VI. A B C K

Lepidium hirtum (L.) Sm. ssp. nebrodense (Rafin.) Thell. Håret karse. Gråfiltet (til halvglat) flerårig med liggende stængler med opstigende klaser. Skulpen 6-8x4-5mm. IV-VI. C K

L. sativum L. Havekarse. 20-40cm. 20-40cm. Glat med blådugget stængel. Nedre blade fjersnitdelte med smalle, tandede afsnit. Dyrket og forvildet. VI-VII. B

L. ruderale L. Stinkende karse. V-VII. A K

L. latifolium L. Strandkarse. VI-VII. B K

L. graminifolium L. Græsbladet karse. 40-70cm. Nedre blade tandede til lappede, øvre m.m. linjeformede. Skulpen druekærneformet, 2-4mm. V-X. A B C K

Cardaria draba (L.) Desv. Hjærteskulpet karse. V-VII. A B C K

Coronopus squamatus (Forsskål) Asch. Ravnefod. Bladene 3-8cm, endeafsnittet 8-16x1-3mm. Skulpen 2-3x3½-4mm, rynket, nyreformet med en spids opad. III-VI. A B C K

C. didymus (L.) Sm. Liden ravnefod. 5-25cm. Bladene 1-2cm, endeafsnittet 3x1mm. Skulpen 1½x2-3mm, netåret, indsnøret midtpå og derved dobbelt kugleformet. III-V. A K

Conringia orientalis (L.) Dum. Hvidlig kålurt. 10-50cm. Enårig. Stængelbladene elliptiske med bredt øret grund. Kronen 10-13mm, gullig-eller grønlighvid. Skulpen 4-kantet. V-VI. B

Moricandia arvensis (L.) DC. Purpursennep. 30-50cm. Glat og blågrøn enårig med stærkt stængelomfattende, butte blade. Blomsterne ca. 2cm lange, rødlilla. IV-V. A C

Diplotaxis. Mursennep.

1. Kronbladene hvide, lillaårede, 7-13mm ..... erucoides
   " gule 2.
2. Kronbladene 8-14mm. Skulpen med ekstrastilk på ½-2mm
   Bladene noget smalfligede ..... tenuifolia
   Kronbladene 3-8mm. Skulpen uden ekstrastilk 3.
3. Kronbladene 3-4x1mm ..... viminea
   " 6-8x3-4mm muralis

Diplotaxis erucoides (L.) DC. Kålsennep. 10-50cm. Stænglerne sparsomt stivhårede. Nedre blade fjerdelte, øvre tandede. Skulperne 2-4½cm x 1½-2mm. I-XII. A B C K

D. viminea (L.) DC. Stinkende mursennep. 30-50cm. Glat eller svagt håret, uden stængelblade. Bladene lyreformet fjerlappede, hen ad Mursenneps. Kronen svovlgul. Skulperne 1½-2½cm. II-XI.ABCK

D. tenuifolia (L.) DC. Sandsennep. V-X. A B C K

D. muralis (L.) DC. Mursennep. V-IX. A B C K

Brassica. Kål.

1. Stængelbladene med m.m. omfattende grund ..... 2.
   " " tilsmalnet grund 5.
2. Enårig. Stænglen urteagtig ..... 3.
   Flerårig. Stængelgrunden forveddet 4.
3. Bladene blågrønne, glatte eller fåhårede ..... napus
   " grønne, stivhårede rapa
4. Nedre blade glatte eller svagt randhårede ..... rupestris
   " " dunede eller filtede incana
5. Modne skulper tiltrykte ..... nigra
   " " m.m. udstående 6.
6. Kun få og lavtsiddende stængelblade. Flerårig ..... gravinae
   Med tydeligt bladet stængel 7.
7. Bladenes endeafsnit meget større end sideafsnittene
   fruticulosa
   Bladenes endeafsnit 1-3 x sideafsnittene 8.

8. En ekstrastilk på ½-3mm mellem skulpe og bæger .... elongata
   Ingen ekstrastilk mellem skulpe og bæger tournefortii

Brassica elongata Ehrh. Sortehavskål. 50-100cm. Stænglen spredt stivhåret. Bladene med krumme børster på begge sider. VI-X. K

B. rupestris Rafin. Klippekål. 20-80(150)cm. Nedre blade lyreformede med 1-2 par sidelapper og dybt 3-5-delt endeafsnit. Stængelbladene m.m. hele. Skulpen 3½-5cm, firkantet. 200-1200m. III-IV. K (Sorrento, Napoli(Astroni), Sperlonga)

B. incana Ten. Vinget kål. 30-100cm. Grundbladene med vinget stilk, ellers helrandede til lappede. Skulperne 3½-5cm, trinde. Kalkklipper, mest ved kysten. 0-800m. III-IV. A B C K

B. napus L. Raps. III-X. Dyrket og forvildet i A B C K

B. rapa L. Agerkål. III-X. A B C K

B. fruticulosa Cyr. Lyrebladet kål. 20-60cm. Bægeret 4-5mm, opret, undertiden lillat. Kronen 8-10mm. Skulpen 1½-4cm, knudret. Nedre blade med 2-3 par butte sidelapper. I-XII. A B C K

B. tournefortii Gouan Smalfliget kål. 30-50cm. Kronbladene 5-7 mm, bleggule, ofte med lillaanløben grund. Skulpen 3-6cm med et næb på 6-15mm. Mest på sandstrand. II-V. A B C

B. nigra (L.) Koch Sort sennep. II-V. A B C K

B. gravinae Ten. Fjærnfliget kål. 10-30cm. Bladene noget kødede, noget lyreformede , bugtede til fligede. Klaserne med 25-40 blomster på 9mm. Skulpen 2-5cm, næbbet 2½-4mm. 1500-2200m. VI-VII.CK

Sinapis. Sennep.

1. Skulpens næb sværdformet sammentrykt ..... alba
   " " næppe sammentrykt 2.
2. Enårig. Den modne skulpe 2½-4cm, udstående ..... arvensis
   Flerårig. Den modne skulpe 1½-2½cm, opret pubescens

Sinapis arvensis L. Agersennep. III-V. A B C K

S. alba L. Gul sennep. III-VI. A B C K. 2 underarter:
ssp. alba: Bladene tydeligt lyreformede. Skulpen 3mm bred.
ssp. dissecta (Lag.) Bonnier: Bladene snitdelte; endeafsnittet ikke meget større end sideafsnittene. Skulpen 4-7mm bred.

S. pubescens L. Dunet sennep. 30-60cm. Stænglen tæt dunet til lådden. Bladene tiltrykt dunede. Skulpen med opret tiltrykte hår og et krumt næb på 9-12mm. I-XII. A B C K

Eruca sativa Miller Salatsennep. 20-80cm. Enårig. Kronbladene 15-20mm, hvide eller bleggule med lilla årer. Ofte stivhåret. Bladene storfliget lyreformede. II-VI. A B C K

Erucastrum virgatum (Presl) Presl Lappet svinesennep. 30-60cm. Nedre blade med 1-2 par store sidelapper og et uregelmæssigt trekantet endeafsnit på 5x4cm, svagt stivhåredepå rand og ribber. Kronen 8-11mm, bleggul. Skulpen 1½-4cm. V-VI. B (Muro) C

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.F. Bastardsennep. 10-50cm. 1-2-årig. Tæthåret. Nedre blade lyreformede til fjerfligede. Kronen 6-9mm, bleggul. Klasens blomstrende del kugleformet sammentrængt. Skulperne 8-17mm, noget tiltrykte. IV-V. A B C K

Succowia balearica (L.) Med. Morgenstjærne. 20-30cm. Enårig. Bladene 2 x delte. Skulpen 3-5mm, helt dækket af 1-3mm lange torne og med et næb på 6-9mm. II-V. K (Capri)

Cakile maritima Scop. ssp. aegyptiaca (Willd.) Nyman Strandsennep. I-XII. A B C K

Rapistrum perenne (L.) All. Flerårig knopskulpe. 30-100cm. Flerårig, tæt stivhåret forneden, glat foroven. Blomsterstilken 1-2

x bægeret. Skulpen jævnt tilsmalnet i næbbet. VI-VIII. B K

Rapistrum rugosum (L.) All. Enårig knopskulpe. 15-60cm. Enårig. Blomsterstilken kortere end bægeret. Skulperne noget tiltrykte, med ret brat afsat griffel. V-VII. A B C K. 3 underarter:
ssp. rugosum: Nedre skulpeled omtrent så langt som det øvre og kun lidt smallere.
ssp. orientale (L.) Arc.: Nedre skulpeled kort og tyndt; øvre skulpeled med rynkede ribber.
ssp. linnaeanum Rouy & Fouc.: Nedre skulpeled tyndt, det øvre m.m. jævnt. K (Ischia)

Crambe hispanica L. Enårig strandkål. 20-100cm. Enårig. Bladene med hjærteformet endeafsnit og 0-2 par små sidelapper, børstehårede. Endeafsnittet 3-7cm. Skulpen toleddet som Knopskulpes. IV. A

Calepina irregularis (Asso) Thell. Netskulpe. 20-40cm. Glat og noget blågrøn enårig. Kronbladene uens, de ydre 2mm, de indre 2½-3 mm. Skulpen 2mm, kugleformet, netåret. II-V. A B C K

Raphanus raphanistrum L. Kiddike. III-VI. A B C K. 2 underarter:
ssp. raphanistrum: Skulpens bredde 3½-5mm.
ssp. landra (Moretti) Bonnier: Skulpens bredde 5-8mm.

RESEDACEAE

Reseda. Reseda.

1. De nedre blade hele ..... 2.
   " " " fligede 3.
2. Alle blade hele. Blomsterne 4-tallige ..... luteola
   Øvre " tredelte. Blomsterne 6-tallige phyteuma
3. De nedre blade med 1-2 par sideflige ..... lutea
   " " " " 5-15 par " alba

Reseda luteola L. Farvereseda. VI-IX. A B C K

R. alba L. Hvid reseda. 10-80cm. Alle blade mangefligede. Kronen hvid. Kapslen m.m. udstående. I-XII. A B C K

R. phyteuma L. Rapunselreseda. 10-50cm. Kronen grønlighvid. Kapslen nikkende, noget pæreformet. IV-IX. A K

R. lutea L. Gul reseda. V-IX. A B C K

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L. Vandklap. Svømmende, noget blærerodsagtig vandplante med kransstillede, 1-1½cm lange blade med en 4-6 børsteformede flige og en sammenklappelig klap. VII-VIII. A (Otranto) B (Lago di Pignola) - forsvundet?

CRASSULACEAE

Crassula. Korsarve. 2-6cm høje, glatte enårige med modsatte, ofte rødlige blade. Blomsterne 3-4-tallige. 3-4 støvdragere.

C. tillaea Lester-G. Moskorsarve. Bladene ægformede, konkave, 2mm, tætsiddende og næsten taglagte. 3-tallige blomster i små grupper i bladhjørnerne. Fugtigt sand og dynd. I-V. C K

C. vaillantii (Willd.) Roth Rødblomstret korsarve. Bladene bredt linjeformede, flade, 4-6mm, ikke tætstillede. 4-tallige blomster på tynde stilke, der er længere end bladene. II-V. A B

Umbilicus. Navleblad. Flerårige planter med kødede, skjoldformede blade. Blomsterne i en lang klase med rørformet, sambladet krone.

U. erectus DC. Storblomstret navleblad. 20-60cm. Blomsterne grønliggule, 9-13mm, ca. ½ delte. Bladene mere rundagtige i det. 0-800m. IV-VI. A (Gargano ved Stignano, S.Nicandro og Vieste) B (Sila ved Pardice og ved Vallone di Spina)

U. rupester (Salisb.) Dandy Nikkende navleblad. 20-50cm. Blom-

sterne hængende, grønlige, med korte, bredt ægformede kronflige. III-VI. A B C K

Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. Udspærret navleblad. 20-50cm. Blomsterne udstående, grønlige, med korte, spidse kronflige. ABCK

Sempervivum arachnoideum L. Spindelvævshusløg. 6-12cm. Rosetterne ½-2½cm brede, m.m. dækkede af lange spindelvævshår. Blomsterne 8-10-tallige. VI-VIII. K

S. tectorum L. Alm. husløg. VI-VIII. B C K

Sedum. Stenurt.

1. Bladene flade ..... 2.
   " trinde 4.
2. Flerårig ..... maximum
   Enårig 3.
3. Bladene mest i kranse på 3-4. Blomsterne i en åben top cepaea
   " spredte. Blomsterne i kvast stellatum
4. Enårig ..... 5.
   Flerårig 10.
5. Kronen gul ..... 6.
   " ikke gul 7.
6. Kronen næppe længere end bægeret. Mest 5 støvdragere litoreum
   " 2 x bægeret. 10 støvdragere annuum
7. Planten kirteldunet, i hvert fald foroven ..... 8.
   " glat 9.
8. Blomsterne 6(-9)-tallige, med 12(-18) støvdragere hispanicum
   " 5-tallige med 5 støvdragere rubens
9. 10-12 støvdragere. Bladene noget kølleformede ..... atratum
   4-5 støvdragere. Bladene ægformede caespitosum
10. Bladene tilspidsede eller brodspidsede ..... 11.
    " butte 14.
11. Blomsterne hvidlige eller bleggule ..... 12.
    " klart gule 13.
12. Bægerbladene 5-7mm, kirteldunede ..... ochroleucum
    " 2½-4½mm, glatte sediforme
13. Skuddene med blivende, visne blade ..... tenuifolium
    De visne blade falder af reflexum
14. Blomsterne gule ..... 15.
    " hvide eller hvidlige 16.
15. Bladene valseformede, ofte i 5-6 rækker ..... sexangulare
    " ægformede, bredest forneden acre
16. Bladene ægformede, 1-1½ x så lange som brede .. dasyphyllum
    " lange 17.
17. Blomsterstanden klaseagtig ..... magellense
    " halvskærmagtig album

Sedum maximum (L.) Suter Alm. sankthansurt. VI-VIII. A B C K

S. sediforme (Jacq.) Pau Buegrenet stenurt. 20-40cm. Topgrenene stærkt buekrummede. Kronbladene 4-7mm, udstående, stråfarvede til grønlighvide. V-VII. A B C K

S. ochroleucum Chaix Bleggul stenurt. 15-30cm. Topgrenene næppe buekrummede. Kronbladene 7-10mm, oprette, grønlighvide eller flødefarvede. VI-VIII. K

S. reflexum L. (S. rupestre) Bjærgstenurt. V-VII. A B C K

S. tenuifolium (Sm.) Strobl Børstestenurt. 6-20cm. Bladene hindeagtigt udvidede forneden med en bred, trelappet, stængelomfattende grund. 0-1900m. V-VIII. B C K

S. acre L. Bidende stenurt. V-VII. A B C K

S. sexangulare L. Seksradet stenurt. V-VII. K

S. album L. Hvid stenurt. VI-VII. A B C K

Sedum dasyphyllum L. Tykbladet stenurt. 3-8cm. Ofte helt kirteldunet. Bladene blåduggede, tit modsatte, ofte 3x2½mm. A B C K

S. magellense Ten. Tyndbladet stenurt. 6-15cm. Helt glat, friskgrøn og skinnende. Bladene 4-9mm. Klasen med omtrent 15 blomster. 1400-2200m. B C K. 2 underarter:
ssp. magellense: Bladene spredte, med indsnævret grund.
ssp. olympicum (Boiss.) Lacaita: Bladene modsatte eller næsten i krans, kortstilkede.

S. cepaea L. Topstenurt. 15-30cm. Blomsterne i en lang top, der indtager det meste af stænglen, blegrøde. V-VII. A B C K

S. atratum L. Mørk stenurt. 3-10cm. Bladene 4-6mm. Bægeret rødligt med indsænkede punktkirtler. Planten ofte mørkt rødlig. BCK

S. stellatum L. Stjærnestenurt. 3-15cm. Glat. Kronen lyserød. Bladene 8-15mm, omvendt ægformede til næsten runde, med ujævn rand. 0-800m. IV-V. A B C K

S. annuum L. Liden stenurt. 3-10cm. Undertiden rødligt anløben. Bladene 6mm, affladede på begge sider. VI-VIII. C (Aspromonte)

S. litoreum Guss. Bleg stenurt. 2-10cm. Bladene 2-5mm, lidt affladede. Kronen bleggul, til sidst hvidlig. IV-V. A C K

S. rubens L. Rødlig stenurt. 5-12cm. Noget blågrøn og ofte rødlig. Kronbladene 6mm, skarpt tilspidsede, hvide. IV-VI. A B C K

S. caespitosum (Cav.) DC. Brodkronet stenurt. 2-5cm. Ofte rødlig. Bladene 5-8mm. Kronbladene 3mm, brodspidsede, hvide med lyserødt skær. 0-800m. IV-V. A B K

S. hispanicum L. Grå stenurt. 7-15cm. Bladene 7-18mm, blågrønne. Kronbladene 5-7mm, tilspidsede, hvide med lyserød åre. V-VI. ABCK

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga. Stenbræk.

1. Grundbladene tydeligt afsatte fra bladstilken ..... 2.
   " jævnt tilsmalnede i " 6.
2. 1-2 stængelblade. Kronbladene hyppigt prikkede ..... 3.
   Flere stængelblade. Kronbladene ikke " 4.
3. Grundbladene 2½-6cm brede med 11-25 takker .... rotundifolia
   " 1½-2½cm " " 5-9 takker taygetea
4. Med yngleknopper i stænglens bladhjørner ..... bulbifera
   Uden " " " " 5.
5. Kronbladene med kirtelhåret overside ..... graeca
   " " glat overside granulata
6. 1-årige uden golde skud. Bladene lappede fortil ..... 7.
   Flerårige med " " . " helrandede til tandede 8.
7. Enårig. Nedre blade visne under blomstringen tridactylites
   Toårig. " " grønne " " adscendens
8. Kronbladene røde. Grundbladene 6-15mm ..... porophylla
   " hvide 9.
9. Bladranden tiltrykt tandet ..... paniculata
   " helrandet 10.
10. Grundbladene 3-12mm, tydeligt hindekantede ..... marginata
    " 2½-9cm, ikke hindekantede lingulata

Saxifraga rotundifolia L. Rundbladet stenbræk. 15-40cm. Bladpladen rund til nyreformet, rund- til groft savtakket. Kronbladene 6-11mm, ofte gulprikkede forneden. 800-2200m. VII-VIII. A B C K

S. taygetea Boiss.& Heldr. 10-20cm. Nær foregående. Toppen med 3-12 småprikkede blomster. 1500-2000m. VI-VII. B (A.di Latronico)

S. adscendens L. Opstigende stenbræk. 3-25cm. Nær følgende, men kronen 3-5mm. 1900-2900m. VI-VIII. B C K

Saxifraga tridactylites L. Trekløftstenbræk. Kronen 2-3mm. ABCK

S. bulbifera L. Kirtlet knopstenbræk. 20-40cm. Nær følgende, men stænglen først grenet i spidsen. Kronbladene 7-10mm, med kirtelhåret overside. 0-1900m. III-V. A B C K

S. graeca Boiss. Rundlappet knoldstenbræk. 20-40cm. Med knoldformet grund og tyk stængel. Grundbladene kortstilkede med 7-9 butte lapper, kirtelhårede. 500-1000. IV-VI. A B C K

S. granulata L. Kornet stenbræk. 0-1600m. IV-VI. A B C K

S. porophylla Bertol. Italiensk stenbræk. 5-8cm. Bladene blågrønne, med kalkkirtler, helrandede, omvendt lancetformede, brodspidsede. Kvasten med 6-12 blomster. 1200-2000m. VI. B C K

S. marginata Sternb. Kantet stenbræk. 3-10cm. Grundbladene m.m. butte, randhårede i nedre ½, hindekantede i øvre halvdel. Kronbladene 10-15mm. 1000-1800m. V-VI. B C K

S. lingulata Bell. (S. callosa) Tungestenbræk. Bladene ofte med mørkerød grund. Mange blomster i en ret smal top. Kronen 6-9mm, ofte med karminrøde prikker. 1100-2500m. V-VI. B C K

S. paniculata Miller Klippestenbræk. 15-30cm. Bladene blågrønne, lancetformede, opadbøjede, bredere i øvre ½. Blomsterne i en åben top. Kronen 4-6mm, 2 x bægeret. VI-VIII. B C K

Chrysosplenium alternifolium L. Alm. milturt. Bladene spredte, med hjærteformet grund. 600-1800m. K (M.Meta)

C. dubium Gay Ægbladet milturt. Bladene modsatte, med kileformet til afrundet grund, ægformede til runde, ret glatte. III-V. 800-1500m. B C (Pollino, Sila, Aspromonte) K (Piano Laceno)

PARNASSIACEAE

Parnassia palustris L. Leverurt. VI-VIII. K

GROSSULARIACEAE

Ribes multiflorum Kit. Mangeblomstret ribs. 1-2m. Bladene ca. 10x10cm, 3-5-lappede, fint savtakkede, m.m. hårede nedenunder. Klaserne 30-50-blomstrede. Bærret rødt. 1000-1800m. A B K

PLATANACEAE

Platanus. Platan. Bladene lønagtige, men spredte.

P. orientalis L. Fliget platan. Bladene over ½ lappede, med kileformet grund. Vild i C K. Noget dyrket.

P. hybrida Brot. Alm. platan. Bladene under ½ lappede, med afskåret eller hjærteformet grund. Dyrket og forvildet i A B C K

ROSACEAE

Filipendula vulgaris Moench Knoldet mjødurt. V-VII. A B K

F. ulmaria L. Alm. mjødurt. V-VII. A B C K. 2 underarter:
ssp. ulmaria: Bladundersiden hvidfiltet. B
ssp. denudata (Presl) Hayek: Bladundersiden grøn.

1. Urteagtige skud. Frie fodflige. Oprette kronblade saxatilis
   Forveddede " . Fodfligene sammenvoksede med bladstilken 2.
2. Modne frugt rød. Bladene oftest fjersnitdelte ..... idaeus
   " " sortagtig. Bladene trekoblede eller håndelte 3.
3. Fodfligene lancetformede ..... caesius
   " linje- til trådformede 4.
4. Bladundersiden grøn ..... hirtus
   " hvid- til gråfiltet 5.
5. Hvidgule kronblade. Endesmåbladet rudeformet ..... canescens
   Hvide eller lyserøde kronblade. 6.
6. Årsskuddene blåduggede ..... ulmifolius
   " ikke blåduggede candicans

Rubus saxatilis L. Fruebær. B (Muro)

R. idaeus L. Hindbær. V-VI. A B C K

R. ulmifolius Schott Ælmebrombær. Bladoversiden glat og mørkegrøn. Kronbladene lyserøde. V-VII. A B C K

R. candicans Weihe Duskbrombær. Støvdragerne ret få. Bladoversiden glat. K A?

R. canescens DC. Kilebrombær. Bladene foddelte, ofte med stjærnehår på oversiden. V-VII. A B C K

R. hirtus W.& K. Stivhåret brombær. Årsskuddene trinde, m.m. blåduggede, med uens torne og mange kirtler. A B C K

R. caesius L. Korbær. V-VII. A B C K

Rosa. Rose.

1. Griflerne sammenvoksede til en søjle ..... 2.
   " frie 3.
2. Bladene stedsegrønne og læderagtige ..... sempervirens
   " løvfældende og urteagtige arvensis
3. Kronbladene gule ..... foetida
   " røde eller hvide 4.
4. Bægerbladene m.m. helrandede ..... 5.
   De 3 ydre bægerblade lappede eller fligede 6.
5. Stænglen tæt tyndtornet. Kronen mest hvid .. pimpinellifolia
   " mest uden torne. Kronen dybrosa pendulina
6. Bladene stift læderagtige. Kronbladene 3-4½cm ..... gallica
   " ikke stift læderagtige. Kronbladene 1-2½cm 7.
7. Bladundersiden filtet og m.m. kirtlet. Med harpikslugt ... 8.
   " glat til dunet 9.
8. Hybenstilken grådunet, ukirtlet ..... heckeliana
   " med kirtelbørster, ikke dunet villosa
9. Bladundersiden tæt kirtlet ..... 10.
   " uden eller med få kirtler 16.
10. Småbladene 7-15(20)mm, med 4-12 par tænder ..... 11.
    " større, med flere tænder 13.
11. Hybenbægeret fremadrettet og blivende ..... sicula
    " tilbagebøjet og affaldende 12.
12. Griffelmundingen under 1mm ..... serafinii
    " over 1mm viscosa
13. Bladoversiden kirtlet ..... glutinosa
    " uden kirtler 14.
14. Griflerne m.m. glatte ..... rubiginosa
    " lådne 15.
15. Småbladsgrunden kileformet. Ukirtlede bægerblade agrestis
    " afrundet. Bægerbladene kirtlede micrantha
16. Griffelåbningen over 1mm bred ..... dumalis s.l.
    " under 1mm bred 17.
17. Bladene omkring blomsterne rager ofte op over dem canina s.l.
    Bladene omkring blomsterne rager sj. op over dem pouzinii

Rosa pimpinellifolia L. Klitrose. 500-1500m. V-VII. A B C K

R. sicula Tratt. Siciliansk rose. 20-50cm. Tornene rette eller svagt krumme. Småbladene 10-16(20)mm. Hybenstilkene tit med kirtelbørster, 3-5mm. 800-1500m. V-VI. A (Gargano)

R. glutinosa S.& S. Klæbrig rose. 20-50cm. Stænglen med mange kirtelbørster mellem tornene. Hybenbægeret blivende, fremadrettet. Bladundersiden dunet. 800-1500m. V-VI. B K (Napol.)

R. viscosa Jan Glatstilket rose. 50-100cm. Tornene krumme. Småbladene 15-20mm. Hybenstilkene glatte. Hybenbægeret tilbagebøjet og affaldende. 800-1500m. V-VI. C (Sila ved Filisora, S.Barbara, Fallistro, Gennano, Neto)

Rosa serafinii Viv. Skinnende æblerose. 40-100cm. Tornene krumme. Småbladene 8-12mm, skinnende ovenpå. Bladet næsten lugtløst. Hybenstilk og bæger med kirtelbørster. V-VI. B (Marsico Vetere)

R. rubiginosa L. Æblerose. V-VI. Indtil Pollino.

R. agrestis Savi Lugtløs æblerose. 1-3m. Hybenstilk og bæger oftest glatte. Griffelmundingen under 1mm. Tornene krumme. Stængelleddene lange. Blomsterne hvide til lyserøde. V-VI. A B C K

R. micrantha Borrer Småblomstret rose. 1-3m. Bladoversiden noget skinnende. Stænglerne foroven med torne, børster og ofte kirtelbørster. V-VI. A K

R. pendulina L. Klipperose. 30-120cm. Spinkel, ofte liggende busk. Hybenet hængende, mest med kirtelbørster, æg- eller flaskeformet. 600-1800m. VI-VII. K (Salernit.)

R. villosa L. Spansk hyben. 0,5-1,5m. Fodfligenes spidser mest seglformet indadbøjede. Kvistene ikke blåduggede. Småbladene 30-50mm. Kronbladene randhårede. VI-VII. B K

R. heckeliana Tratt. Gråstilket filtrose. 30-100cm. Kvistene m.m. dunede. Fåtornet. Småbladene 15-30mm, rundagtige til ægformede. Griflerne uldhårede. 1600-1900m. VI-VII. B C K

R. dumalis s.l. Blågrøn rose. VI-VII. A (Gargano)

R. canina s.l. Hunderose. V-VII. A B C K

R. pouzinii Tratt. Rundbladet hunderose. 30-200cm. Småbladene ofte m.m. runde, med terpentinlignende lugt. Hybenstilken ofte tæt kirtelbørstet. Griflerne langt udragende. V-VI. K

R. gallica L. Sukkerrose. 30-80cm. Ofte med krumme og rette torne samt kirtelbørster. Bladene mest blågrønne ovenpå, blegere, dunede og kirtlede nedenunder. V-VI. A B C K

R. arvensis Hudson Hvid slyngrose. ½-3m. Bladene matte. Kronen hvid. Ydre bægerblade fligede. Hybenet 10-16mm, rødt. V-VII. ABCK

R. sempervirens L. Stedsegrøn rose. 1-3m. Bladene skinnende. Kronen hvid. Hybenet ca. 1cm, rødt. Bægerbladene mest helrandede. 0-100m. V-VI. A B C K

R. foetida J.Herrmann Gul rose. 1-4m. Tornene rette. Bladene mørkegrønne. Bægerbladene helrandede. V. Forvildet i A B

Agrimonia eupatoria L. Alm. agermåne. Blomsterbundens sider furede hele vejen; alle krogbørster opadrettede. VI-VII. A B C K

A. procera Wallr. Vellugtende agermåne. Blomsterbundens sider furede i øvre halvdel; de ydre krogbørster noget nedadrettede. 0-1800m. VI-VII. A B C

Aremonia agrimonioides (L.) DC. Lav agermåne. 5-20cm. En mindre agermåne med 2-3 blomster sammen i en løs kvast. Blomsterbunden uden børster. Småbladene aftager i størrelse mod grunden. ABCK

Sanguisorba officinalis L. Lægekvæsurt. 25-100cm. 3-7 par småblade på indtil 5cm. Mørkerøde kronblade. C (Pollino, Sila)

S. minor Scop. Bibernelle. VII-VIII. A B C K. 3 underarter?
ssp. verrucosa (Ehrenb.) Holmboe: Vortet bibernelle. Underbægret næppe kantet, stærkt vortet.
ssp. minor: Underbægret kantet, med netårede sider.
ssp. muricata Briq.: Vingefrøet bibernelle. Underbægret vinget, med grubet-vortede sider. Den almindelige underart.

Sarcopoterium spinosum (L.) Spach Tornbibernelle. 30-60cm. Lille tornebusk med blomsterstande som Bibernelles omend mindre. Mindre blade med 9-15 småblade på 4-6mm. III-V. A (Bari) C (Crotone)

Dryas octopetala L. Rypelyng. 8-12cm. Lav, tæppedannende dværg-

busk med aflangt ægformede, rundtakkede blade med mørk, rynket overside og hvidfiltet underside. Oftest 8 hvide kronblade. Griflen fjerhåret, forlænget i frugt. VI -VIII. K (M.Cairo)

Geum. Nellikerod.

1. Blomsterne nikkende. Bægeret rødbrunt ..... rivale
   " oprette. " grønt 2.
2. Griflen ret. Kronen kortere end bægeret, bleggul heterocarpum
   " med et hageformet knæk midtpå 3.
3. Endesmåbladet ca. = sidesmåbladene, med kilef. grund urbanum
   " større end sidesmåbladene 4.
4. Endesmåbladet rundagtigt. Blomsterne 1½cm brede ..... molle
   " ægformet. Blomsterne 2cm brede silvaticum

Geum heterocarpum Boiss.(G. micropetalum) Stjærnenellikerod. 30-50cm. Blødhåret. Grundbladene lyreformede med rundt endeafsnit med hjærteformet grund. 5-10 blomster. VI-VII. B (Muro - uddød?)

G. rivale L. Engnellikerod. VI-VII. B C K

G. silvaticum Pourret Skovnellikerod. 15-40cm. Håret. Med bladroset og små stængelblade. Endesmåbladet 3-5cm. 1-3 blomster. 15-30 frugter på 6-8mm. 0-800m. V-VI. C?

G. urbanum L. Febernellikerod. V-VII. A B C K

G. molle Vis. & Pancic Blød nellikerod. 30-40cm. Tæt, blødt dunet. Grundbladenes endesmåblad 5-6cm. Stængelbladene tredelte. Bleggule blomster, 3-5 stykker. 900-1900m. VI-VII. B C K

Potentilla. Potentil.

1. Blomsterne hvide ..... 2.
   " gule 4.
2. Grundbladene 5(7)koblede ..... caulescens
   " 3-koblede 3.
3. Stængler og blade hvidfiltede ..... apennina
   " " " grønne micrantha
4. Bladene finnede ..... anserina
   " fingrede 5.
5. Blomsterne 4-tallige ..... erecta
   " 5-tallige 6.
6. Stænglerne liggende og rodslående ..... reptans
   " ikke rodslående 7.
7. Bladundersiden hvidfiltet ..... 8.
   " ikke hvidfiltet 9.
8. Blomsterstilke og bægre tæt hvidfiltede ..... calabra
   " " " ret spredt filtede argentea
9. Blomstrende stængler sidestillede fra rosetten tabernaemontani
   Blomstrende stængler endestillede 10.
10. Stænglen både med udstående og tiltrykte hår ... detommasii
    " kun med udstående hår 11.
11. Småbladene med 7-15 par tænder ..... recta
    " " 3-8 " " hirta

Potentilla anserina L. Gåsepotentil. V-VIII. K (Avellino)

P. argentea L. Alm. sølvpotentil. VI-VIII. A (Gargano)

P. calabra Ten. Filtet sølvpotentil. 10-20cm. Som foregående, men bladoversiden grågrøn til hvidfiltet. VI-VII. B C K

P. detommasii Ten. Stjærnepotentil. 20-40cm. Stænglen opret, uden kirtelhår. Småbladene med 7-12 par tænder, uldhårede nedenunder. Kronbladene 12-14mm. 300-1200m. V-VII. A B C K

P. recta L. Rank potentil. Stænglen med kirtelhår. Kronen 6-12mm. 0-1200m. VI-VII. A B C K

Potentilla hirta L. Håret potentil. Stænglen ukirtlet, ofte rødlig. Ligner ellers foregående. 0-900m. V-VII. A B C K

P. tabernaemontani Asch. Vårpotentil. IV-IX. A B

P. erecta (L.) Räuschel Tormentil. V-VIII. A B C K

P. reptans L. Krybende potentil. V-IX. A B C K

P. caulescens L. Mangestænglet potentil. 10-30cm. Grundbladssmåbladene 10-30mm, med få, sammenbøjede tænder fortil og tiltrykt silkehåret og kirtlet underside. 500-2000m. VI-IX. B C K

P. apennina Ten. Apenninerpotentil. 5-15cm. Småbladene 7-15x3-6 mm, med ofte tretandet spids. Stængelgrunden med sortagtige bladrester. Kronbladene spatelformede, 8-10mm. VII-VIII. K (Meta)

P. micrantha Ramond Fyrrepotentil. 5-10cm. Småbladene mest 15-30 x 10-20mm, med 7-11 par tænder. Bægeret rødt indvendigt. 0-1500m. I-V. A B C K

Fragaria vesca L. Skovjordbær. Kvastens underste støtteblade over 8x3mm. Frugtbægeret tilbagebøjet. IV-VI. A B C K

F. viridis Duchesns Bakkejordbær. Kvastens underste støtteblade 3-8x½-2mm. Bægeret tiltrykt frugten. V-VI. A B C K

Alchemilla. Løvefod.

1. Bladene delte næsten til grunden ..... nitida
   " under 1/2 delte 2.
2. Planten glat, efterhånden rødlig ..... sinuata
   Stængler og bladstilke hårede 3.
3. Bladoversider og blomsterstilke glatte ..... xanthochlora
   " " " hårede glaucescens

Alchemilla nitida Buser B K. (A. nitida angives ikke fra Mellem- og Syditalien i Hegi fra 1990, hvilket nok vil sige, at planterne her nu nok er udskilte som en særlig art).

A. glaucescens Wallr. Blågrøn løvefod. B (Serra della Ciavole)

A. xanthochlora Rothm. Gulgrøn løvefod. B C (Pollino, Sila)

A. sinuata Buser B (M. Papa)

Aphanes arvensis L. Alm. dværgløvefod. Grågrøn. Fodfligenes tænder lidt længere end brede. Bægerbladene lidt udstående. A B C K

A. australis Rydb. (A. microcarpa) Småfrugtet dværgløvefod. Gulgrøn. Fodfligenes tænder 2-3 x så lange som brede. Bægerbladene sammenknebne. IV-V. A B C

A. floribunda (Murb.) Rothm. Opret dværgløvefod. 2-15cm. Stænglerne oprette. Øvre blade siddende. Fodfligene skededannende og sammenvoksede med bladgrunden. IV-V. C (Spartivento)

Cydonia oblonga Miller Kvæde. 1½-5m. Busk med ægformede, helrandede blade med filtet underside. Lyserød blomst. Frugten 2½-3½cm, æble- eller pæreformet, gul og filtet. Dyrket og forvildet. IV-V.

Pyrus pyraster Burgsd. Vild pære. IV-V. A B C K

P. amygdaliformis Vill. (P. spinosa) Mandelpære. 1-6(20)m. Bladene m.m. lancetformede, 2½-5x1-2cm, svagt hårede som unge. Unge kviste hvidfiltede. Grenene stundom tornede. Frugten 1½-3cm, gulbrun og mest rund. 0-1100m. IV-V. A B C K

Malus florentina (Zucc.) Schneider Rønneabild. 1-4m. Kvistene m.m. hårede. Bladene indtil 5x3½cm, bredt ægformede, med 4-6 par spidse, ofte savtakkede lapper, indtil 1/3 dybe; med ofte hjærteformet grund, grågrønne og noget hårede nedenunder. Frugten indtil 1½cm, rund til aflang, rød eller gul. 300-1200m. V. B (Balvano, Bella, Pignola) K (Napol.)

Malus silvestris Miller Skovæble. Modne bladundersider glatte. IV-V. A B C K

M. domestica Borkh. Sødæble. Modne bladundersider filtede. Forv.

Sorbus. Røn.

1. Bladene fjersnitdelte ..... 2.
   " hele til lappede 3.
2. Vinterknopperne rødbrune, klæbrige. Barken ru .... domestica
   " sorte, ej " . Jævn bark aucuparia
3. Spidslappede blade med grøn underside ..... torminalis
   U- eller svagtlappede blade med hvid/gråfiltet underside 4.
4. Bladene ofte bredest på eller under midten ..... aria
   " " " over midten graeca

Sorbus domestica L. Storfrugtet røn. 8-15m. Bladene som hos følgende. Fåblomstret halvskærm. Frugterne 1½-3cm, kirsebærstore, pæreformede, grøn- eller brunlige. 5 grifler. IV-V. A B C K

S. aucuparia L. Alm. røn. 3-4 grifler. V-VI. A B C K. 2 ssp.:
ssp. aucuparia: Halvskærmsaksen dunet. Frugten m.m. kugleformet.
ssp. glabrata (Wimmer & Grab.) Caj.: Halvskærmsaksen glat. Frugten ægformet. ?

S. torminalis (L.) Cr. Tarmvridrøn. IV-V. A B C K

S. aria (L.) Cr. Sydlig akselrøn. 3-20 m. Bladene med 10-14 par ribber, med afrundet grund. Bærret længere end bredt, med mange små prikker. 0-1200m. V-VI. A B C K

S. graeca (Spach) Kotschy Læderrøn. 3-6m. Bladet med 9-11 par ribber og kileformet grund. Bærret rundt med få, store prikker, karmoisinrødt. 0-1400m. V-VI. B C K

Amelanchier ovalis Med. Europæisk bærmispel. 1-3m. Busk med sorte grene og savtakkede, ægformede blade med afrundede ender og uldhåret underside som ung. Kronbladene smalle og hvide, hårede udvendigt. Blåsort bær. 0-1200m. IV-V. A B C K. 2 underarter:
ssp. ovalis: Frugten helt glat om sommeren. Bægeret og blomsterstilken glatte. Bladet med (8)9-13 par sideribber.
ssp. cretica (Willd.) Pign.: Frugten om sommeren hvidulden ved stilk og bægergrund. Bladet med 6-8 ribbepar. Pollino

Cotoneaster integerrimus Med Rød dværgmispel. ½-1½m. Blomsterstilke og bægerblade glatte. Bladene 1½-4cm. Kvastene med 1-5 blomster. VI-VII. B C K

C. nebrodensis (Guss.) C.Koch Filtet dværgmispel. 1-2(3)m. Blomsterstilke, bægerblade og frugt tæt filtede. Bladene 2-5cm. Kvastene med 3-12 blomster. 500-1600m. IV-V. A B C K

Pyracantha coccinea M.J.Roemer Ildtorn. ½-2m. Stærkttornet busk. Bladene stedsegrønne, omvendt lancetformede, 2-4cm, skinnende ovenpå, helrandede til fåtandede. Røde bær. IV-V. A B C K

Mespilus germanica L. Mispel. 2-6m. Busk med slanke, oftest oprette grene og næsten sort bark. Bladene 5-12cm, lancet- til omvendt ægformede, savtakkede, hvidfiltede nedenunder som unge. Hvide blomster. Frugten 2-3cm, brun. V-VI. Forvildet i A B C K

Crataegus oxyacantha L. Alm. hvidtjørn. 2-3 grifler. A B C K

C. monogyna Jacq. Engriflet hvidtjørn. IV-V. A B C K. 2 ssp.:
ssp. monogyna: Unge kviste og blade glatte til fåhårede.
ssp. azarella (Griseb.) Franco: Unge kviste og blade tætdunede.

Prunus.

1. Frugtknude og frugt hårede ..... 2.
   " " " glatte 5.
2. Bladene 0,8-1,4 x så lange som brede ..... armeniaca
   " 2-4 x så lange som brede 3.

3. Bladene 6-9mm brede. Frugten 20-25mm ..... webbii
" 12-40mm brede. Frugten mindst 35mm 4.
4. Bladet bredest foroven ..... persica
" " forneden dulcis
5. Bladene stedsegrønne, læderagtige ..... laurocerasus
" løvfældende, ikke læderagtige 6.
6. Bladene 0,8-1,4 x så lange som brede ..... mahaleb
" 2-4 x så lange som brede 7.
7. Bladstilken med 2 kirtler foroven. Bladet 8-15cm ..... avium
" uden " " 8.
8. Bladene 2-4cm ..... 9.
" 4-12cm 10.
9. Uden torne ..... cocomilia
Med " spinosa
10. Unge kviste tæt dunede ..... insititia
" " m.m. glatte 11.
11. Bladene 6-12cm, oversiden skinnende ..... cerasus
" 6-8cm, " mat domestica

Prunus persica (L.) Batsch Fersken. Kantede, rødlige kviste. Bladene noget brunliggrønne. IV-V. Dyrket og lidt forvildet.

P. dulcis (Miller) Webb Mandel. Bladene lancetformede, glatte. Barken brungrå. Vildformerne tornede. II-III. Dyrket og sj. forv.

P. webbii (Spach) Vierh. Rødblomstret mandel. 1-3m. Grenene udspærrede og tornede. Bladene 20-35x6-9mm. Kronbladene stærkt lyserøde. 0-600m. II-III. A (S.Severo, Apricena)

P. armeniaca L. Abrikos. Unge blade og kviste rødlige. Bladgrunden afskåret eller lidt hjærteformet. III-V. Dyrket. Næppe forv.

P. spinosa L. Slåen. 0-1500m. III-IV. A B C K

P. domestica L. Blomme. III-IV. Dyrket og lidt forvildet.

P. insititia L. Kræge. III-IV. Dyrket og forvildet.

P. cocomilia Ten. Bjærgblomme. 2-5m. Helt glat. Bladene elliptiske-omvendt ægformede. Frugten 12-40mm, aflang, gul med rødligt skær. 800-1500m. A (M.di Bagnoli) B C (Sila)

P. avium L. Fuglekirsebær. IV-V. A B C K

P. cerasus L. Surkirsebær. IV-V. Dyrket og forvildet.

P. mahaleb L. Klippekirsebær. 2-6m. Bladene bredt ægformede, næsten med hjærteformet grund, tilspidsede, finttakkede, lidt læderagtige. 3-7 blomster i en kort klase. Sort bær. IV-V. A B C K

P. laurocerasus L. Lavrbærkirsebær. 2-8m. Bladene 8-15x3-4cm, mandellugtende ved gnidning, svagttandede. Oprette klaser på 8-12 cm. Sorte, pæreformede bær på 8-12mm. IV-V. Dyrket, sj. forv.

LEGUMINOSAE

1. I det mindste nogle blade finnede eller fingrede. (Hertil arter med store, småbladslignende fodflige ..... 2.
Bladene enkle eller trekoblede 33.
2. Bladene ligefinnede ..... 3.
" uligefinnede 9.
3. Nogle blade dobbelt ligefinnede. Træer ..... Acacia
Alle blade enkelt ligefinnede 4.
4. Træ. Grønlige, kronløse blomster i klase ..... Ceratonia
Urter 5.
5. Stænglen vinget eller bladene ligestrengede ..... Lathyrus
" uvinget og bladene fjerstrengede 6.
6. Alle bægertænder mindst 2 x bægerrøret ..... Lens
Mindst 2 bægertænder kortere 7.
7. Akselbladene meget større end småbladene ..... Pisum
" ikke " " " 8.

8. Griflen kun dunet på oversiden ..... Lathyrus
" anderledes dunet eller glat Vicia
9. Bladene fingrede eller næsten fingrede ..... 10.
" uligefinnede 11.
10. Blomsterne i ende- og akselstillede hoveder ..... Dorycnium
" i endestillede klaser Lupinus
11. Blomsterstilkene udgår m.m. fra samme punkt ..... 12.
Blomsterne enlige, i klaser eller tætte toppe 22.
12. Bælgen en ledbælg ..... 13.
" ikke leddelt 15.
13. Bælgen stærkt netåret. Kølen but ..... Ornithopus
" ikke " . " spids 14.
14. Bælgen med ensidige, dybe indskæringer ..... Hippocrepis
" lidet indskåren, m.m. symmetrisk Coronilla
15. Bælgen med 2-4 længdevinger ..... Tetragonolobus
" uden " 16.
16. Kølen med et næb ..... 17.
" uden noget næb 19.
17. 4-7 par småblade ..... Securigera
2-3 " " 18.
18. Nedre blade udelte. Skulpen kredsformet ..... Hymenocarpus
Alle blade finnede. " aflang til linjeformet Lotus
19. Nogle af hovederne endestillede ..... Anthyllis
Alle hoveder sidestillede 20.
20. Kølen stærkt mørkerød eller sort ..... Dorycnium
" ikke " " " 21.
21. Kølen med en brod fortil ..... Oxytropis
" uden brod Astragalus
22. Bælgen leddelt ..... 23.
" ikke leddelt 24.
23. Blomsterne enlige i bladhjørnerne ..... Hippocrepis
" i klaser Hedysarum
24. Bælgen med tandet rand eller tandede sider ..... 25.
" uden tænder 26.
25. Bælgen aflang og flad, savtakket på begge sider Biserrula
" kort, næsten skiveformet Onobrychis
26. Planten m.m. kirtlet ..... 27.
" ikke " 28.
27. Småbladenes sideribber når ikke bladranden .... Glycyrrhiza
" " " bladranden Cicer
28. Træ eller busk ..... 29.
Urter 30.
29. Træ. Kronen hvid. Ofte med akseltorne ..... Robinia
Busk. Gul krone. Ikke tornet Colutea
30. Kølen med et næb eller en brod fortil ..... 31.
" uden " " brod 32.
31. 4-7 par småblade. Kølen med en brod fortil ..... Oxytropis
5 småblade. Kølen med et næb fortil Lotus
32. Alle støvdragere sammenvoksede. Hvidblå krone ..... Galega
Øverste støvdrager helt fri Astragalus
33. Sideribberne løber lige ud i den ofte tandede bladrand 34.
" når ikke bladranden 40.
34. Alle støvdragere sammenvoksede. Ofte kirteldunet ... Ononis
1 fri og 9 sammenvoksede støvdragere 35.
35. Bælgen skruesnoet ..... Medicago
" højst seglkrummet 36.
36. Den visne krone bliver siddende om bælgen ..... Trifolium
" " " falder af 37.
37. Bælgen kort, æg- til nyreformet ..... 38.
" lang, ret eller krum 39.
38. Bælgen ægformet eller rund. Planten m.m. glat ... Melilotus
" nyreformet. Planten dunet Medicago lupulina
39. Flerårig ..... Medicago falcata
Enårig Trigonella

40. Urter uden forveddet grund ..... 41.
    Træer, buske eller urter med forveddet grund 45.
41. Med trekoblede blade ..... 42.
    Alle blade hele 44.
42. Blå eller hvide blomster. Kirtelprikkede blade ... Psoralea
    Gule eller røde " 43.
43. Småbladene uens. Bælgen leddelt, uvinget ..... Coronilla
    " ens. " med 2-4 vinger Tetragonolobus
44. Karminrøde blomster. Græsagtige blade Lathyrus nissolia
    Gule blomster Scorpiurus
45. Træ med mimoseblomster med talrige støvdragere ..... Acacia
    Ærteblomster med 10 støvdragere 46.
46. Træ med lyserøde blomster og runde blade på 7-12cm Cercis
    Blomsterne gule 47.
47. Tornede buske ..... 48.
    Ikke tornede 51.
48. Bægeret lige afskåret. 3 småblade ..... Calicotome
    " tandet eller tolæbet 49.
49. Bægeret med korte, ens tænder ..... Anthyllis hermanniae
    " tolæbet 50.
50. Bægeret delt til grunden. Ingen blade ..... Ulex
    " tolæbet. Med blade 61.
51. Blomsterne i 10-40cm lange, hængende klaser ..... Laburnum
    " ikke i hængende klaser 52.
52. Kvistene meget bredt tvevingede og flade ... Chamaespartium
    " ikke tvevingede eller flade 53.
53. Bægeret kløvet til grunden foroven. Enkle blade .. Spartium
    " ikke kløvet til grunden 54.
54. Bælgene 10-20x1½-2cm. Kort fane ..... Anagyris
    " meget mindre 55.
55. Bælgene med store, knudrede kirtler ..... Adenocarpus
    " uden sådanne kirtler 56.
56. Bægerets overlæbe dybt kløvet ..... 57.
    " " kort tvetandet 59.
57. Bægerrøret tydeligt kortere end læberne ..... Argyrolobium
    " mindst lig læberne 58.
58. Bladene med 1 småblad, eller med 3 og affaldende .. Genista
    " blivende med 3 småblade Teline
59. Bægeret rørformet ..... Chamaecytisus
    " klokkeformet 60.
60. Blomsterne i bladløse, hårede klaser ..... Lembotropis
    Klaserne bladede - eller bladløse og glatte Cytisus
61. Bægeret rørformet, overlæben kort tvetandet Chamaecytisus
    " klokkeformet, overlæben dybt kløvet Genista

Ceratonia siliqua L. Johannesbrødtræ. 1-8m. Stedsegrøn. 2-5 par ligefinnede, elliptiske til næsten runde, læderagtige småblade med skinnende mørkegrøn overside og lys underside. Bælgene brune, affladede, 10-15x2cm. 0-400m. IX-XI. A B C K

Acacia. Akacie. Blomsterne gule eller hvide med talrige støvdragere i aks eller kugleformede hoveder og ligner da mimosernes. Plantede arter. Medtages kun i nøglen.

1. Bladene dobbelt ligefinnede ..... 2.
   " hele og helrandede 5.
2. Løvfældende med akseltorne. 2-8 par 1.ordens finner ..... 3.
   Stedsegrønne uden torne. 8-20 par 1.ordens finner 4.
3. Småbladene 3-5mm. Akseltornene 1-2½cm ..... farnesiana
   " 6-10mm. " 3-6(10)cm karoo
4. Unge kviste hvidfiltede. Småbladene 3-4mm ..... dealbata
   " " gulfiltede. " 2mm mearnsii
5. Blomsterne i aks. Busk ..... longifolia
   " i hoveder. Træer 6.

6. Unge kviste dunede. Bladene 3-5-strengede ..... melanoxylon
" " glatte. " 1-strengede 7.
7. Bladene seglformede. Klaserne med 10-20 hoveder .. pycnantha
" rette eller lidt krumme. Klaserne med 2-10 hoveder 8.
8. Hovederne 10-15mm brede. Bælgen med indsnøringer cyanophylla
" 4-6mm brede. Bælgen næppe indsnøret retinodes

Anagyris foetida L. Stinktræ. 1-4m. Stinkende busk. Småbladene 1-4cm. Kronen gul, 18-25mm. Fanen ca. ½ x køl og vinger, ofte med en sort plet. Fodfligene sammenvoksede. 0-1100m. II-IV. A B C k

Laburnum anagyroides Med. Alm. guldregn. 1-6m. Kvistene tiltrykt dunede og grågrønne. Bælgens dunet som ung, dens øvre søm spids og uvinget. 0-800m. V-VI. A B C K

L. alpinum (Miller) Berc.& Presl Alpeguldregn. 1-6m. Kvistene glatte og grønne. Bælgen glat, dens øvre søm med en 1-2mm bred vinge. 500-1600m. V-VII. B C K

Calicotome. Bægergyvel. Stærkt tornede buske med 3-koblede blade og gule blomster. Let kendelige på det lige afskårne bæger.

C. spinosa (L.) Link Tornet bægergyvel. 1½-3m. Blomsterne mest enlige. Bladoversiden og bælgen m.m. glatte. IV-V. A B K

C. villosa (Poiret) Link Håret bægergyvel. 1½-3m. Blomsterne 2-15 sammen. Bladoversider og bælge m.m. lådne. IV-V. A B C K

Lembotropis nigricans (L.) Griseb. Sort gyvel. 50-120cm. Trinde kviste. Trekoblede småblade på 1-3 cm. Planten opret. Fanen 7-10 mm. Bladstilkene 10-13mm. 0-1400m. VI-VII. B (Castelgrande)

Cytisus. Gyvel.

1. Blomsterne i bladløse klaser ..... sessilifolius
" i bladede " 2.
2. Bladene mest med 1 småblad. Udstående-hårede kviste decumbens
" " " 3 småblade. Glatte til dunede kviste 3.
3. Bægeret glat. Kvistene spidskantede scoparius
" låddent. Kvistene butkantede til trinde villosus

Cytisus sessilifolius L. Spadergyvel. 1-2m. Grenene mørkebrune og trinde, glatte. Bladene trekobledeog kortstilkede. Småbladene 1-2cm. Kronen 10-11mm. Klaserne med 3-12 blomster. V-VI. B C K

C. decumbens (Durande) Spach Nedliggende gyvel. 10-30cm. Liggende til opstigende. Bladene i knipper forneden. Småbladene 1-2cm. Blomsterne 1-3 sammen. Fanen 10-14mm. IV-V. A B C K

C. villosus Pourret Bladgyvel. 1-2m. Opret. Kvistene dunede mod spidsen. Småbladene 1½-3cm, det midterste størst, dunede nedenunder. Fanen stærkt tilbagebøjet. 0-1000m. II-IV. A B C K

C. scoparius (L.) Link Alm. gyvel. 0-1400m. V-VI. B C K

Chamaecytisus. Gedekløver. 3 småblade.

1. Gamle grenender tornagtige ..... spinescens
Ikke tornet 2.
2. Blomsterne i hoveder med et svøb af blade under sig supinus
" i bladede klaser 3.
3. Grenene mest opstigende/oprette. Bælgen m.m. håret hirsutus
" udstrakte. Bælgen lådden polytrichus

Chamaecytisus spinescens (C.Presl) Rothm. Tornet gedekløver. 20-40cm. Unge kviste tiltrykt hviddunede. Småbladene 3-11x1-3mm. Blomsterne 1-2 sammen. Bælgen kun dunet langs sømmene. IV-V.ABCK

C. hirsutus (L.) Link Håret gedekløver. 20-100cm. Grenene udstående dunede eller hårede. Småbladene 6-20x4-10mm, undersiden dunet til håret. Fanen med eller uden brune pletter. V-VI.

C. polytrichus (Bieb.) Rothm. Udstrakt gedekløver. 10-25cm. Fa-

nen brunplettet. Bladene mest udstående hårede på begge sider. Unge kviste langt udstående hårede. V-VI.

Chamaecytisus supinus (L.) Link Hovedgedekløver. 20-60cm. Grenene oprette eller opstigende. Småbladene 15-35mm, glatte til svagt hårede ovenpå. Hovederne med 2-8 blomster. Fanen ofte brunplettet.

Cercis siliquastrum L. Judastræ. 3-8m. Træ med afrundet hjærteformede blade. Blomsterne kommer frem før bladene og sidder lige på stammen i tætte knipper. III-IV. A B C K

Teline monspessulana (L.) C.Koch Bredbladet krusbælg. ½-2m. Småbladene 8-20mm, hårede på begge sider. Blomsterne 3-9 sammen i bladhjørnerne. Bælgen dunet, 2cm. IV-V. A C K

Genista. Visse.

1. Med torne. 1 småblad ..... 2.
   Uden " 3.
2. Bladundersiden dunet. Bladet 10-20x2-3mm ..... silvestris
   Bladene glatte, 4-10x2-3mm anglica
3. Bladene trekoblede, affaldende. Risagtig busk .. ephedroides
   " enkle, blivende 4.
4. Grenene trekantede og smalt trevingede ..... januensis
   " m.m. trinde, uvingede 5.
5. Køl og fane tæt silkehårede ..... sericea
   " " " glatte tinctoria

Genista tinctoria L. Farvevisse. 0-1800m. V-VII. 2 underarter:
ssp. ovata (W.& K.) Arc.: Bægeret tæt rusthåret. Bladene tæt dunede. B C
ssp. tinctoria: Bægeret glat. Bladene spredt hårede. A B K

G. januensis Viv. Trekantsvisse. 10-50cm. Glat. Golde skuds blade indtil 30x5mm, blomstrende skuds 5-12x2-4mm, alle med klar, smal, svagt finttandet rand. Kronen 9-10mm. 0-900m. IV-V. A K

G. sericea Wulfen Silkehåret visse. 80-120cm. Bladene mest 12-16 mm, butte. Blomsterne i endestillede knipper på 2-5. V-VI. C

G. anglica L. Engelsk visse. IV-V. C (Sila, Aspromonte)

G. silvestris Scop. ssp. dalmatica (Bartl.) Lindb. Grenvisse. 20-50cm. Udstrakt og blødtornet. Lange, endestillede klaser. Bægeret 5-7mm. Fanen 7-8mm. V-VI. A (Gargano)

G. ephedroides DC. Ledrisagtig visse. 30-70cm. Småbladene 4-15 x 2-3mm. Blomsterne i løse klaser, 8-10mm. 0-600m. V-VI. K (Marina di Ascea og M.di Pisciotta ved Salerno)

Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs Nedliggende vingevisse. 10-25cm. Krybende med opstigende, leddede, noget læderagtige kviste. Tætte, endestillede klaser. 300-1600m. VI-VII. B C K

Spartium junceum L. Spansk gyvel. 1-3m. Grøn, risformet busk med enkle, affaldende blade. Blomsterne 2-2½cm, i løse, mangeblomstrede klaser. 0-600m. V-VI. A B C K

Ulex europaeus L. Alm. tornblad. 0-1000m. II-V. A B C K

Adenocarpus complicatus (L.) Gay Kirtelbælg. 40-100cm. Busk med lysegrå bark. Bladene trekoblede, 7-15mm, svagt dunede. Ca. 1cm store, orangegule blomster i åbne klaser. V-VI. C. 2 underarter:
ssp. complicatus: Bægeret tæt kirteldunet. Sila.
ssp. commutatus (Guss.) Cout.: Bægeret m.m. håret, uden kirtler.

Argyrolobium zanonii (Turra) Ball Sølvbælg. 8-25cm. Stængler og bladundersider tæt tiltrykt sølvhårede. Stænglerne udstrakte. Blomsterne 9-12mm, endestillede, 1-3 sammen. V-VI. A C K

Lupinus. Lupin.

1. Kronen gul ..... luteus
   " hvid eller blå 2.
2. Bægerets overlæbe svagt tvetandet ..... albus
   " " tvekløvet 3.
3. Kronen 15-17mm. Bælgen 13-20mm bred ..... varius
   " 10-14mm. " højst 12mm bred 4.
4. Småbladene linjeformede, 2-5mm brede ..... angustifolius
   " omvendt ægformede, 5-15mm brede micranthus

Lupinus luteus L. Gul lupin. IV-V. A C K

L. angustifolius L. Smalbladet lupin. Klasens blomster spredte. Kronen mest lyseblå. IV-V. 2 underarter:
ssp. angustifolius: 50-80cm. Småbladene 3-4cm x 4-5mm. A C K
ssp. reticulatus (Desv.) Cout.: 20-40cm. Småbladene 10-20x2mm. B

L. albus L. Hvid lupin. -120cm. Kronen hvid. Kølen med lyseblå spids. IV-V. Dyrket og alm. forvildet.

L. varius L. Spraglet lupin. 40-70cm. Kronen blå. Fanen med en hvid, gul eller lyslilla plet. III-IV. A C

L. micranthus Guss. Håret lupin. 10-40cm. Brunhåret. Kronen blå, fanen hvid midtpå, kølen mørkspidset. Nedre blomster spredte, øvre uregelmæssigt kransstillede. IV-V. A B C K

Robinia pesudacacia L. Uægte akacie.

Galega officinalis L. Lægestregbælg. 40-150cm. Flerårig med talrige, oprette, mest ugrenede stængler. Hvide til blegblå blomster i langstilkede klaser fra bladhjørnerne. Bælgen 2-5cm, trind og indsnøret mellem frøene. V-VII. A B C K

Colutea arborescens L. Blærebælg. 1-4m. 4-6 par småblade. 4-8-blomstrede klaser i bladhjørnerne. Kronen 13-17mm. Bælgen 5-7x3 cm, oppustet, papirsagtig og noget gennemskinnelig. V-VII. A B C K

Astragalus. Astragel.

1. Enårig ..... 2.
   Flerårig 6.
2. Kronen rødlilla. Klasen med 10-15 blomster ..... echinatus
   " gul, gullig eller blåliggul 3.
3. Klaserne meget kortstilkede ..... 4.
   Klasestilken mindst 3cm 5.
4. Fanen 8-9mm. Kronen blåliggul til gul ..... sesameus
   " 3mm. Kronen gul epiglottis
5. Fanen 7-9mm. Planten liggende. Bælgen seglkrummet .. hamosus
   " 12-14mm. Planten opret. Bælgen aflang boeticus
6. Bladene ligefinnede. Bladskaftet ender i en torn ..... 7.
   " uligefinnede. " ikke tornagtigt 9.
7. Kronen gullig. Bægertænderne 1/4-1/3 x røret ..... sirinicus
   " ikke gullig. Bægertænderne = bægerrøret 8.
8. Klaserne kortstilkede. Bægeret ikke skjult af sine hår sempervirens
   Klaserne m.m. siddende. Bægeret skjult af sine hår calabrus
9. Kronen gul ..... glycyphyllos
   " af anden farve 10.
10. Med stængelblade. Kronen rødlilla ..... purpureus
    Alle blade grundstillede 11.
11. Bægeret 9-15mm. Kronen grumset rosenrød .... monspessulanus
    " 4-6mm. Kronen hvid til blålilla depressus

Astragalus boeticus L. Kaffeastragel. 10-50cm. Bladene 5-20cm med 10-15 par småblade. Kronen gul. Bælgen 2-4cm x 7-8mm, med et kroget næb. Planten opret. III-IV. K (Capri)

A. sesameus L. Sesamastragel. 10-40cm. Liggende til opstigende. Bladene 3-4cm med 6-9 par småblade. Hoveder på 5-10 blomster i bladhjørnerne. Bælgene oprette, 10-13x3mm. IV-V. A B C K

Astragalus echinatus Murray Skælhåret astragel. 10-50cm. Stænger og bladundersider udstående hårede. Langstilkede klaser. Bælgen ægformet, med krumt næb, skæl og knuder. IV-V. C (Reggio) K

A. epiglottis L. Hjærteastragel. 5-25cm. Liggende til opstigende med midtfæstnede hår. Bælgen ægformet-trekantet. III-IV. C K

A. hamosus L. Krogastragel. 10-40cm. Bælgen 20-50x2-3mm. Hårene midtfæstnede. Kronen bleggul. III-V. A B C K

A. purpureus Lam. ssp. gremlii A.& Gr. Purpurastragel. 10-40cm. 7-15 par småblade. Klasestilken 1-2 x bladene. Klasen rund. Bægeret 8-10mm. Kronen ca. 18mm. 600-1800m. C (Pollino)

A. depressus L. Lav astragel. 1-5cm. Bladene 2-30cm med 6-14 par småblade. Klasestilkene 1-6cm med 6-14 blomster på 10-12mm. 700-2400m. VI-VII. B C K

A. glycyphyllos L. Sød astragel. V-VII. A B C K

A. calabrus (Ten.) Fiori (A. parnassi ssp. c.) 20-40cm. Småbladene 5-10x1-3mm, spredt hårede nedenunder og ved grunden. Kronen 18-24mm, kødfarvet rødlig. VI-VII. C (Sila, Aspromonte (Montalto))

A. sirinicus Ten. Gult ræveskæg. 30-40cm. Tornene bløde. Bladene 5-8cm, sølvgrønne, med 7-9 par småblade på 7-10x2-3mm; endesmåbladet ofte blivende. Klasen tæt, 2-3cm. VI-VII. B C K

A. sempervirens Lam. ssp. gussonei Pign. Stedsegrøn astragel. 20-40cm. Behåringen meget tæt; bladene hviduldne, senere grågrønne, 3-4cm, med 8-10 par småblade på 7-9x1-1½mm. V-VII. B K

A. monspessulanus L. Fransk astragel. 10-25cm. Med midtfæstnede hår. Bladene 7-20cm med 10-20 par småblade. Bægeret rødligt. Kronen 20-26mm. Bælgen 20-26x6mm. 500-1400m. V-VI. A B C K

Oxytropis caputoi Moraldo & La Valva (A. pilosa p.p.) Sorthåret spidsbælg. 5-20cm. Stænglerne udstående hårede. Blomsterne lysegule, 12-14mm, i langstilkede klaser. Bælgen 17-26mm. Bægeret overvejende sorthåret. 900-2200m. VI-VII. K (M.Picentini)

Biserrula pelecinus L. Savbælg. 10-40cm. Enårig. 7-15 par småblade. 3-9-blomstrede klaser med blå eller blåspidset bleggule blomster på 4-6mm. Bælgen 25x5mm. IV-V. A C K

Glycyrrhiza. Lakridsplante. Flerårige. Kronen bleglilla.

G. glabra L. Lakridsplante. 50-100cm. Kronen 8-12mm. Klasen forlænget i frugt. Bælgen 15-30mm, glat eller kirtelbørstet. A B C K

G. echinata L. Pigget lakrids. 50-150cm. Kronen 4-6mm. Klasen hovedformet i frugt. Bælgen 12-16mm, spidst ægformet, m.m. tæt kirtelbørstet. VI-VII. A B

Psoralea bituminosa L. Tjærekløver. 20-50cm. Opret flerårig med langstilkede blade (3-8cm). Blålilla blomster i ægformede, langstilkede hoveder. Planten tjærelugtende. V-VI. A B C K

P. americana L. Hvid tjærekløver. 20-80cm. Småbladene 3-4cm, brede, med tandet rand. Hvide blomster på 8mm i lange, langstilkede klaser. Kølen ofte lillaspidset. III-VI. A (Barletta)

Cicer arietinum L. Kikært. 20-50cm. Opret, klæbrig enårig. 3-8 par kraftigt tandede småblade. Enlige, blegblå eller hvide blomster. Bælgen 2-3x1-1½cm. VI-VIII. Dyrket og forvildet.

Vicia. Vikke.

1. Klasen kortstilket, stilken kortere end 1 blomsts længde 2.
   " langstilket, " længere " " " " 13.
2. Alle blade uden slyngtråd. Kronen hvid med mørke vinger faba
   Øvre " med " 3.

3. Fanen dunet. Kronen bleggul til rødlilla ..... hybrida
" glat 4.
4. Bægeret skævt afskåret eller bægertænderne uens ..... 5.
" lige " og bægertænderne m.m. ens 9.
5. Vingerne gule med sort spids. Kølen rødlilla ..... melanops
" anderledes 6.
6. 2-3 par småblade på 2-5x1-4cm ..... narbonensis
3-10 par " , ½-14mm brede 7.
7. Småbladene ½-2mm brede, trespidsede ..... peregrina
" 1-4mm " , ikke trespidsede 8.
8. Enårig. Kronen gul (sj. rødlilla) ..... lutea
Flerårig. Kronen grumsetlilla sepium
9. Kronen helt eller overvejende gul ..... 10.
" ikke gul 11.
10. Kronen 25-35mm. Vingerne gule ..... grandiflora
" 18-22mm. " blålilla barbazitae
11. Kronen 5-8mm. Frøene knudrede ..... lathyroides
" 10-30mm. Frøene jævne 12.
12. 1-3 bladpar. Køl og vinger hvidlige ..... bithynica
4-8 " . " " " rødlilla sativa
13. Alle bægertænderne lig eller længere end bægerrøret .... 14.
Ihvertfald den øvre bægertand kortere end " 19.
14. Bladene uden slyngtråd ..... ervilia
" med " 15.
15. Kronen bleggul ..... consentina
" ikke gul 16.
16. Fodfligene uens: 1 linjeformet + 1 håndfliget .. articulata
" ens 17.
17. Kronen 15-20mm ..... bithynica
" 2-10mm 18.
18. Kronen 6-10mm. Bælgen med 3-6 frø ..... leucantha
" 2-4mm. " " 2 " hirsuta
19. Kronen bleggul ..... 20.
" ikke gul 21.
20. Klaserne med 20-30 blomster på 7-13mm. Glat .... ochroleuca
" " 6-20 " " 10-25mm. Dunet sparsiflora
21. Bladene uden slyngtråd ..... sicula
" med " 22.
22. Kronen 4-9mm, hvidlig eller blegt rødlilla. Enårig ..... 23.
" 10-25mm 26.
23. Klasen kortere end bladet. Kronen 3-5mm ..... disperma
" mindst lig " . " 5-9mm 24.
24. Småbladene 3-5mm brede. Bægeret dunet ..... pubescens
" ½-3mm " . " m.m. glat 25.
25. Klaserne 2-5-blomstrede, med en kort stak ..... tenuissima
" 1-2-blomstrede, stilken uden stak tetrasperma
26. Fodfligene tvedelte. Klasen med 1-4 blomster .... calcarata
" ikke tvedelte 27.
27. Kronen hvid med blålige årer ..... 28.
" anderledes 29.
28. Fodfligene helrandede. Planten silkelådden ..... serinica
" tandede. Planten glat altissima
29. 3-5 par småblade. Håndfligede fodflige ..... dumetorum
5-mange par småblade. Fodfligene helrandede/finttandede 30.
30. Bægergrunden stærkt poset. Fanens plade ½ x neglen ..... 31.
" ikke poset 34.
31. Klasen 2 x bladene ..... giacominiana
" ca. = bladene eller lidt kortere 32.
32. Kronen lyserød og mørkspidset ..... atropurpurea
" blålig eller rødlilla 33.
33. Bælgen 5-6mm bred. Klaserne 3-10-blomstrede .. pseudocracca
" 8-11mm bred. " 10-30-blomstrede villosa
34. Kronen 17-24mm. Klasen med 4-12 blomster ... onobrychioides
" 8-18mm. " " indtil 30 blomster 35.

35. Småbladene 2-2½ x så lange som brede. Sideribberne udgår i en vinkel på 45-60° ..... cassubica
Småbladene 3-5 x så lange som brede. Sideribbevinklen ca. 30° 36.
36. Kronen 12-18mm. Fanens plade længere end neglen tenuifolia
" 8-12mm. " " så lang som " 37.
37. Stænglen glat eller tiltrykt håret ..... cracca
" udstående dunhåret incana

Vicia sicula (Rafin.) Guss. Spidsbladet vikke. 40-80cm. Glat flerårig. 1-3 par meget smalle småblade på 2-5cm x 1-3mm. Kronen 15-20mm, blegt rødlilla. III-IV. C

V. sparsiflora Ten. Bleggul vikke. 30-100cm. Ingen slyngtråde. 6-14 par småblade på 8-25x4-10mm. VI. B. Gl. fund.

V. serinica Uechtr.& Huter Gråvikke. 20-40cm. Planten gråulden. 8-10 par småblade på 25-30x3mm. Klasen med 4-10 blomster på 2cm. 1600-1800m. VII. B (M. Papa ved Lagonegro)

V. cassubica L. Kassubisk vikke. V-VII. A B C K

V. ochroleuca Ten. 30-60cm. 7-12 par småblade på 20-45x3-9mm. Kronen bleggul eller gulgrøn. 0-800m. V-VI. B C K

V. dumetorum L. Kratvikke. V-VI. A B C K

V. onobrychioides L. Esparsettevikke. 30-80cm. 4-11 par småblade på 10-35x1-4mm. Blomsterne stærkt rødlilla; kølen lysere. A B

V. altissima Desf. Blåstribet vikke. 60-200cm. 5-9 par småblade på 10-25x4-9mm. Klaserne med 5-15 blomster på 15-19mm. V-VI. K

V. consentina Sprengel Gul musevikke. 40-120cm. Nær V. cracca, men silkehåret. 0-1200m. V-VI. B C

V. cracca L. Musevikke. V-VIII. A B C K

V. incana Gouan Filtet vikke. 30-150cm. 10-22 par tæthårede, 5-7mm brede småblade. Nedre bægertænder sylformede. Kronen mere rødlilla end hos V. cracca. V-VIII. A B C K

V. tenuifolia Roth Langklaset vikke. V-VIII. A B C K

V. villosa Roth Sandvikke. III-VI. A B C K. 2 underarter:
ssp. villosa: Stænglen lådden. Bægertænderne udstående randhårede. Dyrket og forvildet.
ssp. varia (Host) Corb.: Stænglen og bægertænderne glatte eller svagt dunede.

V. pseudocracca Bertol. 30-120cm. Nær foregående, men kronen 14-18mm, ofte med gullige vinger. III-V. A B C K

V. atropurpurea Desf. (V. benghalensis) Sortspidset vikke. 10-40 cm. Lådden 1-flerårig. Klaserne med 2-12 blomster på 12-15mm. 0-800m. III-VI. A B C K

V. giacominiana Segelberg. 10-30cm. Enårig. Nær foregående, men mindre og kortere og mindre håret. Klaserne med 3-6 blomster. Bælgen 5mm bred (8-11mm hos atr.). 0-300m. V. A (Porto Badisco på sydøstkysten)

V. calcarata Desf. (V. monantha) Treblomstret vikke. 5-8 par småblade på 10-25x1-6mm. Kronen lyst rødlilla med bleg grund. 2ssp.:
ssp. calcarata: Klaserne med 1-2 blomster på 10-15mm. Brune frø.
ssp. triflora (Ten.) Burtt & Lewis: Klaserne med 2-4 blomster på 14-20mm. Frøene sortagtige. IV-V.

V. articulata Hornem. Enblomstret vikke. 20-70cm. Glat enårig. Bægertænderne lidt uens, lænegere end røret. Kronen 8-17mm, hvid eller blegblå, undertiden sortspidset. 0-600m. V-VI. A B C K

V. ervilia (L.) Willd. Linsevikke. 15-50cm. Enårig. 8-15 par småblade. Klasen med 1-4 blegrøde blomster på 6-9mm, kortere end bla-

dene. Bælgen næsten perlesnorsagtig. 0-1000m. IV.V. A B C K

Vicia leucantha Biv. Blåårет vikke. 30-50cm. Klasen med 1-4 hvide og lillaårede blomster. III-V. A K (Capri)

V. hirsuta (L.) S.F.Gray Tofrøet vikke. IV-VI. A B C K

V. disperma DC. Sylbægret vikke. 10-50cm. Ligner den foregående, men bægertænderne uens og kronen blegt rødlilla. 2-frøet bælg. 0-1400m. III-V. A B C K

V. tenuissima (Bieb.) Sch.& Th. Spinkel vikke. Klaserne længere end bladene. Bægertænderne uens. 4-6 frø. III-V- A B C K

V. tetrasperma (L.) Schreber Taddervikke. IV-VI. A B C K

V. pubescens (DC.) Link Dunet taddervikke. Nedre bægertænder mindst lig bægerrøret. Kronen bleglilla. III-V. A B C K

V. sepium L. Gærdevikke. VI-VII. B C K

V. grandiflora Scop. Storblomstret vikke. 30-60cm. Enårig. Blomsterne ofte 2 sammen på 2-8mm lange stilke, bleggule med lillat eller grønligt anløben fane. Dunet bælg. V-VIII. A B C K

V. barbazitae Ten. Blåvinget vikke. Nær foregående, men bægertænderne ca. = bægerrøret (kortere hos gran.) V-VI. A B C

V. sativa L. Fodervikke. III-VI. A B C K. 6 underarter:

1. Underjordiske, kronløse blomster og bælge ..... amphicarpa
   Ingen underjordiske stængler med blomster og bælge 2.
2. Kronen mest 15-16mm. Bægertænderne kortere end røret ..... 3.
   " 18-30mm. Bægertænderne mindst lig bægerrøret 4.
3. Fanens plade næsten retvinklet opadbøjet ..... angustifolia
   " " skråt opadbøjet segetalis
4. Bælgen 4½-6mm bred. Bægertænderne længere end røret cordata
   " 6-11mm " . " ca. = røret 5.
5. Bælgen indsnøret mellem frøene, brun eller gulbrun .. sativa
   " ikke indsnøret, mørkebrun eller sort macrocarpa

V. lathyroides L. Vårvikke. III-V. A B C K

V. peregrina L. Markvikke. 20-40cm. Svagt dunet enårig. 3-7 par småblade. Blomsterne rødlilla, 1-2 sammen, 10-16mm. III-V. ABCK

V. melanops S.& S. Sortøjet vikke. 15-80cm. Dunet enårig. 5-10 par småblade på 5-20x2-8mm. 1-4 blomster sammen på 15-22mm. Fanen grønliggul, kølen rødlilla. 0-900m. IV-V. A B C K

V. lutea L. Gul vikke. Stænglen ribbet og næsten firkantet. 1-3 blomster sammen på 20-35mm, bleggule. IV-V. A B C K. 2 ssp.:
ssp. lutea: M.m. glat til tæt dunet. Bælgen hvidhåret.
ssp. vestita (Boiss.) Rouy: Lådden. Bælgen rust- eller rødhåret.

V. hybrida L. Svovlvikke. Blomsterne enlige, 18-30mm. Bægertænderne uens. Bælgen dunet. 0-1000m. III-IV. A B C K

V. bithynica (L.) L. Firbladet vikke. 20-60cm. Enårig. Småbladene lancetformede, 22-36x8-12mm, med brod. Fodfligene med mange, sylformede tænder. Blomsterne 16-20mm. Rødlilla fane. A B C K

V. narbonensis L. Fransk vikke. 20-60cm. Dunet, opret enårig. Småbladene kort randhårede, grågrønne. Fodfligene ca. 1cm. Blomsterne mørkt rødlilla, 15-18mm, 1-4 sammen. IV-VI. A B C K

V. faba L. Hestebønne. III-V. Dyrket og lidt forvildet.

Lens. Linse. Ligner Vicia, men med lange bægertænder. Enårig. Blegblå eller bleglilla blomster på 4-7mm, 1-3 sammen i langstilkede klaser.

L. nigricans (Bieb.) Godr. Vild linse. 10-30cm. Udstående dunet. 2-5 par småblade, 1-2mm brede. Fodfligene halvt spydformede eller tandede. Klasestilken med stak. Bælgen glat. IV-V. A B C K

Lens culinaris Med. Alm. linse. 10-40cm. Udstående dunet. 3-8 par småblade, op til 8mm brede. Fodfligene helrandede. Klasestilken med stak. Bælgen glat. V-VIII. Dyrket og forvildet.

L. ervoides (Brign.) Grande Kortbladet linse. 10-30cm. Tiltrykt dunet. 2-4 par småblade, 1-3mm brede. Fodfligene halvt spydformede eller tandede. Klasestilken uden stak. Dunet bælg. IV-V. ABCK

Lathyrus. Fladbælg.

1. Bladene uden slyngtråd ..... 2.
   " med " 10.
2. Enårig ..... 3.
   Flerårig 4.
3. Karminrød blomst. Bladene græsagtige ..... nissolia
   Bleggul blomst. Bladene med småblade saxatilis
4. Stænglen uvinget ..... montanus
   " vinget 5.
5. Småbladene ligestrengede ..... 6.
   " fjerstrengede 7.
6. Småbladene afrundet-rudeformede, 2-4x1-2cm, 1 par laxiflorus
   " linjeformede, 15-80x2-8mm, 1-2 par digitatus
7. Småbladene tilspidsede. Fodfligene 9-18mm ..... 8.
   " butte til halvspidse. Fodfligene 4-10mm 9.
8. 3-8 blomster på 1½-2cm. Bælgen ukirtlet ..... vernus
   6-12 " " 1-1½cm. " kirtlet venetus
9. 8-15 cm høj. Klaserne med 3-4 blomster ..... jordanii
   30-60cm ". " " 4-8 " niger
10. Flerårig ..... 11.
    Enårig 14.
11. Blomsterne gule ..... pratensis
    " røde 12.
12. Stænglen uvinget ..... grandiflorus
    " vinget 13.
13. Fodfligene mindst ½ x så brede som stænglen .... latifolius
    " under ½ x " " " " silvester
14. Kronen gul til orangegul ..... 15.
    " ikke gul 17.
15. Ingen småblade, 2 par store, spaderlignende fodflige aphaca
    Alle eller øvre blade med småblade 16.
16. Bladstilken udfladet, 1-2cm bred ..... ochrus
    " ikke udfladet annuus
17. Kronen teglstens- til orangerød ..... 18.
    " anderledes farvet 19.
18. Blomsterstilken 5-20mm, med stak ..... sphaericus
    " 10-40mm, uden stak setifolius
19. Nedre blade reducerede til en udfladet bladstilk ..... 20.
    Alle blade med 1, sjældent flere par småblade 21.
20. Vingerne blå- eller rødlilla. Fanen udrandet ..... clymenum
    " hvide/lyserøde. Fanen brodspidset articulatus
21. Stænglen uvinget. Kronen rødlilla eller lyseblå angulatus
    " vinget 22.
22. Klasestilken over 6cm, med 1-3 blomster ..... 23.
    " under 6cm, 1-blomstret 24.
23. Blomsterne 7-15mm, lyserøde med blegblå vinger ... hirsutus
    " 20-35mm, rødlilla odoratus
24. Bælgen med 2 køle på rygsømmen. Stilken 1-3cm ..... cicera
    " " 2 vinger på rygsømmen. Stilken 3-6cm sativus

Lathyrus vernus (L.) Bernh. Vårfladbælg. Stænglerne ofte enlige. IV-V. 500-1800m. A B C K

L. venetus (Miller) Wohlf. Firbladet fladbælg. 20-40cm. Som den foregående, men ofte flerstænglet. Klasen bøjet. Bælgen brunkirtlet. 0-1200m. IV-V. A B C K

Lathyrus niger (L.) Bernh. Sort fladbælg. 0-1000m. V-VI. B

L. jordanii (Ten.) Ces., Pass.& Gib. Lav fladbælg. 8-15(25)cm. Nær foregående, men rødderne tenformet fortykkede og småbladene 8-25x3-7mm. 600-1200m. V-VI. B C K (Cilento)

L. digitatus (Bieb.) Fiori Fingerfladbælg. 10-40cm. Bladene ofte næsten fingrede. Fodfligene 6-8x½-1mm. Klasen med 4-10 klart rødlilla blomster på 15-30mm. 800-1300m. B K C (Pollino, Sila)

L. montanus Bernh. Kratfladbælg. V-VI. B C K

L. pratensis L. Gul fladbælg. V-VIII. A B C K

L. laxiflorus (Desf.) O.Kuntze Fyrrefladbælg. 20-50cm. Småbladene spidse i begge ender; fodfligene omtrent så store som og af form som småbladene. Blålilla blomster på 15-20mm. VI-VIII. C

L. grandiflorus S.& S. Storblomstret fladbælg. 30-150cm. 1(3) par småblade på 25-50x10-35mm, ægformede. Fanen blålilla, vingerne rødlilla, kølen lyserød. 300-1300m. IV-VII. B C K

L. silvester L. Skovfladbælg. V-VIII. C K

L. latifolius L. Havefladbælg. ½-2m. Bladstilken mindst så bredt vinget som stænglen. Småbladene ½-5cm brede, tydeligt netårede. Klaserne stift oprette, længere end støttebladene. V-VIII. ABCK

L. odoratus L. Ærteblomst. 50-200cm. Småbladene 2-6x0,7-3cm, finttandede, med blågrøn underside, 1 par. VI-VIII. B C

L. saxatilis (Vent.) Vis. Stenfladbælg. 10-30cm. Dunet og vikkeagtig. Nedre blade med 2-3 par kileformede småblade, øvre med 1-2 par linjeformede. Blomsterne 6-9mm, enlige. IV-V. A C

L. sphaericus Retz. Enblomstret fladbælg. 10-60cm. Kronen 10-13 mm. Bælgen 3-7cm x 4-7mm, tydeligt længdestribet. V-VI. A B C K

L. angulatus L. Langstilket fladbælg. Klasestilken 2-7cm, 1(2)-blomstret, med stak. Bælgen 2-4½cm x 3-4mm. V-VI. C K

L. setifolius L. Børstefladbælg. 10-60cm. Bælgen 15-30x7-11mm, uden længdestriber. Kronen 8-11mm. IV-VI. A B C K

L. cicera L. Purpurfladbælg. 10-60cm. Kronen 10-14mm, rødlilla. Planten glat. Småbladene 2-5mm brede. Bælgen 2-4x½-1cm. A B C K

L. sativus L. Sædfladbælg. 10-60cm. Kronen 12-18(24)mm, lyseblå (sj. lyserød eller hvid). Bælgen 2-4x1-1½cm. III-V. Dyrk. & forv.

L. annuus L. Rødgul fladbælg. 40-150cm. Glat med vinget stængel. Småbladene 5-15cm x 4-18mm. Klasen med 1-3 gule eller orangegule blomster på 12-18mm. Bælgen 30-80x7-12mm. III-VI. A B C K

L. hirsutus L. Håret fladbælg. 20-100cm. Svagt dunet. Bælgen 20-50x5-10mm, rusthåret. IV-VII. B C K

L. clymenum L. Klatreært. Bladene med bred, udfladet stilk og skaft, de nedre uden småblade, de øvre med 2-4 par. Kronen karminrød . IV-VI. B C K

L. articulatus L. H ridvinget klatreært. Bladene som hos clymenum. IV-VI. B

L. ochrus (L.) DC. Den udfladede bladstilk tunge-spatelformet, nedre blade uden, øvre med 1-2 par småblade. IV-VI. A B C K

L. nissolia L. Græsbladet fladbælg. 10-90cm. Den udfladede bladstilk 5-10x½cm, græsagtig, uden småblade. 0-1600m. IV-VII. ABCK

L. aphaca L. Bladløs fladbælg. 20-60cm. Selve bladet reduceret til en slyngtråd, men med 2 store, spyd- eller spadeformede fodflige. Langestilkede, enlige blomster på 5-16mm. IV-VI. A B C K

Pisum elatius Bieb. Vildært. En ært med klaserne 2-3 x længere

end fodfligene. Kronen rød- eller blålilla. IV-VI. A B C K

Ononis. Krageklo.

1. Kronen rød eller hvid ..... 2.
   " gul 7.
2. Planten tornet og flerårig ..... spinosa
   Enårige uden torne 3.
3. Alle blade med 1 småblad ..... 4.
   Nogle " " 3 småblade 5.
4. Planten halvglat og ukirtlet. Småbladet 10-45mm ..... alba
   " klæbrigt-kirtlet 14.
5. Blomsterne tydeligt stilkede ..... reclinata
   " m.m. siddende 6.
6. Planten ukirtlet. Bægeret hvidligt ..... mitissima
   " klæbrig. " grønt diffusa
7. Flerårig ..... 8.
   Enårig 9.
8. Blomsterstandens blade ca. 2 x blomsternes længde .. pusilla
   " " kortere end blomsterne natrix
9. Bælgen 7-10 x så lang som bred og knudret .. ornithopodioides
   " bredere og ikke knudret 10.
10. Blomsterstilkene 2-blomstrede ..... biflora
    " 1-blomstrede 11.
11. Nedre og mellemste blade 3-koblede, øvre enkle ..... sicula
    " " øvre blade enkle, mellemste kan være 3-koblede 12.
12. Småbladet 5-8mm, oftest sammenfoldet ..... variegata
    " 10-20mm, ikke " 13.
13. Kronen 7-9mm, højst af bægerets længde ..... breviflora
    " 10-13mm, længere end bægeret sieberi
14. Småbladet 3-5cm. Fodfligene 15-23mm ..... alopecuroides
    " ½-1cm. " 5-7mm oligophylla

O. ornithopodioides L. Fugleklo skrageklo. 5-25cm. Klæbrig. 3 småblade. Kronen kortere end bægeret. Bælgen 17-21x2-3mm. ABCK

O. biflora Desf. Tveblomstret krageklo. 10-50cm. Stænglen svagt kirtelhåret. 3 kødede småblade på 15-20mm. Kronen bleggul eller noget rødligt anløben, længere end bægeret. II-IV. A

O. sicula Guss. Stakkrageklo. 5-20cm. Stænglerne lådne og kirtelhårede. Småbladene 10-15mm. Bægeret 8-9mm. Kronen 5mm. Bælgen 10-17x2-4mm. III-V. K (Avellino) C (Monteleone)

O. reclinata L. Udstrakt krageklo. 2-15(30)cm. Mest med udstrakte-opstigende, klæbrigt dunede grene. Kronen 5-8mm, ofte lidt kortere end bægeret. Småbladene 5-8mm. 0-1400m. IV-VI. A B C K

O. breviflora DC. (O. viscosa ssp. b.) 10-20cm. Stænglen grenet fra grunden med 1-2mm lange kirtelbørster, Kronen ofte rødåret. Blomsterstilkens stak 6-17mm. 0-1200m. V-VI. A B C K

O. sieberi Besser (O. viscosa ssp. s.) 10-20cm. Som den foregående, men med aromatisk duft. Blomsterstilkens stak 0-3mm. A B C

O. pusilla L. Liden krageklo. 10-20cm. Lidt forveddet ved grunden. Småbladene 5-13mm. Blomsterne siddende i løse aks, støttebladene længere end blomsterne. Kronen 5-12mm. VI-IX. A B C K

O. spinosa L. Strandkrageklo. V-IX. A B C K. 2 underarter:
ssp. spinosa: Kronen 15-17(12-20)mm, ca. 2 x bægeret. Unge kviste med 2 hårstriber. ?
ssp. antiquorum (L.) Arc.: Kronen 6-10mm, kun lidt længere end bægeret. Kvistene trindt hårede.

Ononis alba Poiret Hvid krageklo. 15-45cm. Småbladet 10-45x2-12 mm. Blomsterne i løse klaser, stilkene 1-2mm. Kronen 12-16mm, lyserød eller hvidlig, 2 x bægeret. V-VI. A B C K

O. oligophylla Ten. Firfrøet krageklo. 10-40cm. Liggende til opstigende. Blomsterstilkene ca. 5mm, -15mm i frugt. Bægertænderne med 3-5 ribber. Kronen 10-12mm, lidt længere end bægeret. A B C K

O. variegata L. Foldet krageklo. 10-30cm. Liggende eller opstigende, klæbrig og ofte med påsiddende sandskorn. Småbladet ofte noget krummet. Kronen 12-14mm. Sandstrand. IV-V. A B C K

O. diffusa Ten. Savtandet krageklo. 10-40cm. Mest udstrakt, klæbrigt dunet. Klasen forlænges efter blomstringen. Kronen 9-11mm, lidt længere end bægeret. Klippe- og sandkyst. IV-VI. A C K

O. mitissima L. Akskrageklo. 15-60cm. Opret eller liggende. Blomsterne i tætte aks. Kronen 10-12mm, længere end bægeret. Øvre støtteblade uden småblade og hindeagtige. IV-VI. A B C K

O. alopecuroides L. Tungekrageklo. 10-65cm. Blomsterne i tætte, aksformede klaser. Bægeret 12mm, kronen 15mm. IV-VI. B C K

O. natrix L. Gul krageklo. 20-60cm. Dværgbusk. Mest 3 småblade på 8-20mm. Kronen ofte med røde eller lilla årer. Blomsterne enlige på 2-3cm lange stilke i den tætte klase. IV-VII. A B C K
ssp. natrix: Stængelhårene ½-2mm. Bægertænderne 2½-4 x røret.
ssp ramosissima (Desf.) Batt.: Stængelhårene 0,2-0,5mm. Bægertænderne 1½-2½ x bægerrøret. Ofte stærktgrenet. C

Melilotus. Stenkløver.

1. Kronen hvid ..... alba
   " gul 2.
2. Mellemste blades fodflige helt eller næsten helrandede ... 3.
   " " " tandede 7.
3. Kronen 2-3mm. Bælgen ½-3mm ..... indica
   " 4-9mm. " 3-8mm 4.
4. Bælgen opret eller udstående, med et næb på ½-1mm neapolitana
   " hængende 5.
5. Fane og vinger længere end kølen. Svagtåret bælg officinalis
   " " " = kølen. Bælgen tydeligt året 6.
6. 2-flerårig. Bælgen dunet og netåret ..... altissima
   Enårig. Bælgen glat og tværåret elegans
7. Bælgen netåret ..... italica
   " koncentrisk stribet 8.
8. Klaserne meget kortere end deres støtteblad .... messanensis
   " mindst så lange som deres støtteblad 9.
9. Fanen mindst af kølens længde. Bælgen sortbrun ..... infesta
   " kortere end kølen. Bælgen gulbrun 10.
10. Kronen 3-4mm. Bælgen bredt siddende ..... sulcata
    " 4-8mm. " stilket efter bægeret segetalis

Melilotus altissima Thuill. Høj stenkløver. VII-X. A B K

M. alba Med. Hvid stenkløver. VII-IX. B C K

M. officinalis (L.) Pallas Lægestenkløver. V-VIII. B K

M. italica (L.) Lam. Storblomstret stenkløver. 20-60cm. Klaserne 1½-3cm, længere i frugt. Kronen 6-9mm. Bælgen 5-6mm, kugleformet. III-V. A B C K

M. neapolitana Ten. Næbfrugtet stenkløver. 15-50cm. Klaserne ca. 1cm, længere i frugt. Kronen 4-6mm; fane, vinger og køl lige lange. Frugten m.m. kugleformet bortset fra næbbet. IV-VI. A B C K

M. indica (L.) All. Indisk stenkløver. 15-50cm. Kronen bleggul. Bælgen stærkt netåret. IV-VII. A B C K

Melilotus elegans Salzm. Vellugtende stenkløver. 20-150cm. Kronen 4-5mm; kølen længere end fane og vinger. IV-VII. A B C K

M. infesta Guss. Dråbestenkløver. 30-50cm. Kronen 6-7½mm. B K

M. sulcata Desf. Småblomstret stenkløver. Ofte rødstænglet. Klasen 1-2cm, ofte med under 25 guldgule blomster. IV-VII. A B C K

M. segetalis (Brot.) Ser. Agerstenkløver. Klasen ca. 3cm og med 30-50 blomster; til sidst 3 x støttebladet. IV-VII. B K

M. messanensis (L.) All. Kortklaset stenkløver. 15-20cm. Småbladene savtakkede. Klaserne 7-10mm, med 3-10 blomster på 4-5mm. Bælgen 6-7mm. III-IV. A B C K

Trigonella. Bukkehorn.

1. Klasestilken længere end støttebladet ..... 2.
   " kortere " " 3.
2. Bægertænderne m.m. ens, ca. ½ x røret ..... maritima
   Øvre bægertand længere end resten og ca. = røret corniculata
3. Bægeret klokkeformet, ca. 3mm. Kronen gul ..... monspeliaca
   " rørformet, 6-8mm. Kronen hvidlig eller lilla 4.
4. Bælgen 2½-6cm. Småbladene 5-12mm ..... gladiata
   " 7-12cm. " 2-5cm foenum-graecum

Trigonella maritima Del. Strandbukkehorn. 5-40cm. Liggende og m.m. glat. Klaserne med 3-10 blomster på 6-7mm, næsten i skærm. Bælgen med tykke, skæve årer, 10-16mm. Sandstrand. III-V. A C

T. corniculata (L.) L. Markbukkehorn. 10-50cm. Opstigende. Klaserne aflange med 8-15 blomster. Bælgen med tynde tværårer, 10-16x2-3mm, lidt krum. Kronen 6-7mm. III-V. A B C K

T. monspeliaca L. Stjærnebukkehorn. 5-15cm. Tæt tiltrykt dunet. 4-14 blomster på ca. 4mm i siddende nøgler. Bælgen 7-17x1-1½mm, krum og skævribbet. III-VI. A B C K

T. gladiata Steven Sværdbukkehorn. 3-15cm. Blomsterne ofte enlige og siddende. Kronen 8-10mm, bleggul, undertiden lillaanløben. Bælgen 15-40x3-7mm med et næb på yderligere 8-20mm. IV-VI. ABCK

T. foenum-graecum L. Bukkehorn. 10-50cm. Som gladiata, men blomsterne ofte parvise. Bælgen 6-11cm x 4-6mm med et næb på 2-3cm. Kronen 12-18mm, gulhvid med lilla grund. Dyrket og forvildet.

Medicago. Sneglebælg.

1. Bælgen nyreformet, højst 3mm lang ..... lupulina
   " forlænget, krum eller skruesnoet, over 3mm 2.
2. Flerårig ..... 3.
   Enårig 6.
3. Busk på 1-4m med orangegule blomster ..... arborea
   Urter 4.
4. Hvidfiltet strandplante ..... marina
   M.m. dunet 5.
5. Kronen lilla. Bælgen skruesnoet ..... sativa
   " gul. Bælgen seglkrummet til næsten lige falcata
6. Fodfligene helrandede til svagt takkede ..... 7.
   " tydeligt savtakkede til fligede 8.
7. Bælgens kant bred og flad. Tornene akseparallelle .. coronata
   " " kølet. Tornene udstående minima
8. Den tornløse bælg med iøjnefaldende tværribber nær randen rugosa
   Bælgen uden påfaldende, vinkelrette tværribber nær randen 9.
9. Kronen næsten lig bægeret, ca. 2½mm ..... praecox
   " tydeligt længere end bægeret, mindst 3mm 10.
10. Bælgens torne slanke og med en tydelig fure (lup!) ..... 11.
    " eventuelle torne højst med en svag fure 13.

11. Alle bælgens torne drejer ned mod bægeret ..... disciformis
Tornene flersidigt rettede 12.
12. Vindingernes køl med en midterfure. Småbladene tit
med en sort plet, ofte 10-25mm store ..... arabica
Vindingernes køl uden midterfure. Småbladene pletfrie,
polymorpha
13. Bælgen 9-18mm bred ..... 14.
" 2-10mm " 17.
14. Bælgen uden torne ..... 15.
" med " 16.
15. Bælgen halvkugleformet ..... scutellata
" linseformet orbicularis
16. Bælgen kirteldunet ..... ciliaris
" glat intertexta
17. Planten næsten glat. Bælgen ofte topformet ..... murex
" håret 18.
18. Småbladene tandede næsten til grunden ..... turbinata
" højst tandede i den øvre halvdel 19.
19. Bælgen tydeligt kirteldunet ..... rigidula
" højst kirteldunet på kanten 20.
20. Bladstilken tit længere end klasestilken ..... 21.
" kortere end den tilhørende klasestilk 22.
21. Fodfligene tandede forneden ..... tenoreana
" fligede " truncatula
22. Modne bælg med kølet kant. Klasen 6-9-blomstret ... tornata
" " uden " " . " mest med 1-6 blomster 23.
23. Alle vindinger lige brede undtagen den øverste littoralis
Bælgen æg- eller kugleformet aculeata

Medicago lupulina L. Humlesneglebælg. IV-VII. A B C K

M. sativa L. Lucerne. Dyrket og forvildet.

M. falcata L. Seglsneglebælg. IV-VII. A B C K

M. arborea L. Træsneglebælg. Silkehåret busk med hvidlig bark. 4-8 blomster sammen på 12-15mm. Bælgen 12-15mm, med 1-1½ vinding. 0-300m. V-VI. A K

M. marina L. Strandsneglebælg. 10-30cm. Liggende, forveddet forneden. Klaserne næsten hovedformede med 5-12 blomster på 6-8 mm. Bælgen 6-8mm med 2-4 vindinger. III-VIII. A B C K

M. orbicularis (L.) Bartal. Skivesneglebælg. Glat eller svagt håret. Bælgen linseformet, 10-17mm, dens tværårer noget sammenløbende. IV-V. A B C K

M. intertexta (L.) Miller Gittersneglebælg. Bælgen 12-15mm, kugleformet, typisk med tiltrykte torne. IV-V. A B C K

M. ciliaris (L.) All. Kirtelsneglebælg. Ligner intertexta, men bælgen op til 15-20mm. IV-V. A B C K

M. scutellata (L.) Miller Skjoldsneglebælg. Bælgen kirteldunet, med mange tydelige tværårer og en tydelig kantåre. IV-V. A B C K

M. rugosa Desf. Ribbet sneglebælg. Bælgen 6-10mm, skiveformet. Tværårerne ikke sammenløbende. III-V. A C

M. rigidula (L.) All. Krogsneglebælg. Stænglen med dybe længderibber. Bælgen med krumme torne; tværårerne stærkt krummede, næppe sammenløbende. III-VI. A B C K

M. tornata (L.) Miller Valsesneglebælg. Bælgen 5-8mm, flad i begge ender, linse- til valseformet. Kystnær. IV-V. A C K

M. truncatula Gaertner Fodangelsneglebælg. Bælgen 5-8mm, valseformet, med tyk randribbe. III-V. A B C K

Medicago litoralis Rohde Sandsneglebælg. Bælgen 4-6mm, tværårerne næsten rette, næsten kun sammenløbende nær randribben. Sandede steder nær kysten. III-V. A B C K

M. aculeata Willd. Savsneglebælg. Kraftige, dybt furede stængler. Klaserne ofte 1-2-blomstrede. Bægeret 3mm, ca. = kronen. Bælgen med eller uden torne, 7-10mm. III-V. A B C K

M. turbinata (L.) All. (M. tuberculata) Knudret sneglebælg. Klasen med 1-8 blomster. Kronen 5-6mm. Bælgen 5-7mm, m.m. valseformet med korte, men tætstillede torne. III-V. A B C K

M. murex Willd. Kærvsneglebælg. Bælgen 5-9mm, oftest med 1-3mm lange torne, men undertiden med korte knuder i steden for. ABCK

M. arabica (L.) Hudson Pletsneglebælg. Bælgens kant med 3 furer, med de 2 ydre dybest; tornene dybt furede. IV-VI. A B C K

M. polymorpha L. Foranderlig sneglebælg. Bælgen 4-10mm med fremtrædende ribber på hver side af kølribben, hvorved kanten bliver 3-kølet. Tornene dybt furede. III-V. A B C K

M. praecox DC. Pindsvinesneglebælg. Blomsterne mest enlige, 2-3 mm. Bælgen 3-4mm bred, svagt dunet, mest krumtornet. III-IV. C K

M. coronata (L.) Bartal. Kronsneglebælg. Spinkel og dunet. Kølribben udvidet til en flad kant med torne, der er parallelle med aksen. Bælgen 2-4mm. Klaserne 3-8-blomstrede. IV-V. A B C

M. disciformis DC. Hvirvelsneglebælg. Bælgen ca. 6mm bred, glat og tornet, den øverste vinding meget mindre og uden torne. ABCK

M. tenoreana Ser. Kortstilket sneglebælg. Bælgen 5mm, kort valseformet. Tornene korte, næsten rette, akseparallelle. A B C K

M. minima (L.) Bartal. Liden sneglebælg. Planten spredt håret. Bælgen også håret og noget kirtlet. V-VII. A B C K

Trifolium. Kløver.

1. Kronen gul ..... 2.
   " hvid, rød, lilla eller hvidgul 7.
2. Blomsterne 2-3½mm. Fanen næppe furet ..... 3.
   " mindst 4mm. Fanen furet 4.
3. 1-6 blomster med stilke længere end bægerrøret .. micranthum
   3-15 " " " kortere " " dubium
4. Frugtstilkene ca. 3mm, 2-4 x bægerrøret ..... sebastianii
   " højst ½mm, kortere end bægerrøret 5.
5. Kronen 4-5mm ..... campestre
   " 5-7mm 6.
6. 20-50cm høj. Småbladene 3 x så lange som brede ..... patens
   5-20cm " . " ca. " " " " brutium
7. Frugtbægeret opblæst ..... 8.
   " ikke opblæst 14.
8. Flerårig ..... 9.
   Enårig 10.
9. Blomsternes nedre støtteblade 3-4mm, ufrie ..... fragiferum
   " " " ½-1mm, frie indbyrdes physodes
10. Frugtbægeret dunet til filtet. Blomsten drejer 180° .... 11.
    " glat. Blomsten vender fanen opad 12.
11. Hovederne m.m. siddende ..... tomentosum
    " tydeligt stilkede resupinatum
12. Kronen kun lidt længere end bægeret ..... spumosum
    " tydeligt " " " 13.
13. Frugtbægeret stærkt opblæst, med tværribber ... vesiculosum
    " kun lidt opblæst, uden tværribber mutabile
14. Hovederne med 2-5(1-7) blomster med krone ..... 15.
    " mangeblomstrede 17.
15. Flerårig. Blomsterne mest 15-20mm, rodnære ..... uniflorum
    Enårig. Blomsterne 6-14mm 16.

16. Stængler og bægre glatte ..... ornithopodioides
" " " dunede subterraneum
17. Planten og bægeret glat ..... 18.
Bægeret håret, oftest på tænderne 24.
18. Hovederne siddende ..... 19.
" stilkede 20.
19. Øvre blade kortstilkede. Kronen lyserød ..... glomeratum
Alle " langstilkede. " hvid suffocatum
20. Flerårig ..... 21.
Enårig 22.
21. Bægertænderne adskilte af smalle, spidse bugter .... repens
" " " butte bugter hybridum
22. Småbladenes ribber ender i kirteltænder ..... strictum
" " " ikke i kirtler 23.
23. Bægertænderne 3-4 x bægerrøret ..... michelianum
" ca. = " nigrescens
24. Flerårig ..... 25.
Enårig 33.
25. Kronen hvid eller hvidgul ..... 26.
" rød 29.
26. Kronen 7-9mm. Bægertænderne ikke ret hårede ..... montanum
" 12-25mm. Bægertænderne fjerhårede 27.
27. Nederste bægertand 2-3 x de øvre ..... ochroleucon
" " højst 1½ x de øvre 28.
28. Alle bægertænder lige lange ..... noricum
Nederste bægertand 1½ x de øvre pratense
29. Hovedet (2½) 3 x så langt som bredt ..... rubens
" højst 2 x så langt som bredt 30.
30. Bægerrøret glat ..... medium
" håret 31.
31. Bægeret 20-ribbet. Småbladene lancetformede ..... alpestre
" 10-ribbet 32.
32. Mellemste fodflige brat tilsmalnede i en børsteformet spids pratense
Mellemste fodflige jævnt tilsmalnede i en grøn spids patulum
33. Kronen lilla med furet fane. 5 bægerribber ..... speciosum
" ikke lilla, højst rødlilla. Flere bægerribber 34.
34. Hovederne med blade lige under sig ..... 35.
" stilkede 43.
35. Alle blade spredte ..... 36.
I det mindste de 2 øverste blade modsatte 40.
36. Stænglerne glatte ..... congestum
" dunede til hårede 37.
37. Kronen 2 x bægeret ..... tenuifolium
" ikke meget længere end bægeret 38.
38. Frugtbægerets tænder oprette eller sammenknebne .. bocconei
" " m.m. udstående 39.
39. Småbladenes sideribber krumme. Kronen oftest hvid scabrum
" " rette. " lyserød striatum
40. Hovedet med et svøb af ofte bladløse fodflige ..... 41.
" uden et sådant svøb 42.
41. Kronen længere end bægeret ..... hirtum
" kortere " " cherleri
42. Bægertænderne m.m. oprette i frugt ..... pallidum
" udspærrede i frugt 55.
43. Hovedet tydeligt forlænget ..... 44.
" m.m. rundt i blomst 50.
44. Kronen kortere end bægeret ..... 45.
" lig eller længere end bægeret 47.
45. Alle blade stilkede, bredbladede ..... ligusticum
Øvre " siddende, smalbladede 46.
46. Bægertænderne længere end røret ..... arvense
" omtrent lig " phleoides

47. Småbladene 10-25 x så lange som brede ..... angustifolium
" kun lidt længere end brede 48.
48. I det mindste de 2 øverste blade modsatte .... alexandrinum
Alle blade spredte 49.
49. Bægertænderne uens, alle langt udstående hårede smyrnaeum
" m.m. ens, opret-udstående hårede incarnatum
50. Bægeret 20-ribbet med glat rør. Glat stængel .... lappaceum
" 10-ribbet 51.
51. Alle blade spredte ..... stellatum
De 2 øverste blade modsatte 52.
52. Bægertænderne m.m. ens ..... 53.
" tydeligt uens 54.
53. Stænglen glat forneden ..... obscurum
" tæt udstående håret leucanthum
54. Bægertænderne højst 3-ribbede ved grunden ..... echinatum
" 3-ribbede mindst til midten 55.
55. Kronen 5-7mm. Øvre småblade 1-2cm ..... squamosum
" 9-12mm. " " 2-4cm squarrosum

Trifolium ornithopodioides L. Spædt bukkehorn. 5-10cm. Liggende. 2-4 hvide eller lyserøde blomster sammen på 6-8mm. Bælgen længere end bægeret, 6-8mm. V-VI. B

T. strictum L. Rank kløver. 3-15cm. Opret eller opstigende. Småbladene smalle. Hovederne 7-10mm, stilkene 1-2 x bladene. Kronen 5-6mm, lyserød, lidt længere end bægeret. V-VI. A B C K

T. montanum L. Bjærgkløver. 15-60cm. Småbladene mest 2-4cm, lancetformede, med skarpt brodspidsede tænder. Hovedet 15-30mm. Kronen gulbrun som vissen, med krum fane. V-VIII. B (Pollino)

T. repens L. Hvidkløver. IV-X. A B C K. 2 underarter:
ssp. repens: Planten m.m. glat.
ssp. prostratum (Bias.) Nyman: Blomsterstilkene hårede. Blade og hovedstilke hårede. Småbladene mest 5-10mm.

T. hybridum L. ssp. elegans (Savi) A.& Gr. Smuk kløver. Stænglen fyldt, meget grenet. Hovederne 16-19mm brede. Kronen ca. 5mm. Tørre blade med ca. 40 par ribber. V-VIII. A B C K

T. nigrescens Viv. Ledkløver. 5-40cm. Ligner en enårig Hvidkløver. Bælgen indsnøret mellem de godt 4 frø. III-VI. A B C K

T. michelianum Savi Knudekløver. 10-60cm. Opret. Hovederne 20-25 mm, løse og mangeblomstrede. Bægeret ca. 5mm, tænderne sylformede, 3-4 x røret. Kronen lyserød, 8-11mm. V-VI. K

T. glomeratum L. Nøglekløver. 10-20cm. Liggende til opstigende. Stængelleddene 1-8cm. Hovederne 8-12mm, mest vel adskilte. Bægertænderne trekantet-ægformede, tilbagebøjede. IV-VI. A B K

T. suffocatum L. Sandkløver. 1-3cm. Tueformet. Stængelleddene mest under 5mm. Hovederne 5-6mm, ofte sammenflydende. Bægertænderne lancet-sylformede, tilbagebøjede. IV-V. A B C K

T. uniflorum L. Lav kløver. 1-6cm. Lav og tueformet. Blomsterne 1-3 sammen, hvide til rødlilla. Bægeret 6-7mm, korttandet.V-VI. C

T. spumosum L. Spytkløver. 10-30cm. Liggende eller opstigende. Frugtbægeret pæreformet, stærkt netåret, med 24 længderibber. Kronen først hvid, senere lyserød, IV-V. A C K

T. vesiculosum Savi Blærekløver. 15-30cm. Stive stængler. Småbladene 1½-3cm, næsten læderagtige, mest lancetformede. Hovedet 2-6x2-3½cm. Kronen 1½-2 x bægeret. IV-VI. A B C K

T. mutabile Portenschl. Glatbægret kløver. 10-50cm. Nær foregående, men småbladene bredere i det. V-VI. A B C K

T. physodes Steven Skumkløver. 5-25cm. Planten glat, ikke rodslående. Hovederne 15-20mm brede. Kronen 8-14mm, lyserød. ABCK

Trifolium fragiferum L. Jordbærkløver. IV-VIII. A B C K. 2ssp.:
ssp. fragiferum: Bægeret 4-4½mm i blomst, 8-10mm i frugt.
ssp. bonannii (C.Presl) Sojak: Bægeret 3½-4mm i blomst, 4-6mm i frugt. ?

T. resupinatum L. Omvendt kløver. 10-30cm. Kronen vender fanen nedad. Frugtbægeret pæreformet med 2 udspærrede, synlige tænder i spidsen. IV-VII. A B C K

T. tomentosum L. Uldhovedet kløver. 5-15cm. Altid liggende. Frugtbægeret næsten kugleformet, de 2 tænder næsten skjulte og korte. IV-VI. A B C K

T. speciosum Willd. Violkløver. 5-15cm. Opret. Hovederne runde, 13mm eller mere. Kronen 8-10mm. 500-1200m. IV-VI. B C

T. brutium Ten. 5-20cm. Stænglen håret. Småbladene 8-10mm. Hovedstilkene 2-4 x bladene, 3-5cm. Hovedet 15-20mm i frugt. VI-VII. 900-1500m. B C K

T. patens Schreber Guldkløver. 20-50cm. Stænglen bugtet. Småbladene 5-18mm. Hovedet 10-15mm i frugt. Kronen 5-7mm, gyldengul. Blomsterne næsten siddende. VI-VII. A K

T. campestre Schreber Gul kløver. IV-VIII. A B C K

T. sebastianii Savi Hængekløver. 5-30cm. Hovederne 8-10mm med hængende blomster på 4mm, der bliver rødbrune efter blomstringen. Nedre bægertænder 3-4 x bægerrøret. V-VI. B K (Irpinia)

T. dubium Sibth. Fin kløver. V-IX. B K

T. micranthum Viv. Spæd kløver. Hovedstilkene trådformede. Kronen 2-3mm. V-IX. A B C K

T. striatum L. Stribet kløver. IV-VII. A B C K. 2 underarter:
ssp. striatum: 5-20cm. Liggende. Bægertænderne kortere end røret, overrages af kronen.
ssp. tenuiflorum (Ten.) Arc.: -50cm. Opstigende til opret. Bægertænderne = røret, overrages næppe af kronen. B K (Ischia)

T. arvense L. Harekløver. IV-VI. A B C K

T. bocconei Savi Tvillingkløver. 5-25cm. Tætdunet, ofte opret. Hovederne 9-15mm, tætte, valse- eller kegleformede; de endestillede ofte parvise, men uens. Blegrød krone = bægeret. A B C K

T. tenuifolium Ten. Smalbladet sylkløver. 10-30cm. Øvre småblade linjeformede, nedre ofte bredere. Hovederne runde til ægformede. Kronen gulligt lyserød, 6mm. V-VI. A (Pen.Salentina) B

T. phleoides Pourret Rottehalekløver. 10-35cm. Minder om Harekløver, men med få hoveder, ofte kun 1-2 pr. stængel. Kronen 4-5 mm, blegrød eller hvid, kortere end bægeret. 800-1500m. IV-VI. A

T. ligusticum Balbis Børstekløver. 10-40cm. Stænglen mørkegrøn, udstående håret. Hovederne ofte parrede med eet kort- og eet langstilket. Kronen 3-4mm, meget kortere end bægeret. IV-VI. A B C K

T. scabrum L. Ru kløver. Minder om Stribet kløver, men bægertænderne stikkende og udspærrede. IV-VI. A B C K. 2 underarter:
ssp. scabrum: Stænglen dunet. Kronen hvidlig, kortere end bægeret
ssp. lucanicum (Gasparr.) Pign.: Stænglen tætfiltet. Kronen blegrød, lig eller længere end bægeret. A B

T. stellatum L. Stjærnekløver. 8-20cm. Stænglen tæt udstående håret. Hovederne ca. 15mm under blomstringen. Bægerrøret 5mm, tænderne 7mm, udspærrede i frugt. Kronen 8-12mm. IV-VI. A B C K

T. incarnatum L. Blodkløver. IV-VI. 2 underarter:
ssp. incarnatum: Opret. Kronen blodrød. Dyrket og forvildet.
ssp. molineri (Balbis) Syme: Opstigende. Kronen gullighvid eller blegrød. A B C K

Trifolium pratense L. Rødkløver. I-XII. A B C K. 2 underarter:
ssp. pratense: Hovederne store, 2-4cm. Nedre blomster udstående eller nedadrettede og dækker derved bægrene helt.
ssp. semipurpureum (Strobl) Pign.: 5-10cm høj. Hovederne små, 1,2-2cm. Nedre blomster opadrettede med synlige bægre.

T. pallidum W.& K. Bleg kløver. 15-40cm. Ligner en enårig Rødkløver. Kronen hvidlig eller blegrød. Fodfligene brat tilsmalnede i en trådformet stak. Udstående håret. IV-VII. A B C K

T. noricum Wulfen ssp. praetutianum (Guss.) Pign. 5-15cm. Tættuet. Bladene forneden dækkede af hvidlige fodflige. Kronen bleggul med rød spids. Hovederne ofte nikkende. 1600-2100m. VII-VIII. K

T. lappaceum L. Burrekløver. 4-25cm. Kronen 7-8mm, lyserød, lig bægeret i blomst, meget kortere i frugt. Bægertænderne hårede i øvre halvdel. IV-V. A B C K

T. congestum Guss. Nålepudekløver. 1-3cm. Stive, liggende stængler. Hovederne 8-10mm, ofte siddende. Bægeret smalt klokkeformet, med 20 ribber. Tænderne 2 x røret, = kronen. IV-V. B C

T. hirtum All. Håret kløver. 10-40cm. Ofte udstående grenet, med udstående hår. Hovederne runde. Kronen rødlilla, 12-15mm. V-VI. C

T. cherleri L. Svøbkløver. 5-15cm. Sjældent grenet foroven; udstående håret. Hovederne halvkugleformede. Blegrød krone. A B C K

T. medium L. Bugtet kløver. V-VIII. B C K

T. patulum Tausch. Smalbladet rødkløver. 20-60cm. Småbladene 15-50x4-5mm. Hovederne indtil 4cm, ægformede til aflange. Kronen lidt længere end bægeret. VI-VIII. C (Sila) K (Alburno)

T. alpestre L. Skovkløver. V-VIII. B K

T. rubens L. Purpurkløver. 20-60cm. Opret og ofte glat. Bladene 4-6½cm, aflangt lancetformede. Hovedet valseformet, 3-7cm, rødkløverfarvet. Bægerrøret 20-ribbet, mest glat. A (Otranto)

T. angustifolium L. Smalbladet kløver. 8-20cm. Opret, tiltrykt dunet stængel. Det endestillede hovede forlænget, 2-8cm. Kronen blegrød, omtrent lig bægeret. IV-VII. A B C K. 2 underarter:
ssp. angustifolium: Småbladene smalt linjeformede, 2-8cm. Bægertænderne glatte mod spidsen.
ssp. gibellianum Pign.: Småbladene lancetformede, 1-2cm. Bægertænderne lådne mod spidsen.

T. smyrnaeum Boiss. Harefodskløver. 5-20cm. Blødt gråhåret. Småbladene ægformede, 5-10mm. Ægformede, ofte parrede hoveder. Frugtbægeret klokkeformet, nedre tand 2 x resten. V-VI. C

T. ochroleucum Hudson Bleggul kløver. 20-50cm. Vækst som T. medium, men med lidt bredere blade. Hovedet 2-4cm. V-VI. A B C K

T. alexandrinum L. 40-70cm. Hovederne 1½-2cm. Nederste bægertand 3-ribbet ved grunden og af rørets længde. Kronen 8-10mm, flødefarvet, ca. 2 x bægeret. IV-VI. Dyrket og forvildet.

T. echinatum Bieb. Pindsvinekløver. 10-60cm. Hovederne 8-15mm. Nederste bægertand stiv og tornagtig. Kronen lyserød eller flødefarvet, mindst 2 x bægeret, 8-12mm. V-VII. A B C K

T. leucanthum Bieb. Hvidblomstret kløver. 15-30cm. Tæt udstående håret. Hovederne langstilkede, ofte parvise, hvidhårede forneden. Frugtbægerets tænder udstående. Kronen 6-8mm. IV-V. A B C K

T. squamosum L. Pigget kløver. 10-40cm. Bægertænderne udstående og fortykkede i frugt, tornagtige, den nedre 2 x resten. Kronen blegrød, lidt længere end bægeret. IV-V. A B

T. squarrosum L. Krogkløver. 20-80cm. Ofte opret. Bægeret som hos squamosum. Kronen blegrød eller hvid, ca. = bægeret. A B C K

Trifolium obscurum Savi Krukkekløver. 20-60cm. Opret. Småbladene 15-20x7-12mm. Hovederne indtil 20mm. Bægertænderne lancetformede, 3-5-ribbede forneden. Kronen 4-5mm. V-VI. A (Panni) B K (Avell.)

T. subterraneum L. Ankerkløver. 3-15cm. Liggende. 2-5 hvidlige blomster på 8-14mm, omgives senere af flere golde bægre. Modne hoveder ofte underjordiske. IV-VI. A B C K

Dorycnium. Hanefod. Blomsten hvid eller lyserød med mørk køl.

1. Kronen 13-16mm. Tæt udstående håret ..... hirsutum
   " 3-7mm. Tiltrykt dunet 2.
2. Småbladene alle ustilkede, fingrede ..... pentaphyllum
   Bladskaftet 5-10mm rectum

Dorycnium hirsutum (L.) Ser. Håret hanefod. 20-40cm. Kort bladstilk. Hovederne med 5-10 blomster. V-VI. A B C K

D. rectum (L.) Ser. Opret hanefod. 30-150cm. Hovederne med 15-30 blomster. Grøfter og sumpe. IV-V. A B C K

D. pentaphyllum Scop. Snerrehanefod. 10-30cm. De smalle blade giver planten et snerrelignende præg. Kronen 3-5mm. V-VII. ABCK
ssp. suffruticosum (Vill.) Rouy: Stænglens øvre hår alle tiltrykte. Hovedet med 5-15 blomster. Meget korte blomsterstilke.
ssp. herbaceum (Vill.) Rouy: Stænglen foroven også med enkelte lange, udstående hår. Hovedet med 12-25 blomster.

Lotus. Kællingetand.

1. Flerårig ..... 2.
   Enårig 7.
2. Bægeret tolæbet med korte sidetænder. Rødlilla kølspids .. 3.
   Bægertænderne nogenlunde lige store 4.
3. Sidestillede bægertænder butte, meget kortere end de øvre. Kronen 8-14mm ..... cytisoides
   Sidestillede bægertænder spidse, kun lidt kortere end de øvre. Kronen 12-18mm creticus
4. Øvre småblade smalle, 4-8 x så lange som brede ..... tenuis
   " " bredere 5.
5. Bægertænderne mindst 1½ x bægerrøret ..... preslii
   " højst 1½ x " 6.
6. Stænglerne fyldte. Hovederne med 2-7 blomster corniculatus
   " hule. Hovederne med 5-12 " uliginosus
7. Bægeret tolæbet med korte sidetænder ..... 8.
   Bægertænderne nogenlunde lige store 9.
8. Bladskaftet under ½ x de nedre småblade ..... halophilus
   " over ½ x " " " ornithopodioides
9. Bægertænderne 3-4 x bægerrøret ..... parviflorus
   " højst 1½ x røret 10.
10. Bælgen 4-8mm bred og tyk, med furet ryg ..... edulis
    " 1-2mm bred, uden fure 11.
11. Bælgen 2-3 x bægeret, 10-16mm ..... subbiflorus
    " over 3 x bægeret, 15-60mm 12.
12. Kronen hvid eller blegrød med lilla køl .... conimbricensis
    " gul angustissimus

Lotus tenuis W.& K. Smalbladet kællingetand. V-VIII. A B C K

L. corniculatus L. Alm. kællingetand. IV-IX. A B C K

L. uliginosusSchkuhr Sumpkællingetand. V-VII. A B C K

L. preslii Ten. Rudekællingetand. 20-50cm. Hovederne med 1-6 blomster på 10-15mm med stilke på ca. 1½mm. V-VII. A B C K

L. parviflorusDesf. Krumstilket kællingetand. Lådden. Frugtstilkene krumme. Bælgen ca. = bægeret, 4-5x1½mm. IV-VI. B C K

L. subbiflorusLag. Håret kællingetand. Tæthåret. Hovederne med 2-4 blomster. IV-VI. A (Pen. Salent.) K

Lotus angustissimus L. Tveblomstret kællingetand. Hovederne med (1)2-3 blomster. Bælgen 15-30mm. IV-VI. A B C K

L. edulis L. Tyk kællingetand. Blomsterne 1-2 sammen. Let kendelig ved sin tykke bælg. II-V. A B C K

L. conimbricensis Brot. Hvid kællingetand. Bælgen 20-60x1-2mm, seglkrummet. IV-VI. C B (Muro) K (Ogliastro i Salern.)

L. cytisoides L. Skævtandet kællingetand. 5-20cm. Noget forveddet. Bladene let kødede og gråfiltede. Kølen med rødlilla spids. Fanen udrandet. Vingerne lidt længere end kølen. IV-VI. A B C K

L. creticus L. Sølvkællingetand. 10-40cm. Kronen 12-18mm. Fanen hel. Vingerne meget længere end kølen. Klitter. III-VI. A B C K

L. halophilus Boiss.& Spr. Strandkællingetand. Opstigende og lådden. Bladskaftet ofte ganske kort. Bælgen 2-3cm, let knudret, krum fortil. Fugtige strande. III-V. A (Taranto) C

L. ornithopodioides L. Fuglekloskællingetand. Blomsterne 2-3 sammen. Bælgene 2-3cm, knudrede og let krumme. IV-V. A B C K

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth Alm. kantbælg. V-VII. A

T. biflorus (Desc.) Ser. Orange kantbælg. 30-60cm. Enårig. 1-2 langstilkede, orangegule blomster sammen på 16-20mm. Bælgen 25-35x5mm, med 4 vinger på 1mms bredde. III-V. C

T. purpureus Moench Rød kantbælg. 10-40cm. Duent enårig. 1-2 mørkerøde blomster sammen på 15-22mm. Bælgen glat, 3-6cm med 4 2-4mm brede, krusede vinger. IV-V. A B C K

Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi Skjoldbælg. 5-25cm. Enårig. Nedre blade enkle, øvre med 2-3 par mindre småblade. Kronen 5-7 mm, gul. Bælgen 10-15mm, nyre-skiveformet. III-IV. A B C K

Securigera securidaca (L.) Deg.& Dörfl. Hagebælg. 30-100cm. Enårig. 4-7 par småblade. Langstilkede hoveder med 4-8 gule blomster. Bælgen 5-10cm, tilspidset i et hageformet næb på 1-3cm. 0-1000m. IV-VI. A B C K

Anthyllis. Rundbælg.

1.	Busk med forveddede grene	2.
	Urter	3.
2.	Grenene tornede. Bladene enkle eller trekoblede	hermanniae
	Ikke tornet. Bladene uligefinnede	barba-jovis
3.	Bægertænderne omtrent = bægerrøret	montana
	Bægeret korttandet	4.
4.	Bladene usymmeterisk finnede. Bægertænderne ens	tetraphylla
	" symmetrisk finnede. " uens	vulneraria

Anthyllis hermanniae L. Tornet rundbælg. 10-50cm. Busk med vredne grene med tornspidsede ender. Bladene 10-13mm. Blomsterne 1-3 sammen i bladhjørnerne i en mellembrudt klase. V-VII. A C

A. barba-jovis L. Jupiterskæg. 30-150cm. 6-9 par småblade med sølvhvide undersider. Endestillede hoveder med oftest over 10 lysegule blomster. Tørre kystklipper. IV-V. A K

A. montana L. ssp. atropurpurea (Vukot.) Pign. Bjærgrundbælg. 4-30cm. Flerårig. 8-20 par småblade. 1 stængelblad. Endestillet hovede med svøbblade og mørklilla blomster. 1300-2500m. B C K

A. vulneraria L. Alm. rundbælg. V-VIII. A B C K. 4 underarter:
ssp. vulnerarioides (All.) Arc.: Bægeret med udstående hår (eneste ssp.), 8-9mm. 10-15cm høj. Stænglen udstående håret.
ssp. maura (Beck) Lindb.: Bægeret 14-17mm. Bladene jævnt fordelte langs stænglen.
ssp. praepropera (Kerner) Bornm.: Bægeret mest 12-13½mm. Stængelbladene mest samlede forneden, de nedre med 1-3 småblade.

ssp. weldeniana (Rchb.) Cullen: Bægeret 10-12mm. Stængelbladene mest samlede forneden, de nedre med 7-11 ret ens småblade.

Anthyllis tetraphylla L. Blærerundbælg. Liggende enårig. 5 meget uens småblade. Blomsterne i akselstillede nøgler. Bægeret opblæst og i frugt indtil 10-14x10mm. III-V. A B C K

Ornithopus compressus L. Fladtrykt fugleklo. 3-30cm. Gulblomstret enårig. Øvre blade siddende. Hovederne med et finnet højblad under sig. 7-18 par småblade. Bælgen m.m. fladtrykt. IV-VI. ABCK

O. pinnatus (Miller) Druce Gul fugleklo. 10-40cm. Gulblomstret enårig. Alle blade stilkede med 3-7 par småblade. Hovederne uden blade under sig. Bælgen trind. IV-VI. C K

Coronilla. Kronvikke.

1. Nedre blade enkle eller trekoblede. Stort endesmåblad .... 2.
   " " uligefinnede med ret ens småblade 3.
2. De øvre blade hele eller trekoblede ..... scorpioides
   " " " finnede med 2-4 par småblade repanda
3. Kronen hvid eller lyserød ..... 4.
   " gul 5.
4. Flerårig. Hovedet med 10-20 blomster på 10-15mm ..... varia
   Enårig. Hovedet med 3-6(9) " " 4-7mm cretica
5. Småbladene smalt hindekantede. 5-25(50)cm høje ..... 6.
   " ikke " . Buske 7.
6. Småbladene kortstilkede. Fodflige 3-8mm, affaldende vaginalis
   " siddende. Fodfligene 1mm, blivende minima
7. Fanens negl 2-3 x bægeret ..... emerus
   " " ca. 1 x bægeret 8.
8. Stænglen sivagtig, med affaldende blade ..... juncea
   " ikke sivagtig. Bladene ikke affaldende valentina

Coronilla emerus L. Perlebælg. 2-4 par småblade på 1-2cm. 3-8 blomster sammen på 14-20mm. Bælgene 5-14cm, hængende. A B C K
ssp. emerus: Bladene mørkegrønne. Skærmene 3-4-blomstrede. Bælgens led butkantede. Bælgen ofte under 8cm. IV-VI.
ssp. emeroides (Boiss.& Spr.) Hayek: Bladene lidt blågrønne. Op til 8 blomster sammen. Bælgen oftest 7-14cm, med trinde led.

C. valentina L. Buskkronvikke. 30-70cm. Bladene stedsegrønne og blågrønne. 4-12 blomster i langstilkede skærme. I-V. A B C K
ssp. valentina: 3-8 par småblade. Bælgen oftest over 2cm, med 4-8 led. A B C K
ssp. glauca (L.) Batt.: 2-3 par småblade. Bælgen oftest under 2cm, med 1-3 led. B K

C. vaginalis Lam. Skedekronvikke. 5-25(50)cm. Fodfligene sammenvoksede, urteagtige med hindeagtig spids, på størrelse med småbladene. (Ligner som ung Hippocrepsi comosa, der har mindre og frie fodflige). 3-5 par småblade. V-VIII. B C K

C. minima L. Liden kronvikke. 5-30cm. Fodfligene sammenvoksede og hindeagtige. 2-6 par siddende småblade. Kronen 5-8mm. V-VII. K

C. juncea L. Sivkronvikke. 20-200cm. Lange stængelled. 2-3 par linjeformede til aflange småblade. Kronen 6-8½mm. Skærmene langstilkede og med 2-6 blomster. IV-V. A (Gargano, Lecce-området)

C. varia L. Giftvikke. VI-VIII. B K

C. cretica L. Hvid kronvikke. 10-90cm. 3-8 par småblade. Hovederne med 3-6(9) hvide eller lyserøde blomster på 6-7mm. Bælgen 3-8cm, m.m. ret, med 5-kantet tværsnit. V-VI. A (Gargano)

C. scorpioides (L.) Koch Skorpionsvikke. 5-20cm. Enårig. Bladene elliptiske, enten enkle eller også med 2 små, runde sidesmåblade. Bælgene krumme, skorpionshaleagtige. IV-V. A B C K

Coronilla repanda (Poiret) Guss. Bølget skorpionsvikke. 5-20cm. Nedre blade enkle, øvre med 2-3 par småblade. Ellers som foregående. 0-600m. IV-V. A K

Hippocrepis. Hestesko.

1. Flerårig. Hovederne med 4-12 blomster ..... 2.
   Enårig. Blomsterne 1-5 sammen 3.
2. Bælgen med røde og brune småvorter, 15-30x2-3mm ..... comosa
   " " hvide småvorter, 30-40x1-2mm glauca
3. Blomsterne enlige ..... unisiliquosa
   " 2-5 sammen ciliata

Hippocrepis glauca Ten. Blågrøn hestesko. 5-20cm. 4-7 par noget blågrønne småblade på 2-10x½-3mm med tæt hviddunet underside. Fanens negl ca. så lang som bægeret. V-VII. A B C K

H. comosa L. Alm. hestesko. 5-20cm. 3-8 par småblade på 5-15 x 2-4mm med glat til tætdunet underside. Fanens negl ofte tydeligt længere end bægeret. V-VIII. A B C K

H. ciliata Willd. Børstehestesko. 5-15cm. Oftest glat. Kronen 3-5mm. Bælgen 15-25x2½-4mm, med lange småvorter langs randen og kredsformede åbninger mellem leddene. III-V. A B C K

H. unisiliquosa L. Enblomstret hestesko. 5-35cm. Blomsterstilkene indtil 5mm. Kronen 4-7mm. Bælgen 15-40x4-5mm, m.m. uden småvorter. III-V. A B C K

Scorpiurus. Skorpionshale. Enårig med enkle, m.m. spatelformede blade. Blomsterne gule med brunåret fane, 1-5 sammen. Bælgen uregelmæssigt snoet, med længderibber og tit med torne og knuder.

S. muricatus L. Flerblomstret skorpionshale. 5-15(40)cm. Hovederne med 2-5 blomster. Bælgen glat eller med knuder eller torne. 0-1200m. IV-V. A B C K

S. vermiculatus L. Enblomstret skorpionshale. Blomsterne 1(2) sammen. Bælgen med paddehatformede knuder. IV. A (Gargano)

Hedysarum. Hanekløver. Bælgen med 2-4 skiveformede led.

H. coronarium L. Italiensk hanekløver. 30-100cm. Liggende til opstigende flerårig. Klasen med 10-35 røde blomster på 12-15mm. 3-5 par småblade. Bælgen med 2-4 led. IV-V. A B C K

H. glomeratum Dietrich Rødstænglet hanekløver. 10-30cm. Liggende enårig. Klasen med 2-10 røde blomster på 14-20mm. 7-10 par småblade. Bælgen mest 2-leddet. 0-1000m. III-V. A B C K

Onobrychis. Fruespejl.

1. Enårig ..... 2.
   Flerårig 3.
2. Kronen 10-12mm. Randtornene bredt trekantede .. aequidentata
   " 4-7mm. " smalle, 3-5mm caput-galli
3. Bælgen lådden, dens hår mindst ½ mm ..... alba
   " dunet, dens hår højst ½ mm 4.
4. Fanen ca. 2mm kortere end kølen. Liggende/opstigende montana
   " ca. lig kølen. Opret viciifolia

Onobrychis alba (W.& K.) Desv. Hvidt fruespejl. 40-70cm. Kronen 8-16mm, hvid eller lyserød. Stængelgrunden medrødlige bladrester.
ssp. alba: Bægeret 0,8-0,9 x kronen, denne 8-10(12)mm. Bælgens tænder 2(3)mm. A (Gargano)
ssp. echinata (Guss.) P.W.Ball: Bægeret 0,8-0,9 x kronen, denne 12-16mm, med en rød plet. Bælgens tænder 3mm. A B
ssp. tenoreana (Lacaita) Pign.: Bægeret ½ x kronen, denne 12-13 mm. Bægeret hvidhåret. Bælgens tænder 1-1½mm. 1000-1700m. K
ssp. laconica (Orph.) Hayek: Bægeret ½ x kronen, denne 10-12mm. Bægeret brunhåret. Bælgens tænder 1-1½mm. A C K

Onobrychis montana DC. Bjærgfruespejl. 20-50cm. Vingerne 4-6mm, næsten så lange som bægeret. Bælgen med tynde torne på 1-2mm. 1000-2100m. VI-VIII. K

O. viciifolia Scop. Esparsette. 40-70cm. Vingerne 2-3(4½)mm, tydeligt kortere end bægeret. Bælgen med tykke torne på ½-1mm eller næsten tornløs. V-VIII. A B C K

O. caput-galli (L.) Lam. Hanehovedfruespejl. 5-45cm. 5-9 par småblade. Klasestilken mest kortere end bladet. Bælgen 6-10mm med 4-9 randtorne samt langtornede sider. IV-V. A B C K

O. aequidentata (Sm.) D'Urv. Stortandet fruespejl. 5-45cm. 5-8 par småblade. Klasestilken mest 2-3 x bladet. Bælgen 6-12mm med 4-7 tænder på 2-5mm. IV-V. A B C K

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L. Brun surkløver. 5-30cm. Liggende, ofte lillaanløben. Småbladene 5-18x8-23mm. Gule blomster. Kronbladene 4-7mm. Fodfligene ørede. Alle blade spredte. IV-VI. A B C K

O. fontana Bunge Rank surkløver. 10-30cm. Opret. Bladene mest modsatte eller i krans, uden fodflige. Kronbladene gule. V-X. B

O. acetosella L. Skovsyre. Hvide blomster. IV-VI. A B C K

O. pes-caprae L. Svovlgul surkløver. 5-15cm. Blade og skærmstilke udgår fra en underjordisk stængel. Skærmene med 5-12 store, svovlgule blomster på 20-22mm. XI-V. A C K

GERANIACEAE

Geranium. Storkenæb.

1. 1-2-årig ..... 2.
   Flerårig 11.
2. Bægeret opret under blomstringen ..... 3.
   " m.m. udstående 5.
3. Bladets omrids rundt ..... lucidum
   " " femkantet 4.
4. Støvknapperne rødbrune. Kronen længere end bægeret robertianum
   Støvknapperne gule. Kronen ca. = bægeret purpureum
5. Bægeret langt brodspidset ..... 6.
   " kort " 8.
6. Planten kirtelhåret. Bladfligene brede ..... lanuginosum
   " lidet kirtlet. Bladfligene linjeformede 7.
7. Blomsterstilken 5mm, i frugt 15mm ..... dissectum
   " 2-4cm columbinum
8. Kronbladene hele ..... rotundifolium
   " kløvede 9.
9. Stængler og bladstilke ensartet korthårede ..... pusillum
   " " " med korte og lange hår 10.
10. Nederste skærmstilk lig eller længere end bladet .. brutium
    " " kortere end bladet molle
11. Bægeret opret. Kronbladene hele ..... macrorhizum
    " udstående 12.
12. Bladet med rundt omrids og butlappet ..... 13.
    " " kantet omrids, ofte spidslappet 14.
13. Frugterne hårede og jævne ..... pyrenaicum
    " glatte og tværstribede 10.
14. Kronbladene m.m. hele eller også bølgede ..... 15.
    " dybt udrandede eller kløvede 17.
15. Kronbladene nedbøjede ..... reflexum
    " opad- og udadbøjede 16.
16. Kronen bleglilla og mørkåret. Frugten dunet asphodeloides
    " mest rødlilla. Kirteldunet frugt silvaticum
17. Blomsterne enlige ..... sanguineum
    " parvise 18.

18. Med nogle grundstillede blomsterstilke ..... subcaulescens
    Uden grundstillede blomsterstilke 19.
19. Bladafsnittene æg-rudeformede og tandede ..... versicolor
    " (1)2 x fjersnitdelte tuberosum

Geranium macrorhizum L. Klippestorkenæb. 20-50cm. Bladene 8-10cm brede, med mest 7 fjerlappede flige. Bægeret rødligt. Kronbladene 15-17mm, blodrøde. 400-1700m. V-VI. K

G. subcaulescens DC. Mørkt storkenæb. 10-20cm. Grundbladene m.m. grå, 1½-4cm brede. Kronbladene 10-16mm, mest mørkt rødlilla, med mørkere årer og ofte sortlilla grund. 1400-2100m. VII-VIII. B C K

G. sanguineum L. Blodrødt storkenæb. V-X. A B C K

G. silvaticum L. Skovstorkenæb. VI-VIII. B C

G. versicolor L. Året storkenæb. 15-50cm. Bladene 5-8cm brede. Kronen noget trompetformet. Kronbladene 15-16mm, bleglilla og mørkårede. 500-1400m. IV-VI. B C K

G. reflexum L. Nedbøjet storkenæb. 40-70cm. Grundbladene 6-14cm brede, med rudeformede, tandede afsnit. Frugtstilkene nedbøjede. Kronbladene med bølget rand, mat- eller rødlilla. K (M. Maio)

G. tuberosum L. Knoldstorkenæb. 20-50cm. Med rodknold. Ingen stængelblade. Bægeret 4-6mm. Kronbladene 8-12mm. II-V. A B

G. asphodeloides Burm.f. Tenstorkenæb. 30-75cm. Med tenformede rødder. Bladene med 5-7 kileformede afsnit med trespidset forkant. Kronbladene 13-15mm. 800-1500m. V-VI. A B C K

G. lanuginosum Lam. Brandstorkenæb. 10-30cm. Stænglerne med udstående uldhår og kortere, klæbrige kirtelhår. Kronbladene 7½mm, blålilla med hvid grund. 500-1000m. V-VII. B K

G. pyreniacum Burm.f. Pyrenæisk storkenæb. IV-VII. A B C K

G. rotundifolium L. Rundbladet storkenæb. 5-40cm. Stængler og blade med korte og lange hår samt kirtelhår. Blomsterstilkene mørkkirtlede. 0-1200m. V-X. A B C K

G. molle L. Blødt storkenæb. Bladene grågrønne. Kronbladene 5-6 mm. III-IX. A B C K

G. brutium Gasp. Grønt storkenæb. 20-70cm. Ligner foregående, men bladene grønne og kronbladene (6)9-11mm. IV-V. B C K

G. pusillum L. Lidet storkenæb. V-X. A B C K

G. columbinum L. Storbægret storkenæb. III-X. A B C K

G. dissectum L. Kløftet storkenæb. IV-IX. A B C K

G. lucidum L. Skinnende storkenæb. Planten skinnende, m.m. glat. IV-IX. A B C K

G. robertianum L. Stinkende storkenæb. V-X. A B C K

G. purpureum Vill. Purpurstorkenæb. 5-20cm. Ligner foregående, men ofte mindre, med stærkere rødlilla blomster. Frugten med 4 kraftige tværribber nær spidsen (1-2 hos rob.). IV-XI. A B C K

Erodium. Hejrenæb.

1. Grundbladene delte til skaftet for det meste af bladet ... 2.
   " højst med 1(2) par frie småblade 6.
2. Små lapper på stilken mellem bladafsnittene ..... 3.
   Ingen " " " " " 4.
3. 1-2-årig ..... ciconium
   Flerårig alpinum
4. Stængelløs flerårig ..... acaule
   Med bladet stængel, oftest enårig 5.

5. Bladafsnittene højst halvt indskårne ..... moschatum
" dybt delte cicutarium
6. Flerårig ..... 7.
1-2-årig 9.
7. Frugtens næb tæt fjerhåret. 2-4 blomster sammen glaucophyllum
" " spredt stivbørstet. 3-14 blomster sammen 8.
8. Bladene med 1-2 par helt frie afsnit ..... alpinum
" højst ½ delte nervulosum
9. Skærmene med 2 brede støtteblade ..... laciniatum
" " 3-flere " 10.
10. Frugten 3-6mm med et næb på 1-4½cm. Røde kronblade ..... 11.
" 8-15mm " " " " 5-11cm. Blålilla kronblade 13.
11. Frugtens topgrube med en dyb fure under sig ..... malacoides
" " uden fure 12.
12. Næbbet 3-4cm ..... chium
" 1-2cm alnifolium
13. Kronen 8-9mm, omtrent lig bægeret ..... ciconium
" ca. 15mm, længere end bægeret botrys

Erodium glaucophyllum (L.) L'Hér. Blågrønt hejrenæb. 5-45cm. Bladene blågrønne, ægformede, m.m. lappede. Kronbladene lilla, 10-12 mm. Frugtens næb 8cm. III-IV. A B (mellem Taranto og Metaponto)

E. alnifolium Guss. Ællebladet hejrenæb. 10-50cm. Nedre blade m.m. runde, øvre ægformede, lidet delte. Kronen blegrød, af bægerets længde, 6mm. III-VI. A B C K

E. chium (L.) Willd. Lappet hejrenæb. 5-50cm. Bladene ægformede, meget forskelligt indskårne. Kronblade 5-9mm, rødlilla, lidt længere end bægeret. II-V. A B C K

E. laciniatum (Cav.) Willd. Fliget hejrenæb. 7-50cm. Bladene aflange til bredt ægformede, meget forskelligt indskårne, fra savtakkede til næsten 2 x fligede. Mest på strande. III-V. A B C K

E. malacoides (L.) L'Hér. Blødt hejrenæb. 10-60cm. Bladene oftest ægformede med hjærteformet grund, tandede eller svagt 3-lappede, undertiden mere delte. II-XI. A B C K

E. botrys (Cav.) Bertol. Langhåret hejrenæb. 10-40cm. Nedre blade ægformede, fra lappede til 1-2 x fligede; de øvre ofte 2 x fligede. Frugtens topgrube med 2 furer under sig. IV-V. A B C K

E. nervulosum L'Hér. (E. gussonii) Katosthejrenæb. 15-30cm. Stænglen langt hvidhåret. Bladene bredt ægformede, ofte 3-lappede. Store, mørkebrune fodflige. Næbbet 4-6cm. IV-V. A B C K

E. alpinum L'Hér. Alpehejrenæb. 10-20cm. Bladene mest fligede, sjældnere snitdelte. Bægerbladene 8-10mm, kirtelhårede. Kronbladene 10-14mm, lilla. Næbbet 4-6cm. 1300-1800m. VI-VII. B

E. ciconium (L.) L'Hér. Mellembrudt hejrenæb. 10-70cm. Bægeret 10-12mm, med en stak på 4-6mm. Kronen 7-8mm, blå eller blålilla. Frugtens topgrube uden fure under sig. III-V. A B C K

E. moschatum (L.) L'Hér. Moskushejrenæb. 10-50cm. Moskuslugtende. Kronen 13-14mm, rødlilla. Frugterne udstående brun- eller hvidhårede. Næbbet 2-4½cm. Topgruben med 1 fure under sig. I-V. A B C K

E. cicutarium (L.) L'Hér. Alm. hejrenæb. III-XI. A B C K

E. acaule (L.) Bech.& Th. Stængelløst hejrenæb. 5-12cm. Ligner cicutarium, men flerårig med fortykket, forveddet rod. Kronen 7-12mm. Frugtens næb 4-4½cm. III-VI. A B C K

ZYGOPHYLLACEAE

Fagonia cretica L. Haneklo. 10-40cm. Næsten glat, liggende flerårig. Bladene 3-koblede, lancetformede, med tornede fodflige. Kronen rødlilla, 6-7mm. Akselstillede blomster. IV-VI. C

Peganum harmala L. Hermelrude. 30-50cm. Stærktgrenet, opret flerårig med spredte, uregelmæssigt 2-3 x smalfligede blade. Enlige, endestillede blomster. Linjeformede bægerblade på 7-10mm. Kronbladene hvidgrønne, 10mm. 15 støvdragere. V-VI. A (Tavoliere)

Tribulus terrester L. Korstorn. 10-60cm. Dunet, liggende enårig. Bladene modsatte, ligefinnede med 5-8 par småblade. Stilkede, gule blomster fra bladhjørnerne. Kronen 4mm. Frugten tornet, kan minde om et femtakket malteserkors. V-X. A B C K

LINACEAE

Linum. Hør.

1. Kronbladene blå ..... 2.
   " røde, gule eller hvide 4.
2. Støvfangene hovedformede ..... tommasinii
   " linjeformede 3.
3. Mest 2-flerårig, flerstænglet. Kapslen 4-6mm ..... bienne
   Enårig, mest enstænglet. Kapslen 6-9mm usitatissimum
4. Kronbladene gule ..... 5.
   " røde eller hvide 8.
5. Øvre blade med 2 kirtler ved grunden. Kronbladene 15-20mm 6.
   Bladene uden kirtler. Kronbladene 4-12mm 7.
6. Flerårig. Bladranden jævn ..... capitatum
   Enårig. Bladranden ru nodiflorum
7. Bladranden jævn ..... trigynum
   " ru strictum
8. Alle blade modsatte. Kronbladene hvide ..... catharticum
   Alle eller øvre blade spredte 9.
9. Planten tæt kirteldunet, klæbrig foroven ..... viscosum
   " ikke klæbrig, som oftest glat 10.
10. Enårig. Bægeret ikke kirtelrandhåret ..... decumbens
    Flerårig. Bægeret kirtelrandhåret tenuifolium

Linum capitatum Kit. Hovedhør. 10-40cm. Med udstrakte grene fra grunden, der ender i bladrosetter. Blomsterstanden næsten hovedformet, med 5-10(15) blomster. 1500-2300m. VI-VII. B C K

L. nodiflorum L. Soløjehør. 10-40cm. Glat med 1-få vingede stængler. Kvasten meget åben med klaseagtige grene. V-VI. K

L. tommasinii Rchb. 20-30cm. De golde skuds blade tætstillede og ofte m.m. udstående. Frugtstilkene mest nedbøjede. VI-VII. A B

L. decumbens Desf. Rosenhør. 10-25cm. Opstigende, blågrøn. Bægeret 7-9mm, bredt hindekantet forneden, randhåret foroven. Kronen 13-16mm, rød eller lyserød med hvid grund. IV-V. A B K (Capri)

L. bienne Miller Toårig hør. 10-50cm. Bladene linjeformede, 1-1½mm brede. Indre bægerblade hindekantede og randhårede, ydre helrandede. V-VII. A B C K

L. usitatissimum L. Alm. hør. V-VII. Dyrket og forvildet.

L. viscosum L. Klæbrig hør. 30-50cm. Dunet flerårig. Bladene (3)5-7mm brede, 3-5-ribbede, kirtelrandhårede. Lyserød krone. A K

L. trigynum L. Fin hør. 9-30cm. Opret og grenet. Bladene linjeformede. Bægeret 5mm, kortkirtlet. Kronen 6mm. III-V. A B C K

L. tenuifolium L. Smalbladet hør. 20-40cm. Opstigende med forveddet grund. Bladene linjeformede, tætsiddende på de golde skud. Kronbladene 15mm, lyserøde eller næsten hvide. V-IX. A B C K

L. strictum L. Rubladet hør. 10-60cm. Som trigynum, men bægeret randhåret kirtlet. Kronen 6-12mm. IV-V. A B C K. 2 underarter:
ssp. strictum: Blomsterstanden aksformet. Blomsterne m.m. siddende.
ssp. corymbulosum (Rchb.) Rouy: Blomsterstanden halvskærmformet. Blomsterstilkene tynde, mindst af bægerets længde.

Linum catharticum L. Vild hør. V-VII. A B C K

EUPHORBIACEAE

Andrachne telephioides L. Avneblad. 20-40cm. Stærktgrenet, glat og blågrøn flerårig. Bladene spredte, helrandede, 4-6x2-3½mm, bruskrandede med sølvskinnende akselblade. Blomsterne enlige eller få sammen i de øvre bladhjørner, 5-6-tallige med gule kronblade. Kugleformet, 3-delt frugt på 2-3mm. III-VII. A B?

Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. Lakmusplante. 10-30cm. Nærmest mældeagtig, tæt stjærnefiltet, grågrøn enårig. Frugten dog tydeligt tretallig og dækket af skjoldformede hår. Bladene æg- til rudeformede, bugtet-tandede til helrandede. VI-VIII. A B C K

C. obliqua (Vahl) Juss. Hvid lakmusplante. 15-30cm. Som foregående, men hvidlig og meget tæt stjærnefiltet. Bladene med afskåret til svagt hjærteformet grund. VI-VIII. C (gl. fund)

Mercurialis annua L. Enårig bingelurt. 10-50cm. Glat eller svagt håret, oftest opret og grenet enårig. Bladene bredt lancetformede, afrundet savtakkede, modsatte, 1½-5cm. Mest tvebo. Oprette hanaks i de øvre bladhjørner. Hunblomsterne i nøgler. I-XII. A B C K

M. perennis L. Skovbingelurt. IV-VI. A B C K

Acalypha virginica L. Nældeblad. 10-30cm. Dunet, bingelurtsagtig enbo enårig med spredte blade. Disse 2-10cm, bredt lancetformede, rund-savtakkede. Stilken 1/3-1/2 x pladen. Blomsterne i små, akselstillede aks, de 4-tallige hanblomster øverst og de 3-5-delte hunblomster nederst. VII-X. A (Bari-området)

Ricinus communis L. Kristpalme. -4m. Enårig eller busk. Store, stjærneformede blade med 5-9 lancetformede takker, 20-30cm brede. Blomsterne i smalle, oprette toppe. Frugterne 1-2cm, runde og småpiggede. VII-X. Dyrket og forvildet.

Euphorbia. Vortemælk.

1. Bladene modsatte ..... 2.
   " spredte 6.
2. Opret. Bladene 4-radede, uden akselblade, 3-12cm lathyris
   Liggende/opstigende enårige. 2-radede blade med akselblade 3.
3. Stænglen mest opstigende. Bladene 10-30mm ..... nutans
   " liggende. Bladene 3-11mm 4.
4. Bladstilken 2-3mm. Kapslen 4-5mm ..... peplis
   " ½-1mm. " 1-2mm 5.
5. Kapslen udstående håret eller glat ..... chamaesyce
   " tiltrykt håret maculata
6. Kirtlerne m.m. afrundede, med udadbuet yderkant ..... 7.
   " med indadbuet eller ret yderkant 22.
7. Enårig ..... 8.
   Flerårig 14.
8. Kapslen mest uopspringende, næppe furet, 3-4mm .. akenocarpa
   " opspringende, furet 9.
9. Kapslen jævn ..... 10.
   " vortet 12.
10. Kapslen vinget, hver klap med 2 bølgede vinger pterococca
    " uvinget 11.
11. Bladene savtakkede i deres øvre halvdel ..... helioscopia
    " helrandede phymatosperma
12. 2 rækker vorter på hver kapselklap ..... cuneifolia
    Kapslens vorter jævnt fordelte 13.
13. Skærmens støtteblade ulig højbladene ..... platyphyllos
    " " lig " serrulata
14. Kapslen jævn ..... 15.
    " vortet 16.
15. Urt. Kapslen tæt dunet ..... corallioides
    Busk. " glat dendroides

16. Skærmene mangestrålede ..... palustris
" med 3-5(1-6) stråler 17.
17. Busk. Ældre grene m.m. blivende, lidt tornagtige spinosa
Urter 18.
18. Frøene fintknudrede. Kapslen oftest håret ..... pubescens
" jævne. Kapslen glat 19.
19. Bladene 8-9cm lange. Med mange ekstrastråler ceratocarpa
" 1-3½cm 20.
20. Kapslens vorter lange og tynde ..... gasparrinii
" " kun lidt længere end brede 21.
21. Liggende til opstigende. Bladene ca. 1½cm ..... apios
Opret. Bladene 2-3½cm verrucosa
22. Enårig ..... 23.
Flerårig 27.
23. Højbladene lancetformede ..... exigua
" ægformede til runde 24.
24. Bladene brede: bredt lancetformede til næsten runde ... 25.
" smalle: smalt " til linjeformede 26.
25. Kapslen med 2 vinger på hver klap ..... peplus
" uvinget falcata
26. Kapslen fintprikket, dybt furet, med afrundede klapper segetalis
Kapslen m.m. jævn, svagt furet, med kølede klapper aleppica
27. Højbladene sammenvoksede ved grunden ..... 28.
" indbyrdes frie 29.
28. Kapslen med udstående hår ..... characias
" glat amygdaloides
29. Blade og støtteblade skarpt savtakkede ..... serrata
" " " helrandede eller finttandede 30.
30. Kapslen 4½-8mm bred. Noget kødede planter ..... 31.
" 2½-4½mm bred 33.
31. Kirtlernes horn ikke udvidede. Strandplante ..... paralias
" " udvidede. Blågrønne klippeplanter 32.
32. M.m. nedliggende. Bladene omvendt ægformede ... myrsinites
M.m. opret. Bladene lancetformede rigida
33. Mest 8-18 skærmstråler ..... 34.
3-5(6) skærmstråler 35.
34. Bladene lancetformede, læderagtige, 4-9mm brede nicaeensis
" linjeformede, tynde, 1-3mm brede cyparissias
35. Frøets fedtlegeme bådformet ..... terracina
" " anderledes 36.
36. Bladene omvendt ægformede til rundagtige ..... barrelieri
" linje-lancetformede pinea

Euphorbia nutans Lag. Nikkende vortemælk. 15-40cm. Stærkt gaffelgrenet. Stænglen først dunet foroven, ofte rødlig. Bladene 6-8mm brede, finttandede, ofte med en rødlig plet. VII-X. K

E. peplis L. Sandvortemælk. 5-20cm. Bladene lidt kødede, blågrønne, meget usymmetriske. Kapslen næsten glat. V-X. A K

E. chamaesyce L. Skævbladet vortemælk. 5-30cm. Bladene usymmetriske, spidsen but eller udrandet. VI-X. A B C K

E. maculata L. Pletvortemælk. 5-20cm. Stænglerne dunede. Bladene med skævt afskåret grund, finttandede nær spidsen, oftest med en lilla plet midtpå. V-X. A

E. dendroides L. Trævortemælk. 1-3m. Halvkugleformet busk. Bladene 2½-6½cm x 3-8mm, kun på årsskuddene. Skærmene med 5-8 stråler. Støttebladene lig stængelbladene. Kystnær. XI-IV. A B C K

E. serrata L. Savtandet vortemælk. 20-50cm. Opret, lidt blågrøn. Øvre blade med bredt ægformet grund. Højbladene gule. Kapslen 5-6mm. III-V. K (Gola d'Itri ved Napol.)

E. corallioides L. Uldvortemælk. 40-70cm. Bladene aflange og

butte med finttandet spids, hårede til filtede, ofte rødligt anløbne. Kapslen tætdunet. Fugtige kløfter og tæt skov. V-VII. BCK

Euphorbia akenocarpa Guss. Børstevortemælk. 15-45cm. Bladene spatelformede, oftest butte, med finttandet spids. 2-5 skærmstråler. Kapslen mest med lange, bebørstede vorter. IV-V. C K

E. palustris L. Kærvortemælk. 50-150cm. K aftig, glat og blågrøn. Bladene 2-6cm, m.m. lancetformede. Kapslen 5-6mm.IV-VI. A K

E. ceratocarpa Ten. Hornvortemælk. 50-90cm. Bladene spidse, helrandede og bølgede, de øvre noget nedbøjede. Kapslen 4-5mm, langvortet. IV-VII. A (Barese) C

E. gasparrinii Boiss. Trådfrugtet vortemælk. 10-30cm. Forveddet forneden og stærkt grenet. 5 korte skærmstråler. Kirtlerne ofte rødlige. Kapslen 4mm. Bladene 13-18mm. V-VI. C (Sila)

E. apios L. Roevortemælk. 5-20cm. Med roeformet rodknold på 2-7 cm. Stænglerne med skælblade forneden. 3-5 skærmstråler. Kapslens vorter korte og kegleformede. V-VI. A B C (Pollino)

E. verrucosa L. (E. brittingeri, E. flavicoma) Vortet vortemælk. 20-50cm. M.m. dunet. Bladene elliptiske. Højbladene gule.IV-VI. K

E. spinosa L. Tornet vortemælk. 10-30cm. Tætgrenet dværgbusk med blivende grenender, der dog ikke er stikkende. Bladene 5-20mm, lancetformede, helrandede. 3-5 ofte korte skærmstråler. A B C K

E. platyphyllos L. Rottevortemælk. 15-80cm. Lancetformede blade med let hjærteformet grund og finttandet spids. Ofte noget lillaanløben. Mange ekstrastråler. VI-IX. B C K

E. serrulata Thuill. Hyldevortemælk. 20-50cm. Bladgrunden lidt mere hjærteformet end hos foregående. Med hyldeduft. Kapslens vorter længere end brede (halvkuglef. hos plat.). V-IX. C (Sila)

E. pubescens Vahl Dunet vortemælk. 30-80cm. Tætdunet og opret. Bladene lancetformede, grågrønne, finttandede. V-X. A B C K

E. cuneifolia Guss. Kilevortemælk. 5-25cm. Med vækst som Skærmvortemælk. Bladene med finttandet, afrundet spids. IV-V. C K

E. pterococca Brot. Vinget vortemælk. 10-30cm. Bladene lancet- til spatelformede. De 5 skærmstråler først 3- så 2-grenede. A C

E. helioscopia L. Skærmvortemælk. XII-V. A B C K

E. phymatosperma Boiss.& Gaill. Hængevortemælk. 10-30cm. Grenene hængende før blomstringen. 3(-5) skærmstråler. Frøene tværrynkede. IV-V. B (Pignola alla Farneta, Caprara, Acqua di Majo m.m.) C

E. rigida Bieb. Rank vortemælk. 30-50cm. Glat og stærkt blågrøn. Bladene tilspidsede. 8-11 skærmstråler. Svøbet med oprette, trekantede lapper mellem kirtlerne. 500-1100m. II-IV. B C (Sila)

E. myrsinites L. Blågrøn vortemælk. 20-30cm. Bladene tykke og kødede. 5-12 skærmstråler. Kapslen 5-6mm. V-VI. A B C K

E. lathyris L. Korsvortemælk. 20-100cm. Glat og blågrøn, opret toårig. Bladene 3-12cm, lancetformede, de nedre smalt trekantede. 2-4 skærmstråler. Kirtlerne med kølleformede horn. VI-VIII. K

E. aleppica L. Granvortemælk. 10-30cm. Bladene linjeformede, meget tætstillede og opadrettede foroven, manglende forneden. 2-4 op til 5 x tvedelte skærmstråler. V-VII. A B C

E. exigua L. Liden vortemælk. IV-VIII. A B C K

E. falcata L. Seglvortemælk. 8-30cm. Bladene bleggrønne, de nedre kileformede med afskåret spids, de øvrelancet- til omvendt ægformede. Frøene med 5-6 tværfurer. III-IX. A B C K

E. peplus L. Gaffelvortemælk. I-XII. A B C K

Euphorbia segetalis L. Markvortemælk. 10-40cm. Bladene blågrønne, de nedre linjeformede, de øvre linje-lancetformede, 15-30x2-4mm. Frøene grubede og lysegrå. IV-VI. C K

E. pinea L. Fyrrevortemælk. 10-40cm. En form af foregående, men flerårig og tueformet. Bladene tætstillede, 1-3mm brede, lidt tykke, de nedre nedadrettede. Kystklipper og sand. III-VI. ABCK

E. nicaeensis All. Fransk vortemælk. 20-50cm. Bladene 25-42x4-9 mm, lancetformede til aflange, de nedre oprette og spidse, de øvre mere udstående og butte. V-VII. A B C K

E. barrelieri Savi Skyggevortemælk. 6-40cm. Bladene blågrønne, med 3 længderibber, lidt tykke, de nedre tætstillede og mindre end de øvre. Højbladene ofte lillaanløbne. V-VII. A B

E. paralias L. Strandvortemælk. 30-60cm. Stænglerne noget kødede og m.m. forveddede ved grunden. Bladene 4-25mm, lancetformede, de øvre tætstillede og noget taglagte. IV-VIII. A B C K

E. cyparissias L. Cypresvortemælk. III-VI. K

E. terracina L. Langhornet vortemælk. 10-50cm. Kirtlerne med 2 lange horn på indtil 2 x kirtlens bredde eller mere. II-IX. ABCK

E. amygdaloides L. Skovvortemælk. 30-70cm. Opret og tæt dunet. Bladene stedsegrønne og læderagtige, 6-8cm, bredest i øvre ½, danner en slags roset midt på stænglen. II-VI. A B C K

E. characias L. Ulvemælk. 60-120cm. Kraftig, tætlådden flerårig. Bladene 45-90x10-13mm, smalt lancetformede, lidt blågrønne, ofte med omrullet rand. Kirtlerne mørkebrune. I-IV. A B C K

RUTACEAE

Ruta. Rude. Flerårige urter. Bladene 2-3 x fjersnitdelte, spredte og kirtelprikkede, med m.m. omvendt lancetformede afsnit. Blomsterne 4-tallige, grønliggule, i halvskærme. Kronen ofte med frynset rand. 8 støvdragere. 1 griffel.

R. chalepensis L. Frynset rude. 20-60cm. Kronbladene langfrynsede. Bægerbladene trekantet-ægformede. IV-VII. A B C K

R. graveolens L. Haverude. 15-45cm. Kronbladene finttandede. Bægerbladene lancetformede. V-VII. A B C K

Dictamnus albus L. Moses brændende busk. 50-80cm. Flerårig med askeagtige, fjersnitdelte blade. Endestillet, kort- og mørkkirtlet top med ret store, lyserøde, mørkårede 5-talsblomster. Kronbladene 2-2½cm, spidse. 10 let opadkrummede, lange støvdragere. V-VI. B C

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Miller) Swingle Skyrækker. Træ på 5-15m. Bladene spredte, fjerfinnede, 45-60cm, m.m. glatte. 13-25 småblade på 7-12cm, lancet- til ægformede, tilspidsede, med 2-4 tænder nær grunden med en stor kirtel under sig. Dyrket og forv. ABCK

POLYGALACEAE

Polygala. Mælkurt.

1. Enårig. Kronen meget kortere end vingerne ..... monspeliaca
   Flerårig. Kronen ofte længere " " 2.
2. Vingerne og kronen stærkt gule ..... flavescens
   Blomsterne ikke gule 3.
3. Kronrøret 0,8-1,2 x vingerne ..... 4.
   " ca. 0,5 x " 5.
4. Støttebladet ca. 2 x blomsterstilken ..... major
   " ca. 1 x " preslii
5. Støttebladet ca. 2 x blomsterstilken ..... 6.
   " ca. 1 x " 7.

6. Støttebladene falder af under blomstringen, 2½-5mm nicaeensis
" blivende til frugtsætningen og så 6-8mm apiculata
7. Nedre blade større end de øvre ..... vulgaris
" " mindre " " " angelisii

Polygala monspeliaca L. Enårig mælkurt. 9-20cm. Opret. Grundbladene spatelformede, ca. 8mm; stængelbladene linje-lancetformede, ca. 15mm. Vingerne 6-8mm, hvidliggrønne. IV-VI. A B C K

P. major Jacq. Stor mælkurt. 15-40cm. Vingerne 9-13mm i blomst, rødlilla til blålilla. Kronen 3-4mm længere end vingerne, med opadbøjet kronrør. 300-1200m. V-VII. A B C K

P. preslii Sprengel Rørmælkurt. 10-40cm. Blomsterne lyserøde til hvide. Vingerne 9-10mm. Kapslen med en stilk på 1mm (3-4mm hos major). 500-1500m. IV-VI. C (Aspromonte)

P. flavescens DC. Gul mælkurt. 15-40cm. Støttebladene 2½-3½mm, længere end blomsterstilken. Vingerne 7½-9mm, grøngule i frugt. Kronrøret ca. 3½mm. IV-VI. A (Gargano) B (Muro, Pisterola) K

P. nicaeensis Risso ssp. mediterranea Chodat Opstigende mælkurt. 10-35cm. Vingerne 6½-9mm i blomst, 10-14mm i frugt. Kronen 1-2½mm længere end vingerne. Alle blade linje-lancetformede. IV-VII.ABCK

P. apiculata Porta Brodbladet mælkurt. 20-40cm. Nedre blade elliptiske og butte, øvre lancet- til linjeformede, spidse til tilspidsede. 0-800m. V-VI. A (Biccari ved Foggia) C (Stilo, Gerace, S.Luca d'Aspromonte, Bianco Nuovo)

P. vulgaris L. Almindelig mælkurt. V-VII. C K

P. angelisii Ten. (P. alpestris p.p.) 8-15cm. Klaserne med 5-20 blå eller hvide blomster. Vingerne 4-6½mm. 250-2400m. V-VII.ABCK

ANACARDIACEAE

Rhus typhina L. Hjortetakstræ. 2-8m. Løvfældende. Bladskaftet uvinget. Småbladene 5-12cm. Dyrket og forvildet. V-VI. B

R. coriaria L. Garvesumak. 1-4m. Nær foregående, men næsten stedsegrøn. 5-10 par småblade på 1-5cm. Bladskaftet vinget. Bladene 10-18cm. 0-800m. V-VIII. A B C K

Pistacia terebinthus L. Terpentintræ. 1-5m. Bladene uligefinnede og noget læderagtige, spredte, med 3-9 småblade. Disse mørkegrønne ovenpå, grågrønne nedenunder, lancetformede, 3-4½cm, med en kort brod. IV-VI. A B C K

P. lentiscus L. Mastikstræ. 1-3m, sj. 6-8m. Bladene ligefinnede, læderagtige, med vinget skaft og 8-12 småblade på 1-5x½-1½cm. 0-700m. Særligt alm. langs kysten. III-V. A B C K

Schinus molle L. Peruviansk pebertræ. 2-8m. Stedsegrønt træ eller busk med tynde, hængende grene. Uligefinnede blade med 7-13 par linje-lancetformede, ofte savtakkede småblade, der er dunede som unge. Hvidlige blomster i top. VI-VII. Sj. forvildet.

ACERACEAE

Acer. Løn.

1. Bladene over 10cm ..... 2.
" under 10cm 4.
2. Bladundersiden håret. Korte og brede lapper ... neapolitanum
" glat. Bladet over ½ delt 3.
3. Bladlapperne m.m. helrandede, tilspidsede ..... lobelii
" tandede pseudoplatanus
4. Bladet 3-lappet med 3 hovedribber ..... monspessulanum
" 5-lappet " 5 " 5.

5. Bladet under ½ delt, endelappen bredere end lang obtusatum
" over ½ " , " længere " bred campestre

Acer lobelii Ten. Søjleløn. 3-20m. Med søjleformet vækst. Nær Spidsløn, men bladlapperne utandede. 750-1700m. V. B (Vulture, Balvano, Muro, Pignola m.m.) C (Pollino, Sila) K (Alburno m.m.)

A. campestre L. Navr. A B C K

A. pseudoplatanus L. Ær. A B C K

A. obtusatum W.& K. Butlappet løn. 1-20m. Bladet 5-9x6-11cm, med 5 korte, brede og butte, ujævnt takkede lapper. Undersiden ofte filtet. 500-1300m. IV. A B C K

A. neapolitanum Ten. 1-20m. Nær foregående, men bladpladen større: 10-14x12-18cm. 500-1300m. IV. A B C K

A. monspessulanum L. Trelappet løn. 1-12m. Bladet 3-8cm, læderagtigt, skinnende ovenpå, noget grågrønt nedenunder, med butte, helrandede lapper, ca. ½ delt. 0-1000m. IV. A B C K

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus hippocastanum L. Hestekastanje. Dyrket og forv. i ABCK

BALSAMINACEAE

Impatiens noli-tangere L. Alm. springfrø. VI-VIII. K (Alburno)

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L. Kristtorn. IV-V. A B C K

CELASTRACEAE

Euonymus europaeus L. Benved. Bladene mest 4-8cm. Kvistene 4-kantede. Knopperne 2-4mm. IV-VI. A B C K

E. latifolius (L.) Miller Bredbladet benved. 1-5m. Bladene mest 7-14cm, tilspidsede. Knopperne mest 8-15mm. Kvistene mindre tydeligt 4-kantede. Blomsterne 5-tallige. V-VI. B C K

E. verrucosus Scop. Vortet benved. 1-3m. Bladene mest 3-5cm. Kvistene trinde, ru af mørkebrune korkvorter. 4-talsblomster. Knopperne 2-3mm. IV-VI. B C (Laino Castello)

STAPHYLEACEAE

Staphylea pinnata L. Blærenød. 1-4m. Busk med hyldeagtige, fjersnitdelte blade med oftest 5 glatte, savtakkede og spidse småblade. Bladene modsatte. Kendelig på de opblæste, 2½-4cm lange, hængende, tohornede, lysegrønne frugter. Blomsterne 5-tallige i klaser. 0-900m. IV-V. B (Vulture) C K

RHAMNACEAE

Paliurus spina-christi Miller Skjoldhat. 1-4m. Busk med tornformede fodflige. Fintdunede, zigzagbøjede kviste. Bladene 2-4cm, ægformede og toradede. Topformet 7-8mm bred frugt med en bred, bølget vinge hele vejen rundt, så den bliver 18-30mm bred. A B K

Ziziphus jujuba Miller Brystbær. 1-8m. Zigzagformede, glatte kviste med tornede fodflige og spredte, aflange, fint kirtelsavtakkede blade på 2½-5cm. Frugten 1½-3cm, aflang, mørkt rødlig eller næsten sort. Dyrket og forvildet. VI-VII. A B C K

Rhamnus. Vrietorn.

1. Bladene stedsegrønne og læderagtige ..... alaternus
" løvfældende, ikke læderagtige 2.
2. Alle blade spredte. 4-20 par sideribber. Ingen torne ..... 3.
Nedre blade mest modsatte. 2-4 par sideribber. Tit tornet 4.
3. 7-12 par sideribber. Oftest opret busk på 1-4m ..... alpinus
4-9 " " . Udstrakt busk på 5-20cm pumilus

4. Bladpladen 3-9cm; stilken 10-25mm ..... catharticus
" 1-3cm; " 1-5mm saxatilis

Rhamnus alaternus L. Stedsegrøn vrietorn. 1-5m. Barken rødlig. Unge kviste dunede. Bladene spredte, elliptiske eller bredt lancetformede med en hvidlig hindekant, helrandede eller med svage, småkirtlede tænder, 2½-6cm, spredte. II-IV. A B C K

R. saxatilis Jacq. ssp. infectorius (L.) P.Fourn. Klippevrietorn. 50-150cm. Stærktgrenet busk med lancetformede, noget buestrengede, rund-savtakkede blade. IV-V. A B C K

R. catharticus L. Alm. vrietorn. IV-VI. A B C K

R. alpinus L. Alpevrietorn. Busk med oprette, grålige grene. Bladstilken 1-2cm. Bladene bredt lancetformede, skinnende ovenpå, finttandede hele vejen, mest 6-8cm. V-VI. B C K

R. pumilus Turra Dværgvrietorn. Liggende, knudret, med grå bark. Bladene 2-4(1½-6)cm, omvendt ægformede til elliptiske, kort tilspidsede; stilken 2-5mm. Undersidens ribber dunede. V-VI. B C K

VITACEAE

Vitis vinifera L. Vild vinranke. Hvert 3. bladfæste uden slyngtråd eller blomsterstand. Kvistene trinde. Bladene tydeligt 3-5-lappede med snæver stilkbugt. 0-800m. V-VII. A B C K. 2 ssp.:
ssp. silvestris (Gmelin) Hegi: Tvebo. Druen ca. 6mm. Kærnerne m.m. runde. Flodskove, løvskove. Den vilde form.
ssp. vinifera: Blomsterne tvekønnede. Druen 6-22mm. Kærnerne pæreformede. Dyrket.

V. labrusca L. Amerikavin. 1-5m. Alle bladfæster med en slyngtråd eller top. Bladene lidet lappede; undersiden rustfiltet. Dyrk.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon Klatrevildvin. 1-6m. Bladene håndsnitdelte med mest 5 småblade. Slyngtrådene med 5-8 (3-12) grene med hæfteskiver i spidsen. Dyrket og forv. i A B C K

TILIACEAE

Tilia platyphyllos Scop. Storbladet lind. Kvasten mest 3(2-5)-blomstret. Bladundersiden med hvide hårduske. V-VI. B C K

T. cordata Miller Småbladet lind. Kvasten med 4-15 blomster. Bladundersiden med rødbrune hårduske. V-VI. B K

T. vulgaris Hayne Parklind. Kvasten med 5-10 blomster. Bladundersiden med hvidbrune hårduske.

MALVACEAE

1. Intet yderbæger. Gulblomstret enårig ..... Abutilon
Med yderbæger 2.
2. 2-3 yderbægerblade ..... 3.
6-13 " 5.
3. Yderbægerbladene sammenvoksede ved grunden ..... Lavatera
" frie 4.
4. Yderbægerbladene større end bægerbladene og stilkede Malope
" mindre end " og siddende Malva
5. Yderbægerbladene frie. Frugten en kapsel ..... 6.
" sammenvoksede forneden. Spaltefrugt 7.
6. Planten rustbrunt stjærnefiltet ..... Kosteletzkya
" anderledes Hibiscus
7. Blomsterne m.m. siddende. Kronbladene 3-5cm ..... Alcea
" delvist stilkede. Kronbladene 1½-3cm Althaea

Malope malacoides L. Håret trompetkatost. 20-50cm. Mest flerårig. Nedre blade 2-5cm, ægformede, de øvre lige sådan eller 3-lappede. Yderbægerbladene store og helt hjærteformede. V-VI. A B C K

Malva. Katost.

1. Bægerbladene linje-lancetformede, 7-10mm ..... cretica
" ægformede eller trekantede 2.
2. Stængelbladene dybt delte ..... 3.
" lappede 4.
3. Stænglen stjærnehåret. Yderbægerbladene ægformede .... alcea
" uden stjærnehår. Yderbægeret lancetformet moschata
4. Yderbægerbladene under 3 x så lange som brede ..... 5.
" mindst 3 x " " " " 6.
5. Kronbladene hvidlige eller blålige, 10-12mm ..... nicaeensis
" rødlilla, 12-22mm silvestris
6. Kronbladene mindst 2 x bægeret ..... neglecta
" ca. = bægeret parviflora

Malva cretica Cav. Smalbægret katost. 10-40cm. Stivhåret enårig. Nedre blade m.m. runde, de øvre 3-fligede. Yderbæger og bæger linjeformede. Kronen 10mm, 1-1½ x bægeret. III-VI. A B C K

M. alcea L. Rosenkatost. VI-IX. B K

M. moschata L. Moskuskatost. V-VIII. A B C K

M. silvestris L. Almindelig katost. V-VIII. A B C K

M. nicaeensis All. Bleg katost. 30-60cm. 1-2-årig. Bægeret ofte glat på undersiden. Kronen uden mørkere årer. V-VII. A B C K

M. parviflora L. Småblomstret katost. 20-50cm. Opret enårig. Kronen 4-6mm, hvid, med røde eller blålige årer. III-V. A B C K

M. neglecta Wallr. Rundbladet katost. V-VIII. A B K

Lavatera. Katost.

1. Kronbladene citrongule, 22-26mm ..... agrigentina
" lyserøde eller rødlilla 2.
2. Blomsterne i nøgler i bladhjørnerne ..... 3.
" enlige i bladhjørnerne 4.
3. 30-50cm. Yderbægeret mindre end bægeret ..... cretica
1-3m. Yderbægeret større end bægeret arborea
4. Forveddet busk ..... olbia
Urter 5.
5. Flerårig. Stænglen tæt filtet ..... thuringiaca
Enårig. Stænglen ikke tæt filtet 6.
6. Stænglen med ugrenede og fågrenede hår ..... trimestris
" dækket af fine stjærnehår punctata

Lavatera cretica L. Vejkatost. Ligner fuldstændigt Alm. katost, men er opret, har bredere yderbægerblade og ikke netrynkede delfrugter. III-V. A B C K

L. arborea L. Kæmpekatost. Opret og forveddet ved grunden. Toårig. Bladene runde, svagt 5-7-lappede, op til 20cm. Yngre dele stjærnfiltede. Kronbladene 15-20mm. IV-IX. A K (Ellers forvildet)

L. olbia L: Buskkatost. 60-200cm. Stænglerne stivhårede, unge dele stjærnefiltede. Kronbladene 1½-3cm. Øvre blade æg-lancetformede, ofte med trelappet grund. Kalkklipper. IV-VI. B C

L. thuringiaca L. Poppelrose. 50-100cm. De nedre blade svagt 5-7-lappede, de øvre 3-lappede med forlænget midterlap. Kronbladene 3-4½cm, lyserøde. Bægerbladene tilspidsede. VI-VIII. B C K

L. punctata All. Rødstænglet katost. Opret enårig. Stænglen ofte m.m. rød. Nedre blade runde, svagt 5-lappede, øvre spydformet 3-lappede. Kronbladene 1½-3cm. V-VI. A B C K

L. trimestris L. Mamelukærme. 60-120cm. Rundbladet. De øvre blade noget 3-7-lappede. Kronbladene 2-4½cm. Delfrugterne dækkede af en skiveformet udvidelse af midteraksen. IV-VIII. C

L. agrigentina Tin. Svovlkatost. 30-200cm. Blødtfiltet enårig.

Bladene 2-4cm, svagt trelappet hjærteformede. Med moskuslugt. IV-V. C (Monteleone)

Althaea hirsutaL. Håret stokrose. 10-25cm. Enårig. Nedre blade runde, øvre smalt 3-5-fligede. Blomsterne enlige. Kronen 15mm, lidt længere end bægeret. Gule støvknapper. V-VIII. A B C K

A. cannabina L. Hampestokrose. 50-80cm. Opret flerårig. Bladene meget dybt håndfligede med 3-5 savtakkede, lancet- eller linjeformede flige. Kronbladene 1½-3cm, lyserøde. VII-IX. A B C K

A. officinalis L. Lægestokrose. 40-120cm. Flerårig. Bladene lappede eller hele, m.m. trekantet ægformede, tæt gråt stjærnedunede og 6-10cm. Bægerbladene bøjede ind over frugten. VII-IX. A B C K

Alcea rosea L. Havestokrose. Dyrket og forvildet. V-VIII. B

Abutilon theophrasti Med. Kinajute. 50-100cm. Opret. Bladene rent hjærteformede. Blomsterne i tætte nøgler. Kronbladene 7-13 mm. Delfrugterne med næb. VII-IX. K (Minturno)

Hibiscus syriacus L. Syrisk rose. 1-2m. Busk. Bladene 3-7cm, tandede, rudeformede og ofte ret dybt trelappede. Kronbladene 4-5 cm, blå, røde eller hvide. Dyrket og forvildet. VI-VIII. A B C K

H. trionum L. Timeviser. 20-40cm. Opstigende enårig. Stænglen ru af grove knuder. Bladene næsten helt delte i 3(5) lappede afsnit. Kronbladene lysegule med sortlilla grund, 1½cm. VIII-IX. A

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. Vedbendkatost. 1-2m. Opret flerårig. Bladene 6-12x4-8cm, mest med 3 brede lapper. Kronbladene lyserøde, 2-2½cm. 6-11 yderbægerblade. K (Licola, Fusaro)

THYMELAEACEAE

Mest mindre buske med spredte, helrandede blade. Blomsterne firtallige med enkelt, farvet bloster med m.m. rørformet underdel.

1. Enårig urt ..... T. passerina
   Småbuske med forveddede grene 2.
2. Blomsterne overvejende i endestillede stande ..... 3.
   " " " sidestillede " 6.
3. Løvfældende ..... D. alpina
   Stedsegrøn 4.
4. Blomsterne i top. Bladene helt glatte ..... D. gnidium
   " " hoveder. Unge blade hårede nedenunder 5.
5. Modne blade glatte nedenunder, mest 1-2cm ..... D. oleoides
   " " lådne " , 3-5cm D. sericea
6. Bladene 3-13cm, glatte ..... 7.
   " 3-18mm, filtede nedenunder 8.
7. Læderagtige, stedsegrønne blade ..... D. laureola
   Tynde, løvfældende blade D. mezereum
8. Bladene skælformede med glat underside, 3-8mm ... T. hirsuta
   " omvendt lancetformede, 9-13mm T. tartonraira

Daphne mezereum L. Pebertræ. III-V. B C K

D. laureola L. Skovlavrbær. 60-120cm. Bladene omvendt lancetformede, skinnende, helt glatte, mest 8-13cm. Blomsterne gulgrønne, i 6-8cm lange klaser fra bladhjørnerne. II-IV. A B C K

D. gnidium L. Høstkælderhals. 60-150cm. Bladene 3-4½cm x 3-5mm, med en brod på ca. 1mm og let indrullet rand, spidse. Blomsterne 7mm, hvide. VII-X. A B C K

D. alpina L. Bjærgkælderhals. 20-100cm. Unge kviste hårede. Bladene først dunede på begge sider, 20-40x6-10mm. Blomsterne hvide og duftende, 6½-10mm, 4-10 sammen. IV-VI. K (Montevergine)

D. oleoides Schreber Olivenkælderhals. 30-50cm. Bladene skinnende og oftest glatte ovenpå, tit omvendt lancetformede. Blomsterne 11-15mm, hvide. 300-1700m. IV-VI. A B C K

Daphne sericea Vahl Silkepebertræ. 50-70cm. Unge kviste hårede. Bladene omvendt lancetformede, tiltrykt hvidfiltede, efterhånden glatte ovenpå. Blomsterne lyserøde, 10mm. II-III. A K

Thymelaea hirsuta (L.) Endl. Skællet spurvetunge. 40-100cm. Grenene tæt dækkede af skællignende blade, med indadvendt, hvidfiltet overside og udadvendt, glat underside. IX-IV. A B C K

T. tartonraira (L.) All. Sølvspurvetunge. 20-50cm. Unge skud og bladene silkehårede på begge sider. Blomsterne gullighvide, ca. 4mm. IV-V. K (Pen. Sorrentina, Capri)

T. passerina (L.) Cosson & Germ. Enårig spurvetunge. 20-50cm. Opret med jævnt fordelte, spidse, linjeformede blade på 8-12x1mm. Blomsterne grønlige, 1-3 sammen i bladhjørnerne, 3-4mm, noget hen ad Dværgløvefods. VI-VIII. A B C K

ELAEAGNACEAE

Hippophae rhamnoides L. Havtorn. IV-V. K (Policastro)

GUTTIFERAE

Hypericum. Perikon.

1. Planten uden kirtler på blade eller blomster. Buske ..... 2.
   " sortkirtlet " " " " . Urter 3.
2. Kronen kortere end bægeret. Frugten et sort bær androsaemum
   " længere " " . " en kapsel hircinum
3. Planten dunet ..... 4.
   " glat 5.
4. Bladene ikke sortkirtlede ..... tomentosum
   " med sorte kirtler hirsutum
5. Bægerbladene helt eller næsten helrandede ..... 6.
   " frynsede 9.
6. Stænglen firvinget ..... tetrapterum
   " trind eller med 2 lister 7.
7. Bladene bølgede og stængelomfattende ..... triquetrifolium
   " hverken bølgede eller stængelomfattende 8.
8. Bægerbladene uden sorte randkirtler ..... perforatum
   " med " " australe
9. Bægerbladene ukirtlet frynsede ..... barbatum
   " kirtelfrynsede eller -tandede 10.
10. Kronbladene med mange sorte kirtler på fladen .... spruneri
    " højst med enkelte sorte kirtler på fladen 11.
11. Stænglen med 2 lister, jævnt bebladet ..... perfoliatum
    " trind 12.
12. Bægerbladene med sorte kirtler på fladen ..... australe
    " uden " " " " barbatum

Hypericum androsaemum L. Bærperikon. 30-70cm. Bladene 4-15cm, bredt ægformede. Bægerbladene 8-12mm, uens. Kronbladene 8-10mm. 0-1400m. V-VII. A B C K

H. hircinum L. Bukkeperikon. 30-100cm. Stænglen 2-ribbet eller 4-kantet. Bægeret 3-6mm. Kronbladene 10-18mm. Bladene 12-50x5-25 mm, bukkelugtende ved knusning. V-VIII. 0-1200m. A B C K

H. hirsutum L. Lådden perikon. VI-VIII. A B C K

H. montanum L. Bjærgperikon. VI-VIII. B K

H. tomentosum L. Filtet perikon. 10-90cm. Stænglen grenet fra grunden. Bladene aflange til ægformede, ofte med korte skud fra hjørnerne. Bægeret 3-6mm. Kronen 6-12mm. V-VI. B K

H. perfoliatum L. Gennembrudt perikon. 25-75cm. Bladene 13-60mm, æg- til smalt lancetformede, ofte stængelomfattende. Bægeret tæt og uregelmæssigt frynset. 0-1200m. V-VI. A B C K

H. spruneri Boiss. Tungeperikon. 30-60cm. Opret. Bladene trekan-

tet-lancetformede til smalt aflange. Bægeret med mange sorte prikker. 0-600m. V-VI. A B

Hypericum barbatum Jacq. Skægget perikon. 15-40cm. Bægerbladene spidse, med mange sorte prikker og streger. Kronbladene ofte sortprikkede. 500-1500m. VI-VII. C (Pollino, Sila)

H. australe Ten. Hedeperikon. 8-40cm. Liggende til opret. Bægerbladene helrandede eller oftere med kortstilkede randkirtler. 0-500m. IV-V. A B C K

H. tetrapterum Fr. Vinget perikon. VI-VIII. A B C K

H. perforatum L. Prikbladet perikon. V-VIII. A B C K

H. triquetrifolium Turra Risperikon. 15-50cm. Meget stærkt grenet med nærmest pyramideformet udstående grene. Bladene 5-12x2-5 mm. Bægeret uden sorte kirtler. III-X. A B C

VIOLACEAE

Viola. Viol.

1. Enårig ..... 2.
   Flerårig 5.
2. Øvre kronblade tydeligt længere end bægeret ..... hymettia
   " " højst så lange som bægeret 3.
3. Planten lang-, næsten uldhåret ..... parvula
   " korthåret eller næsten glat 4.
4. Planten svagt håret eller næsten glat ..... arvensis
   " kort stivhåret kitaibeliana
5. De sidestillede kronblade opadrettede (Stedmoderblomst) .. 6.
   " " " nedadrettede 8.
6. Kronen 15-18(25)mm i lodret mål, mest lilla (sj. gul) graeca
   " 20-30(40)mm " " " 7.
7. Bægerbladene 8-9mm ..... pseudogracilis
   " 10-13mm aethnensis
8. Med bladbærende stængler ..... 9.
   Uden " " 10.
9. Bægerbladsvedhængene 2-3mm. Sporen ofte hvid ..... riviniana
   " højst 1mm. Sporen lilla reichenbachiana
10. Planten tæt håret ..... odorata
    " spredt håret til glat 11.
11. Bladene bredere end lange, nyreformede ..... palustris
    " længere " brede, ofte hjærteformede alba

Viola odorata L. Martsviol. II-IV. A B C K

V. alba Besser ssp. dehnhardtii (Ten.) Becker Sydlig hvid viol. 5-10cm. Forbladene på eller over blomsterstilkens midte. Underjordiske udløbere på 0-5cm. Kronens midte tydeligt hvid, ellers lilla trods navnet. II-IV. A B C K

V. reichenbachiana Jordan Skovviol. III-VII. A B C K

V. riviniana Rchb. Kratviol. IV-VIII. A B C K

V. palustris L. Engviol. 1600-2500m. V-VII. C (Sila)

V. graeca (W.Becker) Hal. 5-20cm. Glat eller svagt håret. Bladene smalle jævnt tilsmalnede mod grunden. Fodfligene 3-5-delte og smalfligede. Øvre kronblade med kileformet grund. A (Gargano)

V. aethnensis Parl. Ætnastedmoderblomst. 5-30cm. Nedre blade med æg- til rudeformet plade. 800-2800m. Mellem Astragalus-tornbuske.
ssp. splendida (W.Becker) Merxm.& Lippert: Kort stivhåret. Bægerbladene 11-17mm med vedhæng på 3-5mm. IV-VI. A B K
ssp. messanensis (W.Becker) Merxm.& Lippert: M.m. glat. Bægerbladene 10-13mm med vedhæng på 1½-2½mm. B C

V. pseudogracilis Strobl ssp. pseudogracilis 10-20cm. M.m. glat.

Nedre blade med afskåret eller afrundet grund. 800-1400m. IV-VI. B K (Pen.Sorrentina på M.Lattari al Faito, m.m.)

Viola arvensis Murray Agerstedmoderblomst. IV-VII. A B C K

V. kitaibeliana Schultes Dværgstedmoderblomst. 2-10cm. Fodfligene mest håndformet fligede. De største blade med 1-2 par rundtakker.Kronen 4-8mm, mest hvidgul. III-IV. B C K

V. hymettia Boiss.& Heldr. Stivhåret stedmoderblomst. 3-10cm. Kort stivhåret. Kronen 10-15mm, kraftigt gul. Sporen 3-4mm. B C

V. parvula Tin. Spinkel stedmoderblomst. 3-10cm. Nedre blade aflange til runde, næsten helrandede. Sporen kortere end bægerbladsvedhængene. Kronen 5mm, hvidlig. III-VI. 1200-2500m. B C

CISTACEAE

1. Blomsterne hvide eller lyserøde ..... 2.
   " gule 3.
2. De 3 indre bægerblade meget større end de 2 ydre Helianthemum
   5 eller 3 forholdsvis lige store bægerblade Cistus
3. Ydre støvdragere perlesnorsformede, uden støvknapper Fumana
   Alle " med støvknapper 4.
4. Griflen lang, med knæet eller S-formet grund .. Helianthemum
   " kort og ret eller manglende 5.
5. Sølvskællet busk ..... Halimium
   Urter 6.
6. Støvfanget m.m. siddende. Ofte med bladroset ..... Tuberaria
   Griflen kort og ret. Ingen bladroset Helianthemum

Cistus. Stenrose.

1. Kronen lyserød ..... 2.
   " hvid 3.
2. Bladranden m.m. flad. Planten ikke klæbrig ..... incanus
   " kruset. Planten klæbrig creticus
3. Bladene fjerstrengede, ægformede til elliptiske salvifolius
   " 1-3-strengede, linje-lancetformede 4.
4. 3 bladribber. 5 bægerblade ..... monspeliensis
   1 bladribbe. 3 " clusii

Cistus incanus L. Gråbladet stenrose. 30-100cm. Bladstilken 2-4 mm. Bladet 2-4x1-2cm, med rynket overside og bræmmet med hvid filt. Planten med 0-få kirtelhår. 0-800m. IV-V. A B C K

C. creticus L. Kruset stenrose. 30-100cm. Med mange kirtelhår og aromatisk lugt. Bladstilken 2-4mm. Bladoversiden ikke hvidbræmmet. 0-1200m. V-VI. A C K (Napol.)

C. monspeliensis L. Smalbladet stenrose. 30-100cm. Planten klæbrig. Bladene 15-50x3-6mm, mørkegrønne og fåhårede ovenpå, stjærnefiltede nedenunder. Blomsten 2-3cm bred. 0-700m. IV-V. A B C K

C. salvifolius L. Ægbladet stenrose. 30-50cm. Bladet 15-30x8-15 mm, grønt med rynket overside og stjærnehår på begge sider. Blomsten 3-5cm bred. 0-1200m. IV-V. A B C K

C. clusii Dunal Kortbladet stenrose. 30-100cm. Bladene 10-25x1-2 mm, med mørkegrøn overside, hvidfiltet underside og omrullet rand. Blomsterne 2-3cm brede, i ofte skærmlignende småkvaste. A C

Halimium halimifolium (L.) Willk. Sølvbladet soløjebusk. 30-120 cm. Opret, hvidfiltet busk. Bladene elliptiske, 10-40x5-20mm. Blomsterne i mange, fåblomstrede svikler. Planten dækket af stjærnehår og skjoldformede hår. 0-300m. V-VI. A C K (Napol.)

Tuberaria. Soløje. Artsopfattelse efter Flora Iberica.

1. Flerårig. Grundbladene 2-5cm ..... lignosa
   Enårig. Grundbladene mindre og visne under blomstringen 2.

2. Blomsterstilke under blomstringen af bægerets længde praecox
" " " længere end bægeret 3.
3. Indre bægerblade 1,7-2,5mm brede. Støvknapperne 0,1-0,2mm plantaginea
Indre bægerbl. 2,5-3,3mm brede. Støvkn. 0,4-0,5mm guttata

Tuberaria lignosa (Sweet) Samp. Vejbredsoløje. 10-30cm. Forveddet ved grunden. Bladene vejbredagtige. Blomstrende stængler oprette. Kronbladene 15mm. IV-V. A (Pen.Salentina) C

T. guttata (L.) Fourr. Plettet soløje. 5-15cm. Lådden. Blomsterne i oprette klaser. Kronbladene 5mm, ofte med en sort plet. III-V. A B C K

T. plantaginea (Willd.) Gallego Meget lig T. guttata. Bladrosetten mere vedvarende.

T. praecox Grosser Hvidstilket soløje. Blomsterstilkene hviddunede. IV-V. A B C K

Helianthemum. Soløje.

1. Enårig ..... 2.
Flerårig 4.
2. Bægerbladene hindeagtige, kun hårede på ribberne aegyptiacum
" urteagtige, jævnt hårede 3.
3. Blomsterstilkene fortykkede, kortere end bægeret ledifolium
" spinkle, længere end bægeret salicifolium
4. Bladene uden fodflige eller kun de øvre med ..... 5.
Alle blade med fodflige 6.
5. Bladene med kileformet grund. Blomsterne i klase ..... canum
" " afrundet grund. Blomsterne ofte i top cinereum
6. Blomsterne siddende ..... sessiliflorum
" stilkede 7.
7. Fodfligene linjeformede, ulig bladene ..... 8.
" m.m. bladlignende, længere end bladstilken 10.

8. Kronen gul. Bladene m.m. linjeformede ..... jonium
" hvid med gul grund 9.
9. Bæger og kapsel 7-10mm ..... apenninum
Bægeret 5-6mm, kapslen 4-5mm pilosum
10. Bladoversiden tæt stjærnefiltet. Kronen tit orangegul croceum
" glat eller dunet. Kronen gul nummularium

Helianthemum croceum (Desf.) Pers. Safrangult soløje. 10-30cm. Stænglerne hvidfiltede. Nedre blade m.m. runde, øvre elliptisk-lancetformede. Kronen orangegul, gul eller hvid. VI-VII. B C K

H. nummularium (L.) Miller Alm. soløje. V-VIII. 4 underarter:
ssp. tomentosum (Scop.) Sch.& Th.: Bladundersiden grå- eller hvidfiltet (eneste ssp.).
ssp. glabrum (Koch) Wilczek: Bladene næsten glatte (eneste ssp.).
ssp. grandiflorum (Scop.) Sch.& Th.: Bægerbladene glatte mellem ribberne, de indre 7-10mm. Kronen 10-18mm. Pollino
ssp. obscurum (Celak.) Holub: Bægerbladene filtede eller dunede mellem ribberne, de indre 5-8mm. Kronbladene 8-12mm.

H. jonium Lacaita Hørbladet soløje. 20-40cm. Bladene linjeformede, 5-20x1-2mm, med omrullet rand

H. apenninum (L.) Miller Hvidt soløje. 20-40cm. Bladene 18-20 x 4-5mm eller smallere. Stilken 2-3mm. Fodfligene 1/3 x bladpladen. 0-1800m. IV-VI. A B C K

H. pilosum (L.) Pers. Smalbladet soløje. 10-30cm. Bladene 10-20 x 1-4mm, de øvre længere end de nedre. IV-V. B (Torremare)

H. sessiliflorum (Desf.) Pers. Akssoløje. 30-60cm. Hvide, stjærnehårsdunede, oprette grene. Nedre blade modsatte. Bladene lancet- til linjeformede. Bægeret 1-2mm. Kronen ca. det samme. IV-V. A C

Helianthemum ledifolium (L.) Miller Tykstilket soløje. 10-60cm. Lådden filtet. Klaserne svikkelagtige med tykke, oprette blomsterstilke. Kronen kortere end bægeret. IV-V. A C

H. salicifolium (L.) Miller Enårigt soløje. 5-25cm. Bladene omvendt lancetformede, svagt dunede, 6-25mm. Blomsterstilkene udadrettedeog opadsvungne. III-V. A B C K

H. aegyptiacum (L.) Miller Hindebægret soløje. 5-30cm. Nær foregående, men bladene linjeformede, mørkegrønne og glatte ovenpå, gråfiltede nedenunder. Frugtstilkene nedbøjede. IV-V. A B C

H. canum (L.) Baumg. Gråfiltet soløje. 4-20cm. Bladene æg-lancetformede på stænglerne, smallere på de golde skud, gråfiltede nedenunder. Ingen fodflige. V-VII. A B C K

H. cinereum (Cav.) Pers. Gråbladet soløje. 10-20cm. Stænglerne ofte rødlige foroven. Bladene m.m. glatte ovenpå, hvidfiltede nedenunder. Øvre blade mest uden fodflige. IV-V. B C K

Fumana. Hedesoløje. Dværgbuske.

1. Bladene uden fodflige ..... 2.
   " med " 3.
2. Blomsterstilkene nedbøjede, ca. = støttebladene procumbens
   " rette, 2-3 x støttebladene ericoides
3. 2 fodflige. Bladene lancetformede ..... arabica
   6-8 fodflige i knippe. Bladene smalle 4.
4. Bladene spredte. Planten glat ..... laevipes
   " modsatte. Planten kirtelhåret 5.
5. Bladene æg-lancetformede, med ombøjet rand, 1-2mm brede thymifolia
   Bladene linjeformede, stærkt ombøjede, ½-1mm brede laevis

Fumana arabica (L.) Spach Bredbladet hedesoløje. 15-25cm. M.m. kirteldunet. Bladene 5-12x2-5mm. IV-V. A C

F. procumbens (Dunal) G.& G. Nedliggende hedesoløje. 5-15cm. Liggende. Bladene med et noget trekantet tværsnit, linjeformede, 8-12x1mm, randhårede. V-VI. A B C K

F. ericoides (Cav.) Gand. Opret hedesoløje. 10-50cm. Opstigende eller opret. Bladene som hos procumbens. Blomsterne oprette eller udstående. IV-VI. B C K

F. thymifolia (L.) Spach Timianhedesoløje. 10-20cm. De øvre blade tæt kirtlede eller kirtelbørstede. IV-VI. A B C K

F. laevis (Cav.) Pau Bladene glatte. Står nær foregående. Ikke udskilt hos Pignatti.

F. laevipes (L.) Spach Tyndbladet hedesoløje. 8-15cm. Bladene 4-8x0,3-0,4mm, klart grønne eller blågrønne, glatte eller med nogle spredte kirtelhår. IV-V. B K (Capri)

TAMARICACEAE

Tamarix. Tamarisk. Mindre træer med slanke grene, der er dækkede af ganske små, skælagtige blade. Blomsterne små, hvide eller lyserøde, i valseformede, ret tætte klaser.

T. africana Poiret Strandtamarisk. 2-5m. Barken sort eller sortlilla. Klaserne 6-8mm brede, mest på forveddede grene. Klasens akse og støttebladene ofte finvortede. V-VI. A B C K

T. gallica L. Slap tamarisk. 2-10m. Barken mørkebrun til brunlilla. Klaserne 3-5mm brede, mest på grønne årsskud. Planten helt jævn. IV-VI. A B C K

FRANKENIACEAE

Frankenia. Nellikelyng. Urter med modsatte eller kransstillede, hele, ofte lyngagtige blade uden fodflige. Oftest røde, noget

nellikeagtige blomster med sambladet bæger, mest 5-tallige.

Frankenia pulverulenta L. Enårig nellikelyng. 5-25cm. Enårig. Bladene flade, spatelformede, svagt dunede ovenpå, tætdunede nedenunder. Blomsterne i tætte, korte, ensidige aks. IV-V. A B C K

F. laevis L. Spredtblomstret nellikelyng. 10-30cm. Flerårig. Bladene smalle med omrullet rand. Fintdunet med hår op til 0,1(0,2) mm. Blomsterne spredte langs stængler og grene. IV-VI. A B C K

F. hirsuta L. Skærmnellikelyng. 10-30cm. Flerårig. Bladene smalle med omrullet rand. Tætdunet af hår på 0,1-1mm. Blomsterne i endestillede, halvskærmsagtige knipper. IV-VI. A

ELATINACEAE

Elatine macropoda Guss. Langstilket bækarve. 2-15cm. Ligner de hjemlige Bækarver. Blomsterne 4-tallige, med stilke på op til 23 mm. III-V. A (Pen. Salentina)

CUCURBITACEAE

Ecballium elaterium (L.) Rich. Æselagurk. 20-80cm. Kraftigt stivhåret, flerårig plante med trekantet hjærteformede blade. Gule agurkeblomster på 18-20mm. Grøn, elliptisk, stivhåret frugt på 4-5cm. V-IX. A B C K

Bryonia dioica Jacq. Tvebo galdebær. IV-VI. A B C K

Sechium edule Swartz 1-4m. Klatrende flerårig med grenede slyngtråde og 8-12cm store, let kantede, hjærteformede, ru blade. Tvebo. Blomsterne hvidgule og små, hannerne i korte akselstillede klaser og hunnerne enlige. Frugten 10-12x6-8cm, pæreformet, stivbørstet. Vi-VII. Dyrket og forvildet i C

CACTACEAE

Opuntia vulgaris Miller (O. compressa) Lav figenkaktus. 10-50cm. Pladerne 5-12x4-5cm, ofte liggende på jorden. Tornene enlige, 1-2 cm. VI-VII. B (Muro)

O. maxima Miller 1-3m. Pladerne 20-40cm, ca. 2 x så lange som brede, matgrønne. Puderne små, med 1-4 hvidgrå torne på op til 3cm. IV-VI.

O. ficus-indica (L.) Miller Ægte figenkaktus. 3-5m. Pladerne 35-45x20cm. Puderne små, hvidlige, mest uden torne, sj. med 1-2 små torne. IV-VI.

LYTHRACEAE

Lythrum. Kattehale.

1. Kronen 8-12mm. Blomsterne i endestillede aks ..... salicaria
   " 0-6mm. " spredte i bladhjørnerne 2.
2. Bladene modsatte. Underbægeret 1½mm. Kronen 1mm .... portula
   " spredte 3.
3. Støvdragerne tydeligt udragende af bægeret ..... junceum
   " indesluttede i eller lig bægeret 4.
4. Bægertænderne m.m. ens ..... tribracteatum
   " skiftevis korte og lange 5.
5. 6 støvknapper. Kronbladene 2-3mm ..... hyssopifolia
   2 " . " 1-2mm thymifolia

Lythrum salicaria L. Alm. kattehale. VI-IX. A B C K

L. junceum Banks & Sol. Slangekattehale. 20-60cm. Glat. Bladene 8-20x2-6mm. Underbægeret 5-6mm. Bægertænderne lige lange, skiftevis smalle og brede. Kronen 5-6mm. V-IX. A B C K

L. hyssopifolia L. Isopbladet kattehale. 10-50cm. Oftest opret og m.m. glat. Blomsterne oprette og tiltrykte. Bladene 10-14x2-3 mm. Underbægeret 4-6mm. IV-IX. A B C K

Lythrum thymifolia L. Lav kattehale. 4-17cm. Stænglerne med 4-5 længdelister. Bladene 4-7x½-2mm. Blomsterne mest 4-tallige. Underbægeret 3-4mm. IV-V. A (Gallipoli) B (Nova Siri)

L. tribracteatum Salzm. Gaffelkattehale. 5-30cm. Stænglerne ofte lilla, med 4 lister. Grenene modsatte, udstående. Bladene 5-9 x 2mm. Underbægeret 5-6mm. Kronbladene 2-3mm. IV-VI. A C K

L. portula (L.) D.A.Webb Vandportulak. VI-X. B C K

Ammannia verticillata (Ard.) Lam. Dunbægret risurt. 10-50cm. Enårig med firkantede stængler og modsatte, omvendt lancetformede blade på 8-25x4-8mm. Nøgler af m.m. siddende firtalsblomster i bladhjørnerne. Underbægeret 2mm, Kronen meget lille eller væk. Forvildet i rismarker og grøfter. VII-VIII. C

MYRTACEAE

Myrtus communis L. Myrte. Busk op til 5m med modsatte, lancetformede, stedsegrønne, læderagtige, kirtelprikkede blade på 2-5cm. Langstilkede, hvide, parvise femtalsblomster i de øvre bladhjørner med mange støvdragere. VI-VII. A B C K

Eucalyptus. Febertræ. Bladene noget læderagtige, med en m.m. tydelig randribbe tæt ved kanten. Unge blade modsatte, brede og regelmæssige. De modne blade spredte, smalle og ofte seglkrummede. Blomsterne enlige eller i skærme. Blosteret lågformet, falder af og afdækker de mange støvdragere. Høje, plantede træer.

1. Blomsterne enlige. Frugten over 10mm ..... globulus
   " i skærme. Frugten ikke over 10mm 2.
2. Frugten m.m. siddende ..... 3.
   " tydeligt stilket 6.
3. Skærmene 3-blomstrede og med trind stilk ..... viminalis
   " med (3)5-10 blomster og flad stilk 4.
4. Bladene over 18cm. Barken jævn. Frugten blågrøn ... maidenii
   " under 18cm. " trævlet. Frugten ikke blågrøn 5.
5. Skærmstilken 7-10mm. Frugten 7-9x7-9mm, valseform. botryoides
   " 25-35mm. " 13-20x11-15mm gomphocephalus
6. Skærmstilkene kantede eller flade ..... 7.
   " m.m. trinde 8.
7. Frugten 5-8mm, klapperne stærkt udragende ..... resinifer
   " 12-15mm, klapperne næppe " robustus
8. Barken jævn og hvid ..... 9.
   " ru, sort eller rødlig 10.
9. Skærmstilken 10-15mm. Frugten 7-8x5-6mm ..... camaldulensis
   " 5-12mm. " 6-9x8-10mm tereticornis
10. Bladene med utydelige ribber ..... trabutii
    " " fremtrædende ribber rudis

PUNICACEAE

Punica granatum L. Granatæble. Busk op til 5m, stærkt grenet, løvfældende, med firkantede kviste. Bladene modsatte, lancetformede, glatte og helrandede og blanke. Blomsterne knaldrøde, 3-4 cm brede, med et stort og kødet bægerrør, 5-7-tallige. IV-VI.

ONAGRACEAE

Circaea lutetiana L. Dunet steffensurt. VI-VII. A B C K

Ludwigia palustris (L.) Elliott Vandkryb. 5-50cm. Krybende, rodslående, flerårig sumpurt. Bladene modsatte, rudeformede, Parietarialignende, glatte. Blomsterne 4-tallige i bladhjørnerne, 4mm, bestående af underbæger og bæger, uden krone. VI-VIII. C (Sila)

Oenothera stricta Ledeb. Køllenatlys. 20-100cm. Lådden, Stængelbladene bølgede, mest linjeformede. Kronbladene 2-4½cm. Frugtknuden 2-2½cm, fortykket i øvre halvdel. VI-IX. K

Epilobium. Dueurt.

1. Alle blade spredte ..... 2.
   I det mindste de nedre blade modsatte eller i kranse 3.
2. Bladene lancetformede, 10-25mm brede ..... angustifolium
   " linjeformede, 1-3½mm brede dodonaei
3. Støvfanget tydeligt 4-lappet ..... 4.
   " kølle- eller hovedformet, ikke lappet 7.
4. Stænglerne udstående dunede ..... 5.
   " tiltrykt " eller glatte 6.
5. Kronbladene 10-16mm. Kapselhårene 0,8-1,5mm ..... hirsutum
   " 4-8½mm. " 0,2mm parviflorum
6. Bladene med kileformet grund. Kronen først hvid lanceolatum
   " " afrundet grund. Kronen lyserød montanum
7. Bladene helrandede, med omrullet rand ..... palustre
   " tydeligt tandede 8.
8. Med grundstillede bladrosetter, uden udløbere ... tetragonum
   Uden " " , med " obscurum

Epilobium angustifolium L. Gederams. VI-VIII. B C K

E. dodonaei Vill. Sandgederams. 50-100cm. Opret. Bladene 2-2½cm, grønne på begge sider, tæt tiltrykt hårede. Bægerbladene vinrøde, tæt tiltrykt hårede. VI-IX. C (Sila) K

E. hirsutum L. Lådden dueurt. VII-IX. A B C K

E. parviflorum Schreber Dunet dueurt. VI-VIII. A B C K

E. montanum L. Glat dueurt. VI-VIII. A B C K

E. lanceolatum Seb.& Mauri Lancetbladet dueurt. 20-50cm. Bladene 3-5cm x 8-15mm, stilken 3-10mm. Frøtens flader med udstående kirtelhår. Kronen først hvid, senere lyserød. VI-VII. B C K

E. palustre L. Kærdueurt. VI-VIII. B C K

E. obscurum Schreber Risdueurt. VI-VII. C (Sila)

E. tetragonum L. Kantet dueurt. V-VII. A B C K. 2 underarter:
ssp. tournefortii (Michalet) Léveillé: Bægeret 8-10mm. Kronen 10-12mm. Støvfangene højere end støvknapperne. B K
ssp. tetragonum: Bægeret 4-5mm. Kronen 5-6(2½-7)mm. Støvfanget på højde med støvknapperne. A B C K

HALORAGACEAE

Myriophyllum verticillatum L. Kranstusindblad. Oftest 5 blade i kransene. Kamdelte støtteblade. VI-IX. A B K

M. spicatum L. Akstusindblad. 4 blade i krans. Hele støtteblade. VI-IX. K

M. alterniflorum DC. Hårtusindblad. Øvre blomster spredte eller modsatte. Mellemste blade med 10-18 flige. VII-IX. C (Sila)

THELIGONACEAE

Theligonum cynocrambe L. Hundekål. 2-15cm. Fuglegræslignende, stinkende enårig med opsvulmede stængelled. Nedre blade modsatte, øvre spredte. Stærkt reducerede, særkønnede blomster i bladhjørnerne. Hanblosteret 2-5-lappet, hunblosteret rørformet.II-IV.ABCK

HIPPURIDACEAE

Hippuris vulgaris L. Hestehale. V-VI. K (Salernit.)

BALANOPHORACEAE

Cynomorium coccineum L. Maltesersvamp. 10-20cm høj, mørkerød, kødet, kølleformet, svampelignende snylteplante. Snylter på Atriplex halimus, Tamarix m.m. IV-V. B

CORNACEAE

Cornus sanguinea L. Rød kornel. V-VI. A B C K

C. mas L. Kirsebærkornel. 2-8m. Kvistene gulgrønne. Bladene 4-10 cm, med 3-5 ribbepar, oversiden lidt skinnende, undersiden mørkegrøn. Sidestillede skærme med gule blomster og mørkerøde frugter. II-IV. A B C K

ARALIACEAE

Hedera helix L. Vedbend. IX-X. A B C K. Som forvildet træffes også ssp. poetarum Nyman med gule bær.

UMBELLIFERAE

1. Bladene helrandede og oftest ligestrengede ..... Bupleurum
   " takkede til fjersnitdelte 2.
2. Bladene håndstrengede, ikke helt delte ..... 3.
   " anderledes 6.
3. Krybende og rodslående planter ..... Hydrocotyle
   Ikke krybende 4.
4. 50-200cm høj plante med dobbeltskærme ..... Heracleum
   20-50cm høje planter uden egentlige dobbeltskærme 5.
5. Frugten med krogbørster. En kvast af flere skærme Sanicula
   " glat. Blomsterne i en ren top Lereschia
6. Svøbbladene tornede eller tornagtige ..... 7.
   " ikke tornagtige 8.
7. Blomsterne i dobbeltskærme ..... Echinophora
   " " hoveder Eryngium
8. Frugten med ribbestillede torne med bred eller tyk grund 9.
   " glat, dunet eller højst med børster 13.
9. Storsvøbbladene 3-kløvede til fjersnitdelte ..... Daucus
   " hele eller manglende 10.
10. Storsvøbet manglende eller reduceret ..... Caucalis
    " veldudviklet 11.
11. Skærmstrålerne tæt hviddunede ..... Pseudorlaya
    " ikke tæt hviddunede 12.
12. Storsvøbet under 1/4 af skærmstrålerne ..... Turgenia
    " mindst 1/2 x " Orlaya
13. Kronbladene gule ..... 14.
    " hvide, lyserøde eller hvidgule 32.
14. Bladene med stjærnehår på undersiden ..... Opopanax
    " uden " 15.
15. Frugtens randribber tydeligt vingede eller fortykkede .. 16.
    " " ikke " " " 23.
16. Bladene enkelt fjersnitdelte ..... Pastinaca
    " 2-flere x delte 17.
17. Storsvøbet flerbladet ..... 18.
    " 0-3-bladet 20.
18. Stænglen trekantet. Bladafsnittene lancetformede Heptaptera
    " trind. Bladafsnittene trådformede 19.
19. Randribberne bredere end rygribberne ..... Ferulago
    " og rygribberne lige brede Cachrys
20. Frugtens vinger smalle ..... 21.
    " " mindst så brede som frugten selv 22.
21. Få, affaldende småsvøbblade. Frugten med flad ryg .. Ferula
    Flere småsvøbblade. Frugten med hvælvet ryg Peucedanum
22. Yderste bladflige linjeformede, 1½-4mm brede ..... Thapsia
    " " hårtynde Elaeoselinum
23. De nedre blade med store, brede, ægformede afsnit ..... 24.
    Bladafsnittene små eller smalle 25.
24. Frugten mindst 3 x så lang som bred ..... Kundmannia
    " bredere end lang Smyrnium
25. 0-3 storsvøbblade ..... 26.
    Mange storsvøbblade 28.
26. Bladafsnittene kileformede. Med småsvøb ..... Petroselinum
    " trådformede. Intet småsvøb 27.

27. 2-flerårig. Ca. 20 ulige lange skærmstråler .... Foeniculum
Enårig. Ca. 40 m.m. lige " " Ridolfia
28. Bladene kødede. Kystplante ..... Crithmum
" ikke kødede 29.
29. Frugten stivhåret og stjærnehåret ..... Portenschlagiella
" glat 30.
30. Frugten 7-15mm. Bladfligene tråd-linjeformede ..... Cachrys
" 3-5mm 31.
31. Bladfligene lancetformede. M.m. uden stængelblade Bonannia
" linjeformede. Med stængelblade Seseli
32. Frugtens randribber tydeligt vingede eller fortykkede .. 33.
" " ikke " " " 41.
33. Frugtens rand fortykket ..... Tordylium
" " vinget 34.
34. Enårig. Intet storsvøb. Et ensidigt småsvøb ..... Aethusa
2-flerårige. Småsvøbet ikke ensidigt 35.
35. Med storsvøb ..... 36.
0-få storsvøbblade 38.
36. Frugten med 2 vingede rygribber ..... Laserpitium
" " 0 eller 3 vingede rygribber 37.
37. 1.ordens bladafsnit siddende ..... Seseli libanotis
" " stilkede Peucedanum
38. Bladafsnittene store og brede ..... 39.
" små eller smalle 40.
39. Frugten 7-10mm, med oljekanaler mellem ribberne Heracleum
" 4-5mm, uden " Angelica
40. Nedre blade 1 x delte. Frugten 6-7½mm Peucedanum schottii
" " 2-4 x delte. Frugten 2-4mm Seseli
41. Nedre bladstilke delvist underjordiske ..... 42.
" " ikke " 44.
42. Griffelfoden brat tilsmalnet i griflen ..... Bunium
" jævnt " " " 43.
43. Frugten linjeformet-aflang, med tydelige ribber .... Huetia
" ægformet-aflang, utydeligt ribbet Conopodium
44. Frugten over 3 x så lang som bred ..... 45.
" højst 3 x " " " " 49.
45. Frugtens næb 1-4 x frugten ..... Scandix
Frugten uden eller med kort næb 46.
46. Frugten uden ribber, med tydeligt næb ..... Anthriscus
" med " og uden næb 47.
47. Frugten glat ..... Chaerophyllum
" dunet 48.
48. 5-20 skærmstråler. Bladfæsterne ikke opsvulmede Athamantha
1-3 " . " opsvulmede Myrrhoides
49. 1-blomstrede småskærme. Store, findelte bægerblade Lagoecia
Bægerbladene ikke fint fjersnitdelte 50.
50. Frugten dunet eller bebørstet ..... 51.
" glat 55.
51. 0(-2) småsvøbblade ..... Pimpinella
3-flere småsvøbblade 52.
52. Frugten med et tydeligt, kort, glat næb Anthriscus caucalis
" uden et sådant næb 53.
53. Frugten stivbørstet ..... Torilis
" kortdunet 54.
54. Med storsvøb ..... Athamantha
Uden " Seseli
55. Alle luftblade 1 x fjersnitdelte med store afsnit ..... 56.
Alle eller nogle luftblade anderledes 58.
56. 0(-2) storsvøbblade. 3-12 skærmstråler ..... Apium
2-flere storsvøbblade. 10-30 skærmstråler 57.
57. Bladene dobbelt savtakkede ..... Berula
" enkelt " Sium
58. Frugten med tydelige, blivende bægerspidser ..... 59.
" uden " " " 60.

59. Frugten kugleformet, delfrugterne adskilles ikke Corinadrum
" mest forlænget, delfrugterne adskilles Oenanthe
60. Frugten en dobbeltkugle, som et liggende ottetal ... Bifora
" anderledes 61.
61. Storsvøbbladene trekløvede eller 1-2 x snitdelte ..... Ammi
" hele eller manglende 62.
62. Bladene 2-3 x trekoblede med store ægformede afsnit ... 63.
" fjersnitdelte 64.
63. Uden stor- og småsvøb ..... Aegopodium
Med " " " Physospermum
64. Intet småsvøb ..... 65.
Med småsvøbblade 67.
65. Tvebo. Stængelgrunden stærkt trævlet ..... Trinia
Ikke tvebo. Stængelgrunden ikke trævlet eller skællet 66.
66. Nedre blade med siddende 1.ordens afsnit ..... Pimpinella
" " " stilkede " " Apium
67. Frugten med rynkede eller bølgede ribber ..... 68.
" " jævne ribber 69.
68. 2-5 skærmstråler. Stænglen ikke blådugget .... Capnophyllum
10-20 skærmstråler. Stænglen blådugget Conium
69. M.m. undervandsplante. 2(4) skærmstråler .. Apium inundatum
Landplanter 70.
70. Nogle blade 1 x delte med æg-lancetformede afsnit ... Sison
Bladene mere delte 71.
71. Enårig. Nogle småsvøbblade spatelformet udvidede Ammoides
2-flerårig. Ingen spatelformede småsvøbblade 72.
72. Tvebo. Stængelgrunden stærkt trævlet ..... Trinia
Tvekønnede blomster 73.
73. 3-8 storsvøbblade ..... Carum
0-få " 74.
74. Bladfligene hårformede, 0,2mm brede ..... Meum
" bredere 75.
75. 20-45 skærmstråler ..... Cnidium
4-20 " Seseli

Sanicula europaea L. Sanikel. V-VII. A B C K

Eryngium. Mandstro.

1. Hovederne med 12-25 svøbblade ..... barrelieri
" " 3-7 " 2.
2. Svøbbladene 1-2½cm brede, bladlignende ..... maritimum
" smalle 3.
3. Grundbladene udelte ..... dichotomum
" dybt delte 4.
4. 3-4 svøbblade. Hovederne 5mm brede ..... triquetrum
5-7 " . " 10-20mm brede 5.
5. Hovedstanden bleggrøn. Grundbladene ej nedløbende campestre
" blålilla. " nedløbende amethystinum

Eryngium barrelieri Boiss. Pindsvinemandstro. 5-30cm. 1-2-årig. Grundbladene 7-10cm, linje-lancetformede. Hovederne i stænglens gaffelgreninger, 5-8mm brede. V-VI. A B C

E. maritimum L. Strandmandstro. VI-IX. A B C K

E. dichotomum Desf. Gaffelmandstro. 20-60cm. Nedre blade aflange med afskåret eller hjærteformet grund, 3½-6cm, enkelt eller dobbelt savtakkede. Hovederne lilla. V-VI. B C

E. triquetrum Vahl Trekantsmandstro. 20-40cm. Flerårig. Grundbladene tidligt visne, dybt 3-delte med hånd eller fjersnitdelte afsnit. Stænglen trekantet. Blålige hoveder. V-VII. B (Muro) C

E. amethystinum L. Blå mandstro. 20-45cm. Stængelbladenes stilk uden flige ved grunden. Småsvøbbladene helrandede. A B C K

Eryngium campestre L. Bjærgmandstro. 20-40cm. Stængelbladenes stilk med tornede, stængelomfattende flige ved grunden. A B C K

Lagoecia cuminoides L. Haresæde. 10-30cm. Enårig med røllikeagtige blade. Skærmene ½-1½cm brede, kugleformede. De store, fjersnitdelte bægerblade bliver siddende på frugten. V. A

Echinophora spinosa L. Hvid pigskærm. 20-50cm. M.m. dunet flerårig. Bladene 2 x delte med stive og tykke, tornspidsede flige. Skaftet ofte buekrummet. Storsvøbet tornet. Hvide blomster. Sandstrand. VI-IX. A B C K

E. tenuifolia L. Gul pigskærm. 20-50cm. Grådunet og gaffelgrenet flerårig. Bladene 2-3 x delte med flade, noget kødede afsnit, uden torne. 2-5 skærmstråler. Gule blomster. VIII-X. A B C K

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon Knudeskærm. 30-100cm. Stivhåret enårig med opsvulmede nedre bladfæster. Stænglen ofte lillaanløben. Skærmen med 2-3 stråler. Frugten 4-10mm. V-VI. A B C K

Chaerophyllum hirsutum L. Bjærghulsvøb. 50-120cm. Bladene med bredt trekantet omrids, ofte noget stivhårede. Blomsterne hvide eller lyserøde, tydeligt randhårede. VI-VIII. B C K

C. aureum L. Lysfrugtet hulsvøb. 80-120cm. Bladene kørvelagtige, gulgrønne, med langspidsede endeafsnit. Stænglen kort dunet og ofte også langt stivhåret og rødplettet. Blomsterne ikke randhårede. Frugten 8-12mm, gulliggrøn. VI-VII. B C K

C. temulum L. (C. temulentum) Alm. hulsvøb. V-VII. A B C K

Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel Lundkørvel. 40-150cm. Ligner Vild kørvel, men frugterne grønne til sortgrønne som modne, ofte knudrede og stivhårede. VI-VII. A B C K

A. cerefolium (L.) Hoffm. Hvaekørvel. Enårig. 1-3 småsvøbblade. Frugten 7-10mm, heraf næbbet 3-4mm. IV-VI. B K

A. caucalis Bieb. Gærdekørvel. Frugten 4-5mm, tætbørstet, næbbet 2mm. V-VII. B

Scandix. Jomfrukam. Enårige. 10-35cm. Kendelige på det lange næb.

1. Småsvøbbladene tydeligt hindekantede. Småskærmens midterfrugt m.m. siddende ..... australis
   Småsvøbet næppe hindekantet. Stilket midterfrugt 2.
2. Frugten 1½cm. Næbbet under 2 x selve frugten ... brachycarpa
   " 2-8cm. Næbbet mindst 2 x selve frugten 3.
3. Griflen 1-2½mm. Næbbet 3-4 x selve frugten .. pecten-veneris
   " 0,4-0,75mm. Næbbet 2-3 x selve frugten macrorhyncha

Scandix australis L. Udspærret jomfrukam. IV-VI. A B C

S. brachycarpa Guss. Kortnæbbet jomfrukam. IV-VI. A B C

S. pecten-veneris L. Alm. jomfrukam. IV-VI. A B C K

S. macrorhyncha C.A.Meyer

Coriandrum sativum L. Koriander. 15-50cm. Glat enårig med glinsende, smalfligede blade. Ydre kronblade forøgede. Frugten nærmest kugleformet, 3-5mm. Forvildet i kornmarker. V-VI. A B K

Bifora testiculata (L.) Roth Stinkende hulfrø. 20-40cm. Glat enårig med linjeformede bladflige. 1-3 skærmstråler. Frugten rynket, 2½-3½x4½-7mm. I kornmarker. III-V. A B C K

Smyrnium. Guldskærm. Gulblomstrede toårige. Frugterne æg-kugleformede, ofte bredere end lange.

S. olusatrum L. Stor guldskærm. 30-120cm. Bladene 3-koblede, derefter 1-2 x fjersnitdelte med brede, ægformede afsnit. Frugten 7-8mm, sort. I-V. A B C K

Smyrnium perfoliatum L. Lundgylden. 30-120cm. Nedre blade 1-2 x trekoblede med ægformede afsnit. Øvre blade ægformede og rundtakkede, meget bredt stængelomfattende. Stænglen med smalt vingede kanter. III-V. A B C K

S. rotundifolium Miller Rundbladet lundgylden. 20-60cm. Som foregående, men stænglen uden vinger og de øvre stængelblade helt eller næsten helrandede. III-V. A C

Bunium bulbocastanum L. Jordkastanje. 30-100cm. Nedre blade 2 x delte med flige på 5-12x1-1½mm. Mange skærme med (5)10-20 stråler. 5-10 storsvøbblade. 800-1900m. V-VII. A B C K

B. petraeum Ten. 20-40cm. 1-3 skærme med 5-8 stråler. 1-5 storsvøbblade. 1200-1800m. VII-VIII. B C K

Conopodium capillifolium (Guss.) Boiss. Hårbladet svinenød. 20-80cm. Stænglen bladet til grunden. Bladene 2 x delte med m.m. hårformede flige. 6-20 skærmstråler. 0-2 storsvøbblade. V-VI. A

Huetia cynapioides (Guss.) Ball. Knoldpersille. 20-40cm. Bladene 3 x delte, de yderste flige ½-1½mm brede. 6-15 skærmstråler. 0-3 stor- og 3-6 småsvøbblade. 800-1400m. VI-VII. A B K

Pimpinella. Pimpinelle.

1. Nedre blade 2 x delte. (2)5-6 skærmstråler ..... anisoides
   " " 1 x " eller hele 2.
2. Frugt og frugtknude glatte. Flerårige ..... 3.
   " " " hårede 4.
3. Stænglen mest skarptkantet. Større bladafsnit 3-7cm .. major
   " " trind. Større bladafsnit 1-2½cm saxifraga
4. Flerårig. Stængelgrunden med skællede bladrester ... tragium
   1-2-årig. Anderledes 5.
5. Frugten udstående håret. Mest over 15 skærmstråler peregrina
   " tiltrykt håret. 7-15 skærmstråler anisum

Pimpinella anisum L. Anis. 10-50cm. Enårig. Nederste blade nyreformede, de næste 1 x delte, de øvre 2-3 x smalfliget fjersnitdelte. Dyrket og forvildet. VII-VIII. A

P. peregrina L. Hårfrugtet pimpinelle. 50-100cm. Fintdunet toårig. Nederste blade hjærteformede og takkede, de næste 1 x delte, de øvre 2 x fligede. 8-50 skærmstråler. V-VII. A B C K

P. tragium Vill. ssp. lithophila (Schischkin) Tutin Skællet pimpinelle. 30-60cm. Bladresterne hvidlige. Nedre blade 1 x delte. Få og små stængelblade. 5-15 skærmstråler. VI-VII. A B C K

P. anisoides Briganti Rosetpimpinelle. 40-80cm. Flerårig. Stængelbladene m.m. reducerede til smalle bladstilke. Frugten glat eller tiltrykt dunet. 0-1300m. VI-VII. B C K (Salernit.)

P. major (L.) Hudson Stor pimpinelle. VI-VIII. A B C K

P. saxifraga L. Alm. pimpinelle. VI-VIII. B K

Aegopodium podagraria L. Skvalderkål. V-VII. K

Sium latifolium L. Bredbladet mærke. VII-IX. C K

Berula erecta (Hudson) Coville Sideskærm. VI-VIII. A B C K

Crithmum maritimum L. Stranddild. 10-50cm. Glat flerårig med 1-2 x delte blade med kødede, linje-lancetformede afsnit. 8-36 skærmstråler. Grønliggule blomster. Kystklipper. VI-VIII. A B C K

Seseli. Hjorterod.

1. Med veludviklet storsvøb ..... 2.
   Uden storsvøb (eller 1-3 hurtigt affaldende blade) 3.
2. Blomsterne hvide eller lyserøde. 20-40 skærmstråler libanotis
   " gulgrønne. 5-20 skærmstråler peucedanoides

3. Kronen gullighvid. Bredt hindekantet småsvøb ..... tortuosum
   Kronen hvid til lyserød 4.
4. Stænglen grenet fra grunden ..... viarum
   " ikke grenet forneden polyphyllum

Seseli libanotis (L.) Koch Hjorterod. B (Marsico Vetere)

S. peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol. Gul hjorterod. 40-100cm. Bladfligene 3-10x½-1mm. 10-15(5-20) skærmstråler. 5-12 storsvøbblade. 1300-1800m. V-VI. B C (Pollino, Sila)

S. polyphyllum Ten. 20-50cm. Noget blågrøn. Bladomridset lancetformet. 10-15(20) skærmstråler. Modne frugt skarpribbet. Kystklipper. VII-IX. K (Capri, Pen.Sorrentina indtil Majori og M.S. Liberatore, Montevergine)

S. viarum Calest. 30-100cm. Blågrøn. Bladomridset lancetformet. Modne frugt butribbet. Skærmstrålerne udspærrede. 100-1200m. VIII-X. B C (Pollino) K

S. tortuosum L. Vreden hjorterod. 20-70cm. Blågrøn. Stænglen gaffelgrenet og m.m. zigzagbøjet. Bladomridset trekantet. Bladene 3-4 x delte, kødede. 3-10 skærmstråler. VIII-X. A B C

Oenanthe. Klaseskærm.

1. Frugten m.m. kugleformet. 5-6 skærmstråler ..... globulosa
   " ikke kugleformet 2.
2. Skærmene kortstilkede, modsat stængelbladene ..... aquatica
   " langstilkede og endestillede 3.
3. Skærmen med 2-3 stråler. Hul stængel ..... fistulosa
   " " 4-40 stråler 4.
4. Skærm- og frugtstilke tynde. Med storsvøb ..... lachenalii
   " " " fortykkede. Uden storsvøb 5.
5. Grundbladsafsnittene ægformede. Stænglen fyldt pimpinelloides
   " smalle. Stænglen hul silaifolia

Oenanthe globulosa L. Kugleklaseskærm. 20-50cm. Nedre blade 2 x delte, ret smalfligede, med båndformet, 2-3mm bred stilk. 1 storsvøbblad. Griflerne 2/3 x frugten. IV-VI. B K

O. fistulosa L. Vandklaseskærm. V-VII. A B K

O. pimpinelloides L. Valseklaseskærm. Frugten valseformet. Griflerne over 2/3 x frugten. 6-15 skærmstråler. V-VII. A B C K

O. silaifolia Bieb. Knoldklaseskærm. 20-100cm. Frugten 2½-4mm, valse- eller omvendt kegleformet, griflerne næsten lige så lange. 4-10 skærmstråler. VI-VII. A K

O. lachenalii Gmelin Engklaseskærm. VI-VIII. A B K

O. aquatica (L.) Poiret Billebo. V-VI. A B K

Aethusa cynapium L. Hundepersille.

Portenschlagiella ramosissima (Port.) Tutin Klippefennikel. 50-80cm. Bladene 4-5 x delte med trådformede flige. Øvre grene og skærme ofte modsatte eller i krans. 30-50 skærmstråler. Kalkklipper. 50-1200m. VII-VIII. B K (Salernit.)

Athamantha macedonica (L.) Sprengel Stenøjenrod. 50-150cm. Grågrøn, stærktgrenet og dunet. Bladene 2-3 x delte med ægformede, savtakkede afsnit på 1-3cm. Mange skærme. 12-25 skærmstråler.5-8 storsvøbblade. VI-VII. A (Gargano ved M.S.Angelo)

A. sicula L. Flaskeøjenrod. 40-70cm. Nedre blade 3-4 x delte med små, smalt rudeformede afsnit på 2-3x1-1½mm. 10-20 skærmstråler og 1-3 storsvøbblade. 0-1500m. V-VI. A B C K

Foeniculum vulgare Miller Fennikel. 40-150cm. 2-flerårig. Blågrøn. Bladene 3-4 x delte med trådformede afsnit. VI-VIII. 2 ssp:

ssp. vulgare: 12-25 skærmstråler. Oftest 2-årig. Bladafsnittene mest over 10mm. Dyrket og forvildet.
ssp. piperitum (Ucria) Cout.: 4-10 skærmstråler. Flerårig. Bladafsnittene mest under 10mm. Den vilde form.

Kundmannia sicula (L.) DC. Guldmærke. 30-70cm. Glat flerårig. Stor- og småsvøb mangebladede. Frugten 6-10mm, næsten valseformet. Bladafsnittene 2-3x1½-2cm. V-VI. A C K

Meum athamanticum Jacq. Bjørnerod. 30-60cm. Glat. Stærkt krydret lugt. Stængelgrunden stærkt trævlet. Bladene 3-4 x delte. 3-15 skærmstråler. Børsteformede svøbblade. V-VIII. B C (Pollino)

Physospermum verticillatum (W.& K.) Vis. Kransstjærnesvøb. 50-100cm. Bladene 2-3 x trekoblede, afsnittene 5-11cm. Grene og skærme ofte i krans. Ægformet, uribbet frugt på 5-9mm. A B C K

Conium maculatum L. Skarntyde. VI-IX. A B C K

Cachrys. Nøddeskærm. Gule blomster. Store frugter med ribber, der ofte er tandede eller på anden måde markerede. Linjeformede flige.

1. Frugten med brede rand- og rygvinger, 15-30mm .... ferulacea
   " uden vinger, 7-15mm 2.
2. Midterskærmens storsvøb (1)2 x fjersnitdelt ..... sicula
   " " udelt eller 2-3-kløvet 3.
3. Yderste bladflige 3-5cm lange ..... pungens
   " " 5-13mm " 4.
4. Frugtens ribber glatte eller finttandede ..... libanotis
   " " uregelmæssigt kamtandede cristata

Cachrys sicula L. Tandet nøddeskærm. 30-150cm. Noget blågrøn med modsatte og kransstillede grene. 20-30 skærmstråler. Frugten 10-15mm med fint kamtandede ribber. VI-VII. A B C

C. libanotis L. Kærvet nøddeskærm. 30-120cm. Som sicula, men ofte lavere og kraftigere. 8-15 skærmstråler. Frugten 7-10mm. A C K

C. pungens Jan Ribbet nøddeskærm. 30-120cm. Frugten med finttandede ribber, ellers som sicula. VI-VII. A C

C. cristata DC. Kamnøddeskærm. 30-150cm. Bladfligene stive og lidt tornagtige. 10-12 skærmstråler. VI-VII. A

C. ferulacea (L.) Calestani Vinget nøddeskærm. 30-150cm. Stænglen trævlet forneden. Bladene 20-50(80)cm, fligene 1-4½cm. 8-15 skærmstråler. Hver delfrugt med 5 lige brede vinger. A B C K

Heptaptera angustifolia (Bertol.) Tutin Smalbladet kølleskærm. 40-100cm. Nedre blade hele, derefter 1 x delte, så 2 x delte med lancetformede afsnit på 1cm. Mange skærme. Frugten kølleformet, 13-15mm, med 4 vinger. Egeskov. 700-1200m. VI-VII. A (Gravina) B

Bupleurum. Hareøre.

1. Busk med forveddede grene. Fjerstrengede blade .. fruticosum
   Urter med ligestrengede blade 2.
2. Bladene gennemvoksede. Intet storsvøb ..... 3.
   " ikke gennemvoksede. Med storsvøb 4.
3. Mest 5-10 skærmstråler. Frugten 3-3½mm, jævn rotundifolium
   " 2-3 " . " 3-5mm, knudret lancifolium
4. Flerårig ..... falcatum
   Enårig 5.
5. Stor- og småsvøb æg-lancetformede, over 1mm brede, med stak 6.
   " " " smalle, under 1mm brede, brodspidsede 7.
6. Småsvøbet gennemskinneligt, stakken højst 1mm ... fontanesii
   " mat, med en stak på 2-3mm baldense
7. De større blade kølede på undersiden ..... praealtum
   Bladene flade 8.
8. De fleste skærme med 2-3 stråler ..... tenuissimum
   " " " " mindst 4 stråler 9.

9. 3-30cm. Bladene ½-5cm ..... semicompositum
   30-60cm. " 8-20cm gerardi

Bupleurum rotundifolium L. Rundbladet hareøre. 10-50cm. Blågrøn og ofte lillaanløben. Småsvøbbladene store og ægformede, gulgrønne, 7-10x5-7mm. V-VI. B K

B. lancifolium Hornem. Blomsterhareøre. 10-50cm. Ligner foregående. Småsvøbbladene rundagtige. IV-VI. A B C K

B. baldense Turra Stakhareøre. 5-70cm. Storsvøbbladene 10-20x2-3 mm, med gennemskinnelig kant og næppe sammenløbende tværårer. IV-VIII. A B C K

B. fontanesii Guss. Nethareøre. 5-30cm. Storsvøbbladene lancetformede, brodspidsede, hvidlige i frugt, 3-9-ribbede med tværårer, der går fremad og så bøjer brat tilbage. IV-VI. B C

B. praealtum L. Sivhareøre. 30-50cm. 2-3 skærmstråler. Storsvøbet 2-5x0,3mm, sylformet, ½-1/3 x strålen. V-IX. A B C K

B. gerardi All. Børstehareøre. 30-60cm. Bladene ofte noget seglkrummede. VIII-IX. A B C K

B. tenuissimum L. Smalbladet hareøre. Frugten finvortet. A B C K

B. semicompositum L. Hvidknudret hareøre. 3-30cm. Frugten 1½-2 mm, dækket af små, hvide vorter. IV-VI. A B C

B. falcatum L. Seglhareøre. 20-100cm. 3-15 skærmstråler. 2-5 lancet- til sylformede storsvøbblade. 5 linje-lancetformede småsvøbblade. VII-VIII. A B C K

B. fruticosum L. Buskhareøre. 1-2m. Stedsegrøn busk med læderagtige blade på 10-11x2-3cm med skinnende overside. Endestillede skærme med 7-11 stråler. VI-VII. A (C.di Leuca - forvildet?)

Trinia glauca (L.) Dumort Trævlskærm. 20-40cm. Glat og blågrøn flerårig. Stænglen kantet, bugtet og hyppigt grenet. Bladene med smalle flige på 5-30mm. Frugten 5-ribbet. V-VII. B C K

T. dalechampii (Ten.) Janchen Lav trævlskærm. 5-12cm. Hver stængel med 1 kurv. Bladfligene 5x1mm. Frugten med 9 ribber. 1300-2500m. VII-VIII. B (Pollino) K

Apium. Sumpskærm.

1. Intet småsvøb ..... 2.
   5-7 småsvøbblade 3.
2. Bladafsnittene smalle ..... leptophyllum
   " brede graveolens
3. 2(4) skærmstråler. Nedre blade findelte ..... inundatum
   3-12 " . Æg-lancetformede bladafsnit nodiflorum

Apium graveolens L. Vild selleri. V-IX. A B C K

A. nodiflorum (L.) Lag. Kortstilket sumpskærm. 30-100cm. Krybende eller opstigende, rodslående. Skærmene kortstilkede, ofte næsten siddende i bladhjørnerne. Bladene 1 x delte. V-VII. A B C K

A. inundatum (L.) Rchb.f. Svømmende sumpskærm. V-VI. K

A. leptophyllum (Pers.) Mueller Finbladet selleri. 20-50cm. Ofte 2 skærmstråler. Bladene findelte. Tørbundsplante. V-VI. K (væk?)

Petroselinum crispum (Miller) A.W.Hill Havepersille. Forvildet.

Ridolfia segetum Moris Smalflig. 30-80cm. Glat, stinkende enårig. Øvre blade ofte reducerede til den opblæste bladstilk. Frugten 1½-2½mm. Kornmarker. V-VI. A B C K

Sison amomum L. Krydderskærm. 30-60cm. Toårig. Nedre blade 1-2 x delte med 5-9 æg-lancetformede, undertiden lappede småblade. De øvre smalfligede. 3-6 uens skærmstråler. 2-4 stor- og småsvøbblade. Talrige skærme. VI-VIII. B C K

Lereschia thomasii (Ten.) Boiss. Kvastskærm. 20-50cm. Bladene mest grundstillede, med 3 rudeformede, tandede flige. En stor, uregelmæssig top. 800-1400m. VII-VIII. Fugtige skove, kløfter, sumpe. C (Sila, Serra S. Bruno, Aspromonte)

Ammi. Fligsvøb. 1(-2)-årige.

1. Nedre blade 2-3 x delte med brede afsnit ..... majus
   Alle blade med trådformede flige 2.
2. Skærmstrålerne fortykkede og oprette i frugt ..... visnaga
   " ikke sådan crinitum

Ammi visnaga (L.) Lam. Kostfligsvøb. 20-60cm. Storsvøbet 1-2 x fjersnitdelt. 13-50 skærmstråler. V-IX. A B C K

A. majus L. Fligsvøb. 30-60cm. Storsvøbet 3-kløvet eller fjersnitdelt. 15-30(60) tynde skærmstråler. V-VII. A B C K

A. crinitum Guss. Finbladet fligsvøb. 50-160cm. Bladene ganske findelte. Ellers nær visnaga. IV-VI. C

Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. Hårskærm. 10-50cm. Stænglen blågrøn, til sidst rødlig. Nedre blade med lancetformet omrids, 2 x delte med 0,2mm brede, hårfine flige. 5-11 uens skærmstråler. Intet storsvøb. 0-1400m. IV-VI. A K

Hydrocotyle vulgaris L. Vandnavle. V-VII. K

H. ranunculoides L. Nyrebladet vandnavle. 10-30cm. Bladpladen m.m. nyreformet og håndlappet, ikke skjoldformet; stilken 2-3mm tyk, kødet. 5-10 blomster i en enkel skærm. IV-VIII. C K

Carum multiflorum (S.& S.) Boiss. Mangeblomstret kommen. 10-50cm. Grundbladene med bredt trekantet omrids, 3-4 x delte, med stilkede 1.ordens afsnit. Talrige skærme. 15-35 skærmstråler. VI-VII. A

C. flexuosum Nyman (C. heldreichii p.p.) Bugtet kommen. 20-40cm. Nedre blade med aflangt omride og siddende 1.ordens afsnit, smalfligede. 6-7 skærmstråler. 1600-2400m. VI-VII. B K

Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai Klippebrændeskærm. 50-120 cm. Nedre blade 3-4 x delte med rukantede flige på 4-10x½-2mm. 20-40 skærmstråler. Oftest uden storsvøb. VI-VII. B C K

Angelica silvestris L. Angelik. VI-VIII. B C K

Bonannia graeca (L.) Hal. Harpiksskærm. 30-70cm. Grundbladene med lancetformet omrids, 2 x delte med lancetformede flige. Reducerede stængelblade. Mange skærme med 10-15(20) stråler med både stor- og småsvøb. 350-1500m. VI-VII. C (Pollino, Sila)

Capnophyllum peregrinum (L.) Lange Rynkefrø. 10-50cm. Glat enårig. Bladene 3 x delte, jordrøgsagtige. 2-5 skærmstråler. Frugten 4-6mm, med kraftige, tværrynkede ribber. IV-V. A B C

Ferula communis L. Alm. ferle. 1-2m. Stænglen meget kraftig, blågrøn-lilla. Nedre blade 30-60cm, 4-6 x delte medlinjeformede afsnit på indtil 5cm. Øvre blade i form af store skeder. A B C K
ssp. communis: Bladfligene højst 1mm brede, begge sider grønne.
ssp. glauca (L.) Rouy & Camus: Bladfligene indtil 3mm brede, friskgrønne ovenpå, blågrønne nedenunder. V-VI.

Ferulago campestris (Besser) Grec. Alm. birkerod. 50-120cm. Bladets omrids trekantet-ægformet, bredest ved grunden. Øvre grene m.m. kransstillede. Frugten 8-12mm. VII-VIII. A B C K

F. silvatica (Besser) Rchb. Smalbladet birkerod. 40-120cm. Bladene med lancetformet omrids, bredest midtpå. Frugten 6-8mm. Ellers nær foregående. 300-1200m. VI-VII. B C (Pollino)

Opopanax chironium (L.) Koch Stor gummirod. 1-2½m. Nedre blade 2 x delte med ægformede afsnit på 5-8x3-5cm. 5-10(25) skærmstråler. Gul krone. Frugten 7-12mm, meget smalvinget. V-VII. A B C K

Opopanax hispidus (Friv.) Griseb. Håret gummirod. 1-3m. Nedre blade med stivhårede, lancetformede afsnit på 4-12cm. 6-13 skærmstråler. Orangegul krone. Bredvinget frugt. V-VII. A? B?

Peucedanum. Svovlrod.

1. Blomsterne gule ..... 2.
   " hvide 3.
2. Med store, ægformede bladafsnit på 1½-4x1-2cm verticillare
   Bladene 4-6 x trekoblede med linjeformede flige officinale
3. Bladafsnittene linjeformet-aflange ..... schottii
   " m.m. ægformede 4.
4. Bladafsnittene 2-4x1-2cm ..... cervaria
   " 1-8mm brede 5.
5. Storsvøbbladene udstående, tiltrykte strålerne ..... venetum
   " hængende under blomstringen 6.
6. Bladskaftet med et knæk for hvert småblad ..... oreoselinum
   " uden nedbøjede knæk austriacum

Peucedanum officinale L. Lægesvovlrod. 60-200cm. Trævlet stængelgrund. Bladene kostformede, fligene 8-9cm x 1½mm. 10-40 skærmstråler. 0-3 storsvøbblade. Frugten 5-10mm. VII-VIII. A B C K

P. schottii Besser Forskelligbladet svovlrod. 30-60cm. Stængelgrunden hvidtrævlet. Nedre blade 2-3 x delte, de øvrige 1 x smalfligede: 5-10cm x 1½-2mm. VII-IX. B C K

P. venetum (Sprengel) Koch Rank svovlrod. 80-120cm. Stænglen kantet-furet, ofte rødlig foroven; øvre grene ofte i krans. Ofte ret mange og ret små skærme. VIII-IX. K (Montevergine)

P. austriacum (Jacq.) Koch Østrigsk svovlrod. 50-100cm. Stænglen furet, grunden ikke trævlet. Nedre blade 20-40cm, 3-4 x delte, fligene indtil 1,2mm brede. VII-VIII. B C K

P. oreoselinum (L.) Moench Bakkesvovlrod. 30-60cm. Nedre blade 2-3 x delte med vinkelret udstående sideafsnit; yderste flige trekantede med 3-4 brodspidsede lapper. VI-VIII. A B C K

P. cervaria (L.) Lapeyr. Hjortesvovlrod. 40-120cm. Trævlet stængelgrund. Nedre blade 2-3 x delte med ægformede, brodtandede afsnit. VIII-IX. K (Montevergine)

P. verticillare (L.) Koch Kæmpesvovlrod. 1-3½m. Stænglen lilla og stribet, 1-2½(5)cm tyk, med kransstillede skærme foroven. 10-30 skærmstråler. Gulgrønne blomster. VI-VIII. K

Pastinaca sativa L. ssp. urens (Req.) Celak. Pastinak. A B C K

Heracleum sphondylium L. Bjørneklo. V-X. 2 underarter:
ssp. montanum (Schl.) Briq. (ssp. cordatum): Større stængelblade mest med tre afsnit.
ssp. sibiricum (L.) Simonkai (?): Større stængelblade med mest 5 afsnit.

Tordylium. Skjoldfrø. 1-2-årige. Frøet skiveformet med en tyk og ofte rynket randvulst. Ydre randkroner forøgede. Bladene (0)1 x delte. Hvid krone.

T. maximum L. Stort skjoldfrø. 30-50cm. Frugten 5-8mm, stivbørstet; randvulsten jævn. V-VII. A B C K

T. officinale L. Lægeskjoldfrø. 20-50cm. Frugten 2-3mm, blødhåret; randvulsten rynket. Ydre blomster med 2 forøgede kronblade med meget uens lapper. V-VI. A B C K

T. apulum L. Storkronet skjoldfrø. 20-50cm. Frugten 5-8mm, blødhåret; randvulsten rynket. Ydre blomster med 1 forøget kronblad med 2 m.m. lige store lapper. V-VII. A B C K

Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. Hvidvinget oljeskærm. 50-120 cm. Flerårig. Nedre blade 20-40cm, 3-5 x delte med hårtynde, ofte

kransstillede afsnit. Frugten 8-15mm, bredt hvidvinget. A B C K

Laserpitium garganicum (Ten.) Bertol. Finttandet foldfrø. 20-50 cm. Grundbladene 10-25cm, 2-3 x delte med bredt lancetformede, næsten helrandede afsnit med kileformet grund. VI-VII. A B C K

L. latifolium L. Bredbladet foldfrø. 50-150cm. Bladene 2 x delte med bredt ægformede, tandede afsnit på 3-10x2-6cm med hjærteformet grund. VI-VIII. B C K

Thapsia garganica L. Storfrugtet vingeskærm. 30-250cm. Nedre blade 10-40cm, 2-3 x delte med smalle flige med omrullet rand og lysere underside. Frugten 12-25mm med 3-6mm brede, dybt udrandede, let bølgede vinger. Intet svøb. V-VII. A B C K

Torilis. Randfrø. 1(2)-årige.

1. Skærmstrålerne meget korte, skærmene hovedformede ... nodosa
   Skærmene ikke hovedformede 2.
2. Med kortstilkede skærme modsat bladene ..... leptophylla
   Alle skærme langstilkede 3.
3. 4-6(12) storsvøbblade ..... japonica
   0-1 storsvøbblade arvensis

Torilis nodosa (L.) Gaertner Liggende randfrø. 20-50cm. Mest liggende. Skærmene siddende eller kortstilkede modsat bladene. Delfrugterne uens: 1 med børster + 1 med vorter. III-VIII. ABCK

T. arvensis (Hudson) Link Markrandfrø. 20-60cm. IV-VIII. ABCK
ssp. arvensis: 4-12 skærmstråler. Ydre kronblade kun lidt større. Griflen 2-3 x griffelfoden. A B C K
ssp. neglecta (Schultes) Thell.: 4-12 skærmstråler. Ydre kronblade tydeligt større. Griflen 3-6 x griffelfoden. A (Otranto)
ssp. elongata (Hoffm.& Lk.) Cannon: Mest 2 skærmstråler i en vinkel på 90°. Øvre blade fligede som de nedre. Frugten 5-6mm.
ssp. purpurea (Ten.) Hayek. Mest 3 skærmstråler med vinkler på 45-60°. Øvre blade smalfligede. Frugten 4-5mm.

T. japonica (Houtt.) DC. Hvast randfrø. VI-VIII. A B K

T. leptophylla (L.) Rchb.f. Gultornet randfrø. 10-40cm. Frugten linje-valseformet, ca. 5mm, gulbørstet. Skærmstilkene 2-3cm. 2-4 skærmstråler. V-VI. A K

Caucalis platycarpos L Fodangel. 5-30cm. Opret enårig. Bladene 2-3 x delte, fintfligede med trekantet omrids. 2-5 skærmstråler. Kronbladene ca. 2mm. Frugten 6-13x5mm, krogtornet. V-VII. ABCK

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Burreskærm. 20-40cm. Enårig. Bladene 1 x fjersnitdelte med tandede eller fligede, lancetformede afsnit. 2-5 skærmstråler. Frugten 6-10x7mm. V-VI. A B C K

Orlaya. Bredfrø. Stivhårede enårige med 2-4 x fligede blade.

O. kochii Heyw. Fladfrugtet bredfrø. 10-30cm. 2-4 skærmstråler. Ydre kronblade 2-3 x de øvrige, 5-7mm. Frugten 10-15mm.V-VI.ABCK

O. grandiflora (L.) Hoffm. Storblomstret bredfrø. 20-70cm. 5-12 skærmstråler. Ydre kronblade indtil 8 x de øvrige, 8-12mm. Frugten ca. 8mm. V-VIII. A B K

Daucus. Gulerod.

1. Enårig. Nedre blades flige 0,3-0,7mm brede ..... 2.
   2-flerårig. Nedre blades flige mindst 1mm brede 5.
2. Storsvøbet udstående under blomstringen ..... 3.
   " nedadrettet under blomstringen 4.
3. Storsvøbet ofte længere end skærmstrålerne ..... guttatus
   " højst lig skærmstrålerne broteri
4. Kronen hvid hele tiden. Frugtens torne sølvhvide muricatus
   " efterhånden gullig. Frugtens torne gullige aureus

5. Frugtskærmen stærkt sammentrængt. Frugtens torne så brede som selve frugten ..... carota
   Frugtskærmen ikke eller svagt sammentrængt. Frugtens torne 1/2-1/3 x så brede som selve frugten gingidium

Daucus muricatus (L.) L. Uligestilket gulerod. 10-30(60)cm. 8-14 meget uens skærmstråler, der er m.m. sammentrængte i frugt. Ydre kronblade forøgede. Tornene med sammenløbende grund. V-VI. B C K

D. broteri Ten. Grenet gulerod. 15-50cm. 8-14 korte skærmstråler. Frugten 4-6mm, tornene med sammenløbende grund. V-VI. ABCK

D. aureus Desf. Gulblomstret gulerod. 10-30(60)cm. Skærmstrålerne lidt uens. Ydre kronblade svagt forøgede. Frugten 4-6mm, tornene sjældent sammenløbende ved grunden. V-VI. C

D. guttatus S.& S. Plettet gulerod. 20-60cm. 8-25 kun lidt uens skærmstråler. Midterblomsten mørklilla. Frugten 2-4mm. A B C K

D. carota L. Vild gulerod. Opret eller opstigende. Storsvøbet med linjeformede flige. IV-X. A B C K. 4 underarter:
ssp. maritimus (Lam.) Batt.: Endeskærmen 3-5cm. Yderste bladafsnit ca. 10 x så lange som brede.
ssp. carota: Endeskærmen 5-10cm. Frugtens torne enkle. Opret.
ssp. major (Vis.) Arc.: Endeskærmen 5-10cm. Frugtens torne enten enkle eller også med to kroge. Oftest opstigende.
ssp. maximus (Desf.) Ball: Endeskærmen 12-20(30)cm. Ofte med stjærneformet stillede tokrogede torne på frugten.

D. gingidium L. Kystgulerod. (D. gummifer). Liggende til opstigende. Storsvøbet med lancet- eller linje-lancetformede flige. Klipper og sandstrand. III-XII. A B C K. 4 underarter:
ssp. mauritanicus (L.) Onno: Bladafsnittene af 1. og 2. orden danner en ret vinkel med skaftet (eneste ssp.). K
ssp. fontanesii (Thell.) Onno: Bladpladen hindeagtig . Planten tæt stivhåret. Frugtskærmen undertiden sammntrængt. A
ssp. gingidium: Bladene glatte til svagt hårede, over 20cm. 2.ordens afsnit fjerfligede med æg-/lancetformede afsnit. K
ssp. polygamus (Gouan) Onno: Bladene glatte til svagt hårede, under 20cm. 2.ordens afsnit oftest 3-tandede eller lancetfligede.

Pseudorlaya pumila (L.) Grande Sandskærm. 5-20cm. Tæthåret enårig. Bladene 2-3 x delte. Oftest 3 skærmstråler. 2-5 grønne, linjeformede storsvøbblade. Frugten 7-10x5-6mm. Sandstrand.IV-V.ABCK

PYROLACEAE

Pyrola minor L. Liden vintergrøn. VI-VII. K C (Sila, Aspromonte)

Orthilia secunda (L.) House Ensidig vintergrøn. VI-VII. B C K

Monotropa hypopitys L. Snylterod. VI-VII. A B C K

ERICACEAE

Erica. Lyng.

1. Støvknapperne indesluttede i kronen ..... 2.
   " rager ud af kronen, denne lyserød 3.
2. Kronen 5-7mm, lyserød ..... terminalis
   " 2½-4mm, hvid arborea
3. Støvknapperne 0,7-1mm, dybt kløvede ..... manipuliflora
   " 1,5mm, svagt kløvede foroven multiflora

Erica terminalis Salisb. Kildelyng. 1-2½m. Grenene rødbrune, med et hvidt skær af korte hår. Bladene 3-7mm. Blomsterstandene skærmagtige og endestillede. VI-VII. K (Capri, ved Salerno m.m.)

E. arborea L. Trælyng. 1-5m. Bladene 3-5mm. Blomsterne i sidestillede klaser, samlede i en slags top. Unge kviste tæt dunede af korte, glatte og længere, piggede hår. III-V. A B C K

Erica manipuliflora Salisb. Kranslyng. 30-60cm. Mest liggende til opstigende. Blomsterne mest på sidestillede grene og overragede af bladbærende grene. Kronen 3-3½mm. Bladene 4-8mm. A

E. multiflora L. Kratlyng. 80-150cm. Mest opret. Blomsterne i endestillede knipper. Kronen 4-6mm. Bladene 6-11mm. IX-XI. ABCK

Arbutus unedo L. Jordbærtræ. 1-8m. Busk eller træ. Unge kviste med kirtelbørster. Bladene 4-11x1½-4cm, stedsegrønne, læderagtige, skinnende ovenpå med finttandet rand og en stilk på 1cm. Hvidlige, krukkeformede blomster på 6-10mm i hængende klaser. Frugten et finvortet, rødt bær på 2cm. X-XI. A B C K

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel Hedemelbærris. VI-VII. K

PRIMULACEAE

Primula. Kodriver. Kun gulblomstrede arter.

1. Bladene rynkede. Bægret kantet ..... 2.
   " jævne. Bægeret trindt 3.
2. Blomsterstilkene udgår lige fra rosetten ..... vulgaris
   Blomsterne i en stilket skærm veris
3. Støttebladene finttandede, 10-25mm ..... palinuri
   " helrandede, 1-4mm auricula

Primula vulgaris Hudson Storblomstret kodriver. II-III. A B C K

P. veris L. ssp. columnae (Ten.) Lüdi Hulkravet kodriver. K

P. auricula L. Aurikel. 5-16cm. Bladene 5-12cm, smalt hindekantede. Skærmen ofte mangeblomstret med hindeagtige støtteblade. Blomsterstilkene 1-2cm. 300-2600m. IV-VII. K (M. Cervati)

P. palinuri Petagna Guldkodriver. 8-20cm. Bladene bredt spatelformede, kødede, klæbrige, duftende, korttandede. Mest 10-20 mørkegule blomster. Fugtige kystkalkklipper. 0-400m. II-IV. B C K (Fra Capo Palinuro til Marina di Camerota, P.ta degli Infreschi, P.ta Caina ved Maratea, Fiuzzi, Scalea, Isola di Dino)

Androsace villosa L. Håret fjældarve. 2-3cm. Rosetdannende pudeplante. Bladene 4x1mm, lancetformede, hårede. Skafter på 2-3cm med 1-5 hvide blomster med vinrød midte. VI-VII. C (Pollino) K

Soldanella. Alpeklokke. Bjærgplanter med runde til nyreformede, tykke, glatte og stedsegrønne rosetblade, ingen stængelblade og hængende, frynsede, lyslilla kroner.

S. alpina L. Alm. alpeklokke. 5-15cm. Unge bladstilke med siddende kirtler, der efterhånden falder af. V-VII. C (Pollino)

S. hungarica Simonkai ssp. major (Neilr.) S.Pawł. Stor alpeklokke. 5-15cm. Bladstilkene med mange kirtelhår på 0,1-0,4mm. V-VI. 1000-1500m. C (Sila, Aspromonte)

Cyclamen hederifolium Aiton Vedbendbladet alpeviol. Blomsterne blegrøde til hvide med rødlilla pletter ved svælget og ørede kronflige. Bladene med 5-9 store takker, fremme efter blomsterne. 0-1300m. VIII-X. A B C K

C. repandum S.& S. Tandet alpeviol. Blomsterne mest ensfarvet rødlilla, kronfligene ikke ørede. Bladene med store tænder eller svage lapper, samtidige med blomsterne. IV-V. A B C K

Lysimachia nemorum L. Lundfladstjærne. V-VII. B C K

L. nummularia L. Pengebladet fredløs. V-VIII. K (Fusaro)

L. vulgaris L. Almindelig fredløs. VI-VIII. B C

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby Stjærnehør. 3-12cm. Glat enårig, friskgrøn og opret. Bladene linje-lancetformede, spidse, modsatte, helrandede, 3-7x½-1½mm. Stjærneformet bæger på 3-6mm og en meget lille hvid krone på nedbøjede stilke. III-V. A B C K

Anagallis. Arve.

1. Kronen 11-20mm bred, blå. Flerårig ..... monelli
   " mindre. Enårig 2.
2. Kronen 4-6mm bred, af bægerets længde ..... parviflora
   " 8-10mm " , længere end bægeret 3.
3. Kronen med få eller ingen randhår, altid blå ..... foemina
   " " mange randhår, rød eller blå arvensis

Anagallis arvensis L. Rød arve. Blomsterne kan også godt være blå, hvorved planten ligner følgende art. IV-X. A B C K

A. foemina Miller Blå arve. Som foregående, men de øvre blade ofte lancetformede. Blomsterstilkene ofte kortere end bladene under blomstringen. IV-X. A B C K

A. parviflora Hoffm.& Lk. Småblomstret arve. 5-15cm. Blomsterne altid blå. Bladene stængelomfattende. Blomsterstilkene 2-3 x deres blade. Mudder,fugtig jord. V-IX. C

A. monelli L. Pragtarve. 10-50cm. Opret eller opstigende. Bladene lancetformede eller linje-lancetformede, spidse, 2-3 sammen. Blomsterstilkene krumme, 2-5cm. III-VI. B (Pignola)

Samolus valerandi L. Samel. VI-IX. A B C K

Coris monspeliensis L. Pigkrans. 10-30cm. Med lyngagtig vækst og blade. Tætte, endestillede klaser af rødlilla blomster. Bægeret klokkeformet med 2 rækker tænder, hvoraf den ydre er sylformet og udstående. Kronen 9-12mm med lille overlæbe og 5-lappet underlæbe. III-V. K (Positano på Pen.Sorrentina)

PLUMBAGINACEAE

Plumbago europaea L. Blyrod. 30-100cm. Flerårig. Nedre blade ægformede og langstilkede, øvre siddende, øreformet omfattende, med melet underside. Bægeret rørformet, 5-7mm, tæt stilkkirtlet på ribberne. Kronen blålilla med et rør på 1½ x bægeret og hjulformede kronflige. VI-X. A B C K

Armeria. Fåreleger.

1. Skeden under hovedet kortere end dettes bredde ..... 2.
   " " " mindst lig " " 3.
2. Hovedet 17-23mm bredt. Bladene lidt indrullede majellensis
   " 12-16mm " . " ikke " nebrodensis
3. Ydre svøbblade højst lig de indre, mellemste spidse canescens
   " " større end de " , " butte macropoda

Armeria canescens (Host) Boiss. Grå fåreleger. 15-60cm. 3-5 bladstrenge. Bægerets stilk 2/3 x røret. 600-1800m. A B C K.2ssp:
ssp. canescens: Ydre blade 5-12cm x 4-5½mm, de indre 17-21cm x 2½-3mm. Bægerrøret ensartet håret. V-VIII. A
ssp. gracilis (Ten.) Bianchini: Ydre blade 6-13cm x 1-2½mm, de indre 5-8cm x 2,5-3,3mm. Bægerrøret kun håret på ribberne. VI-IX.

A. nebrodensis (Guss.) Boiss. 8-20cm. Bladene 1-strengede, de ydre udbøjede, 3-3½cm x 2-2,3mm, de indre 5-6cm x 1-1,2mm. Skeden under hovedet 7-11mm. 600-1900m. VI-VII. C (Aspromonte)

A. majellensis Boiss. ssp. ausonia Bianchini 13-40cm. Bladene 1-3-strengede, 4-7cm x 0,5-2,2mm, de ydre bredest. VI-IX. A B C K

A. macropoda Boiss. Grønhovedet fåreleger. 30-70cm. Bladene 3-5-strengede, de ydre 4-10cm x 3-9mm, de indre 7-15cm x 1½-4mm. Svøbbladene friskgrønne. 600-1500m. V-VII. K (Montevergine, M.Motola, Alburno) B (M.Serranetta, Sasso di Castalda, Pietrapterosa)

Limonium. Hindebæger.

1. Bladene lappede. Kronen bleggul eller lyserød ..... sinuatum
   " helrandede (evt. manglende) 2.

2. Enårig. Småaksene bananagtigt krummede, ½-2/cm ... echioides
   Flerårige 3.
3. Blomsterstanden højst med nogle få golde grene ..... 4.
   " med mange golde grene 7.
4. Bladene fjerstrengede, 10-15cm lange ..... serotinum
   " ligestrengede 5.
5. 8-13 småaks/cm ..... tenoreanum
   4-6 småaks/cm 6.
6. Grenleddene rette og ru. Bladene 5-9mm brede ..... calabrum
   " krumme og jævne. Bladene 4-5mm brede inarimense
7. Ydre dækblad overvejende hindeagtigt ..... bellidifolium
   " " " urteagtigt 8.
8. Stængler og grene gråligt dunede ..... 9.
   " " " glatte 10.
9. Grenvinklen but: 90-180° ..... cancellatum
   " spids johannis
10. 5-10(20)cm høj. Grenene knudrede. Grenvinklen 90° japygicum
    10-30cm høj 11.
11. Bananagtigt krummede småaks ..... virgatum
    Rette småaks 12.
12. Toppens led 2-2½cm. Aksene 5-9cm ..... remotispiculum
    " " højst 2cm. Aksene indtil 3½cm multiforme

Limonium sinuatum (L.) Miller Bugtet hindebæger. 20-40cm. Bladene med 4-7 par lapper. Bægeret ofte lillat. V-VII. C (Crotone)

L. serotinum (Rchb.) Pign. (L. vulgare ssp. s.) 30-70cm. A B C K

L. bellidifolium (Gouan) Dum. Gaffelhindebæger. 10-30cm. Bladene 14-40x3-6mm, spidse, ofte visne under blomstringen. Talrige toppe, der ofte danner en hel halvkugle. VI-VII. A K

L. cancellatum (Bernh.) O.Kuntze Gitterhindebæger. 10-18cm. Bladene 15-27x3-5mm. Toppen netagtig, med ofte vandret udstående grene. Aksene 1-2½cm. VI-VII. A (Torre Mileto til Otranto)

L. johannis Pign. Fåblomstret hindebæger. 15-25cm. Bladene 20-50 x 6-9mm. Toppen tæt, kun med aks foroven, disse reducerede eller med 2-4 småaks/cm. VI-VIII. K (Napolibugten ved Capri, Posillipo, Gaiola og Sorrento)

L. japygicum (Groves) Pign. Tjørnehindebæger. Bladene 10-15x3mm. Toppen stærktgrenet. Aksene reducerede eller 1-3cm med 5-6 småaks /cm. VI-VIII. A (mellem Galipoli og P.to Cesareo, Otranto)

L. multiforme (Martelli) Pign. Foranderligt hindebæger. 15-40cm. Bladene 20-30(55)x5-6(9)mm, rynkede ovenpå. 3-4 småaks/cm. VI-VII. K (Gaeta). Som småarten L. amynclaeum Pign.

* L. calabrum Brullo (L. minutiflorum p.p.) Småblomstret hindebæger. 15-25(35)cm. Bladene 20-25mm. Aksene korte, de yderste indtil 2-4cm. VI-VIII. C (Copanello)

L. remotispiculum (Lacaita) Pign. Fjærnakset hindebæger. 20-30 cm. Bladene 30-40x4-5mm, omrullede. Topleddene indtil 3cm, grenvinklen 15-45°. 1-2 småaks/cm. VII-IX. B C K (fra Pen.Sorrentina (Positano) til Policastro-bugten (Scalea og Cirella))

L. inarimense (Guss.) Pign. Krumhornet hindebæger. 10-20cm. Bladene 6-8 x så lange som brede. Ellers som foregående. VI-VIII. K (Napoli-bugten på Ischia og Castellamare)

L. tenoreanum (Guss.) Pign. Smaltoppet hindebæger. 10-15cm. Bladene 20-40x4-7mm, omrullede. Aksene korte, 9-13mm. VI-VIII. K (Castellamare, Ischia?)

L. virgatum (Willd.) Fourr. Rishindebæger. (L. oleifolium). 15-50cm. Bladene 30-55x4-9mm. Aksene 2-4cm med ca. 4 småaks/cm. Let kendelig ved sine bananformede småaks. VI-VIII. A B C K

Limonium echioides (L.) Miller Enårigt hindebæger. 5-12(30)cm. Bladene 2-4x1-1½cm, knudrede, utydeligt fjerstrengede. ½-2cm mellem de enkelte småaks i de 2-10cm lange aks. V-VII. A

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. Buskhindebæger. 30-70(120) cm. Ligner Limonium, men er en dværgbusk med grenede, bladede stængler. Bladene kødede, spatelformede, blågrønne. Aksene 5-10cm lange. Kronen 1-2cm bred, lyserød. Saltsumpe. VI-VIII. A C

EBENACEAE

Diospyros lotus L. Dadelblomme. 3-15m. Bladene spredte, uden fodflige, 5-10x2-3cm, elliptiske, helrandede, tilspidsede, dunede som unge, kortstilkede. Blomsterne 4-tallige, akselstillede; hanblomsterne 2-3 sammen og ca.5mm; hunnerne enlige og 8-10mm. Kronen rødlig- eller grønlighvid. Frugten rund, 1,5cm, gul eller blåsort. VI-VII. Dyrket og sj. forvildet.

STYRACACEAE

Styrax officinalis L. Jødevirak. 2-7m. Busk til træ med spredte, bredt ægformede, helrandede, butte, hvidt stjærnehårede blade. Hængende klaser med 3-6 hvide, 5-7-fligede blomster på ca. 2cm. Bægeret klokkeformet, ganske korttandet. IV-V. K (Mondragone)

OLEACEAE

Jasminum officinale L. Lægejasmin. 1-5m. Klatrende busk. Bladene modsatte med 5-7 småblade, det yderste langt tilspidset og 2 x de andre. Blomsterne 4-5-tallige, hvide, hjulformede med langt rør. V-IX. Dyrket og forvildet.

Fontanesia phillyraeoides Labill. Løvfældende stenved. 1-3m. Glat, tætgrenet busk. Bladene modsatte, lancetformede, 1½-4cm x 5-12mm, helrandede og spidse. 4-tallige, hvidlige blomster i korte kvaste fra bladhjørnerne eller grenenderne. Kronen 1½-2mm, delt næsten til grunden. Bægeret ½mm. Frugten 6-9mm, elliptisk og bredt vinget på begge sider. IV-V. C (forv. ved S. Ferdinando)

Fraxinus ornus L. Bjærgask. 1-10m. 2-4 par 2-6mm langt stilkede småblade. Knopperne grålige eller brunlige, m.m. blåduggede. Kronblade forefindes, 5-6mm lange, linjeformede, i oprette, oftest endestillede toppe. IV-V. A B C K

F. oxycarpa Bieb. 5-15m. 2-6 par siddende, smalt lancetformede småblade. Unge kviste glatte, skinnende grønne. Knopperne mørkebrune. XI-I. A B C K

Olea europaea L. Oliventræ. 1-10m. Grå, udstående, ofte noget kantede grene. Bladene modsatte, mest lancetformede med mørkt grågrøn, glat overside og lysegrå underside. IV-VI. A B C K

Ligustrum vulgare L. Almindelig liguster. IV-V. A B C K

Phillyrea. Stenved. Stedsegrønne buske eller træer. Kvistene trinde. Bladene modsatte. Blomsterne 4-tallige i korte, akselstillede klaser, små. Frugten en m.m. rund, blåsort stenfrugt på 6-10mm.

P. angustifolia L. Smalbladet stenved. 1-3m. Bladene smalt lancetformede, 2-8cm x 3-15mm, helrandede med 4-6 par svage sideribber. III-V. B C K

P. latifolia L. Bredbladet stenved. 1-5(15)m. 2 slags blade: De unge ægformede, 2-7cm, m.m. savtakkede; de ældre lancetformede til elliptiske, 1-6cm, helrandede eller fint takkede. 7-11 par oftest tydelige sideribber, der er bølgede og tydeligt delte mod spidsen. III-V. A B C K

GENTIANACEAE

Cicendia filiformis (L.) Delarbre Bitterblad. 3-12cm. Opret enårig. Få linjeformede bladpar på 2-6mm. Blomsterne 4-tallige, lang-

stilkede med en gul krone på 4-5mm. IV-V. K (Versilia)

Blackstonia. Bitterling. Glat, blågrøn enårig på 10-60cm. Kronen hjulformet, gul, 6-8-tallig. Bladene ofte parvist sammenvoksede.

1. Øvre stængelblade næppe tilsmalnede mod grunden perfoliata
   " " tydeligt tilsmalnede mod grunden 2.
2. Øvre stængelblade smalt forbundne ved grunden ..... serotina
   " " ikke eller næppe forbundne imperfoliata

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson Spydbitterling. Bægertænderne sylformede, 1-ribbede. Støvknappen 1/3-1/2 x tråden. A B C K

B. serotina Koch Høstbitterling. Bægertænderne linje-lancetformede, ofte 3-ribbede inderst. Støvknappen ½-1 x støvtråden. ABCK

B. imperfoliata (L.f.) Samp. Lancetbitterling. 10-30cm. Bægertænderne lancetformede, 3-ribbede. Støvknappen som hos serotina. VI-VII. K

Centaurium. Tusindgylden.

1. Kronen gul ..... maritimum
   " lyserød 2.
2. Blomsterne i en aksformet kvast ..... spicatum
   " i en halvskærmformet kvast 3.
3. Toårig. Bladrosetten veludviklet under blomstringen erythraea
   Enårig. " væk under blomstringen 4.
4. Stænglen oftest med 2-4 stængelled ..... pulchellum
   " " " 5-9 " tenuiflorum

Centaurium erythraea Rafn Marktusindgylden. V-IX. A B C K. 3ssp:
ssp. erythraea: Grenet i øvre halvdel. Blomsterne m.m. siddende i tæt halvskærm. Kronfligene 5-6mm.
ssp. rumelicum (Velen.) Meld.: Som foregånede, men kronfligene 2½-5mm.
ssp. rhodense (Boiss.& Reuter) Meld.: Grenet fra grunden eller midten. Kortstilkede blomster i åben halvskærm.

C. pulchellum (Sw.) Druce Liden tusindgylden. Stænglen oftest gaffelgrenet i nedre halvdel. Blomsterne langstilkede, ofte i åben gaffelkvast. V-X. A B C K

C. tenuiflorum (Hoffm.& Lk.) Fritsch Kosttusindgylden. Stænglen grenet i øvre halvdel. Blomsterne kortstilkede, oftest i en tæt gaffelkvast. IV-IX. A B C K

C. spicatum (L.) Fritsch Akstusindgylden. 10-55cm. 1-2-årig, mest med bladroset. Blomsterne 12-14mm. VI-X. A B C K

C. maritimum (L.) Fritsch Gul tusindgylden. 10-20cm. 1-2-årig. Kronen 20-25mm. IV-V. A B C K

Gentiana. Ensian. Kronen uden frynser.

1. Kronen gul, delt næsten til grunden ..... lutea
   " blå, kortfliget 2.
2. Blomsterne 4-tallige, i nøgler i bladhjørnerne .... cruciata
   " 5-tallige 3.
3. Flerårig. Kronen 4-5cm ..... dinarica
   Enårig. Kronen 1½-2cm utriculosa

Gentiana lutea L. Gul ensian. 50-120cm. Bladene mest ægformede til elliptiske, op til 25cm, buestrengede med 5-7 årer. Blomsterne i kranse, 2-3cm. 1000-2200m. VI-VII. B C K

G. cruciata L. Korsensian. 15-40cm. Stængelbladene mest 3-årede og 5-10x1-2½cm. Kronen 2-2½cm, rent blå indvendigt, skidenblå til grønlig udvendigt. VI-VIII. K (Matese)

G. dinarica G.Beck Mørkplettet ensian. 5-8cm. Rosetbladene 2-3 x 1-2cm, bredt hindekantede. Stængelbladene mindre. Kronen blålilla med mørkere pletter. 1600-2300m. VI-VII. K (Matese)

Gentiana utriculosa L. Opblæst ensian. 8-15(25)cm. Ofte grenet og flerblomstret. Bægeret med 2-3mm brede vinger. Kronen 12-20mm bred. V-VIII. K (M.Meta)

Gentianella. Ensian. Kronen med frynser. Enårige eller toårige.

G. ciliata (L.) Borkh. Frynset ensian. 6-25cm. Kronen 4-tallig, 35-50mm, kraftigt blå med udstående flige, der er randfrynsede i den indre halvdel. VIII-IX. K

G. crispata (Vis.) Holub Kruset ensian. 2-20cm. Kronen 5-tallig, 12-20mm, lilla eller hvidlig, frynset i svælget, ikke på fligene. Bægertænderne med stærkt kruset, sortagtig rand. 1000-2000m. VI-VII. C (Serra Dolcedorme på Pollino)

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata L. Bukkeblad. V-VI. K (Matese, Avellino)

APOCYNACEAE

Nerium oleander L. Nerie. 1-5m. Busk. Bladene ofte i kranse på 3, linje-lancetformede, op til 12cm, læderagtige, noget grågrønne med tætte, kamlignende ribber og bruskagtig kant. 3-4cm brede, lyserøde (sj. hvide) blomster. V-VII. A B C K

Vinca minor L. Liden singrøn. Blomsterne 2½-3cm brede. A B C K

V. difformis Pourret Bleg singrøn. 20-50cm. Blomsterne 3-4½cm brede, blegblå eller næsten hvide. Bladene 2½-7cm, glatrandede. Bægertænderne 8-13mm. II-IV. B K

V. major L. Stor singrøn. Blomsterne 3-5cm brede, blålilla. Bladene 2½-9cm, fint randhårede (lup). Bægertænderne 14-18mm. III-V. A B C K

ASCLEPIADACEAE

Periploca graeca L. Træranke. 2-10m. Forveddet slyngplante. Bladene bredt elliptiske, 4-12x2-7cm, hindeagtige, stilkede. Mangeblomstrede, akselstillede kvaste. Blomsterne ca. 2cm brede, mørkt brunlilla med grønlig yderside. V-VI. A K

Gomphocarpus fruticosus (L.) Ait.f. Børstekapsel. Busk på 1-2m. Bladene modsatte, smalt lancetformede, 2-10cm x 3-10mm, spidse. Hvide blomster i skærme fra de øvre bladhjørner, 1½-2cm brede. Kapslen tenformet, 5x1cm, med masser af stive børster. V-VI. C K

Cynanchum acutum L. Spids svalerod. Slyngplante op til 3m. Bladene spidst ægformede med dybt hjærteformet grund, 3-12cm. Tætte skærme i bladhjørnerne på 1-6cm lange stilke. Kronen hvid eller blegrød, 8-12mm bred. Saltsumpe og flodlejer. VII-VIII. A B C

Vincetoxicum hirundinaria Med. ssp. hirundinaria Svalerod. ABCK

CONVOLVULACEAE

Cuscuta. Silke.

1. De 2 støvfang hovedformede. 4-tallig blomst ..... tinei
   " 2 " kølle- til trådformede 2.
2. Hovederne 10-15mm brede. Blomsten mest 4-tallig ... europaea
   " 5-10mm " . " " 5-tallig 3.
3. Bægertænderne aflange, længere end bægerrøret ... planiflora
   " trekantet-ægformede, spidse, ca. = røret epithymum

Cuscuta tinei Inzenga Firtallig pileurtssilke. Stænglerne gulgrønne til orange. Griflerne kortere end den kugleformede frugtknude. På Pileurt og andre urter. V-IX. A K

C. europaea L. Nældesilke. VI-IX. A B C K

C. epithymum (L.) L. Lyngsilke. Kronrøret lidt længere end bægeret. Kronen mest lyserød. Griflerne 2 xfrugtknuden. VI-IX. ABCK

Cuscuta planiflora Ten. Hvidblomstret silke. Bægeret lig kronrøret, med fortykkede og halvt cylindriske tænder. Kronen hvid, dens flige = kronrøret. V-VII. B K

Cressa cretica L. Strandpude. 10-30cm. Pudeagtig, grådunet 1-flerårig. Bladene 2-10mm, ægformede med hjærteformet grund. Blegt lyserøde blomster på 3-5mm i korte aks for enden af grenene. På sandstrand. V-VII. C (Pellaro)

Calystegia soldanella (L.) R.Br. Strandsnerle. 10-50cm. Stænglerne liggende, lidet klatrende. Bladene nyreformede og noget kødede. På sandstrand. IV-VIII. A B C K

C. sepium (L.) R.Br. Gærdesnerle. Forbladene sj. over 15mm brede, overlapper ikke og dækker ikke bægeret helt. V-IX. A B C K

C. silvatica (Kit.) Griseb. Skovsnerle. Som sepium, men blomsterne større, 5-9cm. Forbladene dækker bægeret helt og er 15-40 mm brede i flad tilstand. IV-X. A B C K

Convolvulus. Snerle.

1. Bladene oftest siddende, med tilsmalnet grund ..... 2.
   " stilkede, med hjærte- eller spydformet grund 5.
2. Enårig. Kronen blå med gul grund ..... pentapetaloides
   Flerårig. Kronen lyserød eller hvid 3.
3. Nedre blade med udvidet, hindeagtig grund ..... lineatus
   " " uden hindeagtig grund 4.
4. Stænglerne urteagtige ..... cantabrica
   " forveddede cneorum
5. Kronen blå. Flerårig. Bladene elliptisk-spatelform. sabatius
   " hvid eller lyserød 6.
6. Bladene spydformede og helrandede ..... arvensis
   " fligede. Kronen lyst rødlilla, katostfarvet 7.
7. Planten med udstående, ofte brunlige hår ..... althaeoides
   " " tiltrykte, sølvhvide hår elegantissimus

Convolvulus cneorum L. Sølvsnerle. 10-30cm. Hvidfiltede, lancetspatelformede blade på 16-24x4-6mm. Blomsterne i ofte tætte, endestillede hoveder, hvide med 5 rødlige striber. IV-V. K (Pen. Sorrentina ved Massa, Pta.Campanella, Vallone d.Ferriere. Capri)

C. lineatus L. Smalbladet snerle. 3-15cm. Tæt silkehåret med forveddet grund. Bladene smalle. Kortstilkede, blegrøde blomster på 12-25mm, 1-flere sammen. III-VI. A K

C. cantabrica L. Rank snerle. 20-50cm. Oprette, udstående hårede stængler, dog tiltrykt hårede foroven. Bladene smalle, udstående hårede. Kronen lyserød, 15-25mm. V-X. A B C K

C. pentapetaloides L. Klokkesnerle. 10-30cm. Kronen 7-10mm, 2 x bægeret, ret indskåren. III-VI. A B C

C. sabatius Viv. Rundbladet snerle. 10-50cm. M.m. dunet. Bladene 1-1½ x så lange som brede og 3-8 x stilken. Kronen 13-15mm, blålilla med gul grund. IV-VI. A (forvildet)

C. arvensis L. Agersnerle. IV-X. A B C K

C. althaeoides L. Katostsnerle. 30-60cm. De nedre blade uregelmæssigt trekantede, de øvre næsten helt delte i 5-8 flige, hvoraf den midterste er grofttandet. Kronen 2-3cm bred. IV-VI. A B C K

C. elegantissimus Miller Syvfliget snerle. 30-60cm. Som den foregående, men bladene helt delte i 7 smalle, helrandede flige. IV-VI. A B C K

Ipomoea. Tragtsnerle. Slyngende flerårige. Støvfanget med 1-3 kugleformede lapper.

I. stolonifera (Cyr.) Gmelin Syrebladet tragtsnerle. 20-70cm. Bladene med hjærteformet grund og afrundet eller udrandet spids,

aflange, noget kødede. Kronen 3½-5cm, hvid eller bleggul. VI-X. Sand og klitter. K (Ischia)

Ipomoea sagittata Poiret Pilbladet tragtsnerle. 40-300cm. Bladene pilformede, 5-8x2-3cm, spidse. Kronen 4-7cm, lyserød til lyslilla. Strandsumpe. VI-IX. A (Pantano di Taro, Gallipoli)

BORAGINACEAE

1. Ingen svælgskæl ..... 2.
   Svælgskæl til stede 9.
2. Ingen støtteblade. Små, hvide blomster ..... Heliotropium
   Med støtteblade 3.
3. Kronen m.m. uregelmæssig. Griflen udragende ..... Echium
   " regelmæssig 4.
4. Busk ..... Lithodora
   Urter 5.
5. Bladene glatte, ofte hvidknudrede ..... Cerinthe
   " hårede 6.
6. Kronen m.m. valseformet, lysegul ..... Onosma
   " tragt- til hjulformet 7.
7. Bægeret femkantet, ca. 1/3 delt ..... Pulmonaria
   " trindt, dybt delt 8.
8. De nedre hår nogle mm. lange. Flerårig ..... Alkanna
   Hårene under 1mm Lithospermum
9. Kronen hjulformet med meget kort kronrør ..... Borago
   Kronrøret veludviklet 10.
10. Griflen rager frem fra kronen ..... 11.
    " indesluttet 12.
11. Støvdragerne fremragende ..... Solenanthus
    " indesluttede Symphytum
12. Nødderne tornede og fritsiddende ..... 13.
    " ikke tornede, ofte gemte i bægeret 14.
13. Kronen 3-4mm, forglemmigejblå. Med støtteblade .... Lappula
    " 4-9mm, af anden farve Cynoglossum
14. Frugtbægeret forstørret, fladtrykt og tandet ..... Asperugo
    " ikke fladtrykt 15.
15. Få til ingen støtteblade. Kronen lyseblå (lysegul) Myosotis
    Med støtteblade 16.
16. Kronen bleggul til hvid. Bægeret ca. 1/3 delt ..... Nonea
    " mest blålig. Bægeret halvt til helt delt Anchusa

Heliotropium. Skorpionsurt. Grågrønne enårige med tiltrykt dunede, m.m. ægformede blade på 2-3x1-2cm med en stilk på 1-2cm. Bispestavsformede svikler.

1. Bladene hvidfiltede, i det mindste på undersiden ... supinum
   " grågrønne på begge sider 2.
2. Kronen 4½-8mm bred ..... suaveolens
   " 2-4mm " 3.
3. Støvfanget linje-sylformet, oftest glat ..... europaeum
   " kegleformet, håret dolosum

Heliotropium europaeum L. Alm. skorpionsurt. 5-40cm. Oftest opret. Bægeret delt til grunden. VI-XI. A B C K

H. dolosum De Not Kystskorpionsurt. 5-40cm. VIII-X. K C

H. suaveolens Bieb. ssp. boddonei (Guss.) Brummitt Sortfrugtet skorpionsurt. 5-40cm. Blomsterne vellugtende. VI-X. C K (Ischia)

H. supinum L. Lav skorpionsurt. 10-30cm. Med opret midtergren og udstrakte sidegrene ved grunden. Bægeret højst 1/4 delt, opsvulmet og pæreformet i frugt. VII-IX. A C K

Lithospermum. Stenfrø.

1. Kronen gul. Enårig ..... apulum
   " hvid eller blå 2.

2. Flerårig ..... 3.
   Enårig 5.
3. Kronen gullighvid, 4-6mm ..... officinale
   " mørkeblå (12)14-20mm 4.
4. Bladene bredest under midten ..... purpurocaeruleum
   " " på midten calabrum
5. Bægeret meget tæt stivhåret med butte tænder ..... minimum
   " med spredte hår og spidse tænder 6.
6. Frugtstilkene kølleformet fortykkede mod spidsen gasparrinii
   " valseformede arvense

Lithospermum officinale L. Lægestenfrø. V-VII. A B C K

L. apulum L. Gult stenfrø. 5-25cm. Stivhåret. Halvskærmagtigt forgrenet foroven. Bladene m.m. linjeformede. Sviklerne tætte og ensidige. Kronen 6-6½mm. III-V. A B C K

L. purpurocaeruleum L. Blåt stenfrø. 15-60cm. Bueformede stængler i større bevoksninger. Lancetformede, spidse blade på 3½-8cm. Kronen først rødlilla, senere mørkeblå. IV-VI. A B C K

L. calabrum Ten. Udstrakt stenfrø. 5-15cm. Stænglerne 30-80cm, krybende, udgår fra forrige års skud. Bladene 2-3½cm. Korte, fåblomstrede svikler. IV-V. C (Pollino, M.Montea, Silas østside)

L. arvense L. Rynket stenfrø. I-VI. A B C K

L. gasparrinii Heldr. Køllestenfrø. 3-20cm. Ligner foregående, men grenet fra grunden med liggende sidegrene og ofte opret midtergren. Kronen blå til blålilla. IV-VII. A B C K

L. minimum Moris Lidet stenfrø. 2-10(27)cm. Bægeret 1½-3mm, i frugt indtil 6mm, så langt som det halve kronrør. Kronen oftest blå. IV-V. B (Pollino) C (Pollino, Mormanno)

Lithodora rosmarinifolia (Ten.) Johnston Rosmarinstenfrø. 10-20 cm. Dværgbusk. Bladene tætstillede, stive, mørkegrønne, 1-6cm x 1-10mm, med omrullet rand. Ensianblå, 10-11mm brede blomster. XII-IV. K (Pen. Sorrentina fra Salerno og Vietri til P.ta Campanella)

Onosma lucana Lacaita 40-75cm. Bladene med stjærnebørster med mest 5-10 sidegrene på 0,1-0,3mm. Bægeret 10-16mm i blomst, 15-20 mm i frugt. Med flere golde rosetter. VI-VII. B C

O. echioides L. Storbægret æselurt. 10-30(60)cm. Bladene med stjærnebørster med 10-20(8-25) sidegrene på 0,3-0,6mm. Bægeret 7-14mm i blomst, 8-15mm i frugt. VI-VII. A B C K

Cerinthe minor L. Fligkronet voksurt. 15-45cm. 1-2-årig. Kronen 9-11mm, ½ delt i 5 oprette, spidse flige, gul, undertiden med 5 brune pletter i svælget. V-VII. B C K

C. auriculata Ten. Purpurvoksurt. 20-40cm. Flerårig. Som foregående, men kronen kun gul ved grunden, ellers brunlilla. V-VII. 800-1900m. B C K

C. major L. Storblomstret voksurt. 15-60cm. Enårig. Kronen 15-20mm, med korte, tilbagebøjede lapper, gul med en lilla ring under midten, nærmest rørformet. XII-VI. A B C K

Alkanna tinctoria (L.) Tausch Farvestilkfrø. 8-20cm. Kraftigt stivhåret. Sviklerne tætte med støtteblade på 10-12mm. Bægeret næsten helt delt. Kronen 6-7mm bred, oftest mørkeblå, ellers himmelblå. Stilkede nødder. III-V. A B C

Echium. Slangehoved.

1. Alle støvdragere indesluttede i kronen ..... 2.
   Mindst 1-2 udragende støvdragere 3.

2. Bægeret 6-8mm i blomst, i frugt indtil 15mm med tænder, der er 3-6mm brede ved grunden ..... parviflorum
   Bægeret 5-7mm i blomst, indtil 10mm i frugt med tænder, der er 2-3mm brede ved grunden arenarium
3. Kronen bleg: kødfarvet eller lyst gråbrun ..... 4.
   " blå eller rødlilla 5.
4. Kronen 13-15mm, kødfarvet. Støvtrådene røde ..... asperrimum
   " 10-12mm, lyst gråbrun. Støvtrådene blege italicum
5. Kronen m.m. glat, kun håret på kanter og årer plantagineum
   " m.m. jævnt håret 6.
6. Oftest 1-2 fremragende støvdragere ..... sabulicolum
   " 3-5 " " vulgare

Echium asperrimum Lam. Stikkende slangehoved. 50-100cm. Stærkt grenet fra grunden og med tætte, hvidgrå, stikkende børster. Grundbladene omvendt lancetformede. III-VI. A C

E. italicum L. Blegt slangehoved. 35-100cm. Grundbladene 20-30cm og lancetformede. Stænglen enkel, opret. Toppen ofte stærkt grenet og smalt pyramideformet. 4-5 udragende støvdragere. A B C K

E. vulgare L. Alm. slangehoved. IV-IX. A B C K

E. plantagineum L. Purpurslangehoved. 20-60cm. Opret, blødhåret. Kronen 18-30mm, først blå, siden rødlilla, så lyserød. Oftest 2 udragende støvdragere. III-VII. A B C K

E. sabulicolum Pomel Strandslangehoved. 30-50cm. Oftest opstigende, stivhåret. Kronen 12-22mm, lyserød til mørkeblå eller mørklilla. III-V. C

E. arenarium Guss. Sandslangehoved. 15-25cm. Opstigende. Bladene med hvidlige, korte, tiltrykte børster. Kronen 6-10mm, mørkeblå, m.m. rørformet. III-V. A C K

E. parviflorum Moench Bladbægret slangehoved. 10-40cm. Opstigende til opret. Bladene med tiltrykte børster. Kronen 10-14mm, blegblå med mørkere rand, m.m. rørformet. III-V. A K

Pulmonaria vallarsae Kerner Bølget lungeurt. 20-30cm. Bladene ensartet kort- og blødhårede med få længere børster, randen ofte bølget. Kvasten klæbrigt kirtlet. IV-V. B (Pignola) K

P. saccharata Miller Storbladet lungeurt. Bladene med uens behåring og længere børster. Kvasten ikke klæbrig. III-V. A B C K

Nonea ventricosa (Sm.) Griseb. Hvid kosakurt. 10-40cm. Ukirtlet, stivhåret. Bægeret 5mm i blomst, 8-12mm i frugt, og ofte meget stærkt opblæst med indadbøjede tænder. III-V. A

Symphytum officinale L. Lægekulsukker. V-VII. B K

S. tuberosum L. ssp. nodosum (Schur) Soó Knoldkulsukker. 15-25 cm. Blomsterne lysegule, 13-19mm; svælgskællene ikke udragende. Stængelhårene mest 0,1-0,2mm. III-IV. A B C K

S. bulbosum Schimper Sylkulsukker. 20-40cm. Kronen lysegul, 7-12 mm; svælgskællene sylformede og udragende. Stængelhårene indtil 1½ eller 2mm. III-IV. A B C K

Anchusa. Oksetunge.

1. Kronen lidt uregelmæssig med bøjet kronrør ..... 2.
   " regelmæssig med ret kronrør 3.
2. Kronen rødlilla, senere blå med hvide årer ..... cretica
   " lyseblå arvensis
3. Kronrøret kortere end kronfligene ..... barrelieri
   " mindst lig " 4.
4. Bægeret delt næsten til grunden ..... azurea
   " halvt delt hybrida

Anchusa hybrida Ten. Korttandet oksetunge. 20-50cm. Flerårig. Bladene linje-lancetformede, spidse, ofte bølgede. Kronen blå med et rør på 5-8mm og en 3-5mm bred krave. V-IX. A B C K

A. azurea Miller (A. italica) Blå oksetunge. 30-80cm. Flerårig. Kronen 9-13mm bred, mørkeblå. Sviklerne forlænges i frugt, så bægrene sidder 1-2cm fra hinanden. IV-VII. A B C K

A. barrelieri (All.) Vitman Topoksetunge. 50-80cm. Mange kvaste i en topformet stand. Bægeret 2-3mm, i frugt op til 6mm. Kronen blå eller blålilla, 7-10mm bred; røret 1-1½mm. V-VII. B K

A. arvensis (L.) Bieb. Krumhals. V-VIII. B K

A. cretica Miller Hvidåret krumhals. 5-50cm. Enårig. Nedre blomster med støtteblade af bægerets længde eller længere; øvre blomster uden støtteblade. II-VI. A B C K

Borago officinalis L. Hjulkrone. 20-60cm. Enårig. Kronen med et ganske kort hvidligt rør og op til 15mm lange, vandret udstående, spidse, mørkeblå kronflige. Støvdragerne med 6mm lange støvknapper, der er samlede i en slags rør. IV-VIII. A B C K

Asperugo procumbens L. River. II-VII. A B C

Myosotis. Forglemmigej.

1. Flerårig ..... 2.
   1-2-årig 4.
2. Nødderne spidse. Frugtbægeret med afrundet grund silvatica
   " butte. " " tilsmalnet grund 3.
3. Bægeret tæt hvidhåret, fortykket ved grunden i frugt ambigens
   " sj. " , ikke fortykket i frugt alpestris
4. Bægeret med rette, tiltrykte hår ..... 5.
   " " hagekrummede, udstående hår 7.
5. Frugtstilkene kølleformet fortykkede ..... incrassata
   " ikke fortykkede 6.
6. Kronens krave flad. Blomsterne alsidigt stillede .. nemorosa
   " " skålformet. Blomsterne toradede sicula
7. Kronen først lysegul, siden lyserød og lyseblå .... discolor
   " lyseblå hele tiden 8.
8. Nedre frugtstilke 2 x bægeret eller mere ..... arvensis
   " " ca. = bægeret ramosissima

Myosotis incrassata Guss. Kølleforglemmigej. 5-20cm. Frugtbægrene toradede. Kronens krave skålformet, 3mm bred. III-V. A B C

M. arvensis (L.) Hill Markforglemmigej. IV-VII. A B C K

M. ramosissima Rochel Bakkeforglemmigej. IV-VI. A B C K

M. discolor Pers. Forskelligfarvet forglemmigej. IV-VI. B C K

M. silvatica Hoffm. Skovforglemmigej. 3 underarter:
ssp. subarvensis Grau: Kronen højst 4mm bred. Stærktgrenet med små, smalle blade. V-VII. A (Gargano)
ssp. cyanea (Boiss.& Heldr.) Vestergr.: Kronen 5-7mm bred. Frugtstilkene højst 7mm. VI-VII. A (Gargano)
ssp. elongata (Strobl) Grau: Kronen 7mm bred. Frugtstilkene 8-15 mm. IV-VI. B C K

M. alpestris F.W.Schmidt Alpeforglemmigej. 5-35cm. Rosetbladene ofte tydeligt stilkede. Frugten 2-2½mm. Kronrøret mest kortere end bægeret. 1800-2750m. VII-VIII. K

M. ambigens (Beguinot) Grau Tykbægret forglemmigej. 4-12cm. Bægeret med overvejende rette hår. Blomsterne hvidlige til lyseblå. 1200-2400m. V-VII. B C K

M. nemorosa Besser Lundforglemmigej. 10-40cm. Ligner Engforglemmigej, men de nedre bladundersider med tilbagerettede hår på 0,6-1 mm. VI-VIII. A B C K

Myosotis sicula Guss. Toradet forglemmigej. 20-50cm. 1-2-årig. Grundbladene 3½-6cm, ofte visne under blomstringen. Kronen 3mm bred. Fugtige enge. IV-VII. K

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort Småhaget pigfrø. 5-40cm. 1-2-årig, der ligner en stor Forglemmigej. Blomsterne ca. 4mm, 2-4mm brede. VI-IX. K (Salerno)

Cynoglossum. Hundetunge.

1. Klaserne med støtteblade ..... 2.
   " uden " 3.
2. Toårig. Bægertænderne butte ..... cheirifolium
   Flerårig. Bægertænderne spidse magellense
3. Kronen mat rødlilla ..... montanum
   " blå eller blålig 4.
4. Kronen bleg med blå årer ..... creticum
   " mørkeblå columnae

Cynoglossum columnae Ten. Enårig hundetunge. 15-40cm. Grågrøn enårig. En spinkel udgave af vor hjemlige Hundetunge med mørkeblå blomster. IV-VI. B K

C. creticum Miller Året hundetunge. 20-60cm. Grågrøn toårig. Kronen 7-9mm. Frugtstilkene ofte nedbøjede. IV-VI. A B C K

C. montanum L. Skovhundetunge. (C. nebrodense p.p.) 10-50cm. Kronen 4-6mm, kraven ca. = røret. Trapezformede svælgskæl. V-VI. B C K

C. cheirifolium L. Filtet hundetunge. 10-40cm. Grågulligt filtet. Kronen først lyst rødlilla, senere blålilla eller mørkeblå. Frugtstilkene ofte udadkrummede. IV-VI. A B C K

C. magellense Ten. Smaltandet hundetunge. 20-35cm. Hvidfiltet med lillat skær. Bladet højt oppe. Grundbladene med stilk på 4-6 cm og plade på 6-9cm. Kronen rødlilla. VI-VII. C K

Solenanthus apenninus (L.) Fischer & C.A.Meyer Engsækkrone. 50-70 cm. Stænglen opret og kantet. Bægeret 8-10mm. Kronen 7-9mm, rødbrun. Nødderne 6-8mm, tæt og fint hagepiggede langs randen. V-VII. 800-2000m. B C K

VERBENACEAE

Vitex agnus-castus L. Kyskhedstræ. Busk på 1-6m. Unge grenet but 4-kantede. Bladene modsatte, 5-7-fingrede med hvidfiltet underside og smalt lancetformede, helrandede småblade. Blomsterne lyslilla i lange, Buddleya-lignende aks. V-VIII. A B C K

Verbena officinalis L. Jærnurt. 15-60cm. Opret flerårig med modsatte, rude-spatelformede, lappede til fligede blade. Lyslilla læbeblomster i lange, smalle og for neden spredtblomstrede aks. Kronen 4mm, svagt tolæbet. I-XII. A B C K

V. supina L. Lav jærnurt. 10-30cm. Enårig, ofte liggende, tæthåret med kortere aks på op til 8cm og 1-2 x fjerfligede blade. V-IX. A B C K

Lippia nodiflora (L.) Michx. Krybende kølbæger. 10-30cm. Krybende flerårig med modsatte, rude-spatelformede, m.m. tandede blade. Hvide blomster i tætte, hovedformede aks på 2-4cm lange stilke fra bladhjørnerne. Blomsterne 2mm, lidt uregelmæssige. Bægeret delt i 2 kølede blade. Fugtige enge. VI-VIII. A K

CALLITRICHACEAE

Callitriche. Vandstjærne.

1. Ingen flydeblade. Gennemskinnelige undervandsblade truncata
   Bladene matte 2.
2. Frugten længere end bred, smalvinget foroven ..... palustris
   " ikke længere end bred, vinget hele vejen rundt 3.

3. Griflerne tiltrykte frugten, denne 1-1,4x1-1,2mm ..... brutia
" ikke tiltrykte frugten, denne 1,5-1,8mm stagnalis

Callitriche truncata Guss. Kortbladet vandstjærne. 5-15cm. Bladene tilsmalner mod den afskårne eller tvetandede spids. Frugten stilket og smalvinget, 1-1,2x1,3-1,4mm. III-V. K

C. stagnalis Scop. Storfrugtet vandstjærne. IV-IX. A B C K

C. palustris L. Vårvandstjærne. V-X. A B C K

C. brutia Petagna Stilkfrugtet vandstjærne. VIII-X. A B C K

LABIATAE

1. Kronens overlæbe mangler eller stærkt forkortet ..... 2.
" " veludviklet 3.
2. Underlæben 3-delt ..... Ajuga
" 5-delt Teucrium
3. Støvdragerne helt indesluttede i kronrøret ..... 4.
" rager ud af kronrøret 6.
4. Blåblomstret halvbusk ..... Lavandula
Blomsterne ikke blå 5.
5. Støttebladene lig bladene. Flerårige ..... Marrubium
" ulig bladene eller også enårige Sideritis
6. 2 fungerende støvdragere ..... 7.
4 " " 9.
7. Kronen næsten regelmæssig, 2½-4mm lang ..... Lycopus
" tydeligt tolæbet, 8-40mm lang 8.
8. Kronens overlæbe konkav. Bladene linjeformede .... Rosmarinus
" " hvælvet. " brede Salvia
9. Kronen ret regelmæssig, 4-lappet ..... Mentha
" tolæbet 10.
10. Griffelgrenene tydeligt uens ..... 11.
" m.m. ens 14.
11. Bægertænderne ens. Kronen 15-35mm ..... Phlomis
Bægeret tolæbet 12.
12. Bægeret med buget grund og indsnævret rør ..... Acinos
" ikke buget eller indsnævret 13.
13. Bægerrøret krumt. Tætte, mangeblomstrede kranse Clinopodium
" ret. Blomsterne i stilkede kvaste Calamintha
14. Bægeret uregelmæssigt ..... 15.
" m.m. regelmæssigt 24.
15. Kronens overlæbe tydeligt hvælvet ..... 16.
" " m.m. flad 19.
16. Bægeret med en pukkel på ryggen ..... Scutellaria
" uden en sådan pukkel 17.
17. Bladene savtakkede, friskgrønne, 1½-4cm ..... Prasium
" ikke savtakkede 18.
18. Støttebladene helt ulig bladene ..... Prunella
" m.m. lig " Micromeria
19. Støvdragerne tiltrykte kronens underlæbe ..... Ocimum
" ikke tiltrykte underlæben 20.
20. Støvdragerne udspærrede og udragende ..... 21.
" parallelle eller sammenbøjede 22.
21. Blomsterne i tætte småaks i en grenet stand ..... Origanum
" i kranse eller hoveder Thymus
22. Kronen 25-40mm ..... Melittis
" 4-15mm 23.
23. Kronrøret krumt ..... Melissa
" ret Micromeria
24. Underlæbens sideflige mangler eller reducerede til
2 små tænder ..... Lamium
Underlæbens sideflige veludviklede 25.
25. Underlæben med 2 hule tænder ved grunden ..... Galeopsis
" uden sådanne tænder 26.

26. Kronen kraftigt gul. Overlæben 10-12mm ..... Lamiastrum
" højst lysegul. " højst 8mm 27.
27. Krybende og rodslående med blå blomster ..... Glechoma
Anderledes 28.
28. Blomsterne i tætte småaks i en grenet stand ..... Origanum
" enlige eller i kranse 29.
29. Bægeret m.m. brat udvidet i øvre 1/4 eller før .... Ballota
" jævnt udvidet opadtil 30.
30. Bladene rund- til savtakkede. Urteagtige stængler ..... 31.
" helrandede; eller også dværgbuske 32.
31. 15 bægerribber. Indre støvdragere længst ..... Nepeta
5-10 bægerribber. Ydre " " Stachys
32. Blå blomster i ensidige aks ..... Hyssopus
Kransene ikke ensidige 33.
33. 10 bægerribber. Støvdragerne ofte udragende ..... Satureja
13 " . " ikke " Micromeria

Ajuga. Læbeløs.

1. Bladene 3-delte med 3 linjeformede flige ..... chamaepitys
" hele 2.
2. Bladene linjeformede, over 5 x så lange som brede ..... iva
" æg- til spatelformede. Kronen blå 3.
3. Stængelløs. Alle blade i roset ..... tenorii
Med bladet stængel 4.
4. Støvdragerne helt indesluttede i kronrøret ..... orientalis
" rager ud af kronrøret 5.
5. Stænglen tvesidet håret foroven. Med udløbere ..... reptans
" trind håret foroven. Ingen " genevensis

Ajuga orientalis L. Korthannet læbeløs. 10-60cm. M.m. lådden. Nedre blade rundtakkede, indtil 9x4cm. Støttebladene ofte blåligt anløbne. Kronen 12-16mm. III-V. C

A. genevensis L. Bakkelæbeløs. 10-40cm. Støttebladene ofte blå eller lillaanløbne. Kronen 12-20mm, klart blå. Grundbladene ofte væk under blomstringen. IV-VII. A C K

A. reptans L. Krybende læbeløs. IV-VI. A B C K

A. tenorii Presl Rosetlæbeløs. 2-10cm. Stænglen 0-4cm. Bladene omvendt lancet-spatelformede. Kronen 16-25mm, klart blå. Stenede skove. 1200-2200m. V-VI. A B C K

A. iva (L.) Schreber Moskuslæbeløs. 5-20cm. Tueformet flerårig med moskuslugt. Bladene helrandede eller med 2-6 korte lapper. Kronen rødlilla, lyserød eller gul, 12-20mm. III-VI. A B C K

A. chamaepitys (L.) Schreber Gul læbeløs. 10-20cm. Stærktlugtende enårig. Bladene noget klæbrige. Kronen citrongul, 7-15mm. ABCK

Teucrium. Kortlæbe.

1. Blomsterne i endestillede, halvkugleformede hoveder ..... 2.
" i kranse 3.
2. Bladene helrandede ..... montanum
" rundtakkede polium
3. Bladene helrandede. Kronen blå, 15-25mm. Busk .... fruticans
" ikke helrandede 4.
4. Bladene dybt tredelte med butfligede afsnit ... campanulatum
" ikke fligede 5.
5. Bægeret tolæbet ..... 6.
" m.m. regelmæssigt 7.
6. Enårig med tornede grene ..... spinosum
Flerårig uden torne siculum
7. Kronen gulgrøn ..... flavum
" rød 8.
8. Stænglen forveddet forneden. Kronen 12-15mm ..... chamaedrys
" helt urteagtig. Kronen 7-9mm scordium

Teucrium fruticans L. Buskkortlæbe. 50-120cm. Busk med firkantede, hvidfiltede grene. Bladene hvidfiltede nedenunder, ofte glatte og skinnende ovenpå, 3-4cm. 2-blomstrede kranse. IV-V. A K

T. campanulatum L. Klokkekortlæbe. 10-30cm. Liggende til opstigende og rodslående, m.m. glat. Bægeret klokkeformet, 3-4mm. Kronen 5mm, hvidlig. Fugtige enge. V-VII. A

T. siculum Rafin. (T. scorodonia ssp. euganeum) Kirtelkortlæbe. 20-80cm. Bladene trekantet-ægformede, med hjærteformet grund, rynkede og rundtakkede. Bægeret og stænglen foroven med lange, ofte kirtlede hår. Kronen 9mm, tit rødlilla. V-VII. A B C K

T. scordium L. ssp. scordioides (Schreber) M.ire & Pet. Løgurt. 20-60cm. Med løglugt. Bladene lancetformede med 5-7 par tænder. Kronen lyserød, 7-10mm. Sumpe, fugtige enge. VI-VIII. A B C K

T. spinosum L. Tornet kortlæbe. 30-50cm. Stærktgrenet med tornlignende grene, der er næsten bladløse i blomst. 1-4 6-8mm store, hvide blomster sammen, der er vendte på hovedet. VI-VIII. A

T. chamaedrys L. Ædelkortlæbe. 20-35cm. Bladene op til 2x1 cm med 5-8 par tænder. Kronen 12-15mm, mest rødlilla. V-VII. A B C K

T. flavum L. Gul kortlæbe. 30-60cm. Halvbusk med forveddede, firkantede grene. Bladene trekantede og rundtakkede, skinnende ovenpå. V-VII. A B C K. 2 underarter:
ssp. flavum: Bladene ca. 2cm med lådden underside.
ssp. glaucum (Jordan & Fourr.) Ronn.: Bladene ca. 1cm med blågrøn og glat underside. B C

T. montanum L. Bjærgkortlæbe. 8-15cm. Halvbusk med hvidfiltede, liggende til opstigende grene. Bladene læderagtige, linjeformede med indrullet rand. Kronen bleggul, 12-14mm. V-VIII. A B C K

T. polium L. ssp. capitatum (L.) Arc. Hovedkortlæbe. 8-20cm. Tætfiltet halvbusk med opstigende grene. Lancetformede, ofte noget omrullede blade. Kronen hvid eller noget rødlig. A B C K

Scutellaria. Skjolddrager.

1. Støttebladene bladagtige ..... 2.
   " m.m. ulig bladene 3.
2. Bladene jævnt tandede, uden spydformet grund .. galericulata
   " mest helrandede, med " " hastifolia
3. Klasen firkantet, kort og tæt. Bladene 1½-3cm ..... alpina
   " ensidig. Bladene 4-10cm columnae

Scutellaria alpina L. Alpeskjolddrager. 15-45cm. Opstigende. Bladene mest ægformede, de nedre stilkede, de øvre m.m. siddende. Kronen 20-25mm, rødligt lilla. 1500-2500m. VI-VIII. B C (Pollino)

S. columnae All. Ensidig skjolddrager. 40-85cm. Opret. Bladene ægformede. Kronen 20-24mm, rødlilla med hvidlig underlæbe. Kronrøret dunet. 0-1000m. V-VII. A B C K. 2 underarter:
ssp. columnae: Bladene halvglatte til svagt dunede, 5-7cm.
ssp. gussonii (Ten.) Rech.f.: Bladene tætdunede, 6-10cm. B C

S. galericulata L. Alm. skjolddrager. VI-VIII. C (Sila) K

S. hastifolia L. Spydbladet skjolddrager. VI-VII. A K (Matese)

Prasium majus L. Murgrøn. 30-100cm. Halvbusk med gulliggrå, længdesprukken bark. Bladene 2-5cm, ægformede. Bægeret tragtformet med 3-tandet over- og 2-tandet underlæbe, op til 25mm i frugt. Kronen 17-20mm, oftest hvid, ellers rødlilla. IV-VI. A B C K

Marrubium. Kransburre.

1. 10 ens, hagekrummede bægertænder ..... vulgare
   5 m.m. ens bægertænder 2.
2. Bægertænderne længere end den rødlilla krone ..... alysson
   " kortere " " hvide krone incanum

Marrubium incanum Desr. Hvidgrå kransburre. 30-50cm. Tæt filtet. Bladene aflangt-ægformede med kileformet grund, grågrønne ovenpå, hvidlige nedenunder. Kransene med 20-25 blomster. V-VIII. A K

M. alysson L. Viftebladet kransburre. 20-40cm. Tæt hvidulden. Bladene vifteformede med lang, kileformet grund. Kransene med indtil 12 blomster. V-VI. A

M. vulgare L. Kransburre. 20-45cm. M.m. grå-hvidfiltet. Bladene m.m. runde, uregelmæssigt rundtakkede, med en stilk på 1-2cm. Kronen 6-7mm, hvid. V-VIII. A B C K

Sideritis syriaca L. Tungekortkrone. 10-50cm. Flerårig. Grå- ellet hviddunet. Bladene 1-6cm, omvendt lancet-spatelformede. Støttebladene hjærteformede. Lysegule blomster. V-VII. A B C K

S. montana L. Kortkrone. 5-25cm. Enårig. Bægeret med 3 opad- og 2 nedadrettede tænder, 6-8mm. Kronen gul og brunrandet, ca. = bægeret. V-VII. K

S. romana L. Stortandet kortkrone. 5-25cm. Enårig. 1 stor og 4 små bægertænder. Kronen hvidgul, ca. = bægeret. IV-VI. A B C K

Melittis albida Guss. Hvid hjærtensfryd. 40-70cm. Ægformede blade på 6-15cm med 20-24 par tænder og hjærteformet grund. Stænglen tæt og kort kirtelhåret. Kronen oftest hvid, ellers med røde pletter på underlæben. V-VII. B C K

M. melissophyllum L. Vild hjærtensfryd. 30-50cm. De største blade 5-7(9)cm med 10-20 par tænder. Stænglen med 0-få kirtelhår. Kronen mere hyppigt med røde tegninger. V-VIII. A B K

Phlomis. Løvehale. Kronens overlæbe hvælvet og bøjet ned over underlæben.

P. herba-venti L. Vindløvehale. 30-50cm. Kronen lyserød, 15-20 mm. Kransene mest med 8-12 blomster. Planten hvidligt stjærnefiltet. Bladene 8-11x3-4cm. V-VI. A B C K

P. ferruginea Ten. Rustløvehale. 40-100cm. Kronen gul, 25-27mm. Kransene med 14-30 blomster. Planten rustfiltet. Forbladene linjeformede. Bladene 3-8cm. V-VII. 0-300m. A (Monopoli, Martina Franca, Ginosa, Otranto?) B (Montescaglioso) C

P. fruticosa L. Buskløvehale. 50-100cm. Kronen gul, 23-25mm. Kransene med 14-36 blomster. Planten grågult filtet. Forbladene lancetformede. Bladene 6-9x2-3cm. III-V. A C

Galeopsis ladanum L. Sandhanekro. Stænglen ikke stivhåret eller fortykket ved bladfæsterne. Bægeret grønt med udstående, klare hår. Bladene 2-4 x så lange som brede. V-VII. B C K

G. angustifolia Ehrh. Smalbladet hanekro. Bægeret hvidt med tiltrykte, matte hår. Bladene 5-10 x så lange som brede. V-VII. B K

G. tetrahit L. Alm. hanekro. VI-VIII. B C K

Lamium. Tvetand.

1. Kronrøret krummet ..... 2.
   " ret 4.
2. Støvknapperne glatte. Kronen mest 15-20mm ..... flexuosum
   " hårede. " 20-35mm 3.
3. Kronen hvid. Læbens sidelapper med 2-3 småtænder ..... album
   " mest rød. Sidelapperne består af 1 tand maculatum
4. Flerårig. Kronen 25-40mm ..... garganicum
   Enårig 5.
5. Kronens overlæbe kløvet ..... bifidum
   " " helrandet 6.
6. Frugtbægertænderne sammenstødende ..... amplexicaule
   " udstående purpureum

Lamium garganicum L. Stribet tvetand.30-50cm. Underlæben ofte med røde striber. Kronrøret meget længere end bægeret. A B C K
ssp. garganicum: Stængler og blade tæt hårede. IV-VIII.
ssp. laevigatum Arc.: Stængler og blade spredt hårede til halvglatte.

L. flexuosum Ten. Klippetvetand. 15-60cm. Flerårig. Kronen hvid eller lyserød, røret lig eller kortere end bægeret. IV-VI. ABCK

L. maculatum L. Plettet tvetand. 20-50cm. Flerårig. Bladene ofte blegplettede. Kronen med hvidt rør og ofte plettet underlæbe.ABCK

L. album L. Døvnælde. V-VIII. B C K

L. bifidum Cyr. Kløvet tvetand. 10-40cm. Bladene uregelmæssigt indskåret-tandede. Kronen 20-25mm, hvid. III-V. A B C K

L. purpureum L. Rød tvetand. III-X. A B K

L. amplexicaule L. Liden tvetand. I-V(+IX-XI). A B C K

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Pol. ssp. montanum (Pers.) Ehrend.& Pol. Guldnælde. V-VIII. B C K

Ballota pseudodictamnus (L.) Bentham Gulfiltet skålbæger. 30-50 cm. Gulfiltede stængler. Æg-hjærteformede eller runde blade på 3-5x3-4cm. Bægeret 8-10mm, med en uregelmæssigt rundtakket krave på 7-8mm. Kronen 14-15mm, hvid og rødprikket. VI-VII. A B K

B. rupestris (Biv.) Vis. Klippetandbæger. 40-70cm. Udstående håret. Bladene hjærteformede og rundtakkede, 6-7x5-6cm. 10 bægertænder. Kronen 12-14mm, rødlilla med lådden overlæbe.IV-VIII.ABCK

B. nigra L. Tandbæger. V-VIII. A B C K. 2 underarter:
ssp. foetida Hayek: Bægertænderne ikke krummede. A B K
ssp. uncinata (Fiori & Bég.) Patzak: Bægertænderne krummede. ABC

Stachys. Galtetand.

1. Kronen lysegul eller hvid ..... 2.
   " rød 6.
2. Enårig ..... 3.
   Flerårig 4.
3. Svagt håret. Bladgrunden afrundet til kileformet ..... annua
   Udstående håret. Bladgrunden afskåret ocymastrum
4. Grundbladene næsten væk under blomstringen ..... recta
   " danner en blivende roset 5.
5. Bladene 10-15(6-20)mm brede, låddent filtede ..... maritima
   " 4-5mm brede, dunede pubescens
6. Enårige ..... 7.
   Flerårige 8.
7. Kronen 12-20mm, tydeligt længere end bægeret marrubiifolia
   " 6-12mm, næppe længere end bægeret arvensis
8. Blomsterne uden eller med ganske små forblade ..... 9.
   " med forblade mindst så lange som bægerrøret 11.
9. Øvre blade 1,2-2 x så lange som brede, ægformede silvatica
   " " 3-6 x så lange som brede 10.
10. Bladene 6-12cm. Kronens overlæbe helrandet ..... palustris
    " 2-6cm. " " kløvet arenaria
11. De fleste blade grundstillede ..... officinalis
    " " " på stænglen 12.
12. Stænglen kirtelhåret. Bladene ægformede, 5-8cm brede alpina
    " uden kirtler. " lancetformede, 1-2(5)cm br. 13.
13. De fleste blade med kileformet grund ..... salviifolia
    " " " " afskåret eller hjærteformet grund 14.
14. Bladundersiden grøn ..... heraclea
    " grågrøn til hvid 15.
15. Bægertænderne kirtlede, mest m.m. krumme i frugt tymphaea
    " ukirtlede, ikke krumme i frugt germanica

Stachys officinalis (L.) Trevisan Betonie. 30-120cm. Bladene aflange med hjærteformet grund, groft rundtakkede, 3-12cm. 1-3 par stængelblade. Et endestillet, tæt aks. VI-X. A B C K

S. alpina L. Alpegaltetand. 30-100cm. Bladene 5-18x3-9cm, grønne eller grågrønne, tandede. Bægertænderne uens. Kronen mat rødlilla. VI-VII. K (Matese)

S. germanica L. Filtet galtetand. 30-90cm. Bladene 3-9cm med gråfiltet underside. Nedre kranse adskilte. V-VIII. A B C K

S. tymphaea Hausskn. Uligetandet galtetand. 15-40cm. Bladene 3-6(9)x2½-4(5½)cm, gråfiltede nedenunder, æg- til ægformet-aflange. Få kranse. Bægertænderne ofte lidt uens. V-VIII. B C K

S. salviifolia Ten. Salviegaltetand. 30-60cm. Bladene hvidfiltede på begge sider eller m.m. grågrønne ovenpå. De nedre blade kan have hjærteformet grund. V-VIII. A B C K

S. heraclea All. Lådden galtetand. 20-60cm. V-VIII. A B C K

S. silvatica L. Skovgaltetand. VI-VIII. A B C K

S. palustris L. Kærgaltetand. VI-VIII. K

S. recta L. Bleggul galtetand. 20-40cm. Bladene 3-5cm, aflange til linjeformede. Kransene med 6-16 blomster og mindre, ægformede støtteblade på 11x5mm. Kronen 15-20mm. V-IX. A B C K. 3 ssp.:
ssp. recta: Bægeret 5-7mm, regelmæssigt 5-tandet, mest uden ½-1mm lange kirtelhår. Kronens underlæbe 5-8mm.
ssp. labiosa (Bertol.) Briq.: Bægeret 7-10mm, uregelmæssigt, mest med ½-1mm lange kirtelhår. Kronens underlæbe 8-12mm. Mellemste og øvre blade 7-10mm brede, rund- til savtakkede. B
ssp. subcrenata (Vis.) Briq.: Som labiosa, men mellemste og øvre blade 1-6mm brede, helrandede til svagt rundtakkede. A K

S. maritima Gouan Strandgaltetand. 10-30cm. Bladene 2½-4x1-1½cm, aflange til bredt ægformede. Bægeret uden kirtelhår. Kronen filtet, 12-14mm. Kransene tætstillede. Sandstrand. VII-VIII. A C

S. pubescens Ten. Dunet galtetand. 20-40cm. Bladene ca. 25x4-5 mm, m.m. aflange. Bægeret med siddende kirtelhår. Kronen dunet. Kransene m.m. adskilte. V-VI. A (Bari, Lecce) B C

S. arenaria Vahl Sandgaltetand. 20-80cm. Liggende, svagt stivhåret. Bladene omvendt lancetformede, med kileformet grund og ellers rundtakkede. Bægeret tæt låddent. IV-V. C K

S. ocymastrum (L.) Briq. Håret galtetand. 20-50cm. Opret og udstående håret. Bladene aflangt til bredtægformede. 4-6-blomstrede kranse. Kronen 12-13mm, med kløvet overlæbe. III-VI. A B C K

S. marrubiifolia Viv. Hjærtebladet galtetand. 10-40cm. Opret. Bladene 2-6x1½-4½cm, æg-hjærteformede, hårede. Akset forlænget, med mellembrudt grund. IV-VI. K (Ischia, Posillipo)

S. annua (L.) L. Enårig galtetand. 10-40cm. Bladene lancetformede, 1-6cm, svagt tandede. 2-6-blomstredekranse. Kronen 10-16mm, hvid eller bleggul, med hel overlæbe. V-VIII. B C K

S. arvensis (L.) L. Agergaltetand. III-V. B C K

Nepeta. Katteurt. Underlæbens midterflig konkav. Overlæben udrandet. Flerårige.

N. cataria L. Katteurt. 50-100cm. Stænglen tæt korthåret. Bladene dunede, med stilke på 1-3cm. Kronen hvid med røde prikker. ABCK

N. nuda L. Glat katteurt. 50-100cm. Stængel og blade næsten glatte. Bladene siddende, kun de nedre med 1-5mm lange stilke. Kronen lilla eller hvid. VI-VII. K (Matese)

Glechoma hirsuta W.& K. Håret korsknap. Som den hjemlige Korsknap, men kronen 2-3cm. III-VI. A B C K

Prunella laciniata (L.) L. Hvid brunelle. 15-25cm. I det mindste de øvre blade fjerfligede til lappede. Kronen gullighvid. A B C K

P. vulgaris L. Alm. brunelle. IV-X. A B C K

Melissa officinalis L. Hjærtensfryd. 50-80cm. Med citronduft. Bladene svagt hårede, kirteldunede nedenunder. Frugtbægerets øvre midtertand tydelig og bredt trekantet. V-VIII. A B C K

M. romana Miller (M. officinalis ssp. altissima) Håret hjærtensfryd. 40-150cm. Stinkende. Bladundersiden grå- eller hvidfiltet. Frugtbægerets øvre midtertand utydelig. VI-VIII. A B C K

Satureja montana L. Vinterbønneurt. 10-70cm. Nedre støtteblade 10-20mm, længere end kransene. Bladene 15-30x1-7mm, glatte og randhårede. Kronen hvid til rødlilla, 6-12mm. VII-IX. A B C K

S. cuneifolia Ten. Kilebladet bønneurt. 10-50cm. Nedre støtteblade 3-10mm, højst lig kransene. Bladene 5-16x1½-4mm, de øvre ofte med indrullet rand. Kronen 5-10mm. VI-VIII. A C (Laino Borgo)

Acinos arvensis (Lam.) Dandy Voldtimian. Enårig. Kronen 7-10(12) mm. IV-VI. A B C K

A. suaveolens (Sm.) G.Don Citronvoldtimian. 10-30cm. Citronduftende flerårig. Bladene mest 2-3 x så lange som brede, 10-20mm, med smalt kileformet grund. V-VI. A B

A. alpinus (L.) Moench Alpevoldtimian. 5-30cm. Flerårig uden citronduft. Bladene 1,2-1,5 x så lange som brede, 6-20mm, med afrundet til bredt kileformet grund. 1000-2200m. V-VII. 2 ssp.:
ssp. alpinus: Bladundersiden uden fremtrædende ribber nær kanten. Bægerhårene rette, 0,6-0,8mm. Kronen 12-20mm. A B C K
ssp. majoranifolius (Miller) Ball (A. granatensis): Bladundersiden med fremtrædende ribber, især nær kanten. Bægerhårene hagekrummede, 0,2-0,3mm. Kronen 10-12mm. C (Pollino, Sila, Asprom.)

Calamintha grandiflora (L.) Meonch Bøgemynte. 20-50cm. Bladene ægformede, 3-5x2-4cm. Kransene 1-5-blomstrede, m.m. ensidige. Kronen 25-35mm, lyserød. VII-VIII. A B C K

C. silvatica Bromf. Alm. bjærgmynte. 30-80cm. Bladene bredt ægformede til runde, takkede. Kvastene 3-9-blomstrede på en stilk op til 15mm. Bægeret 6-10mm, dets nedre tænder 2-4mm. V-X. ABCK
ssp. silvatica: De større blade 5-6x3-4cm. Kvaststilkene op til 15mm. Kronen 15-22mm.
ssp. ascendens (Jordan) Ball: Større blade 1½-3x1-2cm. Kvaststilkene 1-3(10)mm. Kronen 10-16mm.

C. nepeta (L.) Savi Grå bjærgmynte. 20-40cm. Som foregående, men bladene helrandede eller svagt tandede. Bægeret 3-7mm, med de nedre tænder 1-2mm. V-X. A B C K. 2 underarter:
ssp. nepeta: Bladene ægformede, 1,3-1,5 x så lange som brede, op til 35mm. Kvastene 10-20-blomstrede, længere end støttebladene.
ssp. glandulosa (Req.) Ball: Bladene æg-rudeformede, ca. så lange som brede, op til 22mm. Kvastene 5-11(15)-blomstrede, sj. længere end støttebladene.

Clinopodium vulgare L. Kransbørste. VI-VIII. A B C K. 2 ssp.:
ssp. vulgare: Bægeret 7-9½mm; nedre tænder 2½-4mm, de øvre -2½mm.
ssp. arundanum (Boiss.) Nyman: Bægeret 9½-12mm; nedre tænder 4-5½mm, de øvre tænder 2½-4mm.

Micromeria. Murtråd.

1. Bægertænderne ca. så lange som brede ..... fruticosa
" 2-6 x så lange som brede 2.
2. De større blade omtrent så brede som lange ..... microphylla
" " " højst ½ " " " " 3.
3. Blomsterne siddende, nøglerne ofte m.m. siddende ... juliana
" og nøglerne tydeligt stilkede 4.

4. Bægeret udstående håret, resten af planten svagere håret nervosa
   Bægeret med m.m. samme behåring som resten af planten 5.
5. Stængelbladene i knipper ..... fruticulosa
   " parvise 6.
6. Blomsterstandens blade linjeformede, 0,7-1mm brede consentina
   " " 2mm brede 7.
7. Planten udstående håret ..... canescens
   " tiltrykt " graeca

Micromeria fruticosa (L.) Druce Buskmurtråd. 30-60cm. Grenene hvidfiltede. Bladene 6-15x2-7mm, kirtelprikkede. Kransene løse, 10-30-blomstrede. Kronen 5-10mm, hvidlig. VI-VII. A?

M. microphylla (D'Urv.) Bentham Spaderbladet murtråd. 5-15cm. M.m. trådformede stængler. Bladene 3-6x2-4cm, trekantet ægformede til elliptiske. Kronen 5-8mm, rødlilla. IV-V. A (Andria, Otranto)

M. juliana (L.) Bentham Aksmurtråd. 12-35cm. Noget blågrøn. Opret. Nedre blade 5-6x2-3mm, ofte indrullede og derfor tilsyneladende 1mm brede. 3-4mm lange, sylformede forblade. V-VI. A B C K

M. nervosa (Desf.) Bentham Ægbladet murtråd. 10-40cm. Bladene 7-10x4-5mm. Kronen 4-6mm. IV-V. A (Polignano, Gallipoli)

M. graeca (L.) Bentham Alm. murtråd. 20-30cm. Tiltrykt fintdunet. Nedre blade æg-lancetformede, øvre blade gradvist smallere. Kronrøret 2-4mm længere end bægerrøret. V-VI. A B C K. 2 ssp.:
ssp. graeca: Kvastene med 2-4mm opret-udstående stilke og 3-4 blomster. Mest i oliventræsbæltet.
ssp. tenuifolia (Ten.) Nyman: Kvastene med 1-1½(3)mm opret-tiltrykte stilke og oftest 2 blomster. I bakke og bjærglandet.

M. canescens (Guss.) Bentham Grå murtråd. 15-25cm. Hvidulden eller stivhåret. Hårene 0,5-1,2mm. Kvastene med over 4 blomster. V-VII. A C K

M. consentina (Ten.) Terr. Smalbladet murtråd. 15-30cm. Fintdunet med hår på 0,1mm. Nedre blade ægformede, 3½-4x2mm, øvre omrullet linjeformede, 12-20x0,7mm, noget tiltrykte. V-IX. C

M. fruticulosa (Bertol.) Grande Knippemurtråd. 8-15cm. Kort stivhåret, hårene 0,3-0,5mm. Kronen 7-8mm. III-VI. K (Capri, Pen.Sorrentina)

Hyssopus officinalis L. Isop. 20-50cm. Nedentil forveddet flerårig. Bladene 20-30x2-3mm, helrandede og ofte omrullede. Bægeret rørformet, 5-5½mm. Kronen 7-9mm. VII-X. B C K. Som ssp. aristatus (Godr.) Briq.

Origanum heracleoticum L. Vintermerian. 40-70cm. Nær O. vulgare, men støttebladene 2-3mm, grønne og tætkirtlede. Kronen hvid, sj. lyserød. VI-VIII. A B C K

O. vulgare L. Alm. merian. Støttebladene 4-5mm, oftest rødlilla, med 0-få kirtler. Bægeret regelmæssigt. VI-IX. A B C K

O. majorana L. Havemerian. 20-50cm. Bladene m.m. gråfiltede. Støttebladene gråfiltede. Bægeret 1-læbet, kløvet på den ene side. Kronen ca. 4mm, hvid eller lyserød. Dyrket og forvildet. VI-IX.

Thymus. Timian.

1. Bladene linjeformede, noget trekantet kølede ..... capitatus
   " ikke kølede eller med trekantet tværsnit 2.
2. Bladene linjeformede, støttebladene m.m. ægformede striatus
   Blade og støtteblade af samme form 3.
3. Stænglen under blomsterstanden trindt håret ..... 4.
   " " blomsterne tvesidet håret eller kanthåret 6.
4. De udstrakte skud ender i et bladknippe ..... longidens
   " " " " " en blomsterstand 5.

5. Bægeret 3½-5mm. Bladene 1½-2½mm brede ..... spinulosus
" 2½-3½mm. " 3-5mm brede, siddende pannonicus
6. Stænglen kanthåret foroven ..... pulegioides
" tvesidet håret foroven 7.
7. Bladundersidens sideribber fremtrædende og gule .... kerneri
" " svage og grønlige longicaulis

Thymus capitatus (L.) Hoffm.& Lk. Hovedtimian. 20-50cm. Dværgbusk med opstigende til oprette, grenede stængler. Bladene nåleformede, ofte knippestillede, 6-10mm. Ægformede hoveder med tæt taglagte støtteblade. Kronen 7-10mm. V-VI. A B C K

T. striatus Vahl Nåletimian. 8-15cm. Bladene mest 10-15x1-2mm, med få, blege kirtelprikker, ofte knippestillede. Støtteblade og bægre ofte rødlilla. V-VII. A B C K

T. spinulosus Ten. Stentimian. 5-20cm. De større blade 8-10 x 1,5-1,7mm, med tydelige ribber. Bægeret grønligt, tæt rødligt kirtelprikket. Kronen hvidlig, 5-6mm. V-VI. A B C K

T. pannonicus All. Steppetimian. 10-25cm. Planten med busket vækst. Bladene 3-6 x så lange som brede, med svage sideribber. Blomsterstanden forlænget og mellembrudt. V-VIII. K

T. longidens Velen. 8-15cm. Stænglerne langt krybende. Bladene m.m. siddende, lancetformede, større opad, med kraftige ribber; uden bladknipper forneden. IV-VII. 0-1000m. B (Pignola)

T. kerneri Borbas 4-8cm. Bladene ca. 2 x så lange som brede; sideribberne sammenløbende yderst; ægformede til rundagtige. Bladene større opad, de nedre med bladknipper. VI-VIII. K (Cilento)

T. longicaulis Presl Langstænglet timian. 3-6cm. Bladene 4-5 x så lange som brede, m.m. siddende, større opad; de nedre med bladknipper. Sideribberne næppe sammenløbende. IV-VIII. A B C K

T. pulegioides L. Bredbladet timian. IV-VIII. A B C K

Lycopus europaeus L. Sværtevæld. Øvre blade tandede. A B C K

L. exaltatus L.f. Høj sværtevæld. 90-160cm. Som europaeus, men alle blade fjerfligede. Støttebladene 6-9mm (3-5mm hos europaeus) VII-IX. K (Fusaro ved Napoli)

Mentha. Mynte.

1. Blomsterne i kranse i hjørnerne af almindelige blade .....2.
" i endestillede stande; støttebladene små 3.
2. Bægertænderne lidt uens. Bladene mest 3-7mm brede pulegium
" ens. Bladene mest over 1cm brede arvensis
3. Bladstilken over 2mm ..... aquatica
" 0-2mm 4.
4. Bladene 5-9cm. Undersiden med 0-få grenede hår ..... 6.
" op til 4½cm. Undersiden med mange grenede hår 5.
5. Bladene 2-4cm brede og under dobbelt så lange ... suaveolens
" ½-2cm " " ca. dobbelt så lange microphylla
6. Bladene bredest nær grunden. Undersiden oftest med
nogle grenhår ..... spicata
Bladene bredest midtpå. Alle hår enkle longifolia

M. arvensis L. Agermynte. VI-IX. C (Pollino)

M. aquatica L. Vandmynte. VI-X. A B C K

M. suaveolens Ehrh. Rundbladet mynte. 30-90cm. Bladene stærkt rynkede, bredest nær grunden, oftest savtakkede, m.m. grå-hvid-uldne på undersiden, butte. V-X. A B C K

M. microphylla Koch Småbladet mynte. 20-60cm. Bladene 10-45x5-20 mm, lancetformede og savtakkede, bølgede og filtede på begge sider. Kransene ofte adskilte i et svagtgrenet aks. VI-X. A B C K

Mentha spicata L. Grøn mynte. VI-X. A B C K. 2 underarter:
ssp. spicata: Stængler, blade, blomsterstilke og bægre hårede.
ssp. glabrata (Lej.& Court.) Lebeau: Blomsterstilke og bægre glatte. Stængler og blade glatte eller fåhårede. Dyrket og forvildet.

M. longifolia (L.) Hudson Grå mynte. 50-100cm. Bladene 5-9x2-4cm, grå- til hvidfiltede nedenunder, ofte udstående tandede, jævne til svagt rynkede ved grunden, spidse. VI-X. A B C K

M. pulegium L. Polejmynte. 15-60cm. Liggende til opstigende. Bladene 12-20mm, oftest smalt elliptiske, med 0-6 par tænder. A B C K

Rosmarinus officinalis L. Rosmarin. 30-120cm. Busk med liggende eller opstigende grene med gråbrun bark. Bladene 15-28mm, linjeformede med omrullet rand. Blomsterne få sammen, 10-12mm, lyseblå; kronens overlæbe kløvet, underlæbens midtflig skeformet. A B C K

Lavandula stoechas L. Toplavendel. 30-120cm. Bladene 1-2cm, linje-lancetformede, helrandede, ofte gråfiltede. Blomsterne i tætte, 2-3cm lange, ægformede aks med 2-3 lilla, kronbladsagtige højblade i toppen. III-V. B C K

L. angustifolia Miller Ægte lavendel. 30-100cm. Bladene som hos stoechas. Aksene 3-8cm, langstilkede, uden højblade i toppen. Kransene til slut adskilte. VI-IX. B C K

L. multifida L. Fjerlavendel. 30-100cm. Bladene mest 2 x fjersnitdelte med trekantet omrids. Aksene tynde, 2-7cm, firkantede og langstilkede, uden højblade øverst. III-IV. C (Capo dell'Armi)

Salvia. Salvie.

1. Stænglerne helt eller delvist forveddede ..... 2.
   " " urteagtige 4.
2. Større blade 3-6cm brede, ofte med 2 lapper nederst triloba
   " " 1-2cm brede og udelte 3.
3. Bladene lancetformede. Kronen lilla (sj.rød/hvid) officinalis
   " lancet-linjeformede. Kronen hvidlig leucantha
4. Bægertænderne tornagtige ..... 5.
   " ikke tornagtige 6.
5. Støttebladene hindeagtige, lyserøde eller hvide .... sclarea
   " urteagtige og grønne argentea
6. Kronen lysegul. Planten klæbrig. Spydformede blade glutinosa
   " ikke gul 7.
7. Bladene regelmæssigt rundtakkede. Enårig ..... viridis
   " groft takkede til fjersnitdelte. Flerårige 8.
8. Bægeret med 1-1½mm lange, hvide hår ..... 9.
   Bægerhårene korte, 0,3-0,4mm 10.
9. Bladene under 2/3 delte. Kronen mest lilla ..... verbenaca
   " næsten helt delte. Kronen himmelblå multifida
10. Bladene fjerfligede ..... ceratophylloides
    " groft takkede eller lappede 11.
11. Kronen 11-20mm. Med forlængede topgrene ..... virgata
    " 20-30mm. Toppen kortgrenet pratensis

Salvia officinalis L. Lægesalvie. 20-60cm. Bladene ca. 6cm, rynkede, med grågrøn over- og hviddunet underside. Kransene m.m. ensidige. Kronen blålilla, op til 35mm. III-V. A B C K

S. triloba L.f. Trelappet salvie. 50-120cm. Busk med hvidfiltede stængler. Bladene ægformede, 7-9cm, fintrundtakkede, rynkede. Kronen 16-25mm, lyslilla eller lyserød. V-VI. A C

S. leucantha Cav. 30-80cm. Bladene 5-12cm, spidse, fint rundtakkede, rynkede ovenpå, hviduldne nedenunder. Klaserne 10-30cm med adskilte kranse. Kronen 10-15mm. Forvildet. V-VI. C (Bagnara)

S. sclarea L. Harpikssalvie. 50-110cm. Mest toårig. Bladene bredt ægformede med hjærteformet grund. Støttebladene hindeagtige, rødlilla eller hvide. Kronen lyslilla. VI-VII. B K

Sclarea argentea L. Sølvsalvie. 30-80cm. Opret og stærkt grenet stængel, m.m. kirtlet foroven. Bladene indtil 9x6cm, tæt uldhårede. Bægeret klæbrigt kirtlet. VI-VII. A B C K

S. glutinosa L. Klæbrig salvie. 50-100cm. Bladene 10-13x6-8cm, trekantet-spydformede. Kransene mest 2-blomstrede. VI-IX. B C K

S. pratensis L. ssp. haematodes (L.) Briq. Engsalvie. Bladene aflangt ægformede med hjærteformet grund. Kransene med 4-6 blomster på 2-3cm. V-VIII. A B C K

S. ceratophylloides Ardoino Indskåren salvie. 30-70cm. Nær foregående, men kraftigt stinkende. Bladene spidsfligede. V-X. C (Terreti, Straorini, Gallico)

S. virgata Jacq. Rissalvie. 30-50(100)cm. Nedre blade aflangtægformede med hjærteformet grund, savtakkede. Støttebladene under ½ x bægeret. Kronen 11-20mm, blålilla. VI-VIII. A B

S. verbenaca L. Jærnurtssalvie. 20-50cm. Nedre blade elliptiske, 6-10x3-4cm med 3-4 par m.m. dybe lapper, m.m. kirtlede ovenpå. Støttebladene lidt kortere end bægeret. I-XII. A B C K

S. multifida S.& S. 10-30cm. Som verbenaca, men mindre. Grundbladene dybt indskårne eller næsten fjersnitdelte. III-VI. ABCK

S. viridis L. Blåtoppet salvie. 20-50cm. Blomsterstanden ofte med en top af lilla eller grønne højblade øverst. Kronen 14-18mm, lyserød eller lyslilla. IV-V. A B C

Ocimum basilicum L. Basilikum. 20-40cm. Glat enårig. Bladene stilkede, 3-4x2-3cm, ægformede og helrandede. Bægeret med bladagtig overlæbe. Kronen 10-12mmm, hvid til blegrød. V-IX. Forvildet.

SOLANACEAE

1. Støvdragerne sammenbøjede ..... 2.
   " adskilte 3.
2. Bladene 2 x fjersnitdelte ..... Lycopersicon
   " hele til 1 x delte Solanum
3. Blomsterne i toppe eller klaser ..... 4.
   " enlige eller i små nøgler 6.
4. Bladene tandede til indskårne ..... Hyoscyamus
   " helrandede 5.
5. Bægeret 8-20mm. Frugten en kapsel ..... Nicotiana
   " 4-7mm. " et bær Cestrum
6. Busk, ofte tornet ..... Lycium
   Urter 7.
7. Frugten en kapsel. Enårig. Kronen 4-19cm, tragtformet Datura
   " et bær 8.
8. Bægeret delt næsten til grunden. Kronen hvid .... Salpichroa
   " højst ½ delt 9.
9. Stængelløs rosetplante ..... Mandragora
   Med bladet stængel 10.
10. Bægeret omvokser bærret som en slags kapsel ..... Physalis
    " " ikke bærret Atropa

Lycium. Bukketorn.

1. Bladene oftest bredest på eller under midten ..... 2.
   " " " over midten 3.
2. Bladene oftest bredest under midten ..... chinense
   " " " på midten barbarum
3. Bægeret 5-7mm. Kronen 20-22mm ..... afrum
   " 1½-4mm. " 8-18mm 4.
4. Bladene 2-5cm. Bægeret 2-3mm. Kronen 11-13mm ..... europaeum
   " 3-15mm. " 1½-2mm. " 13-18mm schweinfurthii

Lycium europaeum L. Europæisk bukketorn. 1-4m. Kraftigt tornet. Kronen lyserød eller hvid, fligene 3-4mm. IV-IX. A B C K

Lycium schweinfurthii Dammer (L. intricatum p.p.) Småbladet bukketorn. 30-200cm. Stærkt tornet. Kronen lilla, bleglilla eller hvid, fligene 2-3mm. Bærret sort. IV-VII. C

L. barbarum L. Bukketorn. ½-2½m. Fåtornet. Kronen 9mm, røret smalt valseformet over 2½-3mm. Bladene 2-10x½-3cm. Kronen lilla. VI-VIII. Forvildet i K (Salernit.)

L. chinense Miller Bredbladet bukketorn. ½-2½m. Fåtornet. Kronen 10-15mm, røret smalt valseformet over ca. 1½mm, røret. Bladene 1-14x½-6cm. IV-XII. Forvildet i C (Soverato)

L. afrum L. Storblomstret bukketorn. 1-2m. Stærkt tornet. Bladene 10-23x1-2mm. Kronen noget valseformet, brunlilla. III-VI. Dyrket og forvildet i A B C K

Atropa belladonna L. Galnebær. ½-2m. Kronen 2½-3cm, klokkeformet, brunlilla eller grønlig. Sort, kugleformet bær. VI-IX. A B C K

Hyoscyamus niger L. Bulmeurt. Stængelbladene siddende. Kronen hvidgul med lilla årer. V-VIII. A B C K

H. albus L. Hvid bulmeurt. 30-50cm. Stængelbladene stilkede. Kronen hvidgul, uden lilla årer, men med grønligt eller lillat svælg. V-VIII. A B C K

Physalis alkekengi L. Jødekirsebær. V-VII. B K

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baillon Svaleæg. 30-80cm. Flerårig med nikkende, klokkeformede blomster på 6-10mm i bladhjørnerne. Bærret ægformet, 1-1½cm, hvidt og spiseligt. VII-IX. Forv.i K

Solanum. Natskygge.

1. Planten uden stjærnehår ..... 2.
   " med " 4.
2. Kronen lilla. M.m. forveddet flerårig ..... dulcamara
   " hvid. Enårige 3.
3. Kvastene med (3)5-10 blomster. Bærret sort eller grønt nigrum
   " " 3-5 blomster. Bærret rødt eller gult luteum
4. Stængler og blade uden eller med svage torne elaeagnifolium
   " " " med stærke torne sodomaeum

Solanum nigrum L. Sort natskygge. III-XI. A B C K. 2 underarter:
ssp. nigrum: Glat til dunet med oftest tiltrykte, ukirtlede hår.
ssp. schultesii (Opiz) Wessely: Lådden med oftest udstående, kirtlede hår. Bladene takkede.

S. luteum Miller Håret natskygge. Som nigrum, men kvaststilkene 7-13mm (14-30mm hos nigrum), ofte nedbøjede. Bærret ofte længere end bredt. III-XII. A B C K. 2 underarter:
ssp. luteum: Stænglen butkantet. Planten lådden med udstående og kirtlede hår. Bærret rødt til gult.
ssp. alatum (Moench) Dostal: Højrød natskygge. Stænglen skarpkantet. Planten glat til tiltrykt dunet, ukirtlet. Rødt bær.

S. dulcamara L. Bittersød natskygge. IV-VII. A B C K

S. elaeagnifolium Cav. Sølvbladsnatskygge. 40-100cm. Flerårig urt eller dværgbusk med tæt grågul stjærnefilt. Ofte med små, mest rødlige torne på stængler og blade. Disse lancetformede, 6-8 cm, m.m. helrandede. Kronen rødlilla. VII-VIII. Indslæbt i A

S. sodomaeum L. Sodomaæble. 50-120cm. Tætgrenet busk med kraftige gule torne på 5-9mm. Bladene 6-12cm, bugtet lappede. Bleglilla blomster. Bærret 2-3cm, kuglerundt, gult eller brunt. IV-XI. ABCK

Lycopersicon esculentum Miller Tomat. VII-X. Ofte forvildet.

Mandragora autumnalis Bertol. Alrune. Rosetplante med 10-30cm lange, let bølgede, omvendt lancetformede blade. Kortstilkede kvaste af lyslilla blomster fra rosettens midte. Bærret ellipsoidisk,

gult til orange. IX-XI (evt. også III-IV). A B C K

Datura stramonium L. Pigæble. Kronen 6-8cm. Bægertænderne 5-15 mm. VII-X. A B C K

D. innoxia Miller Storblomstret pigæble. ½-2m. Kronen 11-19cm. Bægertænderne 1-2½cm. VI-IX. Forvildet i C

Cestrum parqui L'Hér. Kapunbusk. 1-3m. Busk. Bladene lancetformede, 3-14x1-4cm. Blomsterne gule eller gulgrønne med et kronrør på 15-20mm og kronflige på 3-6mm. Et aflangt, sortagtigt bær på 7-10mm. IV-VII. Dyrket og forvildet. A B C K

Nicotiana glauca Graham Grågrøn tobak. 1-3m. Glat busk. Bladene 5-25cm, lancet- til æg-rudeformede, grågrønne. Kronen gul, 3-4cm, med et langt, smalt rør og en kortlappet krave. I-XII. A K

SCROPHULARIACEAE

1. Kronen m.m. hjulformet, med kort kronrør, næsten regelmæss. 2.
   " ikke " 3.
2. Kronen 4-tallig, mest blå. 2 støvdragere ..... Veronica
   " 5-tallig, " gul. 4-5 støvdragere Verbascum
3. Kronrøret med en pukkel eller spore ved grunden ..... 4.
   " uden " " " " " " 9.
4. Kronrøret ikke lukket af en pukkel ..... Chaenorhinum
   " lukket af en pukkel fortil 5.
5. Kronen meden but pukkel ved grunden ..... 6.
   " " " spids spore " " 7.
6. Enårig. Bægerfligene længere end kronrøret ..... Misopates
   Flerårig. Bægerfligene kortere end kronrøret Antirrhinum
7. Bladene smalle, m.m. siddende ..... Linaria
   " brede og stilkede 8.
8. Bladene lappede, stilken længere end pladen ..... Cymbalaria
   " ikke lappede, stilken kortere end pladen Kickxia
9. Bægeret med 4 tydelige og m.m. ens tænder ..... 10.
   " 5-tandet eller tolæbet 16.
10. Lyserød snylteplante uden bladgrønt ..... Lathraea
    Planten med grønne blade 11.
11. Bægerrøret sammentrykt, skiveformet opblæst .... Rhinanthus
    " ikke skiveformet opblæst 12.
12. Blomsterne i ensidige aks ..... Odontites
    " ikke i ensidige aks 13.
13. Nedre blade helrandede ..... Melampyrum
    Bladene tandede 14.
14. Kronens overlæbe med 2 skråt oprette lapper ..... Euphrasia
    " " hel eller udrandet 15.
15. Bægeret klokkeformet. Kronen hvid/lyserød ..... Bellardia
    " rørformet. Kronen rød eller gul Parentucellia
16. Kronrøret kort og m.m. kugleformet ..... Scrophularia
    " rør- til tragtformet 17.
17. Fjersnitdelte blade ..... Pedicularis
    Bladene hele 18.
18. Bladene spredte ..... Digitalis
    " modsatte 19.
19. Kronen gul. Overlæben snabelagtigt forlænget Rhynchocorys
    " hvidlig. Overlæben ikke forlænget Gratiola

Gratiola officinalis L. Nådesurt. 15-30cm. Glat, opret flerårig. Bladene lancetformede, spidse, 2-5cm, kirtelprikkede, m.m. savtakkede. Kronen rørformet med en noget tolæbet krave.VI-VIII.A K

Verbascum. Kongelys.

1. Hvert støtteblad med 1 blomst ..... 2.
   " " " 2-7 blomster 4.
2. Alle støvknapper nyreformede. Kronen mest rødlilla phoeniceum
   Nedre " nedløbende. " " gul 3.

3. Bægeret 8-15mm med savtakkede tænder ..... creticum
" 5-8mm " helrandede " blattaria
4. Støvtrådene med rødlilla hår ..... 5.
" " hvide eller gule hår 10.
5. Grundbladene bølget lappede ..... sinuatum
" takkede til helrandede 6.
6. Grundbladene med hjærteformet grund ..... nigrum
" " tilsmalnet grund 7.
7. Grundbladene siddende, m.m. helrandede ..... mallophorum
" stilkede 8.
8. Blomsterstanden mest ugrenet ..... rotundifolium
" grenet 9.
9. Bladene helrandede. Nedre støvknapper nedløbende argenteum
" tandede. Alle støvknapper nyreformede chaixii
10. Alle støvknapper nyreformede ..... 11.
Nedre " nedløbende eller skævt påsatte 12.
11. Blomsterstilkene 2-5mm. Bladoversiden grådunet pulverulentum
" 6-11mm. " næsten glat lychnitis
12. Nedre støvtråde overvejende glatte ..... 13.
" " hårede 15.
13. Øvre stængelblade ikke nedløbende ..... phlomoides
" " nedløbende 14.
14. Blomsterstilkene 3-5mm. Kronen 3-5cm bred ..... densiflorum
" ca.0mm. " 1½-3cm " thapsus
15. Øvre blade næppe nedløbende ..... samniticum
" " tydeligt nedløbende 16.
16. Grundbladenes stilk 3-5(10)cm. Øvre blade nedløbende niveum
Grundbladene siddende. Alle blade nedløbende macrurum

Verbascum phlomoides L. Hjærtebladet kongelys. 30-120cm. Bægeret 5-12mm. Kronen 2-5½cm bred. Støttebladene æg-lancetformede, 9-15 mm. V-VIII. A B C K

V. samniticum Ten. Riskongelys. 60-150cm. Spredt filtet, ofte m.m. halvglat. Klasen grenet. Bægeret 6-9mm, stilkene 4-6mm. Støttebladene 10-12mm. VII-VIII. A B

V. densiflorum Bertol. Uldbladet kongelys. B (Muro, Abriola)

V. niveum Ten. Snekongelys. 30-150cm. Blomsterne siddende, 2½-5 cm brede. Bægeret 7-12mm. VI-VIII. A B C K. 3 underarter:
ssp. inarimense Murb.: Stængelbladenes nedløbende vinger når næste blade. (Minder om V. macrurum). B K
ssp. niveum: Vingerne når ikke det følgende blad. Grundbladene 20-30x5-6cm. Kronen 3-5cm bred. A B C
ssp. garganicum (Ten.) Murb.: Vingerne når ikke det følgende blad. Grundbladene 6-14x3-6cm. Kronen 25-32mm bred. A (Gargano)

V. macrurum Ten. Langhalet kongelys. 50-150cm. Hvidgult filtet. med tæt, hård filt. Grundbladene næsten helrandede, 25-40x8-20cm. Klasen mest ugrenet. Kronen 3-5cm bred. VI-VIII. A B C K

V. thapsus L. Filtet kongelys. V-VIII. A B C K

V. argenteum Ten. Sølvkongelys. 30-100cm. Gulfiltet. Grundbladene indtil 40x12cm, næsten helrandede, stilkede. Kronen 18-25mm bred. 1000-1800m. VII-VIII. K (S.Gregorio på Matese). Gl. fund.

V. lychnitis L. Blegt kongelys. 80-150cm. Stænglen grenet foroven og også ofte forneden. Nedre blade lancetformede, mørkegrønne og glatte ovenpå. Blomsterstilkene 6-11mm. VI-VIII. B K

V. rotundifolium Ten. Rundbladet kongelys. 50-150cm. Hvidfiltet. Nedre blade ægformede til runde, butte, 12-25x6-17cm, stilken 7-15cm. Klasen mest ugrenet. V-VI. K (Vesuv, M.di Castellamare, M. Accelica)

V. sinuatum L. Bugtet kongelys. 40-100cm. Kort, men tæt grå eller gulfiltet. Blomsterstanden grenet og åben. Støttebladene 3-8

mm, trekantet-hjærteformede. Bægeret 2-4mm. V-VIII. A B C K

Verbascum mallophorum Boiss.& Heldr. Rødstænglet kongelys. 50-150cm. Grundbladene 15-45x5-15cm. Toppen grenet og ret tæt. Støtteblade 4-7mm. Bæger 2½-4mm. VI-VIII. A B (Rionero) K

V. pulverulentum Vill. Hvidtottet kongelys. 50-120cm. Tæt hvidfnugget; de ældre dele m.m. halvglatte. Grundbladene 12-40x6-15 cm. Toppen grenet, ret tæt. Bægeret 2-3½mm. VI-VIII. A B C K

V. chaixii Vill. Savbladet kongelys. 50-120cm. Flerårig. Grundbladene 12-25x6-9cm, glatte og mørkegrønne ovenpå. Toppen oftest grenet. Støttebladene 2-5mm, linjeformede. VI-VIII. A B C. 2ssp:
ssp. chaixii: Grundbladene ofte lidt lappede vedgrunden, gråfiltede nedenunder. Øvre blade fjærnt tandede.
ssp. austriacum (Schott) Hayek: Østrigsk kongelys. Grundbladene ikke lappede, grønne nedenunder. Øvre blade fint tandede. ?

V. nigrum L. Mørkt kongelys. VI-IX. B C K

V. blattaria L. Klasekongelys. 40-70cm. Stænglen kantet, kirtlet foroven. Bladene glatte, rundtakkede til fjerfligede. Kronen med lilla grund. Øvre støvtråde med hvide og rødlilla hår. A B C K

V. phoeniceum L. Purpurkongelys. 30-100cm. Mest flerårig. Stænglen krushåret forneden, kirteldunet foroven. Få og små stængelblade. Blomsterstilkene 1-2½cm. Kronen 2-3cm bred. A (Gargano)

V. creticum (L.) Cav. Lappet kongelys. 40-150cm. Kirteldunet. Grundbladene lappede, lapperne ofte helt frie. Kronen 4-5cm bred med lillaanløben grund. 4 støvdragere. IV-V. C

Scrophularia. Brunrod.

1. De nedre blade 1-2 x delte ..... 2.
   Bladene takkede eller med 1 par lapper på stilken 4.
2. Kronen 4-9mm. Støvdragerne næppe udragende ..... lucida
   " 2½-5mm. " tydeligt udragende 3.
3. Kronens overlæbe 1/2-2/3 x kronrøret ..... juratensis
   " " 1/3 x kronrøret canina
4. Kronen lysegul og regelmæssig ..... vernalis
   " ikke gul, m.m. tolæbet 5.
5. Øvre blade spredte. Bægertænderne uden hindekant peregrina
   Alle blade modsatte. " hindekantede 6.
6. Stænglen stivhåret og kirtelhåret ..... scopolii
   " glat foroven (sj. med få kirtelhår) 7.
7. Bægerets hindekant 0,1-0,2mm bred ..... nodosa
   " " 0,4-0,7mm " 8.
8. Staminodiet rundagtigt. Bladgrunden ofte hjærtef. auriculata
   " tvelappet. " m.m. kileformet umbrosa

Scrophularia vernalis L. Vårbrunrod. IV-VI. A B C K

S. peregrina L. Skarptakket brunrod. 40-80cm. M.m. glat enårig. Ægformede, uregelmæssigt tandede blade. Bægertænderne spidse. V-VII. A B C K

S. scopolii Hoppe Alpebrunrod. 50-120cm. Stænglen stribet og rødlig. Kronen 7-12mm, grønlig med brunlilla overlæbe. Bladene m.m. dunede, dobbelt savtakkede. V-VII. B C K

S. nodosa L. Knoldet brunrod. VI-IX. A B K

S. auriculata L. Øret brunrod. 40-100cm. Mest glat. Stænglen smalvinget. Bladstilken med 1 (sj. flere) par lapper. VI-IX. BCK

S. umbrosa Dum. Vandbrunrod. VI-IX. K (Alburno)

S. lucida L. Skinnende brunrod. 20-50cm. Mest toårig. Stængelbladene mindre opad. Kvastene med 3-15 blomster. Blomsterstilkene kortere end det 2-4mm lange bæger. Kronen brunlig. IV-VII. A

Scrophularia canina L. Fliget brunrod. 15-80cm. Flerstænglet. Nedre blade modsatte, 1-2 x fligede, øvre ofte spredte. Blomsterstilkens kirtler m.m. siddende. Brunlilla krone. IV-IX. A B C K

S. juratensis Schleicher (S. canina ssp. hoppii) Gulstrubet brunrod. 30-60cm. Nær canina, men tættere kirteldunet, blomsterstilkene indebefattede. Kronen med gult svælg. 800-2000m. B K

Antirrhinum siculum Miller Hørbladet løvemund. 20-50cm. Kronen lysegul, 18-25mm. Bladene ca. 10 x så lange som brede. Planten glat med kirteldunet klase. I-XII. C K (Capri)

A. majus L. Haveløvemund. 50-100cm. Kronen rød, 33-45mm. Bladene ca. 4-6 x så lange som brede. Planten glat med kirteldunet klase. V-IX. Dyrket og forvildet i A B C K

A. tortuosum Boso Vreden løvemund. 40-80cm. Kronen rød, 33-48mm. Bladene ca. 10 x så lange som brede. Planten helt glat. III-VI.ACK

Misopates orontium (L.) Raf. Agerløvemund. 20-50cm. Bægeret 10-17 mm, længere end den lyserøde krone på 10-15mm. V-IX. A B C K

M. calycinum Rothm. Hvid agerløvemund. 30-80cm. Bægeret 15-20mm, kortere end den 18-22(27)mm lange krone, der er hvid og ofte rødstribet. V-IX. A B C K

Chaenorhinum minus (L.) Lange Liden torskemund. IV-X. A B C K

Linaria. Torskemund

1. Stænglen liggende. Glat ..... reflexa
   " opstigende til opret 2.
2. Klasen kirteldunet ..... 3.
   " glat 7.
3. Kronen bleglilla ..... 4.
   " gul 5.
4. Sporen stærkt krummet, 1½-3mm ..... arvensis
   " ret eller svagt krum, højst 1mm micrantha
5. Kronen 6-8mm. Enårig ..... simplex
   " 10-30mm. Flerårig 6.
6. Golde skuds blade i kranse på 6. Kronen 10-16mm heterophylla
   Bladene spredte. Kronen 25-33mm vulgaris
7. Kronen lilla ..... 8.
   " hvid eller gul 9.
8. Enårig. Sporen m.m. ret ..... pelisseriana
   Flerårig. Sporen krum purpurea
9. Kronen mest hvid ..... 10.
   " gul 11.
10. Kronen med orange pukkel og lilla spore ..... triphylla
    " helt hvid chalepensis
11. Bladene æg- til lancetformede, 2-4 x så lange som brede dalmatica
    Bladene linjeformede, 35-50x1-1½mm vulgaris

Linaria reflexa (L.) Desf. Krumstilket torskemund. 8-15cm. Bladene m.m. elliptiske, mest spredte. Bladede klaser med blomster på 20-30mm. Frugtstilkene buekrummede. I-IV. A C

L. triphylla (L.) Miller Trebladet torskemund. 30-50cm. Bladene blågrønne, elliptiske, 3-5-årede, mest i kranse på 3. Blomsterne næsten siddende, 20-30mm; sporen 8-9mm. II-IV. A C

L. dalmatica (L.) Miller Musetornstorskemund. 30-100cm. Bladene tilspidset ægformede, stive. Kronen 27-37mm. VI-VII. A B C

L. heterophylla Desf. Forskelligbladet torskemund. 30-70cm. Stængelbladene linjeformede, 20-30x1mm, mest spredte; 4-7x1mm på de golde skud. Klasen tæt. I-XII. C (Reggio)

L. chalepensis (L.) Miller Hvid torskemund. 15-40cm. Bladene 18-35x1-2mm. Klaserne løse. Kronen 12-16mm med en krum spore på

8-11mm. Blomsterstilkene 1-2mm, i frugt -4mm. IV-V. A B C K

Linaria purpurea (L.) Miller Purpurtorskemund. 20-60cm. Blådugget. Bladene i krans forneden, spredte foroven, ofte noget ensidige her. Kronen 9-12mm, sporen 5mm. IV-X. A B C K

L. pelisseriana (L.) Miller Hedetorskemund. 15-50cm. Glat og blågrøn. Bladene linjeformede. Klaserne tætte. Kronen 15-20mm med stærkt forlænget overlæbe og hvidstribet pukkel. III-VI. A B C K

L. vulgaris Miller Alm. torskemund. VI-X. A B C K

L. arvensis (L.) Desf. Agertorskemund. 10-40cm. Opret og blågrøn enårig. Bladene i krans forneden, spredte foroven. Kronen 4-6mm. Frøene 1-1,5mm. III-VI. A B C K

L. simplex (Willd.) DC. Ugrenet torskemund. 8-30cm. Som arvensis, men kronen 6-8mm, sporen 2-3½mm, frøene 1,5-2,3mm. IV-VI. A B C K

L. micrantha (Cav.) Hoffm.& Lk. Småblomstret torskemund. 5-25cm. Blågrøn enårig. Bladene 15-30x2-10mm, linje- til aflangt-lancetformede. Kronen 2½-5mm. Frøene 1,3-1,8mm. IV-VI. A

Cymbalaria pilosa (Jacq.) Bailey Lådden torskemund. 10-30cm. Kapslen håret. Planten lådden. Bladene med mest 7 butte lapper. Kronen 10-12mm, bleglilla til hvid. Sporen 1mm. IV-VIII. B C K

C. pallida (Ten.) Wettst. Dunet torskemund. 10-20cm. Kapslen glat. Planten oftest dunet til fintdunet. Bladene hele til kort 5-lappede. Kronen 15-25(30)mm, bleglilla. Sporen 6-9mm. VI-VIII. 1500-2500m. K

C. muralis Gaertner & al. Vedbendtorskemund. Kapslen glat. Planten glat til håret. Kronen 8-9mm. Sporen 1½-3mm. III-X. A B C K

Kickxia. Torskemund.

1. Alle blade med afrundet eller hjærteformet grund .... spuria
   Øvre " " spydformet grund 2.
2. Kronen 4-6mm. Bladene lancetformet spydformede .... cirrhosa
   " 9-15mm. " trekantet spydformede 3.
3. Sporen krum ..... commutata
   " ret elatine

Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch Pilbladet torskemund. Bladene m.m. glatte, minder noget om Rødknæs. Kronen hvid, lillaanløben og -stribet. V-VI. K (Ischia)

K. commutata (Bernh.) Fritsch Skovlbladet torskemund. Flerårig. Bladene lådne, de nedre bredt ægformede. Kronen 11-15mm, hvidlig med blålig overlæbe, gul underlæbe. IV-VII. A B C K

K. elatine (L.) Dumort Spydbladet torskemund. Enårig. Kronen gullig eller blålig med lilla overlæbe. V-X. A B C K. 2 ssp.:
ssp. elatine: Mellemste blade spydformede og spidse, øvre spidse og savtakkede. Kronen 7-10mm. Stilken 3-6 x bægeret.
ssp. crinita (Mab.) Greuter: Mellemste blade m.m. ægformede, svagt spydformede, butte; øvre spydformede og butte. Kronen 10-15 mm. Blomsterstilken 2½-3 x bægeret.

K. spuria (L.) Dum. Rundbladet torskemund. Kronen 10-15mm, gul med mørklilla overlæbe og krum spore. VI-IX. A B C K

Digitalis micrantha Roth Småblomstret fingerbøl. 50-90cm. Klasen ensidig, ret tæt. Kronen hvidgul, rørformet, 9-11x2-3mm. 300-1800m. V-VII. A B C K

D. ferruginea L. Rustfingerbøl. 30-120cm. Stænglen glat. Kronen 15-35mm, gul- til rødbrun med mørkere årer. Underlæbens midterflig forlænget. 500-1700m. V-VII. A B C K

Veronica. Ærenpris.

1. Blomsterne spredte i bladhjønerne. Liggende planter ..... 2.
   " i klaser 7.
2. Bladene sav- til rundtakkede ..... 3.
   " 3-9-lappede 4.
3. Kapseludrandingen stumpvinklet. Kronen 8-12mm bred persica
   " spidsvinklet. " 4-8mm " polita
4. Kronen hvid. Bægertænderne butte og ægformede ..... 5.
   " blå til lilla. Bægertænderne trekantede og spidse 6.
5. Griflen 1-2mm. Bladet håret på begge sider ..... cymbalaria
   " ca. ½mm. Bladundersiden glat panormitana
6. Kronen blegblå. Frugtstilken 9-15(7-20)mm ..... hederifolia
   " blå. Frugtstilken 2-7(9)mm triloba
7. Blomsterne i sidestillede klaser ..... 8.
   " " endestillede " 18.
8. Planten m.m. glat. På fugtig bund ..... 9.
   " håret. På tørrere bund 12.
9. Alle blade stilkede. Stænglerne rodslående nederst beccabunga
   Øvre " siddende. " oprette 10.
10. Enårig med elliptisk kapsel ..... anagalloides
    Flerårig. Kapslen ægformet til rund 11.
11. Klaserne modsatte. Bladene m.m. lancetf. anagallis-aquatica
    " ofte spredte. Bladene m.m. linjeformede scutellata
12. Klaserne med 2-7(9) blomster ..... 13.
    " " over 9 " 14.
13. Korte skud med bladene samlede i en slags roset ... aphylla
    Lange " " jævnt fordelte blade montana
14. Frugtstilken mindst 2 x støttebladet ..... urticifolia
    " højst 2 x " 15.
15. Planten udstående håret. Stænglen tveskægget ... chamaedrys
    " m.m. tiltrykt håret. Stænglen ikke tveskægget 16.
16. Bladene tydeligt stilkede. 4 bægertænder ..... officinalis
    " m.m. siddende. Ofte 5 uens bægertænder 17.
17. Stænglerne liggende til opstigende. Bladene 1-2cm orsiniana
    " oprette. Bladene 2-5cm austriaca
18. Flerårig ..... 19.
    Enårig 20.
19. Ret glat. Klaserne med 7-40 blomster ..... serpyllifolia
    Dunet. Klaserne med 2-6 blomster aphylla
20. Planten m.m. glat. Blomsterne hvidlige ..... peregrina
    " håret. Blomsterne blå 21.
21. Frugtstilken højst ½ x bægeret ..... arvensis
    " mindst = bægeret 22.
22. Frugtstilken 2-3 x bægeret ..... acinifolia
    " ca. 1 x bægeret praecox

Veronica serpyllifolia L. Glat ærenpris. V-X. A B C K. 2ssp?:
ssp. serpyllifolia: Klasen med 25-40(15-60) hvide til blegblå blomster.
ssp. humifusa (Dickson) Syme: Klasen med 8-15(25) lyseblå til klart lillablå blomster. I bjærgene.

V. acinifolia L. Stilkærenpris. 3-10cm. Bladene ægformede, ikke eller svagt tandede. Planten m.m. kirteldunet overalt. Kronen blå, 2-3mm bred. III-V. A B C K

V. praecox All. Tidlig ærenpris. 5-20cm. Kirteldunet. Frugtstilkene 2½-8mm, bueformet opstigende. Kapslen bredt elliptisk. Griflen længere end indbugtningen. III-VI. A B C K

V. arvensis L. Markærenpris. II-VI. A B C K

V. polita Fries Blank ærenpris. III-X. A B C K

V. persica Poiret Storkronet ærenpris. I-XII. A B C K

V. triloba (Opiz) Wiesbaur Trelappet ærenpris. 5-20cm. Bladene kødede, trelappede, mørkegrønne. Bægerbladene dunede udvendigt,

omslutter kapslen i frugt. III-V. A (S. Severo)

Veronica hederifolia L. Vedbensærenpris. I-V. A B C K

V. panormitana Tineo Kortgriflet ærenpris. 5-30cm. Bladene m.m. runde med 7(9) oftest spidse lapper, fint randhårede. Blomsterstilken glat. Kapslen med ingen eller meget få hår. C (Paola)

V. cymbalaria Bodard Hvid ærenpris. 5-40cm. Bladene runde med 5-9 lapper, ofte rødligt anløbne nedenunder. Kapslen og bægeret med alm. hår. Kronen 6-12mm bred. I-V. A B C K

V. peregrina L. Vandreærenpris. 5-20cm. Opret. Bladene 3-5 x så lange som brede, helrandede til tandede. Kronen 2-3mm bred. ABCK

V. austriaca L. (V. austriaca ssp. dentata i Fl.Eur.) Savtakket ærenpris. 15-40cm. De nedre blade ofte rund-savtakkede, de øvre ofte m.m. helrandede. Klaserne ret lange. V. B C

V. orsiniana Ten. (V. austriaca ssp. vahlii) 15-30cm. Bladene rundtakkede til indskåret-savtakkede. Klaserne korte. V-VII. B K

V. chamaedrys L. Tveskægget ærenpris. IV-VI. A B C K

V. montana L. Bjærgærenpris. V-VI. A B C K

V. scutellata L. Smalbladet ærenpris. VI-IX. B C

V. urticifolia Jacq. Nældeærenpris. 30-60cm. Opret. Bladene trekantet-ægformede, skarpt savtakkede, 4-8x2-4cm. Kapslen 2 x bægeret. Griflen ca. 5mm. V-VII. K (M. di Calvanico i Salernit.)

V. officinalis L. Lægeærenpris. V-VII. A B C K

V. aphylla L. Sneærenpris. 3-8cm. Klaserne med 2-5 6-8mm brede, blålilla blomster. Bladene dunede, ofte bredt ægformede, samlede i slags roset. 1500-2800m. VII-VIII. B (Pollino) K

V. anagallis-aquatica L. Lancetbladet ærenpris. VI-X. A B C K

V. anagalloides Guss. Dyndærenpris. 10-40cm. Ligner foregående, men stænglerne svampede (hule hos a.q.), ofte rødligt anløbne. Bladene smalt lancetformede. VI-X. A B K

V. beccabunga L. Tykbladet ærenpris. IV-IX. A B C K

Melampyrum arvense L. Agerkohvede. Akset tæt og alsidigt. Støttebladene oftest rødlilla. Bægeret ensartet korthåret, tænderne 1½-2 x røret. Kronens svælg åbent. V-VIII. A B K

M. variegatum Huter & al. Rødlæbet kohvede. Akset alsidigt. Bægeret kun håret på ribberne, tænderne ca. = røret. Kronens svælg lukket. Kronens læber lyserøde. 600-1100m. VI-VII. A (Vico Gargano) C (Dirupata di Morano ved Pollino)

M. italicum Soó Italiensk kohvede. 20-50cm. Klasen m.m. ensidig og åben. Støttebladene lilla. V-VIII. C (M.Montea) K (Avell.)

Euphrasia stricta D.Wolff Spids øjentrøst. U- eler kortkirtlet. Nederste blomst ved (3)7-14. bladfæste. V-X. A B C K

E. hirtella Jordan Lådden øjentrøst. 5-20cm. Blade og støtteblade tæt hårede og kirtelhårede. Nederste blomst ved 2-6.(7.) bladfæste. 1500-2200m. VII-IX. C (Sila)

Odontites lutea (L.) Clairv. Dunet guldtop. 20-50cm. Opret enårig. Bladene 5-25x1-2mm, m.m. helrandede. Blomsterne gule, 5-8mm. VIII-X. A B C K

O. verna (Bell.) Dum. Rødtop. V-X. A B C K

Parentucellia viscosa (L.) Caruel Engguldtop. 10-50cm. Kirteldunet enårig. Bladene som Skjallers, kronen 15-25mm, gul og rødtopagtig. Klasen alsidig. III-V. A B C K

Parentucellia latifolia (L.) Caruel Stenrødtop. 3-25cm. Minder mest om en Rødtop, men klasen alsidig og bladene omvendt ægformede med 2-4 par ret dybe tænder. Kronen 9-11mm, rød. III-VI. ABCK

Bellardia trixago (L.) All. Rosenmund. 5-50cm. Kirteldunet enårig. Vækst og blade som Skjaller. Kronen 20-25mm, hvid med lyst rødlilla overlæbe. IV-V. A B C K

Pedicularis. Troldurt.

1. Kronen rød ..... 2.
   " gul 3.
2. Bægeret uldhåret, tænderne helrandede ..... petiolaris
   " svagt dunet, tænderne tandede elegans
3. Kronens overlæbe med but spids, uden næb ..... hoermanniana
   " " " tvetandet spids eller med et næb 4.
4. Kronens overlæbe udtrukket i et langt næb ..... tuberosa
   " " med tvetandet spids comosa

Pedicularis hoermanniana K.Maly Slovensk troldurt. 30-90cm. Grundbladene 15-30x5-10cm, 3 x delte. Stængel og blade glatte. Kronen indtil 25mm. 1000-1800m. VI-VIII. K

P. tuberosa L. Knoldtroldurt. 10-25cm. Stænglen med 2 hårstriber og m.m. lådden forneden. Bægeret dunettil låddent, tænderne rundtakkede. Kronen 16-20mm. VI-VIII. C (Avellino)

P. elegans Ten. Fjertroldurt. 2-12cm. Stænglerne liggende. 0-2 stængelblade. Bladene ret glatte. Få blomster på 20-22mm i et hovedformet aks. 1400-2400m. V-VI. 2 underarter:
ssp. elegans: Bægerrøret kun håret på kanterne. C (Pollino, M. Montea) K (M.Lattari, M.Picentini, Alburno, M.Cervati)
ssp. praetutiana (Levier) Pign.: Bægerrøret kruset uldhåret. K (Matese)

P. comosa L. Dusktroldurt. 20-50cm. Bægeret hindeagtigt, mørkåret, med stivhårede kanter; tænderne 1-1½mm, bredere end lange. Kronen 22-25mm. VI-VII. B C K

P. petiolaris Ten. Langstilket troldurt. 7-25cm. Bladene glatte med lådden stilk. Akset hviduldent. Kronens overlæbe ender i et kort og bredt, tospidset næb. VI-VII. C (Pollino) K (M.Lattari)

Rhinanthus. Skjaller.

1. Bægeret glat eller fåhåret. Overlæbens tænder ca. ½mm .... 2.
   " tæthåret 3.
2. Kronens svælg m.m. lukket ..... personatus
   " " m.m. åbent minor
3. Bægre og støtteblade tæt kirtelhårede ..... wettsteinii
   " " " uldhårede alectorolophus

Rhinanthus minor L. Liden skjaller. V-IX. B C K

R. personatus (Behrendsen) Béguinot Maskeskjaller. 800-1800m. VI-VII. K (Avell.)

R. wettsteinii (Sterneck) Soó Italiensk skjaller. 10-20cm. 1300-2400m. VII-VIII. K (Montevergine ved Avellino, Alburno) B (Muro, Pignola, Vulture)

R. alectorolophus (Scop.) Pollich Håret skjaller. Overlæbens tænder 1,3-2,5mm. V-IX. A B K

Rhynchocorys elephas (L.) Griseb. Elefanthovede. 40-60cm. Flerårig med buttandede, elliptiske blade og akselstillede, gule, elefanthovedlignende blomster, hvis overlæbe er udtrukket i et langt buet næb, og hvis underlæbe har 3 store lapper. Bække og væld, fugtig skov. V-VII. B (Balvano), C (Sila, Aspromonte) K (Matese)

Lathraea squamaria L. Skælrod. III-V. B C K

Lathraea clandestina L. Lav skælrod. 5-8cm. Grenet underjordisk stængel. De enkelte blomsterstande med 4-8 lyslilla blomster på 4-5cm i jordhøjde. På Pil, Poppel og Æl. IV-VI. C (Nardello, Aspromonte) K (Avellinese, M. Cervialto)

OROBANCHACEAE

Orobanche. Gyvelkvæler.

1. Kronens grundfarve lilla eller blå ..... 2.
   " " ikke blå eller lilla 7.
2. Hver blomst med 1 støtteblad, 2 forblade og 2 bægerflige 3.
   " " " " " og 2 bægerflige 6.
3. Støvknapperne glatte ..... 4.
   " hårede eller dunede 5.
4. Stænglen 4-7mm tyk forneden. Kronen 18-25(30)mm ... purpurea
   " 1½-3mm " " . " 9-20mm ramosa
5. Vinklen mellem over- og underlæbe ca. 180° .... lavandulacea
   " " " " " ca. 90° schultzii
6. Kronen opsvulmet nederst og indsnævret midtpå ..... cernua
   " jævnt udvidet opadtil amethystea
7. Kronen skinnende mørkerød (eller sortagtig) indvendigt ... 8.
   " ikke sådan 10.
8. Støvfanget rødlillat ..... sanguinea
   " gult 9.
9. Underlæbens midterlap 2 x sidelapperne ..... variegata
   " " ca. = sidelapperne gracilis
10. Underlæben kirtelrandhåret ..... 11.
    " ikke kirtelrandhåret 16.
11. Støvfanget lillat ..... 12.
    " gult 14.
12. Kronen med mørke kirtelhår ..... alba
    " " lyse " 13.
13. Kronen kirtelhåret ..... caryophyllacea
    " lådden pubescens
14. Kronen næsten ret indtil overlæben og så fremadbøjet lutea
    " jævnt krummet langs ryggen 15.
15. Overlæbens flige opadbøjede ..... rapum-genistae
    " " fremadrettede lucorum
16. Kronens overlæbe med mørke kirtelhår ..... reticulata
    " " " lyse " 17.
17. Kronen næsten ret indtil overlæben og så fremadbøjet lutea
    " anderledes bøjet 18.
18. Kronen langt uldhåret ..... pubescens
    " ikke " 19.
19. Kronen lidt opsvulmet ved grunden, tilsmalnet fortil hederae
    " ikke særligt tilsmalnet fortil 20.
20. Overlæben med fremadrettede flige ..... 21.
    " " m.m. opadbøjede flige 22.
21. Kronen gul, rødligt anløben, ca. 4 x så lang som bred canescens
    Kronen bleggul, ca. 2 x så lang som bred minor
22. Kronen 20-30mm, med bredt udstående kronflige ..... crenata
    " 14-25mm, med smalt tilbagebøjede kronflige 23.
23. Kronens største knæk nær grunden ..... amethystea
    " " " " spidsen loricata

Orobanche ramosa L. Grenet gyvelkvæler. 15-25(40)cm. A B C K
ssp. ramosa: Bægeret 4-5mm med trekantede tænder ca. 2 x så lange som brede. Stænglen ofte grenet. Kronen 9-14mm.
ssp. nana (Reuter) Cout.: Bægeret 4-7mm, tænderne med trådformet vedhæng. Stænglen mest ugrenet. Kronen 10-15mm.
ssp. mutelii (F.W.Schulz) Cout.: Bægeret 6-9mm, tænderne med trådformet vedhæng. Stænglen mest grenet. Kronen (14)16-20mm.

O. schultzii Mutel Rank gyvelkvæler. III-VI. A (Otranto)

Orobanche lavandulacea Rchb. Lavendelblå gyvelkvæler. 15-30cm. Blomsterne blå, 16-22mm, m.m. vandret udstående. IV-V. B K

O. purpurea Jacq. Røllikegyvelkvæler. 20-50cm. Kronen mørkåret mod spidsen, 18-24mm. På Røllike og andre Compositae. A B C K

O. cernua Loefl. Krumkronet gyvelkvæler. 20-40cm. Kronen opblæst og hvidligt hindeagtig forneden, krum og svagt dunet. Mest på Bynke og Helianthus. IV-VI. B (Muro)

O. crenata Forsskål Bønnegyvelkvæler. 20-40cm. Kronen m.m. glat, hvid og lillaåret. Underlæbens midterflig ca. 2 x de ydre. På dyrkede Ærteblomster. IV-VII. A B C K

O. alba Stephan Timiangyvelkvæler. Kronen gullig og lillaåret eller mere rødlig i det. Bægerfligene ofte udelte. På Læbeblomstrede. IV-VII. A B C K

O. reticulata Wallr. Tidselgyvelkvæler. 30-80cm. Nær foregående, men kronen mørkere, rødlilla på ryggen og spidsen. Mest på Tidsler. V-VII. B

O. amethystea Thuill. Ametystgyvelkvæler. 20-40cm. Kronen 16-20 (25)mm, tæt dunet, hvid mod grunden og lilla mod spidsen. Overlæben dybt tvelappet. IV-VII. B

O. canescens Presl Kødfarvet gyvelkvæler. 15-30cm. På Mandstro og Kurvblomster. IV-VI. A B C K

O. loricata Rchb. Bittermælkgyvelkvæler. 10-40cm. Kronen 15-20mm, gullighvid med lillaåret overlæbe. Støvtrådene udgår 3-5mm fra grunden, hårede forneden, glatte foroven. IV-VII. K

O. minor Sm. Kløvergyvelkvæler. 10-15cm. Kronen 10-15mm, gullig med lillat skær mod spidsen. Mest på Kløver. III-VII. A B C K

O. pubescens D'Urv. Lådden gyvelkvæler. 10-50cm. Stænglen oftest tæt lådden. Kronen 13-18mm, bleggul, lillaanløben foroven. Støvfanget rødlillat eller orangerødt. IV-V. B K

O. hederae Duby Vedbendgyvelkvæler. 15-60cm. Kronen 13-16mm, lidt flaskeformet, m.m. glat, gulligbrun og lillaanløben. På Vedbend. IV-VI. A B C K

O. caryophyllacea Sm. Snerregyvelkvæler. 20-50cm. Kronen 20-32mm med nellikeduft, mest gulligt til rødligt brun. På Rubiaceae.ABCK

O. lutea Baumg. Gulbrun gyvelkvæler. 15-40cm. Kronen 20-22mm, gulligt til rødligt brun. Støvfanget gult. Med liljekovalduft. På Ærteblomster. V-VII. B C K

O. lucorum A.Braun Berberisgyvelkvæler. 15-50cm. Kronen 15-20mm, gul og kirteldunet. Støttebladene sylformede og forlængede, 15-20 mm, danner en top over knopperne. På Berberis. VI-VIII. B

O. rapum-genistae Thuill. Høj gyvelkvæler. 30-60cm. Kronen 20-23 mm, bleggul til rødlig. Overlæben næsten hel og fremadrettet. På Ærteblomster. IV-VII. B K

O. gracilis Sm. Vissegyvelkvæler. 20-50cm. Kronen 16-18mm, gullig med røde årer og rand. Overlæben 2-lappet og fremadrettet. Mest på Ærteblomster, sj. på Cistus. IV-VII. A B C K

O. variegata Wallr. Stinkende gyvelkvæler. 20-40cm. Kronen 15-18 mm, næsten sortagtig indvendigt, mørkt rødbrun udvendigt. På Ærteblomstbuske. IV-VII. B C K

O. sanguinea Presl Blodrød gyvelkvæler. 25-40cm. Kronen 12-17mm, m.m. glat, mørkerød eller udvendigt med gul grund. På Ærteblomster. IV-VI. B (Muro) K (Is.Napoletane)

ACANTHACEAE

Acanthus mollis L. Blød bjørnetidsel. 25-100cm. Staude med 20-60cm lange lappet-fligede grundblade. 4-5cm store, hvide, rødårede maskeblomster uden overlæbe i et tæt, 30x3cm langt aks med 4cm store, ægformede støtteblade. III-VI. A B C K

A. spinosus L. Tornet bjørnetidsel. 40-100cm. Som foregående, men bladene tidselagtigt tornede. V-VI. A K

GLOBULARIACEAE

Globularia. Kugleblomst. Ret lave, flerårige planter med stedsegrønne, spatelformede blade i rosetter. Små, lyseblå blomster i 1-2cm brede hoveder med svøbblade under sig.

G. punctata Lapeyr. Alm. kugleblomst. 10-20cm. Stænglerne mangebladede. Grundbladene afrundede fortil og med punktformede kalkkirtler (lup). III-V. A C K

G. meridionalis (Podp.) O.Schwarz 5-15cm. Stænglerne bladløse eller med 1-2 småskæl. Grundbladene 16-35x3-6mm, mest spidse. Bægertænderne ca. = bægerrøret. V-VII. B C K

G. neapolitana O.Schwarz Udrandet kugleblomst. 3-10cm. Stænglerne bladløse eller med 1-2 småskæl. Grundbladene udrandede eller afrundede. Bægertænderne ca. 2 x røret. 400-1400m. V-VI. K (Napolitane på M.S.Angelo over Castellammare, Capri)

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula hirtiflora Ten. Rød vibefedt. 5-11cm. Kronen bredt klokkeformet, 14-26mm, blegrød eller lyslilla med gult svælg og spore. Underlæbens lapper udrandede. 300-1300m. IV-V. C (Rossano) K (bjærgene over Amalfi)

Utricularia minor L. Liden blærerod. VI-VIII. K

U. vulgaris L. Alm. blærerod. VI-VIII. K

RUBIACEAE

1. Planten med modsatte blade og små fodflige ..... Putoria
   Fodfligene = bladene, der derfor virker kransstillede 2.
2. Blomsterne siddende i tætte aks ..... Crucianella
   " ikke i aks, mest i grenede stande 3.
3. Frugten omgiven af blade eller en tornet udvækst fra frugtstilken. Enårige ..... 4.
   Frugten fri og synlig 5.
4. Kronen lyseblå. Blomsterne i endestillede hoveder Sherardia
   " hvidgul. " akselstillede Valantia
5. Frugten et bær. Kronen 5-fliget ..... Rubia
   " tør. Kronen 4-fliget 6.
6. Kronfligene kortere end kronrøret ..... Asperula m.m.
   " længere " " 7.
7. Kransene med 4 blade. Gule blomster i korte kvaste Cruciata
   Anderledes Galium m.m.

Putoria calabrica (L.f.) DC. Stinkkælderhals. 50-80cm. Stærktgrenet dværgbusk. Bladene 1-2cm x 3mm, akselbladene 1mm. Lyserøde blomster i små, endestillede kvaste med 10-12mm lange, smalle kronrør og ombøjede kronflige. VI-IX. B C

Sherardia arvensis L. Blåstjærne. III-VII. A B C K

Crucianella. Korsaks. Små, gullige, langrørede kroner, der rager lidt frem mellem aksenes tæt taglagte støtteblade.

C. maritima L. Strandkorsaks. 10-50cm. Liggende, forveddet flerårig. Kransene med 4 æg-lancetformede, hvidkantede, let tornspidsede blade. Aksene 3-5x1cm. Kronerne 10-14mm. VI-VII. A C K

C. angustifolia L. Smalbladet korsaks. 25-50cm. Enårig. Bladene 6-8 sammen, 5-15x½-1mm. Kronen 3-5mm, ikke længere end støtteblad det, dette frit. Akset 3-6cm x 4-6mm. V-VII. A B C K

Crucianella latifolia L. Bredbladet korsaks. 20-30cm. Bladene 4-6 sammen, 10-25x1-4mm. Kronen 5-7½mm, lidt længere end støttebladene, der er m.m. forbundne nederst af deres hindekant. Aksene 6-16cm x 2-3mm. IV-VI. A B C K

Asperula. Mysike.

1. Kransene med 6-9 blade ..... 2.
   " " 2-4 " 4.
2. Næsten intet kronrør; hjulformet krone ..... purpurea
   Med langt kronrør 3.
3. Flerårig med hvide blomster ..... Galium odoratum
   Enårig med blå blomster arvensis
4. Bladene elliptiske til ægformede, 3½-25mm brede ..... 5.
   " linjeformede, ½-3½mm brede 6.
5. Bladene 3-6cm. Blomsterne 10-14mm, siddende ..... taurina
   " 1-2½cm. " 1,3-2mm, stilkede laevigata
6. Kronrøret 1-1½ x kronfligene ..... cynanchica
   " 2-5 x " 7.
7. Stængler og blade grønne eller grågrønne ..... aristata
   " " " blågrønne 8.
8. Bladene modsatte, kun de allernederste 4 sammen ..... 9.
   " 4 sammen, ihvertfald i stænglens nedre del 10.
9. Bladene 1½-3½mm brede, delkvastene hovedformede ... staliana
   " ½mm brede, delkvastene aksformede garganica
10. Kronen under 7mm, gullig. Bladene 15-40mm ..... crassifolia
    " over 7mm, lyserød. " 7-13mm calabra

Asperula aristata L.f. ssp. scabra (Presl) Nyman Brodmysike. 10-60cm. Bladene 15-25mm. Kvasten åben. Kronen grønliglilla, bleglilla eller gullig, 5½-8mm. V-VII. B C K

A. crassifolia L. Brun mysike. 15-45cm. Bladene 15-30x1½-2mm, småtykke, m.m. butte, omrullede. Kronen 4,7-6,3mm, tæt udstående håret. Kalkklipper. 0-5m. K (Capri, Li Galli-øerne)

A. calabra (Fiori) Ehrend.& Krendl Sort mysike. 10-25cm. Ikke så blågrøn. Bladene 1-2mm brede, ofte sorte som tørre, lidet omrullede. Kronen 7-12mm, mest glat. 1500-2200m. B C K (M.Terminio, Cervati, M.Sacro, Pollino, Cozzo del Pellegrino, Montea, M.Mula)

A. staliana Vis. Tykbladet mysike. 10-35cm. Ofte håret ved grunden. Bladene 10-30mm, småtykke, spidse. Kronen 3-8mm, lyserød. Kalkklipper. 0-150m. A (Is. Tremiti). V-VI.

A. garganica Huter & al. Tuemysike. 10-25cm. Glat. Bladene 5-15 mm, tynde. Kronen ca. 6mm, lyst rødlilla. 300-800m. V-VI. A (Gargano - kalkklipper)

A. cynanchica L. Bakkemysike. 10-20(50)cm. Bladene 12-35x0,8-1½ mm. Blomsterne i halvskærm, 2½-3½mm, lyserøde til hvide. A B C K

A. taurina L. Treribbet mysike. 20-40cm. Stængler og blade m.m. udstående hårede. Bladene 3-6x1-2½cm. Blomsterne omgivne af svøbblade. Kronen hvidlig eller bleggul. IV-VI. A B C K

A. laevigata L. Skovmysike. 30-70cm. Bladene 9-25x4-10mm, tydeligt netårede og lysere nedenunder. Kronen hvid. Kvastene ende- og sidestillede. VI-VII. A B C K

A. arvensis L. Blåmærke. 10-55cm. Bladene mest i kranse på 6, 10-25x½-4mm. Delblomsterstandene hovedformede, omgivne af langt randhårede, bladlignende støtteblade. Kronen 4-6mm. IV-VI. ABCK

A. purpurea (L.) Ehrend. Purpurmysike. 20-50cm. Bladene 7-10 (6-11) sammen, 10-20x½-1mm, med omrullet rand. Planten snerreagtig med talrige, brunlilla, 1-1½mm brede blomster. VI-X. K

Galium. Snerre.

1. Enårig ..... 2.
   Flerårig 9.
2. Bladranden med tilbagerettede småtorne ..... 3.
   " " fremadrettede " 5.
3. Frugstilken nedbøjet. Bladoversiden glat ..... tricornutum
   " skråt opret. Bladoversiden dunet 4.
4. Kronen grøngul, 0,8-1,3mm bred. Frugten 2-3mm ..... spurium
   " hvid, 1,5-1,7mm bred. Frugten 3-5mm aparine
5. Frugten 4-6mm, vortet. Bladene 2-5mm brede ..... verrucosum
   " under 2mm. Bladene smallere 6.
6. Kvastene kortere end bladene ..... 7.
   " længere " " 8.
7. 3-7 blomster i kvastene ..... verticillatum
   1-2 " " " murale
8. Kvaststilkene 1-3 x de ret kraftige blomsterstilke parisiense
   " 3-7 x de trådfine blomsterstilke divaricatum
9. Bladene 3-ribbede, i kranse på 4 ..... 10.
   " 1-ribbede 11.
10. Stænglen 30-50cm høj, tæt udstående håret ..... scabrum
    " 10-20cm " , Glat (sj. fåhåret) rotundifolium
11. Frugterne kugleformede. Bladene m.m. butte ..... 12.
    " ægformede. Bladene spidse 13.
12. Bladene linjeformede, 0,8-2mm brede. Frugtstilken
    ikke udspærret ..... debile
    Bladene 3-6mm brede. Frugtstilken udspærret elongatum
13. Kronen skål- eller tragtformet, hvid ..... 14.
    " hjulformet 17.
14. 2-8cm. Bladene 2½-5x½mm, 5-6 sammen ..... palaeoitalicum
    15-110cm. Bladene 2-7½cm 15.
15. Frugtknude og frugt med krogbørster ..... odoratum
    " " " glatte 16.
16. Kronen skålformet med m.m. brodspidsede flige .. laevigatum
    " tragtformet, fligene ikke brodspidsede glaucum
17. Planten 5-15(25)cm. Stængelgrunden trådformet ..... 18.
    " 20-150cm. Stængelgrunden over 1mm tyk 19.
18. Bladene med tydelig midterribbe, rurandede ... anisophyllon
    " " utydelig " , jævne magellense
19. Stænglen m.m. trind, ihvertfald fornden. Gul krone .. verum
    " firkantet hele vejen 20.
20. Bladene 5-11x½-1mm, med omrullet, ru rand ... corrudifolium
    " 10-40mm 21.
21. Blomsterne mest brunlilla. Bladene ½-1mm brede,
    tydeligt omrullede ..... Asperula purpurea
    Blomsterne ikke brunlilla. Bladene 1-5mm brede 22.
22. Blomsterne rødlige ..... bernardii
    " ikke rødlige, mest hvide 23.
23. Bladene 3-8 x så lange som brede, 1½-5mm brede ..... album
    " 8-30 x " " " " , 1-2mm " lucidum

Galium scabrum L. Ægbladet snerre. Bladene bredt ægformede, 20-35x10-16mm. Blomsterstanden lang, ægformet og mangeblomstret. Frugt og frugtknude med kroghår. VI-VII. C (Aspromonte)

G. rotundifolium L. Rundbladet snerre. Bladene ægformede til rundagtige, 14-18x6-10mm. Endestillet, ret fåblomstret og åben halvskærm. Frugtknuden med kroghår. V-VII. B C

G. odoratum (L.) Scop. Skovmærke. V-VII. A B C K

G. debile Desv. Spinkel snerre. 20-80cm. Minder om Kærsnerre. Stænglen noget ru eller jævn. Kransene med 4-6 ofte omrullede blade på 8-18x0,8-2mm. V-VII. A B C K

G. elongatum Presl Vandsnerre. V-VIII. A B C K

G. verum L. Gul snerre. VI-X. A B C K

Galium album Miller Hvid snerre. V-IX. A B C K

G. corrudifolium Vill. Raspesnerre. 20-40cm. Stænglen tit finvortet-ru forneden. Bladene læderagtige, med stærkt ru rand, med fremtrædende midterribbe. V-VIII. A B C K

G. lucidum All. Sylsnerre. 30-70cm. Bladene 10-30mm, med klar brodspids. Randen lidt omrullet, ru. Blomsterstanden aflang eller ægformet, tæt. Kronen 3-5mm bred, mest hvid. V-IX. A B C K

G. bernardii G.& G. Rødlig snerre. 30-50cm. Nær foregående. Bladene 10-20x1mm, lidt krumme. Blomsterstanden mere åben. 0-1600m. VII-IX. B K

G. glaucum L. Blågrøn snerre. 40-80cm. Planten blågrøn. Stænglen opret, svagt firkantet. Bladene 8-10(6-11) sammen, 20-40x½-2mm. Kronen 4-6mm bred. V-VII. A B C K

G. laevigatum L. Dugsnerre. 70-110cm. Med ofte korte udløbere. Bladene 4-7½cm x 4-6mm, bredest midtpå, mest friskgrønne, hindeagtige. Kronen 2½-3½mm bred. 600-1400m. VI-VIII. A B C K

G. palaeoitalicum Ehrend. Pudesnerre. Pudeformet og halvkugleformet. Bladene nåleformede, ganske tætstillede, med tydelig brod. 2-6 m.m. siddende blomster sammen, 2mm brede. 800-2200m. V-VI. K (Cervialto) C (Pollino, M.Cozzo del Pellegrino)

G. anisophyllon Vill. Alpesnerre. 7-15(25)cm. Bladene 6-12 x så lange som brede, bredest 1/3-1/5 fra spidsen og her brat tilsmalnede. Stænglerne mest med 1-3 kvaste. VII-VIII. B C (Pollino)

G. magellense Ten. Tætblomstret snerre. 5-9cm. Bladene mest 6-8 x 1-1½mm, skinnende. Blomsterstanden tæt og bredt ægformet; stilkene tykke og m.m. udstående. 1800-2600m. VI-VIII. K

G. spurium L. Hørsnerre. Ligner Burresnerre. Frugten tætbørstet eller glat. III-VI. A B C K

G. aparine L. Burresnerre. I-V. A B C K

G. tricornutum Dandy Vortesnerre. Nær foregående, men frugten uden krogbørster, med små, spidse vorter. IV-VI. A B C K

G. verrucosum Hudson Rynket snerre. Minder om Burresnerre. Frugtstilkene nedbøjede. Frugten groft rynket. I-V. A B C K

G. parisiense L. Marksnerre. 5-40cm. Toppen kegleformet til aflang. Vinklen mellem frugtstilkene 45-90°, disse mest 0,1-0,2mm tykke. IV-VI. A B C K

G. divaricatum Lam. Udspærret snerre. 5-30cm. Toppen bredt omvendt ægformet til kugleformet. Vinklen mellem frugtstilkene 20-45°, disse mest 0,05-0,075mm tykke. IV-VI. A B C K

G. verticillatum Danth. Kranssnerre. 5-20cm. Opret. Bladene 4-8 x 1-2mm. Blomsterne m.m. siddende. Kronen 1-1½mm. V-VI. C

G. murale (L.) All. Mursnerre. 5-20cm. Kransene med 4-6 omvendt lancetformede blade. Frugtstilkene nedbøjede. Delfrugterne adskilte, valseformede, 1,3-1,5mm, ofte uens. III-VI. A B C K

Cruciata laevipes Opiz Alm. korsblad. 15-50cm. Fleårig. Bladene 3-ribbede. Stænglen med 0,7-1,5mm lange, udstående hår. Blomsterstilkene mest hårede og med 2 forblade. IV-VII. A B C K

C. glabra (L.) Ehrend. Glat korsblad. 10-30cm. Flerårig. Bladene 3-ribbede. Stænglen glat eller med 0,2-0,5mm lange hår. Blomsterstilkene glatte og uden forblade. IV-VII. A B C K

C. pedemontana (All.) Ehrend. Enårigt korsblad. 10-35cm. Enårig. Bladene 1-ribbede, 4-10mm. Kvastene uden forblade. IV-VI. A B C

Valantia. Hornsnerre. Små enårige med 4-bladede kranse. Blomsterne i korte, 3-blomstrede kvaste med 2 han- og 1 tvekønnet blomst.

Frugtstilken nedbøjet, udvidet og tornet, omslutter frugten.

Valantia muralis L. Glat hornsnerre. 2-6(15)cm. Bladene ægformede, 2½-6mm. Stængler og blade glatte. Frugtstilken med et rygstillet horn. Stilk og horn med nogle krogbørster. III-VI. ABCK

V. hispida L. Ru hornsnerre. 2-5(10)cm. Stænglen stivhåret. Frugtstilken uden horn, men med mange børster. III-VI. A C K

Rubia. Krap. Grove, flerårige snerrer, noget klatrende med modhager på bladene og ofte også på stænglerne.

R. tinctorum L. Farvekrap. 30-100cm. Bladene 4-6 sammen, løvfældende, 3-ribbede, lysegrønne. Kronen bleggul. Støvknapperne ½mm, 5-6 x så lange som brede. IV-VI. Forvildet i A B C K

R. peregrina L. Vild krap. 30-120cm. Bladene 4-8 sammen, stedsegrønne, 1-ribbede, mørkegrønne og læderagtige. Kronen gulgrøn. Støvknapperne 0,2-0,3mm, højst 2 x så lange som brede.IV-VI.ABCK

PLANTAGINACEAE

Plantago. Vejbred.

1. Bladene modsatte ..... 2.
   " i roset eller spredte 4.
2. Flerårig. Stænglerne forveddede ..... sempervirens
   Enårig. Stænglerne urteagtige 3.
3. Bladene 3½-7cm. Nedre støtteblade med lang stak ... arenaria
   " 1-2½cm. " " uden stak afra
4. Bladene ægformet-elliptiske ..... 5.
   " lancet- til linjeformede 6.
5. Støvdragerne 8-10mm udragende. Lyse støvknapper ..... media
   " 2-4mm " major
6. Bladene fligede eller tandede ..... 7.
   " helrandede 9.
7. Bladet fliget med båndformet midterdel ..... coronopus
   " lancetformet og tandet 8.
8. Bladet bredest foroven, med 3-4 par tænder ..... macrorhiza
   " " midtpå, med 9-12 " " serraria
9. Bladene kødede og trinde ..... crassifolia
   " ikke kødede 10.
10. Bladene stive og linjeformede, 1-2mm brede ..... 11.
    " ikke stive, bredere 12.
11. Bladene i forlængede rosetter, blivende som visne subulata
    " i korte rosetter, affaldende som visne holosteum
12. Akset virker låddent på grund af de lådne støtteblade .. 13.
    " " ikke låddent 14.
13. Nedre støtteblade 3-4mm, lancetformede ..... lagopus
    " " 6-8mm, sylformede bellardii
14. Enårig med spredte blade og glatte støtteblade amplexicaulis
    Flerårig med bladroset 15.
15. Skaftet tydeligt furet hele vejen ..... lanceolata
    " højst stribet 16.
16. Akset forlænget, ofte mellembrudt forneden ..... albicans
    " ægformet eller aflang-ægformet, tæt 17.
17. Hvide støvknapper. Lancetformede støtteblade ..... argentea
    Gulbrune støvknapper. Rundagtige " fucescens

Plantago major L. Glat vejbred. V-IX. A B C K

P. coronopus L. Fliget vejbred. IV-VIII. A B C K. 2 underarter:
ssp. coronopus: Støttebladene 2½-3mm, med en stak 2/3-3/4 x så lang. Skaftet 1-1½mm tykt, 1-2 x bladene.
ssp. commutata (Guss.) Pilger: Støttebladene 2,2-3mm, stakken 1/3. Skaftet 1½-2mm tykt, ofte kortere end bladene.

P. macrorhiza Poiret Spidstakket vejbred. 5-20cm. Flerårig. Bladene 7-9x1cm, kødede og stive, randhårede og hårede. Skaftet gul-

ligt, 1-2 x bladene. Akset valseformet, 2-4cm. V-X. A B C K

Plantago crassifolia Forsskål Tykbladet vejbred. 8-15cm. Flerårig. Bladene 5-20cm. Akset 2-5cm. Ofte ved Sortskæne. V-VI. A B C

P. serraria L. Savbladet vejbred. 10-30cm. Flerårig. Bladene 5-20x½-4cm, regelmæssigt savtakkede. Aksene 6-10cm, valseformede. III-VI. A B C K

P. holosteum Scop. Kølet vejbred. 10-30cm. Roden forveddet, ofte med flere rosetter. Nedre blade korte og nedbøjede, øvre m.m. oprette, 2-15cm. Akset 3-8cm x 3-4mm. V-VI. A B C K

P. subulata L. Sylvejbred. 5-12cm. Grenede, tætbladede stængler med mest 2-4cm lange blade, med trekantet tværsnit. A (Otranto)

P. media L. Dunet vejbred. V-VIII. A B C K

P. fucescens Jordan Sodbrun vejbred. 15-40cm. Bladene 10-30cm x 8-14mm, 5-7-strengede, lådne på begge sider. Akset brunt, 1-2x1cm. 1000-2500m. VI-VII. B K

P. amplexicaulis Cav. Skedevejbred. 10-25cm. Bladene 3-15cm x 3-15mm, m.m. tæt udstående hårede, med stængelomfattende grund. Støttebladene mindst så brede som lange. IV-V. C (Capo Spartivento, Capo dell'Armi)

P. lanceolata L. Lancetvejbred. V-VIII. A B C K

P. argentea Chaix Sølvvejbred. 20-50cm. Bladene 10-30x½-1½cm, m.m. tæt tiltrykt sølvhårede. Skaftet 6-12-stribet. Støvknapperne hvide (gule hos lanceolata). 300-2000m. VI-VIII. B C K

P. lagopus L. Harefodsvejbred. 5-40cm. Mest 1-årig. Bladene lancetformede, 3-7-strengede. Aksene førstrunde til ægformede, senere lidt forlængede. (Kan have spredte blade). IV-VI. A B C K

P. bellardii All. Rævehalevejbred. 3-10cm. Som lagopus, men bladene ofte smallere og aksene lancetformede. III-VI. A B C K

P. albicans L. Hvidbladet vejbred. 10-30cm. Jordstænglen ofte grenet. Bladene smalt lancet- til næsten linjeformede, 5-8mm brede, ofte bølgede, silke-uldhårede. Filtede skafter. IV-V. A B C

P. arenaria W.& K. (P. indica) Grenet vejbred. 10-50cm. Stænglen med bløde, udstående eller opadrettede hår. V-VII. K

P. afra L. (P. psyllium) Loppefrø. 3-15(40)cm. Stænglen ofte stærkt kirteldunet, ihvertfald foroven. I-VI. A B C K

P. sempervirens Cr. Spergelvejbred. 10-30cm. Ofte stærktgrenede, kortdunede stængler. Bladene 1-6cm. Nedre støtteblade ofte med brod. IV-VII. A

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus ebulus L. Sommerhyld. Staude på 80-150cm. Fodflige til stede. Støvknapperne mørklilla. V-VII. A B C K

S. nigra L. Alm. hyld. IV-VI. A B C K

Viburnum lantana L. Pibekvalkved. 1-3m. Kviste og blade brunligt stjærnedunede. Bladene m.m. ægformede, 4-14x3½-9cm, spidse og med let hjærteformet grund, savtakkede, med rynket overside. Ingen forstørrede blomster i halvskærmen. IV-V. K

V. tinus L. Vintersnebolle. 1-3m. Busk med modsatte, helrandede, m.m. ægformede blade med glat og skinnende overside og dunet til glat underside. Ensartede, flødefarvede, 5-9mm brede blomster i en 6-10cm bred halvskærm. X-VI. A B C K

V. opulus L. Kvalkved. V-VI. B (Pignola, M.Arioso) K?

Lonicera. Gedeblad og Vedvindel.

1. Oprette buske ..... 2.
   Slyngplanter 3.
2. Bladene mest 6-8cm, undersiden stærkt skinnende ... alpigena
   " " 3-6cm, " blødhåret xylosteum
3. Blomsterne sidder lige over det øverste bladpar ..... 4.
   " i stilkede hoveder 5.
4. Bladene ægformede til aflange, stedsegrønne ..... implexa
   " elliptiske og løvfældende caprifolium
5. Øvre bladpar indsnævret ved grunden ..... etrusca
   " " udvidet ved grunden stabiana

Lonicera alpigena L. Fjældgedeblad. 1-3m. Bladene spidse til langt tilspidsede. Stilken mest 2½-3½cm. Blomsterparrenes frugtknuder helt sammenvoksede. Rødligbrun krone. V-VI. B C K

L. xylosteum L. Dunet gedeblad. V-VII. A B C K

L. implexa Aiton Stedsegrøn vedvindel. Bladene skinnende mørkegrønne ovenpå, blågrønne nedenunder. Støvdragerne indesluttede i kronen. Flere sammenvoksede bladpar under hovedet. V-VI. A B C K

L. caprifolium L. Havevedvindel. Bladene mørkegrønne ovenpå, blågrønne nedenunder. Støvdragerne rager 5-10mm ud af kronrøret. V-VII. A B C K

L. etrusca Santi Stilket vedvindel. Bladene løvfældende, blå- eller hvidgrønne. Hovedets stilk 1½-2½(6)cm. Støvdragerne 5-10mm udragende. Bærret rødt. V-VI. A B C K

L. stabiana Pasquale Gulfrugtet vedvindel. Nær foregående. Klatrer på klipperne. Støvdragerne rager næppe ud af røret. Bærret gult. 800-1400m.VI-VIII. K (Napol. på M.Lattari fra M.S.Angelo til Capo d'Orso)

ADOXACEAE

Adoxa moschatellina L. Desmerurt. III-V. B C K

VALERIANACEAE

Valerianella. Vårsalat.

1. Alle støtteblade bredt hindekantede, æg- eller hjærteformede, oftest langt randhårede og spidse ..... 2.
   I det mindste de nedre støtteblade m.m. aflange og butte, svagt til ikke hindekantede og højst svagt randhårede 5.
2. Bægeret oppustet og indsnøret foroven ..... vesicaria
   " ikke oppustet eller indsnævret foroven 3.
3. Frugten med en tandet krone af frugtens længde ..... 4.
   " uden eller med en kortere krone pumila
4. Frugtens krone næsten helt delt ..... discoidea
   " " halvt delt coronata
5. Frugten med 1-3 kraftige krogede horn i spidsen ... echinata
   " anderledes 6.
6. Frugten med et 6-tandet bæger ..... eriocarpa
   Bægeret reduceret til en enkelt tand eller manglende 7.
7. Frugten uden tydelig tand. Blomsterne blegblå ..... 8.
   " med " " . " hvide til lyserøde 10.
8. Frugten uden nogen længdefure ..... locusta
   " med en tydelig længdefure 9.
9. Frugten med et aflangt omrids i længderetningen ... carinata
   " " " rundt " " " turgida
10. Bægertanden af frugtens længde, skævt kraveformet muricata
    " kortere end frugten 11.
11. Frugten 2½-3mm ..... 12.
    " 1-1½mm 13.
12. Blomsterne lyserøde. Frugten vindruekærneformet ... dentata
    " hvide. Frugten æg-kugleformet rimosa
13. Støttebladene udstående. Frugterne tæthårede ..... puberula
    " tiltrykte frugterne microcarpa

Valerianella coronata (L.) DC. Kronvårsalat. 10-30cm. Bladene ofte fligede eller groft tandede. Blomsterne lyst rødlilla. Frugten stivhåret med netåret bæger. IV-VI. A B C K

V. discoidea (L.) Loisel. Pindsvinevårsalat. 10-30cm. Nær foregående, men ofte med 3-4 par modsatstillede hovedstilke. Bægerkronen med 6-12 uregelmæssige, mest hagekrummede tænder. V-VI. A C

V. vesicaria (L.) Moench Blærevårsalat. 10-30cm. Som coronata, men blomsterstanden med 2-4 par modsatte grene. Støttebladene meget bredt ægformede. Frugten 3-5mm, netåret. V-VI. A (Leucaspide)

V. pumila (L.) DC. Furet vårsalat. 10-40cm. Blomsterstanden 3-4 x gaffeldelt. Kronen lyserød. Frugten halvkugleformet, but trekantet, oftest uden krone. IV-VI. A B C

V. eriocarpa Desv. Uldfrugtet vårsalat. 10-30cm. Øvre blade med tandet grund. Støttebladene linjeformede, spidse og randhårede, i frugt oprette og overragende frugterne. IV-V. A B C K

V. muricata (Stev.) Baxter Skævkravet vårsalat. 10-30cm. Ligner eriocarpa undtagen på frugtens krave. IV-V. A B C K

V. microcarpa Loisel. Småfrugtet vårsalat. 5-25cm. Frugten mest dunet, med en kort, bred og but bægertand. IV-VI. A C K

V. puberula (Bertol.) DC. Trekantet vårsalat. 5-20cm. Frugtens tværsnit trekantet med et kort, noget tolæbet bægervedhæng med svagt tretandet underlæbe. IV-VI. K (Capri)

V. rimosa Bastard Opblæst vårsalat. 10-40cm. Blomsterstanden flere gange gaffeldelt. Frugten 2½mm, med en kort, ganske svagt tandet spids. IV-VI. B K

V. dentata (L.) Pollich Tandet vårsalat. 10-20cm. Bægeret kort og skævt afskåret med uens tænder. V-VII. A B C K

V. locusta (L.) Laterrade Tandfri vårsalat. IV-V. A B C K

V. carinata Loisel. Kølet vårsalat. 10-30cm. Frugten but firkantet i tværsnit. IV-VI. A B C K

V. turgida (Steven) Betcke Bredfrugtet vårsalat. 10-30cm. Frugten ca. 3mm, 3-furet, med lidt trekantet tværsnit. C (Reggio)

V. echinata (L.) DC. Hornet vårsalat. 5-20cm. Stængelbladene tandede til fligede. Nedre enlige frugter 8-10mm, med 1 horn. Øvre 3-6mm, smalle og 3-hornede. IV-VI. A K

Fedia cornucopiae (L.) Gaertner Læbebaldrian. 10-30cm. Enårig, glat, noget kødet, flere gange gaffelgrenet plante med spatelformede til elliptiske blade. Blomsterne i tætte knipper på kølleformet opsvulmede stilke. Kronen 8-16mm, m.m. tolæbet, stærkt rødlilla, sjældent lyserød. XII-IV. A C K (Capri)

Valeriana. Baldrian.

1. Stængelbladene uligefinnede med 5-mange afsnit ..... 2.
   " udelte eller de øvre 3-delte 3.
2. Grundbladene hele ..... tuberosa
   " fjersnitdelte officinalis
3. Grundbladene med hjærteformet grund ..... tripteris
   " uden " " montana

Valeriana montana L. Bjærgbaldrian. 20-40cm. Øvre blade udelte. Grundbladene mest helrandede. Stænglen dunet foroven og på bladfæsterne. Kronen mest blegrød. V-VIII. B C K

V. tripteris L. Trefliget baldrian. 30-50cm. Øvre blade mest 3-delte. Grundbladene m.m. tandede. Stænglen håret ved bladfæsterne. VI-VIII. C K

V. tuberosa L. Knoldbaldrian. 10-40cm. Roden fortykket. Blomsterne lyserøde, 8mm lange. Frugten 3-4mm. V-VI. A B C K

Valeriana officinalis L. Lægebaldrian. V-VII. A B C K

Centranthus. Sporebaldrian. Kronen mest rød, med en spore eller pukkel nær grunden.

C. ruber (L.) DC. Rød sporebaldrian. 30-70cm. Flerårig. Bladene hele, de større 7-12cm, ægformet trekantede. Kronrøret 6-11mm, sporen 5-10mm. V-VIII. A B C K

C. calcitrapae (L.) Dufr. Fliget sporebaldrian. 10-40cm. Enårig. De nedre blade mest hele, ægformede til runde; de øvre smalfligede. Kronrøret 1-3mm, med en udvækst på under ½mm. III-VI. A K

C. macrosiphon Boiss. Sommerbaldrian. 20-40cm. Enårig. Bladene hele eller buttandede, de øvre dog skarpttandede med fliget grund. Kronrøret 5-8mm, med en spore på 1-1½mm. III-VI. K (Forvildet ved Napoli i Portici og Resina)

DIPSACACEAE

1. Kronen 5-tallig ..... 2.
   " 4-tallig 4.
2. Svøbbladene halvt sammenvoksede ..... Pycnocomon
   " indbyrdes frie 3.
3. Frugten med 10 børster ..... Tremastelma
   " " 5 " Scabiosa
4. Stænglen tornet ..... Dipsacus
   " uden torne 5.
5. Ydre blomster forøgede og uregelmæssige ..... Knautia
   " " ikke større, m.m. regelmæssige 6.
6. Svøbbladene i flere end 3 rækker ..... Cephalaria
   " " 1-3 rækker Succisa

Cephalaria transsilvanica (L.) R.& Sch. Tungeskælhovede. 30-80cm. Enårig. Svøbblade og avner spidse eller med brod. Yderbægeret med 8 korte tænder. Stænglen stivhåret, især forneden. VII-X. A B C K

C. joppica (Sprengel) Bég. Bredskællet skælhovede. 20-60cm. Enårig. Svøbblade og avner butte, kileformede eller rundagtige. Yderbægeret med 8 korte tænder. Stænglen mindre håret. VI-VII. C K

C. leucantha (L.) R.& Sch. Hvidt skælhovede. 30-80cm. Flerårig. Svøbbladene butte til halvspidse, avnerne m.m. spids. Yderbægeret med finttandet rand. Kurvene brunskællede. VII-IX. A B C K

Dipsacus fullonum L. Gærdekartebolle. VI-VIII. A B C K

Succisa pratensis Moench Djævelsbid. VI-VIII. C (Sila)

Knautia. Blåhat.

1. Enårig med hele stængelblade ..... integrifolia
   2-flerårig 2.
2. Grundbladene stivhårede af gullige børster på 1-5mm ..... 3.
   " m.m. hårede, men uden børster 4.
3. Flerårig. Ikke dunet mellem børsterne ..... dinarica
   Mest toårig. Dunet mellem børsterne lucana
4. Bladundersiderne m.m. gråfiltede ..... calycina
   " hårede eller dunede 5.
5. Flere par stængelblade. Kronen mest blålilla ..... arvensis
   1-2 " " . " " rødlilla purpurea

Knautia dinarica (Murb.) Borbas Gulbørstet blåhat. 30-80cm. Ofte med sidestillede rosetter. Stænglen gulbørstet forneden. Stængelbladene lancetformede, de øvre ofte helrandede. 800-1500m. VI-VIII. C (Sila på Botte Donato, Serriselli, Pirillo, Tacina)

K. lucana Lacaita & Szabo Brunbørstet blåhat. 50-150cm. Stænglen forneden med ca. 5mm lange, brungrundede børster. Stængelbladene æg-lancetformede, fligede, grovtandede eller helrandede. 800-1500 m. VI-VIII. B (Potenza, Gallipoli-Cognato, Pietrapertosa m.m.)

Knautia calycina (C.Presl) Guss. Okseøjeblåhat. 20-40cm. Grundbladene mest hele. Stængelbladene med 2-4(1-5) par sidelapper og endeafsnittet ofte kortere end det delte afsnit. VI-VII. B C

K. arvensis (L.) Coulter Alm. blåhat. V-IX. A B K

K. purpurea (Vill.) Borbas Bakkeblåhat. 20-50cm. Nedre blade hele til delte, øvre 1-2 x delte med mest 4-8 par smalle ofte ret dybttandede flige. 800-1800m. VI-VIII. B C K

K. integrifolia (L.) Bertol. Enårig blåhat. 20-80cm. Grundbladene hele eller noget delte. Stængelbladene linje- til lancetformede. Kronen blålilla. 12-24 bægertænder. VI-VIII. A B C K

Tremastelma palaestinum (L.) Janchen Tibørstet skabiose. 20-50cm. Enårig. Kurvene blålilla, ydre blomster forøgede. Stængelbladene smalfligede. V-VII. A B C

Scabiosa. Skabiose.

1. Stænglen forveddet forneden ..... 2.
   " urteagtig 5.
2. Bladene helrandede ..... cretica
   " tandede til fjersnitdelte 3.
3. Grundbladene helrandede til tandede ..... dallaportae
   Alle blade delte 4.
4. Blomstrende grene 30-100cm, oftest grenede .. pseudisetensis
   " " 12-25cm og ugrenede crenata
5. Bægerkraven kort, ca. 1/5 x frugten ..... maritima
   " 1/3 x frugten eller mere 6.
6. Randkronernes yderflig længere end kronrøret ..... argentea
   " " kortere " " 7.
7. Bladene fløjlshårede. Kronen rødligt lilla ..... holosericea
   " glatte til kort stivhårede 8.
8. Bægerbørsterne 1½-2½mm. Øvre blade 2-3 x delte ... gramuntia
   " 2½-6mm. " " 1-2 x " 9.
9. Stængelbladenes endeafsnit 1½ x så bredt som sideafsnittene columbaria
   Stængelbladenes endeafsnit meget bredere end sideafsnittene uniseta

Scabiosa cretica L. Kystskabiose. 10-25cm. Halvkugleformet tuet. Lancetformede, gråfiltede blade. Gamle bladskeder blivende. Stænglerne ugrenede. Kurvene 3½-5cm brede. IV-VII. C

S. crenata Cyr. Okseøjeskabiose. Kurvene 3cm brede, blegrøde. Bægerbørsterne gule eller lilla, 2-4 x kraven. V-VIII. A B C K

S. pseudisetensis (Lacaita) Pign. Valmueskabiose. Bladene glatte. Bægerbørsterne lyse og 2 x kraven. . Kurvene 2-2½cm brede, lyst rødlilla. VI-VIII. B (Mellem Nuova Siri og Senisa, under Noepoli, Terranova del Pollino, M.Balsamano) 300-1000m.

S. dallaportae Heldr. Murskabiose. 60-90cm. Bladene spredt hårede, de nedre spatelformede, 5-6x2-2½cm, de øvre tandede eller 2-3 par lapper. Stænglerne ugrenede. 300-800m. VI-VIII. A (Vallone di Pulsano på Gargano)

S. argentea L. Hvid skabiose. 20-50cm. Mest toårig. Bladene 1-2 x smalfligede. Mange kruve. Blomsterne hvidgule, gule eller lyserødt-gullige. Mest på sandstrand. VII-IX. A B C K

S. columbaria L. Dueskabiose. VI-IX. A B C K

S. uniseta Savi Fåbørstet skabiose. 50-150cm. Stængelbladenes sideafsnit mest 3-8 x så lange som brede (8-16 x hos columb.). Bægerbørsterne ofte affaldende, 1-4 tilbage. V-VIII. A B C K

S. gramuntia L. (S. triandra) Finbladet skabiose. 20-90cm. Bladene tæt stivhårede, de nedre lyreformede. Bægerbørsterne mangler ofte, ellers korte, lyse og brune. VI-IX. B K

Scabiosa holosericea Bertol. Gråfiltet skabiose. 20-80cm. Grundbladene 4-7x1-2cm, rundtakkede til m.m. dybt lappede. Øvre blade 1-2 x smalfligede. Mange kurve. 500-1900m. VI-VII. A B C K

S. maritima L. (S. atropurpurea) Vejskabiose. 20-60cm. Frugthovedet aflangt. Bægerkransen med 8 ribber. Underbægerets ribber bredere og sammenflydende opad. IV-XI. A B C K

Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffm.& Link Rudeskabiose. -175cm. Flerårig. Bladene 1-2 x fjersnitdelte og smalfligede. Kurvene ½-2cm brede. Blomsterne lyserøde, gullige eller hvide. VI-IX. K

CAMPANULACEAE

1. Kronen uregelmæssig og 2-læbet ..... Laurentia
   " regelmæssig 2.
2. Kronen delt næsten til grunden ..... 3.
   " højst halvt delt 6.
3. Blomsterne enlige eller i nøgler ..... 4.
   " i hoveder 5.
4. Blomsterne tydeligt stilkede ..... Campanula
   " m.m. siddende Asyneuma
5. Blomsterknopperne rette. Kronfligene hurtigt frie .. Jasione
   " krumme. Fligene forbundne øverst Phyteuma
6. Frugtknude og kapsel prismatiske ..... Legousia
   " " " æg-, kugle- eller pæreformede 7.
7. Blomsterne med et kronrør på 6-12x1mm i en halvskærmformet kvast ..... Trachelium
   Kronrøret bredere. Ingen halvskærm 8.
8. Enårig med langstilkede blomster på 7-8mm ..... Wahlenbergia
   Anderledes Campanula m.m.

Campanula. Klokkeblomst.

1. Enårig ..... 2.
   2-flerårig 3.
2. Blomsterne 3-5mm, stilkene 0-5mm ..... erinus
   " 18-20mm dichotoma
3. Blomsterne siddende, i hoveder eller aks ..... 4.
   " stilkede 7.
4. Med tilbagebøjede bægervedhæng mellem tænderne ... lingulata
   Uden " " " " 5.
5. Flerstænglet, 2-8(20)cm høj ..... Edraianthus graminifolius
   Enstænglet, 20-70cm høj 6.
6. Svøbbladene med udvidet grund. Nedre bladstilke uvingede glomerata
   Svøbbladene bladagtige. Nedre bladstilke vingede foliosa
7. Kronen delt næsten til grunden ..... trichocalycina
   " højst 3/4 delt 8.
8. Mellemste stængelblade ægformede eller bredere ..... 9.
   " " lancetformede eller smallere 14.
9. Stænglerne udstrakte til hængende. Kronen over ½ delt ... 10.
   " oprette. Kronen under ½ delt 11.
10. Kronen 10-15mm, fligene 3-5mm brede ved grunden garganica
    " 15-25mm, " 8-12mm " " " fragilis
11. Kronen med mørk grund. Kapslen opret ..... versicolor
    " ensfarvet. Kapslen nikkende 12.
12. Stænglen skarpkantet og stivhåret ..... trachelium
    " trind, ihvertfald i nedre halvdel 13.
13. Kronen 1-2cm. Bægertænderne 1mm brede nederst bononiensis
    " 4-5cm. " 3-6mm brede nederst latifolia
14. Kronen 3-5cm. Stænglen rank, mest ugrenet .... persicifolia
    " op til 2½cm 15.
15. Blomsterne næsten ½ delte, i rigtblomstret top rapunculus
    " mindre delte, i fåblomstret stand 16.
16. Knopperne oprette. Kronen næsten valseform. pseudostenocodon
    " nikkende. Kronen klokkeformet pollinensis

Campanula rapunculus L. Rapunselklokke. 30-100cm. Opret toårig. Bladene linjeformede til aflange, m.m. helrandede. Blomsterne m.m. oprette, 1-2cm, ofte blegblå. V-IX. A B C K

C. persicifolia L. Smalbladet klokke. V-VIII. A B K

C. lingulata W.& K. Tungeklokke. 20-30cm. Stivhåret toårig med 1-flere udelte stængler. Blomsterne 20-25mm, 1/5 delte, spidstandede, Grundbladene aflangt spatelformede. IV-VI. K (Cilento)

C. dichotoma L. Gaffelklokke. 10-15cm. Udstående stivhåret og gaffelgrenet. Bægeret med tilbagebøjede vedhæng mellem tænderne. Kronen rørklokkeformet. IV-VI. A (Is.Tremiti) C K

C. glomerata L. Nøgleklokke. VI-IX. A B C K

C. foliosa Ten. Bladhovedklokke. 30-50cm. Nedre blade 3-8x2-4½cm brat tilsmalnede i den vingede stilk. Bægertænderne 8-12mm, med trådformet spids og langt, blødt randhårede. VII-VIII. B K

C. versicolor Andrews Mørkøjet klokke. 20-40cm. Nedre blade læderagtige og ægformede, ofte med hjærteformet grund. Klasen tæt. Kronen 15-25mm. Ofte glat. 0-400m. VI-VII. A (fra Barese (Patruscio) til Taranto og S.M.di Leuca) B (Matera)

C. fragilis Cyr. ssp. fragilis Skør klokke. 10-40cm. Nedre blade mest rundagtige, 2-3cm, rundtakkede, hen ad Vedbendærenprises. Kronen 3½-4cm bred. VI-IX. B C K (Alm. fra Napoli til Amalfi)

C. garganica Ten. 10-20cm. Grundbladene 2-3cm, m.m. hjærteformede, rund- til savtakkede. Klaserne bladede. Blomsterne 20-22mm brede, bleglilla til næsten hvide. 0-800m. V-IX. A (Gargano: Peschici, Rodi, Cagnano, M.S.Angelo, Mattinata, M.Sacco)

C. erinus L. Tofarvet klokke. 5-25cm. Gaffelgrenet og stivhåret. Bladene 1-2cm, omvendt ægformede med 2-3 par tænder, ofte modsatte. Kronen rørformet med hjulformet krave. III-VI. A B C K

C. latifolia L. Bredbladet klokke. VI-VIII. B (Muro) K

C. trachelium L. Nældeklokke. VI-X. A B C K

C. bononiensis L. Langklaset klokke. 40-100cm. Stænglen ru og dunet. Blomsterne ensidige, stilkene 2-5mm, de nedre 2-3 sammen. Bladundersiden grågrønt filtet. VI-VIII. K (Matese)

C. trichocalycina Ten. Bøgeklokke. 40-80cm. Bladene æg- til lancetformede, skarpt og uregelmæssigt savtakkede. Bægertænderne linjeformede. Kronen med 5 flige på 15x3mm. VI-VII. B C K

C. pseudostenocodon Lacaita Ensianklokke. 15-30cm. Grundbladene væk i blomst. Øvre blade mest smalt lancetformede. Mest 2-6 blomster på 15-20mm. 1100-1800m. VII-VIII. B C K (Alburno, Cervati, Volturino, Serra d.Spina, M.Montea)

C. pollinensis Podlech Som foregående. Fåblomstret. Kronen 16-25mm. 1600-2100m. VI-VIII. B (Pollino fra C.del Dragone til Serra del Prete)

Legousia. Spejlblomst. Enårige. Kortstilkede, m.m. oprette frugtknuder. Den lilla krone ikke meget længere end de smalle bægerflige.

L. speculum-veneris (L.) Chaix Alm. spejlblomst. 10-30cm. Blomsterne mest i top, ellers i små nøgler. Kronen mindst så lang som bægerfligene. Planten dunet. Kapslen 10-15mm. IV-VII. A B C K

L. falcata (Ten.) Fritsch Seglspejlblomst. 10-40cm. Blomsterne i et smalt aks. Kronen ca. 1/3 x bægerfligene. Planten dunet. Kapslen 15-20mm. Bladene svagt bølgede. IV-VI. A B C K

L. hybrida (L.) Delarbre Liden spejlblomst. Blomsterne mest i små nøgler. Kronen ca. ½ x bægerfligene. Planten kort stivhåret.

Kapslen 15-30mm. Bladene stærkt bølgede. IV-VI. A B C K

Trachelium coeruleum L. Krophals. 40-100cm. Næsten glat flerårig. Blålilla, næsten metalliske, rørformede blomster i halvskærme. Bladene ægformede, de større ca. 1½ x så lange som brede. VI-IX. Dyrket og forvildet i B C K

Asyneuma limonifolium (L.) Janchen Bølget stråleklokke. 10-100cm. Bladene m.m. lancetformede, de fleste grundstillede, bølgede. Blomsterne (1)2-4 sammen, med udspærrede flige, hvilket giver planten et liljeblomstret præg. V-VI. A B (Matera)

Phyteuma orbiculare L. Kuglerapunsel. 10-50cm. Grundbladenes plade vel afsat fra stilken, af forskellig form. Blomsterne 15-20 mm. Med flere stængelblade. VI-VIII. K (Salernit.)

P. hemisphaericum L. Halvkuglerapunsel. 5-15cm. Grundbladene linjeformede, 4-6cm x ½-2mm. Mest kun 1 stængelblad. Blomsterne 10mm lange. VII-VIII. K (M.Mutria ved Matese)

Wahlenbergia nutabunda (Guss.) DC. Stilkklokke. 10-40cm. Opret, glat og med oprette grene. Bladene mest lancetformede og m.m. helrandede. Blomsterne i en stor, åben kvast, smalt tragtformede, blegblå, lyserøde eller hvide. III-IV. C (Reggio)

Edraianthus graminifolius (L.) A.DC. Bægerklokke. 2-10(15)cm. Grundbladene 2-10cm x 1-2mm, m.m. krushårede. Endestillede hoveder af mest 3-6 blålilla blomster på 12-20mm. V-VII. B K

Jasione echinata Boiss.& Reuter Spidstandet blåmunke. 10-50cm. Flerårig uden udløbere. Større blade 3-4cm x 5-6mm, bølgede. Større svøbblade 8-10x5-6mm. IV-VI. C (Sila)

J. orbiculata Griseb. 5-15cm. Flerårig med udløbere med golde rosetter. Bladene 10-24x3-5mm, ikke bølgede. Større svøbblade 5-7x3-4mm. VI-VII. B (M.Papa. Schiena d'Asino, Sirino)

Laurentia tenella DC. Flerårig stilklobelie. 3-10cm. Flerårig rosetplante med spatelformede blade og spinkle, ugrenede blomsterstilke på 3-10cm med blålilla blomster på 8-11mm med hvidgult svælg. Over- og underlæbe dybt 2- og 3-delte. IV-IX. C

L. gasparrinii (Tineo) Strobl Enårig stilklobelie. 3-20cm. Enårig med bladet og grenet stængel. Kronen 2½-4½mm, kongeblå med hvidt svælg. V-VIII. A C K

COMPOSITAE

1. Skivekronerne rørformede ..... 2.
   " tungeformede 76.
2. Bladene tornede eller småtornede ..... 3.
   " ikke tornede 19.
3. Enkeltblomstrede kurve i kugleformede hoveder ..... Echinops
   Kurvene flerblomstrede 4.
4. Blomsterne blå ..... 5.
   " ikke blå 7.
5. Stænglen tornet-vinget ..... Cardopatum
   " ikke tornet 6.
6. Ydre svøbblade bladagtige ..... Carduncellus
   Ingen bladagtige svøbblade Cynara
7. Fnokken ikke fjerformet ..... 8.
   " fjerformet 13.
8. Blomsterne gule. Ydre svøbblade bladagtige ..... 9.
   " røde eller hvide 10.
9. Bladene fligede til snitdelte, kraftigt tornede .. Carthamus
   " bugtede og småtornede Cnicus
10. Svøbbladene med et tandet vedhæng. Hvidbrogede blade Silybum
    " stort set helrandede (evt. frynset-tandede) 11.
11. Kurvbunden uden børster eller avner ..... Onopordum
    " med " " " 12.

12. Kurvbunden med avner. Bladene hvidårede ..... Tyrimnus
" " børster Carduus
13. Indre svøbblade skinnende og randkroneagtige ..... Carlina
Anderledes 14.
14. Randkronerne større end midterkronerne ..... Galactites
Alle kroner lige store 15.
15. Ydre svøbblade bladagtige, med sidetorne ..... Atractylis
" " ikke bladagtige 16.
16. Bladranden ikke finttornet mellem de store torne Ptilostemon
" finttornet mellem de store torne 17.
17. Bladoversiden hvidåret ..... Notobasis
" grøn 18.
18. Svøbbladene med et krummet, fjerfliget vedhæng ... Picnomon
" uden " " " " Cirsium
19. Hanblomsterne i særlige kurve; hunblomsterne 1-2
sammen i bladhjørnerne ..... 20.
Alle kurve ser ens ud 21.
20. Frugten ikke stor og tornet. Nedre blade modsatte Ambrosia
" stor og tornet. Bladene spredte Xanthium
21. Bladene overvejende modsatte ..... 22.
" " spredte 26.
22. Med hårformet fnok ..... Eupatorium
Uden " " 23.
23. Fnok af 2-4 kraftige børster med modhager ..... Bidens
Anderledes 24.
24. Hvide randkroner ..... Galinsoga
Gule " 25.
25. Bladene siddende med omfattende grund. 8 randkroner Guizotia
" stilkede Helianthus
26. Med tydeligt synlige, tungeformede randkroner ..... 27.
Tungekroner mangler eller af skivekronernes længde 50.
27. Med hårformet fnok ..... 28.
Uden " " 35.
28. Randkronerne hvide eller lilla ..... 29.
" gule 30.
29. 2-3 rækker randkroner ..... Erigeron
1 rækker randkroner Aster
30. Blomsterstænglerne kun med skælblade ..... Tussilago
" bladede 31.
31. 1 række svøbblade, ofte med små ekstrasvøbblade ... Senecio
2-flere rækker svøbblade 32.
32. 2-3 rækker svøbblade. Kurvbunden hvælvet ..... Doronicum
Mange rækker taglagte svøbblade 33.
33. 6-12 randkroner ..... Solidago
Mange " 34.
34. 1 række fnokhår + en række små, ydre skæl ..... Pulicaria
1 " " Inula
35. Kurvbunden med avner ..... 36.
" uden " 43.
36. De ydre svøbblade store og bladagtige ..... 37.
" " " ikke bladagtige 38.
37. De ydre svøbblade tornspidsede ..... Pallenis
" " " ikke tornspidsede Asteriscus
38. Mange små kurve i tæt halvskærm ..... Achillea
Mellemstore til store kurve 39.
39. Kurven 8-50cm bred ..... Helianthus annuus
" mindre 40.
40. Skivekronerne med udposet grund ..... Chamaemelum
" " slank grund 41.
41. I det mindste de ydre frugter stærkt vingede .... Anacyclus
Frugterne ikke vingede 42.
42. Frugterne stærkt sammentrykte ..... Achillea
" næppe " Anthemis

43. Randkronerne gule eller hvide med gul grund ..... 44.
" helt hvide 46.
44. Ydre frugter store og krumme ..... Calendula
Ingen store og krumme frugter 45.
45. Frugterne trinde, ofte med en krave øverst ... Coleostephus
" kantede, uden krave Chrysanthemum
46. Enårig ..... 47.
Flerårig 48.
47. Bladene 2-3 x delte med trådformede flige ..... Matricaria
" hele Bellis annua
48. Rosetplante uden stængelblade ..... Bellis
Med stængelblade 49.
49. Bladene fjersnitdelte med lancetformede, delte afsnit Tanacetum
Bladene hele eller trådformet fligede ..... Leucanthemum
50. Kronernes tænder flere gange længere end brede. Kronen forholdsvis brat udvidet midtpå ..... 51.
Kronernes tænder korte. Kronen mere jævnt udvidet midtpå 58.
51. Svøbbladene ender i en hagekrummet torn ..... Arctium
" anderledes 52.
52. Svøbbladene med et udvidet, laset, frynset eller flertornet vedhæng i spidsen ..... Centaurea
Svøbbladene uden vedhæng 53.
53. Halvbusk med linjeformede blade ..... Ptilostemon
Anderledes 54.
54. Bladundersiden hvidfiltet ..... Jurinea
" ikke hvidfiltet 55.
55. Svøbbladene ægformede med sort spids og kort brod Mantisalca
" anderledes 56.
56. Fnokken først gyldenbrun, siden sortagtig. Enårig Crupina
" anderledes. Flerårige 57.
57. Svøbbladene brede og m.m. butte ..... Centaurea centaurium
" spidse Serratula
58. Nedre blade ca. så brede som lange, med indbugtet grund 59.
Bladene anderledes 60.
59. Stænglen kun med skælblade ..... Petasites
" med løvblade Adenostyles
60. Bladene delte ..... 61.
" hele 64.
61. Mange små kurve i en forlænget top ..... Artemisia
Kurvstanden anderledes 62.
62. Med hårformet fnok ..... Senecio
Fnokken ikke fårformet 63.
63. Halvbuske. Bladene smalle og kortfligede ..... Santolina
Urter. Aflange, 2 x delte blade Tanacetum vulgare + Anthemis
64. Planten ikke filtet. Veludviklet, hårformet fnok ..... 65.
Planten filtet på bladundersider, svøbgrund m.m. 69.
65. 1 række svøbblade + 2-4 små ydersvøbblade ..... Senecio
Flere rækker svøbblade 66.
66. Kronerne hvidgrå til hvidgule. Enårig ..... Conyza
" gule til brunlige 67.
67. Uden tungeformede randkroner. Linjeformede blade .... Aster
Med korte, tungeformede randkroner af svøbets længde 68.
68. Den hårformede fnok omgiven af korte skæl ..... Pulicaria
Ingen skælagtig fnok Inula
69. Flerårige halvbuske ..... 70.
Urter 72.
70. Kurvsvøbbladene hvidfiltede ..... Otanthus
" overvejende hindeagtige 71.
71. Kurvene i tætte halvskærme med gult svøb ..... Helichrysum
" enlige eller 2-3 sammen, med brunt svøb Phagnalon
72. Kurvsvøbbladene overvejende glatte ..... 73.
" m.m. lådne 74.

73. Kurvene 3-6mm, samlede i en tæt stand ..... Gnaphalium
" 10-17mm, i en åben stand Xeranthemum
74. Kurvene helt skjulte under deres uld ..... Bombycilaena
" synlige 75.
75. Lave planter. Kurvnøglerne pudeformede og omgivne af store, spatelformede højblade ..... Evax
Anderledes Filago
76. Stænglen tidselagtigt tornet ..... Scolymus
" uden torne 77.
77. Frugten helt uden fnok. Enårige ..... 78.
" med skæl-, børste-, hår- eller fjerformet fnok 79.
78. Ydre frugter lange og stjærneformet udstående Rhagadiolus
Frugterne korte, ikke " " Lapsana
79. I hvert fald de indre frugter med fjerformet fnok ..... 80.
Frugterne med hår-, skæl- eller børsteformet fnok 86.
80. Bladene ligestrengede og helrandede ..... 81.
" anderledes 82.
81. Flere rækker kurvsvøbblade ..... Scorzonera
1 række kurvsvøbblade Tragopogon
82. Kurvbunden med avner ..... Hypochoeris
" uden " 83.
83. 1 række kurvsvøbblade ..... Urospermum
Flere rækker kurvsvøbblade 84.
84. Alle blade i roset ..... Leontodon
Med stængelblade 85.
85. Frugterne længdestribede ..... Scorzonera
" tværrynkede Picris
86. Frugterne stærkt sammentrykte ..... 87.
" ikke eller kun svagt sammentrykte 90.
87. Frugterne uden næb ..... 88.
" med " 89.
88. Blomsterne rødlilla ..... Prenanthes
" gule Sonchus
89. 2 rækker kurvsvøbblade, den ydre lille ..... Mycelis
Flere rækker kurvsvøbblade Lactuca
90. Blomsterne blå ..... Cichorium
" ikke blå 91.
91. Kurvsvøbet hindeagtigt. Bladene ligestrengede .. Catananche
" m.m. urteagtigt 92.
92. Ydre svøbblade sylformede, længere end de indre .... Tolpis
" " kortere end de indre 93.
93. Frugterne med skæl- eller børsteformet fnok ..... 94.
" " hårformet fnok 95.
94. Stænglerne bladede. Frugterne 5-8mm, ydre krumme Hedypnois
" bladløse Hyoseris
95. Frugten stærkt tværrynket ..... Reichardia
" ikke " 96.
96. Stænglerne ugrenede, bladløse, hule, tyndvæggede Taraxacum
" anderledes 97.
97. Frugten med en krone foroven omkring næbbet .... Chondrilla
" uden nogen krone foroven 98.
98. Frugterne tilsmalnede foroven ..... 99.
" afskårne foroven 100.
99. Kurvsvøbet taglagt og sortkirtlet ..... Aetheorhiza
2 rækker kurvsvøbblade Crepis
100. Kurvbunden langhåret. Bladene tæt stjærnefiltede Andryala
" ikke langhåret Hieracium
101. Kurvsvøbet taglagt ..... Hieracium
2 rækker kurvsvøbblade Tolpis

Eupatorium cannabinum L. Hjortetrøst. VII-IX. A B C K

Solidago virgaurea L. Almindeligt gyldenris. VII-X. A B C K

Bellis. Tusindfryd.

1. Enårig med bladede stængler ..... annua
   Flerårige rosetplanter 2.
2. Svøbbladene 3-5 mm. Kurven under 3cm bred ..... perennis
   " 7-10mm. " 3-4cm bred 3.
3. Svøbbladene spidse. Bladet jævnt tilsmalnet ..... silvestris
   " butte. " brat " margaritaefolia

Bellis annua L. Enårig tusindfryd. 5-12cm. Halvglat til stivhåret. Bladene 6-25x3-15mm, m.m. finttandede, randhårede. Kurvene 5-15mm brede. XI-IV. A B C K

B. perennis L. Alm. tusindfryd. I-XII. A B C K

B. margaritaefolia Huter Skebladet tusindfryd. 20-50cm. Ligner perennis, men større og glat. Bladene skeformede, ofte dybt tandede. 0-800m. II-VI. B (M.Sacro di Novi) C. Fugtige enge.

B. silvestris Cyr. Mørk tusindfryd. 10-30cm. Bladene 3-18cm, omvendt lancetformede, dunede, 3-5-årede. Skafterne stivhårede. Tungekronerne ofte rødt anløbne. IX-VI. A B C K

Aster. Asters.

1. Stænglen bladløs med 1 kurv ..... bellidiastrum
   " bladet 2.
2. 1-2-årig.Talrige små kurve med korte randkroner .. squamatus
   Flerårige 3.
3. Ingen randkroner. Bladene 1-1½(3)mm brede ..... linosyris
   Med randkroner 4.
4. Bladene kødede. Strandplante ..... tripolium
   " ikke kødede sedifolius

Aster linosyris (L.) Bernh. Guldasters. 30-50cm. Stænglerne tæt bladede. Kurvene i tætte halvskærme. Svøbbladene lange og smalle, ofte udadkrummede. VII-IX. A B

A. sedifolius L. Rustænglet asters. 20-50cm. Stænglen ru. Bladene linje-lancetformede, helrandede, kirtelprikkede, rurandede. Kurvsvøbet ofte med klæbrig glans. VII-XI. A

A. tripolium L. Strandasters. VIII-IX. A B C D

A. bellidiastrum (L.) Scop. Alpetusindfryd. 10-25cm. Bladene omvendt lancet-spatelformede. Kurven 2cm bred. Randkronerne hvide eller lyserøde. VI-VII. K (M.Meta, Montevergine)

A. squamatus (Sprengel) Hieron. Skælasters. 30-80cm. Stærktgrenet. Bladene linje-lancetformede, helrandede, indtil 8x1cm. Korte lilla randkroner, kun lidt længere end svøbet. IX-X. A B C K

Erigeron karvinskianus DC. Tretakket bakkestjærne. 20-40cm. Flerårig. Krybende til opstigende. Ingen grundroset. Nedre blade ofte trelappede. Kurvene 1½cm brede. VII-X. Forvildet i K

E. acer L. Bitter bakkestjærne. VII-IX. B K

E. alpinus L. Alpebakkestjærne. 5-20cm. Flerårig med grund- og stængelblade. Stænglen med 1-3(10) kurve med lyslilla randkroner. Bladene randhårede og krushårede. VII-IX. K

Conyza. Bakkestjærne.

1. Kurvsvøbet næsten glat. 3 rækker svøbblade ..... canadensis
   " som regel håret. 2 rækker svøbblade 2.
2. Nedre blade 1-strengede ..... bonariensis
   " " også med sideribber albida

Conyza canadensis (L.) Cronq. Kanadisk bakkestjærne. VI-X.ABCK

C. albida Willd. Høj bakkestjærne. 50-150cm. Nær den følgende, men lidt mere grågrøn. Nedre blade omvendt lancet- til linjeformede. Toppen pyramideformet. VI-IX. A B C K

Conyza bonariensis (L.) Cronq. Håret bakkestjærne. 10-60cm. Nær canadensis, men ofte noget tættere håret. Nedre blade linje-lancetformede. Ingen randkroner (korte hos canad.) VI-IX. A B C K

Filago. Museurt.

1. Planten pudeformet ..... congesta
   Med opret stængel 2.
2. Kurvsvøbbladene ender i en stak ..... 3.
   " højst tilspidsede 4.
3. Bladene bredest i nedre halvdel ..... vulgaris
   " " " øvre " pyramidata
4. Kugleformede nøgler i forgreninger og grenender eriocephala
   Nøglerne ikke kugleformede 5.
5. Stænglen klaseagtigt grenet ..... 6.
   " gaffelgrenet 7.
6. Nøglerne med 2-12 m.m. siddende kurve ..... arvensis
   " med 2-5 kurve; også med enlige og stilkede kurve heterantha
7. Bladene 4-10mm, aflangt linje- til linjeformede, flade minima
   " 15-25mm, linje-sylformede, ofte indrullede gallica

Filago vulgaris Lam. Kuglemuseurt. V-VIII. A B C K

F. eriocephala Guss. 10-20cm. Uldhovedet museurt. 10-20cm. Ligner vulgaris, men svøbbladene med kort brod og uden egentlig stak. Planten tættere filtet. IV-VII. A B C K

F. pyramidata L. Bredbladet museurt. 5-30cm. Kugleformede nøgler i grenender og forgreningspunkter, med 12-20 kurve, der ofte overrages af højbladene. Bladene 10-15mm, afrundede. IV-VII. A B C K

F. congesta Guss. Pudemuseurt. 3-10cm. Stænglen uudviklet; med tiltrykte grene. Kugleformede nøgler. Kurvene skarpt 5-kantede. Svøbbladene med en stak på 0,5-1,2mm. IV. B (V. del Sarmento)

F. arvensis L. Agermuseurt. V-VII. B C K

F. minima (Sm.) Pers. Liden museurt. V-VIII. C

F. gallica L. Spidsbladet museurt. 2-25cm. Grålig. Bladene spidse, ofte med let indrullet rand, 15-25x0,8-1,5mm. Svøbbladene udtrukne i en lang, but spids. V-VIII. A B C K

F. heterantha (Rafin.) Guss. Stilket museurt. 8-30cm. Gråfiltet. Nogle af de nedre kurve stilkede. Bladene 8-15x1-2½mm, spidse. 400-1500m. V-VI. B C

Evax pygmaea (L.) Brot. Alm. pudekurv. 2-4cm. Hvidfiltet. Bladene spatelformede, 5-15x2-5mm, afrundede; højbladene 2-3 x nøglerne. Disse tætte, danner en skive på 1-2cm. Op til 40 ca. 4mm lange kurvsvøbblade, der er brungule med en stak på 1mm. IV-V. A B C K

E. asterisciflora (Lam.) Pers. Spidsbladet pudekurv. 3-13cm. Ligner den foregående, men ofte mere grenet, med lancetformede og spidse blade på 15-40mm. Højbladene 3-4 x nøglerne. Svøbbladene med udbøjet stak. IV-V. A C K

Bombycilaena erecta (L.) Smolj. Fureblomst. 5-20cm. Gråhvidt uldhåret enårig. Bladene aflangt spatelformede, 10-18mm, m.m. bølgede. Kurvnøglerne 8-10mm brede, oftest omgivne af længere højblade. Indre svøbblade 5-8, 2-3mm. V-VII. A B C K

Gnaphalium. Evighedsblomst.

1. Flerårig ..... 2.
   Enårig 3.
2. Stænglerne 15-30cm med mange kurve ..... silvaticum
   " 1-3cm med 1-6 kurve diminutum
3. Bladene nedløbende på stænglen ..... undulatum
   " ikke nedløbende 4.

4. Kurvene omgivne af højblade. Brunligt kurvsvøb uliginosum
" uden højblade. Strågule kurvsvøbblade luteo-album

Gnaphalium silvaticum L. Rank evighedsblomst. VI-IX. A B C K

G. diminutum Br.Bl. (G. hoppeanum p.p.) Stænglerne hvidfiltede. Nedre blade 6-12x1-2mm (højst 25x3mm). Oftest med endestillede nøgler af 2-3 kurve. Ydre svøbblade brunspidsede. 2300-2700m. VII-VIII. B C K (Pollino)

G. luteo-album L. Gulhvid evighedsblomst. 10-30cm. Hvidfiltet. Bladene spidse, 10-25x2-5mm, halvt omfattende. Blomsterne gulligе, rødlige foroven. Fugtige steder. VI-IX. A B C K

G. uliginosum L. Sumpevighedsblomst. VI-X. A B C K

G. undulatum L. Bølget evighedsblomst. 20-50cm. Bladene grønne, spidse, bølgede, ru ovenpå, hvidfiltede nedenunder. Kurvene i halvskærm, med hvidt svøb. VIII-X. Forvildet i K (Napoli)

Helichrysum italicum (Roth) Don ssp. italicum Smalbladet evighedsblomst. Nedre blade 0,5-1,0mm brede med stærkt omrullet rand. Kurvsvøbet kegleformet, med butte svøbblade, de ydre ofte noget filtede. Kurven med 12-23 blomster. V-IX. A B C K

H. stoechas (L.) Moench Kugleevighedsblomst. 15-30cm. Nedre blade ca. 1mm brede med helt omrullet rand. Kurvsvøbet halvkugleformet, med spidse svøbblade, de ydre ofte glatte. Kurvene med 16-30 blomster. V-VII. K (Napolitane)

H. rupestre (Rafin.) DC. Klippeevighedsblomst. 30-40cm. Nedre blade 1-2(6)mm brede, de største over 3cm lange (under 3cm hos stoechas). Ellers som stoechas. V-VIII. K (Napolitane)

Phagnalon. Stenkurv. Halvbuske på indtil 50cm, med svagt tandede, tofarvede blade og brunskællede kurve.

1. Kurvene 2-6 sammen ..... sordidum
" enlige 2.
2. Svøbbladene med bølget rand. Bladene 2-3mm brede .. saxatile
" ikke bølgede. Bladene 3-4mm brede 3.
3. Øvre svøbblade butte ..... rupestre
" " spidse graecum

Phagnalon sordidum (L.) Rchb. Nøglestenkurv. Bladene 1-3cm x 1 mm, helrandede, tæt uldhårede på begge sider, stærkt omrullede. Kurvene pæreformede til valseformede, ret små. VI-VII. K

P. rupestre (L.) DC. Klippestenkurv. Bladene linje-spatelformede, 10-25mm, spidse, med bølget-tandet rand. Kurvene ægformede, 8-12x6-10mm. II-VI. 2 underarter:
ssp. rupestre: Bladene med 2-4 par tænder. K
ssp. annoticum (Jordan) Pign.: Bladranden hel, men ofte bugtetindrullet. A C K

P. graecum Boiss.& Heldr. ssp. illyricum (Lindb.) Ginzberger Bugtet stenkurv. Bladene helrandede. II-VI. A K

P. saxatile (L.) Cass. Smalbladet stenkurv. Bladene linjeformede 3-5cm, med let bølget rand, svagt uldhårede ovenpå, tæt uldhårede nedenunder. Kurvene 1½cm brede. III-VI. A B C K

Inula. Alant.

1. Planten hvid. Nedre blade stilkede ..... verbascifolia
" grøn 2.
2. Randkronerne højst en anelse længere end skivekronerne ... 3.
" tydeligt længere end skivekronerne 4.
3. Stærktgrenet, kirtelhåret, smalbladet enårig .... graveolens
Svagtgrenet, ukirtlet, lancetbladet toårig conyza
4. Nedre blade 40-80x10-20cm. Kurvene 6-7cm brede .... helenium
" " mindre. Kurvene 1-3½cm brede 5.

5. Bladene kødede, linjeformede, trinde ..... crithmoides
" flade, ikke kødede 6.
6. Bladgrunden ikke stængelomfattende ..... montana
" m.m. " 7.
7. Planten klæbrigt-kirtlet. Mange kurve i top ..... viscosa
" ikke kirtlet. 1-få kurve i halvskærm 8.
8. Bladoversiden ikke tydeligt netåret ..... britannica
" tydeligt netåret 9.
9. Bladundersiden og kurvsvøbet m.m. tæt håret ..... hirta
" " " glat eller svagt håret 10.
10. Øvre stængelblade med afrundet, omfattende grund salicina
" " " kileformet grund spiraeifolia

Inula helenium L. Lægealant. VII-X. B K

I. salicina L. Pilealant. VI-IX. A B C K

I. spiraeifolia L. Udspærret alant. 30-80cm. Dunet forneden, glat foroven. Ydre svøbblade med tilbagebøjet spids. VI-IX. A B C

I. hirta L. Hvas alant. 15-45cm. Stænglen stivhåret og bladene stærkt ruhårede. Kurvsvøbet stivhåret. Kurvene mest enlige, svøbet tiltrykt. V-X. B K

I. britannica L. Soløjealant. VII-IX. B

I. montana L. Bjærgalant. 20-30cm. Blødt hvidulden. Grundbladene linje-spatelformede, 5-10cm x 8-13mm. 1-få kurve. VI-VIII. A C K

I. verbascifolia (Willd.) Hausskn. ssp. verbascifolia Kongelysalant. 20-40cm. Kurvsvøbet 10-12mm, med mange små støtteblade under sig. Randkronerne ret korte. VII-VIII. 100-800m. A (Gargano)

I. conyza DC. Trekløftalant. 50-120cm. Kurvene i en top, 1cm brede, valseformede, med taglagt og ofte rødspidset svøb. A B C K

I. crithmoides L. Strandalant. 40-70cm. Glat halvbusk. Bladene 2-4½cm x 2-4mm, helrandede eller med tretandet spids. Kurvstilkene med mange, skælformede højblade. VII-XI. A B C K

I. graveolens (L.) Desf. Tægealant. 20-50cm. Kamferlugtende. Bladene linjeformede, 20-33x1-2mm, spidse, m.m. helrandede; de nederste indtil 1cm brede. Kurvene 4-7mm brede. VIII-XI. A B C K

I. viscosa (L.) Aiton Klæbrig alant. 40-130cm. Forveddet forneden. Stænglen stivhåret foroven. Bladene spidstandede og ru, m.m. lancetformede. Kurvsvøbet 6-8mm. VIII-X. A B C K

Pulicaria. Loppeurt.

1. Randkronerne 0-3mm. Oftest enårig ..... 2.
" mindst 5mm. Flerårig 3.
2. Stængelbladene linjeformede, 2-3mm brede ..... sicula
" lancetformede, bredere vulgaris
3. Kurvsvøbet 9-15mm i blomst. Med 1-få kurve ..... odora
" 5-8mm " " . Mest talrige kurve dysenterica

Pulicaria sicula (L.) Moris Smalbladet loppeurt. 20-60cm. Svagt håret til glat. Bladene 15-30mm, spidse, ofte omrullede. Mange kurve på 7-10mm med en del små højblade under sig. VII-X. A C K

P. vulgaris Gaertner Alm. loppeurt. 7-30cm. Stinkende. Filtet af krusede hår. Kurvene på korte, bladede stilke. VIII-IX. K

P. dysenterica (L.) Bernh. Strandloppeurt. 30-70cm. Ingen bladroset. Tungekronerne 5½-8½mm. Kurvstilkene med 0-1 småblade. VII-X. A B C K

P. odora (L.) Rchb. Knoldloppeurt. 30-65cm. Ofte med blivende roset af æg-lancetformede blade. Tungekronerne 10-12mm i alt. Kurvstilkene ofte med flere småblade. VI-VII. A B C K

Asteriscus aquaticus (L.) Less. Vandstjærnesvøb. 10-40cm. Opret enårig, halvskærmformet gaffelgrenet foroven. Ydre svøbblade bladagtige, længere end de citrongule randkroner. IV-VII. A B C

Pallenis spinosa (L.) Cass. Tornstjærnesvøb. 30-50cm. Opret 1-2-årig. Grenene rager op over stænglen. Bladene spatel- til lancetformede, brodspidsede. Randkronerne mørkegule. V-VIII. A B C K

Bidens cernua L. Nikkende brøndsel. VII-IX. C

B. tripartita L. Fliget brøndsel. VII-X. A B C K

B. aurea (Aiton) Sherff Smalfliget brøndsel. 40-70cm. Bladene linje-lancetformede eller dybt delte med linjeformede flige. Svøbbladene hindeagtige. 5-7 tungekroner. VIII-X. K (Pompei, Scafati)

Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. Nigerfrø. 1-2m. Udspærret grenet. Bladene lancetformede, 3-10cm. 5 ydre kurvsvøbblade. Oftest 8 tungekroner. VIII-X. Forvildet i K

Helianthus annuus L. Solsikke. VII-X. Dyrket og forvildet.

H. rigidus (Cass.) Desf. 1-3m. Flerårig med modsatte blade på 10-15x6-8cm, tandede og ru. Stilken bredvinget. Skivekronerne brune. Kurvbunden 1cm bred. VIII-X. Dyrket og forvildet i ABCK

H. tuberosus L. Jordskok. 1-2m. Bladene modsatte, de øvre dog spredte, 8-15x5-8cm. Skivekronerne gule. Kurvene 4-5cm brede.

Ambrosia maritima L. Strandambrosie. 10-30cm. Opret enårig. Nedre blade modsatte, 2-5cm, 1 x delte, det udelte stykke 3-6mm bredt. Ofte kun 1 klase. Sandstrand. VII-IX. A B C K

A. artemisiifolia L. Bynkeambrosie. 30-100cm. Opret enårig. Nedre blade modsatte, 3-10cm, 2 x delte, det udelte stykke 1-3mm bredt. Mange klaser på 8-15cm. VII-IX. K

A. trifida L. Trefliget ambrosie. ½-2m. Opret enårig. Alle blade modsatte, hele eller med 3-5 store lapper, 10-20cm, finttandede. Lapperne 1-5cm brede. VII-IX. K

Xanthium spinosum L. Tornet brodfrø. 20-80cm. Liggende til opstigende enårig. Bladhjørnerne med gule, fra grunden 3-kløvede torne. Bladene 3-5-kløvede, hen ad Hjærtespands. VII-X. A B C K

X. strumarium L. Skræppebrodfrø. 20-120cm. Ingen torne. Bladene bredt trekantede og håndstrengede, 8-12x7-12cm. Frugten 12-15mm med 2 rette torne i spidsen. VII-X. A B C K

X. italicum Moretti Plettet brodfrø. 30-120cm. Som foregående, men frugten 15x7mm med 2 krumme torne i spidsen. Stænglen ofte med mørke streger eller pletter. VII-X. A B C K

Galinsoga parviflora Cav. Håret kortstråle. VIII-X. C K

Santolina. Cypresurt. 20-40cm. Dværgbuske med iøjnefaldende, langstilkede, gule kurve uden randkroner. Bladene askegråt filtede, linjeformede, kortfligede.

S. neapolitana Jordan & Fourr. Stænglen med flere skålformede kurve i halvskærm. Golde skuds blade 1-3cm med flige på 2-4mm; de andre 2-6cm med flige på indtil 7mm. VI-VII. 0-1000m. K (Pen. Sorrentina)

S. marchii Arrigoni Stænglen med 1-få halvkugleformede kurve. Øvre blade 1-2cm, nedre 2-4cm med flige på ½-2mm i 2-4 rækker. VI-VII. Dyrket og forvildet i A B C K

Anthemis. Gåseurt.

1. 2-flerårige ..... 2.
   Enårige 7.
2. Ingen randkroner og halbutte avner ..... hydruntina
   Med randkroner eller også med spidse avner 3.

3. Gule randkroner ..... tinctoria
   Hvide " 4.
4. Frugtstilken fortykket ..... arvensis
   " ikke fortykket 5.
5. Stænglerne med 1 kurv. Bladfligene under 1mm brede cretica
   " " flere kurve. Bladfligene over 1mm brede 6.
6. Svøbbladene med rødbrun, frynset spids ..... triumfetti
   " " klar rand maritima
7. Bladene tykke med kirtelprikket underside ..... secundiramea
   " ikke tykke, ikke kirtelprikkede 8.
8. Avnerne med en skarpt afsat brod af avnens længde altissima
   " højst jævnt tilspidsede i en brod 9.
9. Kurvbundens avner børsteformede. Planten stinkende .. cotula
   " " bredere. Planten ikke " 10.
10. Kurvbundens avner butte ..... chia
    " " spidse 11.
11. Alle kurvsvøbblade butte. Frugten lige afskåret .. arvensis
    Ydre " spidse 12.
12. Frugten med en skæv krave foroven. M.m. filtet .. tomentosa
    " lige afskåret segetalis

Anthemis cretica L. (A. montana) Bjærggåseurt. 6-30cm. Bladene kirtelprikkede, først tæt hvidfiltede. Svøbbladene ofte frynsede, med brunlig rand. 1200-2600m. VI-VIII. B C K. 2 underarter:
ssp. cretica: 12-30cm. Opret. Bladene 4-8cm. Kurven 25-45mm bred, med randkroner. Frugterne 1,75-2,5mm. B C K
ssp. calabrica (Arc.) Fern.: 6-18cm. Opstigende. Bladene 13-27mm. Kurven indtil 23mm bred, med eller uden randkroner. Frugterne 1,5-1,75mm. C

A. hydruntina Groves Vellugtende gåseurt. 25-45cm. Med kamilleduft. Bladene indtil 4x2cm, kirtelprikkede. Kurvene 7-8mm brede i blomst, svøbet gulliggrønt. 0-1000m. V-VI. A (Lago di Alimini på Pen. Salentina) B (Matera) C (Sila ved S.Giov.in Fiore, Bonolegno og Ferolia)

A. maritima L. Strandgåseurt. 12-70cm. Glat til svagt dunet halvbusk. Svøbbladene spidse og lyst hindekantede. Randkronerne ofte nedadrettede. På sandstrand. V-XI. A C K

A. secundiramea Biv. Sortfrugtet gåseurt. 10-30cm. M.m. glat. Bladstilken ofte med omfattende flige. Kurvstilkene lange og køllеformede i frugt. Kurvene tit små og ensidige. IV-VI. A C

A. tomentosa L. Filtet gåsefod. 10-30cm. Nær følgende. Bladstilken uden omfattende flige. Frugtstilkene fortykkede. Randkronerne golde. V-VI. A C

A. arvensis L. Agergåseurt. IV-VI. A B C K. 3 underarter:
ssp. arvensis: Enårig. Frugterne m.m. trinde. Frugtstilkene ikke fortykkede.
ssp. incrassata (L.isel.) Nyman: Enårig. Frugterne svagt firkantede i tværsnit. Frugtstilkene tydeligt fortykkede.
ssp. sphacelata (Presl) Fern.: 2-flerårig. Frugterne m.m. jævne. Kurvsvøbbladene ofte brunt hindekantede.

A. cotula L. Stinkende gåseurt. VI-IX. A B C K

A. chia L. Røllikegåseurt. 5-40cm. Bladfligene vinkelret udstående. Svøbbladene sortrandede. Ydre frugter med en lang, skæv krave. III-IV. A (Otranto) C (Reggio)

A. altissima L. Høj gåseurt. 20-120cm. Bladene 2-3 x delte. Ydre svøbblade uden hindekant og spidse, indre med hindekant og butte. Bladfligene brodspidsede. V-IX. A B C K

A. segetalis Ten. Markgåseurt. 10-30cm. Ofte liggende med ensidigt opstigende grene. Tæt dunet. Svøbbladene spidse, de indre frynsede. Frugten med 5-7 striber på hver side. V-VII. A B C K

Anthemis tinctoria L. Farvegåseurt. V-IX. A B C K

A. triumfetti All. Kamgåseurt. 30-50cm. Svagt håret til gråhåret. Bladskaftet tandet mellem fligene. Randkronerne kan mangle. Kurven 3-5cm bred. V-VIII. A B C K

Achillea. Røllike.

1. Stænglerne med 1 kurv ..... 2.
   " " flere kurve 3.
2. Planten gråt silkefiltet ..... barrelieri
   " halvglat til dunet mucronulata
3. 6-12 randkroner mindst af kurvsvøbets længde ..... 4.
   4-5 " , kortere end kurvsvøbet 5.
4. Bladene 1 x fligede med 3-6 par flige ..... lucana
   " hele rupestris
5. Randkronerne gule. Bladene hele og tandede ..... ageratum
   " hvide eller hvidgule. Bladene fjersnitdelte 6.
6. Mellemste stængelblade med under 10 par afsnit ..... 7.
   " " " over 10 " " 9.
7. Svøbbladene brune med sortagtig rand ..... tenorii
   " med klar hindekant 8.
8. Mellemste blades 1.ordens afsnit regelmæssigt delte nobilis
   " " " " uregelmæssigt delte ligustica
9. Skærmen 4-10cm bred. Bladene med svagt buede sider millefolium
   Skærmen 1-3(4)cm bred. Bladene næsten parallelsidede collina

Achillea mucronulata Bertol. Sortskedet røllike. 15-25cm. Sorte bladskeder. Nedre blade 3-5cm, med gentagent 3-delte flige. Få stængelblade. Kurvsvøbet bredt brunt hindekantet. VI-VII. B C K

A. barrelieri Ten. Filtet røllike. 5-15cm. Stænglen ofte udstrakt. Nedre blade mest 4-6x1-1½cm; 1-ordens flige korte (3-7mm) og tætstillede. 2000-2600m. VII-VIII. K (Avellinese)

A. rupestris Porta Klipperøllike. 10-25cm. Golde skuds blade linje-spatelformede , 16-28x2-3mm, helrandede og spidse; stængelbladene spatelformede med 0-4 par småtænder. VII. C (Pollino)

A. lucana Pign. Kamsvøbsrøllike. 10-20cm. Bladene fligede i ydre halvdel. Halvskærmens grene kantede og uldhårede. Svøbbladene med lysebrun rand. 1000-1500m. VI-VII. B (ved Potenza på Serra di Monteforte, Alpe di Latronico og monti di Vietri di Potenza)

A. ageratum L. Balsamrøllike. 25-40cm. Med kamferlugt. Bladene i knipper langs stænglen, spatelformede, kirtelprikkede. Randkronerne ca. 1mm. IV-X. A K

A. collina Becker Bakkerøllike. 30-60cm. Tydeligt håret. Grundbladene 8-13x1-1½cm, mellemste blade 5x1cm. V-VII. A B C K

A. millefolium L. Alm. røllike. Oftest sparsomt håret. Grundbladene 10-20x1½-3cm, mellemste blade 5-8x1cm. V-IX. A B C K

A. nobilis L. Ædelrøllike. 20-60cm. Bladene 1½-3x1-1½cm, med ægformet omrids, fligene 1mm brede. Svøbbladene 2-3 x så lange som brede. Randkronerne ofte hvidgule. VI-IX. K (Napol.)

A. tenorii Grande Mørkkurvet røllike. 12-20cm. Med korte udløbere. Planten gulgrøn. Bladene med 4-6 par afsnit på 1mms bredde. Randkronerne hvidgule. 5-6 rørkroner pr. kurv. VII-IX. A B C K

A. ligustica All. Skarpfliget røllike. 30-90cm. Mellemste blade 2-3x1½cm, ægformede med indtil 2-3mm brede flige. Svøbbladene 3-4 x så lange som brede. Randkronerne hvide. VI-VII. A B C K

Chamaemelum mixtum (L.) All. Tofarvet gåseurt. 20-50cm. Enårig, mest tæthåret. De fleste stængelblade 1 x delte. Svøbbladene grønne med bred, lys hindekant. V-IX. A B C K

Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. Vårgåseurt. 5-30cm. Enårig. M.m. glat. De fleste stængelblade 2-3 x delte med linjeformede flige. Kurvstilkene fortykkede. Svøbbladene mørkrandede. XI-VI. K

Chamomilla recutita (L.) Rauschert Vellugtende kamille. A B C K

Anacyclus radiatus Loisel. Gul bertram. 20-60cm. Enårig. Gule randkroner. Bladene 2 x delte med 1-3mm brede, halvglatte til tæt filtede. Kurvsvøbbladene med et vedhæng hen ad Alm. knopurts. Frugtstilkene kølleformede. V-VIII. K

A. clavatus (Desf.) Pers. (A. tomentosus) Køllebertram. 20-60cm. Som foregående, men randkronerne hvide og svøbbladene uden vedhæng, ofte med rødlig kant. IV-VII. A B C

Otanthus maritimus (L.) Hoffm.& Link Sølvøre. 20-40cm. Tæt hvidfiltet flerårig. Bladene omvendt lancetformede, butte, siddende, kødede, 9-12x4-5mm. Kurvene kugleformede, i tæt halvskærm. Sandstrand. VI-VIII. A B C K

Chrysanthemum segetum L. Gult okseøje. IV-VIII. A B C K

C. coronarium L. Kronokseøje. 20-60cm. Enårig. Bladene 2 x delte med ofte tandede afsnit. Ydre svøbblade med brunligt kantbånd og hvidlig hindekant. Randkronerne gule eller hvide med gul grund. IV-VII. A B C K

Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. Matrem. VI-IX. Forv. i ABCK

T. vulgare L. Rejnfan. VII-IX. K

T. corymbosum (L.) Sch.Bip. Lundokseøje. 50-100cm. Bladene fjersnitdelte med aflange, takkede til snitdelte flige, nærmest rejnfansagtige. 3-14 kurve i halvskærm med hvide randkroner. A B C K

Coleostephus. Enårige, der ligner Gult okseøje på 10-45cm. Randkronerne gule, hvide eller tofarvede. Valseformede frugter.

C. myconis (L.) Rchb.f. Røroksøje. Bladene m.m. regelmæssigt savtakkede. Ydre frugter med en rørformet, hindeagtig krave op om kronrøret; indre frugter med et øre halvt op om kronrøret. ABCK

C. clausonis Pomel Bladene uregelmæssigt savtakkede. Fnokken en krone eller manglende.

Leucanthemum. Okseøje.

1. Bladene 1-3 x smalfliget fjersnitdelte .... ceratophylloides
   " hele til smallappede 2.
2. Mellemste blades grund med tænder, der er længere end brede 3.
   " " " " " " " kortere " " 5.
3. Mellemste stængelblade regelmæssigt rund- eller savtakkede (undtagen ved grunden) ..... vulgare
   Mellemste stængelblade uregelmæssigt lappede 4.
4. Stængelbladene spidslappede ..... laciniatum
   " butlappede praecox
5. Svøbbladene med mørkebrun eller sort rand ..... adustum
   " " lys rand pallens

Leucanthemum praecox (Horv.) Horv. 20-40cm. Stænglen mest grenet. Mellemste blades lapper kun lidt længere nedad modt den ofte ørede grund. III-VII. B K

L. laciniatum Huter & al. 30-60cm. Nedre blade kan være uregelmæssigt fligede. Randfrugterne med en krave ca. af frugtens længde. 600-2000m. VI-VII. C (Pollino, Dirupata di Moruno) K (ryggen af M.ti Alburni)

L. vulgare Lam. Hvidt okseøje. V-X. A B C K (Beskrivelsen svarer ikke til L. vulgare fra Danmark)

L. pallens (Gay) DC. 40-80cm. Mange, ofte grenede stængler. Grundbladene ofte væk under blomstringen. V-VII. B K

Leucanthemum adustum (Koch) Gremli 30-50cm. Stænglen ugrenet, m.m. bladløs foroven. Tykke og læderagtige blade, de nedre med omvendt ægformet plade. VI-VIII. K

L. ceratophylloides (All.) Nyman ssp. tenuifolium (Guss.) Bazzichelli & Marchi Hornbladsokseøje. 30-60cm. Yderste bladflige 10-25x1-2(3)mm på de nedre blade. Svøbbladene sortbrunt randede. 1500-2400m. VI-VIII. K (Matese)

Artemisia. Bynke

1. Bladene mørkegrønne ovenpå, gråfiltede nedenunder ..... 2.
   " af samme farve på begge sider 3.
2. 1. ordens flige ujævnt tandede til fjersnitdelte .. vulgaris
   " " " helrandede og spidse verlotorum
3. Bladene glatte og grønne. Enårig ..... annua
   " filtede eller klæbrige, i det mindste som unge 4.
4. Bladstilken uden øret grund ..... 5.
   " med " " 6.
5. Kurvene 3-5mm brede. Bladfligene mest 3-4mm brede absinthium
   " 5-8mm " . " 1-2mm brede arborescens
6. Kurvsvøbet glat (sj. håret) ..... 7.
   " m.m. låddent 8.
7. Nedre topgrene med hele støtteblade på 6-15mm ... variabilis
   " " " støtteblade på 0-6mm campestris
8. Golde skuds blade hele. Topgrenene tit hængende coerulescens
   " " " delte. " m.m. oprette alba

Artemisia vulgaris L. Gråbynke. VII-X. A B C K

A. verlotorum Lamotte Spidsfliget bynke. 50-200cm. Med udløbere. X-XI. B C K

A. annua L. Enårig bynke. 50-150cm. Glat og stærkt duftende. Bladenes nedre flige adskilte fra de følgende og mindre. Nedre blade 3 x delte, øvre 1-2 x. Nikkende kurve i åben top. K

A. arborescens L. Buskmalurt. 50-100cm. Hvidfiltet. Stænglerne forveddede forneden. Bladene 1-2 x delte, smal- og butfligede. Kurvene gulblomstrede. VI-VIII. A C K

A. absinthium L. Malurt. VIII-IX. A B K

A. alba Turra Kamfermalurt. 30-80cm. Glat til hvidfiltet, men ikke sølvskinnende. Bladene 2-3 x delte, fligene knap 1mm brede. Kurvene 4-5mm, i en ganske smal top. VIII-X. A B K

A. coerulescens L. Rank malurt. 30-80cm. Svagt gråfiltet til m.m. glat. Stængelbladene 0-2 x delte. Kurvene m.m. oprette, tenformede. Svøbbæadene kølformede, smalle. Strandenge. IX-X. A

A. campestris L. ssp. glutinosa (Gay) Batt. Klæbrig bynke. Topgrenene klæbrige. Kurvene m.m. siddende, 1½-2½mm. Grundbladene 10-12cm. Topaksens blade 2-4cm og mere. K (Napol.)

A. variabilis Ten. 60-150cm. En stærktgrenet og højere form af Markbynke. Toppens støtteblade udstående til hængende. VIII-X. B C K (Napol., Vesuvio)

Tussilago farfara L. Følfod. II-IV. A B C K

Petasites hybridus (L.) Gaertn.& al. Rød hestehov. III-V. B C K

P. albus (L.) Gaertn. Hvid hestehov. Dobbelt-tandede, nyreformede blade med gråfiltet underside. IV-V. C (Sila) K

P. fragrans (Vill.) Presl Vellugtende hestehov. Bladene 6-20cm brede, regelmæssigt finttandede, med grøn underside. 2-7 skælblade og 5-10 kurve med hvidligt-blegrøde blomster. I-IV. Forv.i B K

Adenostyles. Hovblad. Halvskærme af mange, små, fåblomstrede kurved med 5-8 kurvsvøbblade og lyslilla blomster. Nedre blade nyreformet trekantede med indskåren grund.

Adenostyles australis (Ten.) Nyman Spidstandet hovblad. 40-80cm. Øvre bladstilke uden øret grund. Hovederne med 3-8 blomster på 8-10mm. 1100-1900m. VI-VII. A B C K

A. orientalis Boiss. Trekantet hovblad. 40-80cm. Øvre bladstilke med bredt øret grund. Hovederne med 10-15 blomster på 13-15mm. 1100-1600m. VII-VIII. C (Botte Donato, Aspromonte)

Doronicum orientale Hoffm. Rundtakket gemserod. 20-50cm. Grund- og stængelbladene hjærteformede, helrandede eller uregelmæssigt rundtakkede. Stænglen med 1-2 blade under midten. Jordstænglen tyk med spredte hårduske. 500-1900m. III-V. A B C K

D. columnae Ten. Tuegemserod. 20-60cm. Grundbladene hjærteformede, 3-8cm, med 19-25 spidse tænder. Stænglen ofte bladet til over midten. Jordstænglen tynd, uden hårduske. 500-2000m. V-VIII. ABCK

D. hungaricum Rchb.f. Kirtlet gemserod. 25-85cm. Grundbladene aflange til smalt elliptiske, med tilsmalnet grund, helrandede. Planten m.m. kirteldunet. 500-1500m. V-VII. C (Sila, Piccola m.m.)

Senecio. Brandbæger.

1. Ingen tungekroner ..... 2.
   Med tungekroner 3.
2. M.m. forveddet klatreplante ..... mikanioides
   Enårig med fligede blade vulgaris
3. Bladene udelte, helrandede eller tandede ..... 4.
   I det mindste de midterste stængelblade delte 8.
4. 1 række kurvsvøbblade, ingen ekstrasvøbblade ..... petasitis
   " " " + små " 5.
5. 10-22 tungekroner ..... 6.
   1-8 tungekroner 7.
6. Grundbladene væk i blomst. Stængelbladene ægform. samniticus
   Med grundblade i blomst. Lancetformede stængelblade tenorei
7. Bladene ca.5 x så lange som brede, tænderne 1mm .... fuchsii
   " ca.3 x " " " " , " 2mm nemorensis
8. Bladundersiden hvid- eller gråfiltet ..... 9.
   " grøn 12.
9. Bladoversiden grøn og m.m. glat ..... 10.
   " hvid- eller gråfiltet 11.
10. Kurvsvøbet glat eller fåhåret ..... gibbosus
    " filtet bicolor
11. Kurvsvøbet glat eller fåhåret ..... lycopifolius
    " filtet cineraria
12. Tungekronerne tilbagerullede ..... 13.
    " udstående 14.
13. Bladene fligede, med smalle, uens flige ..... silvaticus
    " lappede, med brede, ret ens lapper lividus
14. Stængelgrunden forveddet. Glatte, blågrønne blade aethnensis
    " ikke forveddet 15.
15. Enårig. Kurvsvøbet nedadrettet i frugt ..... 16.
    2-flerårig. Kurvsvøbet opret-udstående i frugt 17.
16. Frugterne sammentrykte. Nedre blade dybt delte delphinifolius
    Frugterne m.m. trinde. Nedre blade ofte lappede leucanthemifolius
17. 6-14 ydre kurvsvøbblade. Bladskaftet tandet ..... rupester
    0-6 " " 18.
18. 4-6 ydre svøbblade på 1/2 x kurvsvøbet ..... erucifolius
    0-2(6) meget kortere ydersvøbblade 19.
19. Mest 5-7 par ret ens bladafsnit ..... jacobaea
    Bladene lyreformet delte med 1-4 par flige aquaticus

Senecio samniticus (S. cordatus p.p.) 30-60cm. Mellemste blade med afskåret eller afrundet grund, enkelt tandede, med gråt spindelvævshåret underside. VII-VIII. 500-1800m. B C

Senecio tenorei Pign. (S. doronicum p.p.) 10-50cm. Stænglen med 1 stor kurv på indtil 5½cm. Grundbladene 1,5-2,2 x så lange som brede. Randkronerne lidt orange. 800-2000m. V-VIII. A B C K

S. nemorensis L. ssp. stabianus (Lacaita) Pign. Lundbrandbæger. 60-120cm. Med udløbere. (0)1-3 randkroner. Bladene lancetformede, de øvre siddende, med lidt udvidet grund. VII-VIII. B C K

S. fuchsii Gmelin Pilebladet brandbæger. 50-150cm. Bladene lancetformede, de øvre kortstilkede. Mest 5-6 randkroner. Ingen udløbere. 300-2000m. VI-VIII. K

S. cineraria DC. Gråblad. 20-60cm. Denne og de 3 følgende meget nærtstående arter er tæt hvidfiltede halvbuske med 12-15mm brede kurve i tætte, sammensatte halvskærme. - Nedre blade fligede til snitdelte med ca. 5 par afsnit. V-VIII. K (Capri)

S. bicolor (Willd.) Tod. Tofarvet brandbæger. 30-60cm. Nedre blade fjersnitdelte og lidt lyreformede. V-VII. A (Gargano) C (Pizzo) K (Ischia, Capri)

S. gibbosus (Guss.) DC. Puklet gråblad. 30-60cm. Nedre blade dybt delte. Kurvsvøbbladene med en pukkel ved grunden. VI-VII. C

S. lycopifolius Desf. Sværtevældsgråblad. 20-60cm. Bladene lancetformede med dybt fliget grund. VIII-XI. A (Gargano) B (Muro, Balvano) K (Ischia)

S. mikanioides Otto Jærnbanevedbend. -3(6)m. Bladene 3-10cm, runde til trekantet-nyreformede med 3-11 lapper eller kanter. Mange 5-7mm brede kurve i sammensat halvskærm. VIII-X. Forvildet i C

S. petasitis (Sims) DC. Kæmpebrandbæger. 30-120cm. Bladene håndstrengede, de nedre 5-20cm, m.m. runde og svagt lappede, langstilkede og med hjærteformet grund. VIII-X. Dyrket og forvildet.

S. erucifolius L. Smalfliget brandbæger. 40-120cm. Bladenes midterbælte 2-3mm bredt; 5-7 par ofte kun 2mm brede og ensidigt tandede afsnit. VII-IX. A B C K

S. jacobaea L. Engbrandbæger. VI-X. B C K

S. aquaticus Hill ssp. erraticus (Bertol.) Vandbrandbæger. Nedre grene forlængede, ofte meget længere end stænglen. Randkronerne 6mm. Kurvene 8-15(20)mm brede. VI-X. A B C K

S. rupester W.& K. (S. squalidus) Stenbrandbæger. 20-40cm. Bladene med 3-4 par korte flige, hen ad Vårbrandbægers.VI-VIII. BCK

S. aethnensis Jan Lavabrandbæger. 10-40cm. Glat, blågrøn og ofte rødligt anløben med kødede blade. Mest 20 indre og 5-9 ydre kurvsvøbblade. I-XII. C

S. leucanthemifolius Poiret Okseøjebrandbæger. 5-40cm. Ofte meget kødet. Ganske foranderlig. Bladene ofte omvendt ægformede, tandede eller groft fjersnitdelte. XI-V. A B C K

S. delphinifolius Vahl Trekløftbrandbæger. 20-60cm. Stængelbladene dybt 1-2 x delte med smalle, ofte trekløvede flige. Kurvsvøbet blegt. Ca. 12 bleggule kroner. IV-V. A B C

S. vulgaris L. Alm. brandbæger. I-XII. A B C K

S. lividus L. Fennikelbrandbæger. 20-40cm. Med fennikellugt. Planten fåhåret forneden og m.m. kirtelhåret i toppen. Bladene glatte eller noget kirtlede. Frugterne 3-4mm. IV-VI. B C K

S. silvaticus L. Skovbrandbæger. VII-IX. B

Calendula. Morgenfrue.

1. Flerårig med lidt forveddet stængel ..... fulgida
   1-2-årig " helt urteagtig " 2.

2. Randkronerne i 2-flere rækker, mindst 2 x svøbet officinalis
" i 1 række, 1-2 x kurvsvøbet 3.
3. Bladene omvendt lancet- til ægformede. De lange frugter ikke 3-vingede ..... arvensis
Bladene linje-lancetformede. De lange frugter 3-vingede tripterocarpa

Calendula fulgida Rafin. 20-40cm. Kurvene 2½-5(6)cm brede. Randkronerne orange, undertiden med rød spids. Bladene med bølget el. let uregelmæssigt tandet rand. XII-IV. C (Potenza ved Pignola)

C. officinalis L. Alm. morgenfrue. VI-XII. Dyrket og forvildet.

C. arvensis L. Agermorgenfrue. 15-25cm. Opret eller opstigende, ofte ret grenet. Bladene m.m. helrandede. Kurvene 2-3cm brede. Randkronerne gule eller orange. XI-V. A B C K

C. tripterocarpa Rupr. Trevinget morgenfrue. 10-40cm. Som arvensis, men spinklere og liggende. Bladene svagt kirteldunede, spidse, ofte med tydeligt tandet rand. Kurvene 5-12mm brede.XI-VI.C K

Carlina. Bakketidsel.

1. Indre svøbblade hvide, lyserøde eller rødlilla ..... 2.
" " stråfarvede, gullige eller gule 4.
2. Tæt uldhåret enårig. Indre svøbblade rødlilla ..... lanata
Flerårig. Indre svøbblade sølvhvide på indersiden 3.
3. Blomsterne hvide eller svagt rødlige. Tit stængelløs acaulis
" gule. 20-90cm høj sicula
4. Planten stængelløs med 1 siddende kurv ..... acanthifolia
" med stængel og ofte flere kurve 5.
5. Indre svøbblade klart gule ..... corymbosa
" " stråfarvede vulgaris

Carlina corymbosa L. Skærmbakketidsel. 20-50cm. Glat eller fåhåret flerårig med ofte mange kurve i halvskærm. Kurvene 1½-2cm brede. Indre svøbblade 10-16mm. VII-X. A B C K

C. sicula Ten. Halvglat. 2-4 tætsiddende 2½-3½cm brede kurve øverst; undertiden også 1-2 m.m. siddende i bladhjørnerne. Indre svøbblades yderside hvid til rødlilla. VI-VIII. A (Lecce) K (Capri)

C. lanata L. Rødspidset bakketidsel. 10-50cm. Kurvene 2-3½cm brede. Blomsterne lyst rødlilla. Indre svøbblade ca. 12x1½mm. 0-1200m. VI-VIII. A B C K

C. vulgaris L. Alm. bakketidsel. VI-IX. A B C K

C. acaulis L. Sølvbakketidsel 5-40cm. Kurven 4-5cm brede. De indre svøbblade 3-6cm lange. Kun 1 kurv. VI-IX. A B C K

C. acanthifolia All. (C. utzka) Gråfiltet bakketidsel. Bladundersiden filtet. Kurven enlig, 3-7cm bred. Indre svøbblade 3½-5½ cm, stråfarvede. VII-IX. A B C K

Atractylis cancellata L. Enårigt strålehovede. 6-25cm. Stænglerne hvidfiltede. Bladene smalt lancetformede med fint tornet-tandet rand. De øvre blade omgiver kurvene som et svøb. Kurven ægformet, 5-15x5-12mm. Rødlilla kroner. IV-V. A B C

A. gummifera L. Lavt strålehovede. Stængelløs. Bladene 15-40cm, fjerfligede og kraftigt tornede. Den enlige kurv 3-7cm bred med rødlilla blomster. VIII-IX. A B C K

Xeranthemum. Papirsblomst. Enårige med linjeformede til aflange, helrandede blade. Kurvsvøbbladene hindeagtige, de inderste lyserøde, efterligner randkroner. Blomsterne rødlilla.

X. cylindraceum Sm. But papirsblomst. 15-65cm. Yderste svøbblade butte, med en plet af hvide, tiltrykte hår. 13-16 blomster. VI-VIII. A B K

Xeranthemum inapertum (L.) Miller Spinkel papirsblomst. 10-40cm. Yderste svøbblade glatte og med brod. 25-50 blomster. VI-VIII. A B C K

Cardopatum corymbosum (L.) Pers. Blåskærm. 8-25cm. Meget tornet flerårig. Stænglen rigt forgrenet foroven med mange, næsten siddende, ca. 1cm brede, blå kurve i en bred halvskærm.VI-VIII.ABCK

Echinops ritro L. Glatbladet tidselkugle. 30-70cm. Større blades midterdel 3-8mm bred. Bladene fjersnitdelte, hvidfiltede nedenunder. Hovederne blålige, 3½-4½cm brede. VII-IX. A B C K

E. sphaerocephalus L. Kirtlet tidselkugle. 50-200cm. Større blades midterdel 1-3cm bred. Bladene med gråfiltet underside og bløde torne på 1mm. Hovederne hvide til grålige, 5-6(4-8)cm brede. VII-VIII. B K. 2 underarter:
ssp. sphaerocephalus: Ydre svøbblade kirtelhårede.
ssp. albidus (Boiss.& Spr.) Koz.: Ydre svøbblade helt glatte.

E. siculus Strobl 30-100cm. Nær foregående, men bladene med hvidfiltet underside og stive torne på 2-4mm, men uden torne på oversiden. Kurvene 3-4cm brede. 0-1500m. VI-VIII. A B C K

Arctium. Burre.

1. Blomsterstandens hovedgrene halvskærmagtige ..... 2.
   " " klaseagtige 3.
2. Kurvsvøbet tæt spindelvævshåret ..... tomentosum
   " helt eller næsten glat lappa
3. Blomsterne kortere end svøbbladene ..... minus
   " ca. lig svøbbladene nemorosum

Arctium lappa L. Glat burre. VII-IX. A B C K

A. nemorosum Lej. Skovburre. VII-IX. A B K

A. minus (Hill) Bernh. Liden burre. VII-IX. A B C K

A. tomentosum Miller Filtet burre. VII-IX. B (Muro)

Jurinea mollis (L.) Rchb. ssp. moschata (DC.) Nyman Blød bisamtidsel. 30-60cm. Nedre blade fligede. Kurvene langstilkede, 4-5 cm brede; ydre svøbblade nedbøjede. Hvid fnok. V-VII. A B C K

Carduus. Tidsel.

1. Kurvene valseformede til aflange ..... 2.
   " halvkugle-, æg- eller klokkeformede 7.
2. Mellemste svøbblade ½-1mm brede ..... 3.
   " " 1½-2mm " 4.
3. Kronen 15-20mm. Mellemste svøbblade lancetformede corymbosus
   " 10-12mm. " " med påsat spids acicularis
4. Kurvene i grupper på (5)10-20 ..... cephalanthus
   " " " " 1-8 5.
5. Nedre svøbblade højst ½ x så lange som resten .... australis
   " " ikke meget kortere end " 6.
6. Øvre kurve 1-3 sammen. Kronerne længere end svøbet, oftest lyserøde ..... pycnocephalus
   Øvre kurve 4-8 sammen. Kronerne kortere end svøbet, oftest rødlilla tenuiflorus
7. Svøbbladene smalt hindekantede, de indre med udvidet spids. Bladene ofte hvidårede ..... argyroa
   Svøbbladene ikke hindekantede 8.
8. Midterste kurvsvøbblade indsnørede på midten ..... 9.
   " " ikke indsnørede 11.
9. Bladene 1/3-4/5 delte, sjældent spindelvævshårede ... nutans
   " helt delte, oftest spindelvævshårede 10.
10. Bladene 8-25x3-10cm. Fnokken 18-24mm ..... macrocephalus
    " 8-10x1½-2½cm. " 13-18mm micropterus

11. Kurvene spindelvævshårede. Gultornede kurve chrysacanthus
" lidet spindelvævshårede 12.
12. Svøbbladene randhårede, ½-1mm brede ..... corymbosus
" ikke randhårede 13.
13. Bladene læderagtige og glatte. Bladet til tæt på kurvene carlinaefolius
Anderledes 14.
14. Ydre svøbblade meget kortere end de midterste .... collinus
" " lidet " " " " affinis

Carduus nutans L. Nikkende tidsel. 40-100cm. Stængler og blade kraftigt tornede. Kurvene 3-5cm brede, ofte noget nikkende. Svøbbladene m.m. udad- til nedadbøjede. VI-VIII. A B C K

C. micropterus (Borbas) Teyber Smalvinget tidsel. 40-70cm. Nær nutans, men stænglens vinger smallere og bladene mindre. Kurvene mest enlige og langstilkede. VI-VIII. A B C K. 2 underarter:
ssp. micropterus: Kurvsvøbet med m.m. afrundet eller lidt afladet grund; svøbbladene 2-4mm brede, tiltrykte. A (Gargano)
ssp. perspinosus (Fiori) Kazmi: Kurvsvøbet med tydeligt afskåret grund; svøbbladene 1½-2mm brede, oprette eller m.m. udstående.

C. macrocephalus Desf. Storhovedet tidsel. 30-60cm. Nær nutans, men kurvene indtil 8cm brede, enlige på ofte lange, vingeløse stilke. Svøbbladene ca. 20-35x2-4mm. VI-VIII. A B C K
(C. taygeteus Boiss.& Heldr. afviger fra macrocephalus, ved kun at have bladribberne ophøjede i deres ydre halvdel og ikke over hele længden. ?)

C. chrysacanthus Ten. Gultornet tidsel. 30-50cm. Bladene med 10-12 par lapper og stive, gule torne. Kurvene 4-5cm brede, ofte siddende. Svøbbladene 2-3½mm brede, stivtornede. VII-VIII. ABCK

C. carlinaefolius Lam. Furetidsel. 10-50cm. Kurvsvøbbladene uens og korttornede. Planten ofte stærkt grenet og stærkt tornet. Kurvene ofte nikkende. VII-VIII. B C K

C. collinus W.& K. Skrænttidsel. 30-100cm. Stænglen uvinget foroven. Bladundersiden uldhåret. Kurvene nikkende i knop, ydre svøbblade tiltrykte. VI-VIII. B (Muro)

C. affinis Guss. Vængetidsel. 20-90cm. Stænglen vinget til nær kurvene. Bladene lappede og krusede. Kurvene i en slags halvskærm. Ydre svøbblade ofte udstående. 1500-2200m. VI-VIII. B C K. 2ssp.:
ssp. affinis: Bladundersiden hvidfiltet.
ssp. brutius (Porta) Kazmi: Bladundersiden svagt spindelvævshåret. C (M.Mula og Cozzo Pellegrino)

C. argyroa Biv. Hindekantet tidsel. 20-75cm. Stænglen grenet hele vejen, bredvinget med kraftige torne (4-6mm). Bladene kraftige med 3-5 par lapper. Kronen lyserød, 10-14mm. IV-V. A K

C. corymbosus Ten. Syltidsel. 30-70cm. Stænglen uvinget foroven. En del ofte ret kortstilkede kurve. Bladundersiden håret. Blomsterne længere end svøbet, dette aflangt. IV-VI. A B C K

C. acicularis Bertol. Nåletidsel. 30-60cm. Ligner foregående, men bladundersiden hvidt spindelvævsfiltet. Kurvene på lange, uvingede stilke. Blomsterne højst = svøbet. V-VII. A B K

C. pycnocephalus L. Piltidsel. 20-60cm. Stænglen ofte vinget til kurvene. Bladene med 3-5 par lapper og hvidfiltet underside. Midterste svøbblade spindelvævsfiltede, meget fint randhårede. ABCK

C. tenuiflorus Curtis Smalhovedet tidsel. 20-70cm. Nær foregående, men de midterste kurvsvøbblade glatte til svagt spindelvævshårede og ikke randhårede. IV-VII. A (Gargano) K (Napol.)

C. australis L.f. Marmortidsel. 30-80cm. Kurvene mest 3-5 sammen, overrages af de øvre blades torne. Bladene ofte hvidbrogede.

Kronen ofte hvid. Svøbbladene ofte lillaspidsede. IV-V. A K

Carduus cephalanthus Viv. Lædertidsel. 30-120cm. Bladene læderagtige, næsten helt delte. Kurvene i et tæt knippe, overrages af øvre blades torne. IV-VI. C (Reggio)

Cirsium. Tidsel.

1. Bladoversiden ikke finttornet ..... 2.
   " finttornet 5.
2. Stænglen bladløs foroven. Kurven mest enlig .... pannonicum
   " bladet til spidsen, med mange kurve 3.
3. Stænglen uvinget foroven. Kurvene lyslilla ..... arvense
   " vinget " . " rødlilla 4.
4. Bladtornene 2-6mm. Svøbbladene med en længdevulst palustre
   " 5-15mm. " uden " creticum
5. Bladene nedløbende ..... 6.
   " ikke nedløbende 7.
6. Kurvene 1-1½cm brede, overrages af støtteblade .... italicum
   " 2-4cm " , omgives ikke af støtteblade vulgare
7. Bladene højst 1/3 indskårne ..... scabrum
   " dybt indskårne 8.
8. Ydre svøbblade udstående ..... tenoreanum
   " " m.m. oprette 9.
9. Kurvene omgivne af over 10 linjeformede højblade vallis-demonis
   Kurvene omgivne af 3-6 højblade mindst af kurvenes længde samt af talrige mindre lobelii

Cirsium italicum (Savi) DC. Lansetidsel. 20-45cm. Stænglen spinkel. Bladene bleggrønne, noget filtede nedenunder. Svøbbladene med en brunlilla køllignende vulst under spidsen. VII-X. A B K

C. vulgare (Savi) Ten. Horsetidsel. VI-X. A B C K. 2 ssp.:
ssp. vulgare: Bladundersiden håret, men grøn. Ægformet kurv.
ssp. silvaticum (Tausch) Dostal: Bladundersiden grå- til hvidfiltet. Kurven m.m. kugleformet.

C. tenoreanum Petrak Småhovedet uldtidsel. 15-60cm. Ofte mange kurve i en tæt halvskærm med 2-8 højblade på ca. = kurven. Denne 20-25x12-30mm, mest tæt uldhåret. 1000-1800m. VII-IX. A B K

C. lobelii Ten. Ruhovedet tidsel. 30-50cm. 1-få tætsiddende kurve på 30-50x30-50mm, spindelvævshårede. Mellemste svøbblade udvidede i et blegt, uregelmæssigt tandet-frynset vedhæng. VI-IX. K

C. vallis-demonis Lojac. Smalfliget tidsel. 50-110cm. Kurvene i halvskærm, 25-40x20-40mm. Mellemste svøbblade med frynset og småtornet spids. Kronen hvid eller rødlilla. VII-IX. 800-1500m. C (Pollino, Sila, Serra S. Bruno)

C. scabrum (Poiret) Bonnet & Barratte Rubladet tidsel. 1-2m. Bladene meget store, de nedre 40-80cm, i roset. 1-3 kurve sammen på lange grene i en åben top. VI-IX. A (Bitonto) C

C. arvense (L.) Scop. Agertidsel. V-IX. A B C K

C. palustre (L.) Scop. Kærtidsel. VI-IX. B C K

C. creticum (Lam.) D'Urv. Damtidsel. 50-100cm. Bladene stærkt bølgede med indrullet rand og kraftige torne på 5-15mm. Svøbbladene ægformede med lang spids. VII-VIII. A B C K. 2 underarter:
ssp. creticum: Kurvene 1-4 sammen. Kurvsvøbbladene med en torn på ½-1(2)mm.
ssp. triumfetti (Lacaita) Werner: Kurvene 3-12 sammen. Ydre svøbblade med en torn på 1-3(5)mm, indre med een på 4-8(11)mm.

C. pannonicum (L.f.) Link Lancettidsel. 50-80cm. Bladene lancetformede, helrandede eller finttandede, kort nedløbende, Kurven langstilket. V-VIII. B

Picnomon acarna (L.) Cass. Tornsvøb. 20-50cm. Gråt spindelvævsfiltet enårig. Stænglen med finttandede vinger. Bladene nedløbende. Kurvene i nøgler, omgivne af de øvre blade som en slags svøb. Svøbbladene med en krummet, fjerfliget spids. VI-VII. A B C K

Notobasis syriaca (L.) Cass. Spydtidsel. 20-150cm. Enårig. Stænglen uvinget. Bladene læderagtige; de øvre fjersnitdelte og stort set reducerede til ribberne; omgiver kurvene som et svøb. V-VI. A B C K

Ptilostemon.

1. Planten uden torne. Bladene linjeformede ..... gnaphaloides
   Bladene i det mindste med torne ved grunden 2.
2. Bladene med torne ved grunden, ellers helrandede stellatus
   " " tornet rand 3.
3. Stænglen med tornede vinger af nedløbende blade ... strictus
   " uvinget. Bladene ikke nedløbende niveus

Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter Rank tidsel. 60-100cm. Bladtornene 2-5mm. Kurvene i tætte nøgler på stængler og grene, 17-24 x 12-17mm. Kronen 16-21mm. 300-1300m. VII-X. B C

P. niveus (Prsel) Greuter Filttidsel. 20-65cm. Bladene med snehvid underside og torne på 5-9mm. Stænglen med 1-5 kurve på 37-50 x 32-40mm. Kronen 30-33mm. 1200-1900m. VI-VII. C (Pollino)

P. gnaphaloides (Cyr.) Sojak Frynset græstidsel. 30-60cm. Halvbusk. Bladene 60-80x1-2mm, omrullede, tætstillede forneden. Få kurve, 12-16mm brede. IV-VI. C (Stilo, Gerace, Pazzano)

P. stellatus (L.) Greuter Tvetornstidsel. 15-30(50)cm. Enårig. Bladene 3-4½cm x 2-4mm, med 2(1-3) par store, gule torne på 6-9mm ved grunden. Lange, sylformede svøbblade. VI-VII. B C K

Galactites tomentosa Moench Kamtidsel. 15-100cm. M.m. hvidfiltet enårig. Bladene hvidårede eller hvidbrogede ovenpå, hvidfiltede nedenunder, ret smalfligede. 1-flere kurve sammen. Lyst rødlilla kroner. Svøbbladene med en lang, furet torn. V-VII. A B C K

Tyrimnus leucographus (L.) Cass. Stilktidsel. 30-100cm. Enårig. Kurvene 1½-2½cm, enlige på lange, bladløse stilke. Bladene tynde, nedløbende, hvidårede med gråulden underside. V-VII. A B C K

Onopordum. Æselfoder.

1. Kurvsvøbbladene 5-7mm brede, bredest 1/3 oppe .... illyricum
   " 1,2-5mm brede, bredest ved grunden 2.
2. Planten grå- eller hvidfiltet ..... acanthium
   " grøn 3.
3. Kurvsvøbbladene tæt kirtlede (lup) ..... tauricum
   " ukirtlede horridum

Onopordum acanthium L. Alm. æselfoder. VII-VIII. A B

O. horridum Viv. Krogæselfoder. 50-150cm. Kurvsvøbbladene 3-5mm brede ved grunden, de ydre med nedbøjet spids. Planten tætkirtlet forneden. VI-VIII. A B C K

O. tauricum Willd. Klæbrig æselfoder. 50-200cm. Stængel og blade kirtlede og m.m. klæbrige. Stænglen gulbrun, vingerne ofte mellembrudte. Svøbbladene ofte lillaspidsede. VII-VIII. A (Leccese)

O. illyricum L. Æghovedet æselfoder. 30-130cm. Stænglens vinger ofte smalle og mellembrudte. Kurvene ægformede. Svøbbladene taglagte, de ydre og mellemste med nedbøjet spids. VI-VIII. A B C K

Cynara cardunculus L. Spansk ærteskok. 20-100cm. Bladene op til 50x35cm, 1-2 x delte med 1½-3½cm lange, gule torne.
Kurvene 4-5cm. Svøbbladene med en torn på 1-5cm. VI-VIII. A B C K

Silybum marianum (L.) Gaertner Marietidsel. 20-150cm. Toårig.

Nedre blade store og kraftige, 25-50cm, skinnende og læderagtige, hvidbrogede med kraftige torne. Kurvene 2½-4cm. Svøbbladene med en lang, furet og noget nedbøjet torn på 2-5cm med mindre sidetorne midtpå. VI-VIII. A B C K

Serratula tinctoria L. Engskær. Kurvene 2-5 sammen i grenenderne. VIII-X. B K

S. cichoracea (L.) DC. Gultornet engskær. 20-60cm. Lidet grenet, ofte 1-kurvet. Bladene læderagtige og lancetformede, ofte helrandede. Kurven 3-4cm. Svøbbladene 3-5-ribbede, de ydre med en 3-7mm lang, gul torn, der ofte er udadbøjet som moden. VI-VII. A B C K

Mantisalca duriaei (Spach) Briq.& Cav. (M. salmantica p.p.) 20-100cm. Enårig. Bladene 8-12cm, de nedre fjersnitdelte, de øvre linje-lancetformede. Kurven 10-15mm, ægformet, langstilket. Frugterne med en skæv spids, de ydre uden fnok. VI-VII. A B C

Centaurea. Knopurt.

1. Blomsterne blå ..... 2.
   " røde eller gule 4.
2. Enårig ..... cyanus
   Flerårig 3.
3. Bladundersiden grøn eller grågrøn ..... triumfetti
   " hvidfiltet cana
4. Blomsterne gule ..... 5.
   " røde 9.
5. Svøbbladenes vedhæng med 1 torn og nogle frynser ..... 6.
   " " " flere torne 7.
6. Bladene lyreformede. Kurvsvøbet 20-25mm bredt centauroides
   " ikke lyreformede. Kurvsvøbet 13-17mm bredt collina
7. Stænglen uvinget. Øvre blade ikke nedløbende .... nicaeensis
   " vinget foroven. Øvre blade nedløbende 8.
8. Bladene uldhårede eller gråfiltede ..... solstitialis
   " grønlige og ru melitensis
9. Kurvsvøbbladene med flere torne ..... 10.
   " højst med en kort torn 13.
10. 1 stor torn på 14-25mm og nogle småtorne ..... calcitrapa
    Svøbbladstornene lige store 11.
11. Stænglerne ikke vingede ..... sphaerocephala
    " vingede foroven 12.
12. Flerårig. Kurven ca. 20mm bred ..... sonchifolia
    Enårig. Kurven ca. 10mm bred napifolia
13. Kurvsvøbbladene helrandede, uden noget vedhæng centaurium
    " med et vedhæng 14.
14. Vedhænget adskilt fra svøbbladet af en indsnøring ..... 15.
    " nedløbende ad svøbbladets sider 18.
15. Bladene 1-2 x fjersnitdelte ..... 16.
    " hele 17.
16. Stængler og blade grønne eller grågrønne. Toårig ..... alba
    " " " hvidfiltede. Flerårig diomedea
17. Vedhænget rundagtigt og helt eller laset, lyst .. bracteata
    " trekantet, sortagtigt og frynset nigrescens
18. Svøbbladsvedhænget strå- eller lyst rustfarvet ... leucadea
    " brunt til sortagtigt 19.
19. Fnokken 1/3-1/2 x frugten. Vedhænget korttornet .. subtilis
    " mindst 2/3 x frugten 20.
20. Kurven 15-20mm bred ..... ambigua
    " 9-15mm " 21.
21. Vedhænget med 6-7 par frynser. Planten hvidfiltet cineraria
    " " 3-4 " " . " gråfiltet tenorei

Centaurea centaurium L. Bøgeknopurt. 50-100cm. Glat. Nedre blade indtil 50x25cm med bredt lancetformede afsnit på 12-16x5-7cm. Kurvene 15-17mm brede. Kronerne mørkt rødlilla. 500-1500m. VI-VII. A (Gargano, Martina) B C (Pollino, Sila)

Centaurea collina L. Bakkeknopurt. 20-60cm. Nedre blade 1-2 x delte, de større afsnit 25-40x3-4mm. Vedhænget lysebrunt med en torn på 5-10mm. VII-VIII. A (Taranto)

C. centauroides L. Sortåret knopurt. 30-100cm. Bladene med 3-5 par sideafsnit. Vedhænget med en kraftig torn på 6-20mm. Blomsterne med sorte årer. 0-600m. VI-VII. A (Gargano til Canosa) B C (Østlige Avellinese ved Callistri og Lacedonia)

C. cineraria L. Kystknopurt. 30-60cm. Helt hvidfiltet. Nedre blade 1-2 x fjersnitdelte; nederste fligpar ofte tilbagerettet. Kurvene 9-12mm brede. Kystklipper. VI-VIII. C K (Capri m.m.)

C. leucadea Lacaita 30-50cm. Hvidfiltet. Nedre blade 2 x delte med flige på 8-18x2-4mm. Kurvsvøbet ca. 10mm bredt. Overhængende kalkklipper. VI-VII. A (Capo S. Maria di Leuca)

C. subtilis Bertol. Spinkel knopurt. 20-30cm. Hvidfiltet. Grundbladene med højst 5 linjeformede afsnit på 10x1mm. Kurvene 8mm brede med grønne svøbblade med en torn på 1mm. Kalkklipper. V-VI. A (Gargano ved M.S.Angelo, Mattinata og til Vieste) B (Matera)

C. tenorei Guss. 30-70cm. Nedre blade 1-2 x delte. Mange 9-15mm brede kurve. Vedhængenes længere frynser 2-3½mm. Rødlilla blomster. VI-VII. C (Pen. Sorrentina)

C. ambigua Guss. ssp. nigra (Fiori) Pign. (C. parlatoris ssp. n.) 10-30cm. Stænglerne mest ugrenede. Planten gråfiltet men snart halvglat. De mørke vedhæng dækker kurvsvøbet helt. VI-VIII. K

C. diomedea Gasparr. 20-40cm. Bladene mest 1 x delte. Kurvene 11-13mm brede. Svøbbladsvedhænget rundagtigt, ofte helrandet, med en brun, trekantet midterplet. Kystklipper. VI-VII. A (Is. Tremiti på S.Domino, S.Nicola m.m.; fastlandet mellem Corsano og Galliano ved Marina di Novaglie)

C. alba L. (C. deusta) Rasleknopurt. 30-60cm. Grundbladene 10-15 cm, 1-2 x fjersnitdelte. Kurvene 10-12(6-15)mm brede. Svøbbladsvedhænget tilspidset ægformet og hindeagtigt. VI-VIII. A B C K.
ssp. deusta: Kurvene 10-14mm brede. Vedhænget med en sortbrun eller sort plet. Bladene mest 1 x delte.
ssp. splendens (L.) Arc.: Kurvene 11-12mm brede. Vedhænget med en lysebrun plet. Bladene mest 2 x delte.
ssp. divaricata (Guss.): Kurvene 6-10mm brede. Ofte grenet fra grunden og ofte udspærret grenet. A C

C. bracteata Scop. Hvidskællet knopurt. 30-60cm. Kurvsvøbet 14-20mm bredt, helt dækket af de hindeagtige, ofte hvide svøbbladsvedhæng. VI-VII. A B C K

C. nigrescens Willd. Sortspættet knopurt. 40-100cm. Bladene æglancetformede til lancetformede, ru. Svøbbladsvedhænget 1-1½mm med 6-8 par korte, brune frynser. VI-VIII. A B C K. 2 ssp.:
ssp. ramosa Gugler: Kurvsvøbet m.m. ægformet, 8-11mm bred. Vedhænget ca. så langt som bredt. Planten tæt filtet. B K
ssp. neapolitana (Boiss.) Dostal: Kurvsvøbet valseformet, 10-11mm bredt. Vedhænget længere end bredt, brunt. Spindelvævshåret.

C. triumfetti All. ssp. triumfetti Fløjlsknopurt. 10-50cm. Bladene mest hele og helrandede. Svøbbladene med langt nedløbende lysebrun rand og 2-4mm lange, sølvhvide frynser. V-VIII. A B C K

C. cana S.& S. (C. triumfetti ssp. c.) 3-20cm. Bladene hele eller lyreformede. Svøbbladene med mørkebrun rand, ellers som hos foregående. 1700-2400m. VI-VII. B C (Pollino)

C. cyanus L. Kornblomst. V-VI. A B C K

C. sphaerocephala L. Sandknopurt. 5-50cm. Mest opstigende. Nedre blade lyreformede, klæbrige og m.m. sanddækkede. Kurvene 2½-3cm brede. Vedhænget med 5-9 gule torne på 3-5mm. VI-IX. A B C K

Centaurea sonchifolia L. Svinemælksknopurt. 20-40cm. Opret. Bladene fint stivhårede, de nedre æg- til lyreformede. Kurven 2cm bred. Kurvsvøbet som hos foregående. VI-VIII. C (S. Eufemia)

C. napifolia L. Rapsbladet knopurt. 30-50cm. Enårig. Bladene grådunede, de nedre lyreformede. Kurvene 10-13mm brede. Vedhænget 3 x så bredt som svøbbladet, vifteformet med 5-9 torne. V-VII. C K

C. calcitrapa L. Stjærnetidsel. 20-100cm. Toårig. Nedre blade 1 x delte med lancetformede flige. Kurvene siddende, 6-8mm brede, omgivne af de øvre blade. VI-VIII. A B C K

C. melitensis L. Vinget knopurt. 30-60cm. Talrige 7-9mm brede hoveder. Vedhænget lyst med en torn på 8-12mm. Frugten 2½ mm med en fnok på 2mm. V-VIII. A C

C. solstitialis L. Tornet knopurt. 20-50cm. Kurvene 7-15mm brede. Frugten 2½mm, sort, fnokken indtil 5mm. VI-VIII. 2 ssp.:
ssp. solstitialis: Tornene gullige, den midterste 9-17mm, kraftigere og meget længere end de andre.
ssp. adamii (Willd.) Nyman: Tornene brunlige, den midterste 5-10 mm eller mindre, kun lidt kraftigere og længere. B C

C. nicaeensis All. Øreknopurt. 30-60cm. Toårig. Nedre blade lyreformede, øvre lancetformede. Kurvene 12-18mm brede. Den store torn 10-15mm. Fnokken ½ x frugten. V-VIII. A B C

Crupina. Krybefrø. Slanke enårige på 20-50cm. Bladene 1 x delte, smalfligede og finttandede. Smalt ægformede kurve i åben top.

C. vulgaris Cass. Alm. krybefrø. Kurvgrunden kegleformet. Kurven med 3-5 blomster. Frøets tilhæftningspunkt rundt og endestillet. V-VI. A B C K

C. crupinastrum (Moris) Vis. Flerblomstret krybefrø. Kurvgrunden afrundet. Kurven med 9-15 blomster. Frøets tilhæftningspunkt linjeformet og sidestillet. IV-VI. A B C K

Cnicus benedictus L. Korbendikt. 20-60cm. Enårig. Bladene aflange, lysegrønne med hvidåret underside, fint tornet-tandede, de nedre m.m. delte, de øvre m.m. bølgede. De øverste omgiver kurven som et svøb. V-VI. A K (væk nu?)

Carthamus lanatus L. Gul svøbtidsel. 30-60cm. Noget spindelvævsfiltet enårig. Stænglen brunlig til stråfarvet. Indre svøbblade med et lille, tandet eller helrandet vedhæng. VI-VIII. A B C K

Carduncellus coeruleus (L.) C.Presl Blå æselkurv. 30-60cm. Flerårig med ugrenede stængler. Bladene lancetformede med finttornet rand, meget forskelligt indskårne. Kurvene oftest enlige, omgivne af udstående højblade. VI-VII. A B C

Scolymus. Gyldenrod. Planten stærkttornet som en tidsel, men med gule, cikorielignende blomster.

S. maculatus L. Hvidkantet gyldenrod. 15-90cm. Enårig. Blade og stængler med en fortykket, hvid kant. Kurvene i en slags halvskærm. Kronbladene 15-17mm. VI-VII. A B C K

S. hispanicus L. Alm. gyldenrod. 20-80cm. 2-flerårig. Ikke hvidkantet. Stænglens vinger mellembrudte. Kurvene i en smal top. Kronbladene 16-17mm. VI-VIII. A B C K

S. grandiflorus Desf. Storblomstret gyldenrod. 20-80cm. Flerårig. Ikke hvidkantet. Stænglens vinger ubrudte. Kurvene i en halvskærm. Kronbladene 23-25mm. V-IX. B C K

Cichorium. Cikorie.

1. Flerårig. Indre frugters fnokskæl 0,1-0,2mm. Ydre svøbblade ca. ½ x de indre ..... intybus
   Enårig. Indre frugters fnokskæl 0,7-1,4mm. Ydre svøbblade næsten lig de indre 2.

2. Kurvstilken stærkt fortykket. Lidet grenet ..... pumilum
" lidt fortykket. Stærkt grenet endivia

Cichorium intybus L. Cikorie. VII-X. A B C K

C. endivia L. Endivie. (20)60-130cm. Bladene tandede til fligede. Dyrket.

C. pumilum Jacq. Vild endivie. 15-30(60)cm. Bladene mest savtakkede. VII-IX. A B C K

Catananche lutea L. Gul rasleblomst. 6-40cm. Enårig. Bladene smalt lancetformede, de nedre indtil 15cm. Svøbbladene hindeagtige og gulbrune. Blomsterne gule. IV-VI. A B C K

Tolpis umbellata Bertol. (T. barbata p.p.) Gult kristøje. 20-60 cm. Opret enårig. Let kendelig på de lange, børsteformede ydre svøbblade, der danner et svøb uden om kurven. Kronerne svovlgule. IV-VI. A B C K

T. virgata (Desf.) Bertol. Svovlkurv. 20-60cm. Oftest flerårig. Stænglens grene spidsvinklet udgående og rager op over den. Bladene m.m. lancetformede, helrandede til tandede. Kronerne svovlgule. Kurvsvøbet 6-8mm. V-VII. A B C K. 2 underarter:
ssp. virgata: Kronerne indtil 10mm. Fnokken med 4-6 børster. Grundbladene m.m. lancetformede, indskårne eller lappede.
ssp. grandiflora (Ten.) Pign.: Kronen ca. 15mm. Fnokken med 5-10 børster. Grundbladene ægformede, tandede ved grunden. 500-1400m.

Hyoseris. Svinefoder.

1. Enårig. Kurvstilken udpræget kølleformet fortykket .. scabra
Flerårig. Kurvstilken ikke eller lidet fortykket 2.
2. Bladene glatte, lidt kødede, skinnende ovenpå ..... lucida
" m.m. hårede, ikke kødede radiata

Hyoseris scabra L. Ru svinefoder. Bladene i roset, 5-8x1cm, snitdelte med ægformede, m.m. tandede afsnit, ru og noget melede. Kurvene 7-10x3-5mm. II-IV. A B C K

H. radiata L. Glat svinefoder. Bladene større, 10-14x2-2½cm. Kurvene 10-15x7-15mm. I-XII. A B C K

H. lucida L. (H. baetica) Skinnende svinefoder. Som radiata, men bladene med helrandede eller noget tandede lapper. IV-IX. A C K

Hedypnois cretica (L.) Willd. Ribbekurv. 3-25cm. Enårig rosetplante med ofte grenede og noget bladede stængler. 2 rækker svøbblade, den ydre meget lille. Frugterne m.m. valseformede, ofte krumme. Kurvstilkene stærkt fortykkede. III-V. A B C K

H. rhagadioloides (L.) Willd. 3-25cm. Som foregående, men med slanke kurvstilke. III-VI. A B C K

Rhagadiolus stellatus (L.) Willd. Stjærnefrø. 20-40cm. Opret, grenet enårig, mest enstænglet. Nedre blade spatelformede og tandede forneden, de øvre linjeformede. 2 rækker svøbblade, den ydre ganske kort. De korte, indre frugter jævne; de 8-15 ydre er 10-15 mm lange og stjærneformet udstående. III-VI. A B C K

R. edulis Gaertner Lyrebladet stjærnefrø. 10-40cm. Som stellatus, men de nedre blade lyreformede med 3-4 par sideflige. De korte, indre frugter er rynkede. III-VI. A B C K

Urospermum picroides (L.) Scop. Rut halefrø. 30-45cm. M.m. stivhåret enårig. Bladene stængelomfattende, fjerfligede til tandede. 1-9 op til 4cm brede, langstilkede kurve. Frugt og næb afsatte fra hinanden. II-VII. A B C K

U. dalechampii (L.) Scop. Blødt halefrø. 25-40cm. Udstående håret flerårig. Nedre blade høvlfligede, øvre m.m. helrandede. Op til 5cm brede, langstilkede kurve med svovlgule kroner. A B C K

Hypochoeris. Kongepen.

1. Kurvsvøbbladene lige lange ..... 2.
   " af forskellig længde 4.
2. Enårig. Ydre fnokhår ½mm, indre række 4-6mm ... achyrophorus
   Flerårig 3.
3. Stænglen ofte grenet. Frugten langnæbbet ..... laevigata
   " ugrenet. Frugten uden egentligt næb robertia
4. Bladene fjersnitdelte og smalfligede ..... cretensis
   " tandede til lappede 5.
5. Flerårig. En stribe mørke hår på svøbbladets spids radicata
   Oftest glat og enårig. Ydre frugter uden næb glabra

Hypochoeris glabra L. Glat kongepen. IV-V. A B C K

H. radicata L. Alm. kongepen. IV-VII. A B C K

H. cretensis (L.) Bory & Chaub. Smalfliget kongepen. 10-40cm. Flerårig. Bladene glatte til stivhårede. Ydre frugter med kort, indre med langt næb. IV-VI. A B C K

H. robertia Fiori Næbløs kongepen. 8-15cm. Bladene glatte og bugtet-fligede. Stænglerne med nogle småskæl. Kurvene op til 10 mm brede. 1 række fnokhår. 800-2500m. V-VIII. B C K

H. achyrophorus L. Enårig kongepen. 8-35cm. Planten stivhåret, kan have stængelblade. Bladene svagt tandede. Svøbbladene med 2 rækker børster på 2-3mm. II-VII. A B C K

H. laevigata (L.) Ces.& al. Skælrodskongepen. 10-30cm. Roden med brune, hindeagtige bladrester. Svøbbladene tæt stivhårede. Kronerne svovlgule. III-VI. B (Pollino) C

Leontodon. Borst.

1. Stænglen med over 5 skælblade under kurven ..... 2.
   " " 0-3(5) " " " 3.
2. Stænglerne grenede. Griflerne mørke ..... autumnalis
   " ugrenede. " gule cichoraceus
3. Ydre frugter med skæl- eller kroneformet fnok ..... 4.
   Alle " " veludviklet hårformet fnok 5.
4. Ydre kroner med en grålilla stribe udvendigt .. taraxacoides
   " " " " grønlig " " tuberosus
5. Bladhårene enkle eller ganske kort tvekløvede ..... hirtus
   " tydeligt grenede (eller planten glat) 6.
6. Bladhårene mest 4-grenede, grenene så lange som skaftet intermedius
   Bladhårenes grene tydeligt kortere end skaftet 7.
7. Frugterne svagt tværrynkede, uden stive hår ..... hispidus
   " tværrynkede forneden, kort stivhårede foroven crispus

Leontodon autumnalis L. Høstborst. VI-XI. C (Sila)

L. crispus Vill. Kruset borst. 4-20cm. De stilkede grenhår med 2-6 grene. Med lodret pælerod. De ydre kroner mest gule. Fnokken med 2 rækker fjerformede hår. IV-VI. A B C K

L. hispidus L. Stivhåret borst. Med skæv og afskåret rod. De ydre kroner med rødlig eller orange yderside (sj. grålilla). Ydre række fnokhår finttandede. VI-X. A B C K

L. hirtus L. (L. villarsii) Håret borst. 7-30cm. Bladene smalfligede og med tykgrundede hår. Svøbet med stive, hvide alm. hår eller lange, tvekløvede hår. VI-IX. A B C K

L. intermedius Huter & al. 5-15cm. Med lodret pælerod. Svøbbladene randfrynsede af ofte tvegrenede hår, eller med en midterlinje af tvegrenede hår og stjærnehårsrand. V-VI. A (Gargano) B C (Pollino)

Leontodon cichoraceus (Ten.) Sanguin. Cikorieborst. 8-40cm. Helt uden grenhår; glat eller med få alm. hår. Svøbet glat eller med sorte hår. Ydre kroner rødstribede. V-VII. A B C K

L. taraxacoides (Vill.) Mérat Hundesalat. VII-IX. K

L. tuberosus L. Knoldborst. 15-40cm. Med fortykkede rødder. Stænglerne uden skælblade, med få gaffelgrenede hår. Kurvsvøbet med få grenhår. X-VI. A B C K

Picris. Bittermælk.

1. 2 rækker kurvsvøbblade. Frugten langnæbbet ..... 2.
   Kurvsvøbet taglagt. Frugten kortnæbbet 3.
2. Kurvstilken ikke fortykket efter blomstringen .... echioides
   " fortykket efter blomstringen aculeata
3. Nedre blade fligede. Kurvsvøbet melet ..... scaberrima
   Bladene helrandede til tandede. Kurvsvøbet grønt hieracioides

Picris echioides L. Vingekurv. 40-60cm. Stærkt stivhåret enårig. Børsterne ofte med hvidknudret grund. Ydre 3-5 svøbblade meget store, æg-hjærteformede, dækker næsten de 8 indre. VI-VIII. ABCK

P. aculeata Vahl Stikkende bittermælk. 20-50cm. Flerårig med stikkende børster. Nedre blade i roset, m.m. tandede. Få kurve på 14-18mm. Ydre svøbblade ½ x de indre. V-VI. A B (Muro) C

P. hieracioides L. Ru bittermælk. VI-X. A B C K

P. scaberrima Guss. Fliget bittermælk. 30-70cm. Kurvene klaseagtigt stillede. Kurvsvøbet 9-10mm. 300-1000m. VII-VIII. B (Balvano, Muro, Castelgrande) C (Pollino, Castrovillari, Spezzano Albanese)

Scorzonera. Svinerod.

1. Bladene fjerfligede ..... laciniata
   " helrandede eller tandede 2.
2. Kronerne lyst rødlilla ..... undulata
   " gule 3.
3. Ydre svøbblade butte, uldhårede ..... humilis
   " " tilspidsede 4.
4. Fnokken hvidlig. Kronerne 24-30mm. Indre svøbblade 20-25mm 5.
   " rødlig. " 15-16mm. " " 12-15mm 6.
5. Bladene 2-4(13)mm brede, linjeformede ..... glastifolia
   " 1½-4(5)cm " trachysperma
6. Fnokken 2 x den tæt hvidhårede frugt ..... hirsuta
   " ca. = den glatte frugt villosa

Scorzonera laciniata L. (Podospermum l.) Enårigt fodfrø. 15-45 cm. Flerstænglet og ofte grenet. Ydre svøbblade ofte med horn. Frugterne med en bleg, hul fod på ca. 1/3 x frugten.V-VII. ABCK

S. undulata Vahl ssp. deliciosa (Guss.) Maire Sukkersvinerod. 10-15(30)cm. Grundbladene 3-15cm x 2-7mm, flade. Nedre svøbblade hvidrandede. Frugten med en bleg, hul fod på ca. 1/5 x frugten. IV-V. C (Gerace)

S. humilis L. Lav svinerod. VI-VII. B K

S. glastifolia Willd. Smalbladet sortrod. 30-100cm. V-VII. ABK

S. trachysperma Guss. (S. hispanica p.p.) Vejbredsvinerod. 20-40cm. Grundbladene lancetformede, stængelbladene linjeformede. Frugt og fnok ca. 10mm. V-VI. A (Brindisi) B (Picciano) C (Roccella, Gerace) K?

S. hirsuta L. Håret svinerod. 20-40cm. Stænglen stribet, med snoede hår. Bladene 2-3mm brede, med snoede hår, stive og med fremtrædende ribber. IV-VI. A B C

S. villosa Scop. Lådden svinerod. 40-60cm. Stænglen stribet, finbørstet. Nedre blade blågrønne og noget voksagtige, 2-3mm brede, kølede, med udvidede, hvidlige skeder. IV-VI. A B C K

Tragopogon. Gedeskæg.

1. Kurvstilken tydeligt opblæst ..... 2.
   " ikke opblæst 4.
2. Kronerne gule ..... dubius
   " lilla 3.
3. Ydre frugter med en fnok af 5 ru børster ..... hybridus
   Alle " " fjerformet fnok porrifolius
4. Kronerne kortere end svøbbladene. De ydre lilla crocifolius
   " mindst lig " 5.
5. Bladgrunden næppe udvidet. 5-7 svøbblade ..... samaritani
   " ofte " . 8(12) kurvsvøbblade pratensis

Tragopogon hybridus L. (Geropogon glaber) Køllegedeskæg. 20-50 cm. Glat enårig. Bladene græsagtige, 3mm brede. Kronerne lyst rødlilla, 1/3-1/2 x kurvsvøbet. Ydre frugter 3½-5cm.IV-VI. ABCK

T. pratensis L. ssp. pratensis Enggedeskæg. V-VIII. B K

T. dubius Scop. Storfrugtet gedeskæg. 25-50cm. Øvre stængelblade med opblæst grund. Kronerne kortere end de 8-12(5-18) svøbblade. Næbbet ca. = frugten. V-VI. A C K

T. porrifolius L. Havrerod. V-VI. A B C K. 3 underarter:
ssp. porrifolius: 30-125cm. Glat. Kronerne ca. = kurvsvøbet. Næbbet brat udvidet forneden i frugten. Dyrket og forvildet.
ssp. australis (Jordan) Nyman. 20-50cm. Ofte fintdunet. Kronerne ca. ½ x kurvsvøbet. Næbbet jævnt udvidet i frugten forneden.
ssp. cupani (Guss.) Rich.: Bladene uldhårede. Kronerne noget kortere end kurvsvøbet. Næbbet jævnt udvidet i frugten forneden.

T. crocifolius L. Tofarvet gedeskæg. 20-60cm. Bladgrunden lidt udvidet. 5-7(12) svøbblade, der er 1½-2 x randkronerne. Gule støvfang. Kronerne farvede som hos T. samaritani. V-VI. B C K

T. samaritani Heldr.& Sart. Bjærggedeskæg. 30-80cm. De ydre kroner lilla med gul grund, sjældent helt lilla eller gule; de indre gule. 800-1800m. VI-VIII. B K

Reichardia picroides (L.) Roth Haresalat. 10-45cm. Glat flerårig med noget grenet stængel. Stængelbladene omfattende. 1-5 kurve med mange små, hindekantede skælblade. Ydre svøbblade ægformede med en ½mm bred hindekant. I-XII. A B C K

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. Knoldhøgeskæg. 8-30cm. Flerårig med underjordiske rodknolde. Bladene linje-spatelformede i roset, 0-2 stængelblade. Oftest kun 1 kurv med sortagtige, kølleformede kirtelhår ved grunden og på stilken. III-VI. A B C K

Sonchus. Svinemælk.

1. Stængelbladene med afrundede øren ..... 2.
   " " spidse øren 3.
2. Støvfanget mørkt. Enårig ..... asper
   " gult. Flerårig maritimus
3. Kurvsvøbet tæt hvidfiltet forneden ..... tenerrimus
   " glat eller kirtelhåret forneden 4.
4. Griflerne gule. Kurvstilke og -svøb tæt kirtlede .. arvensis
   " grønne 5.
5. Frugten med 3(4) ribber på hver side ..... asper
   " " flere " " " " oleraceus

Sonchus arvensis L. Agersvinemælk. VI-IX. B C K

S. maritimus L. Strandsvinemælk. 15-60cm. Stærkt blågrøn. Bladene spatelformede, m.m. helrandede til svagt bugtede. Kurven 15mm, ofte hvidfiltet forneden. Strandenge. VI-IX. A K

S. asper (L.) Hill Ru svinemælk. I-XII. A B C K. 2 underarter:
ssp. asper: Bladørerne afrundede og store. Enårig. Uden bladroset.

ssp. glaucescens (Jordan) Ball: Bladørerne spidse og små. Toårig. Med grundbladsroset. Bladene læderagtige og blågrønne.

Sonchus oleraceus L. Alm. svinemælk. III-X. A B C K

S. tenerrimus L. Smalfliget svinemælk. 10-80cm. Bladene oftest stilkede, med lancetformede flige med indsnævret grund, sjældnere med linjeformede flige. I-XII. A C K

Lactuca. Salat.

1. Blomsterne blå ..... perennis
   " gule 2.
2. Kurvene mest 5-blomstrede. Bladene nedløbende ..... viminea
   " med 10-16 blomster. Bladgrunden omfattende 3.
3. Bladgrunden hjærteformet omfattende ..... sativa
   " pilformet omfattende 4.
4. Stængelbladene linjeformede og helrandede ..... saligna
   " aflange til omvendt ægformede 5.
5. Frugten brunliggrå. Bladene ofte lodret stillede .. serriola
   " sort. Bladene vandret stillede virosa

Lactuca viminea (L.) J.& C.Presl Rissalat. 30-60cm. Nedre blade dybt og smalt fligede; alle med 2 linjeformede, 1-2cm lange, nedløbende øren. Toppen ofte stærkt grenet. IV-VII. B C K

L. serriola L. Tornet salat. VII-IX. A B C K

L. sativa L. Havesalat. 30-100cm. Bladene bløde, stængelbladene udelte. V-VIII. Dyrket og forvildet.

L. saligna L. Pilsalat. 30-60cm. Kun de nederste blade med smalle sideflige. Kurvene i en smal klase. V-VIII. A B C K

L. virosa L. Giftsalat. 50-150cm. Bladene omvendt-ægformede til aflange, mest udelte, sjældnere lappede, med finttandet rand. Kurvene i en lang, pyramideformet top. VI-IX. A B C K

L. perennis L. Blå salat. 30-80cm. Glat med grågrønne, lancetfligede blade. De 3-4cm brede kurve i en halvskærmagtig top. B C K

Prenanthes purpurea L. Rød nikkesalat. 50-150cm. Bladene glatte med blågrøn underside, elliptiske, fjærnt tandede, stængelomfattende. Mange, fåblomstrede, m.m. nikkende kurve i en stor top. VI-VIII. A B C K

Mycelis muralis (L.) Dumort Skovsalat. VII-VIII. A B C K

Taraxacum. Mælkebøtte.

1. Ydre kurvsvøbblade bredt hindekantede ..... 2.
   " " smalt eller ikke hindekantede 3.
2. Bladene smalt lancetformede, lidet delte ..... palustre
   " dybt delte megalorrhizon
3. Frugterne m.m. rødlige ..... 4.
   " ikke " 5.
4. Bladfligene smalle. Frugterne røde eller rødlilla erythrospermum
   Bladfligene ret brede. Frugterne rødlige eller lyserøde gasparrinii
5. Ydre svøbblade med et horn ..... obovatum
   " " uden " 6.
6. Ydre svøbblade udstående til nedbøjede ..... officinale
   " " oprette til tiltrykte apenninum

Taraxacum megalorrhizon (Forsskål) Hand.Mazz. 10-20cm. De ydre svøbblade oftest tiltrykte, bredt ægformede med ofte rødligt anløben hindekant og et horn på spidsen. IX-IV. A B C K

T. obovatum (Willd.) DC. Ægbladet mælkebøtte. 5-10cm. Bladene tiltrykte jorden, mørkegrønne, helrandede til svagt tandede. 1500-2400m. V-VII. A B C K

Taraxacum palustre Smalbladet mælkebøtte. III-IV. A B C K

T. apenninum (T. alpinum) Alpemælkebøtte. 5-15cm. Bladene mørkegrønne. Kronerne mørkegule, undertiden lidt rødlige. VI-VIII. K

T. erythrospermum Rødfrugtet mælkebøtte. III-V. A B C K

T. gasparrinii Tineo

T. officinale Fandens mælkebøtte. II-V. A B C K

Chondrilla juncea L. Riskurv. 40-80cm. Grågrøn 2-flerårig, stærkt risagtigt grenet plante med oprette grene; stivhåret forneden og glat foroven. Øvre blade lange og linjeformede. Kurvene talrige, smalt valseformede, 9-12x2½-5mm. VI-VIII. A B C K

Lapsana communis L. Haremad. V-X. A B C K

Crepis. Høgeskæg.

1. Blomsterne orangefarvede, brunrøde eller lyserøde ..... 2.
   " gule 3.
2. Blomsterne orangefarvede til brunligt ildrøde ..... aurea
   " lyserøde rubra
3. Kurvene kugle- til pæreformede i frugt ..... 4.
   " ikke kugle- eller pæreformede i frugt 5.
4. Med siddende kurve i stænglens forgreningspunkter zacintha
   Alle kurve stilkede dioscoridis
5. Ydre kurvsvøbblade ægformede, tydeligt opblæste .. vesicaria
   " " ikke opblæste 6.
6. Flerårig ..... 7.
   1-2-årig 11.
7. Bladene sidder overvejende på stænglen ..... paludosa
   " overvejende grundstillede 8.
8. Kurvsvøbbladene højst svagt gråfiltede ..... leontodontoides
   " tydeligt gråfiltede 9.
9. Kurvsvøbet kortkirtlet. Stænglen med 1-4 kurve .. spathulata
   " tydeligt gråfiltet 10.
10. Grundbladene ikke lyreformede, endeafsnittet lille lacera
    " lyreformede bursifolia
11. Frugterne uden næb ..... 12.
    I hvert fald de indre frugter med næb 14.
12. Kurvene nikkende i knop. Kurvsvøbet 4-7mm ..... neglecta
    " oprette " " 13.
13. Planten klæbrigt kirtlet forneden. Kurvsvøbet glat pulchra
    " mest ukirtlet. Kurvsvøbet håret .. 17.
14. Kurvsvøbet kirtelhåret ..... 15.
    " ukirtlet 16.
15. Mangestænglet. Stænglerne med mange kurve ..... apula
    Enstænglet foetida
16. Svøbbladene med stive, gullige børster midtpå ..... setosa
    " hårede corymbosa
17. Griflen brunliggrøn. Ydre svøbblade 1/3 x de indre tectorum
    " gul. Ydre svøbblade 1/2-2/3 x de indre biennis

C. leontodontoides All. Løvetandshøgeskæg. 10-40cm. Grundbladene mælkebøtteagtigt høvlfligede. Få stængelblade og få grene. Kurvsvøbet 7-8mm, svagt filtet eller glat. IV-X. A B C K

C. biennis L. Toårigt høgeskæg. V-IX. B C K

C. lacera Ten. Laset høgeskæg. 20-60cm. Grundbladene 1-2 x delte med smalle, tandede til fligede flige, der bliver mindre udad. Kurvsvøbet 8-11mm, 600-1700m. VI-VII. A B C K

C. tectorum L. Taghøgeskæg. V-VIII. B C K

Crepis pulchra L. Glinsende høgeskæg. 30-60cm. Stænglen kirtletklæbrig i nedre halvdel, glat i øvre. Kurvstilkene glatte. Mange kurve i halvskærm. Kurvsvøbet 5-8mm. V-VII. B K

C. rubra L. Rødt høgeskæg. 4-40cm. Grundbladene 2-15cm, tandede til høvlfligede. Kurvsvøbet 11-15mm. Kurven nikkende i knop. Ydre svøbblade blege eller hindeagtige. IV-VI. A B C K

C. foetida L. Stinkende høgeskæg. 10-50cm. Stinkende lugt. Bladene m.m. stivhårede, stænglens høvlfligede til dybt fligede. Unge kurve nikkende. Citrongule blomster. VI-X. A B C K

C. dioscoridis L. Stilket gaffelkurv. 10-60cm. Enårig. Kurvene ofte langstilkede. Kurvsvøbet 8-12mm, med kirtel og ofte alm. hår. Ydre frugter vingede. IV-VI. K (Avellino)

C. zacintha (L.) Babc. Gaffelkurv. 20-30cm. Enårig. Bladene glatte. Kurvsvøbet 8-9mm; ydre svøbblade glatte, indre gulkirtlede. Ydre frugter stærkt sammentrykte. V-VI. A B C K

C. neglecta L. Nikkende høgeskæg. 25-50cm. Stænglen grenet fra grunden, stivhåret forneden, glat foroven. Grundbladene helrandede til lappede. Kurvene små. Griflerne mest grønne. V-VII. ABCK

C. corymbosa Ten. Hindebægerhøgeskæg. 10-40cm. Stænglen mest enlig. Kurvene tæt kortbørstede. Griflerne gule. Ihvertfald de indre frugter med et kort næb. IV-VI. A B C K

C. apula (Fiori) Babc. 5-35cm. Stænglen med gullige børster. Talrige kurve, nikkende i knop. Kurvsvøbet 6-8mm, mørkkirtlet. 0-1150m. IV-VI. A B (Metaponto) C (Sila)

C. spathulata Guss. Spatelhøgeskæg. 15-30cm. Grundbladene linjespatelformede, svagt bugtet-tandede, med afrundet spids. Stængelbladene linje- eller skælformede. XI-V. C

C. vesicaria L. ssp. vesicaria Opblæst høgeskæg. 10-80cm. Mest 1-2-årig. Ydre svøbblade oftest bredt hindekantede. Kurvstilkene med opblæste, skælagtige støtteblade, der ligner de ydre svøbblade. V-VII. A B C K

C. setosa Haller f. Børstehøgeskæg. 15-50cm. Enårig. Bladene lyshårede. Stænglen bebørstet forneden. Ydre svøbblade udstående. Griflen sortgrøn. Næbbet ½-1 x frugten. V-IX. A B C K

C. bursifolia L. Hvidtandet høgeskæg. 5-35cm. M.m. dunet med mange liggende eller bueformet opstigende stængler. Frugten med et ca. 2 x så langt næb. IV-IX. K

C. paludosa (L.) Moench Kærhøgeskæg. VI-VII. C (Sila)

C. aurea (L.) Cass. ssp. glabrescens (Caruel) Arc. Guldhøgeskæg. 2-16cm. Alle blade i roset, tandede til fligede, lidet hårede. Kurvsvøbet 7-9mm, med mørke, udstående hår. VI-VIII. B C K

Andryala integrifolia L. Alm. filtkurv. 20-40cm. 1-2-årig. Tæt grågult dunet af stjærnehår og korte, alm. hår. Bladene fra helrandede til bugtede, de øvre m.m. lancetformede og spidse. Mange lysegule kurve i en tæt halvskærm. Kronerne lidt længere end svøbet. IV-VI. A B C K

A. rothia Pers. ssp. dentata (S.& S.) Pign. Orange filtkurv. 20-40cm. Enårig. Som den foregående, men blomsterne orange eller gyldentgule. Kronerne 2 x kurvsvøbet. IV-VI. A B C K

Hieracium. Høgeurt.

1. 1 række fnokhår. Frugten med en knudret ring foroven ..... 2.
   2 rækker " . " " " jævn ring foroven 12.
2. Uden udløbere ..... 3.
   Med over- eller underjordiske udløbere 6.

3. Bladene grønne med mange alm. hår på ½-1mm ..... cymosum
" blågrønne med få alm. hår på 2-7mm 4.
4. Kurvstilkene grønne med 0-få stjærnehår ..... florentinum
" grå- til hvidfiltede af stjærnehår 5.
5. Stænglen uden stjærnehår ..... praealtum
" med " aridum
6. Stænglen med 2-mange kurve ..... 7.
" " 1 kurv 9.
7. Stænglen med mange kirtelhår. Kurvsvøbet 10-11mm .. calabrum
" " 0-få " . " 7-8½mm 8.
8. Kurvstilkene med mange kirtelhår. Tit 0 stængelbl.bracchiatum
" " 0-få " bauhinii
9. Få og korte udløbere. Svøbbladene 1½-3½mm brede .. hoppeanum
Med lange udløbere. Svøbbladene 1-2mm brede eller smallere 10.
10. Svøbbladene m.m. skjulte af hårene ..... pseudopilosella
" ikke helt skjulte af hårene 11.
11. Kurvsvøbet med kirtelhår ..... pilosella
" uden " saussureoides
12. Grundbladene væk eller visne under blomstringen ..... 13.
Med grundblade 18.
13. Nedre stængelblade ret brat større end de øvre ..... 14.
Stængelbladene jævnt mindre opad 17.
14. Bladene skarpttandede. Kurvsvøbet 12-14mm ..... virgaurea
" svagttandede 15.
15. Kurvsvøbet ret langhåret af fjerhår ..... portanum
" med 0-få alm. hår eller fjerhår 16.
16. Kurvsvøbet med mange kirtelhår ..... symphytaceum
" " 0-få " italicum
17. De øvre blade med afrundet til hjærteformet grund sabaudum
Bladene med tilsmalnet grund umbellatum
18. Planten klæbrigt-kirtlet over det hele ..... amplexicaule
" ikke klæbrig 19.
19. Blade og stængel lådne af ret lange hår ..... 20.
" " " ikke lådne 23.
20. Planten hvidlådden. Bladene uden kirtelhår scorzonerifolium
" mørk. Bladene med korte kirtelhår 21.
21. Bladene helrandede til svagt tandede ..... serinense
" groft tandede 22.
22. Kurvsvøbet 9-12mm. 1-2 stængelblade. Griflen gul valoddae
" 12-15mm. 1-5 " . " mørk humile
23. Med 2-flere stængelblade ..... 24.
" 0-1 stængelblade 27.
24. Nedre blade tydeligt stilkede ..... 25.
Bladene m.m. siddende 26.
25. Svøbbladene butte ..... grovesianum
" spidse vulgatum
26. Grundbladene 4-6x½cm, blågrønne ..... naegelianum
Bladene 8-20x2-3½cm portanum
27. Stænglen med 2-5mm lange børster forneden ..... 28.
" uden sådanne børster 29.
28. Bladene glatte på fladerne ..... pollinense
" hårede " " pallidum
29. Kurvsvøbet med 0-få kirtelhår ..... 30.
" " mange " silvaticum
30. Tæthåret og tætbørstet overalt ..... incisum
Anderledes bifidum

Hieracium pilosella L. Håret høgeurt. V-X. A B C K

H. saussureoides AT. (H. tardans) Sen høgeurt. Nær pilosella. Kurvsvøbet snehvidt af ½-1½mm lange, meget tætte hår. 500-2000m. VII-X. K (Acerno i Salernit.)

H. pseudopilosella Ten. Mørkhåret høgeurt. 10-25cm. Kurvsvøbet 10-13mm, med hvid-sorte hår, uden kirtelhår. V-VIII. B C K

Hieracium hoppeanum Schultes Butskællet høgeurt. De korte udløbere med store blade. Svøbbladene ofte butte. V-VIII. B C

H. cymosum L. Kvasthøgeurt. 30-50cm. Bladene gulgrønne, ofte stjærnehårede ovenpå. Kurvstanden skærmagtig. V-VIII. B K

H. florentinum All. 20-70cm. Bladene noget blågrønne og ofte lidt rødlige, med børster på 3-5mm eller glatte. Kurvsvøbet mørkt. V-VIII. A B C K

H. praealtum Vill. Spidsbladet høgeurt. Kurvsvøbet lysegrønt på grund af at svøbbladenes hindekanter er bredere end den urteagtige del. Svøbbladene kirtlede.

H. aridum Freyn 10-40cm. 2-7 kurve. Bladene med afrundet spids, med 2-6mm lange børster ovenpå. 1 stængelblad. Kurvsvøbet 7-9mm med linjeformede svøbblade.

H. bracchiatum Bertol. 10-30cm. Nær foregående, men med udløbere. Blomsterne ofte rødlige.

H. calabrum NP. 10-30cm. Stænglen med mørke hår og mange kirtelhår. Kurvsvøbet 10-11mm. Blomsterne røde. Pollino.

H. bauhinii Besser Langbladet høgeurt. 20-70cm. Bladene ofte meget lange. V-VII. B C K

H. naegelianum Pancic Bølget høgeurt. 12-25cm. Grundbladene linje-lancetformede, blagrønne, glatte eller svagt randhårede, ofte bølgede. 2-4 smalle stængelblade. 1-2 kurve. B C (Pollino)

H. scorzonerifolium Vill. ssp. schizocladum Zahn Svinerodshøgeurt. 20-50cm. Nedre blade lancetformede, 3-9x½-1cm. 3-6 jævnt mindre stængelblade. 1-4 kurve. 1600-2400m. Pollino

H. pollinense Zahn 15-25cm. 1-7 kurve. Grundbladene mest elliptisk-spatelformede og m.m. butte. Kurvsvøbet 11-12mm. Pollino

H. silvaticum (L.) L. (H. murorum) Skovhøgeurt. V-VIII. A B C K

H. grovesianum AT. Grundbladene rude-lancetformede eller m.m. trekantede, tilspidsede; de nedre stængelblade lige sådan. Mange kurve. C

H. vulgatum Fr. (H. lachenalii) Alm. høgeurt. V-VIII. A B C K

H. bifidum Kit. Gaffelhøgeurt. (Nøglekaraktererne passer ikke med dem i Flora Europaea). VII-VIII. K (Salernit.)

H. incisum Hoppe Indskåren høgeurt. Bladhårene op til 3mm. Kurvsvøbet med talrige alm. hår. 1500-2200m. B

H. pallidum Biv. Bleg høgeurt. 10-40cm. Bladene med indtil 10mm lange børster på stilk, rand og undersidens ribbe. Grundbladene ofte lancetformede med tilsmalnet grund. V-VII. B C

H. humile Jacq. Lav høgeurt. 10-25cm. Stænglen bugtet, ofte opstigende, med 2-10 kurve. Grundbladene ofte dybt bugtede til indskårne. Hele planten med ½-3mm lange hår. VI-VIII. B C K

H. serinense Zahn 8-15cm. Stænglen med 2-4 kurve og forlængede grene. 0-1 stængelblad. Kurvsvøbet 9-10mm. 2000m. B (M.Sirino, M.Papa)

H. valoddae Zahn ssp. austroitalicum Zahn 10-30cm. Stænglen med forlængede kurve og mest 4-6 kurve. 1500-2100m. Pollino

H. portanum Belli 30-60cm. Med fjerhår forneden. Stænglen forneden med 5-10mm lange børster, med 3-8 kurve. Nedre 5-8 blade undertiden i roset, med 2-5mm lange børster. Ca. 2100m. VII. C (Pollino - på klippeskrænterne mellem toppen og højsletten)

H. amplexicaule L. Hjærtebladet høgeurt. 25-40cm. Grundbladene 10-15x2-3cm, spatel- til omvendt lancetformede. 3-6 ægformede og

bredt stængelomfattende. 3-6(20) kurve. V-VIII. B C (Pollino)

Hieracium umbellatum L. Smalbladet høgeurt. VIII-X. K

H. sabaudum L. (H. virgultorum s.l.) Bredbladet høgeurt. B

H. symphytaceum AT. 10-100cm. Stænglen tæthåret. Bladene blågrønne, fremtrædende årede nedenunder, de nedre m.m. ægformede, tilsmalnede i en vinget, m.m. omfattende stilk. B

H. virgaurea Cosson Gyldenrishøgeurt. 25-40cm. Bladene mørkegrønne, uldhårede ved grunden, med ret mange stjærnehår. 6-20 kurve på korte, gråfiltede stilke. VI-IX. B C K

H. italicum Fr. Nær foregående, men kurvsvøbet 8-9mm.

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L. Vejbredskeblad. V-VII. A B C K

A. lanceolatum With Lancetskeblad. 20-40cm. Bladene lancetformede, indtil 1½cm brede, med kileformet grund. Frugterne i en enkelt krans. V-VII. B K

Damasonium alisma Miller Damstjærne. 5-40cm. Alle blade grundstillede; flydende og aflange hos vandformer, m.m. lancetformede hos landformer. 3 3mm lange, hvide kronblade med gul grund. Mest 6 stjærneformet udstående bælgkapsler. IV-V. A K

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Søpryd. 10-50cm. Undervandsbladene græsformede, luftbladene lancet-linjeformede, indtil 1½ cm brede. Opret stængel med 1(3) blomsterkranse. Minder om Lancetskeblad, men frugterne i et smørblomstagtigt hovede. A C K

BUTOMACEAE

Butomus umbellatus L. Brudelys. IV-VII. K (Napol.)

HYDROCHARITACEAE

Hydrocharis morsus-ranae L. Frøbid. VII-IX. K

Elodea canadensis Michx Vandpest. VI-VII. K

JUNCAGINACEAE

Triglochin bulbosum L. ssp. barrelieri (Læisel.) Rouy Knoldtrehage. 3-20cm. Stængelgrunden knoldformet fortykket. Mange blade, alle med plade, af længde med klasen. Modne frugter skråt opretter, 3 stk. IV-V. A B C K

T. laxiflorum Guss. Høsttrehage. 3-10(20)cm. De yderste blade uden plade. Ofte kun 2-4 blade med plade; disse kortere end klasen. De modne frugter m.m. oprette. Ellers som bulbosum. IX-XI. AK

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton. Vandaks.

1. Alle blade modsatte ..... densus
   Højst blomsterstandsbladene modsatte 2.
2. Bladpladen æg-lancetformet ..... 3.
   " tråd- eller linjeformet 8.
3. Øvre blade siddende ..... 4.
   " " stilkede 5.
4. Bladgrunden stængelomfattende. Bladene ofte krusede crispus
   " kileformet lucens
5. Flydebladene gennemskinnelige ..... coloratus
   " uigennemskinnelige 6.
6. Undervandsbladene reducerede til bladstilken ..... natans
   " veludviklede, undertiden henvisnende 7.
7. Undervandsbladene finttandede. Frugterne 3-4mm ..... nodosus
   " helrandede. Frugterne 1½-2½mm polygonifolius

8. Bladene mest tråd-børsteformede, uden skede, med skedehinde 9.
" græsagtigt flade, med både skede og skedehinde 10.
9. Bladene tilspidsede. Stænglen stærkt grenet ..... pectinatus
" butte. Stænglen kun grenet ved grunden filiformis
10. Bladene med 1 ribbe. Frugtens buglinje næsten ret trichoides
" " 3-5 ribber. Frugtens buglinje buet pusillus

Potamogeton natans L. Svømmende vandaks. IV-VII. A B C K

P. polygonifolius Pourret Aflangbladet vandaks. IV-VI. C (Sila)

P. nodosus Poiret Knudevandaks. Flydebladene store, elliptiske eller lancetformede, 9-14x3-6cm. Undervandsbladene lancetformede, op til 20x4cm. Aksstilkene fortykkede foroven. Stængelleddene kortere forneden, hvor stænglen derfor bliver knudret. VI-VIII. K

P. coloratus Vahl Vejbredvandaks. IV-VI. A B K

P. lucens L. Glinsende vandaks. VI-VIII. B K

P. crispus L. Kruset vandaks. IV-V. A B C K

P. pusillus L. Spinkelt vandaks. VI-VIII. C (Sila)

P. trichoides Cham.& Schl. Hårfint vandaks. V-VII. C

P. pectinatus L. Børstebladet vandaks. VI-VIII. A B C K

P. filiformis Pers. Trådvandaks. VII-VIII. A (Otranto)

P. densus L. Tæt vandaks. V-VI. A B C K

RUPPIACEAE

Ruppia maritima L. Alm. havgræs. Frugtstilkene 2-4cm, rette. Øvre blade med ret skede. V-IX. A B C K

R. cirrhosa (Petagna) Dumort Langstilket havgræs. Frugtstilkene 8-10cm, skruesnoede. Øvre blades skeder lidt opblæste.V-IX. ABCK

POSIDONIACEAE

Posidonia oceanica (L.) Delile Gedebollegræs. Rodstokken tæt besat med fibre og bladrester, skyller op på stranden som "gedebboller". Ålegræsagtige blade med 13-17 strenge, 8-15mm brede og 10-30cm lange med but til udrandet spids. Saltvand. X. A B C K

ZOSTERACEAE

Zostera marina L. Ålegræs. Bladene 3-10mm brede med 5-9 strenge.

Z. noltii Hornem. Dværgbændeltang. Bladene 5-20cm x 1mm, 1-strengede. IV-VI. A B C K

ZANNICHELLIACEAE

Althenia filiformis Petit Dværgvandkrans. 5-50cm. Vandplante med krybende stængler og korte, trådformede blade i knipper med skæl ved grunden og eet mellem hvert knippe. Bladene 1-4cm x ½mm. Brakvand. IV-X. A B C K

Zannichellia palustris L. Vandkrans. Vandplante med trådformede blade, ofte 3 i krans. Grupper på 2-6 frugter i bladhjørnerne. ABCK

Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. Finttandet ålegræs. Et Ålegræs, der er op til 4mm bredt, med 7-9 ribber og er finttandet mod spidsen. Saltvand. IV-VI. A B C K

LILIACEAE

1. Blomsterne udgår direkte fra løget ..... Colchicum
" sidder på en stængel 2.
2. Blomsterne i bladhjørnerne eller i klaser fra bladhjørnerne 3.
" i en m.m. endestillet stand 7.
3. Bladene nåleformede ..... Asparagus
" flade 4.

4. Bladene bløde og løvfældende ..... 5.
" stive og stedsegrønne 6.
Bladgrunden stærkt stængelomfattende ..... Streptopus
" ikke " Polygonatum
5. Slyngplante med tornet stængel ..... Smilax
Staude uden tornet stængel Ruscus
6. Blomsterne i en skærm, omgivne af svøbblade i knop ..... 7.
" sjældent i skærm, i så fald uden svøb 8.
7. Blomsterstilken skiveformet udvidet foroven Nectaroscordum
" ikke således Allium
8. Blosterbladene mindst 1/5 sammenvoksede ..... 9.
" højst 1/5 " 12.
9. Bladene kødede med tornet-tandet rand ..... Aloe
" helrandede 10.
10. Blomsten 8-10cm, orangerød ..... Hemerocallis
Blomsterne mindre, af anden farve 11.
11. Blosteret ikke indsnøret ved mundingen ..... Bellevalia
" indsnøret ved mundingen Muscari
12. 3-4 helt frie grifler ..... 13.
1 griffel, undertiden med tredelt spids 14.
13. Med spredte blade ..... Veratrum
4 blade i krans Paris
14. Bladene grundstillede (1-2 kan dog omskede stænglen lidt) 15.
Med stængelblade eller bladagtige støtteblade 20.
15. Blomsterne blå, lilla eller lillarøde ..... 16.
" hvide 17.
16. Blomsterne med 1(0) støtteblad ..... Scilla
" " 2 støtteblade Hyacinthoides
17. Blosterbladene med 3 ribber ..... Anthericum
" " 1 ribbe 18.
18. Uden løg. Støvtrådene med udvidet grund ..... Asphodelus
Med løg. Blomsterne i klase, aldrig i top 19.
19. Støvtrådene affladede. Blosterribben grøn/hvid Ornithogalum
" m.m. trinde. Blosterribben tit rødlig Urginea
20. Støvfanget siddende ..... Tulipa
" stilket, på en griffel 21.
21. Blomsterne lysegule ..... 22.
" af anden farve 23.
22. Stænglen mangeblomstret og mangebladet ..... Asphodeline
" fåblomstret og fåbladet Gagea
23. Støvknapperne midtfæstnede ..... Lilium
" endefæstnede Fritillaria

Veratrum nigrum L. Sort foldblad. 50-100cm. De nedre blade 10-25 x 4-10cm, m.m. foldede langs ribberne. Blomsterne rødbrune til sortlilla, 9-15mm brede, i en ofte stor top. V-VII. K

V. album L. Hvidt foldblad. 50-175cm. Som foregående, men blomsterne hvidgrønne. VI-VIII. K (Salernit.)

Asphodelus. Skarnlilje.

1. Bladene m.m. trinde, hule, 1-5mm brede ..... 2.
" flade, 1-4cm brede 3.
2. Blosteret 12-16mm. Kapslen rund, 5-7mm bred ..... fistulosus
" 6-10mm. " ægformet, 4mm bred tenuifolius
3. Blomsterne i klase, sjældent med korte sidegrene ..... albus
" i en rigtgrenet top. Blosterribben rød 4.
4. Kapslen 8-14x5-11mm ..... ramosus
" 5-7x4-5mm aestivus

Asphodelus fistulosus L. Trind skarnlilje. 30-50cm. Blomsterne i en smalt pyramideformet top. Blosteret 12-16mm. III-V. A B C K

A. tenuifolius Cav. Tyndbladet skarnlilje. 30-40cm. Bladene indtil 15cm, 2mm tynde. Blosteret 6mm. II-V. A (Vieste)

Asphodelus ramosus L. (A. microcarpus) 40-150cm. Bladene 15-40 x 1-3cm. Stænglen tit stærktgrenet, Blomsterstilken leddet omkring midten. Kapslen ægformet. Blosteret 15-22 mm. III-V. A B C K

A. aestivus Brot. (A. cerasifer) Stor skarnlilje. 1-1½m. Bladene indtil 40x2cm. Blomsterstilken leddet under nedre 1/3. Kapslen omvendt ægformet. Blosteret 12-15(20)mm. IV-V. A C K

A. albus Miller Hvid skarnlilje. 30-150cm. Bladene 15-60x1-2cm. Blosterribben grøn. Kapslen 8-15x6-13mm. Klasens støtteblade mørkebrune (hvidlige hos de 2 foregående). V-VI. A B C K

Asphodeline lutea (L.) Rchb. Kejserlys. 40-80cm. Stænglen bladet lige til klasen. Bladene med bred, hindeagtig, omskedende grund. Blomsterne 20-25mm. Støttebladet længere end blomsterstilken, der er leddet nær midten. IV-V. A B C K

A. liburnica (Scop.) Rchb. Slankt kejserlys. 25-60cm. Som foregående, men stænglen kun bladet i nedre ½. Støttebladet kortere end blomsterstilken, der er leddet nær grunden. IV-V. A B C K

Anthericum liliago L. Ugrenet edderkopurt. V-VI. B C K

Hemerocallis fulva (L.) L. Rødgul daglilje. 50-100cm. Bladene 2-3cm brede. Blomsterne tragtformede med udbøjede spidser, mat orange. Indre blosterblade med bølgede rande. V-VI. Forv. i K

Aloe vera (L.) Burm.f. Ægte rørklokke. 80-150cm. Bladene tykke og kødede, smalt trekantet-lancetformede. En klase med mange rørformede, hængende, gule blomster på 2½-3cm. V-VI. Forv. i C K

Colchicum. Tidløs.

1. Med blade under blomstringen ..... cupanii
   Uden " " " 2.
2. Blomsterne stærkt spættede ..... bivonae
   " ikke eller lidt spættede 3.
3. Støvfangene prikformede ..... alpinum
   " nedløbende 4.
4. Skeden omkring blomstens grund smalt hindekantet lusitanum
   " " " " bredt " neapolitanum

Colchicum cupanii Guss. Tvebladet tidløs. 8-16cm. Med 2(3) blade. 1-4(8) ensfarvede blomster. Støvknapperne sortlilla. Prikformet støvfang. 0-1600m. IX-XI. A B C

C. alpinum DC. Alpetidsløs. 10-30cm. Blomsten enlig (sj. 2-3), ensfarvet. Støvknapperne 2-3mm, gule. VII-IX. B C

C. bivonae Guss. Spættet tidløs. 20-40cm. Støvfanget langt nedløbende. Støvknapperne 7-8(5-11)mm, sort- til brunlilla. IX-X. A B C

C. lusitanum Brot. Fembladet tidløs. Blosterbladene let spættede. Støvknapperne 5-8mm, sortlilla, lyserøde eller gule. VIII-X. C

C. neapolitanum Ten. Bølgeåret tidløs. Blosteret ikke eller meget svagt spættet. Støvknapperne 5-8mm, gule. IX-XI. A B C K

Gagea. Guldstjærne.

1. Grundbladene 5-10mm brede med hætteformet spids ..... lutea
   " 1-5mm " 2.
2. Blomsterstilkene glatte ..... 3.
   " dunede eller hårede 6.
3. Blosterbladene tilspidsede ..... minima
   " butte til halvspidse 4.
4. Grundbladene 3-5mm brede. Blosteret 15-20mm ..... pratensis
   " 1-2mm " . " 7-14mm 5.
5. Blomsterstandens højblade lidt adskilte ..... amblyopetala
   " " modsatte chrysantha
6. Grundbladene 2-4mm tykke, svampet hule ..... fistulosa
   " ikke hule 7.

7. Stænglen bladet før blomsterstanden ..... 8.
" bladløs til " 9.
8. Grundbladene trådformede, ca. 1mm brede ..... busambarensis
" flade, 2-3mm brede foliosa
9. Grundbladene furede, ½-1mm brede ..... mauritanica
" ikke furede, 2-3mm brede 10.
10. Ydre blosterblade tæt hviddunede ..... granatelli
" " ikke eller lidet dunede arvensis

Gagea arvensis (Pers.) Dum. (G. villosa) Agerguldstjærne. 8-20 cm. Stængelbladene dunede. Blosterets spidser ofte udadbøjede, spidse. Klasen med 5-10(16) blomster. III-V. A B C K

G. granatelli Parl. Dunet guldstjærne. 5-12cm. Løget med en skede af opstigende rødder. Blomsterne gule indvendigt, grønne udvendigt, spidserne ikke udbøjede. III-V. A

G. mauritanica Durieu Lav guldstjærne. 3-7cm. Løget med en skede af opstigende rødder. Stænglen kort og ofte helt underjordisk. Blomsterfarven som hos foregående. III-IV. A (Bari)

G. busambarensis (Tineo) Parl. (G. saxatilis p.p.) 3-7cm. Løget lille, ofte omskedet af opstigende rødder. 1-2 blomster. Stængelbladene spredte og krumme. 1000-1900m. III-V. C

G. amblyopetala Boiss.& Heldr. Langbladet guldstjærne. 5-12cm. 2 ens løg i samme rustbrune svøb. Grundbladene furede, længere end blomsterne. IV-VI. B (Castelgrande, Pollino) C (Pollino)

G. foliosa Schultes Tykbladet guldstjærne. 8-15cm. 2 løg i et helt svøb. Grundbladene fortykkede, længere end stænglen. 2-5 blomster, fligene 11-17mm og butte. IV-V. A (Gargano) B

G. chrysantha (Jan) Schultes 5-10cm. De 2 højblade meget korte, ofte randhårede. 1-få blomster på 8-13mm. 600-1500m. III-IV. B C (Sila)

G. minima (L.) K-G. Liden guldstjærne. IV-V. C (Pollino m.m.)

G. fistulosa (Ram.) K-G. Alpeguldstjærne. 5-12cm. 2 løg i fælles hinde. 2 sivformede grundblade. Blosteret 13-17mm,grønt udvendigt og gult indvendigt. 1500-2800m. VI-VIII. B C (Pollino, Sila)

G. pratensis (Pers.) Dumort Engguldstjærne. IV-V. C (Pollino)

G. lutea (L.) K-G. Alm. guldstjærne.

Tulipa silvestris L. Vild tulipan. 20-30cm. Nederste blad mindst 12mm bredt. Blomsten 3½-6cm, gul, undertiden med grønligt skær udvendigt. Støvknapperne 4-9mm. IV-V. A B C K

T. australis Link Sydlig tulipan 25-40cm. Nederste blad under 12mm bredt. Blomsten 2-3½cm, gul, med rødt skær udvendigt. Støvknapperne 2½-4mm. V-VI. B

Fritillaria messanensis Rafin. 15-30cm. Blomsten bredt klokkeformet, 22-32mm, gullig eller brunlig, spættet og med et gulliggrønt længdebånd på blosterbladene. Øvre blade spredte. C (Pollino). III-IV.

F. montana Hoppe (F. orientalis, F. tenella) Krogvibeæg. 20-30 cm. Blosteret 2-3cm, grønligt, stærkt brunlillat spættet, uden længdebånd. Øvre blade ofte i krans. IV-V. (Pollino) B C

Lilium martagon L. Kranslilje. 50-90cm. Bladene i kranse på 4-8, lancetformede. Blomsterne hængende, op til 3½cm, vinrøde og ofte plettede, med krummede blosterblade. VI-VII. K (M.Taburno)

L. bulbiferum L. ssp. croceum (Chaix) Arc. Brandlilje. 30-80cm. Bladenespredte. De 1-3 blomster oprette, 5½-8½cm, udbredt tragtformede, orangerøde med mørke pletter. V-VII. A B C K

Scilla. Vårstjærne.

1. Blomsternes støtteblade 5-8cm. Bladene 1-4cm brede peruviana
   " " 0-1½mm 2.
2. Høstblomstrende. Blosterbladene 3-5mm ..... autumnalis
   Vårblomstrende. " 5-10mm 3.
3. 50-100 blomster. Planten 30-60cm ..... hyacinthoides
   1-5 blomster. Planten 10-20cm bifolia

Scilla peruviana L. Pyramidevårstjærne. 30-50cm. Løget 4-7cm. Bladene 40-60cm, med hætteformet spids. Klasen først halvkugleformet, senere bredt kegleformet, stilkene -14cm. IV-V. C (Gerace)

S. hyacinthoides L. Hyacintvårstjærne. Bladene 30-40x2-3cm, kort randhårede. Klasen 15-40cm, m.m. valseformet, stilkene 1½-3cm. Blosteret blålillat, 6-9mm. IV-V. C K

S. bifolia L. Tvebladet vårstjærne. Oftest 2 1cm brede, skinnende blade med ofte noget hætteformet spids. Blosteret blålillat. Knopperne gråblå. III-V. A B C K

S. autumnalis L. Høstvårstjærne. 10-40cm. Bladene 1-2mm brede, udvikles under eller efter blomstringen. 6-20 blomster med stilke på 3-4mm (15mm i frugt). VIII-IX. A B C K

Hyacinthoides hispanica (Miller) Rothm. Spansk vårstjærne. 20-50 cm. 4-8 blade på 20-50x1-3½cm. Klaserne med 5-15 udstående til nikkende blomster på 1-2cm. III-V. K (Napoli)

Urginea. Strandløg. Blomsterne i en lang klase. Bladene kommer frem efter blomstringen.

U. maritima (L.) Baker Strandløg. 50-150cm. Stor knold på 10-15 cm med store læderagtige blade på 12-30x3-6cm. Klasen med over 50 tætsiddende blomster på 6-8mm med 5-8mm lange støtteblade, der ofte er affaldende. IX-X. A B C K

U. fugax (Moris) Steinh. Trådbladet strandløg. 10-35cm. Løget 2-3cm. Bladene trådformede og furede, op til 40cm x 1-2mm. Klasen med 5-10 blomster på 9mm med skælformede støtteblade på 1mm. VII-VIII. A (Brindisi) B (Pte. Sauro)

Ornithogalum. Fuglemælk.

1. Blomsterne i en forlænget klase ..... 2.
   " i halvskærm eller kort klase 5.
2. Klasen med 3-12 blomster. Bladene hvidstribede ..... nutans
   " " 20-50 " . " ikke hvidstribede 3.
3. Blomsterne gullige indvendigt ..... pyrenaicum
   " hvide indvendigt. Bladene grønne i blomst 4.
4. Griflen mest kortere end frugtknuden, med kegleformet grund pyramidale
   Griflen mindst lig frugtknuden, helt trådformet narbonense
5. Blomsterne ensfarvede ..... arabicum
   " med en grøn stribe udvendigt 6.
6. Frugtstilken J-formet nedbøjet ..... 7.
   " opret eller udstående 10.
7. Løget uden småløg omkring sig. Kapslen vinget foroven .... 8.
   " med " " " . " uvinget " 9.
8. Bladene 2-6mm brede. Blosteret 12-15mm ..... exscapum
   " 8-9mm " . " 20-25mm ambiguum
9. Klasen med 14-18 blomster på 15(20)mm ..... brutium
   " " 3-4 blomster på 20-25mm adalgisae
10. Bladene uden hvid længdestribe ..... 11.
    " med " " 13.
11. Bladene 8-15mm brede ..... montanum
    " 1-6mm " 12.
12. Bladene 3-6(12)mm. Klasen 10-20(30)-blomstret ..... comosum
    " 1-3(4)mm brede. Klasen 5-12-blomstret gussonei

13. Bladene 8-15mm brede ..... orthophyllum
" 2-6mm " 14.
14. Nedre frugtstilke opret-udstående. Småløgene med blade umbellatum
Nedre frugtstilke udstående til lidt nedadbøjede. Småløgene uden blade divergens

Ornithogalum comosum L. Duskfuglemælk. 15-30cm. Enkelt, brunhindet løg. Bladene randhårede, ofte furede. Blosteret stjærneformet udstående. IV-VI. A B C K

O. montanum Cyr. Udspærret fuglemælk. 8-15cm. Løget enligt, hinden brun-lyserødlig. Blomsterstilkene oprette til opret-udstående, støttebladene lidt kortere. IV-V. A B C K

O. orthophyllum Ten. 8-15cm. Nær foregående. Med 6-12 blomster. Bladene furede, først oprette. V-VI. C (Pollino) K (Napolit.)

O. umbellatum L. Kostfuglemælk. 10-15cm. Småløgene uden for løghinden. Kapslens ribber butte, jævnt fordelte. IV-V. A B C K

O. divergens Boreau Stribet fuglemælk. 10-30cm. Småløgene inden for løghinden. Kapslens ribber spidse, nogenlunde jævnt fordelte. IV-V. A B C K

O. gussonei Ten. (O. tenuifolium Guss.) Smalbladet fuglemælk. 5-12cm. Bladene ofte randhårede. Klasen som hos foregående. Kapslens ribber parvist tilnærmede. IV-V. A B C K

O. excsapum Ten. Stængelløs fuglemælk. 5-10cm. Bladene mest 2-3 mm brede, med en meget fin hvid stribe. Klasen med 3-10 blomster. Kapslens ribber vingede, parvist tilnærmede. II-IV. A B C K

O. ambiguum Terr. 9-12cm. Bladene med tydelig hvid stribe, indtil 3 x stænglen. Med 5-10 blomster. Kapslen som hos exscapum. III-IV. (Pollino) B C

O. brutium Terr. 9-10cm. Med mange (12-13) 6-7mm brede blade. Kapslen butribbet. II-III. A (Bitonto, Modugno, Bari) C (Castrovilleri)

O. adalgisae Groves 6-10cm. Bladene 2-3mm brede med tydelig stribe. Nedre blomsterstilke 2-4 x støttebladene. Kapslen butribbet. II-III. A (Bari, Otranto)

O. arabicum L. Storblomstret fuglemælk. 30-80cm. Bladene 1-3cm brede, uden hvid stribe. Blomsterne i en tæt halvskærm, 15-32mm, hvide eller flødefarvede. IV-V. K (Ischia)

O. nutans L. Nikkende fuglemælk. Blomsterstilken ca. ½ x støttebladet. III-IV. K

O. narbonense L. Pyramidefuglemælk. 30-60cm. Bladene 6-8mm brede. Blosterbladene 12-16mm, med en båndformet, grøn stribe. Frugtknuden 3½-5mm, ægformet. V-VI. A B C K

O. pyramidale L. 30-100cm. Blosterbladene 11-15mm, med en lancetformet grøn stribe. Frugtknuden 2,1-2,5mm, kugleformet til ellipsoidisk. IV-V. B K

O. pyreniacum L. Pyrenæsik fuglemælk. 30-60cm. Bladene ofte visne under blomstringen. Blosterbladene efterhånden med indrullede kanter. Frugtknuden 2,4-3mm. V-VII. A B C K

Bellevalia. Rørhyacint.

1. Klasen bredt keglformet, nedre stilke indtil 10cm .. ciliata
" valseformet eller aflang 2.
2. Bladene liggende. Friske blomster himmelblå ..... dubia
" m.m. oprette 3.
3. Blomsterne 9-16mm. Bladene 15-30mm brede ..... trifoliata
" 8-10mm. " 5-15mm " romana

Bellevalia romana (L.) Sw. Hvidblå rørhyacint. 20-40cm. Klasen med 20-30 smalt klokkeformede, skidenhvide blomster med blåt anstrøg, fligene lig eller længere end røret. III-IV. A B C K

B. dubia (Guss.) Rchb. Slap rørhyacint. 15-40cm. Bladene 7-11mm brede. Klasen med 10-30 blomster på 5½-8mm. Blomsterne senere skidenlilla eller brunlige, hvidtandede. III-IV. C

B. trifoliata (Ten.) Kunth Trebladet rørhyacint. 25-40cm. Blomsterne nikkende, først lilla, senere brunlige. Tænderne 1/4 x røret og grønlige. III-V. A

B. ciliata (Cyr.) Nees Hængende rørhyacint. 20-40cm. Bladene 1-3 cm brede, randhårede. Blomsterne 8-11mm, skidenlilla med gulgrønne tænder. Stilkene bueformet udstående. IV-V. A (Foggia)

Muscari. Perlehyacint.

1. Modne, frugtbare blomster blegbrune, golde lyslilla comosum
   " " " blå 2.
2. Blosteret blegblåt. Høstblomstrende ..... parviflorum
   " blåt til sortblåt. Vårblomstrende 3.
3. Tænderne af blosterets farve ..... commutatum
   " blegere, ofte hvide 4.
4. 2-3(4) blade. Blomsterne blåduggede ..... botryoides
   Mange " . " ikke blåduggede 5.
5. Bladene 1½-3mm brede, smalt furede eller sivagtige atlanticum
   " 3-6mm " , furede neglectum

Muscari parviflorum Desf. Småblomstret perlehyacint. 10-25cm. Bladene 1-2(3½)mm brede, furede. 14(8-20) blomster på 3-5mm, med udbøjede tænder med en mørkere plet. IX-X. C (Catanzaro-prov.)

M. commutatum Guss. Mørk druehyacint. 10-20cm. Blosteret 5-6mm, sortblåt. Frugtknuden grøn. 2-5 blade, 1,8-2,4mm brede ved grunden, længere oppe indtil 4-5mm brede. III-IV. A B C

M. neglectum Guss. Druehyacint. 10-30cm. Blosteret blålillat, 6-7mm. Bladene bredt furede med gulnende spids. III-VI. A B K

M. atlanticum Boiss.& Reuter 10-20cm. Bladene med gulnende spids. Blosteret 4-4½mm, blålillat. III-VI. A B C K

M. botryoides (L.) Miller Perlehyacint. Bladene 5-12mm brede og oprette. Blomsterne 2½-4mm, m.m. kugleformede, stærkt indsnørede, klart blå. II-IV. A B C K

M. comosum (L.) Miller Duskhyacint. 15-80cm. Med en endestillet halvskærm af lyslilla, golde blomster på 6-25mm lange, lyslilla stilke. Selve klasen mindst 15cm. IV-VI. A B C K

Allium. Løg.

1. Indre støvtråde langt trespidsede ..... 2.
   " " enkle eller med 2 små tænder 12.
2. Skærmen med yngleknopper ..... 3.
   " uden " 5.
3. Bladene flade, 4-15mm brede ..... sativum
   " m.m. trinde, i det mindste hule forneden 4.
4. Svøbet mest 2-bladet, blivende ..... sphaerocephalon
   " 1-bladet, affaldende vineale
5. Bladene flade, 4-20mm brede ..... 6.
   " trinde eller kølet trekantede, 1-4(8)mm brede 8.
6. Indre blosterblade uregelmæssigt savtakkede ..... commutatum
   Alle " helrandede 7.
7. Løghinden nettrævlet. Blomsterne mest mørklilla atroviolaceum
   " hindeagtig. " " lysere ampeloprasum
8. Svøbet mest 2-bladet, blivende ..... 9.
   " 1-bladet, affaldende 10.

9. Blosteret lyserødt eller rødlillat ..... sphaerocephalon
" hvidt med grøn eller gullig ribbe arvense
10. Blosteret hvidt med grøn eller lyserød ribbe ..... sardoum
" anderledes 11.
11. Bladene kølet-trekantede ..... amethystinum
" halvtrinde vineale
12. Stænglen 1-4cm høj ..... chamaemoly
" højere 13.
13. Bladene flade, 4-20mm brede eller endnu bredere ..... 14.
" m.m. trinde, sjældent flade og 2-3mm brede 22.
14. Stænglen trekantet ..... 15.
" sammentrykt 17.
15. Stænglen med 2 spidse og 1 but kant ..... neapolitanum
" " 3 " kanter 16.
16. Blosteret med 3 grønne ribber ..... pendulinum
" " 1 grøn ribbe triquetrum
17. Bladene over 2cm brede ..... 18.
" under 2cm " 20.
18. Bladene bredt lancetformede og stilkede ..... ursinum
" båndformede 19.
19. Blosterbladene butte, lyserøde eller hvidlige ..... nigrum
" spidse, grønlige eller rødlilla cyrilli
20. Blosteret hvidt med lyserød ribbe. 3 blade .... trifoliatum
" ensfarvet 21.
21. Blomsterne hvide. Bladene oftest randhårede ... subhirsutum
" mest lyserøde. Bladene glatte roseum
22. Stænglen tyk, hul hele vejen ..... cepa
" tynd, ikke eller kun lidt hul 23.
23. Svøbet 1-bladet, omskeder skærmens grund ..... cupanii
" 2-3-bladet eller 2-3-delt 24.
24. Svøbet tydeligt kortere end skærmen ..... senescens
I det mindste det ene svøbblad af skærmens længde 25.
25. Blomsterne gule. Bladene blågrønne ..... flavum
" højst brungule 26.
26. Støvdragerne tydeligt udragende ..... pulchellum
" omtrent lig blosteret 27.
27. Blosterbladene spidse ..... tenuiflorum
" butte 28.
28. Blosteret 4-5mm, brodspidset, hvidt, mørkstilket .. pallens
" 5-8mm, afstudset-afrundet 29.
29. Blomsterne lyst rødlilla eller hvide ..... paniculatum
" grønbrune eller grumsethvide fuscum

Allium sativum L. Hvidløg. 50-80cm. 6-12 blade, der omskeder halvdelen af stænglen. Svøbet med et langt næb, op til 25cm. Støvknapperne indesluttede. VI-VII. Dyrket og sj. forv.

A. sphaerocephalon L. Hovedløg. 30-90cm. 2-5 ofte visne blade. Svøbet 1-2cm langt. Blosteret lyserødt eller rødlillat, sjældent hvidt, 3½-5½mm, but. VI-VIII. A B C K

A. atroviolaceum Boiss. Mørkt løg. 50-100cm. Bladene 4-12mm brede, finttandede, omskeder 1/3-1/2 af stænglen. Skærmen 3-6cm bred og kugleformet. Ydre svøbblade spidse, indre butte. VI. A

A. vineale L. Sandløg. V-VII. A B C K

A. ampeloprasum L. Porreløg. 40-100cm. Bladene (½)1-4cm brede, rurandede. Skærmen 5-9cm bred, kugleformet, mest tæt, med 30-500 blomster på 3½-5½mm. Svøbet udelt og affaldende. IV-VI. A B C K

A. commutatum Guss. Savtandet løg. 40-180cm. Lig foregående, men bladene op til 4½cm brede. Svøbet langnæbbet, 8-22cm. VII-VIII. A C K

A. amethystinum Tausch Ametystløg. 50-120cm. Stænglen ofte rødlig, 1/4-1/3 omskedet. Bladene hule, 2-8mm tykke, ofte finttandede. Skærmen tæt, 3½-5cm. Blomsterne rødlilla, 3-4½mm. V-VII. ABK

Allium sardoum Moris Stribet løg. 30-80cm. Bladene trådformede, 1-2mm brede, 1/3-1/2 omskedende. Skærmen tæt, 1-3½cm. Svøbet enkelt, men delt i lancetformede flige. IV-VI. A B C K

A. arvense Guss. (A. sphaerocapehalon ssp. a.) 30-60cm. Som sphaerocephalon, men skærmen 2-2½cm med de nedre stilke nedadbøjede. VI-VIII. A B C K

A. flavum L. Gult løg. 20-40cm. 2-3 blade på op til 20cm x 2mm. Ydre skærmstilke ofte nedbøjede. Blosteret 4½-5mm, citrongult. Støvdragerne udragende. VI-VII. A B C K

A. pulchellum G.Don Smukt løg. 30-50cm. Stænglen ½ omskedet. Bladene 2-3mm brede, med rynket rand. Blomsterne lysende rødlilla. Stilkene uens, de indre ofte oprette. VI-IX. C (Pollino)

A. tenuiflorum Ten. 15-30cm. Bladene næsten børsteformede. Blosteret blegrødt med mørk ribbe. VI-VII. A B C K

A. pallens L. Blegt løg. 30-45cm. Bladene halvtrinde, 1-1½mm, let furede. Blomsterstilkene næsten ens. Blosterbladene med afskåret-afrundet spids. VI-VII. A B C K

A. paniculatum L. Topløg. 20-60cm. Bladene karakteristisk indrullede som tørre. Svøbets lange del med næb og indtil 14cm. Skærmen 3½-7cm, halvkugle- til ægformet. VI-VIII. A B C K

A. fuscum W.& K. Brunt løg. 20-60cm. Skærmen fåblomstret. Det ene svøbblad ofte 1½-3 x skærmen. Blomsterstilkene lyse med brunt skær. VI-VII. A (Gargano)

A. cupanii Rafin. Kvastløg. 9-30cm. Bladene ½mm brede, blivende under blomstringen, glatte eller dunede. Skærmen kvastformet med 3-15 uens langt stilkede blomster på 7-8mm. VI-IX. A B C

A. senescens L. Kantet løg. 10-30cm. Løgene aflange. Stænglen tokantet foroven. Bladene 1½-2mm tykke, næsten flade. Svøbet 5-8 mm. Blomsterne lyst rødlilla. VII-VIII. B C K

A. cepa L. Haveløg. VI-VIII. Dyrket og forvildet.

A. nigrum L. Bredbladet løg. 50-100cm. Bladene 1-2(6)cm brede, med bølget rand. Skærmen tæt og halvkugleformet, 7-9cm. Blosteret 6-9mm, stjærneformet udstående i blomst. IV-V. A B C K

A. cyrilli Ten. Smalfliget løg. 50-60cm. Bladene blågrønne, 1-3½ cm brede, finttandede. Skærmen 4-7cm bred. Blosteret 6-7x1-1½mm, hvidt med bred, grøn stribe. IV-V. A (Conversano)

A. neapolitanum Cyr. Hvidt løg. 20-40cm. Bladene 5-20mm brede, kølede, oftest 2 stk. Svøbet udelt, blivende og kortere end stilkene. Blosteret mælkehvidt, 7-12mm. V-VI. A B C K

A. roseum L. Rosenløg. 10-50cm. Løghinden kalkagtig med mange, små huller. Bladene med finttandet rand. Svøbet mest firfliget. Blomsterne blegrøde eller hvide. IV-V. A B C K

A. subhirsutum L. Randhåret løg. 20-50cm. Bladene slappe, 3-10mm brede. Svøbet med 2-3 korte lapper. Skærmen åben. Blosteret 7-9mm, skinnende hvidt. Støvknapperne mest brune. III-V. A B C K

A. trifoliatum Cyr. Trebladet løg. 15-45cm. 2-3 svagt hårede, 2-15mm brede blade. Svøbet op til 2cm, enkelt, blivende. Blosteret stjærneformet og spidst. IV-V. A B C K

A. triquetrum L. Trekantet løg. 10-30cm. Ydre blade længere end stænglen, de indre kortere og krumme, alle brat afsmalnede i en but spids. Blosteret klokkeformet, hvidt, 10-15mm. XII-IV. ABCK

A. pendulinum Ten. Hængeløg. 6-25cm. 2 blade, 3-8mm brede. Blosteret kugle-klokkeformet. Blomsterstilken fortykket mod spidsen. IV-VI. A B C K

Allium ursinum L. ssp. ucrainicum Kleopow & Oxner Ramsløg. ABCK

A. chamaemoly L. Dværgløg. 1-4cm. Bladene og blomsterne omtrent i jordhøjde. Bladene 3-8mm brede og randhårede. Skærmen med 5-10 hvide blomster på 7-8mm. XII-III. A B C K

Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindley Klokkeløg. 60-120cm. Bladene 1-3cm brede, kølede og ofte sammenlagte. Blosteret bredt klokkeformet, 14-16mm, mat grønlig-rødt. Stilkende hænger nedad i blomst, senere oprette. V-VI. B (Potenza)

Streptopus amplexifolius (L.) DC. Snoaks. 30-80cm. Minder om Polygonatum, men bladene mere tilspidsede og stænglen tydeligt zigzagbøjet. Blomsterne enlige, på en knækket stilk, der er bøjet op under bladet. Blosteret 8-9mm. VI-VIII. C (Sila, Aspromonte)

Polygonatum odoratum (Miller) Druce Kantet konval. IV-VI. B C K

P. multiflorum (L.) All. Storkonval. V-VII. A B C K

Paris quadrifolia L. Firblad. VI-VII. C (Sila) K

Asparagus. Asparges.

1. Kladodierne (bladene) tornagtige. Stænglerne forveddede .. 2.
   " " bløde. Stænglerne urteagtige 3.
2. En torn på 5-12mm ved hvert bladknippe ..... albus
   " " " ca.1mm " " " acutifolius
3. Stænglerne længdestribede af bruskagtige småvorter maritimus
   " jævne 4.
4. Kladodierne 10-30 sammen, 0,1-0,2mm brede ..... tenuifolius
   " 3-8(15) sammen, over 0,2mm brede officinalis

Asparagus officinalis L. Alm. asparges. V-VI. A B C K

A. maritimus (L.) Miller Bitter asparges. 40-80cm. Kladodierne 10-30x0,3-0,8mm, 4-7(3-11) sammen, lidt affladede. Blomsterstilkene mest 6-10mm. Mest i klitlavninger. V-VI. A

A. tenuifolius Lam. Stenasparges. 30-80cm. Stærktgrenet. Kladodierne bløde og hårtynde, 5-7mm lange. Blomsterstilken 1-2½cm, leddet under blosteret. V-VI. A B C K

A. acutifolius L. Buskasparges. 30-150cm. Kladodierne 2-8(10)mm x 0,3-0,5mm, ret ens, mest 10-30 sammen. Stænglerne længdestribede. Bærret sort. VIII-IX. A B C K

A. albus L. Hvidgrenet asparges. 50-100cm. Kladodierne 5-25x½-1½ mm, 10-20 sammen. Stænglerne jævne eller meget svagt stribede. Bærret sort. VIII-X. C

Ruscus aculeatus L. Musetorn. 30-60cm. Halvbusk med mørkegrønne grene og mørkegrønne, æg-lancetformede, tornspidsede, stive kladodier på 20-30x8-14mm med blomster og frugter udgående midt fra kladodiets overside. Blomsterne grønlige, 4mm. Rødt bær. A B C K

R. hypophyllum L. Blød musetorn. 30-60cm. Som den foregående, men kladodierne 5-10cm lange og ikke stikkende. Blomsterstilken med et støtteblad på 5x1½mm. XII-IV. K (Salernit.)

Smilax aspera L. Pigtråd. 1-4m. Stedsegrøn slyngplante med tornede, glatte stængler og spredte, hjærte-pilformede, læderagtige blade på ofte 8-10x4-5cm. Blomsterne hvide, 4-5mm, i skærme eller korte klaser fra de øvre bladhjørner. Med bær. IX-XI. A B C K

AGAVACEAE

Agave americana L. Sekelplante. Tykbladet rosetplante med spidse blade på 80-100cm. Blomstrer een gang med en bred, 2-5m høj top. VII-VIII. Dyrket og forvildet i A B C K

AMARYLLIDACEAE

Sternbergia. Tordenurt. Ligner gule, høstblomstrende krokus, dog med 6 støvdragere.

S. colchiciflora W.& K. Stængelløs tordenurt. 5-10cm. Ingen blade under blomstringen, men først om våren: 4-10cm x 2-5mm. Stænglen mest underjordisk. Blosterrøret så langt som blosterbladene, der er 3-4cm x 2-5mm. IX-X. B C (Pollino)

S. lutea (L.) KG. Tordenurt. 12-22cm. Med 7-15mm brede blade under blomstringen. Stænglen 4-10 cm under blomstringen. Blosterbladene 3½-6x1-2½cm, butte. IX-X. A B C K

Galanthus nivalis L. Vintergæk. III-IV. A B C K

Pancratium maritimum L. Strandlilje. 30-50cm. Bladene op til 50 x 2cm, mørkt grågrønne. 5-10 10-15cm lange, hvide blomster i skærm med et 6-8cm langt blosterrør. Blomstens øvre del tragtformet med en 12-tandet bikrone. Sandstrand. VII-IX. A B C K

Narcissus. Narcis.

1. Bikronen 1-2 x så lang som bred ..... 2.
   " højst ½ x så lang som bred 3.
2. Bikronen 2 x så lang som bred ..... pseudonarcissus
   " så lang som bred. Blomsten bleggul incomparabilis
3. Bladene trinde, 2-4mm tykke ..... 4.
   " flade, 5-12mm brede 5.
4. Blomsterne gule. Bikronen 4mm høj ..... jonquilla
   " hvide. " 1-1½mm høj serotinus
5. Blomsterne enlige. Bikronen med orangerød rand ..... 6.
   " mest flere sammen. Bikronen anderledes 7.
6. Blosterbladene næppe overlappende ..... radiiflorus
   " overlappende poeticus
7. Blomsterne mest 2 sammen. Blosterrøret 20-25mm .... biflorus
   " " 3-15 sammen. Blosterrøret 12-18mm tazetta

N. jonquilla L. Sivnarcis. 20-45cm. Bladene 3-4mm tykke, furede. 2-6 blomster sammen. Blosterrøret 2cm, fligene 1-1½cm. Bikronen gul og rundtakket. III-IV. Dyrket og forvildet i A K

N. serotinus L. Høstnarcis. 10-30cm. Bladene udvikles efter blomstringen, 2mm tykke. 1 blomst med støtteblad på 2-3cm og et rør på 1-2cm og flige på 10-16mm. Orange bikrone. IX-XI. A B C K

N. tazetta L. Tazet. 20-50cm. Bladene 1cm brede. Støttebladet 3-5cm3-8(15) blomster. Fligene 9-12x4-8mm. Bikronen gul, 6-11x3-6 mm. XII-III. A B C K

N. biflorus Curtis (N. medioluteus) Tveblomstret narcis. 20-40cm. Bladene blågrønne, 7-10mm brede. Blosterbladene rundagtige, ca. 2 cm. III-IV. Dyrket og forvildet.

N. radiiflorus Salisb. Smalbladet pinselilje. 20-30cm. Bladene blågrønne, 5-8mm brede. Blosterbladene 22-30mm, lancetformede. IV-V. C (Pollino) K (M.Lattari)

N. poeticus L. Pinselilje. Bladene 6-10mm brede. Blosterbladene 20-25mm, omvent ægformede til rundagtige. IV-V. A B C K

N. pseudonarcissus L. Påskelilje. III-V. Dyrket og forvildet.

N. incomparabilis Miller Ægte narcis. 20-40cm. Stænglen tokantet. Bladene 10-12mm brede. Blomsten enlig, lugtløs. Bikronen guldengul og kopformet. II-IV. Dyrket og sj. forvildet i K

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L. Fedtblad. 1-4m. Slyngplante med spredte, ret

store (5-10x3-8cm), hjærteformede, fedtglinsende blade med 3-9 buekrummede årer med tværgrene. Små, 6-fligede, grønne blomster i klaser fra bladhjørnerne. IV-V. A B C K

IRIDACEAE

Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb. Hermesfinger. 20-40cm. En Iris med gulgrønne blomster med brunlilla ydre kronblade og smalle, 4-kantede, sivagtige blade. II-III. A B C K

Iris. Sværdlilje.

1. Bladene med firkantet tværsnit ..... Hermodactylus tuberosus
   " flade 2.
2. 1-2 blade, der ikke er toradet stillede ..... sisyrinchium
   Bladene toradede 3.
3. Ydre blosterblade med en stribe hår (skæg) ..... 4.
   " " glatte eller dunede 8.
4. Stænglen med 1(3) blomst, mest kortere end bladene ..... 5.
   " " 2-flere blomster, længere end bladene 6.
5. Blosterrøret rager ikke ud af hylsterbladet ..... chamaeiris
   " " ud af hylsterbladet pseudopumila
6. Støttebladene hindeagtige i den øvre halvdel ..... germanica
   " kun hindeagtige i spids og kanter 7.
7. Blomsterne hvide eller blegblå med mørkere årer florentina
   " lilla revoluta
8. Blomsterne gule eller gullilla ..... 9.
   " blå til lilla 10.
9. Blomsterne mest matlilla. Stænglen med en kant foetidissima
   " gule. Stænglen trind pseudacorus
10. Hylsterbladet med hvid hindekant ..... sibirica
    " grønt sintenisii

Iris pseudopumila Tineo Siciliansk sværdlilje. 12-20cm. Bladene 9-20x1½-3½cm. Blomsterne gule eller lilla, med gult skæg. Blosterrøret 3-5 x frugtknuden, 5-7½cm. III-V. A

I. chamaeiris Bertol. (I. lutescens) Bleggul sværdlilje. Bladene 5-30x½-2½cm. Blomsterne gule eller lilla, med gult skæg. Blosterrøret1½-2 x frugtknuden, 2-3½cm. IV-V. K (Salernit.)

I. germanica L. Havesværdlilje. 50-100cm. Hylsterbladene m.m. hvide og hindeagtige. Blomsten 10-12cm, lyslilla eller over i det blå. Skægget gult. IV-VI. Dyrket og forvildet i A B C K

I. florentina L. Violrod. 40-100cm. V. Dyrket og lidt forvildet.

I. revoluta Colasante 30-60cm. Blosterrøret 2 x frugtknuden og ca. ½ x blosterfligene. III. Strandhede. A (Porto Cesareo ved Majuso-klippen)

I. pseudacorus L. Gul sværdlilje. IV-VI. A B C K

I. foetidissima L. Stinkende sværdlilje. 30-90cm. Bladene mørkegrønne. Blosterrøret grønligt, de ydre flige gullige inderst, ellers matlilla, de indre lysegule og lillaanløbne. V-VIII. A B C K

I. sibirica L. Sibirisk sværdlilje. 30-80cm. Grundbladene 4-10mm brede. 1-3 blomster med op til 10mm lange stilke og et blosterrør på 4-7mm. Stænglen hul. V-VI. A (Ortanova, Cerignola)

I. sintenisii Janka (I. collina) Næbsværdlilje. 15-30cm. Bladene 3-5(6)mm brede. Mest 2(3)-blomstret. Ydre blosterblade 8-12mm brede. Frugtknuden med et smalt næb på 12-22mm. V-VI. A B C K

I. sisyrinchium L. Toknoldet sværdlilje. 8-12cm. Bladene 10-30cm x 1½-5mm, ofte liggende og halvcirkelformet krummede. Blosterbladene 1½-3cm, himmelblå, ofte med en gul plet. IV-V. A B C K

Crocus. Krokus.

1. Bladene 4-8mm brede. IV-VI ..... 2.
   " 1-4mm " . X-IV 3.
2. Griflen mindst så lang som støvdragerne ..... napolitanus
   " kortere end støvdragerne albiflorus
3. Bladene randhårede. Griffelgrenene 10-16(20)mm .... thomasii
   " glatte 4.
4. Støvknapperne lidt længere end støvtråden. X-XII longiflorus
   " 2 x støvtråden. I-IV 5.
5. Løghinden hindeagtig. Bladene 1-2mm brede ..... biflorus
   " trævlet. Bladene (1)2-3mm " 6.
6. Blomsterne lugtløse, kortere end bladene ..... imperati
   " vellugtende, ca. = bladene suaveolens

Crocus imperati Ten. Fingerkrokus. 3-6 skinnende, mørkegrønne blade, mindst 1,3 x blomsterne, til sidst liggende. Med støtte- og forblad. Griflen mørkorange til rød. I-III. B C K (Capri m.m.)

C. suaveolens Bertol. Nær foregående, men bladene oprette, ca. = blomsten. Intet forblad. Griflen gul eller orange. Blomsten lilla og ofte med gulligt skær. II-III. K (Salernit. på M. Sacro)

C. napolitanus KG. 10-20cm. Blosteret mest lillat uden striber. Blosterbladene 25-40x7-13mm. Støvknapperne 15-16mm. IV-V. B C K

C. albiflorus Kit. Hvid krokus. 8-15cm. Blosteret hvidt, lillat eller hvidt med lilla striber. Blosterbladene 15-30x3-10mm. Støvknapperne 7-8mm. IV-VI. B C K

C. longiflorus Rafin. Skedekrokus. Bladene 1-3mm brede, ofte meget korte i blomst. 1-2 blomster, lilla, ofte med mørkere årer. Svælget gult. Griflen orangerød, med 3 frynsede grene. A B C K

C. thomasii Ten. Randhåret krokus. Blomsterne lilla, mest uden mørkere årer. Svælget gulligt og dunet. Blosterbladene 2-4½cm. Griflen rød eller mørkorange, støvfangene hele. X-XI. A B C

C. biflorus Miller Tveblomstret krokus. Løghinden adskilles i ringe forneden. Blosterbladene 15-45x4-18mm, hvide (blålilla) med ofte 3-5 mørke årer. 3 udvidede griffelgrene. I-IV. A B C K

Romulea. Sivstjærne. Små, oftest lilla/hvide blomster. Trådformede blade uden hvidt bånd. Blomsterne mest på en kort stængel.

1. Blomsterne udgår fra løget, lyst rødlilla ..... purpurascens
   " sidder på en stængel 2.
2. Griffel og støvfang rager op over støvdragerne bulbocodium
   " " " højst lig støvdragerne 3.
3. Bladene trinde, 0,8mm brede, slappe og liggende ..... rollii
   " halvtrinde, 1-1½mm brede, m.m. oprette 4.
4. Øvre støtteblad kun hindeagtigt i kanten ..... ramiflora
   " " overvejende hindeagtigt columnae

Romulea bulbocodium (L.) Seb.& Mauri Langgriflet sivstjærne. 3-15cm. Blosteret 2-3½cm, meget forskelligt farvet, svælget mest gult. Øvre støtteblade mest hindeagtigt og brunligt. II-IV. ABCK

R. rollii Parl. Klitsivstjærne. Bladene 15-25cm lange og m.m. snoede. Blomsten 15-22mm. Svælget gulligt og m.m. håret. Støvtrådene hårede. Øvre støtteblad mest hindeagtigt. II-III. A

R. ramiflora Ten. Blå sivstjærne. 10-25cm. Bladene 25-40cm. Blomsten 15-25mm, blålilla, undertiden mørkstribet. II-III. A C K

R. columnae Seb.& Mauri Mørkåret sivstjærne. 2-15cm. Blomsterne 10-12mm, bleglilla med mørkere striber. Bladene 3-8(20)cm. ABCK

R. purpurascens Ten. Rosensivstjærne. 5-15cm. Grundbladene indtil 25cm. 5-6 stængelblade. Blosteret 1½-4½cm, med gult svælg. III. Dyrket og sj. forvildet. K (Napoli)

Gladiolus. Jomfrufinger. Bladene sværdformede. Blomsterne rødlilla, ofte ensidige, aksstillede, lidt uregelmæssige.

1. Støvknappen længere end støvtråden ..... italicus
   " højst lig støvtråden 2.
2. Det nederste blosterblad tydeligt større end sine 2 naboer byzantinus
   De 3 nederste blosterblade nogenlunde lige store 3.
3. Blosteret stort, 4-5cm. Støvknappen lig støvtråden communis
   " mindre, 3cm. Støvknappen kortere end støvtråden 4.
4. Frøene kantede, uden vinger. Ischia og Capri ... inarimensis
   " 5-6mm, smalvingede dubius

Gladiolus italicus Miller Markjomfrufinger. Blosteret 4(3-5)cm. Øvre blosterblade uens, de nedre ligeså; det nederste med en hvid, mørkkantet plet. IV-V. A B C K

G. byzantinus Miller 50-100cm. Nedre skeder ofte rødårede. Akset ofte med 1-2 sidegrene. Blosterbladene overlappende, de øvre ret ens; det nederste æg-rudeformet. III-V. B C

G. communis L. Grenet jomfrufinger. 50-80cm. Nedreskeder ofte med grønne eller lyserøde årer. Akset ofte med 2-3 sidegrene. Blosteret ofte lyserødt. VI-VII. A B C K

G. inarimensis Guss. V-VI. K (Ischia og Capri)

G. dubius Guss. 30-60cm. V-VI. A B C K

JUNCACEAE

Juncus. Siv.

1. Enårig ..... 2.
   Flerårig 9.
2. Bladene med tydelige tværvægge ..... 3.
   " uden tværvægge 4.
3. 1-5 nøgler med 2-5(8) blomster ..... pygmaeus
   2(3) " " 8-16 blomster tingitanus
4. Stænglen bladløs. 1-4 nøgler med 5-10 blomster ... capitatus
   " med 1-2 blade 5.
5. Blomsterne altid enlige langs grenene ..... 6.
   De øvre blomster til dels i nøgler på 2-20 8.
6. Kapslen kugleformet ..... tenageja
   " ægformet til ellipsoidisk 7.
7. Bladene trådformede, op til 1mm brede ..... bufonius
   " flade, 1-2½mm brede foliosus
8. Nedre blomster enlige, øvre parvise ..... ranarius
   Alle blomster i nøgler på 2-3(4-6) hybridus
9. Alle blade grundstillede, trinde og stængellignende ..... 10.
   Bladene forskellige fra stænglerne 16.
10. Blomsterstanden trængt til side af det lange, stængellignende støtteblad ..... 11.
    Blomsterstanden mindst lig støttebladet 14.
11. Nedre bladskeder sortbrune og skinnende ..... 12.
    " " gulbrune og matte 13.
12. Kapslen 1½-2 x blosteret. Planten grøn ..... depauperatus
    " ca. = " . " blågrøn inflexus
13. Blomsterstanden sammentrængt. Stænglen rillet conglomeratus
    " oftest åben. Stænglen jævn effusus
14. Blosteret gulgrønt, mindst lig kapslen ..... maritimus
    " brunt, 1/2-2/3 x kapslen 15.
15. Kapslen 4-6mm, spidsen kegleformet eller trekantet acutus
    " 2½-4mm, " but litoralis
16. Hver enkelt blomst med 2 forblade under sig ..... 17.
    Blomsterne uden forblade under sig 19.
17. Bladene 6-8mm brede, hule og sammentrykkelige ... subulatus
    " smallere, ikke hule 18.
18. Blosteret 2-3mm, ca. ½ x kapslen ..... compressus
    " 4mm, ca. = kapslen gerardi

19. Bladene uden tydelige tværvægge ..... bulbosus
" med " " 20.
20. Grundbladene reducerede til bladskeder ..... subnodulosus
" med veludviklet bladplade 21.
21. Bladene (især skederne) tydeligt længdestribede ..... 22.
" jævne 23.
22. Stænglerne længdestribede. Nøglerne med 10-20 blom. striatus
" jævne. Nøglerne med 5-8 blomster thomasii
23. Indre blosterblade længere end de ydre ..... acutiflorus
Blosterbladene lige lange articulatus

Juncus subulatus Forsskål Mellembrudt siv. 50-100cm. 2-4 slappe stængelblade. Toppen 10-20cm, åben og mangeblomstret. Blosteret spidst, længere end den butte kapsel. V-VI. A B C

J. tenageja L.f. Tyndstænglet siv. 5-30cm. Bladene smalle, ½-1mm brede. Bladskederne ender i 2 afrundede øren. Blosterbladene 2-2½ mm, de ydre spidse, de indre butte. V-VII. C (Sila)

J. foliosus Desf. Stor tudsesiv. 15-50cm. Blomsterstanden optager ofte det meste af stænglen. Blosterbladene 4-6mm, ofte med en mørk streg før hindekanten. IV-VI. B (Muro) K (Salernit.)

J. bufonius L. Tudsesiv. V-IX. A B C K

J. ranarius Song.& Perr. Klægsiv. 5-20cm. Indre blosterblade butte, ca. = kapslen. IV-V. B (Metaponto)

J. hybridus Brot. Svikkelsiv. 5-20cm. Toppen bred, danner ofte en flad vifte. Blosterbladene uens, de ydre længst, 4-5mm, de indre m.m. butte, ca. = kapslen. IV-VII. A B C K

J. compressus Jacq. Fladstrået siv. VI-VII. A B C K

J. gerardi Loisel. Harril. V-VII. A (Pen. Salent.)

J. effusus L. Lysesiv. V-VII. A B C K

J. conglomeratus L. Knopsiv. V-VII. B C K

J. inflexus L. Blågråt siv. VI-VIII. A B C K

J. depauperatus Ten. 30-50cm. Nær foregående, men mindre. Kapslen tilspidset. 0-1000m. V-VI. (Pollino) B C

J. acutus L. Stikkende siv. 50-150cm. Tæt tueformet og stærkt stikkende. Nedre støtteblad 3-6cm, med kølet grund. Blosteret 2½ mm, ydre blade spidse, indre butte/afskårne. IV-VII. A B C K

J. litoralis C.A.Meyer Hindeblomstret siv. 50-150cm. Som foregående, men bladene mindre stikkende og kvasten lidt mere åben. V-VII. A (Varano ved Gargano). Klitlavninger.

J. maritimus Lam. Strandsiv. VI-VIII. A B C K

J. pygmaeus Richard Dværgsiv. 1-15cm. Blosterbladene 3½-6mm, ret ens. Kapslen 2½-3½mm. IV-V. A (Lecce)

J. tingitanus Maire & Weill. Tvehovedet siv. 5-20cm. Blosterbladene 6-7mm, langt tilspidsede, de indre længst. Kapslen længere end blosteret, med et langt næb. Klitlavninger. IV-V. K (Fusaro nær Napoli)

J. subnodulosus Schrank Butblomstret siv. VI-VIII. A B C K

J. bulbosus L. Lidet siv. VI-VII. C (Aspromonte)

J. articulatus L. Glanskapslet siv. V-VIII. A B C K

J. acutiflorus Ehrh. Spidsblomstret siv. 30-80cm. Nær foregående men med mange hoveder. Blosterbladene tilspidsede, de ydre ofte udbøjede. V-VII. A B C K

J. striatus Schousb. Stribet siv. 30-60cm. Med krybende jordstængel. 2-20 hoveder. Blosterbladene tilspidsede, de indre længst.

Kapslen lidt længere end blosteret. 0-1000m. V-VI. A B C K

Juncus thomasii Ten. Kantet siv. 30-100cm. Bladene med kantet tværsnit og fladere rygside. 5-30 hoveder. Blosteret tilspidset til brodspidset. Kapslen but med kort brod. VI-VII. B C (Sila)

J. capitatus Weigel Fint siv. 2-15cm. Blosterbladene hvidlige, senere rødbrune, de ydre længst. IV-V. B C K

Luzula. Frytle.

1. Blomsterne enlige ..... 2.
   " i nøgler, hoveder eller aks 3.
2. Bladene 7-10mm brede. Frugtstilkene nedadrettede .... pilosa
   " 1-3mm " . " opadrettede forsteri
3. Blomsterne samlede i et nikkende aks ..... pindica
   " i nøgler eller hoveder eller korte, oprette aks 4.
4. Blomsterne i nøgler på 2-3 ..... sieberi
   " i mangeblomstrede hoveder 5.
5. Blomsterne i hovedformede aks på 12-15x4-5mm ..... calabra
   " i hoveder 6.
6. Nøglerne m.m. nikkende i frugt. Korte udløbere .. campestris
   " oprette. Ingen, korte, underjordiske udl. multiflora

Luzula forsteri (Sm.) DC. Smalbladet frytle. 20-30cm. Bladene med en kort brodspids på 0,1-0,2mm. Nedre bladskeder rødlilla til lilla. III-V. A B C K

L. pilosa (L.) Willd. Håret frytle. V-VII. C (Sila)

L. sieberi Tausch Granfrytle. 40-60cm. Bladene 4-5mm brede, tydeligt randhårede. Blosteret rødbrunt, 3-3½mm. Kapslen kortere end blosteret. VI-VII. B C K

L. campestris (L.) DC. Markfrytle. IV-VII. A B C K

L. multiflora (Ehrh.) Lej. Mangeblomstret frytle. IV-VI. ABCK

L. calabra Ten. 20-40cm. Nær foregående. Ret få, mangeblomstrede aks. Blosterbladene 2mm. 500-1500m. V-VI. C (Sila)

L. pindica (Hausskn.) Chrtek & Krisa Bredbladet aksfrytle. 20-45 cm. Bladene 2-5cm x 1-4(8)mm. Støtte- og forblade frynset-randhårede. Blosteret 2-3mm, mørkebrunt. 1600-1900m. VI-VIII. B (Volturino, Pollino) C (Sila)

COMMELINACEAE

Commelina communis L. Fattigjøde. 30-70cm. Liggende til opstigende med spredte, æg-lancetformede, buestrengede, omskedende blade på 5-7cm. 2 større blå og 1 mindre hvidt kronblad. Få blomster sammen over 2 bladagtige støtteblade. VII-IX. Forv. i K

GRAMINEAE

Svøbgræsser: 1-flere småaks i en kort stand, m.m. omgivne af et fællessvøb.

Aksgræsser: Småaksstanden består af et enkelt eller flere aks, hvor de enkelte småaks sidder m.m. lige på aksets akse, eller hvor hvert andet kan være kortstilket.

Duskgræsser: Småaksstanden danner en (eller flere) sammentrængt top, hvor man ved ombøjning kan erkende, at småaksene sidder på korte, grenede stilke og derfor ikke direkte på aksen.

Topgræsser: Småaksstanden en top med for det meste synlige stilke.

Svøbgræsser

Flerårig. 1 helt indesluttet småaks ..... Lygeum

Aksgræsser

1. Småaksstanden består af flere aks ..... 2.
   " " " 1 aks 15.
2. Med knæbøjet stak ..... 3.
   Uden " " 5.
3. 3-20 m.m. fingerformet stillede aks ..... Dichanthium
   Aksene parvise 4.
4. Flere par aks ..... Hyparrhenia
   1 par aks Andropogon
5. Aksene m.m. fingerformet stillede ..... 6.
   Nogle eller alle aks spredtstillede 9.
6. Skedehinden hindeagtig ..... 7.
   " hårformet 8.
7. Oftest 2 aks. Alle småaks siddende ..... Paspalum paspalodes
   " flere aks. Nogle småaks stilkede Digitaria
8. Nedre yderavne med en kort stak på 1½-2mm ... Dactyloctenium
   Avnerne uden stak Cynodon
9. Småaksene m.m. indsænkede i en tyk akse ..... Hemarthria
   " ikke " 10.
10. Skedehinden hårformet ..... 11.
    " hindeagtig eller manglende 12.
11. Småaksstanden tæt og duskformet ..... Aeluropus
    " åben og topformet Cleistogenes
12. Enårig ..... 13.
    Flerårig 14.
13. De enkelte aks tiltrykte ..... Brachiaria
    " " " udstående Echinochloa
14. Inderavnen mest med brod. Yderavnerne ens ..... Beckmannia
    " uden brod. Yderavnerne uens Paspalum
15. Med en knæbøjet stak ..... Gaudinia
    Ingen " " 16.
16. Akset kort og kugleformet. Avnerne stikkende .... Echinaria
    " forlænget 17.
17. 2-3 småaks ved hvert led ..... 18.
    1 " " " " 20.
18. 2 småaks ved hvert led ..... Taeniatherum
    3 " " " " 19.
19. Alle småaks stilkede ..... Hordelymus
    Midtersmåakset siddende Hordeum
20. Småaksene 1-blomstrede ..... 21.
    " flerblomstrede 25.
21. Akset ensidigt ..... 22.
    " toradet 23.
22. Flerårig. Småaksene med stak ..... Nardus
    Enårig. Småaksene uden stak Mibora
23. Inderavnen med stak ..... Psilurus
    " stakløs 24.
24. Småakset med 1 yderavne ..... Hainardia
    " " 2 yderavner Parapholis
25. 1 yderavne. Småakset vender kanten mod aksen ..... Lolium
    2 yderavner 26.
26. Flerårig ..... 27.
    Enårig 29.
27. Yderavnerne sylformede med 0-1 ribbe ..... Secale
    " ikke sylformede, med flere ribber 28.
28. Småaksene på en kort, ca. 2mm lang stilk ..... Brachypodium
    " siddende Elymus
29. 1-2(6) sammentrykte småaks på 2-3cm Brachypodium distachyon
    Flere og kortere (uden stakken) småaks 30.
30. Akset ensidigt. Yderavnerne uens ..... Vulpia unilateralis
    " toradet til trindt 31.
31. Yderavnerne med 2 kort børstehårede køle ..... Dasypyrum
    " " 0-1 køl 32.
32. Avnerne hvælvede med 2-4 stakke eller tænder ..... Aegilops
    " med 0-1 stak 33.

33. Yderavnerne uens ..... Sclerochloa
" ret ens 34.
34. Yderavnerne m.m. kølede. Uden stak ..... Catapodium
" hvælvede. Kan have stak Micropyrum

Duskgræsser

1. To slags småaks: golde og frugtbare ..... 2.
Småaksene ens 4.
2. Frugtbare småaks brede, vinget-kølede ..... Phalaris
" " smalle 3.
3. Golde småaks spidse, eller med stak ..... Cynosurus
" " butte, uden stak Lamarckia
4. Dusken lådden af hår eller lange stakke ..... 5.
" ikke lådden 8.
5. Småaksene stakløse. Flerårig ..... 6.
" med stak. Enårig 7.
6. Småaksene tiltrykte dusken. Nedre blomst gold ..... Imperata
" udstående. Øvre blomst gold og kølleformet Melica
7. Bladene glatte. Dusken forlænget ..... Polypogon
" blødhårede. Dusken ægformet Lagurus
8. Småaksene omgivne af brunlige børster ..... Setaria
" ikke omgivne af børster 9.
9. Yderavnen med ½-1mm lange krogbørster ..... Tragus
" uden krogbørster 10.
10. Småakset med 1 frugtbar blomst ..... 11.
" " 2-flere frugtbare blomster 17.
11. Yderavnerne med en knudeformet fortykkelse ved grunden
Gastridium
Yderavnerne uden knude ved grunden 12.
12. Inderavnen med stak ..... 13.
" uden stak 14.
13. Yderavnerne uens ..... Anthoxanthum
" lige lange Alopecurus
14. Skedehinden hårformet ..... Crypsis
" hindeagtig 15.
15. Småaksene 11-13mm. Dusken 10-25cm ..... Ammophila
" mindre 16.
16. Yderavnen med en vinget køl ..... Phalaris
" " " uvinget køl Phleum
17. Inderavnen med en lang stak ..... Trisetum
" uden eller med en kort stak 18.
18. Dusken m.m. ensidig ..... 19.
" alsidig 21.
19. Skedehinden hårformet ..... Aeluropus
" hindeagtig 20.
20. Enårig. 2-15cm høj ..... Sclerochloa
Flerårig. 20-130cm høj Dactylis
21. Inderavnen med 3-5 brodspidsede tænder foroven ... Sesleria
" spids eller stump eller kort tokløvet 22.
22. Flerårig ..... Koeleria
Enårig Lophochloa

Topgræsser

1. To slags småaks: Frugtbare og golde ... Duskgræsser, punkt 3.
Småaksene ens eller temmelig ens 2.
2. Småakset med 1 frugtbar blomst ..... 3.
" " 2-flere frugtbare blomster 20.
3. Toppen dækket af hvide hår ..... 4.
" ikke dækket af hvide hår 6.
4. Småaksets akse håret. Toppen 25-60cm ..... Erianthus
Avnerne hårede 5.
5. Yderavnerne hårede ..... Tricholaena
" glatte Melica

6. Småaksene i par af 1 siddende og 1 stilket ..... Sorghum
" alle ens 7.
7. Småakset med 1 frugtbar og 1-2 golde blomster ..... 8.
" uden golde blomster 12.
8. Skedehinden hårformet ..... Panicum
" hindeagtig 9.
9. En lang, knæbøjet stak på 10-20mm ..... Arrhenatherum
Stakken højst 5mm 10.
10. Småaksene med kort stak ..... Holcus
" uden stak 11.
11. Enårig. De golde blomster ikke kølleformede ..... Ehrharta
Flerårig. De golde blomster kølleformede Melica
12. Modne inderavne tykkere end yderavnerne og skinnende ... 13.
" " ikke tykkere end yderavnerne 16.
13. Inderavnen uden stak ..... Milium
" med " 14.
14. Inderavnen glat ..... Oryzopsis
" håret 15.
15. Stakken 1cm. Inderavnen jævnt langhåret (3-6mm) Achnatherum
" mindst 1½cm Stipa
16. Med en stak på 3-5 x inderavnen ..... Apera
Stakken højst 2 x inderavnen 17.
17. Skedehinden kort hårformet ..... Sporobolus
" hindeagtig 18.
18. Blomsten med hår ved inderavnens grund ..... Calamagrostis
" uden " " " " 19.
19. Småaksene 5-6½mm, duskagtigt samlede Phalaris arundinacea
" 1½-3½mm Agrostis m.m.
20. Inderavnerne omgivne af m.m. lange, hvide hår.
Høje planter over 1m med kraftige strå ..... 21.
Inderavnerne ikke omgivne af lange, hvide hår 23.
21. Skedehinden hindeagtig. Tueformet ..... Ampelodesmos
" hårformet. Ikke tueformet 22.
22. Strået forveddet. Yderavnerne næsten lige lange .... Arundo
" urteagtigt. " uens Phragmites
23. Skedehinden hårformet ..... 24.
" hindeagtig 27.
24. Enårig. Aflange småaks med små, taglagte avner Eragrostis
Flerårig 25.
25. Inderavnen med 3 tænder eller spidser fortil .... Danthonia
" " en enkelt spids 26.
26. Stænglen med flere knæ. Yderavnerne uens ..... Cleistogenes
" " 1 knæ. Yderavnerne ret ens Molinia
27. Inderavnen med en ryg- eller grundstillet, oftest knæbøjet stak, der kan være skjult bag yderavnerne .... 28.
Inderavnen uden eller med endestillet stak 36.
28. Enårige ..... 29.
Flerårige 32.
29. Småaksene 1½-5½mm. Stakkene 1½-5mm ..... 30.
" 10-30mm. " 1-5cm 31.
30. Stakken udgår fra inderavnens nedre halvdel ..... Aira
" " " " øvre " Trisetum
31. Småaksene m.m. oprette ..... Ventenata
" hængende Avena
32. Småaksene 3-9mm. Stakkene 2-8mm ..... 33.
" 10-25mm. Stakkene 10-25mm 35.
33. Stakken kølleformet fortykket ..... Corynephorus
" ikke kølleformet fortykket 34.
34. Stakken udgår fra inderavnens nedre 1/3 ..... Deschampsia
" " " " øvre 1/3 Trisetum
35. Nye skuds blade med U-formet tværsnit ..... Helictotrichon
" " " flade eller med V-formet tværsnit Avenula

36. Den ene yderavne omtrent af småaksets længde ..... 37.
Begge yderavner kortere end småakset 40.
37. Flerårig. Med kølleformede, golde blomster ..... Melica
Enårig. Ingen golde blomster 38.
38. Inderavnerne med endestillet stak. Toppen tæt ... Avellinia
" uden stak. Toppen åben 39.
39. Yderavnerne lidt kortere end blomsterne ..... Molinierella
" så lange som blomsterne Aira
40. Inderavnen kløvet med en stak fra kløftens grund ... Bromus
" ikke med kløvet spids 41.
41. Inderavnen med hjærteformet grund. Hængende småaks .. Briza
" uden " " 42.
42. Enårig ..... 43.
Flerårig 47.
43. Inderavnerne langstakkede ..... Vulpia
" uden stak 44.
44. Stive og trekantede topgrene ..... 45.
Topgrenene anderledes 46.
45. Småaksene 6-8mm. Inderavnen 5-ribbet ..... Catapodium
" 7-15mm. " 3-ribbet Cutandia
46. Småaksene 3-7mm, stilkene ikke kølleformede ..... Poa
" 1-3mm, " kølleformede Sphenopus
47. Inderavnerne hvælvede ..... 48.
" kølede 51.
48. Inderavnerne med stak eller skarp spids fortil .... Festuca
" butte eller afskårne fortil 49.
49. Småakset med 2 frugtbare blomster ..... Catabrosa
" " flere frugtbare blomster 50.
50. Øvre yderavne 1-ribbet. Inderavnen 7-11-ribbet ... Glyceria
" " 3-ribbet. " 5-ribbet Puccinellia
51. Nedre topgren enlig ..... Dactylis
" topgrene i krans 52.
52. Inderavnen svagt kølet, spids eller med kort stak
Bellardiochloa
Inderavnen tydeligt kølet, uden stak Poa

Festuca. Svingel.

1. Bladene m.m. flade ..... 2.
Grundbladene foldede eller indrullede 8.
2. Stængelgrunden fortykket, trævlet og løgformet ..... 3.
" ikke fortykket eller trævlet 4.
3. Øvre skedehinder 2-3mm. Topgrenene glatte ..... paniculata
Alle " under 1mm. Topgrenene dunede coerulescens
4. Inderavnen med en stak på 10-18mm ..... gigantea
" " " " " 0-3mm 5.
5. Skedehinden 1½-3mm. Skeden uden øren ..... drymeia
" meget kort. Skeden med øren 6.
6. Nederste par topgrene med 1-3 og 4-6 småaks ..... pratensis
o " " " " 5-15 småaks 7.
7. Toppen bred med udstående grene ..... arundinacea
" smal med oprette grene fenas
8. Skedehinden 3-10mm ..... 9.
" højst 1½mm 10.
9. Lillagrønne småaks. Ingen udløbere Bellardiochloa violacea
Gulgrønne småaks. Med udløbere calabrica
10. Skedehinden tydeligt synlig, 0,5-1,5mm ..... 11.
" under 0,5mm 12.
11. Yderavnerne længere end det halve småaks ..... dimorpha
" kortere " " " " bosniaca
12. Visna bladskeder ikke optrævlede ..... 13.
" " til sidst optrævlede 16.
13. Stængelbladene flade og 2-3mm brede ..... heterophylla
" smalle 14.

14. Med udløbere. Stakken 1-2½mm ..... cyrnea
    Uden " . " længere 15.
15. Bladene 0,4-0,8mm tykke. Toppen 3-5½cm ..... robustifolia
    " 0,8-1,1mm " . " 5-11cm curvula
16. Stakken 0-1,3mm. Bleggrønne småaks ..... jeanpertii
    " længere 17.
17. Løst tæppedannende med udløbere ..... rubra
    Ingen udløbere (eller højst 2-5mm) 18.
18. Småaksene skinnende ..... macrathera
    " matte 19.
19. Bladene ru mod spidsen ..... nigrescens
    " jævne 20.
20. Nedre topgrene ofte med 4-8 småaks ..... circummediterranea
    " " mest udelte vizzavonae

Festuca paniculata (L.) Sch.& Th. Guldsvingel. 50-90cm. Bladene 2,2-4mm brede, blågrønne ovenpå. Toppen åben. Småaksene 9-11mm, gyldenbrune. 800-2300m. VI-VII. B C

F. caerulescens Desf. Knoldsvingel. 20-70cm. Bladene 1-2mm brede. Toppen smal. Småaksene 9-13mm. V-VI. A (Canosa)

F. gigantea (L.) Vill. Kæmpesvingel. VII-VIII. B C K

F. drymeia Mert.& Koch Bjærgsvingel. 70-120cm. Bladene 6-15mm brede, noget blågrønne. Toppen 10-30cm, åben og nikkende. Småaksene 7-8mm. 500-1600m. VI-VII. A B C K

F. pratensis Hudson Engsvingel. V-VIII. A B C K. 2 underarter:
ssp. pratensis: Mest 30-70cm. Bladene 3-5mm brede. Inderavnen but uden stak, ikke kløvet i spidsen.
ssp. apennina (De Not.) Hegi: Mest 70-90cm. Bladene 5-8mm brede. Inderavnen med tvetandet spids og stak på ca. ½ x avnen.

F. arundinacea Schreber Strandsvingel. V-VII. A B C K

F. fenas Lag. Smal strandsvingel. 30-80cm. Bladene 3-4mm brede, til sidst indrullede. Toppen stiv og mellembrudt. IV-VI. A B C K

F. calabrica Huter Langhindet svingel. 40-60cm. Med udløbere. Bladene 1-2mm brede, oftest indrullede. Øvre skedehinder 6-10mm. 300-1500m. V-VII. B (Chiaromonte, M.La Spina) C (Pollino, M. Montea) K (M.Lattari i Napol., Capri)

F. dimorpha Guss. Skælsvingel. 30-70cm. Stråene med en 2-4mm tyk skede forneden af ægformede skæl. Toppen 8-12cm. Småaksene gulligе, mest 3-blomstrede, uden stak. 1500-2500m. B (M. Sirino) V-VII

F. bosniaca Kummer & Sendtner 30-88cm. Bladene 0,3-1,2mm tykke, jævne, mest stikkende, de nedre 1/12-1/6 x de øvre. Småaksene lillabrogede, stakken 1,4-2,1mm. 2000-2348m. VI-VII (Pollino) B C

F. rubra L. Rød svingel. V-X. A B C K. 3 ssp. ? :
ssp. asperifolia (St-Yves) MD: Bladene meget ru. C (Sila)
ssp. rubra: Bladene jævne. Løsttuet med nogenlunde lige lange udløbere.
ssp. juncea (Hackel) Soó: Bladene jævne. Både med korte og lange udløbere og derfor med påfaldende klumpet vækst.

F. cyrnea (Litard.& St-Yves) MD. Tæppesvingel. 30-40cm. Danner tætte tæpper. Bladene m.m. glatte; skederne spredt hårede. Toppen 5-7cm. Stakken 1-2,5mm. 600-1800m. V-VI. B C K

F. nigrescens Lam. ssp. microphylla (St-Yves) MD Vejsvingel. 30-50cm. Golde skuds blade 0,4-0,5mm brede, blågrønne. Golde skud kommer uden for skederne, derfor ret løsttuet. VI-VIII. C

F. heterophylla Lam. Forskelligbladet svingel. 30-70cm. Golde skud kommer mest inden for skederne, derfor tættuet, deres blade 0,4-0,6mm brede. Stakken 2-3½(6)mm. V-VII. A B C K

Festuca macrathera (Hackel) MD. 15-30cm. Strået glat. Grundbladene 0,25-0,6mm brede, blågrønne, lidt stive, med noget femkantet tværsnit. Toppen 3-6cm. Stakken 2½-3mm. VI-VIII. B C K

F. robustifolia MD. 24-36cm. Golde skuds blade ret hårde, m.m. blåduggede. Toppen tæt og opret, bleg- til blågrøn og m.m. lillaanløben. 100-2400m. V-VII. B C K

F. curvula Gaudin Tykbladet fåresvingel. 25-40cm. Bladene jævne eller ru. Skederne 1/3 lukkede. Småaksene blåduggede. B C K

F. vizzavonae Ronn. 6-30cm. Bladene 0,3-0,63mm tykke, ret bløde. Toppen 2½-3cm, linjeformet. Stakken 3-5mm. V-VII. A B C K

F. circummediterranea Patzke 20-35cm. Bladene ofte krummede, næsten sivformede, 0,5-1,1mm tykke. Toppen 3-6½(10)cm, pyramideformet. Stakken indtil 3,7mm. V-VII. A B C K

F. jeanpertii (St-Yves) MD. ssp. campana (Terr.) MD. 30-60cm. Bladene 0,6-1mm tykke, jævne, blåduggede. Toppen 7-13cm, linjeformet, blådugget. V-VI. A (Gargano) K (Monti del Napol.)

Lolium. Rajgræs.

1. Inderavnen tyk, 3 x så lang som bred ..... temulentum
   " almindelig, 5 x så lang som bred 2.
2. Planten flerårig, med golde skud ..... 3.
   " enårig, uden " " 4.
3. Mest med stak. Strået næsten altid rut foroven multiflorum
   " uden " . " jævnt foroven perenne
4. Yderavnen tydeligt kortere end småakset ..... multiflorum
   " mindst lig småakset. Oftest uden stak 5.
5. Akset trindt med småaksene indsænkede ..... loliaceum
   " toradet-affladet med m.m. udstående småaks rigidum

Lolium temulentum L. Giftigt rajgræs. 20-70cm. Enårig, oftest kun 1 strå, der er jævnt foroven. Yderavnen ca. = småakset, dette 10-15mm. Oftest med en ru stak. IV-VI. A B C K

L. rigidum Gaudin Rut rajgræs. 18-45cm. Inderavnen med en but, hindekantet spids. Akset ved grunden omgivet af den lidt oppustede øverste bladskede. IV-VI. IV-VI. A B C K

L. loliaceum (Bory & Chaub.) Hand.-Mazz. 15-20cm. Som foregående. Stænglen fortykket og stiv. Ligner en Lepturus, Spidshale. Kystnære, saltholdige steder. V-VI. A K (Capri)

L. multiflorum Lam. Italiensk rajgræs. V-VII. A B C K. 2 ssp.:
ssp. multiflorum: Kraftig flerårig.
ssp. gaudinii (Parl.) Sch.& Th.: Spinkel enårig.

L. perenne L. Almindeligt rajgræs. III-X. A B C K

Vulpia. Væselhale.

1. Toppen med forlængede grene, m.m. pyramideformet.
   Stakken højst af inderavnens længde ..... 2.
   Toppen uden eller med korte grene, linjeformet.
   Stakken ofte længere end inderavnen 3.
2. Nedre yderavne reduceret til et ganske lille skæl ligustica
   " " 1/2 x den øvre geniculata
3. Inderavnen langt randhåret ..... 4.
   " glat 5.
4. Øvre yderavne mindst lig inderavnen ..... alopecuros
   " " kortere end " ciliata
5. Nedre yderavne 0-1/10 x den øvre ..... fasciculata
   " " 1/6-1/2 x den øvre 6.
6. Småaksene i et ensidigt aks (klase) ..... unilateralis
   " i en smal top 7.
7. Toppen 10-20cm, lidt bøjet, rører den øvre bladskede myuros
   " 2-8cm, rank, rører ikke den øverste " 8.

8. Småakset 8-10mm. Stakken ca. lig inderavnen ..... bromoides
" ca. 6mm. " 2-3 x inderavnen muralis

Vulpia geniculata (L.) Link Grenet væselhale. 30-60cm. Toppen 5-15cm med opret-udstående grene. Småaksstilkene 3½-6½mm. Yderavnerne 2½-5½ og 6-10½mm. IV-VI. A B C K

V. ligustica (All.) Link Udspærret væselhale. 20-40cm. Modne topgrene ofte nedadrettede. Yderavnerne 0,2-0,8mm og 8-12(18)mm. IV-VI. A B C K

V. ciliata (Danth.) Link Randhåret væselhale. 3-45cm. Ofte med blade lige til toppen; denne 4-10cm, ofte lilla. Nedre yderavne 0,3-0,9mm, øvre 1,5-3mm. Skedehinden 0,1-0,5mm. IV-VI. A B C K

V. alopecuros (Schousboe) Dumort Stiv væselhale. 10-70cm. Ofte stift opret. Yderavnerne ½-2mm og 8-14mm (med stak). Småakset 10-21mm (uden stakke). IV-VI. K (Napolit.). Sandstrand.

V. myuros (L.) Gmelin Stor væselhale. 8-65cm. Yderavnerne 0,4-2½ mm og 2½-6½mm (med stak). Stakken oftest 1-2 x inderavnen. ABCK

V. bromoides (L.) S.F.Gray Langstakket væselhale. 6-50cm. Yderavnerne 2½-5mm og 4½-9mm (med stak). IV-V. B C K

V. muralis (Kunth) Nees Murvæselhale. 10-60cm. Yderavnerne 1-3 mm og 4-8mm (med stak). IV-V. A B C K

V. fasciculata (Forsskål) Samp. Strandvæselhale. 8-50cm. Toppen kort, 4-10cm, og ensidig. Yderavnerne ½-2mm og 15-20mm. Inderavnen 8-18mm, stakken indtil 2 x så lang. Klitter. IV-VI. A B C K

V. unilateralis (L.) Stace (Nardurus maritimus) Enradet væselhale. 3-35cm. Klasen 1-9cm, ret stiv. Yderavnerne 1½-3½mm og 3-5mm. Inderavnen 3-5mm, stakken tit lige så lang. V-VI. K

Micropyrum tenellum (L.) Link (Nardurus halleri) Toradet svingel. Noget rajgræslignende enårig. Akset tydeligt toradet og stift, 1-20cm. Småaksene 5-9mm, m.m. tiltrykte, med 4-9 blomster, med eller uden stakke. V-VI. K

Catapodium. Stivgræs. (Desmazeria).

1. Småaksene 2-4½mm brede, med tætstillede, taglagte inderavner 2.
" 1-1½mm " , " noget adskilte inderavner 3.
2. Småaksene med 11-20 blomster. Topaksen ofte ret ..... siculum
" " 5-11 " . " bugtet marinum
3. Toppen tæt med korte grene med småaks omtrent fra grunden rigidum
Toppen åben. De nedre grene kun med småaks i øvre ½ hemipoa

Catapodium marinum (L.) Hubbard Liggende stivgræs. 5-15cm. Småaksene 2½-8mm, i et toradet aks, der ofte indtager over halvdelen af planten. Kystnær. III-V. A B C K

C. siculum (Jacq.) Link Skælgræs. 5-25cm. Småaksene ægformede. Avnerne stærkt kølede. Småaksene i et aks, de nedre dog kortstilkede. Kystnær. III-IV. C

C. rigidum (L.) Hubbard Bregnegræs. 5-30cm. Stråene opstigende. Skedehinden 2mm. Toppen sammentrængt, ofte noget ensidig, til sidst med udstående grene, stilkene mest 1-2mm. IV-VII. A B C K

C. hemipoa (Del.) Lainz Rustrået stivgræs. 20-35cm. Stråene mest oprette, ru foroven. Skedehinden indtil 5mm. Småaksstilkene mest ½-1mm. Kystnær. IV-VI. A B C K

Cutandia maritima (L.) Richter Strandstivgræs. 10-35cm. Svingelagtige småaks i en stivgrenet, oftest udspærret top. Skedehinden 3-4mm. Yderavnerne 5-6mm med 3-5 ribber. Sandstrand. IV-VI. ABCK

C. divaricata (Desf.) Bentham Udspærret stivgræs. 10-35cm. Som

foregående, men skedehinden 1-2mm. Yderavnerne 3-4mm med 1 ribbe. Mest på sandstrand. 0-500m. IV-V. K (Napol.)

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb. Kilefodsgræs. 5-25cm. Spinkel, opret, trådbladet enårig med ægformet, tyndgrenet top. Småaksstilkene fine, ofte parvise, jævnt fortykkede opad, ca. 2-4mm. Småaksene ca. 2mm. Kystnær. IV-V. A B C K

Poa. Rapgræs.

1. Nedre topgrene 1-2 sammen ..... 2.
   " " mest 5 (3-10) sammen 7.
2. Yderavnerne ulige lange. Strået mest liggende forneden ... 3.
   " næsten lige lange 5.
3. Støvknapperne 1½-2½mm. Flerårig og rodslående nederst supina
   " 0,2-0,8(1,0)mm. Enårig. Ikke rodslående 4.
4. Nedre topgrene skråt oprette efter blomstringen .... infirma
   " " udstående eller nedadrettede efter blomstringen annua
5. Strået med løgformet fortykket grund ..... bulbosa
   Strågrunden ikke løgformet 6.
6. Bladene 2-4½mm brede og flade ..... alpina
   " 1-2½mm brede, mest foldede molineri
7. Strået sammentrykt. Korte topgrene ..... compressa
   " trindt 8.
8. Øverste skedehinde 3-10mm, spids ..... 9.
   " " 0-3mm 11.
9. Grundbladene indrullet-børsteformede Bellardiochloa violacea
   " flade 10.
10. Tynde og trinde overjordiske udløbere ..... trivialis
    Kødede og knudrede overjordiske udløbere silvicola
11. Øverste blades skedehinder 2-3mm, spidse ..... palustris
    " " " 0-1mm, afskårne 12.
12. Med underjordiske udløbere ..... pratensis
    Ingen udløbere nemoralis

Poa annua L. Enårigt rapgræs. Støvknappen 0,5-0,8(1,0)mm. ABCK

P. infirma Kunth Spinkelt rapgræs. Ligner foregående meget, men støvknappen 0,2-0,3mm. Småaksene med 5-6 mere fjærntsiddende blomster, så de virker smallere. III-V. A B C K

P. supina Schrader Lavt rapgræs. 5-25cm. Skedehinden ½mm. Mest kun 1 nedre topgren. Småaksene ofte med brunlillat skær. B

P. compressa L. Fladstrået rapgræs. VI-VIII. A B C K

P. trivialis L. Almindeligt rapgræs. V-IX. A B C K

P. silvicola Guss. Knuderapgræs. 30-60cm. Som foregående, men med 2-3mm tykke, perlesnorsformede udløbere. Nedre topgrene 3-4 sammen (4-8 hos trivialis). V-VI. A B C K

P. pratensis L. Engrapgræs. V-IX. A B C K

P. bulbosa L. Løgrodet rapgræs. IV-VII. A B C K

P. alpina L. Fjældrapgræs. 5-30cm. Stængelgrunden fortykket af bladskeder, men ikke løgformet. Øvre skedehinder 3-5mm, nedre 1-2mm. V-VIII. B C K

P. molineri Balbis Furet rapgræs. 10-20cm. Nedre skedehinder ½-2 mm, ofte lasede, øvre 1-3½mm, spidse. Småaksene ofte med lillat skær. Bladene med smal, lys bruskrand. VI-VII. B C K

P. nemoralis L. Lundrapgræs. V-X. A B C K

P. palustris L. Stortoppet rapgræs. V-VII. K (Napoletano)

Bellardiochloa violacea (Bell.) Chiov. Violet rapgræs. 20-50cm. Svingelagtigt udseende. Bladene blågrønne, børsteformede, indtil 0,8mm tykke. Toppen sammentrængt, grøn/lilla. VII-VIII. B C

Puccinellia convoluta (Hornem.) Hayek 30-60cm. Bladene sammenfoldede, under 1mm brede. Toppen smal, de nedre grene ofte tiltrykte. Småakset med 7-11 blomster, 10-12mm. Strandenge. VI-VIII. A C

Sclerochloa dura (L.) Beauv. Stivaks. 2-15cm. Fladbladet enårig. Øvre blade med noget oppustet skede og noget omsluttende den tætte, noget ensidige dusk. Planten grågrøn. Yderavnerne stærkt kølede, inderavnerne bredt hindekantede. IV-VI. A B C K

Dactylis glomerata L. Almindeligt hundegræs. V-VII. A B C K

D. hispanica Roth Sydligt hundegræs. 20-40cm. Toppen lige bred foroven og forneden, så den bliver duskformet. Skedehinden 4-8mm (2-5mm hos glomerata). III-V. A B C K

Beckmannia eruciformis (L.) Host Radegræs. 30-150cm. Opret flerårig. Bladene 4-10mm brede, flade og ru. Skedehinden 5-8mm. Akstanden 18-25cm med 1-3cm lange, siddende aks. Småaksene 2½-3mm, bugede. Inderavnen ofte med en lille krog. V-VI. A B C K

Cynosurus cristatus L. Almindeligt kamgræs. Flerårig. Dusken smal, 3-5mm bred hele vejen. IV-VI. A B C K

C. echinatus L. Pindsvinekamgræs. 20-60cm. Enårig. Bladene 3-9mm brede. Dusken ægformet, tæt og kortgrenet. Frugtbare blomsters stakke 1-2 x inderavnen. V-VI. A B C K

C. elegans Desf. Grenet kamgræs. 10-60cm. Enårig. Bladene 1-3mm brede. Dusken ægformet, mere langgrenet og åben. Frugtbare blomsters stakke 4-5 x inderavnen. IV-VI. A B C K

Lamarckia aurea (L.) Moench Guldgræs. 7-15(20)cm. Enårig. En løs, oftest ensidig, først bleggrøn, siden gylden top med m.m. hængende grene. Frugtbare småaks med stak, de golde med 6-9 fjærntsiddende, små, butte inderavner. II-V. A B C K

Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Tæppegræs. V-VII. A B C K

Apera spica-venti (L.) Beauv. Vindaks. V-VI. B C

A. interrupta (L.) Beauv. Børstevindaks. 20-50cm. Toppen mest under 10cm, smal, med oprette grene, uregelmæssigt mellembrudt forneden. Stakkene 4-10mm. Småaksene 2-2½mm. V-VI. B C K

Psilurus incurvus (Gouan) Sch.& Th. Slangehalegræs. 10-30cm. Stængler, blade og aks trådformede. Akset meget skørt og til sidst m.m. indrullet. Yderavnen reduceret til et skæl på højst 1mm. 1 blomst med stak af inderavnens længde. IV-V. A B C K

Mibora minima (L.) Desv. DVærggræs. 2-15cm. Tueformet med trådfine strå. Enårig. Bladene indtil 2cm, 0,5-0,7mm tykke. Akset ½-2cm med toradet stillede småaks på 1,7-3mm på aksets ene side. Yderavnerne længere end inderavnerne. III-V. A

Briza maxima L. Stort hjærtegræs. 20-50cm. Enårig. Toppen med 1-12 meget store, sølvhvide/rødbrune småaks på 14-25mm med 5-20 blomster. IV-VI. A B C K

B. media L. Alm. hjærtegræs. Flerårig. Skedehinden ½-1½mm. ABCK

B. minor L. Lidet hjærtegræs. 15-30cm. Enårig. Toppen mangeblomstret og ret tæt. Småaksene 3-4mm, med 5-7 blomster. Skedehinden 3-6mm. IV-V. A B C K

Sesleria tenuifolia Schrader Smalbladet hovedgræs. 20-40cm. Nedre bladskeder nettrævlede. Bladene ca. 0,6mm brede og foldede. Dusken 10-35x5-10mm. Yderavnens stak 1½-2mm. III-VII. B C K

S. nitida Ten. Skinnende hovedgræs. 40-70cm. Skederne ikke trævlede. Dusken 20-30x9-14mm. Inderavnen 5-6mm. VI-VII. B C K

S. autumnalis (Scop.) F.W.Schultz Sildigt hovedgræs. -40cm. Skederne ikke trævlede. Dusken 45-100x5-7mm. Inderavnen 3-4½mm.

0-1500m. IX-X. B C K

Echinaria capitata (L.) Desf. Pindsvinegræs. 5-15cm. Enårig. Akset kuglerundt, ca. 1cm. Yderavnerne med 1 og 2 staklignende tænder; inderavnerne med 5(7) staklignende tænder. IV-V. A B C K

Melica. Flitteraks.

1. Inderavnen langhåret. Toppen eller dusken hvidlådden ..... 2.
   " og toppen glat 6.
2. Inderavnen elliptisk, but, glat i ydre 1/3 ..... bauhinii
   " lancetformet, spids, håret til spidsen 3.
3. Inderavnen håret på hele ryggen ..... cupanii
   " med et glat bånd på ryggen 4.
4. Nedre skeder langhårede. Planten grøn ..... transsilvanica
   " " glatte. Planten grågrøn 5.
5. Strået med 2-4 knæ under dusken ..... ciliata
   " " 1 " " " magnolii
6. Yderavnerne ret ens, den nedre hindeagtig i ydre 1/4 uniflora
   " uens, den nedre hindeagtig i ydre 1/2 arrecta

Melica cupanii Guss. Låddent flitteraks. 15-50cm. Bladene 1½-3mm brede. Toppen noget åben, under 8cm. Yderavnerne uens. Alle inderavnens ribber langhårede. 1500-1900m. V-VII. K (Maddaloni)

M. ciliata L. Skægflitteraks. 20-60cm. Bladene ofte sammenrullede og stive. Dusken smal, ofte ensidig, med korte, oprette grene. Småaksene blege. Nedre yderavne 3/4-1 x øvre. V-VI. A B C K

M. transsilvanica Schur Duskflitteraks. 30-120cm. Dusken tæt, ikke ensidig, med ofte brunligt anløbne småaks. Nedre yderavne 1/3-2/3 x den øvre. VI-VII. A K

M. magnolii G.& G. 50-100cm. Nær ciliata, men oftest kraftigere og med flade blade. Dusken mellembrudt forneden, 12-25cm. A B C K

M. bauhinii All. Stift flitteraks. 20-50cm. Bladene ru, til sidst indrullede. Toppen løs, ensidig, kun lidt uldhåret, m.m. lilla. 2 frugtbare blomster i småakset. V-VI. K (Napol.)

M. uniflora Retz. Enblomstret flitteraks. V-VI. A B C K

M. arrecta O.Kuntze Pyramideflitteraks. 50-80cm. Toppen åben, 15-30cm, dens nederste led mest 6-12cm. Nedre yderavne 3½-5½mm, den øvre kortere end blomsterne. IV-V. A K

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Højt sødgræs. VII-VIII. K

G. fluitans (L.) R.Br. Mannasødgræs. V-VII. A B K

G. plicata Fr. Butblomstret sødgræs. V-VIII. A B C K

Bromus. Hejre.

1. Flerårig ..... 2.
   Enårig 7.
2. Topgrenene udstående eller hængende ..... 3.
   " m.m. oprette 4.
3. Alle bladskeder stift langhårede ..... ramosus
   Øvre " tæt korthårede benekenii
4. Med udløbere. Bladskederne mest tæt hårede ..... pannonicus
   Tueformet uden udløbere 5.
5. Bladene tæt korthårede, men ikke langt randhårede caprinus
   " langt randhårede, i hvert fald nær grunden 6.
6. Yderavnerne tydeligt uens. Toppen noget åben .. stenophyllus
   " ret ens. Toppen smal og tæt erectus
7. Nedre yderavne med 1 ribbe, den øvre med 3 ..... 8.
   " " " 3-7 ribber, den øvre med 5-9 14.
8. Topgrenene m.m. hængende ..... 9.
   " m.m. oprette 10.
9. Topgrenene dunede. Stænglen dunet foroven ..... tectorum
   " ru. Stænglen glat foroven sterilis

10. Småaksene med stak 2-5cm, næsten siddende i en tæt dusk 11.
" " " 3-9cm, i grenet top 12.
11. Topgrenene med 1-2 småaks. Modne stak tit krum fasciculatus
" " 4-5 " . " " ret rubens
12. Inderavnen 15-17mm med en stak på 20-25mm ..... madritensis
" 20-30mm " " " " 25-75mm 13.
13. Nedre topgrene 1-3 sammen, 1-3cm lange ..... rigidus
" " 3-6 " , indtil 8cm lange diandrus
14. Inderavnens rand til sidst indrullet og overlapper derfor ikke inderavnen ovenover ..... 15.
Inderavnens rand ikke indrullet og derfor overlappende 16.
15. Nedre bladskeder blødhårede. Støvknappen 3-5mm ... arvensis
" " m.m. glatte. " 1-2mm secalinus
16. Nedre bladskeder med stive hår på mindst 1mm ..... 17.
" " blødhårede 19.
17. Inderavnen 6½-8mm, med buekrummet forhjørne ..... racemosus
" 8-11½mm, med stumpkantet forhjørne 18.
18. Småaksene glatte til fåhårede ..... commutatus
" blødhårede neglectus
19. Toppen duskformet, med grene på højst 5-8mm ..... 20.
" bredere, de nedre grene 1-flere cm 21.
20. Stakken højst af inderavnens længde ..... scoparius
" længere end inderavnen alopecuros
21. Bladskederne med 0,4-0,7mm lange, ofte tiltrykte hår intermedius
Bladskederne med 1-1½mm lange hår 22.
22. Inderavnen brsukagtig med næppe synlige ribber ..... 23.
" urteagtig med fremtrædende ribber 24.
23. Toppen mest ensidig, med få, lidt sammentrykte småaks squarrosus
Toppen alsidig, med mange, trinde småaks japonicus
24. Inderavnen 12-20mm. Småaksene 20-50x6-10mm .... lanceolatus
" 8-11mm. " 12-25x4-6mm 25.
25. Stakken affladet forneden, m.m. bøjet i frugt molliformis
" trind forneden, m.m. ret i frugt hordeaceus

Bromus erectus Hudson Opret hejre. V-VII. A B C K

B. pannonicus Kummer & Sendtner Ungarsk hejre. 30-50cm. Blade og skeder langt gråhårede. Småaksene 14-17(25)mm. Inderavnen ca. 9mm, stakken 7-8mm. V-VII. K

B. caprinus Kerner 40-70cm. Strået dunet. Bladhårene 0,1-0,2mm. Toppen ret bred, grenene mest med 1 småaks på 30mm. Inderavnen 9-12mm. 200-1500m. B C (Pollino) K (Capri m.m.)

B. stenophyllus Link 50-120cm. Toppen 15-25cm, aksstilkene ofte meget længere end småaksene, disse 35-40mm. Inderavnen 13-18mm. V-VII. B (Volturino, Muro)

B. ramosus Hudson Sildig skovhejre. V-VII. A B C K

B. benekenii (Lange) Trimen Tidlig skovhejre. V-VII. C

B. rubens L. Rød hejre. 10-30cm. Bladene blødhårede. Toppen rødlig, ofte meget tæt. Småaksene ca. 20mm. Inderavnen 11-16mm. Stakken 8-12mm, rødlig. IV-V. A B C K

B. fasciculatus C.Presl Duskhejre. 4-25cm. Toppen fåakset. Nedre topgrene 1-2 sammen, 1-aksede. Småaksene 20-25mm. Inderavnen 12-14 x 1,4-1,8mm. Stakken 11-14mm. III-V. A B C

B. tectorum L. Taghejre. IV-VI. A B C K

B. sterilis L. Gold hejre. IV-VI. A B C K

B. madritensis L. Spansk hejre. 10-50cm. Stråene oftest glatte. Bladene blødhårede. Toppen åben eller tæt. Småaksene 25-35mm. Inderavnen 15-19mm. Stakken 18-25mm. III-IV. A B C K

Bromus rigidus Roth Stivtoppet hejre. 20-40cm. Toppen 15-20cm, tæt og opret. Småaksene 25-50mm. Inderavnen 24-37mm. Stakken 3-8cm. IV-VI. A B C K. 2 underarter:
ssp. rigidus: Topgrenene ru, de nedre enlige. Bladene slappe.
ssp. ambigens (Jordan) Pign.: Topgrenene dunede, de nedre 2-3 sammen. Bladene lidt stive i det.

B. diandrus Roth Storakset hejre. 35-90cm. Toppen op til 30cm, meget åben (eller tæt), nikkende. Småaksene 4-5cm. Inderavnen 25-30mm. Stakkene 35-60mm. IV-V. A B C K

B. scoparius L. Kosthejre. 6-20cm. Knæene ofte mørke. Toppen æg- og duskformet, 3-5cm. Småaksene 7-18mm, stilkene mest under 2½mm. Stakken 8-10mm, udstående. IV-VI. B C

B. alopecuros Poiret (B. alopecuroides) Rævehalehejre. 20-40cm. Som scoparius, men større. Småaksene 20-25mm. Stakken 15-18mm. Toppen 6-10cm, lancetformet. IV-VI. A B C K (Capri)

B. lanceolatus Roth Stakhejre. 30-70cm. De nedre topgrene forlængede, 2-4cm, men stive og oprette. Småaksene 12-35mm. Inderavnen 10-16mm. Stakken 10-17mm, siden udspærret. IV-VI. A B C K

B. intermedius Guss. Smalbladet hejre. 20-50cm. Toppen åben, de nedre grene bugtede, ofte længere end småaksene; disse 10-15 mm. Stakken 7-7½mm, sidder 1,5-2,2mm fra spidsen. V-VI. A B C K

B. arvensis L. Agerhejre. 80-110cm. Toppen meget åben. Småaksene til sidst udstående eller hængende, 10-25mm, ofte rødlilla. Stakken ret. V-VII. A B C K

B. squarrosus L. Udspærret hejre. 20-60cm. Inderavnen 8-11x6-8 mm, med stumpvinklet rand. Stakken ca. 10mm, stærkt udstående. Toppen meget åben. IV-VI. A B C K

B. japonicus Thunb. Stortoppet hejre. 20-80cm. Toppen åben, ofte ret bred; nedre grene 8-15cm og m.m. udstående. Inderavnen 8-9mm. Stakken 6-10mm. V-VI. B K

B. hordeaceus L. Blød hejre. V-VII. A B C K

B. molliformis Lloyd 10-30cm. Øvre skede ofte lidt opblæst. Toppen indtil 10cm, meget tæt, ofte rødlig; grenene meget korte og stive. Inderavnen afrundet langs kanterne. IV-VI. A B C K

B. racemosus L. Enghejre. 30-70cm. Toppen 6-10cm, smal, til sidst sammentrængt og noget ensidig. Nogle topgrene længere end småaksene. V-VII. A B C K

B. commutatus Schrader Mangeblomstret hejre. 30-70cm. Toppen 5-25cm, løs. Grenene indtil 6cm. Toppen snart nikkende. Stakken ret. V-VI. B C K

B. neglectus (Parl.) Nyman Hvidhåret hejre. 50-80cm. Skederne stribede og hvidfiltede. Topgrenene tætdunede, til sidst hængende. Stakken lidt udspærret. V-VII. B C K (Alburno)

B. secalinus L. Rughejre. 30-90cm. Toppen 14-18cm, åben, ofte ensidig og nikkende i frugt. Småaksene 12-20mm. V-VI. A B K

Brachypodium. Stilkaks.

1. Enårig. Med 2(1-5) sammentrykte småaks ..... distachyon
   Flerårig. Småaksene trinde til halvtrinde 2.
2. Tueformet. Stakken mindst lig inderavnen ..... silvaticum
   Med udløbere. Stakken højst ½ x inderavnen 3.
3. Bladene indrullede, med fremtrædende ribber ovenpå ..... 4.
   " med flad grund, uden fremtrædende ribber ovenpå 5.
4. Småaksene 3-6(8)cm. Akset 15-20(30)cm ..... phoenicoides
   " 2-3cm. Akset 4-9cm retusum

5. Bladene indrullede mod spidsen, noget blågrønne ... rupestre
" helt flade, grønne pinnatum

Brachypodium silvaticum (Hudson) Beauv. Skovstilkaks. A B C K

B. pinnatum (L.) Beauv. Bakkestilkaks. 40-70cm. Småaksene 18-40 mm, oftest rette. Inderavnen ofte noget korthåret. V-VII. A B C K

B. rupestre (Host) R.& Sch. Seglstilkaks. 40-70cm. Småaksene 30-50mm, ofte noget seglkrummede. Stakken højst 3mm. V-VII. B C K

B. phoenicoides (L.) R.& S. Langbladet stilkaks. 50-80cm. Bladene 10-40cm. Akset med 6-9 noget fjærne, ofte seglkrummede småaks. Stakken 0-2½mm. IV-VI. A B C K

B. retusum (Pers.) Beauv. (B. ramosum) Toradet stilkaks. 20-40 cm. Bladene tydeligt toradede, især på de golde skud. Akset tæt og stift opret med 1-5(7) småaks. IV-VI. A B C K

B. distachyon (L.) Beauv. Enårigt stilkaks. 2-15(30)cm. Bladene glatte til svagt hårede, flade. Småaksene 2-3cm, lancetformede. Stakken 7-15mm. IV-VI. A B C K

Elymus. Kvik.

1. Tueformet ..... 2.
Med udløbere 4.
2. Uden stak ..... elongatus
Med " 3.
3. Yderavnen med 7-9 ribber, 15-20mm ..... panormitanus
" " 3 " , 6-10mm caninus
4. Småaksene på samme side ikke overlappende ..... farctus
" " " " overlappende 5.
5. Bladene stikkende ..... pycnanthus
" ikke stikkende repens

Elymus caninus (L.) L. Hundekvik. V-VII. A B K

E. panormitanus Parl. Storakset kvik. 40-90cm. Akset 10-20cm, kraftigt og stift. Småaksene 15-20mm. Yderavnerne længere end den nedre blomst. Stakkene 20-30mm. V-VI. C (Aspromonte). 700-1200m.

E. elongatus (Host) Runemark Langakset kvik. 60-90cm. Tættuet og blågrøn. Aksets akse næsten flad ud for småaksene. Akset 10-25cm. Yderavnerne 7-10mm, mest 7-årede. VI-VIII. A B K

E. farctus (Viv.) Runemark Strandkvik. Klitter. IV-VI. A B C K

E. pycnanthus (Godron) Melderis Stiv kvik. 70-110cm. Akset 6-12 cm, bredt og tæt og m.m. firkantet. Mest kystnær. V-VI. A B C K

E. repens (L.) Gould Alm. kvik. V-VII. A B C K

Aegilops. Bukkekorn.

1. Akset m.m. æg- eller lancetformet, 1-3cm (uden stakke) ... 2.
" valse- og linjeformet, indtil 10cm 5.
2. Yderavnen med 4-5 stakke ..... geniculata
" " 1-3 " 3.
3. Yderavnen med 1 stak ..... uniaristata
" " 2-3 stakke 4.
4. Øvre 1-2 småaks golde ..... neglecta
Alle småaks frugtbare lorentii
5. Yderavnen med 2 tænder eller brodde ..... cylindrica
" " stakke på 1-flere cm 6.
6. Yderavnen med 2-3 stakke ..... triuncialis
" " 1 stak fragilis

Aegilops geniculata Roth Alm. bukkekorn. 10-30cm. Akset 1-2cm med 1 goldt småaks forneden og 2-5 frugtbare med 3-6 blomster. Stakkene ru forneden. V-VI. A B C K

Aegilops lorentii Hochst. (A. biuncialis) Langstakket bukkekorn. 5-10cm. Akset 2-3cm, ca. 5 x så langt som bredt. 2-3(4) frugtbare småaks. Øvre inderavne med (2)3 stakke. V-VI. A

A. neglecta Req. Goldt bukkekorn. 10-30cm. Akset 3cm, brat indsnøret foroven, idet de 2 øverste småaks er golde. 2 frugtbare småaks. Stakkene jævne. V-VII. A B C K

A. uniaristata Kort bukkekorn. 10-30cm. Akset 1½-3½cm, ofte med 3 reducerede småaks nederst. 2-7 frugtbare småaks. Nedre yderavne med alle ribber smalle og m.m. lige brede. V-VI. A

A. fragilis Parl. (A. ventricosa p.p.) 20-50cm. Akset med 3-4 småaks. Nederste småakses yderavnes stak få mm, endesmåaksets yderavnestak mindst 2cm. V-VI. A (Altamura, Gravina)

A. triuncialis L. Trestakket bukkekorn. 20-45cm. Akset 3-6cm uden stakkene, med 1-2 golde småaks forneden og 3-6 frugtbare. Endesmåaksets stakke 3-6cm. V-VI. A B C K

A. cylindrica Host Smalakset bukkekorn. 30-40cm. Akset 6-11cm uden stakke, over 10 x så langt som bredt. 1-2 grundstillede golde småaks. Endesmåaksets stakke 4-6cm. V-VI. A (Gravina)

Dasypyrum villosum (L.) Cand. Børsterug. 20-60cm. Akset 6-10cm. Yderavnen med en stak på 25-32mm og to fremtrædende køle med bundter af korte børster. Inderavnens stak 35-41mm. IV-VI. ABCK

Secale montanum Guss. (S. strictum) Bjærgrug. 30-80cm. Grågrøn, tueformet flerårig. Akset 4-8(11)cm medskør akse med randhårede kanter. Yderavnerne 8-10mm, rukølede. Inderavnen 8-13mm med en stak på indtil 2½cm. VI-VII. B (Vulture) C(Sila, Aspromonte)

Hordeum. Byg.

1. Flerårig ..... 2.
   Enårig 3.
2. Stængelgrunden løgformet. Sidestillede småakses yderavner uden stak ..... bulbosum
   Stængelgrunden ej løgformet. Alle yderavner med stak secalinum
3. Småaks + stak 2cm. Yderavnen uden randhår ..... 4.
   " " " 3-4cm. Midtersmåaksets yderavne randhåret 5.
4. Sidesmåaksenes yderavner uens: 1 bred + 1 smal ..... marinum
   " " ens: begge smalle hystrix
5. Sidesmåaksene ikke længere end midtersmåakset ..... murinum
   " længere end midtersmåakset leporinum

Hordeum secalinum Schreber Engbyg. 15-70cm. Akset 2-5cm. Midtersmåakset siddende, sidesmåaksene med en stilk op til 1½mm. ABCK

H. bulbosum L. Løgrodet byg. 60-150cm. Grøn og tættuet. Nedre blade lådne. Akset 5-10x1cm, tæt og sammentrykt. V-VI. A B C K

H. marinum Hudson (H. maritimum) Strandbyg. 5-30cm. Akset aflangt og opad tilsmalnet. Mest kystnær. IV-V. A B C K

H. hystrix Roth Vejbyg. Nedre bladskeder ofte lådne. Akset ikke udvidet som modent. IV-V. B (Metaponto, Gallipoli-Cognato)

H. murinum L. Gold byg. IV-X. A B C K. 2 underarter:
ssp. murinum: Støvknapperne 0,7-1mm. Planten ikke blågrøn.
ssp. glaucum (Steudel) Tzvelev: Støvknapperne 0,2-0,5mm. Planten blågrøn.

H. leporinum Link 30-60cm. Ligner foregående meget, men sidesmåaksenes nedre yderavne randhåret på begge sider (hos murinum kun på den ene side). IV-X. A B C K

Hordelymus europaeus (L.) C.O.Harz Skovbyg. V-VI. A B C K

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski Tveblomstret byg. 10-40

cm. Enårig. Bladene trådformede, 1-2½mm brede. Akset ca. 4cm med stakke på 5-12cm. Yderavnerne sylformede, sammenvoksede ved grunden. IV-VI. 2 underarter:
ssp. crinitum (Schreber): Inderavnen 8-12mm, dens stak 7-12cm, 0,6-1,1mm bred ved grunden. Bladskederne mest glatte. A B C
ssp. asperum (Sim.): Inderavnen 7-8mm, stakken 6-9cm, 0,4-0,5mm bred ved grunden. Bladskederne lådne. A B

Avena. Havre.

1. Inderavnen ender i 2 4-6mm lange spidser ..... barbata
" " i 2 tænder 2.
2. Toppen alsidig. Småakset 18-25mm ..... fatua
" ensidig. " 25-45mm sterilis

Avena barbata Pott Skæghavre. 30-100cm. Inderavnen oftest hvidgult lådden. Småakset 18-30mm. Stakkene 3-6cm. IV-VI. A B C K

A. fatua L. Flyvehavre. 20-100cm. Inderavnen glat eller håret forneden med rustbrune eller lyse hår. Stakken 2½-4cm. A B C K

A. sterilis L. Gold havre. 50-120cm. Inderavnen rusthåret i nederste halvdel. Stakken 3-9cm. IV-VI. A B C K

Helictotrichon convolutum (Presl) Henrard Trindbladet havre. 50-70cm. Tættuet med trævlet grund. Bladene smalt sammenrullede, 1-1,2mm brede. Toppen med 15-50 ofte lillabrogede småaks på 10-14 mm med 2-3 blomster. Stakken 10-15mm. V-VI. B C (Pollino)

Avenula. Havre.

1. Stakken trind forneden, ensartet tyk set fra siden pubescens
" flad " , skiftevis tyk og tynd set fra siden 2.
2. Småaksene 18-24mm, skinnende stråfarvede ..... cincinnata
" 10-15mm, rustbrune praetutiana

Avenula pubescens (Hudson) Dumort Dunet havre. VI-VIII. B K

A. cincinnata (Ten.) Holub Hejreagtig havre. 30-60cm. Strået med trævlet og lidt løgagtig grund. Bladene blågrønne, skruesnoede som visne, flade eller foldede. V-VI. C (Pollino) K

A. praetutiana (Parl.) Pign. 30-60cm. Løsttuet. Strået med knæbøjet grund. Bladene mest foldede, ret stive, med fintbørstet rand. Nedre topgrene parvise. VI-VII. 1000-2000m. B C K

Arrhenatherum elatius (L.) Presl. Draphavre. V-VII. A B C K

Gaudinia fragilis (L.) Beauv. Akshavre. 30-60cm. Enårig med m.m. lådne blade. Akset ganske langt, op til 35cm. Småaksene 10-12mm med 3-4 blomster og stakke på 5-8mm. IV-VI. A B C K

Ventenata dubia (Leers) Cosson Bunkehavre. 30-60cm. Småaksene 10-15mm, med 2-3 blomster, den nedre med en op til 4mm lang, lige stak, de andre med en 10-15mm lang, knæbøjet stak. V-VI. B C

Koeleria splendens Presl Skinnende kambunke. 20-45cm. Småaksene 6-8mm. Grundbladene 3-5(12)cm x ca. 1mm, hvidrandede. Dusken 3-8 cm, tæt, undertiden lappet forneden. V-VII. A B C K

K. macrantha (Ledeb.) Schultes Spnikel kambunke. 20-50cm. Småaksene 3½-5mm. Grundbladene indtil 15cm x 1-2mm. Dusken 2-8x1cm, m.m. lappet, især forneden. VI-VII. A B C K

Lophochloa. Kambunke.

1. Yderavnerne lige store, af småaksets længde ..... pubescens
" uens, kortere end småakset 2.
2. Dusken ægformet. Nedre stakke 3-5mm ..... hispida
" aflang. Nedre stakke 1-3mm cristata

Lophochloa pubescens (Lam.) Scholz Dunet kambunke. 10-40cm. Dusken aflang, 5-12x½cm. Yderavnerne med randhåret køl. IV-V.ABCK

Lophochloa cristata (L.) Hyl. Enårig kambunke. 5-20cm. Dusken 1-12x½-1cm. Yderavnerne glatte eller dunede. IV-VII. A B C K

L. hispida (Savi) Pign. Stivhåret kambunke. 5-30cm. Dusken 3-5 cm. Yderavnerne glatte med ru køl. IV-VI. A B C K

Trisetum. Guldhavre.

1. Flerårig ..... flavescens
   Enårig 2.
2. Toppen åben og pyramideformet ..... parviflorum
   " duskformet 3.
3. Bladskederne mest glatte. Bladet 1mm bredt ..... aureum
   " lådne. Bladet 3-5mm bredt paniceum

Trisetum flavescens (L.) Beauv. Alm. guldhavre. V-VIII. A B C K

T. parviflorum (Desf.) Pers. Småblomstret guldhavre. 20-50cm. Bladene m.m. lådne. Toppen 4-15cm. Småaksene toblomstrede, 2-2½ mm med en stak på 3-4mm. V-VI. A B C K

T. paniceum (Lam.) Pers. Hvidlig guldhavre. 20-45cm. Bladene lådne. Dusken 4-10cm, ofte lappet, m.m. gullig. Småaksene med 4-6 blomster, 3-5½mm. Stakken udgår højst 1/4 under inderavnens spids, m.m. ret, grålig. V-VI. V-VI. A B C K

T. aureum Ten. Sandguldhavre. 5-25cm. Dusken 1-5x½-3cm, gulligt til brunligt skinnende. Småaksene 2½-3mm. Stakken udgår ca. 1/3 under inderavnens spids, vreden og brunlig. V-VI. A B C K

Lagurus ovatus L. Harehale. 8-50cm. Enårig. Bladene blødhårede. Dusken ægformet med 1-blomstrede småaks med lådne yderavner, der får dusken til at virke meget blødhåret. Inderavnen med 2 endestillede børster på 2-6mm og en stak på 8-20mm. III-V. A B C K

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. Mosebunke. VI-VIII. B C

D. flexuosa (L.) Trin. Bølget bunke. VI-VIII. B C K

Aira. Dværgbunke.

1. Stilkene 1-2 x småaksene ..... 2.
   " 2-8 x " 3.
2. Yderavnerne spidse ..... caryophyllea
   " m.m. butte cupaniana
3. Ingen stak. Stilkene 5-8 x småakset ..... tenorei
   Med stak 4.
4. Stilkene 4-8 x den butte yderavne ..... intermedia
   " 2-5 x " spidse " 5.
5. Yderavnen 1½-2mm. Stilken 4-5 x så lang ..... elegantissima
   " 2-2½mm. " 2-3 x " " cupaniana

Aira caryophyllea L. Udspærret dværgbunke. IV-V. A B C K

A. cupaniana Guss. Tykstilket dværgbunke. 5-30cm. Som foregående, men stilkene brat fortykkede under småakset. Inderavnen 1/2-2/3 x yderavnen (3/4 hos car.) IV-V. A B C K

A. tenorei Guss. Langstilket dværgbunke. 10-40cm. Bladene meget ru. Topgrenene udvidede under småaksene. IV-V. K (Capri m.m.)

A. intermedia Guss. 10-40cm. Den ene blomst kortstakket, den anden uden stak. IV-V. K (Salernit.)

A. elegantissima Schur (A. elegans) Hårdværgbunke. 10-30cm. Stilkene brat udvidede under småaksene. Stakken 2 x småakset. A B C K

Molinierella minuta (L.) Rouy Violet dværgbunke. 5-20cm. Som Aira, men yderavnerne kortere end småakset. Toppen ofte lillaanløben. Småaksene 1-1½mm. Inderavnen uden stak. III-IV. B K

Anthoxanthum odoratum L. Vellugtende gulaks. Flerårig. A B C K

A. ovatum Lag. Æggegulaks. 10-40cm. Dusken ægformet med afskåren

grund, 1½-2 x så lang som bred. De 2 golde inderavner kun lidt længere end den frugtbare. Den ene stak lidt udragende. V-VI. C

Anthoxanthum aristatum Boiss. Enårigt gulaks. 5-40cm. Dusken ofte over 2 x så lang som bred, med m.m. kileformet grund. De 2 golde inderavner ca. 2 x den frugtbare. Den ene stak langt udragende. V-VI. K (nær Napoli)

Holcus lanatus L. Fløjlsgræs. V-VII. A B C K

H. mollis L. Krybende hestegræs. V-VII. B K

Corynephorus divaricatus (Pourret) Breistr. Enårigt sandskæg. 5-50cm. Glat enårig. Bladene ru og indrullede. Skederne ofte lilla. Knæene sorte. Skedehinden indtil 8mm. Småaksene 3½-4mm. Stakken af yderavnens længde, svagt fortykket. IV-VI. A B C K

Avellinia michelii (Savi) Parl. Svingelbunke. 10-25cm. Enårig. Toppen 2-7cm, tæt og hvidliggrøn. Småaksene 3-5mm. Nedre yderavne 1/4 x den øvre og sylformet. Inderavnerne med en kort stak fra spidsen. Sandede steder især nær kysten. IV-VI. A B C K

Agrostis m.m. Hvene.

1. Enårig. Toppen bleggrøn. Stakken 3-4mm ..... pourretii
   Flerårig 2.
2. Inderavnen med stak ..... 3.
   " uden " 4.
3. Småaksene 1,6-2,5mm. Toppen sammenkneben i frugt .... canina
   " 2,5-4mm. " mest åben i frugt castellana
4. Toppen åben hele tiden. Skedehinden ½-1(2)mm .... capillaris
   " sammenkneben hele tiden eller efter blomstringen 5.
5. Toppen meget tæt, ligner en lappet dusk .. Polypogon viridis
   " sammenkneben i frugt, ellers åben stolonifera

Agrostis pourretii Willd. (A. pallida, A. salmantica) Bleg hvene. 10-40cm. Toppen oftest sammenkneben efter blomstringen. Bladene flade og ru, 1-1½mm brede. IV-VI. A C K

A. canina L. Hundehvene. VI-VII. B C

A. stolonifera L. Krybhvene. V-VIII. A B C K

A. castellana Boiss.& Reuter Hornhvene. 20-80cm. De fleste topgrene 2-3 x delte og uden småaks i deres nedre 1/2. Med korte underjordiske udløbere. Skedehinden 1-3mm. V-VI. B C

A. capillaris L. (A. tenuis) Alm. hvene. VI-VIII. B K

Gastridium ventricosum (Gouan) Sch.& Th. Gniddergræs. 10-40cm. Enårig med tæt og lappet dusk, let kendelig ved yderavnernes hvidlige knude forneden. Småaksene enblomstrede, 3-4mm. Yderavnerne glatte med ru køl, brodspidsede, 1/3 uens i længde. V-VII. ABCK

G. scabrum Presl Rut gniddergræs. Som den foregående, men dusken tættere, ikke lapper. Yderavnerne ru, uden brod, 1/5 forskellige i længde. III-V. A C

Polypogon. Skægaks.

1. Blomsterne uden stak. Flerårig ..... viridis
   Yderavnen med stak 2.
2. Flerårig. Stakken højst lig yderavnen ..... litoralis
   Enårig. Stakken længere end yderavnen 3.
3. Yderavnen svagt tvetandet. Inderavnen med stak monspeliensis
   " tvelapper for 1/4-1/3. Inderavnen uden stak 4.
4. Inderavnens fod (callus) 3-4 x så lang som bred subspathaceus
   " " " så lang som bred maritimus

Polypogon viridis (Gouan) Breistr. Duskhvene. 20-80cm. Stråene liggende og rodslående forneden. Minder om en Krybhvene, men toppen ganske tæt, som en lappet dusk. III-V. A B C K

Polypogon litoralis (With.) Sm. (P. adscendens) Mellemform mellem P. viridis og monspeliensis. Dusken lappet. Nedre yderavnes stak 1-3mm, den øvres kortere. III-V. A K (Ischia)

P. monspeliensis (L.) Desf. Skægaks. 10-40cm. Dusken halvt valseformet til svagt lappet, silkeagtigt gulgrøn. Småakset 2mm. Yderavnens stak 5-7mm. Skedehinden 5-10mm, spids. III-V. A B C K

P. maritimus Willd. Purpurskægaks. 10-30cm. Som foregående. Dusken ofte lillaanløben. Skedehinden 5-6mm. III-V. A B C K

P. subspathaceus Req. 20-40cm. Som de foregående, men øvre bladskede opblæst, omslutter duskens grund. Dusken mere ægformet. Yderavnen mere udspærret håret. III-V. A (Pen. Salent.)

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth Skovrørhvene. 60-150cm. Stakken rager et par mm ud af småakset. Bladene friskgrønne med skinnende underside. VI-VIII. K

C. epigejos (L.) Roth Bjærgrørhvene. Toppen stift opret. Planten grågrøn. VI-VII. A B C K

C. pseudophragmites (Haller f.) Koeler Flodrørhvene. 50-150cm. Nær foregående, men toppen slap og noget nikkende, og planten blågrøn. Inderavnens stak endestillet. Flodbredder. VI-VII. B

Phleum. Rottehale.

1.	Flerårig	2.
	Enårig	6.
2.	Yderavnerne jævnt tilspidsede	ambiguum
	" brat afskårne fortil	3.
3.	Dusken lappet ved ombøjning	phleoides
	" ikke lappet ved ombøjning	4.
4.	Dusken bredt valse- til ægformet	alpinum
	" valseformet. Stakken højst 2mm	5.
5.	Skedehinden håret. Småaksene 2½-3½mm	bertolonii
	" glat. " 4½-5½mm	pratense
6.	Yderavnerne jævnt tilspidsede	7.
	" brat afskårne fortil	9.
7.	Yderavnerne med ru køl, bådformede	subulatum
	" randhårede, linje-lancetformede	8.
8.	Dusken med kileformet grund. Støvknappen 0,3-1,2mm	arenarium
	" valseformet. Støvknappen 1,5-2mm	graecum
9.	Dusken valseformet. Stakkene 0,3-0,6mm	paniculatum
	" ægformet. Stakkene 4-6mm	echinatum

Phleum arenarium L. Sandrottehale. IV-VI. Klitter. A B C K

P. subulatum (Savi) Asch.& Gr. Tynd rottehale. 10-40cm. Dusken bleggrøn, 3-6cm x 4-6mm. V-VI. A B C K

P. ambiguum Ten. 20-60cm. Dusken 4-8x1cm, bleggrøn til lilla. Yderavnens køl kun randhåret i øvre halvdel. Bladene ofte indrullede. V-VI. 200-2200m. A B C K

P. graecum Boiss.& Heldr. Køllerottehale. 10-20cm. Dusken 4-10 (15)cm, med afrundet grund. Yderavnerne med vigende spidser. Ellers nær arenarium. V. A (Gallipoli, Otranto) B (Matera)

P. paniculatum Hudson Stenrottehale. 10-30cm. Dusken smalt valseformet, 5-10cm x 6mm, bleggrøn. Yderavnerne kileformede, ret brede opadtil, med en kort brod på 0,3-0,6mm. V-VI. A B C K

P. echinatum Host Pindsvinerottehale. 10-30cm. Dusken 2½-3x1,2 cm, bleg- eller hvidliggrøn. Yderavnerne 3mm, randhårede og langstakkede. III-V. B

P. phleoides (L.) Karsten Glat rottehale. V-VII. A (Gargano)

P. pratense L. Engrottehale. IV-IX. A B C K

Phleum bertolonii DC. Knoldrottehale. IV-X. A B C K

P. alpinum L. ssp. rhaeticum Humphries Mørk rottehale. 20-50cm. Dusken 1-5cm x 7-15mm, ofte blålilla. Øverste bladskede opblæst. Stakkene 1½-4mm. Skedehinden 1mm. 1500-2600m. VI-VIII. B C K

Alopecurus. Rævehale.

1. Dusken æg- til næsten kugleformet ..... 2.
   " valseformet 3.
2. Stakken udragende, af yderavnens længde ..... rendlei
   " indesluttet gerardii
3. Stænglen knæbøjet opstigende. Yderavnerne butte geniculatus
   " opret. Yderavnerne spidse 4.
4. Yderavnerne glatte, med smalvinget køl. Enårig myosuroides
   " hårede, uvingede. Flerårig 5.
5. Stængelgrunden løgformet opsvulmet. Yderavnerne næsten frie bulbosus
   Strågrunden ikke fortykket. Yderavnerne 1/4 sammenvoksede pratensis

Alopecurus rendlei Eig (A. utriculatus (L.) Pers.) Kølrævehale. 10-40cm. Enårig. Yderavnerne 1/4-1/3 sammenvoksede, brat indsnørede over midten, uden brod, stivhårede i nedre ½. IV-VI. ABCK

A. gerardii Vill. Hvid rævehale. 15-30cm. Flerårig. Dusken 7-20 x 5-10mm. Småaksene 4-6mm. Yderavnerne med en lang brod på 1½-3½ mm, hvidlådne især på kølen. VII-VIII. B C (Pollino). 1800-2800m.

A. geniculatus L. Knæbøjet rævehale. V-VII. B C

A. bulbosus Gouan Knoldrævehale. 10-80cm. Strået omgivet af rustbrune skeder forneden. Bladene meget smalle, 1-2mm. Dusken meget tynd: 2-6cm x 2-3mm. Lilla støvknapper. III-VII. A B C K

A. pratensis L. Engrævehale. IV-VI. B C K

A. myosuroides Hudson Agerrævehale. IV-VI. A B C K

Parapholis incurva (L.) Hubb. Krum spidshale. 2-25cm. Yderavnens køl uvinget. Øverste bladskede opblæst. Støvknapperne 0,5-0,9mm. Akset ofte stærkt krummet. IV-VI. A B C K

P. filiformis (Roth) Hubb. Kølet spidshale. 8-25cm. Yderavnens køl tydeligt vinget. Øverste skede ikke eller svagt opblæst. Støvknappen 2½-3½mm. Akset m.m. ret. V-VI. A B C K

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter Lang spidshale. 5-30cm. Opret til opstigende enårig med et 5-15cm langt, stift, m.m. trindt aks med indsænkede småaks. V-VI. A B C K

Phalaris. Glansfrø.

1. 70-150cm høj flerårig med lappet og ofte åben top arundinacea
   Tæt dusk, der ikke er lappet 2.
2. Flerårig ..... 3.
   Enårig 5.
3. Yderavnens køl tandet foroven ..... coerulescens
   " " helrandet 4.
4. Yderavnens køl med et hak før spidsen ..... truncata
   " " uden noget hak bulbosa
5. Yderavnen med stak og en tand nær spidsen ..... paradoxa
   " uden stak 6.
6. Dusken nærmest valseformet. Yderavnens køl tandet .... minor
   " ægformet. Yderavnens køl helrandet 7.
7. De golde inderavner mindst ½ x de frugtbare .... canariensis
   " " " højst 1/5 x " " brachystachys

Phalaris arundinacea L. Rørgræs. V-VII. A B K

P. truncata Guss. Afskåret glansfrø. 30-100cm. Tættuet. Stråene uden løgformet grund. Dusken kølleformet. Yderavnen med en skævt

afskåren køl. Fugtige steder. IV-V. A B C K

Phalaris coerulescens Desf. Violet glansfrø. 40-100cm. Strået løgformet forneden. Dusken ofte lillaanløben. Småaksene i grupper på 5-7 med 1 frugtbart og resten golde. IV-V. A B C K

P. bulbosa L. (P. aquatica) Knoldglansfrø. 50-150cm. Strået tit med løgformet grund. Dusken forlænget. Yderavnens køl jævnt tilsmalnende i begge ender. IV-VI. A B C K

P. paradoxa L. Stakglansfrø. 25-65cm. Dusken ofte dækket af den øverste bladskede forneden og ofte lillabroget. Småaksene i grupper på 5-7 med 1 frugtbart og resten golde. IV-V. A B C K

P. minor Retz Lidet glansfrø. 10-60cm. V-VI. A B C K

P. canariensis L. Kanariegræs. IV-VI. A B C K

P. brachystachys Link Kortskællet glansfrø. 30-60cm. Som foregående, men de golde inderavner reducerede til 2 brunlige skæl på 0,5-0,7mm. IV-VI. A B C K

Milium effusum L. Miliegræs. V-VIII. A B C K

M. vernale Bieb. Vårmiliegræs. 10-50cm. Opret enårig. Bladene ru og glatte. Skederne ru, ofte lilla og bredt hindekantede. Toppen 1½-8cm med opret-udstående grene. IV-VI. A B C K

Oryzopsis miliacea (L.) Asch.& Schweinf. (Piptatherum m.) Alm. rishirse. Toppen stor og åben og mangeblomstret, op til 30cm. Yderavnerne 3-3½mm, hindeagtige. Inderavnen med en 3-5mm lang stak. IV-IX. A B C K. 2 underarter:
ssp. miliaceum: Nedre topgrene 4-8 sammen, med småaks.
ssp. thomasii (Duby) Pign.: Nedre topgrene i kranse på 20-60 og næsten alle golde. K

O. coerulescens (Desf.) Richter (Piptatherum c.) Blå rishirse. 30-70cm. Bladene tynde og ofte indrullede. Toppen stor og fåblomstret med ofte bølgede grene. Yderavnerne 6-8mm, grønt og blåligt brogede. Stakken indesluttet, 3mm lang. IV-V. C

Stipa. Stakgræs og Fjergræs.

1. Stakken 1-3cm ..... 2.
   " mindst 7(5)cm 3.
2. Skedehinden meget kort. Toppen linjeformet ..... bromoides
   " 1-2mm. Toppen åben trichotoma
3. Stakken ikke fjerhåret ..... 4.
   " fjerhåret 5.
4. Flerårig. Stakken 15-20cm. Yderavnen ca. 3cm .... fontanesii
   Enårig. " 7-10cm. " 12-16mm capensis
5. Yderavnerne 6-8cm. Inderavnen mest 20-26mm ..... 8.
   " 4-5cm. " " 15-20mm 6.
6. Inderavnens midterste hårstribe mindst lig nabohårstriberne ..... kiemii
   Inderavnens midterste hårstribe mangler eller er kortere end nabohårstriberne 7.
7. Den indrullede bladoverside tæthåret ..... austroitalica
   " " " kun håret i furerne eriocaulis
8. Bladskederne og strået tæt hårede foroven ..... crassisulmis
   " " " glatte pulcherrima

Stipa bromoides (L.) Dörfl Ret stakgræs. 60-100cm. Flerårig. Bladene indrullede, under 1mm brede. Toppen 15-30cm. Yderavnerne 8-9mm, inderavnen 6-7mm, lådden forneden. Stakken 1½-2½cm. ABCK

S. capensis Thunb. Snoet stakgræs. 10-30(80)cm. Toppen 3-10cm, tæt. Yderavnerne 12-16mm. Stakken (5)7-10cm, stærkt snoet i sin nederste del. IV-V. A B C K

S. eriocaulis Borbas Klippefjergræs. 30-60cm. Bladskeder ofte fint og kort hårede foroven. Strået foroven med 0,2-0,3mm lange

hår. Stakken 23-28(21-30)cm. Inderavnen 18-19(17-20)mm. V-VI. K

Stipa kiemii (Martinovsky) Nedre bladskeder tæt hårede i øvre halvdel, de øvre højst ru. Inderavnen 18½-20mm, stakken 24-28cm. V-VI. A (M.S.Angelo på Gargano)

S. pulcherrima Koch Langstakket fjergræs. 50-100cm. Bladskederne mest glatte. Bladet 2-3mm bredt, mest fladt. Inderavnen 20-23 (18-25)mm. Stakken 30-45(25-50)cm. V-VI. B K

S. crassisulmis P.Smirnov ssp. picentina Martinovsky & al. Tykstrået fjergræs. 40-80cm. Skedehinden 3(6)mm med 1mm lange hår. Inderavnen 20-21(19-23)mm. Ca. 1600m. VI-VII. K (Vallone della Caccia på Monti Picentini ØNØ for Salerno)

S. austroitalica Martinovsky 40-70cm. Eneste Fjergræs med håret bladoverside. Inderavnen kan have 2 randhårede øren nær stakken. 300-1900m. V-VI. A (Gargano) B

S. trichotoma Nees Fint stakgræs. 30-50cm. Bladene trådformede (1mm). Flerårig. Yderavnerne 6-9mm, med knudret grund og sylformet spids. Inderavnen 2mm. Stakken 2-3½cm. V-VI. K (Campi Flegrei ved Napoli)

S. fontanesii Parl. Sylstakgræs. 40-80cm. Toppen ca. 25cm med få småaks. Inderavnen 13-14mm. IV-V. A

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv. Rugræs. 60-120cm. Tueformet flerårig. Unge strå med skællignende bladskeder forneden. Reduceret skedehinde. Toppen 15-30cm, ret åben. Småaksene 8-9mm med 3-6mm lange, hvide hår. VI-VIII. A B C K

Ampelodesmos mauritanica (Poiret) Dur.& Schinz Vingræs. Op til 1m brede tuer. Bladene op til 1m x 7mm, rurandede. Stråene 1-2m med en top på 30-40cm. Småaksene 10-15mm, nærmest svingelagtige, gulgrønne til lillaanløbne. IV-VI. A B C K

Arundo donax L. Kæmperør. 2-5m. Strået 1-2cm tykt og bambusagtigt. Bladene 1-8cm brede. Toppen 30-60cm. Småakset mindst 12mm, mest med 3 blomster. Inderavnen med kløven spids. VII-XI. ABCK

A. plinii Turra Strandrør. 1-2m. Strået 3-7mm tykt. Bladene 1(2) cm brede. Småaksene ikke over 10mm, med 1-2 blomster. Inderavnen ikke kløven. VII-X. A B C K

Phragmites australis (Cav.) Trin. Tagrør. VI-X. A B C K

Danthonia decumbens (L.) DC. Tandbælg. V-VI. B C K

Molinia coerulea (L.) Moench Blåtop. VII-IX. C (Sila)

Ammophila arenaria (L.) Link ssp. arundinacea H.Lindb.f. Hjælme. IV-V. A B C K

Nardus stricta L. Katteskæg. VI-VIII. B C K

Lygeum spartum L. Espartogræs. 20-30cm. Jordstængel og strågrund med læderagtige skæl. Bladene 1½mm brede, indrullede og stive. Blomstersvøbet 3-4cm, æg-lancetformet og spidst. Småakset med 2 blomster med langhåret grund. Lerklinter. III-V. A B C K

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. Kattefodsgræs. 10-25cm. Lange, liggende stængler med ret korte, stive og udstående blade. Dusken en tvesidet klase af m.m. siddende aks med toradet stillede småaks, 2½-5cm lang, smalt ægformet og lappet. VI-VIII. A B C

Cleistogenes serotina (L.) Keng Stivstrå. 30-60cm. Skuddene oprette, de golde med toradet udstående blade. Toppen med udspærrede, akslignende grene, 4-10cm. Småaksene 1-3-blomstrede, lilla. VIII-X. A B C K

Eragrostis. Kærlighedsgræs. Enårige med smalle og langagtige småaks. Yderavnerne så store som de taglagte inderavner, alle butte.

Eragrostis pilosa (L.) Beauv. Slørkærlighedsgræs. 10-30cm. Nedre topgrene 4-5 sammen. Bladene 2-3mm brede, uden kirtler i randen. Småaksene 4-5mm, 1-1½mm brede, ofte sortlilla. VI-IX. A

E. megastachya (Koeler) Link (E. cilianensis) Stort kærlighedsgræs. 10-40cm. Nedre topgrene mest enlige. Bladene 4-8mm brede, randkirtlede. Småaksene 8-12x2-3mm. III-X. A B C K

Sporobolus pungens (Schreber) Kunth Ribbensgræs. 20-50cm. Jordstænglen langt krybende i sandet. Golde skud med faste, indrullede, toradede blade. Toppen grålilla, stærktgrenet, tæt og sammentrængt. Klitter. VII-VIII. A B C K

S. indicus (L.) R.Br. Trådhale. 60-100cm. Tueformet flerårig. Toppen stiv og linjeformet, indtil 30cm, mørkt grålig. Småaksene 1½-2½mm. Yderavnerne 3/4 og 1½mm. VI-VII. K (Napol.)

Crypsis aculeata (L.) Aiton Hovedsumpaks. 3-15cm. Enårig med m.m. oppustede skeder og blågrønne blade. Dusken pudeformet, bredere end lang med et svøb af 2(4) udstående, stive blade med en noget tornagtig spids. Klitlavninger. VII-IX. A B C K

C. alopecuroides (Pill.& M.) Schrader Langakset sumpaks. 10-40 cm. Bladskederne ikke oppustede. Dusken uden svøbblade, valseformet, 4-10 x så lang som bred, ofte mørk. VII-X. A

Dactyloctenium aegyptium (L.) Richter Fingerkamgræs. 20-40cm. Opret enårig. Bladene 3-6mm brede, randhårede. 4-5 aks på 1½-5cm hvis akse ender i en rød brod. Småaksene toradede, 4mm, mest med 3 blomster, kølede. V-VI. C K

Cynodon dactylon (L.) Pers. Hundetandsgræs. 10-30cm. Ligner Digitaria, Fingeraks, men let kendelig ved sine blågrønne, toradede blade. Flerårig. VI-IX. A B C K

Tragus racemosus (L.) All. Burreaks. 10-30cm. Liggende til opstigende enårig. Bladene med stivhåret rand. Dusken valseformet, 2-7cm, lilla med 1-blomstrede småaks på 4mm. VI-VIII. A B C K

Ehrharta delicatula Stapf 40-70cm. Stråene liggende og opstigende. Bladene 3-8mm brede, de øvre omslutter toppens grund. Småaksene med 1 frugtbar blomst og 2 golde inderavner (alle 3mm), hvoraf mindst 1 er karakteristisk tværrynket. VII-XI. K (Forvildet i Parco Reale di Portici ved Napoli)

Panicum miliaceum L. Alm. hirse. Enårig. VII-VIII. A B C K

P. repens L. Krybehirse. 20-50cm. Flerårig med lange, ofte overjordiske udløbere. Bladene næsten regelmæssigt toradede. Toppen tæt med m.m. oprette grene. Yderavnerne glatte. VI-X. K

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Hanespore. 25-100cm. De længste aks 2-10cm. Småaksene 3-4mm, mest med stak. VI-X. A B C K

E. colonum (L.) Link Spinkel hanespore. 10-70cm. Aksene sjældent over 3cm. Småaksene 1½-3mm, uden stak. VII-IX. A B C K

Brachiaria erucaeformis (S.& S.) Griseb. Rævehalehanespore. 30-60cm. Enårig. Aksstanden dannet af 2-10 lodrette, tiltrykte klaser på ½-2½cm. Småaksene uden stak. Yderavnerne hårede.VIII-X. A

Digitaria. Fingeraks. Enårige.

1. Øvre yderavne længere end den frugtbare inderavne .. debilis
   " " ej " " " " " 2.
2. Øvre yderavne lig den frugtbare inderavne ..... ischaemum
   " " 1/3-3/4 x den frugtbare inderavne 3.
3. Øvre yderavne 1/3-1/2 x småakset ..... sanguinalis
   " " 2/3-3/4 x " ciliaris

Digitaria debilis (Desf.) Willd. Spinkelt fingeraks. 10-30cm. Strået spinkelt. Nedre blade dunede, øvre næsten glatte, 3-5mm brede. 5-11 aks på 5-10cm. Nedre yderavne væk. VIII-X. B K

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Blodhirse. 20-50cm. Bladene ofte med udstående hår på 1-1½mm, 8-12mm brede. 4-6 aks på 3-8cm. Yderavnerne ½ og 1½mm; frugtbare inderavne 2½mm. VI-XI. A B C K

D. ciliaris (Retz.) Koeler Randhåret fingeraks. 20-50cm. Som foregående, men den golde inderavne randhåret. VIII-X. B K

D. ischaemum (Schreber) Muhl. Lidet fingeraks. 10-40cm. Bladene glatte eller svagt hårede ved grunden, 5-6mm brede, ofte lilla. Yderavnerne 0,3-1 og 2mm. VII-IX. B K

Paspalum dilatatum Poiret Savaks. 30-80(150)cm. Tættuet flerårig. Bladene næsten glatte, 3-10mm brede. 3-6 spredtstillede aks på 4-11cm. Småaksene 3-3½mm, gulgrønne, 2-blomstrede. VII-IX. K

P. paspalodes (Michx) Scribner Tvillingaks. 10-50cm. Flerårig med udløbere. Blade og skeder ofte randhårede. 2 ret oprette aks sammen på 2-7cm med en smal, affladet akse. Småaksene gulgrønne, stakløse. VII-IX. A B C K

Setaria. Skærmaks.

1. Børsterne med nedadrettede modhager, så de hænger i verticillata
   Børsterne med opadrettede modhager, hænger ikke i 2.
2. Øverste inderavne stærkt tværrynket ..... glauca
   " " jævn eller svagt rynket 3.
3. Dusken 2-3cm bred, m.m. lappet forneden ..... italica
   " under 1cm bred 4.
4. Duskens akse delvist synlig og kort stivhåret .... decipiens
   " " helt dækket, også blødhåret viridis

Setaria glauca (L.) Beauv. (S. pumila) Blågrønt skærmaks. 15-60 cm. Planten grågrøn. Småaksene enligtsiddende, under hvert 4-12 først gule, siden ræverøde børster. VII-X. A B C K

S. viridis (L.) Beauv. Grønt skærmaks. 20-60cm. Dusken ikke mellembrudt. Børsterne 5-10mm, tynde og bøjelige. VI-X. A B C K

S. decipiens Schimp. (S. ambigua) Kortbørstet skærmaks. 20-50cm. Dusken mellembrudt. De fleste børster 3-4mm, tykke og stive.ABCK

S. verticillata (L.) Beauv. Kransskærmaks. 20-60cm. Skederne hårede på fladerne eller kun langs randen, bladene næsten glatte. Dusken mellembrudt forneden, aksen uden længere hår. V-X. A B C K

S. italica (L.) Beauv. Kolbehirse. Strået op til 1cm tykt. Småaksene 3-3½mm, falder ikke af som en helhed, idet yderavnerne bliver siddende. VII-VIII. Dyrket og forvildet.

Tricholaena teneriffae (L.f.) Link Hårhvene. 20-50cm. Tættuet flerårig. Hårformet skedehinde. Toppen 4-10cm, åben. Småaksene 2-blomstrede, lilla, 2½-3½mm med 4-7mm lange, hvide hår. Tørre, stenede skrænter. VI-VII. C (fra Reggio til Pizzo)

Imperata cylindrica (L.) Beauv. Sølvgræs. 50-120cm. Bladene indrullede, indtil 50cm, stift oprette. Dusken indtil 20cm, tæt og valseformet, hvidulden af de lådne yderavner. V-VII. A B C K

Erianthus ravennae (L.) Beauv. (Saccharum r.) Sølvrør. 1-4m. Bladene indtil 1cm brede, til sidst ofte rødlige med hvide ribber. Toppen 30-50cm, hvidulden og lappet. Klitlavninger. VII-X. ABCK

Sorghum halepense (L.) Pers. Vild durra. 50-150cm. Bladene 1-2cm brede med lys midterribbe. Flerårig. Toppen 10-30cm med brunlilla småaks på 4-6mm. VII-X. A B C K

S. bicolor (L.) MOench Negerhirse, Durra. 1-3m. Bladene 2-7cm brede. Enårig. Toppen 20-40cm, kraftig. VIII-X. Dyrket og sjældent forvildet.

Dichanthium ischaemum (L.) Roberty Almindeligt skæggræs. 15-60cm.

Tættuet flerårig. 4-6 fingerformet siddende aks på 3-5cm. Småaksene 3½-4½mm. Stakkene 12-15mm. VI-XI. A B C K

Andropogon distachyus L. Hornet skæggræs. 30-90cm. 2 endestillede aks på 4-14cm. Småaksene 9-12mm. Inderavnens stak 15-30mm. V-IX. A B C K

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf Tvillingskæggræs. 30-100cm. Toppen dannet af mange, parvise klaser på 3-4cm på fælles stilke fra bladhjørnerne. V-X. A B C K. 2 underarter:
ssp. hirta: Toppens blade med glat rand. A B C K
ssp. villosa (Pign.): Toppens blade langt randhårede. C

Hemarthria altissima (Pæiret) Stapf Hulaks. -250cm. Strået liggende til opstigende. Aksene 4-10cm lange, 1-6 sammen i bladhjørnerne. Hvert andet småaks stilket, det siddende indsænket. Kystnære fugtige steder. VII-XII. A (Otranto) C (S.Eufemia Lam.) K

PALMAE

Chamaerops humilis L. Dværgpalme. ½-2m. Stammen oftest kort og knoldformet, sjældnere lidt forlænget. Bladene vifteformede, op til 80cm. Bladstilken med tornet-tandet rand. V-VI. K

ARACEAE

1. Bladene fodfligede ..... Dracunculus
   " ikke fligede (eller mangler) 2.
2. Bladgrunden pilformet ..... 3.
   " ikke pilformet (eller bladløs) 5.
3. Bladstilken fæstner på bladundersiden ..... Colocasia
   " " ved bladgrunden 4.
4. Hylsterbladet sammenvokset forneden ..... Arisarum
   " frit forneden Arum
5. Kolben uden hylsterblad. Bladene linjeformede ..... Acorus
   " med " 6.
6. 10-30cm. Bladløs eller med lancetformede blade ..... Biarum
   4-8cm. Med ægformede blade Ambrosina

Acorus calamus L. Kalmus. V-VI. A

Colocasia esculenta (L.) Schott Taro. 30-60(150)cm. Bladene æghjærteformede, spidse, 10-15x7-10cm. Hylsterbladet 20-45cm med en grøn, rørformet nedre del og en mat orangegul, lancetformet øvre del, der er langt tilspidset. III-V. Dyrket og forv. i C

Arum maculatum L. Plettet lygtemand. Knolden skrå og forlænget. Kolden lilla, jævnt tilsmalnet nedad, kølleformet foroven. Bladene ofte sortplettede. IV-V. B C K

A. lucanum Cavara & Grande Lancetlygtemand. 20-30cm. Knolden affladet kugleformet. Kolben lilla, 2/3 x hylsterbladet, tynd, ikke kølleformet foroven, 20-35x2-3mm. Bladene 6-12x4-5cm. Hylsterbladet 10-12cm. 1300-1700m. VI-VII. B (M.Papa, Pollino) C K (Matese)

A. italicum Miller Hvidåret lygtemand.40-100cm. Bladene 9-23 x 7-22cm, ofte hvidårede. Hylsterbladet 15-25cm. Kolben lysegul, ofte under ½ x hylsterbladet, kølleformet foroven. III-V. ABCK

Dracunculus vulgaris Schott Dragerod. 30-100cm. Bladene nærmest juleroseagtige med 9-15 fodformet anbragte flige, 15-20x25-35cm. Hylsterbladet 20-40cm, grønligt udvendigt og mørkt brunlillat indvendigt. Kolben mørklilla. IV-V. A C K

Biarum tenuifolium (L.) Schott Brun ormetunge. 20-40cm. Bladene 8-15x½-1cm. Hylsterbladet rørformet nederst, lancetformet øverst, mørklillat indvendigt, grønligt anløbent udvendigt, 10-30cm. Høstblomstrende uden blade og sjældnere vår- og forsommerblomstrende med blade. X-VI. A B C K

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. Munkehætte. 10-30cm. 1-få små Arumblade på 4-10cm. Hylsterbladet 3-5cm, grønligt med brunlilla

længdestriber, foroven hætteagtigt fremadbøjet. X-V. A B C K

Arisarum proboscideum (L.) Savi Snabelmunkehætte. 12-20cm. Bladene pilformede, 8-12x6-7cm. Hylsterbladet stærkt hætteformet foroven og udtrukket i en trådformet spids på 5-15cm; mørkebrunt eller brungrønt øverst og lysere forneden. 0-1200m. X-V. A B C K

Ambrosina bassii L. Kolbebåd. 4-8cm. 2-4 undertiden lillabrogede, elliptisk-ægformede blade. Hylsterbladet liggende, bådformet, 2-3 cm, grønt og lillaplettet, ender i en vreden spids. XII-III. C

LEMNACEAE

Lemna trisulca L. Korsandemad. A B K

L. gibba L. Tyk andemad. A B C K

L. minor L. Liden andemad. A B C K

Wolffia arrhiza (L.) Horkel Dværgandemad. Mindste europæiske blomsterplante, ½-1mm store halvkugler med svagt hvælvet overside. Uden rødder eller ribber. K

SPARGANIACEAE

Sparganium erectum L. Grenet pindsvineknop. VI-VIII. A B C K
ssp. erectum: Frugten mørkebrun til sort med kantet tværsnit.
ssp. neglectum (Beeby) S.& Th.: Frugten gulbrun med trindt tværsnit.

S. emersum Rehm. Enkelt pindsvineknop. VI-IX. B C

TYPHACEAE

Typha. Dunhammer.

1. Bladene 1-2(3)mm brede. Hankolben 1½-5cm ..... minima
   " 2-20mm brede. Hankolben 10-30cm 2.
2. Hankolben sidder lige over hunkolben ..... latifolia
   Han- og hunkolben adskilte fra hinanden 3.
3. Hunkolben lysebrun. Bladskederne uden øren ..... domingensis
   " brun. Bladskederne ofte ørede angustifolia

Typha latifolia L. Bredbladet dunhammer. VI-VIII. A B C K

T. angustifolia L. Smalbladet dunhammer. Hunblomsternes skæl matte og mørkebrune. VI-VII. A B C K

T. domingensis Pers. Stor dunhammer. 1-3m. Hunblomsternes skæl lysebrune og gennemskinnelige. VI-VII. A B C K

T. minima Hoppe Liden dunhammer. 30-70cm. Hunkolben så lang som hankolben, mørkebrun, aflang eller ægformet. V-VI. A B C K

CYPERACEAE

Scirpus. Kogleaks.

1. Småaksene samlede i kugleformede hoveder ..... holoschoenus
   " ikke i kugleformede hoveder 2.
2. Blomsterstanden endestillet ..... 3.
   " sidestillet 4.
3. Aksene 1-3cm lange, i en ret tæt stand ..... maritimus
   " 3-8mm " , i en stor og åben stand silvaticus
4. Tueformet. Mest enårig. 3-15cm ..... cernuus
   Med udløbere. Flerårig 5.
5. Strået trekantet. Aksene 5-15mm ..... litoralis
   " trindt 6.
6. 2 støvfang. Dækskællene fint rødvortede .... tabernaemontani
   3 " . " jævne lacuster

Scirpus silvaticus L. Skovkogleaks. V-VII. C (Sila)

S. maritimus L. Strandkogleaks. VI-IX. A B C K

Scirpus holoschoenus L. Kuglekogleaks. 30-100cm. Strået trindt. Aksstanden sidestillet, bestående af oftest 1-10 kugleformede, stilkede hoveder på op til 12mm. VI-IX. A B C K

S. lacuster L. Søkogleaks. V-VIII. A B C K

S. tabernaemontani Gmelin Blågrønt kogleaks. V-VIII. A B C K

S. litoralis Schrader Fjerkogleaks. 30-200cm. Strået med højst 1 blad på 2-6cm. Dækskællene brune og hindekantede. Blosterbørsterne spatelformede, randhårede øverst. V-VI. A

S. cernuus Vahl Damkogleaks. Nær Børstekogleaks. Med 1(3) aks kort under stængelspidsen på 2x1½mm med hvide eller grønlige avner. Nødderne matte og jævne. V-X. A B C K

Blysmus compressus (L.) Panzer Fladtrykt kogleaks. B C K

Eleocharis. Sumpstrå.

1. Akset med 3-8(15) blomster. 3 støvfang ..... 2.
   " " 10-30(70) blomster. 2 støvfang 3.
2. Strået ½-1mm tykt. Akset 4-10mm ..... quinqueflora
   " 0,3-0,5mm tykt. Akset 2-4mm acicularis
3. Griffelfoden tydeligt bredere end høj ..... nebrodensis
   " mindst så høj som bred palustris

Eleocharispalustris (L.) R.& S. Alm. sumpstrå. Griffelfoden ca. ½ så bred som nødden. VI-IX. A B C K

E. nebrodensis Parl. 10-30cm. Nær foregående, men stråene ofte udstrakte. Griffelfoden over ½ så bred som nødden. C (Pollino) VI-VII. 1600-1700m.

E. acicularis (L.) R.& S. Nålesumpstrå. VI-IX. B

E. quinqueflora (Hartmann) Schwarz Fåblomstret kogleaks.C(Sila)

Fuirena pubescens (Poiret) Kunth Knippeaks. 20-40cm. Flerårig med udløbere. Stråene skarpt trekantede, bladede næsten til toppen, blødt dunede ved bladfæsterne. Grågrønne, dunede aks i top eller knippe. V-VI. C (Laos udmunding)

Fimbristylis bisumbellata (Forsskål) Bubani (F. dichotoma) Frynseaks. 10-20cm. Blågrøn enårig. Bladene flade, 1-2mm brede. Indtil 10-12 ægformede, skarpkantede småaks på 3-5x1-1½mm. Avnerne lyst rødbrune med en smal, grøn ribbe. Griflen med lange, udstående hår og 2 støvfang. VIII-IX. C

Cyperus. Fladaks.

1. 2 støvfang ..... 2.
   3 " 5.
2. 2-6 aks i et sidestillet knippe ..... laevigatus
   Mange aks i skærm eller nøgle 3.
3. Bladene 6-8(4-10)mm brede. Aksene rødbrune ..... serotinus
   " ½-3mm brede. Aksene gullige 4.
4. Flerårig. Avnerne med en 3-året køl ..... polystachyos
   Enårig. Avnerne med en 1-året køl flavescens
5. Enårig ..... 6.
   Flerårig 7.
6. Aksene lange, 7-15mm. Avnerne med 6-9 ribber ..... glaber
   " korte, 3-8mm. " utydeligt ribbede fuscus
7. Aksene samlede i et hovede. Sivformede blade ..... capitatus
   " toradet stillede på grene i en skærm. Flade blade 8.
8. 50-120cm høj. Uden rodknolde. Avnerne 2,3-2,8mm ..... longus
   10-40cm " . Med " 9.
9. Bladene blågrønne, 2-6mm brede. Aksene rødbrune ... rotundus
   " friskgrønne, 5-10mm brede. Aksene strågule
   til rødlige esculentus

Cyperus longus L. Langt fladaks. Stråets nederste 20cm dækket af bladløse skeder. Skærmen ofte med 2-4 støtteblade på 7-17cm x 6-8 mm. VI-VIII. A B C K. 2 underarter:
ssp. longus: Skærmstrålerne dels korte (3-6cm) og ugrenede, dels lange og 3-5-grenede (8-12cm).
ssp. badius (Desf.) Asch.& Gr.: Alle skærmstråler korte og ugrenede, 4-5cm, sjældent med enkelte korte grene. VI-VIII.

C. rotundus L. Knoldfladaks. Alle blade grundstillede, skederne ofte rødlige. 2(4) støtteblade på op til 5cm. VI-XI. A B C K

C. esculentus L. Spiseligt fladaks. Aksene 6-12mm med m.m. udstående avner. VII-X. B C K

C. glaber L. Glat fladaks. 10-50cm. Skederne mørke eller lilla. Skærmen med 2-7 lange grene, men hyppigst sammentrængt. 2-3 støtteblade. Avnerne brune med grøn køl. VI-IX. A B C K (forsvundet?)

C. fuscus L. Fladaks. 2-35cm. Stænglen trekantet med konkave sider. Bladene 2-3mm brede, kølede. Aksene i nøgler, 1½mm brede og mørke. VII-IX. A B C K

C. capitatus Vandelli Hovedfladaks. 10-50cm. Grågrøn med lange udløbere i sandet. Strået trindt, ofte krumt. Bladene indrullede og stive. Hovedet 2-3cm bredt. Sandstrand. V-IX. A B C K

C. serotinus Rottb. Sildigt fladaks. 30-100cm. Ligner C. longus, men mere blågrøn. Aksstanden ret bred; grenene 3-15cm.VI-VIII. C

C. laevigatus L. Sivfladaks. 20-40cm. Stråene but trekantede, omgivne af skeder forneden. Aksene 5-23mm lange, på 2-15mm lange stilke. VI-VIII. A C K

C. polystachyos Rottb. Strågult fladaks. 20-40cm. Brunlilla bladskeder. Aksstanden hovedformet eller medgrene på 1-3cm. Avnerne gullige, stråfarvede eller gulbrune. VI-X. K (Ischia)

C. flavescens L. Gult fladaks. 3-30cm. Stråene trekantede med stærkt uens sider. Bladene uden køl. Aksene 10x2½mm, gullige. VII-IX. A B C K

Cladium mariscus (L.) Pohl Avneknippe. V-VII. A K

Schoenus nigricans L. Sortskæne. 10-40cm. Tættuet flerårig med sortagtige nedre bladskeder. Et hovede på 5-10 sortbrune aks. 2 støtteblade; det nederste forlænger strået lidt. IV-VII. A B C K

Carex. Star.

1. Aksene ens ..... 2.
   Han- og hunaks forskellige 12.
2. Med udløbere ..... 3.
   Tueformet 4.
3. Frugten smalvinget. Nedre bladskeder lysebrune ..... praecox
   " uvinget. Nedre bladskeder mørkebrune divisa
4. Aksene med hanblomster ved grunden ..... 5.
   " " " i spidsen 7.
5. Nedre støtteblade 10-20cm lange. Aksene adskilte .... remota
   " " korte 6.
6. Frugten bredvinget, m.m. opret ..... leporina
   " uvinget, udspærret echinata
7. 3 støvfang. Støttebladene meget lange (5-15cm) .... distachya
   2 " 8.
8. Aksene mørkebrune under blomstringen ..... paniculata
   " grønlige under blomstringen 9.
9. Strået skarpt til vinget trekantet med konkave sider otrubae
   " but trekantet, tværsnittet uden " " 10.
10. Frugten med en tydelig tværfure og svampet underdel spicata
    " uden tværfure 11.

11. De nedre aks med afstande på 1-4cm ..... divulsa
Aksene tætsiddende pairaei
12. 2 støvfang ..... 13.
3 " 14.
13. (1)2-4 hanaks. Bladene 4-8mm brede ..... acuta
1(2) hanaks. Bladene 2-4mm brede nigra
14. Flere hanaks ..... 15.
1 hanaks 21.
15. Frugten uden tydeligt næb, ruprikket eller håret ... flacca
" med tydeligt næb 16.
16. Frugten og bladskederne jævnt hårede ..... hirta
" højst randhåret mod spidsen 17.
17. Frugten stivhåret foroven ..... hispida
" glat 18.
18. Frugten lyst gulgrøn, opblæst, længere end avnen ..... 19.
" grønbrun, ofte kortere end avnen 20.
19. Strået rut foroven, skarpt trekantet ..... vesicaria
" jævnt, but trekantet rostrata
20. 2(3) hanaks. Frugten 3-4½mm. Aksene 6-7mm brede acutiformis
3-4 " . " 5-7mm. " 8-12mm " riparia
21. Frugterne dunede ..... 22.
" højst randhårede i spidsen 29.
22. 1-2 grundstillede, mest langstilkede hunaks ..... hallerana
Ingen grundstillede hunaks 23.
23. Frugten med et tydeligt tvetandet eller kløvet næb ..... 24.
" uden eller med et ganske kort næb 25.
24. Nedre støtteblads skede 10-30mm ..... kitaibeliana
" " " 3-7mm macrolepis
25. Aksene 2-4-blomstrede, sidder langs hele strået ... humilis
Hunaksene i stråets øvre halvdel 26.
26. Hunaksene løse, rager ofte op over hanakset ..... digitata
" tætte, " ikke " " " 27.
27. Nederste støtteblad hindeagtigt ..... caryophyllea
" " bladagtigt 28.
28. Frugten med tydelige ribber. Mest 4-5 hunaks .... grioletii
" uden " " . 1-2 hunaks tomentosa
29. Hunaksene fåblomstrede, med 2-12 blomster, løse ..... 30.
" flerblomstrede (eller også tætte) 31.
30. Frugten meget stor, 7-9mm, med et næb på 2½-3½mm depauperata
" middelstor, 4-5mm, kortnæbbet olbiensis
31. Hunaksene hængende ..... 32.
" ikke hængende 34.
32. Hunaksene tætstillede med udspærrede frugter pseudocyperus
" fjærntsiddende. Frugterne ikke udspærrede 33.
33. Hunakset tofarvet. Frugten kortnæbbet, 3-3½mm ..... pendula
" ensfarvet. " langnæbbet, 4-5½mm silvatica
34. Bladene randhårede, 4-10mm brede ..... pilosa
" ikke randhårede 35.
35. Hunaksenes dækskæl mørke ..... 36.
" lyse til mellembrune 37.
36. Frugterne skinnende brune ..... liparocarpos
" blegt grønbrune panicea
37. Hunaksene 4-10cm, valseformede. Bladene 5-13mm brede ... 38.
" ½-3cm 39.
38. Hunaksene 3-6mm brede. Dækskællet ca. = frugten microcarpa
" 2-3mm " . " kortere end frugten strigosa
39. Frugten uden næb. Bladundersiden korthåret ..... pallescens
" med " . " glat 40.
40. Øvre hunaks langt adskilte, aflangt æg- til valseformede 41.
" " oftest tætsiddende, kugle- til ægformede 42.
41. Nederste støtteblad mindst lig aksstanden ..... punctata
" " kortere end " distans

42. Hunlige dækskæl brodspidsede. Grågrønne blade ..... extensa
" " uden brod. Bladene grønne oederi

Carex distachya Desf. Pinjestar. 15-45cm. Bladene ½-1mm brede, af stråenes længde, flade. 2-4 løse aks med2-5 hunblomster. Frugterne 5-6mm. IV-VI. A B C K

C. spicata Hudson (C. contigua) Spidskapslet star. IV-VII. ABCK

C. pairaei F.W.Schultz Pigget star. IV-VII. C

C. divulsaStokes Sydlig mellembrudt star. 20-40(80)cm. Aksstanden 5-10cm, de nedre aksmellemrum større end aksene. IV-VI. ABCK

C. otrubae Podp. Syltstar. IV-VI. A B C K

C. paniculata L. Topstar. V-VI. B C (Sila)

C. divisa Hudson Skænestar. 10-50cm. Stråene m.m. ru. Bladene 1-3mm brede. Aksstanden 1½-2½cm, ægformet med 3-8 brune, tætsiddende aks med hanblomster foroven. IV-VI. A B C K

C. praecox Schreber Tidlig star. 10-30cm. Bladene mest længere end stråene. Aksstanden 1½-2cm lang med 3-5 aks. Kastanjebrune dækskæl. Frugten først vinget over midten. III-VI. B

C. leporina L. (C. ovalis) Harestar. V-VII. A B C K

C. echinata Murray (C. stellulata) Stjærnestar. V-VII. B C

C. remota L. Akselblomstret star. V-VII. A B C K

C. nigra (L.) Reichard (C. fusca) Alm. star. V-VII. C (Sila)

C. acuta L. (C. gracilis) Nikkende star. IV-VI. A C K

C. caryophyllea La Tourr Vårstar. III-V. A B C K

C. tomentosa L. Filtstar. 20-50cm. Bladene grå- til svagt blågrønne. Hunaksene m.m. aflange, 5-15x4-5mm. Nederste støtteblade til sidst vandret udstående. IV-V. B (Muro)

C. grioletii Roemer Pærefrugtet star. 30-60cm. Med korte udløbere. Bladene af stråenes længde, ofte indrullede. Hunlige avner hvidlige eller blegt grønligbrune. III-IV. K (Amalfi)

C. hallerana Asso Stilkstar. 10-30cm. Grundstillede aks mest 7-20cm langt stilkede. Dækskællene brune med grøn køl. Frugten 4-5 mm, tydeligt ribbet. Hunaksene 8-10x5mm. III-V. A B C K

C. humilis Leysser Jordstar. 2-10cm. Bladene 1-1½mm brede, grågrønne, meget længere end stråene. Hunlige støtteblade dækskælsagtige med store skeder. III-VI. K (M.S.Angelo di Castellamare)

C. digitata L. Fingerstar. IV-VI. K (Avellin.)

C. olbiensis Jordan Hvidgrøn star. 20-50cm. Nedre skeder sorte og skinnende. Hunaksene oprette med 3-12 blomster, hvoraf de nedre er m.m. adskilte. Hindeagtige avner. Hvidbrune frugter. III-IV. B C K

C. depauperata Good. Storfrugtet star. 30-60cm. Nedre skeder rustbrune og bladløse. 2-4 hunaks med 2-6 blomster. Dækskællene bredt hindekantede. Grønlige, skinnende frugter. V-VI. A B C K

C. silvatica Hudson Skovstar. IV-V. A B C K

C. strigosa Hudson Tyndakset star. IV-V. B (Muro)

C. pallescens L. Bleg star. VI-VII. C (Sila)

C. panicea L. Hirsestar. IV-VII. C (Sila)

C. liparocarpos Gaudin Glansstar. 10-30cm. Bladene 1-2mm brede. 2-3 mest overlappende hunaks på 5-15x5-6mm med 5-15 blomster. Dækskællene rødbrune, bredt hindekantede. III-V. A B C

C. macrolepis DC. Bredskællet star. 30-60cm. Nedre skeder rødbrune til mørkt brunlilla. 1(2) hunaks på 7-12mm, ægformede til af-

lange. Frugten 3½-6mm, mørkt brunlilla (grønlig?). V-VII. B C K

Carex kitaibeliana Becherer Koststar. 10-40cm. Nedre skeder brune til røde, alle bladede. Bladene lidt slappe. Frugten 4-6mm med fremtrædende ribber og et smalvinget næb. VI-VII. B C K

C. pilosa Scop. Randhåret star. 30-40cm. Lavbladene rødlilla til rødbrune. Aksene 2-4cm, løsfrugtede, stilkene 1-6cm. Frugterne 3½-5mm, grønne til lysebrune. Brune dækskæl. IV-V. K (Avellin.)

C. punctata Gaudin Prikstar. 20-50cm. Bladene 4-8mm brede, friskgrønne. Støttebladene ofte stråoverragende. Frugterne skinnende, udstående, 3-4mm. Lysebrune dækskæl. IV-V. B C K

C. distans L. Fjærnakset star. IV-VI. A B C K

C. extensa Good. Udspilet star. V-VI. A B C K

C. oederi Retz. (C. serotina) Dværgstar. V-VIII. A B C K

C. pendula Hudson Kæmpestar. IV-V. A B C K

C. microcarpa Bertol. Småfrugtet star. 50-100cm. Tættuet. Bladene indtil 13mm brede. Hunaksene oprette. Frugterne 2,5-3,3mm, lyst gråbrune. III-V. A (Gargano)

C. pseudocyperus L. Knippestar. III-V. B

C. rostrata Stokes Næbstar. V-VII. C (Sila)

C. vesicaria L. Næbstar. V-VII. B C (Sila)

C. acutiformis Ehrh. Kærstar. IV-VI. K

C. riparia Curtis Tykakset star. IV-VI. A B K

C. hispida Willd. Ru star. 45-100cm. Stråene kraftige, butkantede. Nedre skeder sortbrune og trævlede. Bladene 4-8mm brede. 2-4 hanaks, 3-5 hunaks på 4-10cm. Dækskæl med stak. III-V. A K

C. flacca Schreber Blågrøn star. A B C K. 2 underarter:
ssp. flacca: Hunaks ofte hængende. Dækskæl med 1 ribbe, næppe længere end den 2-3mm lange frugt. III-VI.
ssp. serrulata (Biv.) Greuter: Hunaks oprette. Dækskæl med 3 ribber, mindst lig den 3-4mm lange frugt. III-V. A B C K

C. hirta L. Håret star. IV-VI. A B C K

ORCHIDACEAE

1. Planten uden grønne blade, kun med farvede skælblade ..... 2.
   " med " " 5.
2. Stænglen mørklilla, blomsterne lilla ..... Limodorum
   Planten ikke lilla 3.
3. Stænglen brun. Læben kløvet ..... Neottia
   " ikke brun 4.
4. Stænglen hvidlig. Blomsten hvid med kort spore ... Epipogium
   " og blomsterne gulgrønne Corallorhiza
5. Læben uden eller med utydelig spore ..... 6.
   " med tydelig spore 13.
6. Stænglen med 2 næsten midterstillede blade ..... Listera
   Stænglen flerbladet eller med 2 grundblade 7.
7. Læben delt på tværs i en inder- og yderlæbe ..... 8.
   " ikke tværdelt 10.
8. Frugtknuden stilket ..... Epipactis
   " m.m. siddende 9.
9. Frugtknuden snoet. Hvid/rødlilla blomst ..... Cephalanthera
   " ikke snoet. Læben rødbrun Serapias
10. Læben med et tydeligt farvet og formet midterfelt .. Ophrys
    " m.m. ensfarvet 11.
11. Underlæben firfliget. Blosterbladene hjælmdannende Aceras
    " ikke firfliget 12.

12. Blomsterne grønlige ..... Herminium
" hvide Spiranthes
13. Læbens midterflig smal og båndformet, 4-6cm lang Himantoglossum
Læbens midterflig kortere 14.
14. Læben udelt, smalt tungeformet. Hvid blomst ... Platanthera
" anderledes, mest 3-tandet eller 3-lappet 15.
15. Sporen kort og sækformet, fremadrettet ..... Coeloglossum
" ikke fremadrettet 16.
16. Underlæben firfliget med krusede sideflige ..... Barlia
Sidefligene ikke krusede 17.
17. Blomsten ensfarvet hvid. Blosterbladene 2-3mm .. Leucorchis
" anderledes 18.
18. Støttebladene urteagtige ..... 19.
" hindeagtige 20.
19. Sporen trådformet, under 1mm tyk. Blosteret 4-5mm Gymnadenia
" tykkere end 1½mm. Blosterbladene større Dactylorhiza
20. Læbens sideflige linjeformede. Sporen 1-3mm ..... Neotinea
" " aflange, æg- eller rudeformede 21.
21. Læben ved grunden med 2 lodrette lameller ..... Anacamptis
" uden lameller ved grunden Orchis

Epipactis. Hullæbe.

1. Læben hvidlig med rødåret inderdel ..... palustris
" grønlig eller rødlig, inderdelen ustribet 2.
2. Blosteret brunrødt eller mørkt rødlillat ..... atrorubens
" i hvert fald delvist grønligt 3.
3. Bladene mest kortere end stængelleddene ..... microphylla
" længere end stængelleddene helleborine

Epipactis palustris (L.) Cr. Sumphullæbe. VI-VIII. A B C K

E. helleborine (L.) Cr. Skovhullæbe. VI-IX. A B C K

E. atrorubens (Hoffm.) Besser Rød hullæbe. VI-VIII. A B C K

E. microphylla (Ehrh.) Swartz Småbladet hullæbe. 15-50cm. Støttebladene kortere end frugtknuden. Klasen m.m. ensidig. Blomsterne mest nikkende. Yderlæben med vortet grund. VI-VIII. B C K

Cephalanthera rubra (L.) Rich Rød skovlilje. Blomsten rødlilla. V-VII. A B C K

C. longifolia (Hudson) Fritsch Sværdskovlilje. 20-45cm. Renhvide blomster. 6-10 blade, der er mindst 6 x så lange som brede. ABCK

C. damasonium (Miller) Druce Hvidgul skovlilje. Hvidgullige blomster. 3-5 blade, der er 2-3 x så lange som brede. V-VII. A B C K

Limodorum abortivum (L.) Sw. Fuglestok. 20-80cm. Stænglen med skælblade. 6-20 lilla blomster med en spore på 15-25mm og en indsnøret underlæbe. V-VII. A B C K

Epipogium aphyllum Swartz Knælæbe. VII-VIII. B (Muro) K (Matese)

Neottia nidus-avis (L.) Richard Rederod. V-VII. A B C K

Listera ovata (L.) R.Br. Ægbladet fliglæbe. V-VIII. A B C K

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Skrueaks. 10-25cm. Bladene ægformet-elliptiske, grundstillede. De små blomster tætstillede i en skrueformet række. X-XI. A B C K

Herminium monorchis (L.) R.Br. Pukkellæbe. V-VII. K (M.S.Angelo)

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Skovgøgelilje. Støvknapperne vigende. V-VII. A B C K

P. bifolia (L.) Richard Bakkegøgelilje. Støvknapperne parallelle. V-VII. A B C K

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Langakset trådspore. 25-55cm. Bladene linje-lancetformede. Akset tætblomstret. Blomsterne lyserøde til næsten hvidlige. Sporen 10-20mm. V-VIII. B K

Leucorchis albida (L.) E.H.F.Meyer (Pseudorchis a.) Sækspore. K

Coeloglossum viride (L.) Hartman Poselæbe. VI-VIII. B C K

Dactylorhiza. Gøgeurt.

1. Sporen ret ..... 2.
   " bøjet 3.
2. Blomsten gul. Sporen valseformet, 1½-2mm tyk ..... insularis
   " rød. " kegleformet, 2-4½mm " saccifera
3. Sporen nedadrettet ..... sambucina
   " opadrettet. Med 3-7 rosetblade 4.
4. Sporen 17-25mm, ofte stejlt opret ..... romana
   " 9-13mm, skråt opret markusii

Dactylorhiza romana (Seb.) Soó (D. pseudosambucina) 15-35cm. Sidestillede blosterblade opadrettede og udaddrejede. Sporen 1-1½ mm tyk. Blomsten gul eller rød. III-VI. A B C K

D. markusii (Tineo) Baum.& Künk. (D. sulphurea ssp. siciliensis) 15-45cm. Blosterbladene som hos romana. Sporen mest 2mm tyk. Blomsten hvidliggul uden rød tegning. III-VI. K

D. insularis (Sommier) Landwehr 20-50cm. Bladene lyst grønne, ikke i grundroset. Blomsterne citrongule. Læben oftest med nogen rød tegning. Sporen mest vandret. IV-VI. C

D. sambucina (L.) Soó Hyldegøgeurt. 10-30cm. Blomsterne gule, eller røde med gult svælg. Sporen 10-15 x ca. 3mm, smalt kegleformet. III-VI. A B C K

D. saccifera (Brongn.) Soó Tragtgøgeurt. 25-90cm. Blomsterne rødlilla. Underlæben blegere med stribe- og pletmønster. Sidestillede blosterblade fremadbøjede. V-VII. A B C K

Neotinea maculata (Desf.) Stearn Kyseblomst. 10-30cm. Bladene lidt blågrønne, ofte småplettede. Akset tæt, 2-6cm, lidt ensidigt. Blomsterne 3-4mm, mat lyserøde eller grønlighvide, med hjælmformet samlede blosterblade. IV-V. A B C K

Orchis. Gøgeurt.

1. De 5 blosterblade m.m. fremadrettede og hjælmdannende .... 2.
   Ihvertfald de ydre blosterblade udstående eller nedadrett. 11.
2. Læben udelt ..... papilionacea
   " 3-4-delt 3.
3. Sporen opadbøjet ..... 4.
   " nedadrettet 5.
4. Sporen meget længere end læben ..... longicornu
   " omtrent af læbens længde morio
5. Læbens midterlap mindre end sidelapperne, udelt coriophora
   " " større " " 6.
6. Støttebladene omtrent af frugtknudens længde ..... 7.
   " højst ½ x frugtknuden 9.
7. Ydre blosterblade 3-3½mm. Sporen 1/4-1/3 x frugtkn. ustulata
   " " 6-12mm. " ½ x frugtknuden 8.
8. Blosterbladene med grønt på sig. Konveks læbe ..... lactea
   " uden grønt. Læben flad/konkav tridentata
9. Blosterbladene brunrøde udvendigt ..... purpurea
   " bleglilla til lyserøde 10.
10. Læbens flige spidse. Bladranden bølget ..... italica
    " " lidt butte. Bladranden jævn simia
11. Blomsterne gule ..... 12.
    " m.m. røde 14.
12. Læben uden røde prikker ..... pallens
    " med " " 13.

13. Bladene plettede. Underlæben med et knæk på 60° provincialis
" uplettede. " lige fremstrakt pauciflora
14. Bladene linje-lancetformede, ingen egentlig roset ..... 15.
" bredere, med roset 16.
15. Læbens midterlap kortere end sidelapperne ..... laxiflora
" " længere " " palustris
16. Læben udelt. Blosteret brunt eller grønligt ..... saccata
" 3-delt. Blosterbladene røde 17.
17. Sporen opadrettet ..... mascula
" nedadrettet eller vandret quadripunctata

Orchis papilionacea L. Sommerfuglegøgeurt. 15-40cm. Blosterbladene ikke helt hjælmdannende, vinrøde og stribede. Læben ofte rudeformet, ofte med brudt stregmønster. IV-V. A B C K

O. morio L. Salepgøgeurt. IV-VI. A B C K

O. longicornu Poiret Køllegøgeurt. 10-35cm. Minder om morio. Underlæbens sideflige oftest retvinklet nedadbøjede, det hvide midterfelt skarpt afsat. III-IV. C

C. coriophora L. Tægegøgeurt. 15-60cm. Blosterbladene tilspidsede. Blomsterne brune, rød, lyserød eller grønlige. Læben med purpurplettet og papilløst håret inderdel. IV-VI. A B C K

O. ustulata L. Bakkegøgeurt. Blosterbladene rød- til sortbrune. Læben 5-8mm, hvid med røde prikker. V-VII. A B C K

O. tridentata Scop. Tretandet gøgeurt. 15-45cm. Hjælmbladene langspidsede, blegt rødlilla med mørkere striber. Læben rigeligt rødlillat prikket. IV-V. A B C K

O. lactea Poiret Mælkegøgeurt. 10-20cm. Blosterbladene spidse, hvidlige, med grønlige eller rødlilla striber. Læben hvid eller lyserød, ret rødprikket. Midterfligen noget delt. III-IV. B K

O. purpurea Hudson Stor gøgeurt. IV-VI. B K

O. simia Lam. Abegøgeurt. 20-45cm. Som følgende, men hjælmbladene ofte svagt årede. IV-VI. A B C K

O. italica Poiret Flammegøgeurt. 20-40cm. Hjælmbladene langt tilspidsede, blegt rødlilla med mørkere årer. Underlæben med 4 smalle og lange flige. III-IV. A B C K

O. laxiflora Lam. Vandgøgeurt. 20-60cm. Blomsterne mørkt rødlilla. Underlæbens midterfelt hvidt og oftest uprikket. Sporen skråt opadrettet, 10-19mm. Kær og våde enge. IV-VI. A B C K

O. palustris Jacq. Kærgøgeurt. 15-100cm. Ligner den foregående, men blomsterne ofte lysere. Sporen 7-19mm, nedadrettet eller vandret. Kær og våde enge. VI-VII. C (Pollino)

O. quadripunctata Ten. Firplettet gøgeurt. 10-30cm. Blomsten lyst rødlilla. Ydre blosterblade vinkelret udstående i eet plan, de to indre fremadrettede mod hinanden. Underlæben med ca. 4 prikker nær svælget. IV-VI. A B C K

O. mascula L. ssp. olbiensis (Reuter) A.& Gr. Tyndakset gøgeurt. IV-VI. A B C K

O. pallens L. Bleg gøgeurt. 15-35cm. Bladene uplettede. Læben rundagtig-rudeformet, 3-lappet. Sporen opadbøjet. IV-VI. C

O. provincialis Balbis Krumsporet gøgeurt. 15-35cm. 5-20 blomster. Sporen opadbøjet, 13-19mm. IV-V. A B C K

O. pauciflora Ten. Fåblomstret gøgeurt. 15-30cm. Mest 3-7 blomster. Sporen opadbøjet. III-V. A B C K

O. saccata Ten. (O. collina) Sækgøgeurt. Blosteret grønligbrunt. Læben m.m. vinrød, noget rudeformet, med letbølget rand. Sporen 5-7mm, sæk-kegleformet. II-III. A B C K

Aceras anthropophorum (L.) Ait.f. Den hængte mand. 10-40cm. Akset smalt valseformet og tætblomstret. Øvre blosterblade grønlige og hjælmdannende. Underlæben okkergul, lang og firfliget, så blomsten ligner en mand med arme og ben. IV-VI. A B C K

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel Bukkeøgletunge. 20-90cm. Blosterbladene hjælmdannende, grønligt til brunligt hvide med rødbrune årer. Læben 3-fliget, sidefligene 5-15mm, linjeformede og spidse; midterfligen ofte skrueformet vreden. V-VI. A B C K

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter Kruslæbe. 25-60cm. Akset tæt med op til 30 blomster. Blosterbladene hjælmdannende, ikke spidse, af varierende farve og rødplettede indvendigt. Læben 13-20mm. Sporen kegleformet, 4-6mm. II-IV. A B C K

Anacamptis pyramidalis (L.) Richard Horndrager. 20-60cm. Akset 2-8cm, kegle- til kort valseformet. Blomsterne lyst til mørkt rødlilla. Underlæben med 3 korte, næsten lige store lapper. Sporen 10-15mm lang og ½mm tyk. V-VI. A B C K

Serapias. Hønsetunge. Læben med en nedadrettet yderflig og en skjult inderdel inde i blomstens svælg. Blosterbladene spids og hjælmdannende. Læben mest rødbrun. Hjælmen mest grålilla.

1. Læben allerinderst med 1 sort vulst ..... lingua
   " " " 2 åse 2.
2. Læbens yderflig 7-11½mm lang ..... parviflora
   " " over 12mm lang 3.
3. Støttebladene mest meget længere end blomsterne .. vomeracea
   " omtrent lig blomsterne 4.
4. Læbens yderdel 18-24mm bred ..... cordigera
   " " 10-14mm " orientalis

Serapias cordigera L. Purpurhønsetunge. 20-40cm. Læbens yderflig hjærteformet, 18-28x18-24mm, brunrød til brunlilla. Blosterbladene lyst grålilla. IV-VI. A B C K

S. vomeracea (Burm.) Briq. Plovskærshønsetunge. 25-50cm. Bladene 5-15mm brede. Læbens yderflig 20-28x 8-13mm. Støttebladene 13-18½mm brede. IV-VI. A B C K

S. orientalis Nelson 10-30cm. Bladene 12-20mm brede. Læbens yderflig 18-26x10-14mm. Støttebladene 18-25mm brede. III-IV. A (langs kysten fra Gargano til Ostuni)

S. parviflora Parl. Småblomstret hønsetunge. 15-25cm. Hjælmen tit indesluttet under det 3-4cm lange støtteblad. IV-V. A B C K

S. lingua L. 10-30cm. Læbens yderflig 13-18x7-12mm, skråt nedadrettet. III-V. A B C K

Ophrys. Flueblomst.

1. Griffelstøtten but ..... 2.
   " spids 5.
2. Ydre blosterblade rødlige ..... tenthredinifera
   " " grønlige 3.
3. Læbens midterlap med stærkt nedbøjet rand og derfor halvkugleformet ..... bombyliflora
   Læbens midterlap ikke eller lidt nedbøjet 4.
4. Læbens rand let nedadbøjet, ikke bredt gulrandet ..... fusca
   " " fladt udbredt eller opadbøjet lutea
5. Læben med tydelige, nedbøjede sidelapper ..... 6.
   " uden eller med svage sidelapper i læbens eget plan 8.
6. Læben med et vedhæng i spidsen ..... 7.
   " uden " " " 10.
7. Læbens vedhæng opadbøjet, ofte 3-tandet ..... scolopax
   " " bøjet ind under læben apifera
8. Læben saddelformet: konkav på langs og konveks på tværs bertolonii

9. Læben uden vedhæng. Indre blosterblade glatte ..... 10.
" med " . " " hårede 14.
10. Læbens rand korthåret til glat ..... 11.
" " stærkt lådden 12.
11. Indre blosterblade over 4/5 x de ydre ..... garganica
" " 2/3-3/4 x " " sphegodes
12. Ydre blosterblade røde ..... sipontensis
" " grønne 13.
13. Læben med tydelige horn i siden ..... incubacea
" uden horn tarentina
14. Læben overvejende gul ..... lacaitae
" højst lidt gul 15.
15. Læbens inderfelt når næsten læbens midte eller længere 16.
" " lille, når langtfra midten 17.
16. Læben trapezformet set forfra, bredest forneden biscutella
" bredt elliptisk forfra, " midtpå crabronifera
17. Læbens mærke skjoldformet og hvidrandet ..... candica
" " med H-formet grundstruktur 18.
18. Læben med en længdeliste mellem mærket og vedhænget oxyrrhynchos
Læben uden en sådan liste holoserica

Ophrys fusca Link Mørk flueblomst. 10-40cm. Læben m.m. flad, lang i det og butlappet, m.m. udrandet fortil, sortagtig, med et oftest mørkeblåt, bredt, omvendt V-formet mærke. III-V. A B C K

O. lutea Cav. Gul flueblomst. 10-25cm. Læben forholdsvis flad og lang i det, butlappet med let udrandet midterflig, mest bredt gulrandet og ellers brun eller sort med mørkeblåt mærke. IV-V.
ssp. lutea: Læben bredt gulrandet, 14-18mm lang, med et knæk oven for mærket.
ssp. galilaea (Fleischm.& Bornm.) Soó: Læben bredt gulrandet, 8-13½mm lang, uden noget knæk oven for mærket.
ssp. melena Renz: Læben brun med brun rand. A (Gargano)

O. tenthredinifera Willd. Stor flueblomst. 10-30cm. Læben firkantet til trapezformet, helrandet, med et vedhæng i spidsen og to kunder, ofte m.m. gulrandet, ellers brun. IV-V. A B C K

O. apifera Hudson Snabelflueblomst. 20-50cm. Griffelstøtten af læbens længde og med bølget spids. Blosteret lyserødt til hvidligt. Læben stærkt hvælvet, ofte brun, med skjoldformet mærke.ABCK

O. bombyliflora Link Humleflueblomst. 5-20cm. Kendelig ved den stærkt hvælvede, hårede, brune underlæbe og de gulgrønne blosterblade. Ret små blomster. IV-V. A B C K

O. biscutella Danesch (O. fuciflora ssp. pollinensis) Brillefluebloms t. 10-50cm. Læben brun. Mærket mest som to tværforbundne pletter. Inderfeltet kastanjebrunt. IV-V. A B C K

O. crabronifera Mauri (O. exaltata) Høj flueblomst. Blosteret mest rødt eller hvidligt. Læben med brunt og tæthåret randfelt og mere gulbrunt inderfelt. Mærket = 2 pletter. III-IV. K

O. holoserica (Burm.f.) Greuter (O. fuciflora) Dødningeflueblomst. 10-30cm. Blosterbladene mest røde/hvide. Læben brun med indtil 3mm høje knuder i siderne. Mærket ofte med øjer til siderne. III-VI. A B C K. 3 underarter:
ssp. apulica (Danesch) Buttler: Indre blosterblade 0,45-0,6 x de ydre. Læben 13½-17x17-21½mm. A B C K
ssp. holoserica: Indre blosterblade 0,25-0,45 x de ydre; disse hvidrøde til lyserøde.
ssp. parvimaculata (Danesch) Danesch: Indre blosterblade 0,25-0,45 x de ydre; disse grønne. A (Foggia til Lecce) B (Matera)

O. candica Greuter & al. Penselflueblomst. 15-40cm. Læben brun med svage knuder. Mærket skjoldformet, brunlillat eller brunt. Blosterbladene røde, de indre små. IV-V. A (sydlige del)

Ophrys lacaitae Lojac. Okkergul flueblomst. 10-25cm. Læben vifteformet, med hvælvet, brunt midterfelt og meget bred, gul rand, med en midterliste ud til vedhænget. III-VI. B K

O. oxyrrhynchos Tod. Rødbroget flueblomst. 10-25cm. Læben trapezformet, brun med kastanjebrunt midterfelt og lillat mærke. Blosterbladene mest grønne. III-V. A B C?

O. scolopax Cav. ssp. cornuta (Steven) Camus Sneppeflueblomst. 10-65cm. Blosteret mest rødt. Læben med et blåt eller brunt mærke, der ofte breder sig stærkt. Hver sidelap med et fremadrettet horn på 6-12mm. IV. A (Gargano)

O. sphegodes Miller Edderkoppeflueblomst. 10-40cm. Blosterbladene grønne, de indre ofte bølgede. Læbben brun, lådden, med svage knuder, udelt, 9-13mm, Mærket H-formet. III-IV. A B C K

O. garganica Danesch 25-35cm. Nær foregående. Indre blosterblade brede: over 1/3 så brede som lange, med gullig rand. A B C

O. incubacea Bianca (O. atrata) Langstribet flueblomst. 20-40cm. Læben mørkt kastanje- til sortbrun, med indtil 3½mm høje knuder, udrandet fortil, ofte med lille vedhæng. III-V.

O. tarentina Gölz & Reinhard 10-30cm. Grønne blosterblade, de indre bølgede. Læben sort- til rødligbrun, let hvælvet, med smal gullig og glat rand yderst uden for behåringen. III-IV. A B C

O. sipontensis Danesch Nær O. incubacea, men uden eller med svage knuder på læben og lidt større blomster. IV. A (Manfredonia og bagland)

O. bertolonii Moretti Saddelflueblomst. 10-35cm. Blosterbladene oftest lyserøde. Læben sortbrun med bredt lådden rand og et ofte lavtsiddende, mørkeblåt mærke. IV-V. A B C K

Corallorhiza trifida Chatel. Koralrod. VI-VII. K (Avellinese)

SLÆGTSOVERSIGT

Abies 5
Abutilon 97
Acacia 62
Acalypha 89
Acanthus 152
Acer 93
Aceras 246
Achillea 174
Achnatherum 233
Achyranthes 17
Acinos 136
Aconitum 31
Acorus 236
Actaea 31
Adenocarpus 64
Adenostyles 176
Adiantum 2
Adonis 32
Adoxa 158
Aegilops 225
Aegopodium 110
Aeluropus 233
Aesculus 94
Aetheorhiza 190
Aethionema 47
Aethusa 111
Agave 206
Agrimonia 56
Agrostemma 25
Agrostis 229
Ailanthus 92
Aira 228
Aizoon 19
Ajuga 131
Alcea 97
Alchemilla 58
Aldrovanda 51
Alisma 196
Alkanna 126
Alliaria 48
Allium 203
Alnus 7
Aloe 199
Alopecurus 231
Althaea 97
Althenia 197
Alyssoides 45
Alyssum 45
Amaranthus 17
Ambrosia 172
Ambrosina 237
Amelanchier 59
Ammannia 104
Ammi 114
Ammoides 114
Ammophila 233
Ampelodesmus 233
Anacamptis 246
Anacyclus 175
Anagallis 119
Anagyris 63
Anchusa 127
Andrachne 89
Andropogon 236
Androsace 118
Andryala 193
Anemone 31
Angelica 114
Anogramma 2
Anthemis 172
Anthericum 199
Anthoxanthum 228
Anthriscus 109
Anthyllis 82
Antirrhinum 145
Apera 221
Apium 113
Aptenia 19
Aquilegia 36
Arabidopsis 48
Arabis 44
Arbutus 118
Arctium 180
Arctostaphylos 118
Aremonia 56
Arenaria 20
Argyrolobium 64
Arisarum 236
Aristolochia 11
Armeria 119
Armoracia 43
Arrhenatherum 227
Artemisia 176
Arthrocnemum 17
Arum 236
Arundo 233
Asarum 11
Asparagus 206
Asperugo 128
Asperula 153
Asphodeline 199
Asphodelus 198
Asplenium 3
Aster 168
Asteriscus 172
Asterolinon 118
Astragalus 65
Asyneuma 164
Athamantha 111
Athyrium 4
Atractylis 179
Atriplex 16
Atropa 141
Aubrieta 45
Avellinia 229
Avena 227
Avenula 227
Azolla 5

Baldellia 196
Ballota 134
Barbarea 42
Barlia 246
Bassia 17
Beckmannia 221
Bellardia 149
Bellardiochloa 220
Bellevalia 202
Bellis 167
Berberis 36
Berteroa 46
Berula 110
Beta 15
Betula 7
Biarum 236
Bidens 172
Bifora 109
Biscutella 48
Biserrula 66
Blackstonia 122
Blechnum 4
Blysmus 238
Bombycilaena 169
Bonannia 114
Borago 128
Botrychium 2
Brachiaria 234
Brachypodium 224
Brassica 49
Briza 221
Bromus 222
Broussonetia 9
Bryonia 103
Bufonia 21
Bunias 41
Bunium 110
Bupleurum 112
Butomus 196

Cachrys 112
Cakile 50
Calamagrostis 230
Calamintha 136
Calendula 178
Calepina 51
Calicotome 63
Callitriche 129
Caltha 21
Calystegia 124
Camelina 46
Campanula 162
Camphorosoma 17
Cannabis 9
Capnophyllum 114
Capparis 38
Capsella 46
Cardamine 43
Cardaria 49
Cardopatum 180
Carduncellus 186
Carduus 180
Carex 239
Carlina 179
Carpinus 7
Carpobrotus 19
Carthamus 136
Carum 114
Castanea 8
Catabrosa 221

Catananche 187
Catapodium 219
Caucalis 116
Celtis 9
Centaurea 184
Centaurium 122
Centranthus 160
Cephalanthera 243
Cephalaria 160
Cerastium 22
Ceratocephalus 35
Ceratonia 62
Ceratophyllum 30
Cercis 64
Cerinthe 126
Cestrum 142
Ceterach 3
Chaenorhinum 145
Chaerophyllum 109
Chamaecytisus 63
Chamaemelum 174
Chamaerops 236
Chamaespartium 64
Cheilanthes 2
Chelidonium 37
Chenopodium 15
Chondrilla 192
Chrozophora 89
Chrysanthemum 175
Chrysosplenium 54
Cicendia 121
Cicer 66
Cichorium 186
Circaea 104
Cirsium 182
Cistus 100
Cladium 239
Cleistogenes 233
Clematis 31
Clinopodium 136
Clypeola 46
Cnicus 186
Cnidium 114
Cochlearia 46
Coeloglossum 244
Colchicum 199
Coleostephus 175
Colocasia 236
Colutea 65
Commelina 212
Conium 112
Conopodium 110
Conringia 49
Consolida 31
Convolvulus 124
Conyza 168
Corallorhiza 248
Coriandrum 109
Coris 119
Corispermum 17
Cornus 106
Coronilla 83
Coronopus 49
Corrigiola 24
Corydalis 37
Corylus 8
Corynephorus 229
Cotoneaster 59
Crambe 51
Crassula 51
Crataegus 59
Crepis 192
Cressa 124
Crithmum 110
Crocus 208
Crucianella 152
Cruciata 155
Crupina 186
Crypsis 234
Cucubalus 28
Cupressus 5
Cuscuta 123
Cutandia 219
Cyclamen 118
Cydonia 58
Cymbalaria 146
Cymodocea 197
Cynanchum 123
Cynara 183
Cynodon 234
Cynoglossum 129
Cynomorium 105
Cynosurus 221
Cyperus 238
Cystopteris 4
Cytinus 11
Cytisus 63

Dactylis 221
Dactylocnemium 234
Dactylorhiza 244
Damasonium 196
Danthonia 233
Daphne 97
Dasypyrum 226
Datura 142
Daucus 116
Delphinium 31
Deschampsia 228
Descurainia 48
Desmazeria 219
Dianthus 29
Dichanthium 235
Dictamnus 92
Digitalis 146
Digitaria 234
Diospyros 121
Diplotaxis 49
Dipsacus 160
Doronicum 177
Dorycnium 81
Draba 46
Dracunculus 236
Dryas 56
Dryopteris 4
Drypis 28

Ecballium 103
Echinaria 222
Echinochloa 234
Echinophora 109
Echinops 180
Echium 126
Edraianthus 164
Ehrharta 234
Elaeoselinum 115
Elatine 103
Eleocharis 238
Elodea 196
Elymus 225
Emex 14
Ephedra 6
Epilobium 105
Epipactis 243
Epipogium 243
Equisetum 1
Eragrostis 233
Eranthis 30
Erianthus 235
Erica 117
Erigeron 168
Erodium 86
Erophila 46
Eruca 50
Erucastrum 50
Eryngium 108
Erysimum 41
Eucalyptus 104
Euonymus 94
Eupatorium 167
Euphorbia 89
Euphrasia 148
Evax 169

Fagonia 87
Fagus 8
Fedia 159
Ferula 114
Ferulago 114
Festuca 216
Ficus 9
Filago 169
Filipendula 54
Fimbristylis 238
Foeniculum 111
Fontanesia 121
Frankenia 102
Fraxinus 121
Fritillaria 200
Fuirena 238
Fumana 102
Fumaria 37

Gagea 199
Galactites 183
Galanthus 207
Galega 65
Galeopsis 133
Galinsoga 172
Galium 153
Gastridium 229
Gaudinia 227
Genista 64
Gentiana 122

Gentianella 123
Geranium 85
Geum 57
Gladiolus 209
Glaucium 37
Glechoma 135
Glinus 19
Globularia 152
Glyceria 222
Glycyrrhiza 66
Gnaphalium 169
Gomphocarpus 123
Gratiola 142
Guizotia 172
Gymnadenia 244
Gypsophila 28

Hainardia 231
Halimione 17
Halimium 100
Halopeplis 17
Hedera 106
Hedypnois 187
Hedysarum 84
Helianthemum 101
Helianthus 172
Helichrysum 170
Helictotrichon 227
Heliotropium 125
Helleborus 30
Hemarthria 236
Hemerocallis 199
Hepatica 31
Heptaptera 112
Heracleum 115
Herminium 243
Hermodactylus 208
Herniaria 24
Hesperis 41
Hibiscus 97
Hieracium 193
Himantoglossum 246
Hippocrepis 84
Hippophae 98
Hippuris 105
Hirschfeldia 50
Holcus 229
Holosteum 22
Hordelymus 226
Hordeum 226
Hornungia 47
Huetia 110
Humulus 9
Hyacinthoides 201
Hydrocharis 196
Hydrocotyle 114
Hymenocarpus 82
Hymenolobus 46
Hyoscyamus 141
Hyoseris 187
Hyparrhenia 236
Hypecoum 37
Hypericum 98
Hypochoeris 188
Hyssopus 137

Iberis 47
Ilex 94
Impatiens 94
Imperata 235
Inula 170
Ionopsidium 47
Ipomoea 124
Iris 208
Isatis 41
Isoetes 1

Jasione 164
Jasminum 121
Juglans 7
Juncus 210
Juniperus 5
Jurinea 180

Kickxia 146
Knautia 160
Kochia 17
Koeleria 227
Kosteletzkya 97
Kundmannia 112

Laburnum 63
Lactuca 191
Lagoecia 109
Lagurus 228
Lamarckia 221
Lamiastrum 134
Lamium 133
Lappula 129
Lapsana 192
Laserpitium 116
Lathraea 149
Lathyrus 70
Laurentia 164
Laurus 36
Lavandula 139
Lavatera 96
Legousia 163
Lembotropis 63
Lemna 237
Lens 69
Leontodon 188
Lepidium 48
Lereschia 114
Leucanthemum 175
Leucorchis 244
Ligustrum 121
Lilium 200
Limodorum 243
Limoniastrum 121
Limonium 119
Linaria 145
Linum 88
Lippia 129
Listera 243
Lithodora 126
Lithospermum 125
Lobularia 46
Lolium 218
Lonicera 157
Lophochloa 227
Loranthus 11

Lotus 81
Ludwigia 104
Lunaria 45
Lupinus 64
Luzula 212
Lychnis 25
Lycium 140
Lycopersicon 141
Lycopus 138
Lygeum 233
Lysimachia 118
Lythrum 103

Malcolmia 42
Malope 95
Malus 58
Malva 95
Mandragora 141
Mantisalca 184
Maresia 42
Marrubium 132
Marsilea 4
Matthiola 42
Medicago 74
Melampyrum 148
Melica 222
Melilotus 73
Melissa 136
Melittis 133
Mentha 138
Menyanthes 123
Mercurialis 89
Mesembryanthemum 19
Mespilus 59
Meum 112
Mibora 221
Micromeria 136
Micropyrum 219
Milium 232
Minuartia 21
Mirabilis 17
Misopates 145
Moehringia 21
Moenchia 23
Molinia 233
Molinierella 228
Monotropa 117
Montia 19
Moricandia 49
Morus 9
Muscari 203
Myagrum 41
Mycelis 191
Myosotis 128
Myosurus 36
Myriophyllum 105
Myrrhoides 109
Myrtus 104

Narcissus 207
Nardurus 219
Nardus 233
Nasturtium 43
Nectaroscordum 206
Neotinea 244

Neottia 243
Nepeta 135
Nerium 123
Neslia 46
Nicotiana 142
Nigella 30
Nonea 127
Notholaena 2
Notobasis 183
Nuphar 30
Nymphaea 30

Ocimum 140
Odontites 148
Oenanthe 111
Oenothera 104
Olea 121
Onobrychis 84
Ononis 72
Onopordum 183
Onosma 126
Ophioglossum 2
Ophrys 246
Opopanax 114
Opuntia 103
Orchis 244
Origanum 137
Orlaya 116
Ornithogalum 201
Ornithopus 83
Orobanche 150
Orthilia 117
Oryzopsis 232
Osmunda 2
Ostrya 8
Osyris 10
Otanthus 175
Oxalis 85
Oxytropis 66

Paeonia 36
Paliurus 94
Pallenis 172
Pancratium 207
Panicum 234
Papaver 36
Parapholis 231
Parentucellia 148
Parietaria 10
Paris 206
Parnassia 54
Paronychia 24
Parthenocissus 95
Paspalum 235
Pastinaca 115
Pedicularis 149
Peganum 88
Periploca 123
Petasites 176
Petrorhagia 29
Petroselinum 113
Peucedanum 115
Phagnalon 170
Phalaris 231
Phillyrea 121
Phleum 230
Phlomis 133
Phragmites 233
Phyllitis 3
Physalis 141
Physospermum 112
Phyteuma 164
Phytolacca 19
Picnomon 183
Picris 189
Pilularia 4
Pimpinella 110
Pinguicula 152
Pinus 5
Pistacia 93
Pisum 71
Plantago 156
Platanthera 243
Platanus 54
Platycapnos 38
Plumbago 119
Poa 220
Polycarpon 24
Polycnemum 15
Polygala 92
Polygonatum 206
Polygonum 11
Polypodium 4
Polypogon 229
Polystichum 4
Populus 7
Portenschlagella 111
Portulaca 19
Posidonia 197
Potamogeton 196
Potentilla 57
Prasium 132
Prenanthes 191
Primula 118
Prunella 136
Prunus 59
Pseudorchis 244
Pseudorlaya 117
Psilurus 221
Psoralea 66
Pteridium 3
Pteris 2
Ptilostemon 183
Puccinellia 221
Pulicaria 171
Pulmonaria 127
Pulsatilla 31
Punica 104
Putoria 152
Pycnocomon 162
Pyracantha 59
Pyrola 117
Pyrus 58

Quercus 8

Ranunculus 32
Raphanus 51
Rapistrum 50
Reichardia 190
Reseda 51
Rhagadiolus 187
Rhamnus 94
Rhinanthus 149
Rhus 93
Rhynchocorys 149
Ribes 54
Ricinus 89
Ridolfia 113
Robinia 65
Romulea 209
Rorippa 43
Rosa 55
Rosmarinus 139
Rubia 156
Rubus 54
Rumex 13
Ruppia 197
Ruscus 206
Ruta 92

Sagina 23
Salicornia 17
Salix 6
Salpichroa 141
Salsola 17
Salvia 139
Salvinia 5
Sambucus 157
Samolus 119
Sanguisorba 56
Sanicula 108
Santolina 172
Saponaria 29
Sarcopoterium 56
Satureja 136
Saxifraga 53
Scabiosa 161
Scandix 109
Schinus 43
Schoenus 239
Scilla 201
Scirpus 237
Scleranthus 24
Sclerochloa 221
Scolymus 186
Scorpiurus 84
Scorzonera 189
Scrophularia 144
Scutellaria 132
Secale 226
Sechium 103
Securigera 82
Sedum 52
Selaginella 1
Sempervivum 52
Senecio 177
Serapias 246
Serratula 184
Seseli 110
Sesleria 221

Setaria 235
Sherardia 152
Sideritis 133
Silene 25
Silybum 183
Sinapis 50
Sison 113
Sisymbrella 43
Sisymbrium 41
Sium 110
Smilax 206
Smyrnium 109
Solanum 141
Soldanella 118
Solenanthus 129
Solidago 167
Sonchus 190
Sorbus 190
Sorghum 235
Sparganium 237
Spartium 64
Spergula 25
Spergularia 25
Sphenopus 220
Spiranthes 243
Sporobolus 234
Stachys 134
Staphylea 94
Stellaria 21
Sternbergia 207
Stipa 232
Streptopus 206
Styrax 121
Suaeda 17
Succisa 160
Succowia 50
Symphytum 127

Taeniatherum 226
Tamarix 102
Tamus 207
Tanacetum 175
Taraxacum 191
Taxus 6
Teesdalia 47
Teline 64
Tetragonolobus 82
Teucrium 131
Thalictrum 36
Thapsia 116
Theligonum 105
Thesium 10
Thlaspi 47
Thymelaea 98
Thymus 137
Tilia 95
Tolpis 187
Tordylium 115
Torilis 116
Trachelium 164
Tragopogon 190
Tragus 234
Tremastelma 161
Tribulus 88
Tricholaena 235
Trifolium 76
Triglochin 196
Trigonella 74
Trinia 113
Trisetum 228
Tuberaria 100
Tulipa 200
Turgenia 116
Tussilago 176
Typha 237
Tyrimnus 183

Ulex 64
Ulmus 9
Umbilicus 51
Urginea 201
Urospermum 187
Urtica 9
Utricularia 152

Vaccaria 29
Valantia 155
Valeriana 159
Valerianella 158
Velezia 30
Ventenata 227
Veratrum 198
Verbascum 142
Verbena 129
Veronica 146
Viburnum 157
Vicia 66
Vinca 123
Vincetoxicum 123
Viola 99
Viscum 11
Vitex 129
Vitis 95
Vulpia 218

Wahlenbergia 164
Wolffia 237
Woodwardia 4

Xanthium 172
Xeranthemum 179

Zannichellia 197
Ziziphus 94
Zostera 197